













A. M. M. M.









Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30453276>



# FUNDAMENTA MEDICINÆ

THEORETICO-PRACTICA,

SECUNDUM CELEBERRIMI D. D. STAHLII

Potissimum, aliorumque Clebriorum Medicorum placita conscripta, &  
propri. Experientia confirmata,

IN FORMA TABULARUM

Universam *Theoriam Medicam*, *Paxin Generalem* & *Specialem* omnium morborum internorum,  
cum *Signis*, *Differentiis*, *Prognosi*, *Remediis*, *Polychrestis*, *Selectis* &  
*Specificis*, *Methodo Medendi planissima*, *Formulis necessariis* &  
*Cautelis Practicis* continentium, exhibita

A

GEORGIO PHILIPPO NENTER,

MED. D. ET PRACT. ARGENT.

EDITIO SECUNDA.



VENETIIS,

Excudebat SEBASTIANUS COLETI.

MDCCLIII.

SUPERIORUM PERMISSU, ac PRIVILEGIO.



ANATOMICAL

WELLS

THE

MUSEUM

OF THE

GEORGE

AND

WELLS





# P R Æ F A T I O.

**D**um tuis, Lector Benevole, qui priora sincera excepisti mente, oculis Medicum denuo subiicia scriptum, non dubito te & hoc eodem excepturum esse animo, certissime enim persuasus esse potes, me nullum alium ob finem Scripta edidisse & editurum esse, quam ut partim novos, in Medicina moderna in magna copia adhuc occurrentes, fideliter demonstrem, partim ut Tyronibus artis breviorē aperiam viam, quo eo facilius & felicius ad finem prepositum pervenire & scopulos, in quos ego in studiorum cursu incidi, evitare queant. Ast quamvis de tua candore nullum mihi sit dubium, non deerunt tamen qui aliis plane scriptum hocce intuebuntur oculis, nam, uti nosti, Censorum & Criticorum, qui nil, nisi quod ipsi faciunt; rectum putant, moderni temporibus plena sunt omnia; unde dum nova prodeunt scripta, cum insigni fervore eadem perlegunt, non eum quidem in finem, ut, an aliquid, quod notatu dignum est, in illis occurrat, inquirant, sed ut habeant, quod carpant: & etiamsi interdum nihil, quod jure carpere possint, inveniant, nihilominus tamen; ut genio suo indulgeant, verbis modo alienum sensum affingunt, modo in stylum inquirunt, eumque juxta omnes regulas examinant, & dum contra realia nihil habent, quod proferre possint, propter verba minus polita ipsa scripta alio spernunt supercilio: sed cum reprehendere, quam imitari facilius sit, facile etiam mecum talium spernes criticorum judicia, ac id ages, ut Medicina, modernis temporibus multis in locis humi jacens & quam maxime contempta, sensim sensimque corrigatur atque debito restituatur nitore: quod sane, si Medici conjunctis viribus magnam hocce aggredierentur opus, facillime fieri posset, uti id cum Baglivo plures & nuper D. Francois Medicus Parisiensis in edito Tractatu de Reformatione Medicinæ, egregie demonstrare. Sed quam maxime dolendum est, quod salutaria talia ut plurimum spernantur consilia, & quod multi Medicorum, quos tamen conscientia ad amplificandam & restaurandam Medicinam compellere deberet, imprimis si sufficientibus simul animi dotibus instructi sunt, adeo socordes sint, ut, quamvis miserum Medicinæ statum satis superque agnoscant, nihilominus tamen miseræ arti Medicæ opem ferre recusent. Et hinc etiam labor hicce insignis & maximi est momenti, imo etiam hisce temporibus maxime tediosus si pauci solummodo eundem suscipiunt: cum enim multi Medicorum, Medicinam jam in florentissimo esse statu, eamque tantum incrementi sumsisse credant, ut vix aliquid superaddi queat, unicuique, quale premium is, qui Medicinam ægritudinis accusare conatur, reportaturus sit, facile patebit: nam Candide Lector, consideres quæso quid hic agendum sit? Omnes errores, qui sensim sensimque in Medicina irrepserunt, demonstrandi sunt: sed cum nullus, etiamsi satis enormis, deprehendatur error, qui suos aut non habuerit, aut adhuc habeat Patronos, placidam etiam reprehensionem graviter eundem defendentium bilem commoturam esse, levi comprehendens negotio: & hinc veritatis pedissequa inseparabilis erit odium, quod, quo magis & fortius reprehendatur error, eo gravius quoque reddetur; gravissimum autem fit, si plures simul monstrantur, quot enim errorum Patroni, tot quoque inimici tum temporis erunt. Non autem errores tantum indicasse sufficit, demonstrationibus & rationibus insuper sufficientibus opus est: si mitiori quis incedit via & persuasionibus placidis ac submissis errores demonstrare conatur, allis adulator audit, ab aliis vero timidatis arguitur: si fortior est rusticus, imprimis si rem, uti est, eloquitur: si subtilia profert argumenta, sophistam agit: si præconceptas opiniones in dubium vocat, septisimi arguitur: si vanitates vanitatumque rationes irridet, scoticus est: si jam diu ( licet erronee satis ) recepta reiicit & alia ( quamvis meliora ) iisdem supponere conatur, Novatoris titulum acquirit: si veterum veras & multiplici experientia confirmatas observationes quorundam speculationibus præfert, & missis inanibus disceptationibus. Theoreticis Praxin potissimum urget, Theoria contemptorum pertæsus, ad talia qualia respondere recusat, triumphus ante victoriam canitur: si forsitan alia vice mitius suam explicat mentem & se rem hoc vel illo modo intellexisse contendit, probat & confirmat, publicæ revocationis arguitur. Majores vero adhuc difficultates occurrunt, si quis erroribus, agnitis mederi cupit, mille enim hic controversiæ & obiectiones occurrunt, alii propositam medelam prorsus respuunt, aliis novos Medicinæ agnoscunt quidem, curam tamen impossibilem esse existimant: ita e. g. cum Baglivii scripta, in quibus multa egregiis Theoreticis, ea solum, quæ ad Praxin spectant, & quidem methodo aphoristica tradiderit, laudabant, simul tamen ipsis displicebat, quod motum meningum in Medicinam introducere conatus fuerit: reliqua quæ de Academiis aut societatibus, Medicinæ promovendæ gratia erigendis, proposuerat, admittebant quidem, sed quoad executionem impossibilia judicabant. Idem fatum etiam elegantissimus D. Francois antea allegatus Tractatus, expeditur: plerique optime conscriptum esse librum & vera continere admittunt, quoad executionem vero eundem impossibilia tradere credunt. Si quis E. hæc omnia probe perpendit, facile a proposito, cum tot tanteque difficultates, non parum odii ac tædii procreantes occurrant, deterri potest. Ast si e contrario ipsam Medicinam corruptam & contemptam, & hinc reformationis, & restorationi maxime indigam, consideramus, merito quaeritur: an propter varias difficultates, occurrentes aut odium metuendum Medicinæ corruptæ medela negligenda sit? Si conscientiam consulo, hæc & sana ratio eam minime intermittenda esse dicunt: cum enim Medicina certissime Dei donum & ideo miseris hominibus concessa sit, ut miserrimum, morbis variis & morti obnoxium, corpus, quantum quidem possibile, in integritate conservetur, per se patet talem artem nobilissimam, si propter hominum commenta & negligentiam corrupta est, omni studio restituendam esse, ut Summi & Optimi Creatoris voluntati satisfiat. Si politicas pondero rationes, summe, imo quam maxime, necessaria est talis Medicinæ cura; interest enim Reipublicæ curvis, ut cives & subditi officio suo fungi queant: uti enim in corpore humano pars parti infervit, & una ægotante reliquæ quoque parviuntur, ita quoque in corpore politico, si plura membra morbis laborant, aut plane tolluntur, necessaria illa partium conspiratio labefactatur: imo quo plures



sunt subditorum, eo magis florens est status, si autem plures e medio tolluntur atque hoc ipso numerus civium & subditorum imminuitur, Respublica maximum exinde capit damnum. Consideremus saltem regiones peste, aut aliis epidemicis morbis devastatas, quænam quæso, sublato etiam jam morbo, ibidem deprehenditur miseria? Pauci enim illi, qui pestis ferociam effugerunt, neque ad culturam terræ, neque ad onera necessaria ferenda sufficiunt: quare etiam ipsi summi Magistratus, miseria subditorum permoti, eos ab oneribus ordinariis, quantum quidem possibile, eximunt, aliisque qui in demortuorum bona succedere cupiunt, multas immunitates gratiose largiuntur, ut hoc modo membra in statu Politico deperdita restituantur, ac Respublica in sua conservetur integritate. Si jam Medicum indoctum ejusque Medicinam corruptam consideramus, & si simul perpendimus, quænam & quot damna talis homo inferat, facile unusquisque concedet, hujusmodi hominem, sub veri Medici larva incedentem, plures sæpius jugulare ægrotos, quam morbos ipsos. Ponamus v. g. Dysenteriam epidemicè grassantem, hanc si perversè tractat talis Medicus, ægrotos brevi tempore neci tradit, aut easdem gravioribus morbis consequentibus exponit. Si Febres tractat intermittentes, easque nimis mature vel suppressit, vel inconvenienti medela protrahit, multis gravioribus morbis portam pandit. Si methodum in acutis medendi veram ignorat, plures jugulat, quam curat: ut alios morbos silentio præteream. Apud Veteres jam celebris erat Themison, qui forsan eadem corrupta instructus erat Medicina, unde querebatur.

Quot Themison ægros autumnno occiderit uno?

*Sed credes forsan, Benevole Lector, paucos tantum esse tales rudes Medicos, qui ægrotis damno potius quam solatio sunt; crederem & ego hocce, nisi supra laudatus D. François paucos dari veros Medicos, peculiari capite demonstrasset: animus quoque esset ejusdem argumenta hoc loco recensere, præsertim cum in lingua vernacula, quam multi non intelligunt, scripserit, ast cum actum agere, ne forsan de novo plagiarum aut compilatoris titulum acquiram, nolim, tibi, Lector candide, eundem commendo librum, hic enim te facile convincet. Supponam E. cum supra allegato Authore, si te, Lector amice, consentiente id fieri potest, paucos dari Medicos veros: si vero veri non sunt, Medicinam profitentur corruptam, & hinc eorum Medicina & Medendi Methodus summa indiget correctione: quando autem non obstantibus omnibus remonstracionibus juxta corruptam suam Medicinam ægrotos in morbis tractant, facile patet, quenam damna exinde in Rempublicam redundant. Quod si tandem medice ipsam rem considero, summa sane necessitas Medicinæ restaurationem & reformationem efflagitat, nam si omnes in universum Medicinæ partes contemplor, multis, imo quam plurimis, tricis eas refertas esse deprehendo, quenam quæso opinionum farrago, quot ridicula figmenta, quot inanes controversiæ inveniuntur, in Physiologia? quot trice occurrunt in Pathologia? quot causæ morbificæ finguntur & proponuntur? & quænam opinionum saburra in reliquis est paribus? qui talia non agnoscit, cæcus sit oportet. Medicinæ E. quam maxime necessaria est Medicina, eaque a sordibus liberanda, ut tandem aliquando, quid vera Medicina sit, apparere queat. Si enim in tali statu misera relinquitur ars, non possunt non graviora sequi mala. Multi præstantes viri, inter quos præcipui fuerunt Sydenham, & Baglivus aliique (quibus merito etiam Celeberrimum D. D. STAHLIUM, quem Deus peculiaribus ad reformandam Medicinam instruxit donis, annumeramus, hic enim plus quam reliqui reformatores omnes præstitit, quod egregia ejus scripta satis superque testantur, quæ etiam contra omnem invidiam inconcussa manebunt, ) id jam satis agnoverunt & publicis scriptis demonstraverunt. Quamvis autem Celeberrimi hi viri tanta in Medicinæ reformatione præstiterint, ut vix aliquid addi possit, licebit tamen & mihi quædam, Medicinæ restaurationem concernentia proponere. Prævideo quidem facile, me parum gratiæ ab hoc labore reportaturum esse, inprimis ab iis qui Medicinam nostris temporibus propter inventa Anatomica Botanica, aliaque maxime exultant esse & hinc reformatione minime egere, sibi firmiter persuadent, uti supra jam monui: sed cum jam iniquos ferre sermones & invidiam pati diu didicerim, paucorum invidorum curabo judicia; unicum enim viri cordati, eruditi & veritatem, quam & ego constanter sequar, amantis equum judicium, mihi potius erit, quam omnia reliqua. Quo vero in odiosa tali materia, eo melius procedam, Medicorum consuetum sequar ordinem ac 1) proponam ægrotae Medicinæ Historiam. 2) Agam de signis ægræ Medicinæ; deinde 3) inquiram in causas, quæ Medicinæ ægritudinem prodixerunt. 4) Tractam Effectus & Prognosin. 5) Tandem finem imponet ægrotae Medicinæ cura cum Cautelis Practicis. Faxit DEUS, ut omnia cedant feliciter.*



## DE MEDICINA ÆGROTA.

*Historia Morbi.*

**M**edicina post lapsum primorum parentum eum in finem humano generi summus rerum Opifex largiebatur, ut ejus ope omnes morbi, quibus homines post lapsum ob peccatum commissum expōiti erant, partim præcaverentur, partim curarentur, quo miseri homines illibata sanitate gaudentes, eo melius Creatorem in creaturis agnoscere possent; adeoque a summo Parente proveniens ars non poterat non esse generi humano quam charissima, & respectu primæ Originis, Subjecti & Finis nobilissima. Deus ipse subministrabat remedia varii generis, ut iisdem uterentur morbis afflicti, unde sensim sensimque primæ Medicinæ jaciebantur fundamenta. Postea cum a multis primariæ dignitatis viris, Principibus & Sacerdotibus, Medicinam tanquam singulare Dei donum considerantibus, indefesso tractaretur studio, majora semper capiebat incrementa. Ex horum numero apud Ethnicos, *Chiron*, *Achilles Rex*, *Æsculapius*, *Podalirius*, *Macbaon*, *Nicomachus*, *Melampus*, *Menecrates Syracusanus*, *Herophilus*, *Empedocles*, aliique maxime inclarescebant. Post hosce magis adhuc Medicina in Schola Hippocratica augebatur, dum Hippocrates Cous indefesso studio Medicinam continuo tractans, iis, quas a Parentibus, aliisque priscis Medicis hauserat, quotidie plures addebat observationes. Tum temporis Medicina in florentissimo per plures annos erat statu, quoniam Medici Naturam, quam veram morborum medicatricem esse credebant, unice sequebantur, & observationibus adeo incumbabant, ut etiam integros dies noctesque in observandis morborum phænomenis consumerent. Postquam vero, mortuis veris Hippocratis asseclis, alii, relicta methodo Hippocratica simplici, multa aliena in Medicinam ingerere inciperent, Medicina sensim ægrotare incipiebat; quæ ægritudo postmodum, cum figmentum spirituum & facultatum in scholas a *Galeno* introduceretur, ac Philosophia Aristotelica Medicinæ immisceretur, magis augebatur. Maximum autem periculum, cum in Arabum perveniret manus, ipsi imminebat; hi enim, neglectis observationibus, per quas ea antea tanta sumserat incrementa, toti in ea erant, ut Medicinam variis & prolixis commentariis illustrarent, cum Philosophia magis adhuc miscerent, ac variis compositionibus exornarent: unde pauper Medicina, dum Historia morborum, quæ hætenus succum & sanguinem ipsi largita erat, fere penitus peribat, tota macie consumebatur. Succedente tempore Paracellus aliique Chymici, miseriam Medicinæ aliquo modo inspicientes, medelam quærebant & etiam multa detegebant, quibus Medicinæ ægrotanti succurrere conabantur: sed cum in tanto Medicorum numero Chymici essent paucissimi, quos reliqui Philosophiæ Aristotelico-Scholasticæ & Arabibus faventes maximis excipiebant convitiis, Medicina aliquo modo per remedia Chymica resuscitata, mox per negligentiam Medicorum Scholasticorum, magis in altercando & absurdis quisquiliis, quam medendo & observando se exercentium, in pristinum redibat statum. Cum vero circa hoc tempus elegantiores renatæ essent literæ, multi Medicorum, missis impuris Arabum lacunis, ex ipsis Græcis fontibus Medicinam hauriebant; unde etiam eo ipso tempore multi Hippocratis scripta diligenter evolventes, & egregia ex hisce trahentes, Hippocratis aliorumque antiquorum observationes in lucem mittebant. Sed cum & horum exiguus, respectu reliquorum Arabicam barbariem & incomptam Scholasticam Philosophiam Medicinæ immixtam amantium, esset numerus, simplices hæ observationes, uti aliis apparebant, statim spernebantur, adeo ut Medicina exinde non multum solatii perciperet. Spes quidem erat, cum Cartesius, rejeclis Scholasticorum tricis, novam introduceret Philosophiam, fore, ut misera Medicina aliquo modo restitueretur; sed cum & hujus Sectæ asseclæ, relicta Naturæ via, hominem in machinam transmutarent, ac phænomenorum variorum explicationibus & racionibus Physicis magis, quam observationibus se manciparent, & Veteres Medicos, Historiam morborum tractantes, prorsus contemnerent, Medicina, si non miserior reddebatur, misera tamen manebat. Cum Anatomici vâla lactea, circulumque sanguinis, aliaque detegerent, spes porro aliqua affulgebat: sed cum horum inventorum nulla prorsus ad Medicinam & potissimum ad Praxin fieret applicatio, & plerique solum inventis hisce contenti essent, parum solatii exinde hauriebat ægra Medicina. Spes quoque erat superioribus temporibus fore, ut, cum non pauci cordati viri miseriam Medicinæ publice exponerent, ut Medicina emendaretur, sed cum reliqui Medici talia proposita vel irriderent, vel ex amore hypothesum suarum salutaria illa consilia amplecti nollent, & solum curiositatibus Botanicis, Anatomicis, Physicis &c. intenti essent, consilia, licet optima, erant inutilia. Nostris temporibus eadem adhuc luditur fabula, licet enim publicæ de Medicinæ corruptæ statu prostent querelæ, & multi etiam ejusdem miserum agnoscant statum, nihilominus tamen quamplurimi Medicinam nunquam perfectiorem, quam hisce temporibus, fuisse contententes reperiuntur, qui ideo etiam Medicinæ medelam inutilem esse judicant. Cum vero misera Medicina adhuc conqueratur. 1) Quod propter deformitatem suam & miserum statum contemnatur, una cum ministris fidelibus. 2) quod relicta Naturæ via, alia plane ars in non paucis Scholis quam Medicina doceatur. 3) Quod a filiis artis, jucunda & curiosa magis quærentibus, plane fere deferatur. 4) Quod a spuris artis dilaceretur. 5) Quod ob negligentiam Medicorum multi adhuc morbi incurabiles reperiuntur, quos tamen veri Naturæ filii antea curaverint. 6) Quod ob eandem negligentiam multorum morborum essentia adhuc incognita sit, & hinc majora adhuc metuat mala, Medicorum verorum Naturæ Ministrorum implorat auxilium.



*Resolutio.*

Præfens Historia exhibet in compendio Medicinam ægotam ab Hippocratis jam tempore multa mala passam, & Medicorum auxilium implorantem, cui honesto petito ut satisfiat, omnino justum & æquum est, nam cum ex præsuppositis, Medicinam revera Dei donum & miserorum solatium esse, constet, ipsa sana ratio, ei quoque in misero, de quo conqueritur, statu succurrendum esse, dicitur: quo autem id eo meliori ordine fiat, primo de signis statum Medicinæ corruptum manifestantibus agemus.

*Signa Diagnostica.* Inter signa statum Medicinæ ægotum indicantia, *primarium* est, *summus Medicinæ contemptus*, qui sane tantus est, ut major esse nequat, quod tamen minime fieri posset, si in eo statu, in quo deberet, constituta esset. Olim enim Reges & Sacerdotes, alique primarii viri eam solum tanquam rem sacram, & charum Dei donum tractabant; reliqui vero subditi ab hisce sacris arcebantur, qui tamen in casu necessitatis ad eos, qui Medicinam exercebant, tanquam ad Deos confugiebant, imo eos quoque post mortem in Deorum numerum referebant. Ast nostris temporibus quantus est Medicinæ & Medicorum contemptus! medentes, quos tamen Deus honorari jusserat, adeo vili penduntur, ut Medicum esse fere dedecus sit. Præter Medicos enim, qui tamen summo cum labore, & multis sumptibus Medicinam addiscere coacti fuerunt, qui legitime promoti Doctores sunt, & omni opera miseris solamen afferre conantur, multi immo innumeri alii ex infima quoque plebis fece, Medicinam hinc inde impune exercent. O magnum Medicinæ lapsus! O miseram Medicinam, quæ ex Regum & juratorum Medicorum in agyrtarum & maximorum nebulonum transit manus!

*Alterum* signum Diagnosticum est, quod quæ in non paucis Scholis docetur Medicina, ut plurimum nullum habeat usum in Praxi: confirmant hocce multi Practicorum, inprimis ii, qui vulgari antea imbuti erant Medicina, & testantur, se, cum ad Praxin accesserint, omnia sua principia rejicere, & novam quasi studii genus incipere coactos fuisse, quod sane clarum est indicium, Medicinam, uti a multis docetur, admodum esse ægotam, & ægris læpius, teste experientia, funestam.

*Tertium* signum est, quod a filiis deseratur: Medicina enim ideo hominibus a Deo concedebatur, ut eam summa colerent diligentia, donec tandem ad justam maturitatem perveniret; primi Medici, Naturam summa imitantes industria, hoc præstabant, unde etiam tum temporis optima capiebat incrementa, & in florenti admodum erat statu: postquam vero sequentes Medici, relicta Naturæ via, alia idola, spiritus, flammulas vitales &c. colerent, Medicina Naturæ superstructa sensim sensimque, destructo vero ejus fundamento, ruere incipiebat, & cum eadem adhuc ludatur fabula, ac Medici, sprete Naturæ, alia quærant fundamenta, Medicina non potest non ægotare, quoniam ea, quæ falso superstruuntur fundamento, Medicinam miseram magis destruunt, quam restituunt.

*Quartum* signum est, quod spurii artis eam plane dilacerent: per spurios artis Medicæ non tantum agyrtas & circumforaneos Medicinam temerario ausu exercentes, sed etiam omnes illos, qui neque veri Naturæ ministri sunt, neque tales esse cupiunt, intelligo; qui Natura etiam reluctante juxta præconceptas solum opiniones curant, eamque cogere conantur: qui nulla denique solida Theoria instructi ægotantium curationum suscipiunt. Cum E. bonorum Medicorum atque verorum Naturæ ministrorum pauci sint, & contra vero reliquorum qui tales esse nolunt, multi reperiantur, quomodo Medicina poterit sana esse.

*Quintum* est, quod Medicina polychrestis ac specificis remediis destituatur: hac sane in parte Medicina admodum manea est & ægra, in multis enim morbis chronicis, quia remedia polychresta deficiunt, frustra laborant Medici, quod experientia satis superque testatur.

*Sextum* est, quod morborum quorundam essentia adhuc incognita sit. E. etiam Medicina hoc in casu ægotat.

*Causæ.* Si jam in causas ægritudinis Medicinæ inquirimus, multæ & variæ se nobis offerunt, quæ partim proximius, partim remotius ad producendam hanc ægritudinem concurrerunt, & adhuc concurrunt, quas ordine jam recensebimus.

Principalis causa est, quod Medici plerique Naturæ viam, cui veteres insistebant, reliquerint & hoc ipso Medicinam pessunderint. Natura enim est, quæ corpus dirigit, quæ illud in sanitate conservat, & quæ sæpius sine aliis adminiculis morbos, etiam gravissimos, sola curat: hæc est illa Magistra, cujus Minister est Medicus, quamque ubique, si veri Ministri titulo gaudere vult, sequi debet.

(Sed dum de Natura hoc loco sermo est, merito quæritur, quid veteres per eam intellexerint, & quid adhuc per eam intelligendum sit? Veterum plerique per Naturam nil nisi principium agens, corpus conservans & operationes in eodem tam sano, quam ægroto, instituens intelligebant: & cum admirandas ejusdem actiones ubique in morbis & effectus, hæc consequentes, observarent, eam summo studio in omnibus & inprimis in acutis morbis sequebantur. Hanc Naturam morborum medicatricem appellabant, uti apparet ex Lib. VI. Epid. Sect. V. De hac pronuntiabant, quod non edocta & nullo magistro usa, ea, quibus opus est, faciat: vid. l. c. & Lib. de Alimentis VIII. 8. ubi iterum legitur, quod Naturæ omnium nullo doctore usæ sint. Porro affirmabant: Quod suis viribus usa, quæ noxia sunt, expellere noverit, quæ utilia, usui servare: quod sapientissima sit, & omnia salutis hominum causa faciat: quod, malum sentiens, gestiat magnopere mederi: quod, eadem repugnante, nihil proficiat Medicina & quod ea deficiente nihil obtineat ars, sed pereat æger. Si jam inquirimus apud eosdem Veteres, cuinam principio hæc attributa adscriperint, ex Hippocrate, id immateriale seu incorporeum esse, apparet, ait enim Lib. de Natura hominis 93. At vero incorporea in recessibus Natura, omnisfaria viscerum genera fabricavit. Interdum etiam, loco vocabuli Naturæ, calidi nomine, quod postea innatum vocabatur, utebantur veteres, cui tamen immortalitatem & cognitionem adscribebant, quod confirmat Hippocr. Lib. de Principiis &



*Carnibus: Et videtur sane mihi id, quod calidum vocamus, immortale esse & cuncta intelligere, & videre, & audire, & scire omnia, tum præsentia, tum futura. Quamvis autem hocce magis de calido universo, quod reliquis elementis vel immixtum, vel superius esse credebant, intelligi possit, uti ex Hippocratis loc. cit. elucescit, nihilominus tam ipse Hippocrates supponit calidum illud innatum, sive spiritum hominis, a calido universali conservari & restitui, id quod probari potest ex Libr. de Morbo sacro. XVII. Et propterea judico cerebrum vim plurimam in homine habere. Hoc enim est nobis eorum, quæ ab aere fiunt, interpres, si sanum fuerit. Sapientiam autem ipsi exhibet aer. Oculi vero & aures & lingua & manus & pedes, qualia cerebrum statuit atque cognoscit, talia subministrant. Sapientia enim toti corpori contingit, prout aere participavit. Ad intelligentiam vero. internuncius est cerebrum. Quum enim homo spiritum in se ipsum attraxerit, primum quidem ad cerebrum pervenit, & sic ad reliquum corpus aer dispergitur, relinquens in cerebro suum ipsius vigorem, & quicquid prudens ac sapientia præditum fuerit. Tandem ipsi animæ, eadem fere attributa, quæ antea Naturæ concesserat, adscribit Libro de insomniis I. a §. 2. usque ad 12. Anima enim, inquit, vigilat, & cum quidem corpori inservit, in multas partes distributa, non sui juris est, sed partem aliquam singulis corporis partibus, sive sensibus distribuit, auditui, visui, tactui, gressui, actioni ac omni corporis facultati. Ipsa autem animi cogitatio sui juris non est. Cum autem corpus quiescit, anima in motu est, & corporis partes perreptans domum suam gubernat & omnes corporis actiones ipsa perficit. Nam corpus dormiens non sentit, ipsa vero vigilans cognoscit, ac visibilia videt & audibilia audit, vadit, tangit, tristatur, animadvertit. In summa, quæcunque corporis aut animæ munia, ea omnia anima ipsa in somno obit. Quicunque igitur hæc recte judicare novit, magnam sapientiæ partem novit. Ex hætenus E. dictis facile liquere potest veteres per Naturam principium immortale, intelligens, propter certos fines agens & corporis conservationi studens intellexisse, Animamque, Naturam & Calidum idem fuisse: si quis vero de ultimo hocce dubitat asserto, eum sequens Galeni locus e Libr. de Tremore, Palpit. & Convuls. apud Lucanum p. 713. occurrens, convincere poterit. Verum enimvero calidum hocce innatum minime gigni motu aut frictione arbitramur, sed corpus ex omni parte conspirabile fluxileque esse contendimus: calidum autem ipsum non adventitium, nec animalis generatione posterius, sed primum, primordiale insitumque putamus. Natura itaque Animæque nihil aliud quam calidum est. Quamvis autem veteres per Naturam & calidum innatum nil nisi Animam immortalem intellexisse certissimum sit, Galenus tamen sine omni dubio primus fuit, qui spirituum idola & facultatum figmenta in Medicinam introduxit: quod ex ejus scriptis satis superque apparet; dubius tamen ubique est, aut sibi contradicit, modo enim dicit, spiritum animale, animæ propriam esse materiam, adeoque Naturam sive animam corpoream concipit, ita ut hinc non immerito Musitanus reprehensionem Oper. Tom. I. Cap. de Dolore Capitis incurrat: modo asserit spiritum animale aut esse animæ substantiam, aut primum ipsius instrumentum, alibi vero eundem non esse animæ substantiam. positive affirmat: verbo hic omnium illarum naniarum & nugarum, de triplici hominis anima, de spiritibus ab ea distinctis, de facultatibus aliisque tricis, in Medicinam introductarum. Author est, quibus tamen, si Hippocratem sequi voluisset, facile supersedere potuisset: hæ enim fabulæ, ansam postmodum, præbebant aliis, ut, relicta Natura, spiritibus omnia tribuerent, atque eandem ab omnibus actionibus, solis animalibus ipsi relictis excluderent.*

Et hæc sententia ad nostra usque propagata fuit tempora, ubi spirituum nomina adhuc adeo celebrata sunt, ut piaculum fere sit, si quis de earum existentia earumque attributis dubitare velit: hi juxta plurimorum sententiam actionum vitalium & animalium sunt auctores. & anima sine illis in actionibus animalibus nihil perficere potest, hi sentiunt, & movent, hi digerunt, secernunt, sanguificant, morbos pellunt & omnia præstant, adeoque modernis temporibus sunt ipsa Naturæ: & quamvis etiam hisce ipsis temporibus juxta alios mechanismus & circulus sanguinis sint Natura, spiritus tamen animales utramque fere in tali systemate absolvunt paginam, ita ut pauper anima ubique ab actionibus excludatur, quas tamen nihilominus in vitis etiam Mechanicis & Spirituosis continuo exercet & exercebit. Possem hoc loco, si crambe biscocta nauseam Lectori movere vellem, multa argumenta contra existentiam fictorum spirituum proferre, sed cum alii inprimis D. Stahlus & D. Alberti nuperrime in Introductione in Universam Medicinam id jam præstiterint, & ego multa jam de hisce in Theoria Hominis sani protulerim, locum tantum Hippocraticum, e quo spirituum existentiam probare conantur paulisper examinabo. Lib. VI. Epidem. Sect. VIII. text. 25. occurrit divisio partium Hippocratica: Grecus textus ita se habet: τὰ ἐχόντα, ἢ ὀρυζόντα, ἢ ἐνιχόμενα: & juxta translationem Lindenii: Continentia, aut Contenta, & intus permeantia corpora; aut, ut alii volunt, Continentia, impetum facientia & contenta. Hic locus eorum, qui spiritus defendunt, est ultimum refugium, aut saltem vetustissimum monumentum, ex quo spirituum existentiam probare contendunt. Sed quemlibet, ut probe ad Hippocratica attendat, verba, & quid inde sequatur, rogo. Hippocrates, uti ex superioribus constat, & cum eodem alii prisci, summo studio corpus & Naturam, seu principium activum, a se invicem distinguere conati sunt, ut & agenti, sive causæ efficienti, & patienti, sive instrumento, suum maneat jus. Supponamus itaque Hippocratem hoc loco exactam inter partes divisionem tradere voluisse, nempe partes alias esse continentes, alias contentas, alias impetum facientes; sed quis inde, cum spiritus, quales hodierno die adhuc secundum unius cujusque lubitum finguntur, in scholas introducere voluisse, concludet? ego sane, qui hoc in passu textum Hippocratis ejusque optimum sequor interpretem Lindenium, exinde nil aliud, quam quod Hippocrates, partes in continentes, contentas, & intus permeantes aut impetum facientes dividere voluerit, concludere possum: seu, ut loquar clarius, Hippocratem docuisse hoc loco partes alias esse continentes, nimirum cutim cum reliquis partibus solidis venis, arteriis &c. alias esse contentas, sanguinem scilicet cum reliquis humoribus: alias vero esse impetum facientes, sive motum humorum promoventes, uti sunt cor aliæque partes ad sanguinis circulum aliquid contribuentes. Fateor equidem spiritus vocabulum frequentius apud Hippocratem reperiri; sed monstratur mihi, an præter aerem, flatum & respirationem aliud quid per spiritum intellexerit. Cum E. uti ex superioribus apparet, juxta veteres, Calidum innatum,



Anima & Natura unum idemque, ac verum motus in corpore principium sint, horum quoque sententia tantisper subscribam, donec alii me fortioribus, ac hactenus quidem factum fuit, demonstrationibus, spiritus dari & principium in corpore revera activum esse, docebunt.

Si vero cuidam hæcce nondum sufficiunt, is sequentia saltem perlegat. Suppono cum omnibus Philosophis ac Medicis, quod motu in corpore vigente, homo vivat, eo vero cessante pereat; & exinde concludo, quod motus sit causa vitæ. De hoc motu statim quæritur, a quonam principio dependeat. Corporeum illud esse nequit, quoniam nullum corpus motum ex se & sua natura procreat, sed quando alia movet corpora, ab aliis jam motum fuit antea: verbo: omne corpus, testibus Philosophis, passive se habet & motum ab alio semper expectat principio. Et quamvis etiam subtilissima supponamus corpora, ea quidem præ crassioribus magis ad modum suscipiendum sunt apta, motum tamen ullum per se producere nequeunt. E. principium illud motum efficiens necessario immateriale aut spirituale esse debet: Spiritus enim est illa substantia incorporea, a qua corpus, quod a semetipso moveri nequit, movetur. Cum vero spiritus sit vel *infinitus*, qui est *Deus*, vel *finitus*, uti sunt *Angeli*, & *Mens humana*, necessario vel spiritus *infinitus*, vel *finitus* regit corpus. Si Deus vel Angelus movet corpus, sequitur, quod vel anima Deum & Angelum interdum ad hanc vel illam actionem peragendam cogat: vel ipsa invita ad certas actiones a spiritu vel infinito vel finito rapiatur, quod utrumque tamen est absurdum. Porro si alius spiritus regeret corpus, anima otiosa esset in corpore: cum vero nihil agere, aut movere, contra naturam spiritus sit, anima necessario aliquid agere debet, quare vel per corpus vel in illud agit. Per corpus eam agere probat experientia, cernit enim, audit, percipit, cogitat, ratiocinatur &c. per corpus. In corpus eandem agere, varia docent animi pathemata, iram v. g. graviolem sequitur effusio bilis in intestina, Diarrhœa biliosa, Cholera, Febris biliosa &c. E. anima agit in hepate: in ira pulsus cordis augetur, vasa intumescunt &c. E. anima agit in cor & alias partes: ob nauseam graviolem excitatur vomitus, E. anima agit in Ventriculo: In tristitia graviore continuante, & meditationibus turbatur digestio ciborum, promovetur vero animo a curis vacuo. E. anima concurrat ad chylicationem. Turbantur quoque in animi pathematibus sanguificatio, secretiones & excretiones. E. anima quoque potentiam habet in illas: In gravidis ob solam fortiolem imaginationem aut terrorem in fœtu generantur nævi, E. anima ad productionem nævorum concurrat. Porro anima opus habet corpore. E. ejus conservationi studere debet. Conservatur corpus vel per internam succi nutritii appositionem, vel per remotionem ejusdem ab objectis, quæ structuram corporis lædere solent. Succus nutritius præsupponit alimenta præparata & appetitum sive voluntatem edendi & bibendi. Appetitum ab anima provenire certissimum est, hæc enim cibos appetit gratos, eosque interdum anxie quærit, ingratos vero respuit: præparat eosdem in ore & promovet ad ventriculum, ut uberius digerantur, hæc autem actiones masticationem & deglutitionem voluntarias esse, & animæ imperio subiacere, clarissimum est. Cibos gratos facile digerit, ingratos vero difficulter admodum, E. concurrat ad ciborum præparationem in ore, ventriculo & intestinis. Animo a curis vacuo & hilari optime procedit nutritio, eodem vero ab actionibus vitalibus per curas graviores revocato, corpus sensim marcescit. E. anima nutritionem peragit. Tandem præsentem objecto corporis structuræ noxam minitante, corpori per fugam consulitur: ad hanc motus voluntarius cum instrumentis necessariis requiruntur: anima conscia se fugæ causam esse scit, E. anima cognita quoque habere debet instrumenta sive organa ad motum necessaria. Appetit porro vel averfatur animæ res sensu perceptas: sensus est in corpore toto, E. anima sentit ubique interne & externe. Sentit autem externe per organa sensoria, teste experientia. Sentit etiam interne, probantibus id doloribus, sive sensu molesto partium internarum. Sensus externi inferiunt intellectui, E. nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu externo. Quæ vero interne sentit objecta, non cadunt in sensus externos & intellectum, E. de illis anima nullam reddere potest rationem. Excitatur interdum inexplicabilis tristitia ob præsentem causam ternam deleteriam, qua remota animus ad se redit: cum vero tristitia & gaudium sint animi affectus, nec ullus affectus, nisi sensus præcesserit, excitetur, anima necessario interne sensu affecta fuit, quam tristitia excepit. Sensationem ordinarie voluntas, hanc vero motus interni pariter ac externi sequuntur: per motum externum corpus admoveatur rebus gratis, aut removeatur a noxiis per motus animales, interne instituuntur motus vitales, ut res noxiæ & sensui interno vitali molestæ expellantur, quod curationes spontaneæ testantur. Ex quibus & aliis ad prolixitatem evitandam omissis, animam in & per corpus agere, adeoque veram Medicorum esse Naturam facile concludi potest. Plura qui de hocce Medicorum Natura legere cupit, evolvat superius allegatæ *D. Alberti Introd. Cap. I. de Natura.*)

Sed redeamus in viam, unde digressi sumus. Altera causa est, quod Medici relicta aphoristica scribendi Hippocratica brevitate, missoque observandi studio, rationibus rerum investigandis totos se dederint, omnia prolixo discursu illustraverint ac Philosophiam Aristotelicam Arti Medicæ ubique immiscuerint, unde ab eo tempore observationibus Hippocraticis non solum parum vel nihil accessit, sed etiam multa, quæ tamen Hippocrates aliique prisce summo annotaverant studio Medici, oblivioni tradita fuerunt. Et cum per longum admodum tempus paucissimi Hippocratem secuti fuerint, Medicina etiam per plura stetit sæcula: quod certe aliter fieri non poterat, quoniam tum temporis in Scholis Medicis nil nisi contentiones, altercationes & vanæ nulliusque pretii explicationes Authorum audiebantur, præsertim cum Medicina ab Arabibus & Medicis Aristotelica Philosophia imbutis publice doceretur, qui missis observationibus, compositionibus remediorum tantum incumbentes, tantis tricis nugisque Medicinam implebant, ut tum temporis Medicina fere nil nisi farrago rerum inutilium & commentum nugi vendulorum esset. Sufficiebat illo tempore allegasse Principem Averrhoen, Rhafen aliosque & sic omnia, licet experientiæ & observationibus contraria essent, salva erant. Adeoque rectissime Baglivus: *Memoria illius diei, quo primum Medicina & reliquæ bonæ artes ab acceptis Barbarorum cladibus inciderunt in Arabes, fieri vix potest, quin acrem animo dolorem mihi perpetuo eliciat.*



*Tertia* causa est, quod successu temporis multa, nullum prorsus in Praxi usum habentia, ad Medicinam tracta, & Theoriæ partim immixta, partim pro ea venditata fuerint: uti sunt Philosophia, Physica, Botanica curiosa, Mathesis &c. quæ juxta mores etiam modernos ample admodum tractantur, atque iisdem tantum temporis consumitur, ut ad veram Medicinam tractandam parum ejus remaneat. Absit a me ut hæc scientias contemnam, sua cuique potius sit laus, veram Philosophiam, quæ viam ad sapientiam monstrat & inculcat, ægrotamque hominis mentem, quantum quidem possibile est, restaurat, maxime veneror, eamque omnibus commendo, nam hæc est, quæ, ut si mens sana in corpore sano, efficit: Physicam tanquam scientiam jucundissimam & utilissimam, quæ Creatorem in creaturis nobis exhibet, laudo & amo: nec etiam reliquas, Botanicam, Chymiam, Anatomiam &c. contemno, (Botanica enim recreat animum eumque exhilarat, dum scilicet varias plantas floresque diversorum colorum, semina, fructus &c. oculis subjicit, & cognitionem remediorum suppeditat: Chymia vero est clavis rerum, quæ varia ex tribus regni artificiose præparata exhibet remedia, adeoque Pharmaciam maxime inservit: Anatomia autem structuram corporis connexionem partium docet,) illud saltem improbo, quod tales artes & scientiæ pro Theoria Medica habeantur, atque Tyronibus tanquam maxime necessariæ commendentur. Sed si Medicinæ subiectum esse hominem vivum consideramus, omnia ad contemplationem & cognitionem hominis vivi non pertinentia a Theoria Medica excludi debere, facile apparere potest. Longe sane alia res est Medicina vera, quæ sane parum emolumenti e talibus rebus haurire potest: hæc enim requirit veram morborum Historiam ex observationibus natam, una cum omnibus causis veris, remediis fideis & cautelis, de quibus tamen in Medicorum Scholis sæpius altum est silentium. Potius particulæ, fermentationes, salia alcalia, acida, & quæ sunt alia, quæ in Praxi nihil valent, ibidem resonant: unde etiam postmodum Praxis sequatur satis inanis necesse est: cum enim Theoria hæcce imaginaria sit ac ex falsis & præconceptionibus fluat opinionibus, quænam, quæso, Praxis huic superstrui poterit? Interim tamen, quod maxime dolendum est, talibus rebus aureum perditur tempus, sumptus inutiliter impenduntur, ac capita Tyronum fumo potius, quam vera implentur Medicina. Res sane est conscientia, adeo negligenter ea, quæ vitam atque salutem hominum concernunt, tradere. Querelæ hinc inde occurrunt, Theoriam (quæ scilicet in variis logomachiis sive variis disceptationibus consistit, circa novitates & curiositates potissimum occupata est, regiamque & veram ad Praxin viam non monstrat, aut alias inanibus superstructa est principiis) nullius esse pretii, nullamque in praxi habere utilitatem, prorsusque respuendum esse; (& hinc etiam respectu vanæ talis Theoriæ natum est commune proverbium: *Optimos scilicet Theoreticos pessimos esse Practicos*: quod quidem hoc sensu certissimum, si vero etiam de vera & necessaria intelligitur Theoria, falsissimum est,) sed quot sunt, qui querelas tales attentione dignas judicant? leguntur quidem & hinc inde etiam allegantur, sed a paucissimis attenduntur. Tali itaque pomposa, sed inani, Theoria instructus Tyro, se quidem doctum esse credit, sed quadrat sæpius in eum illud Veterum: *Filii, ab Academia venis, fastum spiras, ex inani scrinio, ex ioani pectore*. Experientia ipsa testatur de Praxi talium male informatorum, qui postmodum se oleum & operam in Academicis perdidisse experiuntur, ac rejectis omnibus, quæ antea summo fervore didicerant, Praxin in Praxi quærere & experimenta per mortes facere coguntur. Quis E. Medicinam aliam sanam diceret, quæ falsæ superstruitur Theoriæ, & quæ a non paucis falsè docetur & ab affectis postea juxta hausta exercetur principia? Non loquor de viris cordatis, qui multos errores in Theoria & Praxi agnoscen- res, sibi concreditos Auditores serio a rebus nullius momenti dehortantur, ac viam ad veram Praxin omni monstrant diligentia: nec etiam horum cuidam insultare cupio, cum enim res sit notoria, & multi Medicorum hinc inde de hac re cum indignatione locuti fuerint & adhuc loquantur, mihi quoque talia proferre licitum erit.

*Quarta* causa est nimius studiorum amor & perversa librorum lectio, uti *Baglivus* id annotavit. Nolo, quæ laudatus vir prolixè tradidit, huc trahere, sed breviter quid de hac re sentiam, dicam. Dum autem hoc loco nimium studiorum amorem tanquam causam Medicinæ ægrotæ accuso, nemo, ac si indefessum studium dissuadere velim, sibi persuadeat, sed potius urgeo & commendo illud: nam cum memoria uniuscujusque labilis sit, frequenti repetitione aut relectione opus est, quo semel lecta eo magis memoriæ imprimantur atque notis jam alia apud Authores occurrentia adjiciantur. Id saltem volo, quod permulti librorum multorum lectioni totos se dent, & quidem nullum alium in finem, quam ut ut diversarum Authorum hypothesium notitiam sibi comparent, ac apte de illis differere queant: ast hoc ipso ad meditationem, in omni studio, & imprimis in Medicina maxime necessariam, se ipsos ineptos reddunt: judicium enim in tali rerum confusione maximopere turbatur: quo plus enim accedit memoriæ, eo plus judicio decedit: Et hinc etiam viri multæ lectionis, qui fere omnes Authorum devorant sententias, sæpius sunt parvi judicii, & a vera eruditione adhuc longe distant, facileque ab aliis, qui paucos tantum, sed optimos, cum judicio legerunt libros, quoad eruditionem superantur. In librum Naturæ humanæ potius inquirere, ac conari deberent, ut Physici fiant: hic enim est ille, qui viam ad veram Medici eruditionem sternit, cum e contra continua & confusa multorum librorum lectio eandem præcludat: unde etiam non est mirandum, quod Medicina ab antiquorum tempore, quoniam Medici relicto Naturæ libro in multa & confusa librorum lectione eruditionem quæsierunt, tam pauca sumserit incrementa.

*Quinta* causa est pessimus Hypothesium Philosophicarum ac Medicarum amor. Supra jam diximus, quod Philosophia Aristotelico-Scholastica in Medicinam introducta eam admodum ægrotam reddiderit & incrementum Medicinæ maxime impediverit: idem quoque sentiendum est de non paucis aliis principiis Medicinæ immixtis. Non loquar jam de antiquorum hypothesibus, sed mentionem saltem recentiorum faciam. Cum doctrina de alcali & acido in Scholas introduceretur, quam plurimi de magno invento gloriabantur, hinc nil nisi acidum & alcali per totam Medicinam spargebatur, acidum tamen sensim sensimque præ alcali majores acquirebat Patronos, aut potius hostes, unde in quibusvis morbis accusabatur ac



ejus antagonista alcali ubique ipsi opponebatur ut in vaginulis suis id occultaret & vim ejus infringeret. Quam quæso operosi quidam erant in demonstrando acido? quænam virtutes ipsi adscribebantur? in statu sano digerebat, in morboſo rodebat, vellicabat, pungebat, & lancinabat, hic coagulabat, illic spiritus figebat, ut alia ſilentio præteream. Cum porro ſuperioribus temporibus Plethora tanquam non ens e Medicina expelleretur: quænam quæſo turbæ oriebantur? quanto fervore, Venæſectionem, Plethoræ oppoſitam, lethiferam eſſe, defendebant? Quanta celeritate quæcunque Hæmorrhagiæ tanquam res ſummæ noxiæ ſupprimebantur per adſtringentia & opiata? Quid poſtmodum Mechanici, ut hominem in Machinam hydraulico-pneumaticam converterent & animam ab omnibus actionibus vitalibus excluderent machinati fuerint & adhuc machinentur, in aprico eſt: nil enim, niſi quod mechanismum ſapit, admittitur, pori & particulæ earumque figuræ circulo & microſcopiis inveſtigantur, ſecretiones & excretiones a priori ad certum finem, a principio quodam vere activo & dirigente non inſtituuntur, ſed caſu contingunt, cordis pulſus in febris non augetur propter materias expellendas, ſed cor & reliquæ partes ſolummodo ita ſtimulantur, ut neceſſario pulſus cordis major ſequi debeat, ut alia taceam. Quænam autem incrementa Medicina ſub hiſce contentiõibus capere potuerit, unicuique facile liquere poterit. Et cum eadem adhuc rerum ſit facies, ac diſceptationes de principiis & particulis harumque diminutivis in hunc uſque diem durent, Medicinæ incrementum magis impeditur, quam promovetur. Imo tales contentiones occaſionem aliis, Medicinam magis contemnendi, præbent: quis enim ſine riſu aut indignatione eas, quæ hinc inde proferuntur hypotheſes & rationes legere aut audire poteſt? inprimis quando indignabundus quidam Gaſſeranax, aut alius barbarus Rex, hoſtem, variis particulis, acutis, quadratis, oblongis, corpori interitum minitantem, ſatellitum, in cohortes diſtributorum, ope expellere nititur: quando materia illa, ex minutiffimis globulis conſtans, ætherea, undiquaque in corpus penetrans, tot vortices & gyros in ſanguine, ac poſtea ad caput lata cogitationes in cerebro format, deinde vero per nervos ſub ſpirituum animalium, lucidorum, luminorum &c. forma lata, univerſæ machinæ vitam, qua tamen ipſa deſtituitur, largitur: aut quando ab hujus inæquali aut inordinato motu omnes fere morbi derivantur, Naturæ morborum medicatricis nomen ei imponitur ac cognitio etiam ſimul, ut propter certos fines agere queat, ipſi adſcribitur: quando, omnes actiones ex mechanica neceſſitate fluere, aſſeritur: quando diverſa, ex neſcio quibus principiis conſtantia, & quo in loco hærentia fermenta, tam in ſtatu ſano, quam morboſo, allegantur: quando acidum in tot diverſiſque morbis tanquam unica cauſa ſupponitur: quis inquam prudentiorum virorum tales & alias quam plures ineptias, quibus Medicina moderna maxime repleta eſt, ſine cachinno audire poteſt? Ecquis Medicinam, talia tradentem, veram & ſeriam eſſe artem crederet? Perpendite quæſo Medici talia eaque probe examine, ſic enim artem per pueriles hæſce fabulas magis dehoneſtari, quam promoveri, facili deprehendetiſ negotio. Apage E. hæſce ineptias, quæ nil niſi difficiles ſunt nugæ.

*Sexta* cauſa eſt, quod Medici neglecta inquiſitione in remedia polychreſta & relictæ earum compoſitione, Praxin ſolam & præſcriptionem formularum ſibi reſervaverint. Quis vero eſt Medicorum, qui neſciat, quam curta, quoad remedia polychreſta Medicinæ ſit ſupellex? Credant alii remedia uſualia & officinalia ad omnes generis morbos ſufficere, me tamen, tamdiu, quamdiu morbi non pauci, quos tamen curatos fuiſſe ab aliis conſtat, pro incurabilibus habentur, nunquam conſentientem habebunt. Nil dicam de aliis morbis, qui ſæpius, quando Medici fruſtra laborarunt ordinariis remediis, a mulierculis & agyrtis unico polychreſto remedio feliciter tolluntur. Minime autem contemno medicamenta officinalia, nec etiam per polychreſta magna illa arcana, de quibus Alchimiftæ loquuntur, ſed ſpecifica tam ſimplicia, quam compoſita, eaque tam Galenica quam Chimica intelligo remedia. Non ſane primus ſum, qui hæc de re loquitur, ſed querelæ ubique de remediorum vulgarium inſufficientia occurrunt, non quod nulla ipſis inſit vis, quis enim hocce affirmare auderet? ſed quod plurimorum veræ virtutes & vires ſpecificæ incognitæ ſint. Et quot ſunt Præcticorum, qui in talia remedia inquirere cupiunt? Qui ſunt, etiamſi ipſis ſufficiens ſit otium, qui carbonibus manus commaculare audent? Plerique remediis notis, & a diverſis Authoribus commendatis contenti ſunt, ulterius autem ſapere recuſant. Maxime ſane hoc in caſu eſt Medicorum ſocordia, quamvis enim Praxis morborum Hiſtoriam monſtret, hæc tamen ſola non ſufficit, ſed remediis polychreſtis, ad ſuperandos morbos agnitos opus eſt. Minime E. reprehendendi & invidiſ aſpiciendi ſunt oculis, qui conſcientiæ & officio ſatiſfacturi, non ſolum ipſi huic operi manus admovent, ſed & exteros conſulunt, eorumque laboribus utuntur.

*Septima* cauſa eſt neglectus Chirurgiæ. Certum quidem eſt, quod hæc ſola totum fere requirat hominem, aſt nihilominus Medicis minime condonandum eſt, quod antiquiſſimam & a priſcis exercitatam Medicinæ partem aliis, quibus tamen ſæpius in hac arte eſt curta ſupellex, exercendam reliquerint. Adeoque Medici neceſſitate coacti eo majorem operam Chirurgiæ impendere deberent, quo nobiliſſima hæc ars debito reſtituatur nitore: quod ſi autem hoc ipſum negligere continuabunt, non poterit non major ſequi Medicorum contemptus, præſertim ſi interdum Medicus minorem Chirurgiæ habeat cognitionem, quam ipſe Chirurgus, atque hinc cæcus cæcum ducat.

*Octava* cauſa eſt, quod propter multitudinem agyrtarum & Medicaſtrorum Medicis occaſio in Praxi Medica ſe exercendi, & ulteriores progreſſus faciendi, præſcindatur, & quod propter tales etiam reliqui, licet optimi Medici, maxime contemnuntur. Datur autem inter agyrtas inſignis differentia, alii enim ſunt craſſiores, ſubtiliores alii, ac tandem ultimum occupant locum Medicaſtri varii. Sunt vero agyrtæ craſſiores, uti experientia docet, genus hominum mendaciſſimum, hinc inde per varias regiones oberans, & Medicos omnes contemnens, quod in ignorantia craſſiſſima hærens & ſub ſpecie Medici publice apparens, remedia pauca, interdum quidem innoxia, ſæpius vero ſummæ periculofa, ſola lucri cupidine vendens, publico ad certum tempus imponit, poſtea vero, detecta fraude, evadit & excedit: uti ſunt Circulatores, ſive circumforanei, qui publice, funambulis, nimis, ſtultis, &c. ſtipati, Theatra conſcendunt. Præter hoſce dantur adhuc alii, qui interdum ſub eruditionis, interdum ſub pietatis, interdum



vero sub charitatis velo apparentes, modestissimis terminis pauca vel multa jactant arcana, quæ gratis pauperibus nullum alium ob finem, quam ut divitibus imponant, offerunt. Quod vero stricte sic dictos concernit. Medicastrorum aut Medicorum simios, horum sane inter homines maximus est numerus, vix enim quis hominum deprehenditur, qui Medicum in certis occasionibus non agat: quo ipso tamen eos, qui in mitioribus casibus, charitate ducti christiana, proximo domestica suadent remedia, reprehendere nolo, id enim cuiusvis licitum esse, certissime persuasus sum, v.g. si cuidam alvi obstructione laboranti quis suadet usum clysteris & quæ sunt alia. Illos solum hoc loco intelligo Medicastrorum, qui etsi aliquam, quoad quandam Medicinæ partem, cum vera tamen Praxi parum admodum connexionis habentem, cognitionem habeant, frivole in ipsam Praxin sese ingerentes, de Medicorum curationibus judicium ferre, eosque alto spernere supercilio conantur. A tali sane agyrtarum & Medicastrorum genere contemptus Medicinæ & Medicorum maximam partem originem trahit, præsertim cum tales rationales contemnendo Medicos ubique fere per unam alteramque morbi curationem Patronos acquirant, quod maxime dolendum est.

*Nonam* jam ultimo ultimo loco, sed omnium maxime fonticam nomino causam, quam quidem consulto omissem, nisi experientia communis & alii quoque Medici de hac locuti fuissent, invidiam intelligo, logomachias Medicorum & non paucorum ignorantiam. Quid invidia ad Medicorum & Medicinæ contemptum conferat, prolixa non indiget explicatione: Si enim doctus est, invidis eum intuentur oculis minus docti: si insignem in Praxi acquisivit experientiam, imperitorum invidia eum pressor pede sequitur: si amplam habet Praxin atque simul brevi tempore morbos feliciter tollit, reliqui invidi eum odio prosequuntur, ut alia silentio præteream, de quibus prolixè agit *Sempronius Gracchus in Herma Lib. II. Sect. II. de Invidia Medici*, ubi p. 183. & seq. ejus genealogiam, causas & effectus invenies. De Logomachiis & ignorantia Medicorum nil proferam, quia integer *D. Goris* Tractatus prostat, ex quo satis apparere potest, quod allegatæ causæ Medicinam maxime contemptam reddiderint: quibus plura addere possem, at cum musa mea non paucis adeo exosa sit, ut ne ea quidem, quæ apud alios longe prolixius & durius occurrunt, ferre queant, si scilicet in compendio traduntur, ideo cuius ea apud proprios legere Authores licitum erit. Huc pertinet etiam ante allegati *Sempronii Gracchi Lib. I. Sect. II. Art. I. de Copia Medicorum*, quod ut cum attentione perlegatur laudeo, credo enim omnia ea a veritate parum abluere. Possem adhuc alias ægrotæ Medicinæ allegare causas, sed quoniam eæ maxime sunt odiosæ, ideo silentio easdem præterire malo: interim commendo lectionem Libri de Reformatione Medicinæ Domini *Francois*, ubi forsitan una atque altera talium causarum occurreret. Pergo igitur potius ad

*Effectus*. Præsentibus & prægressis quoque tot gravibus causis, nullum est dubium quin pessimi etiam secuti fuerint effectus. Cum enim 1) Talis per longinquum satis tempus docta fuerit in Scholis Medicorum & adhuc a non paucis doceatur quæ in praxi parum vel nihil habet utilitatis. 2) Tyrones sæpius falsa imbuantur Theoria. 3) Ac Medici ipsi Praxin exercentes non raro insufficienti eruditione sint instructi, ut necessaria in morbis observare ac debitis remediis morbis obviam ire queant. 4) Et tandem Medici quoque ea, quæ ad Medicinam revera spectant, consulto, licet admoniti, negligant, quid mirum? Si Medici contemnuntur, si morborum essentia incognita manent, si propter defectum inquisitionis nulla remedia polychresta inveniuntur, si vulgus agyrtis, polychrestis remediis interdum morbos gravissimos curantibus, magis fidit, quam Medicis nominalibus & hinc propter multorum Medicorum ignorantiam ipsam quoque Medicinam receptam contemnit.

*Prognosis*. Si jam Medicinam nostram ægrotam consideramus, eam restitui posse vix aliqua affulget spes, cum enim ii, qui tamen ejus curam gerere deberent, ipsam derelinquant & non obstante summa Medicinæ ægritudine eam sanam imo sanissimam & perfectam esse exclament, non potest non virus in visceribus latens ulterius serpere & Medicinam brevi interimere; quomodo enim malum non agnatum poterit curari? At quid sperandum est, si Medici cordati, miseræ Medicinæ opem ferre cupientes a reliquis Naturæ filiis degeneribus contemnuntur & remunerationis loco nil nisi odium & invidiam reportant. Non allegabo *Paracelsum*, *Helmontium* aliosque Medicinæ reformatores, sed verbum saltem dicam de Viro Celeberrimo *D. D. STAHLIO*, qui plus quam plures alii in Medicinæ reformatione præstitit, sed quænam scommata contra illum publice & clanculum, etiam a minorum gentium diis, effutita fuerint & adhuc effutiantur, notum est. Interim tamen ea, quæ Illustris Vir protulit, vera sunt & talia etiam non obstantibus mussionibus manebunt. Si autem aliquid sperandum est, Medicina non nisi longo tempore & multo labore, quoniam morbus maxime inveteratus est, restitui poterit: id quod fiet 1) per *Aphæresin*, sive remotionem partium inutilium, aut per Purgationem per epicrasin, ut sensim sensimque sordes evacuentur. 2) per *Prosthesisin*, sive additionem partium utilium. 3) per *Analepsin*, sive conservationem virium veræ Medicinæ: hoc enim modo speranda est *Lysis* sive lenta morbi inveterati solutio.

*Methodus Medendi*. Cum ex causis supra allegatis, Medicinam perperam a multis doctam & exercitam fuisse, & exinde omnia provenisse mala satis superque appareat, eo respiciendum ante omnia est 1) ut Medicina legitimo modo doceatur, 2) discatur, & 3) exerceatur: hisce enim legitime institutis & peractis reliqua molesta symptomata facile cessabunt.

#### I. Methodus docendi Medicinam cum Cautelis Practicis.

Quicumque Medicinam docere cupit, is sequentibus instructus sit, necesse est. 1) Eruditionem veram possideat. 2) Fidelis sit, ac cupidus aliis veram eruditionem communicandi. 3) Modum alios facili methodo erudiendi calleat. 4) Liber sit ab omnibus præjudiciis sive præconceptis opinionibus.

Quod eruditionem Medici concernit, non immerito quaeritur, quidnam præcise illa sit? Eruditio du-



plici modo sumitur, vel enim sub ea intelligitur habitus acquisitus, juxta quem Medicus eruditus aut vir summæ vocatur eruditionis: vel denotat actum eruditionis, sive informationis, quando alios erudit & novam quasi formam ipsis tanquam rudibus inducit. Est autem hæc Medici eruditio vel *vera*, vel *superficiaria* vel *falsa*. Vera est quæ hominis contemplationem, veram morborum cognitionem, respectu Historiæ Pathologicæ, Signorum, Subjectorum, Causarum, Prognoseos & legitimam eorum tractationem, respectu Methodi Medendi, unice pro scopo habet. *Superficiaria* est, quæ aliquali Medicinæ cognitione contenta, in profundiora artis penetrare recusat. *Falsa* tandem rerum, partim aliquo modo utilium, partim alienarum, ad Medicinam parum vel nihil prorsus conferentium, farrago est, quæ mentem in Medicina rudem non erudit, sed eum vel in ruditate sua relinquit, vel a vero scopo deducit. Talis superficiaria & falsa eruditio hodiernis temporibus fere ubique deprehenditur, & hinc etiam supra allegatus D. Francois, paucos admodum dari Medicos bonos, id est, vere eruditos, summa cum veritate asserit. Quivis E. cui docendi incumbit officium, probe inquireat, an vere sit eruditus & an eruditionem Medicam aliis communicare queat. Si se tali eruditione non instructum esse deprehendit, satius est a docendo abstinere, quam falsam aut superficiariam eruditionem propagando tempus inutiliter perdere ac publico imponere. Si quis autem ad solidam & veram pervenire cupit eruditionem in Medicina, is 1) gratiam & benedictionem Dei, Authoris Medicinæ, quærat: timor enim Domini, uti in aliis ita & hic quoque est initium sapientiæ. 2) Seponat omnia præjudicia sive præconceptas opiniones, hæ enim mentem occæcant & in inquirenda veritate maxima præbent impedimenta. 3) Diligenter inquireat in morbos eorumque Historiam. 4) Probe observet in morbis cursum eorum & effectus remediorum exhibitorum: hæc enim consideratio & studium in libro Naturæ in acquirenda eruditione longe majoris est utilitatis, quam confusa librorum lectio. 5) Tandem multiplici experientia edoctus conclusiones certas eliciat, quibus tuto fidere liceat, easque Auditoribus suis proponat atque explicet.

Si hoc modo est eruditus, eruditioni in docendo jungat *fidelitatem* & paterno erga Auditores amore ductus, veram eruditionem illis communicare omni opera studeat. Ab initio autem nil nisi necessaria, ad scopum Medicinæ unice tendentia, tractet, iisque rudes Auditorum mentes imbuat, ac simul, an omnia probe comprehenderint, accurate inquireat: quem in finem frequentia instituat examina, per quæ non memoriæ tantum consulitur, sed etiam ingenium maxime acuitur. Hisce horis subscevis utilia jungat, semper tamen, quamnam hæce & ubi cum necessariis connexionem habeant exponat: hoc enim si negligitur, parum exinde hauriunt utilitatis Tyrones. Necessary & utilibus tandem interponat jucunda, quorsum præcipue Botanica, Physica experimentalis &c. spectant, ut animus, a rebus seriis revocatus & per jucunda aliquo modo recreatus, ad seria denuo tractanda eo magis habilis reddatur. Si vero contrario modo procedens jucunda ac curiosa utilibus, hæc autem necessariis præmittit, a vero aberrat scopo, multum temporis inutiliter perdit, ac eo ipso Auditoribus, quibus sapius ob corruptam rationem curiosa & jucunda magis, quam seria placent, necessaria negligendi aut jucundis postponendi, occasionem præbet.

Non autem *Eruditio* & *Fidelitas* sufficiunt, sed facilis quoque docendi methodus requiritur: quare docens 1) omnem prolixitatem ac omnia ad rem non pertinentia, summo cum studio vitet. 2) Brevitati potius, ita tamen, ut ab Auditoribus intelligi queat, studeat. 3) Necessary clare & distincte proponat, ac argumentis confirmet. 4) Facilia difficilibus præmittat. 5) Connexionem rerum propositarum, & quomodo aliæ ex aliis fluant, semper monstret. 6) Si quid exemplis demonstrandum est, Practica potius, si id fieri potest, allegentur, quam alia: talis enim illustratio, quoniam Tyrones hoc modo sensim sensimque Praxi magis affuescunt, semper maximæ est utilitatis.

In docendo quoque Doctor omnia seponat præjudicia & præconceptas opiniones, uti antea jam monitum fuit, nec iisdem rudes Tyronum animos impleat. Si contraria recensenda aut refutanda est sententia, placide illud fiat, ac rationes sufficientes contrarium demonstrantes allegentur, hoc enim neglecto, Tyronum Magistrum sequentium animi variis contentionibus imbuunt, ita ut postmodum acerbius de aliis judicare & famam eorum lædere, sensim sensimque affuescant. Auditores quoque suos, ut simpliciter omnia credant, non adstringat, exinde enim nascitur præjudicium Authoritatis, sed potius eos sufficientibus convincat rationibus, ut ipsi rem certam atque veram esse agnoscere cogantur. Si res propositæ probabiliter saltem veræ videntur, rationes, probabilitatem demonstrantes, simul alleget, ac Auditores, ut ipsi, si maturius iis aliquando est judicium, in talia magis inquirent, admoneat: non pauca enim sapius occurrunt, quæ probabiliter tantum veræ videntur & nihilominus tamen elapso aliquo tempore tanquam certa & vera demonstrari possunt.

Porro etiam docens magnum illud præjudicium, ac si inter Theoriam & Praxin prorsus nulla detur connexio, Auditoribus suis eximere conetur, ne exinde Theoriæ oriatur contemptus, & Tyrones postea illotis manibus Praxin adorianur. Theoria enim (sed veram intelligo) adeo necessaria est in Praxi, ut nullus Medicus ea carere queat, nisi merum agere Empiricum velit, hæc enim ipsi monstrat quomodo Natura & per quæ instrumenta corpus suum conservare studeat, hæc viam pandit ad statum naturalem & præternaturalem: hæc explicat omnes actiones in utroque statu occurrentes, earumque rationes reddit: verbo ex hac fluit vera hominis Historia Physiologica & Pathologica, qua si Medicus destituitur, cæcus est in Praxi. (Comprehendes exinde B. L. quanta mihi fiat injuria, dum quidam clancularii aliis, me omnem Theoriam prorsus respuere & contemnere, persuadere audent. Si ullus est, ego sane is sum, qui Theoriam, sed veram, urges: si autem quisquiliis in ea occurrentes contemno, nec etiam quamvis discursum pro vera agnosco Theoria, non sperno Theoriam.) Quare illis monstret, quomodo partes Medicinæ cohæreant, & quomodo Theoria Praxi, hæc vero illi inserviat. Et ideo etiam Medicinam cum illis in integra sua connexionem a principio ad calcem usque tractet: si enim modo Physiologica, modo Materiam Medicam, modo Praxin aliæque ipsis proponit, magna inde confusio oritur, inprimis si Authores, qui in collegiis explicantur, diversa, aut plane contraria habent principia.



Diffuadeat etiam suis Auditoribus promiscuam Authorum lectionem, quoniam maxime confundit Medicinæ Tyrones: cum enim veris atque certis nondum imbuti sint principiis, selectum inter Authores instituere nequeunt. Pauci, sed selecti, libri ipsis sufficiunt, ad quorum continuam lectionem semper sunt instigandi, satius enim est ex uno vel paucis libris fundamenta haurire, quam multorum lectione confundi.

Si E. Medicina in primis Praxis legitimo modo doceri deberet, res, meo quidem iudicio, facile fieri posset. 1) Si nulli nisi iis, qui solidis principiis imbuti Praxin jam diu exercuerint, publice docendi facultas concederetur: cum enim omnis Medicina ad Praxin tendere debeat, nemo nisi in Praxi exercitatus eam cum fructu docere poterit. Quoniam vero ad docendum insignis requiritur habilitas. 2) Optimum esset, si tales eligerentur, qui antea in docendo se exercuerunt & habitum acquisiverunt, uti talis mos in Saxoniae Universitatibus observatur, ubi plures Doctores, Adjuncti & Ministri legentes, e quorum numero postea Professores eligantur, reperiuntur: sed cum hocce ubique propter defectum selectus fieri nequeat, aliis quoque, solida fundamenta & elegantem res necessarias proponendi methodum possidentibus, docendi munus concedi posset. 3) Publici Doctores, utpote quibus docendi munus concessum est, a Praxi, quantum quidem possibile est, abstinere deberent, in primis si jam antea insignem habitum in Praxi acquisiverunt, ut eo majori diligentia docendi munere fungi possent. 4) Quoniam vero Medicina absque Praxi ne cassa quidem nuce digna est, & insuper in dies plura observentur, quæ Medicinam & in primis Praxin promovent, docentium conscientiam relinquendum esset, quantum temporis in Praxin impendi deberet. Quo autem Auditoribus in Praxi eo magis consulere possent. 5) reliqui Medici, ut omnes observationes Doctoribus publicis communicarent, obstricti esse deberent, quo Tyronum studia hoc ipso magis magisque promoverentur. 6) Docentes, si consuetudo loci id permittit, suis Auditoribus ansam ægrotos visitandi, idque vel manducantibus ipsis Doctoribus publicis vel aliis, quos Docentes aptos judicarent, præbere deberent. 7) Porro Tyrones, ad eas, quæ alias Doctoribus publicis reservata sunt, ad inspectiones scil. cadaverum, visitationes aliaque, quæ maximam partem in Academiis addisci possunt, admitti deberent. 8) Studiosis tandem, si Doctoribus publicis Nosodochia visitandi facultas concessa est, ea quæ ibidem occurrunt observandi libertas concedi posset. Ut alia taceamus, quæ in genere ad studium Medicum promovendum concurrere possunt.

Quod autem in specie docendi methodum concernit, optimum esset, si docentes, in primis quibus publice docendi facultas concessa fuit, inter se convenirent, juxta certas regulas & certa principia, missis omnibus alienis, ad Praxin prorsus nihil vel parum admodum conferentibus, Medicinam tractandi. Quæ quidem res maxime est necessaria, si enim docentes respectu principiorum inter se differunt, non potest non magna exinde oriri confusio. Ponamus e. g. in Facultate esse tres, quatuor, aut plures Professores, quorum alius Helmontium, alius Sylvium, alius Cartesium, alius Mœbium aut Vvedelium, alius Stahlianum, alius alios quoad principia sequitur, dum vero unicuique certæ partes, huic scil. Institutiones, illi Praxi & sic porro dicatæ sunt, & quivis juxta propria principia partes illas explicat, Tyrones Medicinæ nonnunquam quoad Physiologiam erunt Cartesiani, quoad Pathologiam Mœbiani, quoad Methodum Medendi Sylviani, quoad Praxin Helmontiani aut Stahliani, & sic modo de spiritibus, modo de archeo, modo de æthere, modo de mechanismo, modo de Natura, modo de aliis loquentur. Quænam autem exinde farrago sequatur, unusquisque facile comprehendet. Si jam ipsa incommoda, quæ exinde fluunt, consideramus, per se patet 1) quod Tyronum studia hoc ipso quam maxime retardentur, & tanta, quoniam Tyrones optimum eligere nondum norunt, oriatur confusio, ut ex tali labyrintho evadere vix liceat; propria convictus experientia loquor. Et quomodo quæso Tyrones optimum eligere possunt, cum unusquisque Docentium propria, aut ea, quæ sequitur, commendat principia, ac ea Tyronibus & quidem argumentis satis probabilibus continuo inculcet. 2.) Quod, si postmodum ad Praxin accedendum est, juniores Medici, quid agere quidque omittere aut vitare debeant, nesciant. Ponamus exempli loco febrem continuam, hic statim est quæstio, quid primum sit agendum? evolvit Medicus junior varia sua manuscripta aut libros varios a præceptoribus commendatos, ut exinde initium curationis hauriat, sed quanta quæso confusio hic oritur? hic enim venam primum secare jubet, ille dissuadet, alius laudat vomitorium, alius purgans, alius hæc omnia commendat, alius vero eadem rejicit & eorum loco præparantia, clysteres &c. suadet: hic in labyrintho hæret Medicus, dum rationes satis plausibiles ponderat, & quod quivis præceptorum ad propriam provocet experientiam: interim, ne existimatio lædatur & Medicus ignorantia accusetur, aliquid agendum est: trepida E. manu pennam arripit & præscribit remedium vomitorium, tanquam remedium universale, cujus ope sordes ventriculi remove cupit, altera die majorem inveniens Massæ sanguineæ ebullitionem, Venæsectionem instituit: tertia die, quoniam æger conqueritur de nausea, vomitorium repetit, quarta die ad dolorem capitis enormem imminuendum, venam in pede aperiri jubet; tandem progreditur ad specifica sic dicta, nempe ad evacuantia per sudorem & credit se hostem superaturum, sed æger semper in pejus ruit, præscribit E. cordialia calida, nullo tamen cum effectu, die quinto æger corripitur hæmorrhagia narium, Medicus junior lætatur, credens hanc esse criticam, sed circa vespere deliria accedunt, quæ sequente die continuant usque ad noctem, qua æger moritur. Credit itaque causam mali successus esse, quod Venæsectionem reliquis non præmiserit remediis, quare dum alium vocatur ægrotum, statim sanguinem mittere jubet ac sequente die exhibet vomitorium, sed quarto die deliria superveniunt ac tandem æger die septimo satis cedit. Et sic porro in aliis morbis. Non chimerae sunt, quæ hic profero, sed res facti, experientia edoctus loquor, eodem modo in principio Praxeos meæ quosdam ægrotos tractavi, & eadem se fata habuisse nonnulli Practicorum ingenue mihi fassi sunt.

Ad evitanda E. & præcavenda talia experimenta per mortes, Doctores publici conjunctis viribus integrum systema, totam Medicinam, tam Theoreticam, quam Practicam complectens, missis tamen omnibus ratiociniis minus necessariis, conscribere possent. Hocce systema omnia ea, quæ a plerisque Me-



dicis & in primis in Praxi maxime versatis observata & usu probata & quidem juxta eam seriem, quæ cum Praxi quam maxime quadraret, complecti deberet: hoc enim Medicinæ Tyronibus, eo facilius ad necessariorum rerum cognitionem perveniendi, ansam præberet, ac ipsis norma & basis, ad quam omnia referre possent, esset. Sin vero tale systema, quod magis magisque augeri posset, in nimiam excresceret molem & in describendo tædium pareret, inprimis deberet, ut hoc modo via ad integrum systema, ex meris observationibus constans, perficiendum, sterneretur, cui rei observationes a Practicis communicatæ, uti superius jam monui, maxime inservire possent. Imo exteri quoque Medici, ut observationes suas communicarent, rogari deberent, quo talis Medicinæ maxime necessarius liber eo citius, si non ad perfectionem, quæ vix speranda est, perveniret, eo majora tamen incrementa caperet.

Jacto E. tali fundamento explicetur 1. *Physiologia vera Medica*, per quam autem non illam hominis contemplationem, quæ in vanis ac inanibus disceptationibus consistit, sed revera naturam hominis, quatenus scil. ad Medicinam spectat & Medico Practico utilitatem præbet, tractantem, intelligo. In hac præcipue considerentur partes hominis essentielles, corpus scil. & principium vitale illud dirigens, gubernans, conservans, quibus scil. instrumentis ad actiones vitales instituendas utatur, quinam effectus hæc actiones sequantur, quo tempore contingant, & quid effectus illi una cum actionibus ad vitam & sanitatem conferant. Brevissime quoque tradantur materiæ de Sensibus, Generatione, Motu corporis locali &c. quarum uberior explicatio magis ad Physicam, quam ad Physiologiam Medicam pertinet. Dentur quoque Auditoribus variæ quæstiones Problematicæ, Physiologiam complementes, ut mature animi sensa concinno ordine in chartam conjicere discant. Instituantur quoque, si placet, exercitia disputatoria, mihi tamen frequentia examina & repetitiones semper magis placere & placent. Tandem quoque docens modo huic, modo illi injungat, ut materiam quandam præsentibus reliquis ex tempore explicet, ac hoc exercitium tamdiu, donec tota Physiologia firmiter Tyronum memoriæ infixæ hæreat, continuetur: hoc enim modo via optime sternitur ad Pathologiam, ita ut postmodum Tyrones omnia eo melius comprehendere queant.

2. Physiologiæ immediate Pathologia itidem vere Medica, hominis vivi statum præternaturalem naturali oppositum tradens, subjungatur. Hic exacte considerandum est, quid præcise sit morbus & quomodo a causa morbifica & symptomatibus differat? an scil. sit activum in statu præternaturali, quod, variis causis extraordinariis removendis inserviens, conservari debeat, an vero illud sit mere noxium & hinc omni diligentia removendum & supprimendum? Hæc sane consideratio insignem habet usum & viam ad felicem sternit Praxin: monstrat enim in plerisque morbis occurrere activum quid, quod adeo est necessarium, ut sine ejusdem concursu nullus morbus feliciter cedere possit: verbo exinde Autocratia & Synergia Naturæ, quam in Praxi summe necessarium habent Medici elucet, quare hæc doctrina Medicinæ Tyronibus probe explicetur & inculcetur. Postmodum demonstretur, quænam veræ & ordinariæ morborum sint causæ generales, quomodo generentur, aut unde originem trahant, quænam earum sint qualitates, quomodo corpus afficiant & quibusnam motibus extraordinariis ansam præbeant. Tertio Tyronibus explicetur, quibus modis activum illud causis morborum diversis opponatur, & quænam accidentiales motus, contra materiam præternaturalem susceptos, ex necessitate consequentiæ sequantur. Si Pathologia Generalis hoc loco legitime tractatur, Tyronibus tota Historia Pathologica perspicue & naturali modo tradi potest. Imo exinde etiam fuit ipsa Medendi Methodus tam Generalis, quam Specialis. Possem hocce prolixè per plures morbos demonstrare, sed cum hocce in Pathologia jam præstiterim, actum agere nolo. Postea transitus fiat ad Pathologiam specialem, ubi ante omnia eo respiciendum est, ut morbi in certas classes secundum principales causas dividantur, hoc enim modo longe commodius doceri potest Pathologia & omnia etiam a Tyronibus felicius hauriuntur, quam si modo de inflammatione, modo de dolore, modo de Hæmorrhagia agitur. Unicuique autem Classi præmittatur Generalis discursus v. g. de Hæmorrhagiis, Inflammationibus, Febris &c. sic enim reliqua in specialibus occurrentia facillime comprehenduntur a Tyronibus.

3. Tandem quoque in compendio tractetur semiotica, aut si magis id placuerit, aliquanto prolixius: quamvis multa morbos speciales concernentia in semiotica occurrant, quæ longe commodius, in Praxi speciali tractari possunt: Omnia autem in Semiotica Generali occurrentia, si legitimo modo proposita, ac fundamenta in Physiologia & Pathologia antea probe jacta fuerint, a Tyronibus facile intelligi poterunt: nihil enim hic, quod duas hæc partes non respiciat, occurrit, minime autem excludenda est experientia, quæ omnia e Theoria desumpta magis confirmat.

4. Postmodum ad Medendi Methodum progressus fiat. Hæc autem, si legitimam bonamque quis expectit, cum Pathologia Generali exacte conspirare, eamque ubique tanquam basin præsupponere debet. Hic E. semper 1) ad causas generales, non fictitias aut ex falsa hypothesei natas, sed ad veras, sana ratione & multiplici experientia confirmatas, respiciendum est. 2) Ad motus, quos Natura alias, uti in Pathologia id demonstratum fuisse præsuppono, contra causas morificas instituere solet, attendendum est: in hisce duobus enim revera Praxis Generalis maximam partem consistit, & hæc etiam viam sternunt ad reliqua: exinde enim 3) fluunt Indicationes, sive regulæ & conclusiones, quæ, quid agendum sit, quænam remedia causis morificis sint opponenda, ac quomodo Naturæ motus vel alterandi vel moderandi vel stimulandi sint, monstrat. Hisce præmissis 4) progrediendum ad remedia ipsa, ac monstrandum est, quomodo & quo ordine remedia, respectu ætatum, temperamentorum aliarumque circumstantiarum, sint exhibenda. 5) Ipsa autem remedia in certas classes, generalibus morborum causis respondentes, dividantur, & si prolixius de iisdem agere placet, in partes remediorum constituentes inquiratur, ac Tyronibus, quomodo respectu earum remedia operationem suam edant, monstretur. 6) Nulli autem, nisi polychrestis, selectis & usu confirmatis remediis hic locus concedatur, nimia enim remediorum farrago ac effectorum minusque usualium recensio Tyrones confundit: si vero in Methodo Medendi prolixius hæc tractandi animus est, eum solum in finem fiat, ut Auditores omnes cau-



telas, circa usum talium remediorum observandas, addiscant. 7) Commode etiam Methodo Medendi modus conscribendi formulas subungi potest: monstrandum scil. quomodo ex remediis, in quavis classe traditis, concinnæ & selectæ formulæ præscribi ac remedia aliis apte misceri queant: in quibusquidem non semper ad gratiam, sed magis ad necessarios effectus respiciendum est. Quod si vero talis formularum præscriptio in hac parte negligatur, postmodum non levia impedimenta, faciliorem, progressum retardantia, in Praxi speciali occurrunt.

5. Chirurgia quoque in compendio, finita Praxi Generali, Tyronibus tradatur, ut generalia ipsis innotescant: prolixior enim deductio & explicatio peculiaribus merito reservatur Collegiis, ut paulo inferius explicabitur.

6. Tandem in Diætâ, missis inanibus & prolixioribus deductionibus demonstretur, quomodo sex res non naturales ad sanitatis conservationem concurrant: quomodo Diætâ differat respectu Ætatum, sexus & Temperamentorum: cui jungatur Diætâ ægrotantium generalis & specialis, quamvis hæc ultima Praxi quoque speciali reservari possit. Hoc in calu Liber de *Diætâ D. Carls* loco fundamenti inservire posset, qui sane adeo eleganter conscriptus est, ut ab omnibus legi, & in alias quoque linguas transferri mereatur.

7. Hisce omnibus ad finem perductis, progressus fiat ad Praxin specialem, quæ sane, quoniam ad eam omnis Medicina dirigi debet, omni studio tractetur, quo Tyronum animi certis atque firmis regulis imbuantur, ut eo melius postea ab Academiis reduces Praxin exercere queant. Ast antequam ad specialia progrediar, merito illam, nescio an præconceptam opinionem, an dubitationem, an vero questionem, an scilicet *Praxis in Academiis addici possit?* præmitto, quoniam non paucis Tyronum scrupulum movet. In antecessum dico maxime vanam & falsissimam esse hancce persuasionem, quod mox probabo. Præsuppono autem, si quidem licet, Medicinam esse aut certam, aut incertam & hinc exinde elici posse regulas vel certas vel incertas, sive varia axiomata eorumque explicationes, quæ in Academiis a Docentibus proponuntur, ab Auditoribus vero discuntur. Si regulæ illæ sunt certæ, uti certæ esse debent, utilitatem habebunt in Praxi, hisque Tyrones fidere poterunt: sin vero essent incertæ, cui bono proponerentur in Collegiis? Cui bono impenderentur sumptus satis magni? Quem in finem tanto opus esset tempore? Imponerent hoc modo docentes Tyronibus, aut hi se ipsos fallerent: absit hocce ab utriusque: sane si hoc certum esset, Parentes majori jure filios suos Practicis informandos traderent, quam ut eosdem frustra per longum tempus in Academiis alerent. Si vero Medicina & in primis Praxis legitimo modo in collegiis tam publicis, quam privatis, traditur, utique Praxis in Academiis addisci potest, si nimirum Auditores animum sufficienter ad ea quæ ibidem proponuntur, advertunt. Ponamus exempli loco Febrem tertianam intermittentem: hanc Doctor explicaturus sine dubio proponet Definitionem, ac postea quomodo partim ab aliis, partim respectu certorum individuorum differat, monstrabit: allegabit etiam signa huic feбри competentia: hisce junget causas & Prognostica ac explicabit, quomodo primo in genere, ac deinde in specie, certarum circumstantiarum intuitu, legitimo modo curari debeat: allegabit etiam diversa ægrorum, tali methodo curatorum, exempla ac necessarias cautelâs Tyronibus imprimere conabitur, verbo omnia, quæ usui esse possunt, allegabit. Tyro E. si hæc omnia probe percepit ac memoriæ firmiter impressit, jam scit Praxin Febris tertianæ: & si tali modo in omnibus morbis procedit, in Academiis notitiam Praxeos omnium morborum acquirit atque Praxin addiscit. Offeruntur quoque ipsi in Academiis versanti interdum ægroti, quos juxta methodum a Doctore perceptam tractat atque curat, adeoque per talia exempla in methodo suo confirmatur. Interim tamen, & illud negari nequit, quod postmodum frequentior Praxis firmiorem reddat methodum, ita ut junior Practicus sensim sensimque majorem in medendo acquirat habitum, juxta commune proverbium, *fabricando firmus fabri*: nam multa in Praxi occurrunt, quæ specialem merentur attentionem & etiam peculiare quid postulant quoad curationem: ita e. g. femina quædam corripiebatur febre tertiana, adhibebantur omnia usualia remedia, sed frustra, ac febris eodem tenore semper durans ultra duodecimum paroxysmum se extendebat: inquirenti in causas hujus extensionis, ægrotâ se Venæsectionem consuetam neglexisse ajebat: secabatur E. illico vena & febris statim, sine ulteriori remediorum usu, cessabat. Hæc itaque, & alia in morbis occurrentia, Medicum juniorem cautum reddunt, ita ut postmodum in specialissimas etiam circumstantias inquireat, & hoc ipso postea semper firmior in Praxi reddatur.

Quod E. methodum docendi Praxin concernit specialem, eam sequenti modo adornari posse existimo. 1.) Præmittatur *Definitio* aut saltem *Descriptio*, in compendio morbum propositum generaliter sistens. 2.) Subjungatur *Differentia*, ut appareat, quomodo morbus, de quo agitur, ab aliis congeneribus distinguatur. 3.) Sequantur *Signa* morbo propria, ut innotescat, morbum hunc & non alium esse; in Signorum autem recensione is servetur ordo, ut primo loco in morbo occurrentia recenscantur ac hisce reliqua Signa easdem excipientia subjungantur. 4.) Agatur de *Subjecto* tam generali, quinam scil. homines respectu sexus, Temperamentorum, Ætatum, Vitæ generis &c. ad hunc vel illum morbum magis vel minus proni sint: quam speciali, nempe parte affecta, quæ vel nobilior vel ignobilior est, & hinc etiam majorem vel minorem requirit attentionem. 6.) Explicetur quomodo motus hosce ex necessitate consequentiæ omnia antea allegata Signa & Symptomata sequantur. 7.) Ex antea dictis, respiciendo scil. ad causas, subjecta aliasque circumstantias, trahatur Prognosis. 8.) Explicetur, quomodo morbus secundum certas indicationes, ex ante allegatis fluentes, legitimo modo tractari debeat; allegarentur hunc in finem remedia polychresta & selecta & monstretur quænam ab initio, & quæ postea ac quo morbi vel diei tempore exhiberi debeant. 9.) In calamum quoque distitentur variæ formulæ selectæ, aut Tyronibus, ut ex tempore easdem componant, injungatur. 10.) Tandem variæ cautelæ Practicæ, in medendi methodo observandæ finem imponant. 11.) In tali explicatione observationes Practicæ tam propriæ, quam alienæ recenscantur, hæc enim prolata maxime confirmant.



8. Quo autem docens, Auditores omnia accurate comprehendisse certus sit, frequentia instituat examina, hæc enim & iudicium acuunt & memoriæ succurrunt, præsertim si simul a docente res necessariæ breviter denuo explicantur, aut nova jam dictis adduntur.

9. Si jam morbi quidam explicati fuerunt, initium resolutionis casuum fiat, & monstretur, quomodo & quo ordine Historia morbi & Resolutio sit instituenda: quem in finem 1) ex Historia morbi cujusdam generali & speciali varii casus, inter se respectu ætatum, Temperamentorum, sexus, Gradus aliarumque circumstantiarum differentes, formentur, & quo ordine omnia illa, quæ in tali casu requiruntur, poni debeant explicetur. 2) Postmodum progressus fiat ad Resolutionem & quis hic servandus sit ordo exponatur: in Resolutione autem casuum, quantum quidem possibile est, prolixæ demonstrationes & explicationes Physicæ vitentur, & potius ad rationes veram sapientes Theoriam Medicam respiciatur. 3) Si jam aliquatenus in casuum resolutione sunt versati, ipsis diversi casus, ut eos ex tempore resolvant, proponantur, atque hoc modo universa Praxis Specialis tractetur. Talis casuum Resolutio insignem habet utilitatem & viam ad Praxin specialissimam sive individuorum sternit, imo, ut verius loquar, actu eam monstrat.

10. Quo vero Tyrones in aliis quoque partim necessariis & utilibus, partim vero in jucundis se exercent, earumque notitiam acquirant, tempore æstivo Chimia, Materia Medica & Botanica, hyberno vero Anatomia & Chirurgia a Docentibus tractetur, ita quidem ut æstivo & hyberno tempore ea, quæ proponi debent, integre absolvantur.

11. Talis cursus Theoreticus Practicus, si quotidie aliquot horæ impenderentur, duorum annorum spatio posset absolvi, Theoria scilicet & reliquæ partes cum Praxi semel, Chimia vero, Materia Medica, Botanica, Anatomia & Chirurgia bis.

12. Hujusmodi cursus, si v.g. quatuor Doctores inter se convenirent, singulis sex mensibus incipi posset, ita ut si primus initium faceret tempore autumnali, alter tempore verno alium ordiretur & sic porro: aut posset etiam singulis annis incipi talis novus cursus. Ex tali tractatione insignes fluere fructus & quidem. 1) Quod hoc modo Tyrones cito ad Theoriæ & Praxeos cognitionem pervenirent. 2) Quod jam audita, novo cursu incepto, continuo repetere possent. 3) Quod ii, quibus curta est supellex, sine magnis sumptibus Medicinam addiscere possent. Ut alia silentio præteream. Sed si hoc modo tota Medicina tractanda est, non solum a Docentibus, sed etiam a Tyronibus indefessa requiritur diligentia.

## II. Methodus discendi Medicinam cum Cautelis.

Quod jam methodum discendi Medicinam in genere & in specie concernit.

1. Medicinæ Tyro sit pius atque Deum supplex oret, ut sufficientes animi & corporis vires largiatur ad ea addiscenda, quæ necessaria sunt: quare morem multorum studiosorum, vitam asoticam sub libertatis larva ducentium, minime sequatur: Deus enim Author est Medicinæ, is ille ipse est, qui Medicum se hinc inde in S.S. vocat, & qui benedictionem largitur ad omnia, & hinc etiam sana vult ratio, ut illa, quam ex sola misericordia generi humano concessit, ars submissa ac devota mente tractetur & addiscatur: orandum hic est & laborandum, secus qui procedunt, benedictione divina se indignos reddunt, ac nil nisi malum, tam quoad conscientiam, quam quoad eruditionem, ab Academicis reportant thesaurum. Procul E. hinc profani! 2. Probe ad omnia ea, quæ a docente proponuntur, attendat: nam mens alienis rebus intenta nunquam bene percipit: & hinc etiam in Collegiis fabulationes aliaque docentem turbantia (quorsum inutiles spectant quæstiones & oppositiones) vitet. Sedulum potius atque attentum agat auditorem, nam cum in Collegiis res non ludicræ, sed magni momenti, & salutem hominum concernentes proponantur, aut saltem proponi debeant, ipsa sana ratio attentionem suadet. 3. Porro etiam fiducia erga Præceptorem opus est: Docens enim est persona, quæ, vere in Medicina erudita, secundum conscientiam omnia ea, quæ ad promovenda studia inferviunt, fideliter explicat, aut saltem explicare præsupponitur: Quare Tyro Præceptoris fidat, & proposita, ceu vera & certa accipiat: quamprimum enim de Docentis prolatis, aut de ejus fidelitate dubitat, cursus studiorum maxime retardatur. Quo ipso tamen eam nam improbo dubitationem, si forsan aliquo orto scrupolo, Auditor hæsitat, an Docens omnia probe perpenderit, aut annon ex aliquali præcipitantia, aut aliis negotiis impeditus quædam proposuerit, quæ rem non, uti decet, exhausierint: nam tali in casu licitum est Tyroni dubitationes suas cum modestia explicare, aut alios etiam consulere cordatos viros: nunquam tamen, nisi manifesta edoctus experientia, fidelitatem Præceptoris in dubium vocet, quam si propria ratione, experientia, aliorumque demonstratione, deprehenderit, fiducia compenset. 4. Amore quoque docentes prosequatur: amorem talem & quidem infusatum sana postulat ratio: cum enim docens singulari præditus sit eruditione, quam omni diligentia & fidelitate eum in finem auditoribus communicare studet, ut e ruditis statu tracti solida imbuantur scientiæ, nihil magis sanæ congruum est rationi, quam ut discipulus, e Præceptoris ore solida hauriens principia, eum, cui, quicquid scit, unice debet, amore prosequitur sincero & reverenter eum habeat. 5. Diligens sit & continuo studiis suis inprimis tempore matutino, (*Aurora enim Musis amica*) missis omnibus aliis, interdum quidem necessariis visis (quæ tamen ut plurimum aliis commodius peragi queunt horis) negotiis, incumbat: quo plus enim temporis studiis impenditur, eo plus quoque aliis rebus, sæpius satis inutilibus, decedit. Quare etiam consortium eorum, qui chartas lusorias magis, quam Medicorum libros manibus terunt & loco Auditoriorum Cauponas frequentant, atque hoc ipso tempus & sumptus, quos studiis impendere debebant, inutiliter perdunt, magna vitet diligentia, eosque tanquam Universitatum carcinomata fugiat. Eorum vero potius, quos bonis præditos moribus continuo studiis incumbere deprehendit, consortio utatur, ac de rebus necessariis ad Medicinam pertinen-



mentibus familiares misceat sermones, quò hoc ipso in Medica se continuo exercent arte. 6. Si quædam in Collegiis occurrunt, quæ non bene percipit Tyro, inquirat vel statim, quomodo talia sint intelligenda, quod tamen, ne alii turbentur, cum modestia fiat, vel potius privatim finita lectione, hac tamen observata cautela, ut id paucis fiat, ne docenti multum temporis, ad alia necessarii, præripiatur: hoc ipso docentem maxime instigabit, quoniam diligentia & sciendi cupido veri ad promovenda Auditorum studia sunt stimuli. Quis enim docentium non summo afficeretur gaudio, si industrios nactus est auditores, qui scindi desiderio flagrant? quis Doctorum honesto huic desiderio satisfacere recusaret? 7. Studiis suis, inprimis si diversæ in Collegiis explicantur partes, certas destinet horas, ut eo majori diligentia quascunque materias perlegere, ac ad ea, quæ in lectionibus a Doctore proponi debent, eo melius se præparare queat. 8. Lecta & relecta proposita materia, meditetur seposito libro, an omnia probe comprehenderit: hæc sane meditatio magnam ubique in studiis habet utilitatem & iudicium maxime acuit, imo, hoc ipso Tyrones magis magisque perfecti redduntur, ut etiam postea in profundiores materias inquirere queant. 9. Quæ in lectionibus tam publicis, quam privatis audivit, probe annotet, quoniam memoria est labilis. 10. A promiscua librorum lectione absteineat: exinde enim non solum hebes redditur ingenium, sed maxima quoque oritur confusio: paucos potius libros & optimos continuo legat: si vero modo hunc, modo alium de diversis Medicinæ partibus agentem legit librum, Medicinam magis pererrat, quam eandem absolvit. 11. Partibus Medicinæ principalioribus præmittat ea, quæ viam sternunt ad altiora, Theoriam scilicet veram, eamque memoriæ probe imprimat. 12. A necessariis semper faciat initium, aliena verò ad scopum Medicinæ verum non tendentia, quantum quidem possibile est, fugiat. 13. In credendo nunquam nimis præceps sit, sed omnia probe examinet, an cum sana ratione conveniant. 14. Virorum Doctorum & in Praxi exercitatorum consortium semper quærat, ut hoc modo semper majores in studiis profectus facere queat. 15. Nullam materiam necessariam facile prætereat, sed eam tamdiu repetat, donec fundamentum ejus animo probe perceperit. 16. Historiam morborum præ cæteris tanta, quanta potest, diligentia tractet, eamque sibi quam maxime familiarem reddat. 17. Remedia polychresta, pariter ac Regulas Practicas, quantum quidem possibile est, memoriæ mandet, quoniam perpetuum in Praxi habent usum. 18. Jactis probe fundamentis, libros optimos Practicos & Observationum scriptores continuo legat, ut eo firmior in omnibus & inprimis in Praxi fiat. 19. Antequam Praxin ipsam aggrediatur, sub ductu viri in Praxi exercitati in medendo aliquandiu se exercent. Ut alia silentio prætereamus, quæ fidelis Præceptor publice & privatim Auditoribus suis commendare solet. 20. Tandem, finitis studiis Academicis, verba sequentia Sempronii Gracchi semper curæ cordique habeat: *Tu, lectissime Tyro, hoc age, ut nullos ambias honores, nisi spartam Te ornare posse certo scias; si dignus fueris, qui orneris, ne respuas oblatum munus; cura autem, ut Tu titulos, non tituli Te ornent vel honore afficiant. Quodsi vero Te negligat seculum, quin & repellat, animum ne demittas suadeo, cedit id non in Tui sed in seculi opprobrium.*

### III. De Methodo exercendi Medicinam cum Cautelis.

1. Quicumque Praxin Medicam exercere cupit, is eruditus sit, necesse est, i. e. omnium earum rerum, quæ præcise ad Praxin pertinent, cognitionem habeat. 2. Si tali eruditione non est instructus, satius est a Praxi abstinere, quam experimenta periculosa instituere, res enim conscientiae est, illotis manibus Praxin aggredi, ubi sæpius minima circumstantia rem cum ægrotantium summo detrimento variat. 3. In tali casu consulat viros eruditos, inprimis si casus graviores occurrunt, inquirat in libros optimos Practicos, eosque continuo legat, ut remediorum polychrestorum longaque experientia probatorum, ut & Cautelarum necessariarum cognitionem acquirat. 4. Nunquam in Praxi temerarius sit, sed omnia Indicantia & Contraindicantia probe consideret, ac tandem, quid secundum sanam rationem & experientiam agendum sit, concludat. 5. Neque tamen etiam nimis timidus sit: nam occasio in Medicina, & inprimis in Praxi satis præceps est, & sæpius cum ægrotantium damno momento citius præterlabitur. 6. Nunquam minus tuta aut dubia præscribat remedia, ne & ægroto noceat & propriam lædat conscientiam. 7. In observandis morborum phænomenis sedulus sit, ut in Historia morborum certior fiat, & semper majores faciat progressus. 8. In Methodo Medendi Naturam morborum veram Medicatricem semper sequatur. 9. In remedia polychresta continuo inquirat, præsertim in morbis chronicis, quo iisdem ægrotantibus, alias derelictis, succurrere queat, cui fini potissimum inservit chimia, quam, quantum Praxis permittit, exercent. 10. Etiam si remediorum specificorum præparatio ipsi non semper cognita sit, nihilominus tamen iisdem, si usu probata sunt, utatur; satius enim est remedio etiam ignoto ægrotis solatium ferre, quam ob præconceptam opinionem, ac si remediis, quorum compositio ignota est, uti non liceat, ab iisdem abstinere. Ut alia quam plura, hinc inde apud Authores, de Medici officio agentes, occurrentia, silentio prætereamus.

Si E. hoc modo Medicina ubique doceretur, & secundum vera principia, ex ipsa Praxi nata, exerceretur, nullum dubium est fore, quin brevi omnes molestiæ, quæ Medicinam adhuc premunt & inprimis nobilissimæ artis & Medicorum contemptus brevi disparitura sint: quis enim sanæ mentis Medicum eruditum studiis & Praxi summa cum diligentia incumbentem & in omnia ea, quæ publico proficua sunt, inquirentem, contemneret, inprimis si experientia ipsa de ejus eruditione & probitate loquitur? Quis artem nobilissimam, a Deo misero humano generi concessam, amplius aspernaretur? Quamvis, ut verum fatear, ipsa Medicina, quam etiam homines apud indoctos & circulatores quærun, per se non, sed propter logomachias & ignorantiam Medicorum contemnatur, uti id *Goris* in supra jam allegato Tractato de *Medicina Contempta* prolixè demonstravit. Quare ad evitandum



tandum talem contemptum Medici in universum omnes concordiae studere & cunctas illas vanas disputationes, (ubi sæpius decem & plures de uno eodemque morbo quæsitæ, in diversas abeuntes sententias acriter inter se disputant, & non raro rixantur,) evitare deberent, quoniam hæc omnia hominibus, artem aut incertam esse, quæ tamen certissima est, aut Medicos tales ita altercantes veram Medicinam ignorare persuadent. Quem ob finem Medici, in primis iis in locis, ubi Collegia Medica reperiuntur, frequentius convenire, ac de rebus Practicis, de variis Observationibus, de effectibus remediorum aliisque colloqui deberent, hoc enim modo junioribus Practicis via sterneretur ad feliciorum Praxin, & veterani quoque ipsi in sua Praxi confirmarentur. Ubi vero talia Collegia non reperiuntur, Medici Practici cum aliis & exteris quoque commercia literarum instituere, atque hoc modo in varias res, Praxin aliaque concernentes, inquirere possent, uti Domini Medici Uratislavienses nuperrime tale commercium literarium incepterunt, & alios ad communicandas observationes tam curiosas, quam ad Praxin necessarias invitarunt. Sic enim Medicina semper magis magisque augeri & promoveri, ac omnia incommoda quæ hætenus Medicinæ incrementum impediverunt, tolli possent.

*Percepisti forsitan ex hisce, Lector Benevole, Medicinam modernam in multis partibus adhuc insigniter ægrotare & Medicina opus habere. Tu E. Omnipotentem DEUM ardentibus mecum exorabis precibus, ut Gratia sua omnibus iis, quibus hominum salus cura cordique est, assistere velit, ut tandem Medicina multis malis afflicta, bene purgata & reformata convenienti sanitati restitui queat.*

Ceterum Lector Benevole, de occasione huncce edendi librum, monendum adhuc es, me hunc nunquam suscepturum fuisse laborem, nisi amicorum & Tyronum adhortationibus & petitionibus satisfacere consultum duxissem: ante scilicet aliquot annos scriptæ quædam mihi communicabantur Tabulæ Practicæ, quæ postmodum Lipsiæ ab Anonymo sub Prælectionum Academicarum titulo edebantur, hæ non mihi tantum sed & aliis adeo placebant, ut earum continuationem optaremus, & cum tum temporis juvenes quidam selecti privata mea uterentur informatione, continuationem harum tabularum horis a Praxi vacuis incipiebam, visurus, an labor succederet: & cum eum amicis non displicere perciperem, Tabulis de Hemorrhagiis auctis postmodum alias adjiciebam, & cum temporis mihi quoque huncce laborem ad finem usque continuare animus erat. Sed consilium mutare cogebar, ideo quod amici & auditores Tabulas Theoreticas aliasque generales a me efflagitarent, quibus satisfactorius, missis Tabulis Practicis specialioribus, dictas generales tabulas successive elaborabam. Sed hoc ipso labor adeo sub manibus crescebat, ita ut impossibile esset omnes Tabulas in unum volumen redigere, quare eas in duos divisi Tomos, quorum primum hic vides, alterum autem, qui jam maximam partem compositus est, proximis expectabis nundinis.

Secutus vero maxime sum tam in Theoria, quam in Praxi, Virum in Medicina illustrem STAHLIUM, ejus principia, quicquid etiam alii, qui profunda Celeberrimi hujus & in Praxi exercitatissimi Viri scripta, aut intelligere nequeunt, aut ex malitia contemnunt, ogganniant, adeo certa atque cum vera Medicina tantam connexionem habentia hætenus in mea Praxi deprehendi, ut in conscientia convictus asserere non dubitem: hæc principia planam atque certam ad Praxin viam indicare: veram Theoriæ & Praxeos connexionem monstrare: antiquissimam Hippocraticam maxime auctam & certissimam Medicinam nobis sistere: veram morborum Historiam tradere: veras & maxime naturales rationes morborum reddere, ac verum & immediatum morborum nexum cum eorum consequentiis docere. Agnoverunt id jam Viri cordati multi & in Praxi exercitatissimi, e quorum numero potissimum sunt Domini Medici Uratislavienses, qui in edita elegantissima morborum Historia, in multis Celeberrimum Virum cum felicissimo successu secuti sunt: agnoscunt etiam id ipsi Tyrones, quibus talia explicantur principia, quoniam sana ratio & ipsa experientia de eorum veritate loquuntur.

Quo ipsi tamen aliorum hypotesibus nihil detractum volo, sed unicuique alia amplectendi principia liberum relinquo, si modo ita comparata sunt, ut cum vera Praxi stare queant: uti autem unicuique sua defendere principia convenit, ita quoque eorum, quæ sequor, defensionem contra quosvis in me suscipio, nullam enim facile nisi eam, quam clare atque distincte percepi, hætenus admisi sententiam, & hinc etiam eam eo facilius contra aliorum objectiones defendere possum.

Quamvis autem principia hæc certa esse firmiter persuasus sim, iisque Tabulas hæc maximam partem superstruxerim, nemo tamen tantum arrogantiae mihi tribuit, ac si simul easdem ab omni errore plane alienas esse, persuasus essem, cum enim homo atque hinc erroribus obnoxius sim, facile errare potui, præsertim cum aliis negotiis distractus non omnia semper adeo exacte pertractare potuerim, & hinc etiam ubi me errasse deprehendero, aut ab aliis cordatis viris admonitus fuero, lubentissime errores, aut corrigam, aut publice revocabo. Satiùs enim est errorem agnoscere, quam in eodem pertinaciter persistere. Imo, ut verum fatear, illud hominum genus semper parvi pendi, quod quando semel rem quandam hausit, eam adeo pertinaciter, non obstantibus omnibus fortissimis rationibus & demonstrationibus, defendit, ut in errore permanere, quam veritati cedere malit.

Porro etiam monendum es, amice Lector, me remedia Hallensia hinc inde laudasse & commendasse in variis affectibus, non eum quidem in finem, ut præconem vulgum remediorum agere voluerim, sed quoniam multiplici experientia edoctus & hinc in conscientia, ea bona esse & laudabilem præstare effectum, convictus sum. Si alii iisdem uti, ideo quod eorum compositio ignota sit, religioni sibi ducunt, substituant iis reliqua usualia & officinalia remedia in sufficienti copia præscripta; non mihi, dum Hallensia laudavi & laudoremedia, reliqua contemnere mens neque fuit, neque erit. Sin vero nihilominus aliis me ideo carpere animus est, habeant sibi sua, & mihi & aliis ea, quæ in variis affectibus utilia deprehendimus, tantisper præscribendi libertatem relinquunt, donec certa & firma ponatur lex, quæ Medicum ad hoc vel illud præscribendum alliget. Mentio quoque quorundam polychrestorum remediorum, mihi & amicis quibusdam familiarium, facta est, quæ partim invenimus, partim ab aliis communicata possidemus, uti sunt Pillulæ Balsamicæ vitæcerales, Pillulæ antirheumaticæ, Tinctura resolvens, Tinctura Pectoralis &c. quibus adhuc alia in sequen-



quentibus morbis jungemus quæ in Praxi summe utilia deprehendimus. Fateor ea, uti cetera quoque arcana, ex remediis jam diu cognitis præparata esse, ex mineralibus scil. vegetabilibus & animalibus, & hinc mortem per ea præcaveri non posse: quoniam tamen nihilominus bona sunt, nobis tamen reservata, aliis vero arcana erant, donec earum compositionem divulgare nobis animus erit. Interim tamen nemini ea denegabimus, sed cuius petenti lubentissime dabimus, ut ea dispensare queat. Si & ob hanc causam cum aliis censoriam meritis sum virgulam, fiat, mea parum refert: Medico enim, qui Medicinam exercendi facultatem obtinuit, in polycrēsta remedia tam simplicia, quam composita, ut iisdem ægrotis succurrere queat, inquirere licet, imo incumbit: nam quamvis bona Medendi Methodus ad curationem morborum multum conferat, sola tamen sæpius non sufficit, id quod in multis chronicis observamus morbis, qui, etsi multa remedia satis methodice contra illos exhibeantur, nihilominus rebelles admodum & refractarii manent, donec tandem ab ancilla aut rustico unicum exhibeatur specificum remedium, quod brevi morbum præter omnium opinionem tollit, uti superius jam monitum fuit. Et exinde, summe necessariam esse inquisitionem, in remedia polycrēsta & specifica, apparet, præsertim cum adhuc occurrant morbi, qui revera sunt Medicorum scandala & vulgo pro desperatis & incurabilibus habentur, uti sunt Cancer, Podagra inveterata, Epilepsia &c. Minime E. qui in bona remedia inquirunt, reprehendendi, sed potius laudandi & instigandi sunt, quoniam hoc ipso Publico inservire cupiunt: nonne enim satius est, tempus vacuum talibus rebus impendere, quam illud inanibus confabulationibus, expatiationibus, aut chartis litoris inutiliter perdere.

Quod modum scribendi concernit, verborum lenocinia in toto hoc opere non quæsi, sed potius omnia stylo maxime perspicuo proponere conatus sum, ita ut a Tyronibus intelligi queant, nam Viris Doctis hæc non scripsi, optime gnarus, studia mea tanti non esse momenti, ut ipsorum applausum labor hicce mereri queat, si vero & hi aliquid, quod eis non displicet, in Tabulis deprehendant, maxime contentus ero. Ceterum miraberis forsitan, Lector integerrime, quod causas morborum in Tabulis Practicis omiserim, sed scias consulto id factum fuisse: nam cum B. D. Rothius, quem Prælectionum Academicarum Authorem fuisse, hætenus mihi relatum est, eas forsitan non sine ratione præterierit, eundem quoque in hoc passu sequi volui: interim tamen diversas & quidem ordinarias causas semper sub subiecto morborum complexus sum. De causa vero efficiente morborum in Pathologica Tabula satis superque actum fuisse, credo, ita ut, quod de causa efficiente in unoquoque morbo dici debuisset, ex dicta Tabula facile restitui possit. Formulas, quas hinc inde in copia adjeci, ne respuas, tales enim Tyronibus magis, quam Practicis scripte sunt, Tandem B. L. varia sphalmata typographica præter opinionem irrepserunt, inter quæ potissimum illud est, quod in Tabula Pathologica p. 76. l. 26. occurrit, ubi inferendum est: 2.) Chronicos, qui lente procedentes & sæpius solidas partes, inpr. vero viscera affligentes, diu admodum durant: reliquæ leviora sphalmata facile etiam corriges. Tu vero vel Zule vel Mome, qui nihil agendo nihilominus omnia, quocunque etiam comparata fuerint modo, vel, ne fiant, impedire, vel contemnere soles, cum tamen, si tecum habitare velles, facile comprehendere posses, quam sit tibi curta suppellex, carpe, garri, blatera, lacera, rode dente maledico & Theonino, effuti quicquid in buccam venerit, insulta, verbo indulge genio tuo, e me tamen, quoniam tua prolata & proferenda ulla responsione (quis enim ad plus, quam ficulnea & straminea, quæ proferre soles, responderet & tempus aureum, cum filio notis & somni altercando, inutiliter perderet?) digna nec æstimo, nec æstimabo, nihil quicquam, neque hac, neque alia vice, quam illud Socratis: Quid si me &c. elicies: Imperiti enim convitia, ut Seneca utar verbis, æquo animo ferenda sunt, & ad honesta vadenti contemnendus est ipse contemptus. Ceterum Lector vel benevole, vel malevole

LEGE, RELEGE, TENTA, JUDICA.



# NOI REFORMATORI

## Dello Studio di Padoa.

**C**Oncedemo Licenza a Bortolo Baronchelli Stampator di Venezia di poter ristampare il Libro intitolato *Fundamenta Medicinæ Theorico-Practicæ &c. a Georgio Philippo Nenter &c.* osservando gl' ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padoa.

Dat. li 7. Agosto 1753.

{ Gio: Emo Proc. Ref.  
{ Barbon Morosini Cav. Proc. Ref.

Registrato in Libro a Carte 20. al Num. 134.

*Gio: Girolamo Zuccato Seg.*

*Alvise Legrenzi Seg. contro la Bestemia.*



Q. D. B. V.

# FUNDAMENTORUM MEDICINÆ THEORETICO PRACTICORUM THEORIA

Complectens præter Præcognita Medicinæ PHYSIOLOGIAM, PATHOLOGIAM  
& SEMIOTICAM.

PRÆCOGNITA MEDICINÆ.

In his notanda occurrunt Medicinæ.

I. *Definitio.* **M**edicina est ars tradens modum sanitatem hominis præsentem conservandi, amissam vero aut morbis labefactam debitis auxiliis & remediis, quantum possibile, restituendi.

II. *Attributa*, est artium

1. *Nobilissima*

a Respectu *Originis*, quæ est DEUS, largitor ac fons omnis boni.

b Respectu *Subiecti*, quod est homo creaturarum nobilissima.

c Respectu *Finis*, qui est sanitas, thesaurus pretiosissimus.

2. *Difficillima*

a Ratione *partium Medicinæ* satis amplarum & diffusarum.

b Ratione *Temperamentorum* mixtorum & peculiarium inclinationum.

c Ratione *causarum morbificarum* sæpius admodum abstrusarum.

d Ratione *morborum* complicatorum aliorumque factis rebellium aut incurabilium.

e Ratione *defectus remediorum* polychrestorum & specificorum.

3. *Indefinita*: quia etsi Medicus omnia, quæ ad finem assequendum faciunt, agat, fine tamen suo non semper potitur.

4. *Conjecturalis*, quæ tamen non est media, inter perfectam ignorantiam & veram cognitionem, notitia, sed docta experientia & ratione suffulta conjectura.

III. *Subiectum*: Est homo vivus ex Anima & Corpore organico constans.

IV. *Divisio* in partes

1. *Principales*

a *Τηρητική*, quæ tradit modum sanitatem præsentem conservandi.

b *Θεραπευτική*, quæ methodum, morbis per convenientia remedia medendi, docet.

2. *Ministras* sex, quæ inserviunt

a *Cognitioni*, uti sunt

1. *Physiologia*, hominem in statu sano considerans ad quam pertinet *Anatomia*, omnium humanarum partium situm, substantiam & connexionem mediante sectione docens.

2. *Pathologia* morbos, eorumque causas complectens.

3. *Semiotica*, signa utriusque status tam generalia quam specialia exhibens.

b *Curationi*, scil.

1. *Pharmacia*, agens de remediis, cui adhærent:

a *Botanica* modum cognoscendi vegetabilia tradens.

b *Zoologia*, quæ tractat de Animalibus eorumque partibus.

c *Mineralogia*, quæ agit de Mineralibus.

d *Chymia*, methodum demonstrans ex vegetabilibus, animalibus & mineralibus mediante igne optima quæque remedia præparandi.

2. *Dieta* sex rerum non-naturalium naturam, usum & abusum docens. Ad quam a quibusdam refertur *Ars culinaria*.

3. *Chirurgia*, quæ monstrat methodum per manuales operationes vitiis humani corporis medendi, cui itidem inservit *Anatomia*.

V. *Finis*. *Ultimus finis* ad quem tota ars medica dirigitur, est Sanitas: *finis* vero *intermedius* est curatio & tractatio hominis sani & ægroti, quia mediante ad ultimum finem tendit Medicus.

VI. *Scelæ*.

1. *Empirica* Veterum, quæ sola experientia contenta erat.

2. *Dogmatica*, quæ experientiæ rationes phænomenorum jungebat.

3. *Methodica*, quæ ad strictum & laxum omnia referebat.

4. *Chymica*, quæ ex principiis Chymicis cuncta deducebat.

5. *Mechanico-Chymica*, & *Mechanico-Physica* moderna, quæ omnia per Mechanismum Chymicum vel Physicum explicat.

6. *Eclectica* recentissima, quæ præeunte STAHLIO experientia veræ & fidæ sanam jungit rationem, ac stricto & laxo tanquam causis instrumentaliibus, Naturæ vero morborum medicatrici in corpore humano finaliter agenti, tanquam causæ efficiæ Theoriam & Praxin superstruit.

THEORIÆ MEDICÆ

PARS I.

DE

PHYSIOLOGIA.

I. *Definitio.* **P**hysiologia est prima pars Medicinæ ministra tractans hominis statum secundum naturam; sive quæ tradit omnes illas operationes & actiones, quæ ad vitæ & sanitatis conservationem necessariæ sunt.

II. *Differentia*.

1. Alia est mere *Physica*, quæ sola hominis contemplatione sine respectu ad sanitatem, contenta est.

2. Alia est *Medica*, quæ quidem Physicam considerationem præmittit aut præsupponit, ulterius tamen progreditur, & omnes actiones respectu ad vitam & sanitatem Medice contemplatur.

III. *Subiectum*. Homo vivus & sanus corpore organico & anima immateriali ac rationali instructus.

IV. *Finis*. *Ultimus finis* est consideratio sanitatis, intermedius vero, actionum omnium tam vitallium, quam animalium, ut & instrumentorum, quatenus scil. vitam & sanitatem respiciunt, contemplatio.



## De Homine.

- I. *Definitio.* **H**omo est animal constans ex Corpore organico legitime structo & Anima rationali corpus organicum penetrante & informante, sive vitam corpori largiente.
- II. *Divisio* in duas partes essentielles
- 1 *Animam* immaterialem & rationalem.
  - 2 *Corpus* organicum animæ sive spiritui immortalis domicilium præbens.

## De Anima.

- I. *Definitio.* **A**nima est spiritus finitus, intelligens, immortalis corpori organico inclusus, eidemque vitam largiens.
- II. *Differentia.*
- 1 Respectu *essentiæ*, Anima unius ejusdemque est essentiæ in omnibus hominibus.
  - 2 Respectu tamen *indolis* alia videtur esse magis activa, ut in Cholericis & Sanguineis, alia magis torpida, uti in Phlegmaticis & Melancholicis.
- III. *Finis.* Animæ finis primarius est contemplatio operum Divinorum ac agnitio Creatoris in creaturis, quoniam vero corpore ad hanc cognitionem absolute opus habet, intendit quoque conservationem corporis, eamque actu præstat.

## De Corpore.

- I. *Definitio.* **C**orpus est machina artificiosissima ex variis partibus organicis constans, ab initio a summo Creatore e terra producta, jam vero per generationem, benedicente Deo propagata, eum quidem in finem, ut Animæ rationalis sit instrumentum.
- II. *Materia.* Est substantia *mucido-pinguis*, constans ex subtili terra, pinguedine & aqua, cujus existentiam probant
- 1 *Cœtio*, qua mediante omnes partes molles & ipsa quoque ossa in materiam talem mucido-pinguem resolvuntur.
  - 2 *Ossa infantum* & juniorum etiam animalium, in quibus manifeste talis mucilago deprehenditur.
  - 3 *Nutritio*: mucilaginosa enim & gelatinosa omnia corpus ejusque partes optime nutriunt.
  - 4 *Hæctica*, ubi consumpta tali mucilagine, a calore hæctico, omnes partes contabescunt, imo etiam talibus mucilaginosis adhibitis & diu continuatis pristinam plenitudinem acquirunt.
- III. *Mixtio* & inde resultantes diversæ corporis partes, & quidem
- 1 *Fluidæ*, quæ multum habent aquæ & pinguedinis, parum vero terræ.
  - 2 *Solidæ molles*, in quibus multum pinguedinis, sufficiens terræ, minor vero aquæ portio deprehenditur.
  - 3 *Solidæ duræ*, quæ magnam terræ portionem, parum pinguedinis, aquæ vero minimam partem in se continent.
- IV. *Structura*, quæ est partium omnium, tam magis simplicium, quam compositarum & organicarum ex principiis antea dictis decens & legitima combinatio & conjunctio, corpus perfectum sistens.
- V. *Divisio* in
- 1 *Truncum*, sive maximam corporis molem artibus contradistinctam & in tres ventres divisam,
    - a *Supremum* sive *Caput*, in quo continetur cerebrum cum suis partibus.
    - b *Medium* sive *Thoracem*, in quo sunt Cor, Pulmones &c.
    - c *Infimum* sive *Abdomen*, in quo Hepar, Lien, Ventriculus, Intestina, Renes, Vesica, Uterus &c. deprehenduntur.
  - 2 *Artus* & quidem
    - a *Superiores* sive brachia cum suis partibus.
    - b *Inferiores* sive pedes cum membris annexis ad truncum usque. Reliqua structuram concernentia petantur ab Anatomicis.

VI. *Observationes.*

- 1 Nulla inter Elementa corporis firma est cohæsiō, quare etiam cessante motu ea facile a se invicem recedunt, & putrescunt.
- 2 Non obstante tamen corporis ad putredinem dispositione, ea raro in corpore invalescit.

## De Circulo Sanguinis.

I. *Definitio.* **C**irculus Sanguinis est motus sanguinis a Corde per arterias ad partes, ejusdemque per venas ad eundem fontem reditus.

II. *Differentia.*

- 1 Alius est in *adultis*, quando scilicet sanguis per venam cavam refluus fertur ad auriculam dextram & ex hac in dextrum cordis ventriculum, ex hoc vero per arteriam pulmonalem in pulmones; ac deinde in pulmonibus per venam pulmonalem ad cordis auriculam sinistram, ex hac vero in ejusdem lateris ventriculum tendit, ac tandem contracto corde per arteriam aortam expulsus, ad omnes partes distribuitur, ab hisce vero per venam cavam redit ad cor.
- 2 Alius est in *fœtu*, quando nimirum sanguis ex placenta uterina cum succo nutritio per venam umbilicalem ad hepar & per ductum Glissonianum ad venam cavam, & per hanc ad cor ejusque auriculam dextram partim, partim vero per foramen ovale ad sinistram fertur: ex dextra vero cordis auricula in dextrum ventriculum effusus sanguis & ope systoles in pulmones per arteriam pulmonalem impulsus, per ductum arteriosum Botalli ad arteriam tendit aortam, in quam similiter sanguis sinistræ auriculæ e ventriculo ejusdem lateris infunditur, ac tandem postquam in totum corpus distributus fuit, per duas arterias umbilicales ad placentam vehitur, ut ibidem novo succo nutritio imprægnetur.

III. *Materia* est massa sanguinea, quæ dividitur

- 1 In *sanguinem* stricte sic dictum, sive grumum sanguinis, qui potius ex globulis tam diaphanis, quam opacis, e pinguedine sive portione sulphurea sanguinis natis, lymphæ, juxta Lewenhockium innatantibus, quam ex fibris constat.
- 2 In *Lympham* nutritiam e partibus mucilaginosis aut gelatinosis, aquosis & paucis salino-terrestribus compositam.
- 3 In *Serum* excrementitium a partibus aquoso-halituosis, terrestribus salinis, mucosis & sulphureo-bilibiosis, per varia colatoria e corpore expellendis, ortum trahens.

IV. *Organum.*

- 1 *Cor* in diastole sanguinem e vena cava in auriculas & ventriculos recipiens, in systole vero eundem in arteriam aortam expellens.
- 2 *Arteriæ & Venæ*, quarum illæ sanguinem exceptum ad omnes partes vehunt, hæ vero revehunt.
- 3 *Pulmones*, in quibus sanguis fluxilior & ad motum progressivum propter aeris pressionem magis aptus redditur.
- 4 *Reliquæ partes* tono gaudentes, quæ beneficio fibrarum motum humorum promovent.

V. *Causa efficiens.* Est Anima motum partibus solidis & imprimis cordi imprimens & jugiter continuans.VI. *Finis* sive usus circuli sanguinis est,

- 1 Ut fluxilitas & calor sanguinis conserventur.
- 2 Ut sordes noxiæ partium solidarum abstergantur, & fibræ emolliantur.
- 3 Ut calore sanguinis partes solidæ continuo foveantur.
- 4 Ut partes inutiles omni tempore e sanguine removeantur.
- 5 Ut nutrimentum in debita proportionem partibus apponatur, & tandem
- 6 Ut vita & sanitas conserventur.

VII. *Observationes.*

- 1 Quo magis lentus est circulus sanguinis, eo tardius etiam procedunt secretiones & excretiones, ac contra.
- 2 Quo magis augetur circulus sanguinis, eo magis increbescit calor sanguinis & partium.
- 3 Sub fortiori humorum motu multæ generantur partes excrementitiæ.



- 4 Motus sanguinis ad partes externas non semper est equalis, quod ex valorum intumescencia & detumescencia colligitur.
- 5 Nimum cordis impetum refrenant robur meningum & partium Tonus, unde sublata meningum & toni resistentia, sanguis magno impetu in partes ruit.

### De Respiratione,

I. *Definitio.* **R**espiratio est actio vitalis, qua mediante aer in pulmones dilatatos admittitur, & concidente, sive constricto pectore iterum expellitur, eum quidem in finem, ut vita ac fluxilitas & calor sanguinis conserventur.

#### II. *Organum.*

- 1 *Thorax* musculis variis, pectorali, intercostalibus &c. instructus, ut dilatari & constringi possit.
- 2 *Diaphragma*, medium ab infimo ventre separans.
- 3 *Pulmones* substantia cellulosa sive vesiculosa gaudentes cum aspera arteria, ejusque ramificationibus per totam pulmonum substantiam dispersis.

#### III. *Causa efficiens*

- 1 *Immaterialis*, quæ est *Anima* sive *Natura* musculorum ope pectus continuo modo dilatans, modo constringens.
- 2 *Materialis* sive *aer Atmosphericus* propria gravitate in pulmones irruens, elasticitate vero eisdem dilatans & sanguinem in vasis sanguiferis contentum conquassans.

#### IV. *Ujus*, qui est

- 1 *Primarius*, promotio scil. motus sanguinis progressivi a corde incepti, ac productio motus intestini sive vitalis duplicis, fluxilitatis scil. atque caloris sanguinis.
- 2 *Secundarius*, quando nimirum Respiratio loquelæ, cantui, risui, fletui, clamori, olfactui, secum, urinæ, foetusque exclusioni, suctioni &c. inservit.

#### V. *Observationes.*

- 1 Respiratio solis animalibus natis concessa est, unde foetus in utero non respirat.
- 2 Quo celerior est respiratio, eo magis incalescit sanguis, quare respiratio non refrigerat sanguinem.
- 3 Quo minus autem respirant homines, eo magis spissus redditur sanguis, quod ut plurimum in sedentariis observamus.
- 4 Quamvis aer ad vitam conservandam absolute sit necessarius, non tamen est vitæ pabulum.
- 5 Aer nimis densus incrassat humores, nimum vero subtilis eos plus, quam par est, resolvit, & ad dissolutionem putredinosam disponit.

### De Motu Tonico.

I. *Definitio:* **M**otus tonicus est certa & proportionata partium omnium solidarum mollium expansio, ut humores in sufficiente quantitate per easdem sine ulla remora ad partes transpelli, redire ac simul corpus nutriri & secretiones debito modo peragi queant.

#### II. *Existentia* quæ probatur

- 1 Quia in nervis, arteriis, venis aliisque partibus dissectis statim fibrarum fit retractio, & insignis hiatus inter partes divisas cernitur.
- 2 Quia luxata membra per musculositatem retrahuntur, ut sanis breviora evadant.
- 3 Quia relaxato in Paralyti musculo quodam & cessante ejus tensione, antagonista sive musculus eidem oppositus partem paralyticam versus se trahit, uti id observamus interdum in tortura oris.
- 4 Quia partes vere paralyticae, propter cessantem tonum & sanguinem in magna copia in illas irrudent, maxime intumescunt.
- 5 Et e contrario ob nimiam & continuatam stricturam, ob denegatum sanguinis influxum, partes tandem plane contabescunt.
- 6 Quoniam in statu sano tempore somni habitus corporis magis intumescit, & facies, propter majorem sanguinis influxum, magis florida evadit.
- 7 Quoniam in terrore manifesta habitus corporis con-

strictio, in ira vero in subjectis dispositis ejusdem relaxatio observatur.

8 Quia interdum uberior, interdum vero parcius sudoris, urinæ &c. sunt secretiones, in quo casu necessario major vel minor pororum contractio admitti debet.

9 Quia præsentem frigore, impr. tempore hyberno, cutis cum partibus exterioribus admodum constringitur, tempore vero calido relaxatur.

10 Id quod etiam observatur in paroxysmis febrium præcipue intermittentium, ubi relaxatio toni habitus corporis cum emissionem sudoris, cutis contractionem in horrore sequitur. Ut alias motus tonici insignes alterationes in Praxi observabiles silentio prætereamus.

#### III. *Differentia.*

- 1 Respectu *temperamentorum*, in quibus major vel minor fibrarum observatur strictura, major quidem in Cholericis & Melancholicis, minor vero in Phlegmaticis & Sanguineis.
- 2 Respectu *ætatis*, ubi major est fibrarum laxitas in junioribus, major vero contractio in adultis.
- 3 Respectu *sexus*: in masculino enim sexu major ceteris paribus est fibrarum tensio quam in foeminino.

IV. *Organum* sunt omnes partes fibris tam nerveis quam muscularibus instructæ, & hinc vel ad contractionem vel relaxationem aptæ.

V. *Causa efficiens* est *Natura* sive *Anima* vitaliter in corpore agens, quæ pro corporis necessitate tonum partium solidarum mollium modo constringit, modo relaxat, ut major vel minor sanguinis copia ad & in partes admitti queat.

#### VI. *Ujus.*

- 1 Ut debitum partium solidarum mollium robur conservetur.
- 2 Ut proportionata humorum distributio instituat.
- 3 Ut secretiones & excretiones legitimo modo procedere queant.
- 4 Ut sensuum vigor stabilis & constans permaneat.
- 5 Ut maximus cordis impetus, & nimius partium a sanguine infarctus præcaveatur.
- 6 Ut sanguinis motus progressivus & intestinus promoveatur.
- 7 Ut in morbis criticæ evacuationes ad convenientia loca dirigantur.

#### VII. *Observationes.*

- 1 Motus tonicus dependet a meningibus cerebri, quod experimenta *Bagliviana* probant.
- 2 Quo magis intenditur tonus partium externarum, eo major sanguinis copia fertur ad interiora & vice versa.
- 3 Contractis partibus inferioribus major fit humorum motus ad superiora & contra.
- 4 In dormientibus tonus partium externarum relaxatur, in vigilantibus vero magis strictus est.

### De Secretionibus.

I. *Definitio:* **S**ecretiones sunt actiones vitales, quarum ope per viscerum & partium poros vel humores excrementitii a reliquis separantur, ut e corpore expellantur, vel laudabiles, certorum colatoriorum beneficio secernuntur, ut ad usus específicos impendantur.

#### II. *Differentia.*

- 1 Respectu *materia* secernendæ, aliæ secretiones respiciunt partes inutiles, aliæ vero utiles.
- 2 Respectu *gradus*, secretiones interdum largiores: interdum vero mitiores sunt.
- 3 Respectu *Ætatum & Temperamentorum*, quorum alia ad secretionem magis, alia vero minus disposita sunt.

#### III. *Organum.*

- 1 *Glandula conglomerata*, uti sunt salivales variæ, Pancreas &c.
- 2 *Pori* partium, analogiam cum glandulis habentium, Hepar, Cerebrum, Glandulæ miliares intestinum &c.

IV. *Causa efficiens* est *Anima* sive *Natura*, quæ per continuam remotionem partium inutilium, utilium



vero asservationem ad debitum tempus, conservationem corporis intendit & præstat.

V. *Modus*: Omnes secretiones fiunt transcolatione, per poros iusta magnitudine gaudentes, ita ut neque poris neque particulis certa figura præditis, neque fermentis viscerum, humores immutantibus, opus sit. vid. *Physiol. Cap. IV. Membr. IV. Art. 1.*

#### VI. *Usus*.

- 1 Secretiones absolute ad vitam necessariæ sunt, & iis cessantibus morbi graviores corpus affligunt, imo mors interdum repentina sequitur.
- 2 Dum partes inutiles semper e Massa sanguinea remonentur, & e corpore expelluntur, corruptio humorum metuenda præcavetur.
- 3 Hoc ipso etiam nimia humorum abundantia tollitur, atque proportio sive æquilibrium inter humores & motus conservatur.
- 4 Per humorum vero laudabilitatem v.g. salivæ, seminis, lactis, lymphæ &c. secretionem corporis proprii conservationi, prolis generationi & infantis nutritioni prospicitur.

#### *De Secretione Humorum inutilium*

sive

#### *De Depuratione Sanguinis.*

*Definitio*: **D**epuratio sanguinis est continua partium ferosarum, superfluarum & inutilium sub forma sudoris, urinæ, bilis, muci & fecum alvinarum e Massa sanguinea secretio & excretio, ut reliqui humores in statu laudabili conserventur.

#### *I. De secretione & excretionem Sudoris.*

*I. Definitio*: **S**udor est excrementum corporis, ex partibus feri aquoso-halituosis & salino-sulphureis subtilibus constans, quod per habitum corporis expellitur.

#### *II. Differentia.*

- 1 Sudor alius est *strictus* sic dictus, quando partes feri sub forma sensibili aquosa per cutim excernuntur.
- 2 Alius vero *late* sic dictus, quando partes ferosæ sub forma vaporis e corpore exhalant. Hoc per Diapnoen h.e. leniorem transpirationem, illud vero per diaphoresin, sive fortiolem sanguinis propulsum, ad habitum corporis contingit.
- 3 Alius sudor est *spontaneus*, alius causas externas sequitur.

*III. Materia*: Est *serum* aquoso-halituosum multis partibus subtilioribus salinis ac sulphureis repletum, partim ex assumptis, partim, & quidem præcipue, ex humorum nimia attritione natum.

*IV. Organum*: Sunt *glandulæ miliares* subcutanæ, *Stenonianæ* ab inventore dictæ, reti cutis vasculoso interjectæ, secretum sudorem per poros cutis emittentes.

*V. Causa efficiens*: Uti aliarum actionum ita & hujus secretionis Natura est author & causa efficiens, quæ pro necessitatis diversitate habitum corporis per fibras modo constringit, modo relaxat, adeoque hoc ipso sudoris excretionem moderatur.

*VI. Tempus*. Ordinarium sudoris spontanei tempus est, quando digestiones omnes peractæ sunt, inpr. vero sudor spontaneus post mediam noctem versus diluculum erumpit, adeoque juxta Veteres est excrementum tertiæ coctionis, quod peractam Nutritionem sequitur. Sudoris vero, a causis externis pendentis, nullum est ordinarium tempus.

#### *VII. Usus*

- 1 Corpus liberatur a partibus superfluis ferosis & summe agilibus salino-sulphureis, præ ceteris omnibus ad dissolvendum sanguinem aptis.
- 2 Conservatur hoc ipso etiam alacritas corporis & levitas membrorum, quæ suppresso sudore statim cessant.
- 3 Præcaventur etiam multi morbi a feri stagnationibus & corruptionibus ortum trahentes.

#### *VIII. Observationes.*

- 1 Transpiratio non solum fit per habitum corporis, sed & per pulmones & alias partes internas, quod continuus earum mador probat, & hinc cessante aliquo modo Transpiratione major humorum motus vel ad pectus vel ad alias partes interiores fit.
- 2 Transpiratio in junioribus magis fit per superiora, in adultis vero vel æqualiter per totum habitum corporis, vel per partes inferiores.
- 3 Quo magis homines dispositi sunt ad sudores, eo facilius liberantur a febribus, & contra.
- 4 Calor ambiens multum confert ad generationem materiæ sudoris & ipsam quoque excretionem, relaxando habitum, promovet.

#### *De Secretione & excretionem Urinæ.*

*I. Definitio*: **U**rina est excrementum, ex feri crassioribus partibus aquosis & Salino terrestribus paucisque Sulphureis constans, in renibus secretum & per vias urinarias ordinarias excretum.

#### *II. Differentia.*

- 1 Urina alia est *sanguinis*, quando scilicet partes ferosæ sanguinis sufficiente salino-terrestrium ac sulphurearum particularum quantitate imprægnatæ & hinc sub citrino colore secernuntur, & per vias ordinarias excernuntur.
- 2 Alia est *potus*, quando post largiorem potum Massam sanguineam admodum diluentem, urina limpida aquosa, & partibus excrementitiis minus imbuta majori copia & frequentius excernitur, vid. *Theor. Homin. Sani Cap. IV. Membr. IV. Art. 1. Punct. IV.*

#### *III. Materia, quam constituunt.*

- Partes ferosæ* in majori quantitate, quæ reliquis vehiculum præbent, in quibus admixtæ sunt.
- 2 *Salino-terrestres* particulæ, teste Chymia sapore & tartaro matularum.
  - 3 *Salino volatiles*, testibus itidem sensibus & Chymia.
  - 4 *Sulphureæ*, quas color, odor & resolutio Chymicæ probant.

#### *IV. Organum.*

- 1 *Secretionis* sunt *renes* cum glandulis, aut harum analogo, & hisce annexis ramis arteriarum emulgentium, materiam urinæ advehentium, ac tubulis urinariis ad pelvim tendentibus & ureteribus urinam secretam ad vesicam vehentibus.
- 2 *Excretionis* est *vesica* fibrosa cum partibus annexis, quam urina in ea contenta quantitate & qualitate ad excretionem stimulat.

#### *V. Causa efficiens.*

- 1 *Secretionis* est Natura, quæ uti ad alia colatoria, ita & ad renes partes excrementitias beneficio motus cordis pellit: quam ipsam tamen secretionem ope motus tonici constrictorii & relaxatorii ita moderatur, ut modo major, modo minor urinæ secretior pro circumstantiarum necessitate sequatur.
- 2 *Excretionis* eadem est quoque causa, quilibet enim conscius est actionem hanc esse voluntariam: peragitur autem hanc excretionem Natura cohibendo spiritum, premendo partes abdominis & constringendo tunicam vesicæ fibrosam, unde vi dilatato, alias arte constricto, vesicæ sphinctere cum impetu profilit urina.

#### *VI. Usus secretionis & excretionis urinæ.*

- 1 Ut corpus a partibus nimis ferosis, tam ex sanguinis continua conquassatione natis, quam a potu nimio originem trahentibus & sanguinem nimis diluentibus, liberetur, ac h.m. morbi a feri copia dependentes præcaveantur.
- 2 Ut partes salino-sulphureæ sanguinem nimis resolventes, ac terrestres ad obstructions generandas aptæ & hinc æconomix vitali contrariæ, e corpore expellantur.

#### *VII. Observationes*

- 1 Quo major est transpiratio, eo minor observatur urinæ generatio & contra.
- 2 Constrictis renibus urina limpida & in minoria copia emittitur & contra.



## De Secretione &amp; excretionem Bilis.

**I. Definitio:** Bilis est respectu sanguinis humor excrementitius ex flavo viridescens, constans ex partibus aquosis & salino-sulphureis acris, in hepate secretus & in intestinum duodenum vel jejunium infusus.

**II. Differentia.**

- 1 Alia est *Hepatica*, quæ diluta, coloris minus saturati & saporis non adeo acris & amari est, ac continuo per ductum hepaticum ad intestina partim, partim vero per ductus cysthepaticos ad vesiculam felleam fluit.
- 2 Alia est *Cystica*, quæ crassioris est consistentiæ, coloris saturati, insigniter amara, ac non nisi certo tempore, digestionis scilicet contracta vesicula fellea & concurrente ventriculi, cibis repleti, pressione, in intestina expellitur, & cibis semidigestis admiscetur.

**III. Materia sunt**

- 1 Partes *serosæ*, quas autopsia in Chymia & bilis fluxilitas probant.
- 2 *Salino-Sulphureæ* acres, ex insigni attritu partium terreo-salinarum & pinguinum natæ, quarum existentiam monstrat Chymia.

**IV. Organum** secretionis hujus est

- 1 *Hepar* & inpr. ejus acini glandulosi, sive juxta quosdam analogon glandularum, ad quos Venæ portæ per universam hepatis substantiam dispersi rami bilis materiam vehunt, & e quibus postmodum bilis per modum transcolationis secreta per ductus bilarios minores ad hepaticum, & ex hoc partim ad intestina, partim ad vesiculam felleam fluit.
- 2 *Lien*, in quo juxta recentiores sanguis ad facilitatem bilis dimissionem disponitur.

**V. Causa efficiens:** Est Natura, quæ beneficio acinorum glandulorum hepatis partes aquosas & salino-sulphureas reliquis humoribus vitalibus inimicas, e sanguine venæ portæ separat, & per motum tonicum continuo ad intestina propellit.

**VI. Usus** hujus secretionis

- 1 Ut partes biliosæ sive sulphureæ superfluæ crasin humorum vitalium turbantes continuo removeantur & expellantur.
- 2 Ut cibi semidigesti & ad corruptionem proni per partes bilis salino-sulphureas a putredine in intestinis præserventur.
- 3 Ut bilis intestina stimulando motum alimentorum & fecum excretionem promoveat, adeoque clysteris naturalis officio fungatur.

**VII. Observationes**

- 1 Acris oleosa ac aromatica multum præbent bilis.
- 2 Cholericis majorem bilis copiam producant, quam reliquorum temperamentorum subjecta.
- 3 Acida & Nitrosa bilis uberiorem generationem impediunt, ejusque acrimoniam temperant.
- 4 Bilem non ingredi cum chylo in vasa lactea probat ejus albedo & dulcedo.
- 5 Bilis cystica extra chylificationis tempus, inpr. post iram prægressam in intestina infusa, facile Diarrhœas excitat.
- 6 Bile e contra retenta & non rite secreta, crudior & viscidior chylus generatur ad obstructions glandularum meseraicarum producendas maxime pronus.

## 4. De Secretione Muci.

**I. Definitio.** Mucus est excrementum ut pl. album consistentiæ spissioris, ex aquosis terreo-salinis & mucido pinguibus particulis constans, in variis locis secretum & in certas cavitates infusum.

**II. Differentia.**

- 1 Ratione *loci*, alius in capitis variis partibus, alius in ventriculo & intestinis, alius in vesica generatur.
- 2 Ratione *consistentiæ*, alius fluxilis magis, alius vero magis spissus est.

**III. Materia:** Sunt partes terreo-salinæ, mucido pinguibus immersæ, quibus aquæ portio diversa, pro majori vel minori mucî spissitudine, admixta est.

**IV. Organum**, sunt

- 1 Membranæ glandulosæ Narium ac Sinuum sphenoidæ, Ethmoideorum & Frontalium.
- 2 Glandulæ Ventriculi & Intestinorum, mucum talem continuo secernentes.
- 3 Glandulæ Vesicæ.

**V. Causa efficiens**, est pariter Natura, quæ glandularum modo dictarum ope mucum, fluxilitatem humorum turbantem, continuo e Massa sanguinea removet.

**VI. Usus**

- 1 Ut fluxilitas sanguinis ad secretionem necessaria conservetur.
- 2 Ut viscerum secretoriorum obstructions præcaveantur.
- 3 Ut narium membrana mucosa tali materia obducta ab injuriis externis, Ventriculus vero, Intestina ac Vesicæ tunica interiora læsione muniatur.

**VII. Observationes.**

- 1 Quo magis ad Phlegmaticum temperamentum inclinant subjecta, eo major in iisdem mucî generatur quantitas.
- 2 In subjectis junioribus semper major mucî deprehenditur copia.
- 3 In senibus ob fibrarum torporem insignis quoque mucî producitur quantitas.
- 4 Aer crassus, humidus & frigidus humores condensando corpora maxime disponit ad copiosorem mucî generationem.
- 5 Satiusest mucum generari & excerni e capitis variis partibus, quam e glandulis asperæ arteriæ.

## De Secretione &amp; Excretionem fecum alvinarum.

**I. Definitio:** Feces alvinæ sunt excrementa corporis consistentiæ crassæ, coloris flavi vel fusci, fœtida, ex reliquiis ciborum, bile, partibus mucosis aliisque ad intestina depositis nata, & per alvum excreta.

**II. Differentia.**

- 1 Ratione *Consistentiæ*, aliæ sunt consistentiæ spissioris, aliæ magis sunt molles aut fluidæ pro diversitate ætatum, temperamentorum, assumptorum &c.
- 2 Ratione *Coloris*, dum magis vel minus ad flavedinem tendunt.
- 3 Ratione *Fœtoris*, quatenus aliæ pro subjectorum & assumptorum diversitate magis vel minus fœtent.

**III. Materia**

- 1 Reliquiæ ciborum digestorum post chyli ingressum in vasa.
- 2 Partes biliosæ reliquiis istis admixtæ.
- 3 Portio mucî intestinorum.
- 4 Partes crassiores salivæ & succi Pancreatici.

**IV. Organum.**

- 1 *Secretionis*, sunt omnes partes quæ humores excrementitios ad intestina deponunt, ut ibidem cum reliquiis alimentorum misceantur: uti sunt glandulæ salivales, Ventriculi, Intestinorum, Hepar & Pancreas.
- 2 *Excretionis* sunt intestina, omnes hæc partes excrementitia excipientia & motu peristaltico ad anum usque propellunt.

**V. Causa efficiens.**

- 1 *Secretionis* est Natura, quæ humores varios excrementitios, ope variorum organorum a reliquis humoribus separatos, ad intestina tanquam communem cloacam deponit.

- 2 *Excretionis* est eadem natura, quæ beneficio motus peristaltici excrementa successive ad sphincterem ani usque propellit, per quem postmodum juncta spiritus cohibitione & fortiori pressione vi expelluntur.

**VI. Usus:** Ut corpus a sordibus variis ad intestina depositis & reliquiis ciborum junctis liberetur.

**VII. Observationes.**

- 1 In infantibus & Phlegmaticis excrementa alvina semper mollioris sunt consistentiæ, quam in aliis.
- 2 E contra in Cholericis & Melancholicis magis sunt spissa.
- 3 Homines durioribus laboribus assueti feces-alvina



- spissiores & in majori quoque copia excernunt.
- 4 Tempus excretionis pro subjectorum diversitate variat, dum in aliis non nisi elapsis 24. horis, in aliis vero citius, in aliis tardius feces excernuntur.
  - 5 Quo magis homines prout sunt ad alvum liquidam, eo facilius Diarrhœis corripiuntur & contra.
  - 6 Quo plus ciborum diversorum assumunt homines, eo magis fœtent excrementa.

## De Secretione humorum utilium.

### De Secretione Lymphæ ejusque motu.

I. *Definitio.* **L**ymphæ est humor laudabilis sanguinis Massæ primo junctus, postea vero in variis organis secretus, ex partibus aquosis & gelatinosis constans, partium nutritioni dicatus.

#### II. *Differentia.*

1. a *Lymphæ* sanguinis, quæ massæ humorum adhuc junctæ est, cum e contrahæc, de qua sermo est, in peculiaribus vasis contenta sit.
2. a *Sero*, quod est partium excrementitiarum, ad conservationem corporis inutilem, colluvies, Lymphæ vero est omnibus consentientibus liquor laudabilis & nutritivus.

#### III. *Materia*, sunt

- 1 Partes laudabiles *aquosæ* ad fluxilitatem lymphæ facientes, quibus
- 2 multæ partes *gelatinosæ* nutritivæ subpingues &
- 3 paucæ *salinæ*, aquosarum & pinguium mixtionem promoventes, admixtæ sunt.

#### IV. *Organum.*

1. *Secretionis*, quod nondum adeo detectum est ab Anatomicis, probabiliter tamen sunt vel glandulæ exilissimæ, vel pori tantum partium, e quibus lymphæ in vasa tenuissima & exilissima infunditur.
- 2 *Motus*
  - a *Glandulæ conglobatæ* hinc inde impr. vero in mesenterio conspicuæ, quæ beneficio fibrarum lympham conquassando ejus fluxilitatem conservant & simul motum per vasa promovent.
  - b *Arteriæ*, quæ ubique vasa lymphatica comitantur & pulsu continuo lymphæ cursum faciunt.
  - c *Motus* partium vasa lymphatica ambientium tonicis.
  - d *Valvulæ*, recursum lymphæ ad partes impediennes, motum vero versus interiora promoventes.
  - e Ipsa quoque *vasorum lymphaticorum conformatio*, dum summe angusta sensim sensimque ampliora redduntur, ad motum lymphæ aliquid confert.

V. *Causa efficiens*: Est natura corporis conservatrix, quæ ope partium ante recensitarum lympham sanguini mixtam in variis partibus separat, & in peculiaribus vasa receptam partim in receptaculum chyli, partim in vas collare majus, prope inferiorem ductus Thoracici in venam subclaviam eum quidem in finem infundit, ut partibus nutritiis aliquo modo privata iisdem denuo imprægnetur, & novas nutriendi vires acquirat.

#### VI. *Usus.*

- 1 Ut partibus suis gelatinoso-aqueis partes omnes nutriat, irriget, & in debita flexilitate conservet.
- 2 Ut humoribus aliis nutritiis, Lymphæ scil. nervorum, Lacti ac Semini fundamentum præbeat.

#### VII. *Observationes.*

- 1 Lymphæ generatur ex chylo laudabili; quo plus enim cibi expepti largiuntur chyli, eo major lymphæ producit copia & eo melius etiam nutritio succedit.
- 2 Motus corporis multum confert ad fluxilitatem & motum lymphæ, unde in sedentariis facile ejus stagnationes sequuntur.
- 3 Vasa Lymphatica in omnibus partibus reperiri probabile est, quoniam sanguis arteriosus, copiosa lymphæ permixtus, nutritionis gratia ad omnes partes fertur.

### 2. De Secretione Lymphæ nervorum.

I. *Definitio*: **L**ymphæ sive fluidum nerveum est lymphæ subtilissima pars in corticali cere-

bri substantia secreta & vel in tubulos medullaris substantiæ, vel in interstitia eorum infusa, nervorum irrigationi, flexilitati & nutritioni inserviens.

#### II. *Differentia*, Succus nervorum a reliqua lymphæ differt.

- 1 Ratione *loci* continentis, quatenus stricte sic dicta lymphæ in ejusdem nominis vasis, hæc vero vel in nervorum tubulis subtilissimis, vel interstitiis eorum continetur.
- 2 Ratione *consistentiæ*, fluidum enim nervorum magis subtile est quam reliqua lymphæ.
- 3 In seipso etiam differt ratione *loci secretionis*, dum pars fluidi nervorum in cerebro, pars vero in medulla oblongata secernitur.

III. *Materia*. Est lymphæ ex partibus aquoso-salinis constans, quæ per arteriarum carotidum ramificationes quaquaversum per totum cerebrum & quidem ad ejus substantiam corticalem lata, ibidem a reliquis humoribus secernitur.

#### IV. *Organum.*

##### 1 *Secretionis*

- a Est *cerebrum* & potissimum ejus substantia corticalis, sive cineritia, medullarem ambiens.
- b *Medulla spinalis*, in qua inverso ordine cineritia substantia a reliqua circumdata, fluidum hocce separat.

##### 2 *Distributionis*

- a *Nervi*, liquorem secretum excipientes.
- b *Meninges cerebri*.

V. *Causa efficiens*: Est Anima sive Natura omnium actionum præses, quæ non solum secretionem lymphæ nervorum in cineritia cerebri & medullæ spinalis substantia peragit, sed etiam per nervos eandem, concurrente meningum motu constrictorio, in nervos impulsam in universum corpus & impr. in partes sensui & motui inservientes, distribuit.

#### VI. *Usus.*

- 1 Ut per continuum huncce lymphæ influxum nervorum flexilitas & turgescencia conservetur.
- 2 Ut ejus ope nervi nutriantur.
- 3 Ut Organa sensuum & motus in debito vigore permaneant.

#### VII. *Observationes.*

- 1 Lymphæ nervorum existentiam probant experimenta a Bidloo instituta, vid. *Exerc. Anat. Chir.* I. p. 3.
- 2 Motum meningum & influxum fluidi in nervos esse præcipuam motus tonici sive constrictionis & relaxationis partium causam, probant experimenta Bagliviana, quando scil. nimiam nervorum stricturam sequuntur Convulsiones, relaxationem vero Paralytes.

### 3. De Secretione Lactis.

I. *Definitio*: **L**ac est liquor albus, pinguis, spissioris consistentiæ, ex partibus seroso-salinis pinguibus ac caseosis constans, in mammis muliebribus ex sanguine secretus & fœtus nutritioni dicatus.

#### II. *Differentia.*

- 1 Ratione *consistentiæ*, aliud est fluidum magis & serosum, uti Colostrum, aliud magis spissum.
- 2 Ratione *coloris*, aliud est pallidum, aut ad cœruleum colorem tendens, aliud magis album pro temperamentorum diversitate.
- 3 Ratione *saporis*, aliud magis, aliud minus est dulce.

III. *Materia* ex qua est lymphæ multis particulis chylosis imprægnata, id quod partim ex sapore, partim ex colore, partim ex alimentis multum chyli & lactis quoque luppeditantibus, probatur. Resolutio vero docet præterea ei inesse,

- 1 *Serum* sive partes aquosas reliquarum vehiculum.
- 2 *Pinguedinem*, quam cremor lactis & butyrum ex lacte productum probant.
- 3 *Mucilaginem* & partem terrestrem post separationem a sero in caseum abeuntem.
- 4 *Sal* in sero contentum post evaporationem remanens.

#### IV. *Organum.*

- 1 *Secretionis*, sunt glandulæ mammarum conglomeratæ, in quibus sanguinis partes chyloso-lymphaticæ a reliquo sanguine per modum transcolationis separantur.



- 2 *Affervationis*, sunt ductus lactiferi mammarum glandulis adhærentes, lac secretum excipientes, & versus papillam ampliores redditu affervantes, unde etiam lac in iisdem contentum majorem, dimittendo partes aquosas, acquirit spissitudinem.
- 3 *Excretionis*, sunt papillæ sive ductus lactiferi angustiores redditu & ipsas papillas constituentes, e quibus lac secretum & aliquandiu affervatum suctione elicitur.
- V. *Causa efficiens*: Est Principium vitale sive Natura, quæ post partum sanguinem partibus nutritiis imbutum, antea ad uterum fetus nutriendi gratia fluentem, partes inferiores inpr. vero uterum constringendo, versus superiora & præcipue ad mammas dirigit, ut in illis materia gelatinoso-chylosa secreta fetus nutritioni inserviat. Quare etiam si non immediate post partum, paucis tamen elapsis diebus mammæ, ut plurimum non sine insigni molestia intumescunt, ac motus sanguinis ad mammas manifeste sentitur.

VI. *Usus*.

- 1 Ut primum lac, Colostrum dictum, meconium, sive materiam mucosam in intestinis fetus post partum hærentem, partibus suis seroso-salinis evacuet, & intestina abstergat.
- 2 Ut infantis nati nutritioni tamdiu, donec alios cibos ferre queat, inserviat.

VII. *Observationes*.

- 1 Lactis generatio non raro etiam ante partum observatur.
- 2 Lactis effluxus spontaneus mammis gravidarum sæpius vel fetus debilitatem, vel abortum futurum indicat.
- 3 Lac sæpius vagientibus infantibus aut circa ordinarium lactandi tempus effluit.
- 4 Nihil magis lactis generationem impedit, aut generati dissipationem promovet, quam terror.
- 5 Fœminæ fere ordinariæ motum lactis ab axillis ad mammas sentiunt.
- 6 Quo rarius infantes mammis apponuntur, eo citius lac disparere solet.
- 7 Lac antea copiosum subito disparsens, non raro mortem infantis instantem indicat.

## 4. De Secretione Seminis.

I. *Definitio*: Semen est liquor laudabilis ex optimis sive gelatinoso-chylosis partibus in testibus secretus, ad proles generationem necessarius.

II. *Differentia*.

- 1 Respectu *quantitatis*, in aliis in majori, in aliis vero minori copia generatur.
- 2 Respectu *consistentiæ*, in aliis magis, in aliis minus fluidum est.
- 3 Quo ipso intuitu etiam a liquore *prostatarum* limbo, vehiculum vero semini præbente, differt.

III. *Materia*: Est portio lymphatico-chylosa sanguinis subtilior, quod exinde apparet, quia cibi, multum chyli laudabilis continentis, seminis generationem, si modo partes sunt legitime constitutæ, admodum promovent, & e contrario deficientibus alimentis sufficientibus seminis productio impeditur, juxta trium illud: *sine Cerere & Libero friget Venus*.

IV. *Organum*.

- 1 *Secretionis*, sunt testes scroto inclusi, & quidem specialiter eorum substantia glanduloso-vasculosa, sive congeries vasculorum tenuissimorum miro ordine complicatorum, ex arteriis spermaticis procedunt, in quibus scil. vasculis, ex lymphæ per arterias spermaticas infusa semen elaboratum & per miram illorum vasculorum longitudinem latum, majus acquirit robur.
- 2 *Affervationis*, sunt vesiculæ seminales in quas semen per Epididymes, vasa deferentia emittentes, infunditur, & in iisdem usque ad emissionis tempus affervatur: in hisce propter moram dum partes subtiliores aquosæ avolant, majorem acquirit spissitudinem.
- 3 *Emissionis* sive Ejaculationis est membrum virile legitime constitutum & ad sufficientem erectionem aptum, speciatim vero urethra, quæ in coitu spasmodice in parte ejus posteriore contracta, semen orga-

sticum ex vesiculis seminalibus in eandem expressum, una cum liquore prostatarum, insigni & convulsivo impetu expellit.

V. *Causa efficiens*. Secretionis, affervationis & emissionis vera causa est Natura, quæ beneficio glandularum testium semen e sanguinis portione summe laudabili separat, & ad legitimum tempus in vesiculis seminalibus, ad hoc negotium summe aptis, affervat, ac tandem in coitu, roboratis partibus ad emissionem necessariis, iisque magna vi constrictis, semen turgescentis & hoc ipso ad generationem magis dispositum, per urethram in sinum muliebrem effundit.

VI. *Usus*: Ut emissionem seminis in Arvum Naturæ genus humanum propagetur.

VII. *Observationes*.

- 1 Quo magis pendulum & flaccidum est scrotum, eo minor etiam seminis generatur quantitas.
- 2 Quo magis acre & calidum est semen, eo magis etiam ad Venerem stimulat, & contra.
- 3 Quo magis proni sunt homines ad Venerem, eo major etiam seminis, ceteris paribus, est proventus.
- 4 Testes insigne corpori robur conciliare exinde apparet, quod animalia castrata tanto vigore non polleant, ac non castrata.
- 5 Præstantia viri in veneris negotio, non ex membri virilis, sed ex testiculorum magnitudine æstimanda est.

## 5. De Secretione Salivæ.

I. *Definitio*: Humor salivaris est liquor laudabilis, in variis glandulis tam in ore, quam circa illud sitis secretus, ciborum digestionem & resolutionem dicatus.

II. *Differentia*.

- 1 Alia est satis fluida, inpr. quæ ex glandulis sublingualibus, maxillaribus & parotidibus fluit.
- 2 Alia minori fluxilitate gaudet, uti saliva glandularum buccarum.
- 3 Alia denique spissior est, qualis est saliva tonsillarum.
- 4 Saliva differt a sputo; hoc enim spissius & ab aere alteratum, adeoque parvi usus est, cum e contra saliva fluxilitate insigni gaudeat, & in solvendis cibis magnum habeat usum.

III. *Materia sunt*

- 1 Partes *aquosæ* in insigni quantitate reliquis vehiculum præbentes.
- 2 *Lymphaticæ*, quas evaporatio, gelatinosum quid relinquens, demonstrat.
- 3 *Salinæ* acres reliquis immersæ, quarum tamen adeo exigua est quantitas, ut uncia salivæ vix tria grana salis in se contineat, quod idem evaporatio probat.

IV. *Organum* Sunt glandulæ variæ, sitæ

1 In Oris cavitate, quales sunt:

- a Glandulæ Buccarum.
- b ----- Sublinguales.
- c ----- Palatinæ.
- d ----- Tonsillæ.

e Uvula, quæ omnes immediate salivam partim per breves ductus, partim per poros in oris cavitate emittunt.

2 Extra Oris cavitatem

- a Maxillares internæ
- b Parotides, quæ mediate per ductus proprios, illæ scil. per ductum Warthonianum, versus mentum progredientem & ad gingivas in papillam terminantem, hæ vero per ductum Stenonianum prope dentes molares secundos salivam in oris cavitate infundunt.
- c Glandulæ Oculi & Aurium, quarum lymphæ quoque ad oris cavitatem fluit, postquam suam functam est officio in oculis & auribus.

V. *Causa efficiens* est Natura, quæ per varios ductus salivam in glandulis secretam, oris cavitati ad certos fines infundit.

VI. *Usus*.

- 1 Ut inserviat ciborum resolutioni in ore.
- 2 Ut promoveat deglutionem.
- 3 Ut interiora Oris humectet.



- 4 Ut linguę volabilitatem conservet & loquelę inter-  
viat.
- 5 Ut papillas linguę nerveas humectando gustum  
promoveat.

#### VII. *Observationes.*

- 1 Saliva tempore masticationis & deglutitionis ma-  
jori copia ad oris cavitatem fluit.
- 2 Idem major fluxus etiam sub aspectu ferculorum  
gratorum, aut audito interdum saltem eorum no-  
mine observatur.
- 3 Saliva laudabilis sæpius ob malam consuetudinem  
non sine detrimento corporis exspuitur.
- 4 In infantibus dentientibus saliva in insigni copia af-  
fluens gingivas emollit, & dentitionem promovet.
- 5 Saliva ab aere corrupta aut viscida reddita, me-  
lius exspuitur, quam deglutitur.
- 6 Quo magis glutinosa seu viscida est saliva, eo mi-  
nus ad ciborum resolutionem aliosque usus est apta.

#### 6. De Secretione Succı Pancreatici.

I. *Definitio:* **S**uccus Pancreaticus est liquor limpidus,  
salivæ efficacię, in Pancreate e san-  
guine arterioso secretus & in intestinum duodenum  
vel jejunum infusus, ciborum ulteriori resolutioni  
& digestionı intervens.

#### II. *Differentia.*

- 1 Ratione *quantitatis*, cujus respectu major in subje-  
ctis humidioribus quam siccioribus generatur copia.
- 2 Ratione *fluxus*, quamvis enim cum continuo ad inte-  
stina fluere probabile sit, videtur tamen tempore  
digestionis majori quantitate effundi in intestina.

III. *Materia:* Eadem esse videtur ac Salivę, aquea scil.  
gelatinosa & salina acris.

#### IV. *Organum.*

- 1 Secretionis est Pancreas ejusque glandule varię.
- 2 Excretionis sunt ductus minores in majorem termi-  
nantes, e quo in intestinum infunditur.

V. *Causa efficiens* est Natura, quę conservationi corpo-  
ris intenta, ope succi pancreatici, e Pancreate me-  
diantibus fibris expressi, ciborum ulteriorem resolu-  
tionem peragit, ut chylus eo commodius vasa ingredi  
queat, extra vero illud tempus per infusum liquorem  
fibras emollit ac motum peristalticum promovet.

#### VI. *Usus.*

- 1 Ut cibos, in ventriculo jam resolutos, ulterius di-  
luat & digestionem augeat.
- 2 Ut bilis cysticę, tempore digestionis ad intestina  
fluentis acrimoniam temperet.
- 3 Ut intestina extra tempus digestionis emolliat &  
lubrica reddat, ac hoc ipso fecum alvinarum ex-  
cretionem adjuvet.

#### VII. *Observationes.*

- 1 Succum pancreaticum non esse acidum, nec cum bile  
alcalina effervesce, Recentiores contra Sylvianos  
variis rationibus & experimentis demonstrarunt.
- 2 Probabile videtur succum pancreaticum fermenta-  
tionem alimentorum in ore & ventriculo inceptam  
promovere.

#### De Nutritione.

I. *Definitio:* **N**utritio est actio vitalis, qua median-  
te nutrimentum, in diversis corporis  
partibus sufficienter elaboratum ac per arterias pulsu  
cordis ad partes latum, iisdem, in locum ejus,  
quod per varias secretiones deperditum erat, appo-  
nitur ac hoc modo corpus conservatur.

#### II. *Differentia.*

- 1 Alia est proprie sic dicta *Nutritio*, quando ea tantum  
nutrimenti quantitas partibus apponitur, quanta ad  
conservationem corporis ejusque partium requiritur.
- 2 Alia vero vocatur *Auctio*, quando insignis materię  
nutritivę copia partibus infunditur, ut non solum  
quoad longitudinem ad certum usque tempus, sed  
etiam quoad crassitiem corpus augeatur.

#### III. *Materia.*

- 1 Proxima est lympħa laudabilis e chylo beneficio  
motuum & digestionum producta.

2 Mediatæ est chylus bonę notę in variis partibus  
elaboratus.

3 Remota sunt alimenta ab appetitu indicata & in ore,  
ventriculo & intestinis ita præparata, ut chylus exin-  
de extrahi possit. De quibus omnibus mox agetur.

#### IV. *Organum.*

- 1 Cor, cujus motu sanguis ad partes propellitur.
- 2 Pulmones, sanguinis fluxilitatem & faciliorem nu-  
trimenti e sanguine secessum promoventes.
- 3 Arterię, per quas in universum corpus materia nu-  
tritiva vehitur.
- 4 Pori arteriarum capillarium, aut earum juxta alios  
oscula aperta, e quibus nutrimentum in partium  
poros impellitur.
- 5 Fibrę partium debito tono gaudentes, ut nutrimen-  
tum servare queant, quod novus a tergo sequens  
succus nutritivus altius in partium poros protrudit.

V. *Causa efficiens* est Natura, quę materiam nutritiam,  
ope ante dictorum organorum ad partem latam,  
proportionata quantitate in omnes partes distribuit,  
& unicuique convenientem materiam assimilât, ita  
ut non solum omnium partium debita structura,  
sed etiam mutua proportio conservetur.

#### VI. *Usus.*

- 1 Ut in locum per excretiones varias deperditarum  
partium novum nutrimentum apponatur, & corpus  
hoc modo in vigore conservetur.
- 2 Ut corporis auctio ad debitam usque longitudinem  
promoveatur.

#### VII. *Observationes.*

- 1 Quod humidiora sunt corpora & quo magis porosa,  
eo facilius etiam succedit nutritio, & contra.
- 2 Meditationes & speculationes continuę, uti alias a-  
ctiones vitales, ita quoque nutritionem impediunt.
- 3 Præmaturum corporis augmentum non raro brevem  
vitę universalem ambitum portendit.
- 4 Superfluum corporis nutrimentum hinc inde in va-  
rias partes deponitur & constituit pinguedinem.

#### De Appetitu.

I. *Definitio:* **A**ppetitus est stimulus naturalis, quo  
impellimur ad victum quærendum,  
ut id, quod deperditum erat per varias excretiones,  
iterum restituatur: sive est voluntas edendi & bibendi.

#### II. *Differentia.*

- 1 Alius est appetitus *solidorum* sive ciborum, & voca-  
tur *Fames*.
- 2 Alius vero est *liquidorum* sive potus quem *Sitim* ap-  
pellant.

III. *Sedes* sive locus, est ventriculus & impr. juxta plero-  
rumque sententiam ejus orificium sinistrum, ubi ta-  
lis sensus appetitus quam maxime deprehenditur.

IV. *Causa efficiens*, est Natura sive Anima, quod pro-  
batur:

- 1 Quia homo sibi ipsi conscius est se sentire appetitum  
& habere voluntatem edendi & bibendi, quam ob  
causam quoque anxie cibum & potum quærît.
- 2 Quia præsentē appetitu ciborum selectum, qui judi-  
cium & animę rationalis concursum præsupponit,  
instituit, sive alios præ aliis magis eligit.
- 3 Quia ventriculo cibus repleto & appetitu sedato, au-  
dito saltem grati ferculi nomine, appetitus statim  
denuo excitatur.

4 Quia animo aliis rebus intento appetitus non ex-  
citatur.

5 Quia animi affectus graviores & mentis perturba-  
tiones appetitum etiam præsentem momento citius  
tollunt. Plura vide in *Physiol. nostra Cap. IV. Membr.*  
*IV. Artic. II. Punct. I.*

V. *Usus:* Ut homines sensu hocce instigentur ad quæ-  
renda alimenta, quo per ea corpus conservetur.

#### VI. *Observationes:*

- 1 Appetitus in junioribus ordinarię est major quam  
in adultis.
- 2 Qui laboribus durioribus corpus exercent, appetitu  
majore gaudent.
- 3 Appetitus sæpius sequitur solam consuetudinem.



- 4 Cibi cum appetitu sumpti melius digerunt & nutriunt quoque, quam alii.
- 5 Post morbos bene solutos appetitus admodum vigere solet: Natura enim hoc tempore refarcire intendit, quod durante morbo amisit.
- 6 Robur ventriculi non semper ex appetitu æstimandum est, sed potius ex digestionem & nutritionem.

## De Materia Nutritionis.

I. *Definitio*: **M**ateria nutritionis sunt alimenta varia, succum nutritium continentia, corporis conservationi dicata.

II. *Differentia*.

- 1 Alia sunt solida, quæ Cibi audiunt.
- 2 Alia sunt liquida, quibus Potus nomen datur, de quibus in Diæta sermo erit.
- 3 Alia desumuntur ex Regno Vegetabili, Alia ex Animalis, alia ex Minerali, quæ tamen paucissima sunt.

III. *Ufus*: Ut remote inserviant corporis nutritioni.

## De Preparatione Ciborum in Ore sive Masticatione.

I. *Definitio*: **M**asticatio est actio naturalis, qua mediante cibi solidi dentium ope inciduntur, conteruntur, comminuntur & in subtilem pollinem rediguntur, ut postmodum eo facilius in intestinis Chyli fieri possit extractio.

II. *Organum*.

- 1 *Maxilla* superior immobilis & inferior mobilis, quibus dentes diversi sunt infixi.
- 2 Dentes *Incisores*, *Canini* & *Molares* ex ossea & hanc ambiente saxeæ sive lapideæ durissima & albißima substantia constantes, qui incidendo, confringendo & comminuendo cibos, concurrunt ad masticationem.
- 3 *Lingua*, quæ cibos distribuit, & in uno oris latere masticatos excipit, ac alterius lateris dentibus ulterius comminuendos offert.

III. *Causa efficiens* est Natura, quæ motu voluntario maxillæ inferioris cibos per labia assumptos dentium ope infringit, incidit & comminuit, & quo hæc resolutio eo facilius contingat, salivam per ductus varios inter masticandum majori copia in oris cavitatem infundit.

IV. *Ufus*: Ut cibi duriores aut crassioris consistentiæ per dentes comminuti & mediante saliva admodum resoluti, ad chylicationem apti reddantur.

## De Deglutitione.

I. *Definitio*: **D**eglutitio est actio naturalis, qua mediante cibi in ore masticati a lingua excepti, & in Oesophagum dilatatum lati, mediante motu Oesophagi in ventriculum protruduntur.

II. *Organum*.

- 1 *Lingua*, quæ actum deglutitionis incipit, & cibos exceptos, dum ope muscutorum retrahitur, ad oesophagum deponit.
- 2 *Oesophagus*, qui per musculos dilatatus cibos excipit, ac postea contractus ope fibrarum muscularium eos sensim in ventriculum protrudit.

III. *Causa efficiens*. Est Natura, quæ motu linguæ voluntario cibos in ore præparatos ad oesophagum & huius motu ad ventriculum promovet, ut ibidem ulterius digerantur.

## De Preparatione alimentorum in ventriculo &amp; intestinis sive de Chylicatione.

I. *Definitio*: **C**hylicatio est actio vitalis, cujus ope alimenta assumpta & in ore præparata in ventriculo & intestinis resolvuntur, ita ut purum ab impuro separetur & chylus in vasa recipiatur.

II. *Differentia*.

- 1 Chylicatio modo est celerior, modo est tardior respectu assumptorum.
- 2 Ratione temperamentorum cibi quoque citius vel tardius digeruntur.

III. *Organum*.

1 *Ventriculus*, viscus infimi ventris capacissimum ex variis membranis constans, ciborum receptioni & resolutioni dicatum, ac duobus orificiis superiori scil. cibos recipiente & inferiori eos emittente, instructum.

2 *Intestina*, iisdem cum ventriculo tunicis gaudentia, & inpr. tenuia Duodenum scil. Jejunum & Ileum, crassa enim, Cæcum, Colon & Rectum fecibus recipiendis inserviunt.

3 *Vasa lactea*, quæ maximam chyli partem per intestinorum poros transcolatam recipiunt, & hinc post pastum chylo etiam turgida, in animalibus recter enecatis, conspiciuntur, extra vero tempus illud lympham vehunt: ne vero ad intestina redeat chylus, valvulæ obstant.

4 *Vasa Mesaraica*, quæ probabiliter quoque chyli portionem quandam absorbent; a quod in pennatis, vasis lacteis carentibus, chylus e vasis mesaraicis resorbeatur ac flatus in intestina immixtus in vasa mesaraica penetret.

b quod vasorum mesaraicorum magna sit copia, & quidem longe major, quam quæ ad privatum intestinorum usum requiritur.

c quod sanguis venarum mesaraicarum post pastum chylo tinctus appareat. vid. *Physiol. Cap. IV. Membr. IV. Art. II. Punct. III. §. 19. 20.*

5 *Glandule Mesenterii*, ad quas chylus e vasis lacteis receptus tendit, & harum motu constrictorio non solum in fluxilitate debita conservatur, sed etiam per reliqua ex iisdem prodeuntia vasa, ad receptaculum ut chyli promovetur.

6 *Receptaculum chyli* sive cisterna lactea, inquam non solum chylus, sed omnis a partibus infra diaphragma sitis reflua lymphæ infunditur.

7 *Vena Thoracica* a receptaculo ad venam subclaviam ascendens, per quem chylus motu arteriarum ac diaphragmatis & a lymphæ, novoque a tergo premente chylo, continuo versus superiora urgetur, descensum vero ejusdem impediunt valvulæ.

IV. *Causa efficiens* est Natura, quæ beneficio organorum modo dictorum ac ope deglutitiæ salivæ, lymphæ gastricæ ac in intestinis affluentis succi pancreatici & bilis fermentationem resolutoriam in ore inceptam continuat, ac hoc modo efficit ut e Massa digestorum alimentorum e ventriculo expulsa, & ope motus peristaltici per intestina protrusa chylus in vasa relictis sordibus, transcolari queat.

V. *Ufus*.

1 Ut alimenta ad vitam necessaria debito modo præparentur & resolvantur.

2 Ut sordes inutiles removeantur, &

3 Ut pars laudabilis a vasis recipiatur.

4 Ut succus nutritius in sanguine per chylum restituatur, ac hoc modo nutritio peragatur.

VI. *Observationes*.

1 Omnes cibi bene masticati facilius digeruntur, quam non sufficienter masticati.

2 Quo magis viscosi sunt cibi, eo difficilius digeruntur.

3 Meditatio post sumptos cibos turbat digestionem.

4 Cibi nimio potu diluti, laudabilem chylum non præbent.

5 Somnus post prandium in junioribus Phlegmaticis & Senibus promovet digestionem.

## De Vita &amp; Sanitate.

I. *Definitio*.

1 *Vita*: Vita est corporis ad putredinem respectu mixtionis admodum proni per motum generaliter, specialiter vero per remotionem inutilium, utilium vero appositionem, conservatio.

2 *Sanitatis*. Sanitas est omnium actionum integritas a legitima partium organicarum, & fluidarum constitutione & a principio vitali, omnes actiones decenti ordine, tenore & tempore instituyente, originem trahens.

II. *Differentia*.

1 *Vita*, hæc considerari potest

a qua-



*a* quatenus a nullis molestis causis turbatur.

*b* Quatenus non nisi cum insignis molestiis protrahitur, adeoque est vel sana vel morbida.

*c* Quatenus brevi tempore finitur, in aliis vero ad 80. vel centum annos extenditur.

## 2. Sanitatis.

*a* Alia est *perfecta*, quando nulla actionum tam vitalium quam animalium læditur, quæ tamen admodum est rara.

*b* Alia est *imperfecta*, quando salvis actionibus vitalibus, in animalibus observatur defectus.

## III. Causa efficiens.

1 *Principalis*, est Principium vitale sive *Natura* motus omnes ad corporis integritatem conservandam dirigens.

2 *Instrumentalis*, sunt motus cordis, respiratio & motus tonicus circulum sanguinis producentes, ac partes quædam solidæ sive viscera, humores tam utiles quam inutiles e reliqua humorum massa removen-tes & hinc corpus conservantes, de quibus in superioribus jam dictum est.

## IV. Signa.

1 Conformatio omnium partium legitima ætati & sexui respondens.

2 *Habitus* corporis neque strictus neque laxus nimis, ut sanguis in debita proportionem per partes exteriores ferri possit.

3 Pulsus cordis vegetus & æqualis, Temperamento & ætati respondens.

4 Respiratio neque nimis velox, nec nimis tarda, sed æqualis & libera, nisi causæ externæ hanc æqualitatem forsan turbaverint.

5 Æqualis partium omnium & singulorum nutritio, ita ut consueta inter illas proportio servetur.

6 Appetitus constans solitorum ciborum, nullaque eorum usum frequens molestia, sed potius refocillatio.

7 Sitis ciborum assumptorum proportioni respondens, intermedio vero tempore non nisi a causis manifestis excitata.

8 Fecum alvinarum sufficienti copia ac certo & consueto tempore contingens excretio.

9 Earundem color flavus, consistentia crassa, fœtor tolerabilis.

10 Urina quantitate non excedens, sed potulentorum assumptorum quantitati præter propter respondens.

11 Color ejusdem ut plur. citrinus vel aurantii coloris, pro temperamentorum & ætatum respectu, nullo sensibili fœtore, sed potius fracedine quadam imbuta, clara, diaphana, nulla præter nubeculam rariorem contenta exhibens, ac præterea certis temporibus sine ulla molestia emissa.

12 Sudor neque quantitate excedens aut deficiens, neque graveolens aut acris, sed matutinus, lenis tamen post peractas digestionem, interdum vero non nisi præsentibus causis externis fluens.

13 Saliva iusta quantitate ac consistentia gaudens & hinc ad lubricandas partes oris internas & resolutionem ciborum apta.

14 Muci neque e naribus neque e faucibus sensibilis excretio, nisi in subjectis admodum phlegmaticis & junioribus.

15 Vox clara, libera e faucibus satis madidis progrediens, ac linguæ volubilitas, & iusta conformatio loquelæ facilitati inserviens.

16 Somnus placidus, nullis gravibus insomniis turbatus, corpus laboribus fatigatum refocillans.

17 Vigor corporis & alacritas ad actiones peragendas, & absentia subitanæ post labores aut motum fatigationis.

18 Sensuum internorum usus liber, memoriæ majus vel minus robur, iudicium constans pro subjectorum diversitate.

19 Acies sensuum externorum temperamentorum differentia respondens.

20 Animus tranquillus & ad animi affectus graviores minus propensus.

21 Ad generandum habilitas, in sexu scil. masculino  
*a* iusta partium genitalium conformatio,  
*b* feminis legitima elaboratio, asservatio &

*c* debito tempore emissio.

## 22 In feminino vero sexu

*a* præter legitimam partium genitalium structuram  
*b* iusto tempore Mensium eruptio, eorundemque singulis mensibus continuatio.

*c* Conceptio sine gravibus incommodis.

*d* fœtus ad definitum terminum gestatio &

*e* ejus naturalis sine insigni difficultate exclusio.

*f* Secundinarum matura excretio,

*g* Lochiorum fluxus legitime succedens &

*b* Mammarum iusta ad lactis generationem & lactandum dispositio.

## V. Observationes.

1 Hominis consideratio Physica, in Physica quidem sua non caret utilitate, in Praxi vero exiguum vel nullam habet.

2 Qui corpus tantum considerant, insigniter quidem Physicam & Anatomiam augent, Medicinam vero parum promovent.

3 Vitæ vero & Sanitatis vera consideratio maxime necessaria est Medico, qua si destituitur, non potest non graviter in Pathologia & Praxi hallucinari.

## De Differentia Corporis & actionum secundum Ætates, Sexum & Temperamenta.

### I. De Ætate.

I. *Definitio*: **Æ**tas est certa vitæ periodus, septenarium annorum numerum observans, in qua ut plurimum notabiles corporum & actionum sunt alterationes.

### II. Divisio in

1 *Incrementum*, quod sub se complectitur in tribus septenariis Infantiam, Pueritiam & Adolescentiam.

2 *Consistentiam*, Juventutem, Ætatem virilem & Consistentem sub se comprehendentem & ad annum circiter quadragesimum nonum se extendentem.

3 *Senectutem*, Viridem scil. Mediam & Decrepitam.

### III. Diversitas corporis & actionum in

1 *Infantia*: Corpus tenellum, humidum, fibrarum flexilitas & sensibilitas, habitus corporis laxus, mollis & ob hanc causam impotentia ad ambulandum, defectus dentium, qui tamen primo & sequentibus annis producuntur, ac corpus sensim sensimque firmatur & ad ambulandum disponitur; loquela etiam antea nulla, tandem magis magisque melius procedit. Pulsus celerior, secretiones & excretionem optime procedentes; ob leves tamen causas externas, inpr. quod diaphoresin concernit, alterabiles; alvi ut plurimum laxitas, appetitus major, somnus profundus, sensuum externorum ab initio aliqualis habetudo; qui tamen successu temporis magis firmantur. Mentis operationes in prima infantia admodum obscuræ, memoria tamen succedentibus annis satis firma, iudicium vero debile: durat hæc vitæ periodus ad annum usque septimum.

2 *Pueritia*: Corporis majus augmentum & robur, dentium incisorum casus novorumque productio, major firmitas habitus corporis, pulsus fortior, secretionum & excretionum laudabilis status, appetitus corporis incremento respondens & hinc major alacritas corporis & actionum, amor motus, sensuum vigor, memoriæ robur majus cum iudicii incremento: absolvitur hæc ætas secundo septenario.

3 *Adolescentia*: In hac ætate magis notabiles occurrunt corporis & actionum alterationes, corpus magis est firmum & majori robore pollet, habitus corporis strictior, pulsus vegetus, calor sanguinis & corporis major, secretionum laudabilis successus, vocis acutè in graviolem mutatio, primordia barbe, pilorum in pube eruptio, testium augmentum, membri antea flaccidi erectio, generatio seminis, pronitas ad venereum. In sexu feminino præter pilos in pube erumpentes, Menses singulis mensibus fluunt, ac mammae sensibilibus crescunt. In utroque sexu sensus interni magis sunt firmi, ita ut adolescentes relictis puerilibus ad seria se convertant. Finito hocce paroxysmo absolvitur ut plur.



ut plur. corporis auctio quoad longitudinem, in quibusdam tamen ad vigesimum quartum extenditur.

4 *Juventus*: Incipit hæc anno vigesimo primo aut juxta alio vigesimo quarto, corpus in hac ætate jam sufficienter quoad longitudinem auctum, jam magis firmum & robustum redditur, ac quoad crassitiem quoque augetur, habitus corporis est strictior, calor major, pulsus vegetus & fortis, secretiones & excretiones laudabiliter procedunt, judicium est acre, memoria vero satis firma; jam quoque non amplius sibi ipsi vivit, sed sociam nactus, prolem generat, ac aliis in rebus civilibus inservit: durat hæc ætas consentientibus, plerisque ad annum trigessimum quintum, quo tempore incipit

5 *Ætas virilis*: In hac fere semper idem corporis robur & actionum vigor observatur, pulsus est laudabilis & secretiones optime procedunt, Judicium magis viget quam memoria: absolvitur hæc anno quadragesimo secundo, quam immediate excipit

6 *Ætas conficiens*: Hic quidem in multis corporis & actionum laudabilis est vigor, in multis tamen etiam notabile jam virium corporis observatur decrementum & inpr. in iis, qui molliter educati, corpus laboribus non exercuerunt; potentia generandi sensim sensimque imminuitur, membri flacciditas sequitur, & scrotum fit pendulum. In feminis vero Mensium fluxus cum generationis negotio cessat: Absoluta hac ætate succedit

7 *Senectus viridis*, quæ incipit anno quinquagesimo. In hac ætate illud notabile est, quod augmentum structuræ corporis cesser, quod exinde elucescit, quod vulnera & læsiones partium in senibus longe tardius curentur, quam in junioribus, vigor præterea corporis perit, partes molles marcescunt & corugantur, sensum & inpr. oculorum habetudo ac memoriæ & judicii imminutio sequitur, calor corporis imminuitur & copiosius mucus generatur: appetitus minor, somnus levis, dentes excidunt vel atteruntur, plerique cani calvi & fiunt.

8 *Senectus media*: Hujus initium est anno quinquagesimo septimo, quo ipso tempore vires magis magisque fatiscunt, ac actionum vigor decrevit: terminus hujus ætatis est annus sexagesimus tertius, quem *Chimaericum magnum* vocant.

9 *Senectus decrepita*: Hæc reliquam vitam completur, ac majus in ea virium decrementum deprehenditur, & uti in juniori ætate impotentia ad ambulandum, ita in hacce quoque observatur, cum memoriæ & judicii imminutione, ita quidem, ut non pauci perduto judicio pueris similes evadant; decrevunt itaque vires & corpus marcescit, donec anima relicto corpore ad cœlestia migret.

#### IV. *Usus* hujus doctrinæ.

- 1 Complectitur totam historiam hominis, adeoque Medico summe est necessaria.
- 2 Fundamentum præbet morbis ætatum & hinc in Pathologia maximæ est utilitatis.

#### 2. *De Sexu*.

I. *Definitio*: **S**exus est distinctio generis humani corporis & actionum, inpr. vero partium genitalium respectu.

#### II. *Differentia*, est.

- 1 *Masculinus*, in quo observantur habitus corporis strictus & durus, partes carnosæ & musculosæ robustæ, robur corporis insigne, pulsus cordis vegetus, & fortis, calor partium validus, secretionum & excretionum laudabilis status, vox gravis, tempore pubertatis barba, membrum virile cum testibus scroto inclusis reliquaue generationis organa, semen tertii septenarii initio pro producenda prole elaborare incipientia. Animus firmus, constans & judicium acre.
- 2 *Femininus*, in quo deprehenditur habitus corporis laxior & mollis, cordis pulsus minus vegetus, vasa minora, major humorum in partibus porosis copia, ac non obstante fibrarum laxitate insignis sensibilitas, mammarum tempore pubertatis productio,

fluxus Mensium (de quo mox specialius) singulis mensibus recurrens, organa genitalia conceptioni, fœtus gestationi & nutritioni accommodata, lactis post partum in mammis generatio, reliquarum secretionum laudabilis quidem status, facilior tamen quam in viris perturbatio. Animus inconstans, meticulosus, arrogans, ad venerem, otium, iram pronus, facilis excessus in animi pathematibus.

#### *De fluxu Mensium.*

I. *Definitio*. **F**luxus Mensium est sanguinis in sexu fœminino singulis mensibus per mulierum genitalia a Natura instituta excretio, elapso secundo septenario incipiens & circa finem septimi cessans.

#### II. *Differentia*.

- 1 Respectu *quantitatis*, in aliis est largior, in aliis parior pro subjectorum conditione.
- 2 Respectu *coloris*, sanguis excretus alius est floridus magis, alius coloris obscurioris.
- 3 Respectu *ordinis*, alius Lunæ phase exacte sequitur, alius vero intermedia observat tempora.
- 4 Respectu *motum* ad excretionem tendentium, qui in aliis magis, in aliis minus sunt sensibiles.

#### III. *Signa*.

- 1 Effluxus sanguinis singulis mensibus e genitalibus mulierum magis vel minus sincerus.
- 2 Quem præcedunt vel comitantur majores vel minores tensiones in abdomine & circa uterum, habitus corporis magis constrictus, vasa sanguine minus repleta, facies pallida & circulus lividus oculos interdum ambiens: in quibusdam observatur mammarum dura inflatio, itaut earum attactum non nisi cum insignibus doloribus ferre queant.
- 3 Appetitus in quibusdam prostratus, torpor corporis, animus fastidiosus.
- 4 Somnus interdum variis insomniis anxiiis interruptus.
- 5 In quibusdam angustia præcordiorum & respiratio difficilis.

#### IV. *Subjectum*.

- 1 Feminæ, quæ pubertatis annos attigerunt, nec fœtum in utero gerunt, & infantem lactant.
- 2 Juxta quosdam etiam Simiæ majores.

V. *Materia* est sanguis sincerus, reliquo sanguini respectu qualitati par.

#### VI. *Locus excretionis*.

- 1 *Vagina Uteri*, quod probarunt sectiones cadaverum a Bohnio, vid. *Ei* *sd. Circul. pag. 244.* & *Bergero Physiol. pag. 252.* institutæ.
- 2 Specialiter vero *Vena vaginæ*, ab hæmorrhoidalibus probabiliter ortæ, vid. *Physiol. nostr. Cap. IV. Membr. IV. Artic. 1. Punct. XIII.*

#### VII. *Terminus*.

- 1 *a quo*: est ut plur. annus decimus quartus, quamvis interdum etiam maturius, interdum vero serius Menfes erumpant.
- 2 *ad quem*: est finis septimi septenarii, ubi ordinarie Mensium fluxus &abilitas ad conceptionem cessant.

VIII. *Causa efficiens* est Natura, quæ singulis mensibus motu quodam Critico sanguinem fœtus nutritioni alias destinatum extra graviditatis & lactationis tempus, per genitalia ad præcavendum Plethoram expellit.

IX. *Usus* hujus excretionis est ut abundantia sanguinis & mala inde pendentia præcaveantur, ac proportio inter humores & motus conservetur.

#### X. *Observationes*.

- 1 Quo maturius hic fluxus contigit, eo citius etiam cursum suum ordinarium absolvit, & contra.
- 2 In otiosis & lautæ diætæ assuetis citius erumpunt Menfes, tardius vero in iis, quæ corpus laboribus fortioribus exercent.
- 3 Quo magis Lunæ phases observat Mensium fluxus, eo magis etiam tranquille cursum suum absolvit, & contra.



- 4 Quamvis Menses ordinarie gestationis tempore cessent, nonnunquam tamen in subjectis Plethoricis cum euphoria fluunt.
- 5 Lunæ in Menses non est absolutum imperium, quia non paucæ intermedio tempore mensium fluxu laborant.
- 6 Mensium fluxum ex ramis Venæ-portæ hæmorrhoidalibus provenire testatur in prægnantibus & hystericeis Uteri hypochondriorum ac primarum viarum consensus. vid. *Physiol.* l. a.
- 7 Mensium fluxus septimo septenario ut plur. est largus & inordinatus.
- 8 Menses tempore lactationis erumpentes, interdum novam imprægnationem indicant.
- 9 Quæ Mensium fluxum prorsus non experiuntur, rarius concipiunt.
- 10 Sanguis per menstrua effluens non est venenosus, neque per se noxius, prout Paracelsistæ credidere.
- 11 Orgasticus tamen a lascivis feminis excretus & humoribus alius hominis communicatus, periculosissimas parere solet turbas.
- 12 Quæ de speculorum infectione & commaculatione, corruptione Melonum, musti, cerevisiæ recentis, vini rubri &c. a tangente femina menstrua, contingente enarrantur, multiplici experientia refelluntur; accidentaliter tamen simile quid aliquando accidere, negari prorsus non potest.

#### De Temperamentis.

I. *Definitio*: **T**emperamentum est legitima partium corporis solidarum & fluidarum inter se mutua proportio, qua utrarumque debitus motus, depuratio atque conservatio per secretiones & excretiones in fluidis & debita flexilitas in solidiscentibus conservatur.

#### II. *Differentia*.

- 1 *Sanguineum*, cuius notæ sunt
  - a Habitus corporis laxis, porosus, turgidus, floridus.
  - b Vasa exigua.
  - c Pulsus moderatus & æqualis.
  - d Sanguis floridus & fluxilis.
  - e Secretionum & excretionum laudabilis successus.
  - f Appetitus bonus, digestio ciborum optima ac nutritio bene procedens.
  - g Somnus profundus.
  - h Animus liber, alacris, hilaris, voluptatibus & otio deditus.
- 2 *Cholericum*, quod indicant
  - a Habitus corporis strictior, durior, calidior, poris minoribus præditus, floridus quidem, sed minus albus.
  - b Vasa capaciora & ampliora.
  - c Pulsus cordis fortis & vegetus.
  - d Sanguis floridus summe fluxilis & calidus.
  - e Secretiones & excretiones ob sanguinis fluxilitatem & vigorem motuum optime procedentes.
  - f Appetitus laudabilis & digestio facilis, corporis nutritio sufficiens quidem, raro vero superflua, ut hinc obesum reddatur.
  - g Somnus non adeo profundus ut in Sanguineis, sed brevior.
  - h Animus alacris, liber, promptus & ad labores pronus, impatiens, inconstans, ad iram pronus, vindictæ cupidus, immisericors, audax, temerarius, in periculis intrepidus &c.
- 3 *Phlegmaticum*, cuius signa sunt
  - a Habitus corporis spongiosus, laxis, mollis, turgidus, pallidus, valde porosus, frigidus.
  - b Vasa exilia sive angusta.
  - c Pulsus languidus & rarus, cui respondet etiam motus sanguinis tardior.
  - d Sanguis tenuis, aquosus ac hinc satis fluxilis.
  - e Secretiones & excretiones lento gradu procedentes.
  - f Appetitus vagus ut plur. aut in quibusdam satis quidem vegetus, tardior tamen ciborum digestio, ad obesitatem pronitas.

g Somnus admodum profundus & magna ad eundem propensio.

b Animus timidus, torpidus, ad otium pronus, incurius, inconstans &c.

#### 4 *Melancholicum*, quod demonstrant

a Habitus corporis ob fibras rigidas constrictus; densus, ficans, macilentus, pallidus vel ex livido subnigricans, frigidus, minus porosus.

b Vasa ampla.

c Pulsus tardus, fortis tamen.

d Sanguis spissior, minus dilutus ac non adeo fluxilis, multum terræ, parum vero sulphuris continens.

e Secretiones & excretiones pulsus tarditati respondentes.

f Appetitus moderatus, digestio ciborum & nutritio corporis lenta.

g Somnus brevis & insomniis anxiiis sæpius interruptus.

h Animus suspiciosus, meticulosus, taciturnus, vigil, propositis tenax.

#### III. *Mixtio*, unde aliud est

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 Sanguineo-Cholericum. | 6 Phlegmatico-Sanguineum.  |
| 2 --- Melancholicum.    | 7 --- Melancholicum.       |
| 3 --- Phlegmaticum.     | 8 Melancholico-Sanguineum. |
| 4 Cholerico-Sanguineum  | 9 --- Cholericum.          |
| 5 --- Melancholicum.    | 10 --- Phlegmaticum.       |
- quorum signa ex prioribus peti possunt.

#### IV. *Mutatio*.

- 1 Sanguinei in Phlegmaticum, Cholericum aut Melancholicum.
  - 2 Cholericæ in Melancholicum aut Sanguineum.
  - 3 Phlegmatici in Sanguineum aut Melancholicum.
  - 4 Melancholici in Cholericum aut Sanguineum.
- quarum mutationum causæ sunt: ætas, motus corporis, morbi, nutritio excedens vel deficiens, consuetudo &c.

#### V. *Ufus* hujus doctrinæ.

Temperamentorum consideratio summæ utilitatis est in Medicina, exinde enim cognoscitur

- 1 Status partium solidarum earumque major vel minor flexilitas, porositas & ad motus peragendos promptitudo.
- 2 Pulsus cordis magis vel minus vegetus.
- 3 Status sanguinis, ejusque major, vel minor fluxilitas.
- 4 Successus secretionum & excretionum a quibus vita proxime dependet.
- 5 Animi major vel minor alacritas ad suscipiendas actiones, tam vitales, quam morales.

#### VI. *Observationes*.

- 1 Temperamentum sanguineum reliquis præferri meretur, quia ad excessus aut defectus non adeo pronum est.
- 2 Temperamenta pura non adeo frequentia sunt, frequentius vero observantur mixta.
- 3 Temperamenta non plane mutantur, sed nativum præadscititio semper prædominium obtinet.
- 4 Temperamentorum mutatio alia est in melius, quando v. g. Phlegmaticum in Sanguineum mutatur; alia vero in pejus, quando Sanguineum in Phlegmaticum convertitur: & sic se res habet in aliis.
- 5 Frequentius est, temperamenta mutari in pejus, quam melius, cui rei occasionem præbent morbi prægressi, ætatis mutationes & diætæ vitia.

#### De Sensibus.

I. *Definitio*: **S**ensus sunt perceptiones objectorum, beneficio organorum rite constitutorum.

#### II. *Divisio* in

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1 <i>Internos</i> . | 2 <i>Externos</i> . |
| a Sensum communem.  | a Visum.            |
| b Phantasiam.       | b Auditum.          |
| c Memoriam.         | c Olfactum.         |
| d Sensum vitalem.   | d Gustum.           |
|                     | e Tactum.           |

#### III. *Organum*.

- 1 *Internorum* sunt principium nervorum ac reliqui nervi interius per totum corpus dispersi, sensui vitali potissimum inservientes.



2. *Externorum.*

a *Visus*, Oculi tunicis, Cornea pellucida, Uvea, retina & humoribus Aqueo scil. CrySTALLINO, Vitreo ac nervo optico instructus.

b *Auditus*, Auris tam externa cum suis eminentiis: Trago & Antitrigo, ac cavitatibus: Helice & Anthelice ac Concha; quam interna cum meatu auditorio, Tympano, Ossiculis, Labyrintho ejusque tribus partibus Vestibulo, Canalibus semicircularibus tribus & Cochlea, ac in hisce expansa membrana nervea, ex nervo auditorio contexta.

c *Olfactus*: Nares interius membrana nerveo glandulosa cinctæ.

d *Gustus*: Lingua & inpr. ejusdem papillulæ nerveæ variæ, in apice copiosiores.

e *Tactus*: Tota Cutis pariter extremitatibus nervorum, quas papillulas vocant, prædita.

IV. *Objecta*

1 Internorum, sunt partim omnia ea, quæ a sensibus externis suppeditata & de quibus certæ ideæ relictæ fuerunt, partim quæ interius in sensum vitalem incurrunt.

2. *Externorum & quidem*

a *Visus*: species visibiles, five radii luminis variis modis in superficie corporum reflexi, aut per transparentia corpora refracti.

b *Auditus*: Sonus five motus tremulus corporis sonori, mediante aere auri communicatus.

c *Olfactus*: Effluvia sulphurea e corporibus prodeuntia, ac cum aere in inspiratione in nares lata.

d *Gustus*: Salia varia alimentis aliisque rebus in hærentia, ac diverso modo papillulas nerveas afficiunt.

e *Tactus*: Solidum & fluidum, durum & molle, asperum & læve, frigidum & calidum &c. de quibus omnibus consulantur Physici.

V. *Causa efficiens*: Est sola Anima rationalis, quæ per nervos, quos semper in moderata tensione servat, objecta externa percipit, ac diversum de iis fert judicium, prouti ea vel corpori jucunda vel adversa esse existimat.

VI. *Usus Sensuum*: Uti reliquæ actiones vitales potissimum corporis conservationi Massam sanguineam depurando, liquores utiles separando & sufficiens nutrimentum apponendo inserviunt, ita sensus externi pariter ac interni eum habent finem, ne res noxiæ, tam structuræ corporis, quam vitalibus humoribus ullam labem inferre queant: quare etiam præsentibus objectis admodum attenta est Anima in iisdem dijudicandis.

*De Motu Voluntario.*

I. *Definitio*: **M**otus voluntarius est vel translatio corporis de loco in locum, vel certa atque definita extensio membrorum corporis, Animæ imperio subjacens, & ordinarie voluntatem excipiens, eum quidem in finem instituta, ut vel res gratæ & jucundæ corpori admoveantur, vel adversæ ab eodem removeantur.

II. *Differentia.*

1 a motu tonico, qui neque adeo sensibilibus in sensus incurrit, neque etiam voluntati stricte sic dictæ subjacet.

2 a motibus reliquis internis vitalibus, quorum quidam sensibiles quidem, nonnulli vero insensibiles sunt, nec voluntatis, vulgari sensu sumptæ, imperium sequuntur; quamvis omnes etiam hi motus interni sensationem & hanc insequentem voluntatem necessario præsupponant.

III. *Organum*: Sunt omnia membra ossibus per articulationem tam perfectam, quam imperfectam junctis & hinc ad motum dispositis ac musculis legitime conformatis, instructa.

IV. *Causa efficiens*: Est Anima, quæ membra certa ad fines certos assequendos sciens vel contrahit, vel relaxat, & hinc corpus pro lubitu quaquaversum movet.

V. *Usus.*

1 Ut ea quæ per sensus internos vel vere, vel apparen-

ter corpori utilia judicata fuerunt, per convenientiam membra in utilitatem corporis convertantur.

2 Ut adversa per organa appropriata a corpore removeantur.

*De Quiete.*

I. *Definitio*: **Q**uietudo est cessatio voluntaria a motu & labore corporis voluntarie, a Natura instituta, ut membra lassæ pristinum vigorem recipere queant.

II. *Differentia*: Quies differt a Somno, qui consistit in cessatione & feriatiōe tam sensuum, quam motus corporis voluntarii, cum e contra quies operantibus adhuc sensibus solum cessationem motuum voluntariorum respiciat.

III. *Organum*: Quietis eadem sunt organa ac motus, quæ in motu pro necessitatis indigentia sæpius contrahuntur, in quiete vero relaxantur.

IV. *Causa efficiens*: Est pariter Anima, quæ membrorum fatigationem & lassitudinem sentiens, sponte a laboribus abstinere, ut sub hac cessatione libera, fibræ nimis extensæ, pristinum vigorem recuperare valeant.

V. *Usus*: Quoniam sub motu membrorum fortiori fibræ non solum nimis extenduntur & fatigantur, sed etiam ob hanc ipsam extensionem multæ partes utiles ex poris excutuntur, quies admodum necessaria est, ut fibræ iterum contrahi, ac per sanguinem affluentem sufficiens nutrimentum iisdem apponi & hoc modo pristinus vigor restitui queat.

*De Vigiliis.*

I. *Definitio*: **V**igiliæ sunt insignis corporis activitas ubi sensus ad percipiendum, organa vero motus ad movendum sunt optime disposita & prompta.

II. *Differentia*: In vigiliis modo unus, modo plures sensus, modo etiam organa motus simul occupata sunt, adeoque diversi quoque vigiliarum gradus constitui possunt.

III. *Organum*: Sunt antea recensita instrumenta sensus & motus, quæ in debita tensione a Natura servantur, ita ut iisdem pro lubitu uti possit.

IV. *Causa efficiens*: Est Anima, quæ certis finibus assequendis tamdiu prædicta organa in moderata tensione servat, donec finem obtinuerit, vel organa eadem nimium fatigata sentiens, quietem & somnum querit: quod autem vigiliarum sit causa, exinde apparet, quod etiam somnum interdum profundior profliget, & corpus ad vigilandum certa atque definita hora iterum aptum reddat.

V. *Usus.*

1 Ut homo officiis istis, quorum gratia in hunc mundum positus est, rite fungi queat.

2 Ut exercitatione sensuum & corporis partes eo magis promptè reddantur ad agendum.

3 Ut humorum etiam fluxilitas agilitate membrorum eo magis promoveatur.

VI. *Observationes.*

1 Vigiliæ moderate admodum profunt ad sanitatis conservationem; immoderate nimium debilitando & humores resolvendo nocent.

2 Vigiliæ indicant moderatrici & gubernatrici nostræ majorem activitatem, qua quidem per secretionem & excretionem debitas cuncta a putredine conservantur.

3 Vigiliæ ipsius Vitæ, somnus e contra Mortis imaginem sistit.

4 Vigiliæ nimie vel curis, sollicitudinibus & speculationibus originem debent, vel corporis morbis admodum acutis vel chronicis.

*De Somno.*

I. *Definitio*: **S**omnus est cessatio ab actionibus animalibus sensu scil. atque motu, corporis & inpr. solidarum partium restorationi & refocillationi inserviens.



II. *Differentia.*

- 1 Respectu gradus, est levior, alius vero profundior.
- 2 Respectu causarum, alius summam fatigationem corporis, alius vero causas alias, pastum largiorem, potum spirituosum, narcotica &c. sequitur.

III. *Subjectum.*

- 1 Omnes homines in genere refocillatione post labores opus habentes, in specie vero
- 2 Infantes, qui sæpius & profundius præ aliis dormiunt; quia Natura in somno actibus vitalibus eo melius incumbere, & corpus auctione indigens, sufficienter nutrire potest,
- 3 Phlegmatici, qui diutius quoque & profundius dormiunt, quam ceterorum Temperamentorum subiecta.
- 4 Hosce proxime excipiunt Sanguinei, qui etiam largiore somno opus habent, quam quidem Cholericæ & Melancholici, quorum illi propter activitatem & sensibilitatem, hi vero propter eandem sensibilitatem, huicque junctam meticulositatem somnum non facile capiunt, & ab eo etiam facile expergiscuntur.
- 5 Ebrii, qui sæpius adeo profunde dormiunt, ut vix excitari queant.

IV. *Signa*1 *Imminentis:*

- a Capitis gravitas & plenitudo.
- b Sensuum insignis torpor.
- c Lassitudo corporis, membrorumque flacciditas,
- d Conniventia palpebrarum capitis nutatione.
- e Vacillatio pedum & decumbendi vel sedendi necessitas.

2 *Præsentis:*

- a Absentia sensus & motus voluntarii,
- b Cogitationes nullæ vel confusæ sive insomnia.
- c Corpus languidum, flaccidum, flexile & aliquo modo turgidum, ac ut plur. calidum, sub quo statu facile lenis mador erumpit.

V. *Causa efficiens:* Est Natura, quæ sponte cessat ab actionibus animalibus, inpr. vero a sensibus, unde remotis objectis facile postmodum sequitur somnus.

VI. *Usus.*

- 1 Ut illud, quod interdum per labores in organis sensui & motui inservientibus deperditum fuit, per sufficiens nutrimentum restituatur.
- 2 Ut fibræ nimis fatigatæ & extensæ iterum sensum contrahi & pristinus tonus iis restitui queat.

VII. *Observationes.*

- 1 Somnus præsentis animi tranquillitate semper magis est placidus, quam ubi animus est inquietus.
- 2 Quo magis corpus repletum est, eo profundius quidem dormiunt homines, sed eo magis quoque per insomnia gravia turbatur somnus.

*De Generatione.*

I. *Definitio:* **G**eneratio est actio naturalis, qua mediante, concurrentibus mare & femina, ad hoc negotium dispositis, per emissionem feminis in arvom Naturæ genus humanum propagatur, complectens sub se Conceptionem, Nutritionem foetus in utero & Partum.

II. *Organa & Requisita*1 *In sexu masculino.*

- a Membri & testium decens conformatio, & magnitudo.
- b Eiusdem membri erectio.
- c Seminis laudabilis elaboratio, asservatio & ejaculatio.

2 *In feminino.*

- a Legitima partium genitalium constitutio.
- b Ovulorum maturorum præsentia.

III. *Causa efficiens:* Est Anima, quæ sponte, præsentis orgasmo sive appetitu venereo, fertur ad congressum & generationis opus per organa legitime constituta, inchoat.

IV. *Finis:* Est propagatio generis humani & quidem utriusque sexus, unde etiam præsentibus jam unius sexus liberis, homines ardentius alterius sexus prolem anxie desiderant.

I. *De Conceptione.*

I. *Definitio.* **C**onceptio est ovuli maturi, prima foetus stamina in se continentis, per semen virile foecundatio.

II. *Requisita.*

- 1 Præter ipsam proportionem organorum genitalium utriusque sexus requiruntur.
- 2 Ovula in mulierum testibus hærentia, quæ sunt vel a Matura, i.e. ad conceptionem apta & prima rudimenta foetus in se continentia.
- b Immatura, ubi prima stamina nondum sufficienter perfecta sunt.
- c Subventanea, in quibus præter liquorem nihil rudimentorum continetur.
- 3 Emissio Seminis virilis in matricem & admixtio spermatis feminarum, quod cum delectatione in mutuo congressu emittunt.
- 4 Quam præcedere debet Coitus, ut attritu partium genitalium semen spumescens redditum, eo facilius & cum majori vi ad ovarium penetrare queat.

III. *Locus.*

- 1 Ovarium tam dextrum, quam sinistrum, e quo disrupto ovulum foecundatum tubam Fallopianam ingreditur, & per hanc ad Uterum fertur.
- 2 Uterus, juxta Bergerum, quando in feminis salacibus maturius in coitu ovulum ex rupto ovario devolvitur ad uterum, & ibidem foecundum a semine masculino redditur.

IV. *Causa efficiens:* Est Anima, quæ in coitu foecunda cum semine patris ovulo communicatur, ac prima rudimenta disponit ut primo nutrimentum ex liquore, ac postea illud quod mater communicat, recipere queant. Cum enim foetus in utero nutriatur & augetur, hæc autem actiones vitam præsupponant, vita vero ab anima, uti id alibi probavimus, depondeat, necessario quoque in primo statim conceptionis momento præsens esse debet.

V. *Signa Conceptionis & Graviditatis.*

- 1 Insignis, inexplicabilis tamen, alteratio in toto corpore.
- 2 Horror primis diebus in peripheria totius Corporis.
- 3 Tristitia in quibusdam, in plerisque vero tædium omnium rerum, sensibilitas & ad iram magna pronitas.
- 4 Gravitas capitis, in quibusdam dolor dentium, quem etiam in viro ordinarie eo tempore, quo uxor gravida erat, observavimus, cum tamen ea a dolore immunis esset.
- 5 Emissio Mensium ordinarie alias fluentium.
- 6 Nausea insignis, inprimis carnis coctæ.
- 7 Copiosus in multis salivæ in os affluxus atque exputio.
- 8 Apperitus rerum insolitarum & solitarum gravis.
- 9 Vomitus præcipue tempore matutino.
- 10 Insignes & hæcenus inconfueti motus in hypochondriis.
- 11 Orificii uterini arctissima clausura.
- 12 Intumescencia ventris globosa successiva, inpr. circa umbilicum.
- 13 Circa medium gestationis tempus perceptio motus foetus.
- 14 In quibusdam ultimo tempore intumescencia mammarum.
- 15 In aliis tumor pedum, post partum cessans.

V. *Observationes.* Generationis & Conceptionis.

- 1 Homines temperamenti humidi magis ad generationem apti sunt quam sicciiores.
- 2 Mares iusta ætate gaudentes & in juventute constituti magis habiles sunt ad generandum, quam reliqui.
- 3 Feminae quæ mature fluxum Mensium experiuntur, mature etiam ad generandum sunt aptæ.
- 4 Virgines rarius concipiunt quam reliquæ.
- 5 Quæ nunquam Mensium fluxum experiuntur, ad conceptionem rarissime dispositæ sunt.
- 6 Feminae, quæ concipiunt, & partus frequentes edunt, meliori ut plurimum gaudent valetudine, quam quæ ad hoc negotium ineptæ sunt.



## 2. De Nutritione Fœtus.

I. *Definitio*: **N**utritio fœtus est nutrimenti in placenta uterina elaborati & per venam umbilicalem aliasque vias ad cor lati, per arterias vero in universum corpus distributi appositio & assimilatio.

II. *Materia Nutritionis.*

- 1 Prima rudimentorum nutritio hæret in ipso ovulo, & est lymphatica, cum vero hæc non nisi pro primis diebus sufficiat.
- 2 Jungitur ovulum per radículas five fibras Utero, ex cujus tabulis arteriosis nutrimento recipit.

III. *Organum.*

- 1 Placenta uterina, quæ elapsis aliquot diebus ex vaginalis uteri & radiculis five papillis Chorion generatur, adeoque nutrimentum per arterias advenit omne recipit.
- 2 Vena umbilicalis, per quam nutrimentum cum sanguine mixtum per umbilicum fœtus primo ad hepar ac postea per venam cavam ad cor fluit.
- 3 Arteria magna five Aorta, quæ nutrimentum a corde receptum per universum fœtus corpus distribuit, ut omnibus & singulis partibus apponatur. Cum vero necessitas requirat, ut membranæ quoque Amnios scil. & Chorion fœtum ambientes nutrantur & cum fœtu augeantur.
- 4 Sanguis per duas arterias ex Aorta aut ejus ramis iliatis ortas vehitur ad membranas & placenta, quæ a succo nutritio & conservantur, & augentur.
- 5 Juxta quosdam ultimo tempore fœtus per os, sugendo liquorem Amnii, nutritur; sed quoniam nulla sufficiens ratio allegari potest, cur nutritio per umbilicum insufficiens sit, nec fœtus in utero respiret, ab hinc fugere nequeat, merito de hoc nutritionis modo dubitatur.

IV. *Causa efficiens*: Est Anima fœtus, quæ in conceptionis momento communicata, acceptum per vias modo memoratas nutrimentum ope arteriarum in totum corpus distribuit, ejusdemque appositionem tamdiu continuat, donec tenellum fœtus corpus eam acquisiverit magnitudinem ac perfectionem, ut per partum in lucem edi queat.

V. *Observationes.*

- 1 Præsentibus animi pathematibus fortioribus, insigniter turbatur nutritio fœtus.
- 2 Matribus interdum satis repletis & robustis fœtus nihilominus parum nutritur, & e contra matribus gracilibus, infantes sæpius optimo habitu præditi in lucem eduntur.
- 3 Nutritio dependet a particulis gelatinoso-aqueis, non vero aqueo-sulphureis seu oleosis.
- 4 Quo melius partes matris internæ principaliores constitutæ sunt, eo melius fœtus nutritio procedit.

## 3. De Partu:

I. *Definitio*: **P**artus est fœtus perfecti & maturi per orificium uteri ope motus tonici tempore legitimo exclusio.

II. *Tempus*: Ordinarium tempus est finis mensis noni Solaris, aut decimi Lunar, quamvis etiam repellantur partus septimestres, qui tamen semper adhuc imperfectionis quasdam notas habent.

III. *Signa partus*1 *Instantis.*

- a Dolores in lumbis & dorso incipientes & ad pubem usque se extendentes, quibus jungitur
- b Continuus urinam & alvum egerendi conatus cum tenesmo, imo etiam actualis horum excrementorum ejectio.
- c Tremor artuum, imprimis inferiorum.
- d Abdominis antea acuminati subsidentia & descensus versus inferiora, ita ut quasi planum reddatur.

e Orificii uteri hætenus arctissime clausi, apertura.

f Excretio muci cruenti per vaginam uteri.

g Effluxus copiosus aquæ five liquoris Amnii.

h Verticis fœtus in orificio uteri præsentia.

2 *Præsentis*: Actualis, continuantibus doloribus uteri spasticis & adjuvante matre, fœtus exclusio, ita quidem, ut capite primum, facie versus intestinum rectum directâ, brachiisque secundum corpusculi longitudinem exporrectis proceat. Fœtum autem a funiculo umbilicali ligato & dissecto liberatum, postmodum secundinæ ac hæc lochia ad decimum quartum usque diem, primo quidem sub sanguinis, postea vero sub feri cruentis forma fluentia sequuntur. Et hic partus est maxime naturalis, si qui vero ab hac norma deflectant, pro præternaturalibus merito sunt habendi.

IV. *Causa efficiens*: Est Natura, quæ fœtum perfectum & maturum elapso legitimo tempore, ope motuum spasticorum uteri ac fortiori compressione expellit, ut in lucem editus ac a foridibus mundatus, postmodum convenienti modo nutritus crescere & debitam perfectionem acquirere possit.

V. *Observationes.*

- 1 Partus in primiparis tam junioribus, quam adultioribus, semper difficilior est, magis tamen in his, quam in illis.
- 2 Facilitas partus, præter infantis justum situm, plurimum dependet ab apertione & amplificatione pelvis proportionata.
- 3 Quo immaturior est fœtus, eo difficilior partus esse solet.

## THEORIÆ MEDICÆ

## P A R S II.

## D E

## P A T H O L O G I A .

I. *Definitio*: **P**athologia est secunda pars Medicinæ ministra, tractans hominis statum præter naturam, five agens de morbo ejusque causis & symptomatibus.

II. *Differentia*. Pathologia est

- 1 *Generalis*: quæ scil. in genere de morbis & causis variisque eorum accidentibus agit, & h. m. viam ad specialem morborum considerationem sternit.
- 2 *Specialis*, quæ morbos omnes & singulos eorundemque causas, ac varia tam ordinaria & constantia, quam extraordinaria signa subiectum, indolem, durationem & exitum tractat; de qua in Praxi speciali potissimum erit fermo.

## De Morbis in genere.

I. *Definitio*: **M**orbus est status præternaturalis hominis vivi; five specialius: Est ut plurimum conatus Naturæ, quo mediante motu cordis & tonico, illud, quod corpori molestum est, corrigere, secernere & per convenientia loca expellere nititur; quem variæ molestiæ modo leviores, modo graviores comitantur: interdum vero, sed rarius, est cessatio a motibus alias consuetis, quam stagnationes sanguinis aliasque gravissima & non raro funesta symptomata sequuntur.

II. *Differentia*: Morbus

- 1 *Late* sumitur pro statu hominis præternaturali, & sub se complectitur Morbum, Causam morbificam & symptomata.
- 2 *Stricte* pro motibus tantum ad expellendam causam morbificam directis, adeoque hoc respectu distinguitur

a a *Causa morbifica*, quæ vel in corpore genita, vel



extrinsecus illata, pericula æconomiae animali minatur, & hinc expelli debet.

*b a Symptomatibus*, quæ luctam motuum Naturæ contra causam morbificam necessario sequuntur.

*c a Læsonibus*, morbos interdum excipientibus

### III. Observationes Pathologico-Practicæ.

- 1 Nisi tres res præternaturales a se invicem probe distinguantur, facile errores committuntur in Praxi.
- 2 Uti Natura in statu sano corpus per motum ac secretionem & excretionem conservat, ita quoque in morbis iisdem instrumentis utens, expulsionem materiarum noxie intendit.
- 3 Adeoque tales motus, quoniam ad salutarem finem directæ sunt, salutare merito vocantur.
- 4 Licet Natura in moribus hisce interdum erret, & per loca minus convenientia evacuationem materiarum morbificarum molietur, nihilominus intentio Naturæ bona est, licet inventio loci sit erronea.
- 5 Nisi Natura in morbis motibus suis concurrat, frustraneus omnis Medici est labor.
- 6 Morbi, ubi motus Naturæ excedunt, tanto periculo ægrotantes non exponunt, quam ubi deficiunt.
- 7 Nisi Medicus ductum Naturæ motuum sequatur, morbi facile in pejus mutantur.
- 8 Motus Naturæ si sensibilibus excretionibus sequuntur, morbus ut plurimum levior redditur, quod si vero tale quid non contingat, vel morbus diutius protrahitur, vel res, in primis in acutis, periculi plena est.
- 9 Posita causa morbifica & Naturæ motibus facile dignosci potest, quænam symptomata necessario motus Naturæ sequantur.
- 10 Medicus in morborum curatione magis ad motus & causam morbificam, quam ad symptomata respiciat, urgentibus tamen accidentibus, non neglecta interim principali intentione, occurrere licet.

#### De Subiecto Morborum.

I. *Definitio*. **S**ubjectum morbi est, quod varios insultus præternaturales, rarius vel frequentius patitur.

#### II. *Differentia*.

- 1 Aliud subiectum est *Generale*, quod est *Homo vivus*, respectu mixtionis & structuræ ad morbos quidem admodum dispositus, quos tamen, impr. genere diversos, non obstanti tali dispositione, raro experitur, ita, ut respectu totius ambitus vitæ, morborum tempus sit brevissimum: imo permulti totam vitam sine insigni alteratione præternaturali transigunt. Adeoque *Democriti* assertum, *totum hominem ex nativitate esse morbum*, quoad dispositionem certum quidem, quoad vitam vero falsum est. *Vid. DD. Stahl's Dissert. de Infrequentia Morborum.*
- 2 Aliud est *speciales*, quod præter generalem dispositionem propter alias causas tam intrinsecas, quam forinsecas advenientes, facilius morbis corripitur. Tale subiectum constituunt
  - a Homines* præ brutis, quæ ad tot Diætæ errores non sunt proclivia.
  - b Feminae* præ Viris, propter Menses, Graviditatem, Partum, Lochia, Lactationem & maiorem ad affectus graviores propensionem.
  - c Otiosi*, vitæ sedentariæ dediti & appetitui nihilominus indulgentes.
  - d Ad animi* graviores affectus, iram, metum, tristitiam &c. poni.
  - e Meditationibus* profundioribus incumbentes, uti Literati.
  - f In Diætâ* eligenda nimis scrupulosi & molliter educati.
  - g Intemperantes* cibis diversis & adversis, ventriculum onerantes.
  - h Sensibilitate* eximia præditi.
  - i Ad morbos hæreditarios* dispositi.
  - k Evacuationes* assuetas tam spontaneas five naturales, quam artificiales negligentes.
  - l Consuetudinis* respectu ad morbos dispositi.
- 3 Morbi porro interdum totum corpus, interdum vero speciales tantum partes occupat, quod ultimum

potissimum in morbis ætatum locum habet, ubi iuniores præter generales morbos ad affectus capitis, juvenes ad morbos pectoris, reliqui vero ad affectus infimi ventris & partium inferiorum sunt dispositi: imo morbi interdum specialissimam tantum partem affigunt, uti inflammationes & dolores quarundam partium specialium.

### III. Observationes Pathologico-Practicæ.

- 1 Quo magis animi affectibus homines indulgent, eo citius quoque & gravius morbis corripiuntur, & contra.
- 2 Soli animi affectus, nulla quoque præsentia causa morbifica, gravissimos sæpius excitant morbos.
- 3 Homo raro pluribus & diversis morbis corripitur, & si morbi diversi videntur, vel specie magis quam genere differunt, vel sæpius reliquæ priorum morborum male tractatorum sunt, quæ sub aliorum schemate apparent.
- 4 Meditationes continuæ Naturam ab actionibus vitalibus revocant, & hinc insignes illarum actionum ataxias post se trahunt.
- 5 Quo magis sensibilia sunt subiecta, eo citius morbis corripiuntur, & eo facilius quoque graviores in ipsis morbis alterationes subeunt, aut etiam recidivæ illis metuendæ sunt.
- 6 Quando semel motuum perversa consuetudo in corpore nostro invaluit, tunc facillime a rerum non naturalium abusu alterationes capere possumus.
- 7 Quo laboriosius vitæ genus quis eligit, & simplici viæ utitur, eo minus morbis obnoxius esse solet: hac enim ratione & digestionem, secretionem & excretionem, in quibus proprie vita consistit, optime procedunt.

#### De Differentia Morborum.

I. *Definitio*: **D**ifferentia morborum est certa eorum divisio, secundum quam vel causarum evidentium, vel corporis, vel Naturæ, vel aliarum circumstantiarum intuitu, in magis vel minus speciales classes rediguntur

#### II. *Differentia*,

- 1 *Essentialis*, quæ respicit partim corpus mobile five ad motum aptum, ejusque partes fluidas & solidas, partim Naturam motus producentes, five morbos, ubi essentialis ac præternaturalis corporis & motuum deprehenditur dispositio.
- 2 *Accidentalis*, quæ quidem ad essentiam morborum non spectat, multum tamen ad leviores vel graviores illorum statum confert. De singulis vero hisce speciatim agemus.

#### De Differentiis morborum essentialibus.

Essentiales morborum differentiæ respiciunt.

#### I. *Partes fluidas* & quidem

##### 1 Sanguinem ejusque

A *Abundantiam* five Plethoram, a qua originem trahunt

##### 1 *Hæmorrhagiæ* & quidem

*a* Hæmorrhagia Narium.

*β* Hæmoptysis.

*γ* Vomitus cruentus.

*δ* Hæmorrhoides.

*ε* Mensium fluxus nimius.

*ζ* Lochia nimia

*η* Mictus cruentus.

B *Spissitudinem*, & fluxuum horum suppressiones.

e.g.

*a* Hæmorrhagia Narium suppressa.

*b* Hæmorrhoidum suppressio.

*c* Mensium obstructio.

*d* Lochiorum defectus.

2 *Congestione* & stagnationes, a quibus dependent:

##### A *Dolores Congestorii*:

*a* Cephalalgia Sanguinea.

*β* Cephalæa & Clavus Hystericus.

*γ* Otal-



- γ Otagia.  
 δ Odotalgia.  
 ε Cardialgia.  
 ζ Colica.  
 ν Malum Hipochondriacum, Hystericum.  
 θ Hæmorrhoides Cæcæ.

B *Dolores Arthritico-Spastici.*

- a Hemicrania.  
 b Pleuritis spuria.  
 c Nephritis spuria.  
 d Rheumatismus, Arthritis Vaga.  
 e Malum Ischiadicum.  
 f Podagra.

C *Stases & inflammationes, quales sunt:*

- α Phrenitis.  
 β Ophthalmia.  
 γ Angina.  
 δ Pleuritis & Peripnevmonia.  
 ε Hepatitis & Splenitis.  
 ζ Inflammatio Ventriculi & Intestinatorum.  
 η Passio Iliaca.  
 θ Nephritis.  
 ι Inflammatio Uteri.

D *Infarctus, Scirrhi, & Exulcerationes.*

- a Infarctus Pulmonum.  
 b - - Lienis.  
 c - - Hepatis.  
 d Scirrhus Pulmonum.  
 e - - Lienis.  
 f - - Hepatis.  
 g Exulceratio Pulmonum five Phthisis.  
 h Vomica Pulmonum.  
 i Empyema.  
 k Exulceratio Lienis, Hepatis.  
 l - - Renum.

## 2 Serum &amp; Lympham, &amp; quidem

A *Fluxus ejusdem, quos sequuntur.*

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1 Coryza humida.   | 10 Fluxus Cæliacus.     |
| 2 Lippitudo.       | 11 - - - Hepaticus.     |
| 3 Ptyalismus.      | 12 Dysenteria benigna.  |
| 4 Tussis humida.   | 13 Diabete.             |
| 5 Asthma humidum.  | 14 Pollutio Nocturna.   |
| 6 Vomitus Simplex. | 15 Gonorrhœa simplex.   |
| 7 Diarrhœa.        | 16 Fluor Albus simplex. |
| 8 Cholera.         | 17 Sudor nimius.        |
| 9 Lienteria.       |                         |

B *Suppressiones Excretionum*

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| a Gravedo & inde dependens. | e Tussis sicca.     |
| b Cephalalgia Catarrhalis.  | f Sudor suppressus. |
| c Salivæ defectus.          | g Icterus.          |
| d Raucedo.                  | h Obstructio Alvi.  |
|                             | i Dysuria.          |
|                             | k Ischuria.         |

C *Stagnationes seu Stases*

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Oedema                | 7 Hydrocephalus.          |
| 2 Cachexia f. Chlorosis | 8 Hydrops Pectoris.       |
| 3 Leucophlegmatia.      | 9 - - - Uteri.            |
| 4 Hydrops Anasarca.     | 10 Hydrocele.             |
| 5 - - - Ascites.        | 11 Catarrhus Suffocativus |
| 6 Tympanites.           |                           |

D *Corruptiones.*

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| a Scabies benigna. | d Gonorrhœa virulenta. |
| b - - - maligna.   | e Lues Venerea.        |
| c Scorbutus.       | f Fœtor oris.          |
|                    | g - - Sudoris.         |

II. *Partes Solidas, quarum vitia consistunt*A *In conformatione lesa respectu*

- |                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| 1 Magnitudinis. | 2 Figuræ. | 3 Situs. |
|-----------------|-----------|----------|

B *In unitate soluta, ubi occurrunt*

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1 In partibus mollibus | 2 In Ossibus |
| a Vulnere.             | α Fractura.  |
| b Ulcera.              | β Caries.    |
| c Contusiones.         |              |
| d Rupturæ.             |              |

De quibus omnibus sermo erit in Chirurgia.

III. *Principium agens & motum.*A *In Motu*

- 1 Deficiente  
 a in Tono, ubi occurrunt

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Tremor.            | 6 Aponia.                |
| 2 Vertigo.           | 7 Procidencia Ani.       |
| 3 Affectus Soporosi. | 8 - - - Uteri.           |
| 4 Apoplexia.         | 9 Incontinentia Urinæ.   |
| 5 Paralysis.         | 10 Impotentia Virilis.   |
| b in Pulsu.          | 11 Sterilitas Feminarum. |
| 1 Lipothymia.        | 2 Syncope.               |
| 3 Asphyxia.          |                          |

2 *Excedente*

a in Tono, eoque vel rigido vel sæpius interrupto.

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Spasmus Simplex.   | 9 Asthma convulsivum. |
| 2 - - - Cynicus.     | 10 Incubus.           |
| 3 Tetanus.           | 11 Singultus.         |
| 4 Emprostotonus.     | 12 Colica convulsiva. |
| 5 Opisthotonus.      | inpr. Infantum.       |
| 6 Motus Convulsivi.  | 13 Tenesmus.          |
| 7 Epilepsia.         | 14 Priapismus.        |
| 8 Palpitatio Cordis. | 15 Contractura.       |

b in Pulsu vel solo, vel in Tono & Pulsu simul, quale quid contingit in Febribus, quæ sunt

1 *Intermittentes*

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| α Quotidiana.      | ε Quartana duplex & triplex. |
| β Tertianæ.        | ζ Quintana                   |
| γ Quartana.        | η Octana                     |
| δ Tertianæ duplex. | } rariores.                  |

2 *Continuæ, quæ sunt vel*

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| a Continentes ut | b Biliosæ                    |
| 1 Ephemera.      | 1 Causus five febris Ardens. |
| 2 Synochus.      | 2 Febris Biliosa.            |

b *Continuæ simplices.*

- |                        |                         |             |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 Continua Quotidiana. | 2 Tertianæ.             | 3 Quartana. |
| c Exanthematicæ.       | 3 Febris Miliaris.      |             |
| 1 Variolæ.             | 4 - - - Petechialis.    |             |
| 2 Morbilli.            | 5 - - - Pestilentialis. |             |

3 *Lentæ.*

- |   |
|---|
| α Febris lenta.   |
| β - - - Hæctica,  |
| γ - - - Catarrhalis; quæ etiam ad Continuas simplices pertinet. |

B *In Sensibus.*

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1 Externis, ubi occurrunt          | d Depravatio Gustus. |
| a Depravationes Visus.             | e - - - Olfactus.    |
| b Cæcitas.                         | f 'Αναίσθησις.       |
| c Surditas.                        | g Anorexia.          |
| 2 Internis, ubi observari merentur |                      |
| a Memorix debilitas.               |                      |
| b - - - - - totalis amissio.       |                      |
| c Deliria, quæ sunt.               |                      |

α *Acuta, v. g.*

- |                                     |
|-------------------------------------|
| 1 Delirium Phreniticum.             |
| 2 - - - Paraphreniticum.            |
| 3 Deliria Febrium Acutarum reliqua. |

β *Chronica*

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1 Mania.          | 5 Hydrophobia five Rabies Canina. |
| 2 Furor Uterinus. | 6 Tarantismus.                    |
| 3 Melancholia.    | 7 Choreia Sti. Viti.              |
| 4 Moria.          |                                   |

IV. *Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Distributio Morborum in certas classes, causis morborum respondentes, curationem longe faciliorem reddit.
- 2 Morbi sub eodem genere comprehensi & ab eadem causa profluentes, eandem curationem postulant.
- 3 Unus idemque morbus modo ad hanc, modo ad illam classem referri potest, respectu nimirum differentix causarum illum constituentium.
- 4 Optima tamen distributio esse videtur, quæ causis principalibus superstructa est.
- 5 Sub fero & lymphæ late consideratis comprehenditur etiam bilis, pituita, Urina, Sudor, Saliva, & morbi ab iis procedentes.

## De Differentiis Morborum accidentalibus.

Differentiæ morborum accidentales respiciunt

I. *Originem, cujus respectu alii sunt*

- 1 Hæreditarii, qui a Parentibus in liberos propagantur, & plerumque non tantum similitudinem temperamentum, sed & impressas in ipsa fœtus formatione motuum ideas respiciunt.

B 3

a Adsci-



2 *Adscititii*, qui a causis tam internis, Plethora, Spissitudine, Cacochymia, quam externis originem trahunt.

II. *Tempus anni*, & hinc sunt;

1 *Vernales*, quales sunt febres intermittentes quotidianæ & tertianæ, reliquos vide III. *Aphorif.* 20.

2 *Æstivi*, uti febres variæ, Diarrhœa &c. III. *Aphorism.* 21.

3 *Autumnales*, v. g. Dysenterix, Quartanæ &c. III. *Aphor.* 22.

4 *Hyemales*, uti sunt Tussis, Pleuritides &c. III. *Aphor.* 23, vide de hisce omnibus *Patbol. nostr. Sect.* 1. cap. 3, §. 7. & seqq.

III. *Frequentiam Subjectorum*, qui sunt

1 *Epidemici*, qui ex communi causa orti, plures uno eodemque tempore invadunt, v. g. Dysenterix, Febres petechiales &c.

2 *Endemii*, sive morbi ex communi causa certis populis proprii, e. g. Scorbutus Danis, Plica Polonis &c.

3 *Sporadici*, qui nec communiter grassantur, nec certis Regionibus proprii sunt, sed aliis grassantibus, hos vel illos ob particulares causas corripunt.

IV. *Indolem*, cujus intuitu sunt

1 *Benigni*, qui vel mites sunt, vel ordinarias facile superabiles causas agnoscant, v. g. febres intermittentes, Diarrhœa &c.

2 *Maligni*, qui absque causa manifesta totam Oeconomiam animalem maxime turbant, uti sunt: Febres Petechiales, Pestis &c.

3 *Contagiosi* tam Acuti, quam Chronici, qui ope effluviis similes morbos in aliis corporibus excitant, v. g. Dysenteria maligna, Pestis, Scabies, Lues Venerea &c.

V. *Exitum*, unde sunt

1 *Salutares*, qui nullum vitæ periculum minantur, sed sæpius ab aliis gravioribus morbis præservant, uti sunt Hæmorrhagiæ Narium congruæ, Hæmorrhoides, Diarrhœa spontaneæ, Sudores autocratici, Febres tertianæ &c.

2 *Letales*, qui contrario modo se habent, & vel certo jugulant, uti Apoplexia fortis, læsiones viscerum graviores, vel nihilominus in gravissimum vitæ periculum conjiciunt, uti sunt Inflammationes viscerum profundiores, Catarrhus Suffocativus &c.

VI. *Durationem*, & hujus respectu dividuntur in

1 *Acutos*, qui tempora sua cito absolvent, & sunt vel

a *Extreme acuti*, qui tertio vel quarto die finiuntur, uti Pestis & Febris Pestilentialis &c.

b *Perecuti*, quorum terminus est dies septimus, uti Pleuritidis & quarundam febrium Petechialium.

c *Acuti simpliciter*, qui duos septenarios requirunt, v. g. Febres continuæ.

d *Acuti ex decedentia*, qui ad vigesimum octavum, aut ad quadragesimum usque diem extenduntur.

VII. *Periodum*, sive certum invadendi tempus, unde alii sunt.

1 *Intermittentes*, qui certis diei horis invadunt, ac absoluto Paroxysmo prorsus intermittunt, uti sunt: Febres intermittentes Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, quorum paroxysmi vel sunt fixi vel vagi & hinc etiam tales febres vel sunt statæ, vel erraticæ.

2 *Continui*, qui nullam intermissionem, sensibilem tamen remissionem habent, ac certis temporibus iterum exacerbantur: cujus exacerbationis fixæ vel vagæ intuitu itidem sunt vel periodicæ vel vagæ. Tales morbi etiam uti priores respectu certorum invasionis temporum vocantur *Typici*.

3 *Continentes*, qui & intermissione & remissione carentes, continuo durant, uti Ephemera, Synochus.

VIII. *Ætatem & Temperamentum*, unde alii sunt

1 *Congrui*, qui ætatibus & temperamentis respondent, v. g. Variolæ & Morbilli ætati infantili, Hæmorrhagiæ puerili & Adolescentiæ, Hæmorrhoides virili, Mictus cruentus & Calculus senili, febres arden-tes Temperamento Cholericis &c.

2 *Incongrui*, qui ab hac regula deflectunt, v. g. Variolæ adultorum, Hæmorrhagiæ narium in Senibus, Calculus, Apoplexia & Podagra in junioribus.

IX. *Habitudinem ad curationem*

1 *Curabiles*, qui methodo spontanea & artificiali restituantur, uti pleraque morborum pars, v. g. Febres intermittentes, Continuæ, Hæmorrhagiæ, Inflammationes &c.

2 *Incurabiles*, qui nullam medelam admittunt, uti Apoplexia fortissima, læsiones Viscerum graviores, aut eorundem consumptiones, Paralytes consummatæ cum inflatione partium affectarum vid. D. D. *Stahlii in Dissert. de Morb. Incurabilib.*

X. *Symptomata*.

1 *Legitimi* sive exquisiti, qui veris & ordinariis symptomatibus stipati, legitimo tempore finiuntur, uti Tertianæ legitima & Pleuritis vera,

2 *Spurii* sive *Nothi*, qui contrario modo se habent, v. g. Pleuritis spuria, ubi quidem adest dolor lateris interdum gravis cum respirandi difficultate, reliqua tamen symptomata, Pleuritidem veram comitantia, qualia sunt Febris acuta, Pulsus durus & sputum cruentum desunt.

XI. *Prægressam medicationem*, ob quam alii sunt

1 *Corrupti*, qui scilicet, ab indole sua deflectentes sub alio & heteroclitico schemate apparent, idque vel perversæ medicationis vel malæ diætæ vitio, vid. D. *Stahlii Dissert. de Morb. corruptis.*

2 *Non corrupti*, qui legitime tractati tempore ordinario & quidem satis tranquille sine magnis alterationibus cursum suum absolvent.

XII. *Inductam assuetudinem*.

1 *Habituales*, qui partim propter causæ morbificæ nimiam quantitatem, partim propter corporis imbecillitatem, partim & quidem præcipue propter motuum frequentiore repetitionem, remota etiam sæpius causa morbifica in habitum & consuetudinem præternaturalem degenerant, ita ut non nisi magnis laboribus denuo removeri queant; quales morbi potissimum sunt, qui certas evacuationes per frequentes motuum ad certa loca directiones & intentiones impetrandas respiciunt, uti sunt Tussis chronica, Febres intermittentes &c. vide D. *Stahlii Dissert. de Morbis Habitualibus.*

2 *Nondum obfirmati*, in quibus scilicet, directiones motuum ad certas partes observantur, qui tamen evacuata materia cessant, atque hoc modo morbi absoluto tempore ordinario finiuntur.

XIII. *Causam*, & hinc Morbi dependent a Causis

1 *Immaterialibus*, qui scilicet, nulla sæpius præsentente causa materiali a solis animi affectibus gravioribus, humores nimium commoventibus, originem trahunt.

2 *Materialibus*, sunt omnes reliqui morbi, in quibus manifesta causa materialis deprehenditur.

XIV. *Sedem causæ*, cujus respectu sunt alii

1 *Idiopathici*, in quibus causa morbifica in ipso loco affecto hæret, v. g. Dolor capitis a sanguine infarctu in capite, Vomitus a cruditatibus in ventriculo hærentibus.

2 *Sympathici* alii, qui per consensum aliarum partium oriuntur, v. g. Dolor capitis a ventriculi debilitate ortus, aut Clavus Hystericus, vomitus Nephriticorum &c.

XV. *Magnitudinem*

1 *Magni*, qui partes nobiles aggrediuntur, actiones principales insigniter lædunt aut plane tollunt, gravibus stipati sunt symptomatibus, & a causa graviori oriuntur, & hinc interitum ut plurimum minantur, uti sunt Apoplexia, Catarrhus suffocativus, Inflammationes Viscerum, Morbi maligni &c.

2 *Parvi*, qui nullum periculum portendunt, sed propter levitatem facile cedunt, uti sunt Hæmorrhagiæ narium in junioribus, vulnera cutis ejusdemque inflammationes superficialiæ &c.

XVI. *Concursum variorum Symptomatum*.

1 *Compositi* sive *Complicati*, quos alii adhuc morbi comitantur, & hinc ob concursum variorum symptomatum cognitu & curatu difficiles sunt, v. g. Febris continens Variolis Adultorum juncta. Hæctica cum Febre putrida juxta Veteres &c.

2 *Simplices*, qui ordinariis tantum stipati sunt symptomatibus, v. g. Tertianæ, Quartanæ &c.



*Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Quo magis morbi motus sanguinis congestorios ad certa loca respiciunt, eo facilius in liberos propagantur.
- 2 Morbi Hæreditarii non statim in quavis ætate se manifestant, sed non raro tempus ætatum morbis familiare expectant.
- 3 Morbi Hæreditarii ante consuetum & morbis ætatum solenne tempus affligentes, mature etiam ægros jugulant.
- 4 Omnes Morbi hæreditarii rarius plenariam curationem admittunt, inprimis si jam in habitum degenerarunt.
- 5 Morbi adscititii, nisi maligni aut alias satis graves fuerint, longe facilius convenienti methodo tolluntur, quam hæreditarii.
- 6 Morbi vernaes, facilius curantur, quam reliquorum anni temporum affectus.
- 7 Omnes Morbi Epidemici difficiliter curantur, quam Adscititii.
- 8 Morbi Endemii semper sunt difficilioris curationis, mutato tamen solo Paterno & mutata diæta facilius mitigationem admittunt.
- 9 Morbi Maligni quo mitius tractantur, eo melior eorum est successus, & contra.
- 10 Nisi Morbis Malignis in primo statim principio methodo convenienti occurratur, facile sunt funesti.
- 11 Salutares morbi perversa methodo tractati, non raro periculosi aut etiam lethales evadunt.
- 12 Morbi acuti sibi relictis sæpius a Natura curantur.
- 13 Quo magis vero tractantur remediis variis, & præcipue commoventibus, eo facilius pervertuntur.
- 14 Morbi Chronici magis postulant Artis Medicæ concursus, quam Acuti.
- 15 Morbi Periodici facilius curantur, quam Vagi.
- 16 Quo majora inter periodos sunt intervalla, eo diutius durant morbi, & eo difficiliter etiam curationem admittunt.
- 17 Morbi congrui, sive certæ ætatis certisque temporibus anni respondentes, minoris ut plur. sunt periculi, quam incongrui.
- 18 Morbi curabiles, imprudenti medicatione tractati, sæpius sunt incurabiles.
- 19 Non omnes morbos pro incurabilibus habito tales esse, testantur gravissimorum morborum curationes.
- 20 Morbos exquisitos, nisi acuti fuerint, facilius ferunt ægrotantes, quam spurios.
- 21 Omnes morbi, nisi convenienti & Naturæ methodo respondentem modo tractentur, facile corrumpuntur.
- 22 Quo magis morbi respiciunt motus secretorios & excretorios, eo facilius corrumpuntur.
- 23 Omnes morbi corrupti contumaciores sunt quam reliqui.
- 24 In morbis corruptis eo quam maxime respiciendum est, ut morbus primarius revocetur.
- 25 Vera confortantia, v. g. Eff. Dulc. Hailens. Eorumque Pulv. Nigr. & Pulv. Solar. D. Richter cum Pilulis D. Stahl &c. in morbis corruptis sunt optima remedia, quatenus motus secretorios & excretorios in ordinem redigunt.
- 26 Omnes morbi habituales difficilioris sunt curationis quam nondum obfirmati.
- 27 Nisi Medicus in morbis habitualibus ad evacuationem revulsoriam sæpius repetitam & ad motuum, humores versus certa loca dirigentium, solitionem respiciat, frustra ut plurimum laborat, aut morbum pejorem reddit.
- 28 Morbi a causis immaterialibus pendentes ordinarie sunt graviores.
- 29 Morbi a causis immaterialibus orti, si commoventibus tractantur, facile in pejus ruunt.
- 30 Morbi, qui ab initio quidem causas materiales pro fundamento habuerunt, demum vero in consuetudinem degenerarunt, ita plerumque inolescunt, ut etiam sublatis istis causis materialibus, pertinaciter tamen perdurent aut recurrant.

- 31 In morbis Sympathicis semper ad focum causæ respiciendum est, quo neglecto omnis Medici labor frustraneus est.
- 32 Morbi Idiopathici, nisi causa gravior subsit, aut partis affectæ læsio, sæpe facilius profligantur, quam Sympathici.
- 33 Quo graviores sunt morbi, tam causæ quam symptomatum & partis affectæ respectu, eo periculosiores sunt, & contra.
- 34 Morbi complicati, tam acuti, quam chronici, imprudenti medicatione facillime pervertuntur.
- 35 In morbis complicatis ad morbum magis urgentem semper respiciendum est, v. g. in febre maligna Dysenterica majorem attentionem postulat febris, quam Dysenteria.

*De Temporibus Morborum.*

I. *Definitio:* **T**empora morborum sunt eorum decursus tam durationis universalis, quam periodorum certarum aliarumque circumstantiarum respectu.

II. *Differentia* Tempora Morborum sunt

1. *Generalia* respectu

a *Certæ periodi vitæ*, cujus intuitu morbi diversis vitæ temporibus affligunt, vide infra de *Morbis ætatum*.

b *Temporum Anni*, in quibus homines diversis morbis corripiuntur, vide supra de *Morbis Temporum anni*.

2. *Specialia*, respectu

a *Generalis ambitus morbi*, quando alii morbi brevi, alii vero non nisi longo elapso & quidem vel certo vel incerto tempore finiuntur.

b *Temporis invadendi*, cujus intuitu alii certis & quidem definitis, alii vero incertis temporibus invadunt.

c *Paroxysmorum*, in quibus pariter Principium, Incrementum, Status & Decrementum tanquam particularia tempora morborum observantur.

d *Criticarum commotionum & evacuationum*, quæ non nisi certis atque definitis morbi temporibus contingunt.

III. *Causa efficiens* temporum morborum est Natura, quæ generaliter quidem in certis ætatibus & certis quoque temporibus anni, illud, quod molestum est, per varia corporis loca expellit: Specialiter vero in morbis materiam morbificam vel brevi, vel longo tempore, pro diversa materiæ conditione, præparat & ad expulsionem certis diebus instituentem disponit, ac eadem expulsa a motibus desistens, morbum vel brevi, vel longo elapso tempore solvit, aut victa succumbit. Dum autem motus sensim augeat, ac postmodum superato periculo imminuit, nascuntur exinde *Principium, Incrementum, Status & Decrementum* tanquam particularia morbi temporis & hoc ipso finitur generalis morbi ambitus. Plura vide in *Pathol. nostræ Sect. 1. Cap. IV. de Tempore Morborum*.

IV. *Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Nisi Medicus exacte ad morborum tempora respiciat, facile per remedia incongrua tempore data morbum pervertit.
- 2 Quo magis regulariter morbi tempora sua observant, eo facilius etiam a Natura & Arte superantur & contra: exceptis tamen iis casibus, ubi propter solam consuetudinem, remota etiam causa, adhuc affligunt.
- 3 Quo citius morbi tempora sua absolvunt, eo gravius subest periculum.
- 4 Morbi horis matutinis affligentes citius ut plurimum solvuntur, quam pomeridianis, nisi hi maligni fuerint.
- 5 In incremento & statu morborum nihil temere est movendum, quoniam motus tum temporis jam sunt gravissimi.
- 6 In morbis acutis lenissime in principio tractatis status ut plurimum est mitior, quam ubi multa exhibita fuerunt remedia.



- 7 Morbi acuti, vel sibi relicti, vel temperantibus tantum tractati, longe certius statas periodos & dies criticos observant, quam qui variis medicamentis & medicationibus, præsertim manifestius operantibus tractantur.
- 8 Nulla re certius typicus morbi ordo pervertitur, quam imperita & injusta medicamentorum exhibitione.

*De Causis Morborum in genere.*

I. *Definitio:* **C**ausa morbifica est res, quæ vel immateriali suo concursu œconomiam animale ejuſque ſtatum ſecundum naturam turbat, variis vel propinquioribus, vel remotioribus læſionibus viam ſternens.

II. *Differentia.* Cauſæ morborum ſunt

1 *Immateriales*

a Anima ipſa, quæ tanquam motuum in morbis occurrentium cauſa efficiens, in iſdem vel excedit, vel motus perverſe inſtituit, ac materiæ morbificæ per inconvenientia loca expellere conatur: de qua re pluribus infra de *Motibus extraordinariis* &c.

b Ejuſdem pathemata varia ſive animi affectus, qui pro diverſa ſua indole varias anomalias in œconomia animali cauſantur, uti infra de *Cauſis non naturalibus* demonſtrabimus.

2 *Materiales*, quales ſunt ſanguis quantitate vel deſiciente, ſpiſſitudine & Cacoſymia peccans, bilis, mucus, ſerum, lymphæ, calculi, flatuſ &c. de quibus ſingulis ſuo loco agemus. Et talis materialis cauſa eſt.

a *Continens*, quando in parte affecta ipſa hærens, eam actu & continuo lædit, v. g. calculi in urethra hærens ſuppreſſionis urinæ & doloris eximii cauſa eſt continens, pariter ac ſerum in abdomine ſtagnans tumoris aſciti.

b *Antecedens*, quæ præviæ diſpoſitionem ad varios affectus denotat, & quidem

1 *Reſpectu Etatis*, cujus intuitu ſenes ad miſtum cruentum, calculum, podagram &c. juniores ad Narium Hæmorrhagias & inde dependentes affectus diſpoſiti ſunt.

2 *Reſpectu Temperamentorum*, quatenus Cholericis magis ad ebullitiones ſanguinis, Febres, Inflammationes &c. Phlegmaticis e contra ad affectus feri magis proni ſunt.

3 *Reſpectu Sexus*, quatenus femininus ratione Menſium, Graviditatis, Partus, Lochiorum, Lactationis non ſolum pluribus morbis expoſitus, ſed etiam ob majorem ſenſibilitatem magis quam maſculus ad morbos diſpoſitus eſt.

4 *Reſpectu Plethoræ*, ſpiſſitudinis ſanguinis, Cacoſymia &c. quarum intuitu facilius homines ita diſpoſiti in morbos ruunt: præcipue quando accedit

5 *Cauſa Procatartica*, quæ partim Naturam & cauſas immateriales, partim materiales reſpicit, ac motus nimium excitando cauſam antecedentem & continentem in actum deducit, ita ut antea ſilens actu corpori noxia eſſe incipiat.

III. *Observationes Pathologico-Practicæ.*

1 Quo magis Natura ad motus prompte ſuſcipiendos pronæ eſt, eo facilius etiam variis morbis portanda panditur.

2 Morbi a cauſis immaterialibus dependentes ſemper graviores ſunt iis, qui a materialibus originem trahunt.

3 Quo graviora & ſubitanea ſunt Animi pathemata, eo periculoſiores etiam ſequuntur affectus.

4 Animi pathemata ſæpius morbos graviffimos, nulla etiam præſente materia noxia excitant.

5 Quo magis in Animi pathematibus humores feruntur ad interiora, eo gravius imminet periculum.

6 Eo magis autem metuendum eſt periculum ab animi pathematibus, ſi humores & quantitate & qualitate ſunt vitioſi.

7 Quo magis agilis eſt materialis cauſa, eo gra-

viores etiam ſequuntur affectus, & contra.

8 Humores tamen nimis ſpiſſi ſimul & ſemel commoti graviffima poſt ſe trahunt mala.

9 Niſi cauſa continens removeatur, affectus ab ea dependens nunquam curatur.

10 Quo periculoſior eſt cauſa, eo brevioris periodi morbi ſolent eſſe.

*De Plethora.*

*De Plethoræ Definitione, Differentia, Signis &c.*  
videatur Praxis Specialis Lib. I.

Cap. I. Tab. VII.

*Observationes, Pathologico-Practicæ*

1 Plethora eſt fundamentum plurorumque & præcipuorum morborum.

2 Per ſe tamen raro morbos producit, (quod in hominibus Plethoricis ſatis diu interdum ſine ullis incommodis viventibus obſervamus niſi commota, aut inſignis ſanguinis ſpiſſitudo ipſi juncta fuerit.

3 Plethoram commotam, niſi mature mitigetur, aut ſenſibiles excretiones ſequantur, facile graves morbi excipiunt.

4 Plethoram commotam utpl. ſequuntur congeſtiones ad loca Hæmorrhagiis deſtinata, quæ tamen facile inſequente Hæmorrhagia ſolvuntur.

5 Hæmorrhagiæ graviorem Plethoræ commotionem non ſtatim, ſed demum ſedato aliquomodo ejus impetu excipiunt.

6 Si congeſtiones circa loca Hæmorrhagica factæ non ſolvuntur; ſtagnationes facile in plenarias Staſes & Corruptiones degenerant, quas Natura interdum quidem per febres præcavet, non raro tamen actum inflammatorium quoque inſtituere cogitur, ut id quod actu corruptum eſt, ſenſim per fortioſiorem pulſum ſanguinis eluatur.

7 Omnes morbi Plethoræ ſupervenientes graviores ſunt, impr. ſi ex acutorum ſunt cenſu, intermittentes vero non tantum anomali evadunt, ſed etiam diutius durant.

8 Qui ſemel ſunt Plethorici, facile iterum tales, imminuto etiam ſanguine, fiunt, & morbis a Plethora oriundis denuo exponuntur.

*De Spiſſitudine Sanguinis.*

I. *Definitio:* **S**piſſitudo eſt ſanguinis antea fluidioris juſto major concretio, Plethoram & motuum defectum ſequens, a qua ſtagnationes & ab his dependentes morbi originem trahunt.

II. *Differentia.*

1 Alia eſt *generalis*, quando nimirum ſanguis in univerſo corpore ſpiſſeſcit.

2 Alia eſt *ſpecialis*, quando inſigni quadam regione ſpiſſiorem acquirit conſiſtentiam, quale quid contingit in Hypochondriacis & Hyſtericis, quorum ſanguis in abdomine ob motus progreſſivum tardioſiorem lentorem acquirit.

3 Alia eſt *ſpecialiſſima*, quæ in Hypochondriacis & Hyſtericis interdum naſcitur, & certum tantum viſcus occupat.

4 Alia eſt *ſubitanea*, alia tardior.

III. *Signa,*

1 Torpor inſignis & laſtitudo totius corporis.

2 Gravitatis membrorum ſive artuum.

3 Pulſus modo inæqualis, modo intermittens, modo palpitatorius.

4 Habitus corporis interdum ſtriſtus, interdum laxus, hujusque conſtriſtionis & relaxationis frequentes alterationes.

5 Vafa turgida & ſatis inflata, quandoque etiam exilia & vix conſpicua, ut plurimum tamen majora.

6 Frequentis coloris & caloris in habitu corporis alterationes.

7 Reſpirationis difficultas & inpr. ſub motu corporis.

8 Anxietates præcordiorum crebriores.



- 9 Sudoris; urinæ reliquarumque excretionem tardior processus.
- 10 Somnus turbulentus & anxius.
- 11 Sanguis e Venæfecta difficulter prodiens, nigricans & insigniter spissus.
- 12 Animus trepidus, torpidus, meticulosus, anxius.

IV. *Subiectum.*

- 1 Respectu *Temperamentorum*, Sanguineo-Melancholici & ipsi Melancholici magis dispositi sunt ad spissitudinem, quam Sanguinei, Cholericæ, aut Phlegmatici.
- 2 Respectu *Ætatis*, juniores Hæmorrhagiarum Spontanearum vel artificialium suppressionibus laborantes, nec non senes ob sanguinem aliquomodo mucosum præ aliis ad eam sunt proni.
- 3 Respectu *Sexus*, feminæ facilius spissiore acquirunt sanguinem, quam viri.

V. *Causa.*

- 1 *Plethora*, quæ proportionem aut vim motuum superans sensum sensumque tali spissitudine ansam præbet.
- 2 *Vita sedentaria*, torporem motuum inducens inpræsi simul profundiores speculationes accedunt, quæ Naturam eo magis ab actionibus vitalibus revocant.
- 3 *Subitanea* corporis calidi *refrigeratio*, quam subita etiam sanguinis congelatio sequitur.
- 4 *Terror*, qui celeriter, *Tristitia* quæ sensum sanguinem spissiore reddit.
- 5 *Abusus acidorum*, & cibi crassiores chylum largientes, qui sensum quoque sanguinem inspissant.
- 6 Defectus sufficientis potus.
- 7 Nimis excretiones feri per sudorem & urinam.
- 8 Diæta siccior, speculationes nimis, Hæmorrhagiarum consuetarum suppressio, vel artificialium neglectus.

VI. *Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Quo major est sanguinis spissitudo eo graviora quoque eam comitantur mala.
- 2 Quo magis subitanea est spissitudo & coagulatio sanguinis, eo citius quoque gravissimi & interdum lethales sequuntur affectus.
- 3 Spissitudinem specialem facile etiam excipit universalis.
- 4 Uti inotus moderatus & continuatus ad fluxilitatem sanguinis & restituendam & conservandam est optimum remedium, ita fortior & subitaneus, sanguinem spissum uno impetu commovendo, in mala a spissitudine metuenda, facillime præcipitat.
- 5 Spissitudinem, nisi mature convenienti methodo removeatur, facile stagnationes, has vero stases & corruptiones sequuntur.
- 6 Nisi Venæsectio præmittatur remediis incidentibus, frustra fere laborat Medicus.
- 7 Sicut subiecta spissitudini Sanguinis obnoxia quoad animum sunt anxia, trepida, torpida; sic in economia vitali similes sequuntur actiones.

## De Caco-chymia.

I. *Definitio*: Caco-chymia vi vocis est malus status humorum in crasi, vel a secretionibus & excretionibus necessariis suppressis, vel ab externo contagio originem trahens.

II. *Differentia.*

- 1 Respectu *Causæ*
  - a Alia originem trahit a suppressione secretionum & excretionum, Sudoris, Bilis, Urinæ &c.
  - b Alia vero a contagio forinsecus corpori illato oritur, uti Scabies, Lues Venerea, Lepra &c.
- 2 Respectu *Subiecti*
  - a Alia universum corpus & totam massam sanguineam occupat, qualis observatur in Scabie, Jctero &c.
  - b Alia vero in certis tantum partibus occurrit, quæ ut plurimum a congestionibus ad certas partes dependet, v.g. insignis pruritus scroti & ani cum pustulis in Hæmorrhoidariis, Tinea capitis in infantibus.

3 Respectu *indolis*

- a Alia est benigna, *falsa*, uti in Scabie aliisque cutis pustulis; *biliosa* in Jctero; *mucosa* in senibus & infantibus Phlegmaticis; *aquosa* vel *serosa* in Cachexia, Leucophlegmatia, Anasarca &c.
- b Alia est maligna, uti in Pfora, Lepra, Lue Venerea.

III. *Signa.* Hæc patent ex ante dictis.IV. *Subiectum.*

- 1 Homine otiosi, torpidi, per motum corporis secretiones & excretiones non promoventes.
- 2 Cibi insuper malæ digestionis, acidis, salis, aut nimis aromatizatis, liquoribus Spirituosis &c. abutentes.
- 3 Secretiones & excretiones spontaneas negligentes.
- 4 Personæ cum scabiosis & leprosis conversantes, aut cum iisdem in eodem lecto dormientes.
- 5 Coitum cum impuris exercentes.

V. *Observationes.*

- 1 Quo magis supprimuntur excretiones, eo magis etiam augetur Caco-chymia.
- 2 Caco-chymia cum visceris alicujus labe conjuncta, gravior est reliquis speciebus.
- 3 Caco-chymia maligna semper periculosior est, & difficulter etiam curatur.
- 4 Caco-chymia universalis sæpius facilius curatur, quam particularis.
- 5 Nihil fere producendæ caco-chymie magis inservit quam abundantia Sanguinis, ejusque in corpore retentio, sicut hoc in mensium & lochiorum negotio apparet.

## De reliquis humoribus inutilibus &amp; utilibus morborum causis.

Tales humores inutiles sunt Serum & reliqui ex eo prodeuntes: Sudor, Urina, Bilis, Mucus, Feces alvinæ. Utiles vero Lympha, Lac, Semen & Saliva; qui omnes morborum fiunt causæ quando peccant.

I. *Quantitate & motu.*A *Excedente*, uti

- a Serum, quod in Phlegmaticis & Sanguineis potissimum otiosis & vitæ sedentariæ deditis, potu abutentibus, facile augetur, & hinc morborum variorum a Sero oriundorum fit causa.
- b Sudor, qui partim ob causas manifestas labores fortiores, nimium calorem &c. vel sæpius ob latentes nimium excernitur, & hinc, dum sanguis nimis resolvitur, nimisque fluxilis redditur, præter debilitatem insignem, quam post se relinquit, ad varia mala viam sternit. Quorsum tamen Sudores spontanei cum euphoria contingentes, minime referri debent.
- c Urina, quæ partim ob nimiam feri quantitatem, partim ob sanguinis resolutionem, partim ob sphincteris relaxationem, sæpius & insigni, assumpta potulenta superante copia excernitur, & hinc corpus exsuccum reddit.
- d Bilis, quæ partim ob cibos pinguiore aut largiter aromatizatos, ut & potum generosorem in nimia copia generatur, partim in nimia copia in intestina infunditur, & hinc Diarrhœam, Choleram, Febres biliosas &c. excitat.
- e Mucus, cujus quantitatem in Phlegmaticis infantibus & senibus cibi crassioris consistentiæ, vita otiosa, aer frigidus, suppressio transpirationis &c. augent; unde postmodum Coryzæ, Tussis, Asthmata, Vomitus, Diarrhœæ mucosæ &c. originem trahunt.
- f Feces alvinæ, quæ raro peccant quantitate, nisi suppressis reliquis excretionibus, aut vitium in qualitate junctum sit.
- g Lympha, cujus quantitatem in subiectis dispositis augent cibi evpepti, multum chyli largientes, & vita otiosa; mala tamen, præter obesitatem nimiam, non facile ab ejusdem copia œconomie animali imminet.

b Lac,



*b Lac*, quod sæpius in insigni quantitate generatur, & mammas vel cum dolore turgidas reddit, vel in magna copia effluit, quæ tamen lactis abundantia, nisi qualitatis vitia jungantur, aut motus per vasa & excretio lædantur, raro aliquod detrimentum producit.

*i Semen* rarius quoque abundantia sua affectus præternaturales causatur, nisi qualitas ejus vitiosa simul conjuncta sit; si tamen in Pollutionibus nocturnis frequentius excernitur, corpus tandem insigniter exinde debilitatur.

*k Saliva* interdum abundat, uti in infantibus dentientibus, hypochondriacis & Ptyalismo, & copia sua vel cibos nimium diluit, vel depravationem gustus producit.

#### B Deficiente.

*a Serum*, quod frequenter deficit, si scil. cibi sufficienti potus copia non diluuntur, quale quid sæpius observatur in feminis hysteriis, aut per frequentiores excretiones absumitur, unde sanguis spissior redditus, tardius per vasa procedit, & variarum stagnationum fit causa: imo ipsæ fibræ ob defectum feri non sufficienter emolliuntur, quare etiam propter minorem flexilitatem ad motum minus apti sunt.

*b Sudor*, cujus defectus vela nimia humorum spissitudine per vitam otiosam contracta, vela feri defectu, vel a nimio & repentino sanguinis ferventis motu ad cutim, cujus pori hoc modo obstruuntur, dependet. Frequentius quoque Sudor manans, dum corpus frigori exponitur, uno impetu supprimitur, unde vel universaliter vel particulariter contracta cuti insignis æstus, Coryzæ, Tussis, Colicæ, Diarrhææ, Febres, Dolores Rheumatici &c. sequuntur.

*c Urina*, hujus defectus interdum pariter a feri consumptione nimia, interdum vero a muco, calculis, vermibus, sanguine grumoso ureteres obstruentibus, interdum vero a nimia renum constrictione aut inflammatione, urinæ secretionem impediens, dependet, unde eundem facile affectus serosi hydropici, imo ipsa mors excipiunt. Numquam etiam suppressionis totalis urinæ causa est nimis diuturna ejusdem retentio.

*d Bilis*, hujus secretio & effluxus ad intestina modo a calculis, modo a constrictione Hepatis, iram graviolem excipiente, modo ab infarctu sanguinis impeditur, unde ob bilem in hepate & massa sanguinea retentam Icterus aliaque incommoda sequuntur.

*e Mucus*, hujus secretio & excretio interdum in partibus huic negotio dicatis impeditur, unde variae stagnationes cum insignibus doloribus circa illas partes oriuntur, v. g. in capite Gravedo & Cephalalgia serosa, Odontalgia-catharralis, in intestinis vero Colica.

*f Feces alvine*, quarum retentionem, ex quacunque demum causa illa fiat, statim insignes lassitudines, pressiones, inflatio abdominis &c. oriuntur.

*g Lympha*, cujus defectum imminutio nutritionis, lassitudo, pallor, viscerum subsidencia &c. sequuntur: motum vero impeditum variae stagnationes glandularum inpr. abdominis tumores, Atrophia &c. excipiunt.

*b Lac*: hujus defectum, a nimia tristitia, terrore, defectu alimentorum, calore interno &c. ortum, variis infantis lugentis morbi sequuntur: suppressioni vero facile tumores inflammatorii, scirrhi glandularum &c. superveniunt.

*i Semen*: cujus impedita secretio & tardior excretio a quacunque demum causa orta fuerit, Generationem impedit.

*k Saliva*: cujus inopia præparationem & resolutionem ciborum in ore impedit, imo etiam Gustus, quoniam fibræ linguæ nervæ sufficienter non irrigantur, maxime imminuitur.

II. *Qualitate*, cujus respectu antea recensiti humores spissitudine, acrimonia, falsedine, corruptione

&c. variorum morborum sunt causæ v. g.

1 *Serum*: cujus fluxilitatem, acrimoniam, falsedinem &c. sequuntur partim excretiones nimiae, partim varia exanthemata, exulcerationes in cute, Diarrhææ, Dysenteriae. Magis noxium vero redditur, si peregrina acria corrosiva ipsi admixta fuerint effluvia per contagium, uti in Lue Venerea.

2 *Sudor*: cujus acrimonia varios effectus cutis cum majori vel minori ejusdem erosione producit, aut ejus fætor varias molestias creat.

3 *Urina*: hæc sæpius respectu nimiae tenuitatis, crassitiei aut contentorum fabulis, sanguinis, mucici, puris &c. variorum affectuum fit causa, qui inpr. in viis urinariis se exerunt.

4 *Bilis*: quæ sæpius insignem acrimoniam, colorem & consistentiam ejusdem alterantem, & hinc febrium ardentium, torminum, Diarrhæarum fit causa.

5 *Mucus*: qui multoties ob majorem falsedinem vel solam, vel cum spissitudine conjunctam, obstructions glandularum, tumores, erosiones &c. producit.

6 *Feces alvine*: hæc sæpius etiam ob admixta varia heterogenea bilem scil. acrem, mucum crassiores, falsum &c. vitiosam acquirunt qualitatem, & hinc intestina aggrediendo torminum variorum, Diarrhæarum &c. causa sunt.

7 *Lympha*: quæ ob spissitudinem, ad quam admodum prona est, facile infarctus glandularum conglobatarum parit, unde nutritio læsa, inflationes partium per quas vasa lymphatica decurrunt, quæ eo graviores redduntur, si aqua lymphæ mixta, sensim vel per poros transudat, vel erosio a falsedine lymphæ vasculis, in cavitates aut interstitia partium infunditur, unde Hidropis varieg species originem ducunt.

8 *Lac*: quod ob spissitudinem in glandulis stagnans tumores mammarum inflammatorios excitat: ob falsedinem vero erosiones papillarum causatur, aut gravia tormina ac Colicam convulsivam in infantibus excitat: si nimis tenue est, ad nutritionem infantis est ineptum.

9 *Semen*: hoc peccat vel spissitudine aut tenuitate nimia, & hinc ad generationem minus aptum est, dum spissum excerni nequit, tenue vero parum virtutis continet: vel acrimonia, unde sequuntur erosiones, dolores insignes &c. uti illud in Gonorrhœa virulenta observamus.

10 *Saliva*: hæc interdum admodum tenax atque viscida redditur, ita ut ad resolutionem prorsus inepta sit, imo acrimonia salina sub illo muco latitans sæpius fauces arrodit, quod eo facilius contingit, si contagium venereum simul junctum est, quod etiam salivam fœtidam reddit: interdum quoque amaritiam acquirit a bile, ac tandem morbis malignis epidemice grassantibus. saliva a contagio inquinata & deglutita similes fermentationes in corpore excitat.

#### Observationes Pathologico-Practicæ.

1 Quo major est feri abundantia, eo facilius etiam, inpr. excretionibus suppressis, sequuntur morbi serosi tam universales, quam particulares, a decubitu feri ad alias partes dependentes.

7 Morbi a ferro oriundi, motu corporis & blandis ac continuatis evacuantibus facile præcaveri possunt.

3 Uti quantitas feri nimia crasin sanguinis & lymphæ turbat, ita ejusdem defectus sanguinis & lymphæ spissitudinem parit.

4 Seri vitia, etiam si appropriata exhibeantur remedia, nunquam corriguntur, nisi simul jungantur evacuantia.

5 Serum vitiosum nunquam ita corrigitur, ut cum Natura redeat in gratiam, sive ut humor utilis fiat.

6 Quo magis Sudor fluit, in subjectis alias ficcis, eo magis corpus exsiccatur & debilitatur.

7 E contra corpora humida sudores etiam largiores optime ferunt,



- 8 Sudores spontanei matutini, non feri tantum, sed & sanguinis abundantiam tollunt, & multos morbos præcavent.
- 9 Suppressiones Sudorum quorumcunque semper periculum minantur, nisi per alia loca feri fiat evacuatio.
- 10 Sudores foetidi feri malum statum indicant.
- 11 Quo magis sudor fluit in hecticis, eo præsentius periculum & mortem instantem portendit.
- 12 Excretiones Urinæ copiosæ semper cum euphoria fiunt, quando aliæ excretiones sunt suppressæ.
- 13 Quo magis supprimitur urinæ, eo facilius sequitur Hydrops, præcipue quando manifesta suppressionis urinæ causa non occurrit.
- 14 Urinam cruentam in senibus aut in consistente ætate facile sequitur calculus.
- 15 Bilis quo magis ab ira excitatur, eo facilius morbos graviores producit.
- 16 Morbi a nimia effusione bilis orti, graviores sunt, quam ii, qui suppressionem fluxus ejusdem sequuntur.
- 17 Jcterus a calculis, vésiculam felleam obstruentibus, ortus, ut plur. est incurabilis.
- 18 Muci excretio e pectore facilius damna infert, quam si per alia loca contingit.
- 19 Quo major in corpore est muci viscidæ copia, eo facilius morbi chronici excitantur.
- 20 Alvi laxitas feri abundantia & sanguinis resolutionem nimiam sæpius indicat.
- 21 Fecæ alvinæ nimium foetentes, in morbis acutis non raro mortem instantem nuntiant.
- 22 In morbis acutis, exceptis exanthematicis, alvus laxa semper melior est quam adstricta.
- 23 Diarrhææ spontaneæ sæpius morbos præcavent.
- 24 Diarrhææ colliquativæ hecticorum mortem instantem indicant.
- 25 Lymphæ defectus facilius mala post se trahit, quam ejusdem abundantia.
- 26 Quo major est glandularum conglobatarum debilitas aut infarctus, eo difficilior etiam lymphæ vitia corriguntur.
- 27 Erosio vasorum lymphaticorum a lymphæ acri orta incurabilis est.
- 28 Lactis effluxus in gravidis abortum sæpius portendit.
- 29 Lac ab ira concitatum facile, convulsiones in infantibus excitat.
- 30 Lactis sine manifesta causa suppressionem, mortem infantis portendere, ex relatione multarum fide digharum feminarum habemus.
- 31 Quo magis subitanea est lactis suppressio, eo facilius affectus varii sequuntur.
- 32 Seminis defectus, organorum secernentium debilitatem pro causa agnoscens, difficilis est curatio.
- 33 Saliva copiosa minoris est considerationis, quam deficiens.
- 34 Saliva præ omnibus aliis nostri corporis humoribus ad fermentescendum apta est; unde gravissimi morbi per eandem Sanguini nostro sæpius communicantur.

*De Rebus toto genere præter Naturam.*

**I. Definitio:** **R**es toto genere præter Naturam sunt causæ morborum materiales, quæ cum corpore & ejus œconomia plane nullam conspirationem habent, ad ejus subsistentiam & conservationem; ex adverso in ejusdem læsionem, imo destructionem quam maxime pronæ, imo promptæ atque efficaces existunt.

**II. Differentia.**

- 1 Quædam in corpore generantur, uti sunt Flatus, Vermes & Calculi.
- 2 Quædam vero corpori ingeruntur, uti sunt absurda deglutita, globuli plumbei, fragmenta gladiatorum, sagittarum, Venena, miasmata pestilentialia cum saliva communicata. De quarum rerum præcipuis seorsim agemus.

*I. De Flatibus.*

**I. Definitio:** **F**latus sunt substantia halitiosa elastica, aeræ quasi indolis, in primis viis potissimum generata, & modo per superiora, modo per inferiora cum vel sine strepitu ac foetore erumpens.

**II. Differentia.**

- 1 Alii per superiora sub *Ructuum* nomine, alii vero per inferiora quos *Flatus* stricte sic dictos vocant, erumpunt, alii in intestinis hærent, & murmura excitando, *Borborygmi* audiunt.
- 2 Alii vero sine strepitu & foetore excernuntur.

**III. Sedes:** Ordinarie in Ventriculo & intestinis generantur, rarius vero in Abdominis cavitate, Utero & Vesica reperiuntur.

**IV. Materia.** Est substantia ad spumescentiam & elasticitatem apta, quam producant alimenta oleracea, fructus horæi, mustum, cerevisia recens, pisa, fabæ, lentes, carnes pingues, salitæ &c.

**V. Subjectum.**

- 1 Homines temperamenti Phlegmatici.
- 2 Vitæ sedentariæ dediti & simul laute viventes.
- 3 Infantes succulenti.
- 4 Femine histericæ passioni obnoxie.
- 5 Hypochondriaci & Hæmorrhoidarii.
- 6 Alvi obstructioni obnoxii.

**VI. Effectus:** latus præter extensionem abdominis magis vel minus sensibilem, facile post se trahunt Inflammationem ventriculi cum symptomatibus cardialgicis, Colicam, Choleram siccam, Passionem Iliacam, Hernias, Tympaniten &c.

**VII. Observationes Pathologico-Practicæ.**

- 1 Quo magis flaccidus & humidus est corporis status, eo facilius generantur flatus.
- 2 Non omnem abdominis inflationem a flatibus dependere testatur Venæsectio in pede, quæ sæpius momento citius illam infimi ventris intumescen-  
tiam tollit.
- 3 Flatulentia, ad quam Hypochondriaci, Hæmorrhoidarii, Hystericæ & Venæsectionem in pede negligentes sunt proni, utpote a sanguinis stagnatione in ramificationibus Venæportæ dependens, non confundenda est cum inflatione abdominis a flatibus stricte sic dictis orta.
- 4 In tali flatulentia nisi præmittatur sanguinis missio, carminativa remedia aliaque exagitantia magis nocent, quam profunt.
- 5 Clysteres in omni flatulentia proficua sunt, inpr. emollientes, leniter carminativi & stimulant.
- 6 Quo majorem flatulentia cum fluxuum sanguinis suppressionibus & stagnationibus connexionem habet, eo pejora & graviora sequuntur mala, tam in inferiore abdominis regione, quam præcipue circa præcordia.
- 7 Ut vita sedentaria & fibrarum flacciditas multum ad flatuum generationem confert, ita motus corporis fibrarum tonum restaurans, ac humores fluxiles reddens, eorum proventum præcavet, aut eosdem jam generatos discutit.
- 8 Quo major est intestinorum atonia, eo major etiam flatum copia generatur.
- 9 Lenia laxantia, inpr. in iis, qui ad alvi obstructionem proni, sunt optima remedia præservatoria, quibus tamen facile palmam præcipiunt Pilulæ veræ Beccherianæ, incidendo, roborando, discutendo & laxando flatuum generationem impediens & generatorum excretionem promoventes.

*De Vermibus.*

**I. Definitio:** **V**ermes sunt insecta ex proprio semine producta, vel in intestinis & quidem ordinarie, vel extraordinarie in aliis partibus hærentia, & varia mala producentia.

**II. Differentia.**

- 1 Alii sunt *ordinarii*, qui scil. in intestinis hærent, & or-



& ordinarie ibidem generantur, uti sunt Lumbrici teretes, latis ac Ascarides.

- 2 Alii sunt *extraordinarii*, qui scil. in intestinis ex proprio semine generantur, aut in ea irrepunt, uti sunt serpentes, Lutones, Ranæ &c. vel in aliis partibus extraordinarie reperiuntur, v.g. vermes ulcerum & dentium cariosorum, vermes cordis & pericardii, umbilicalis, Crinones, Sirones, quorum etiam referri possunt pediculorum stupenda generatio in Phthiriasi.

III. *Generatio*: Plerique generantur ex proprio semine, an vero Lumbrici latiusdem ex semine aliunde advecto generentur, dubium adhuc est.

IV. *Sedes*: Ordinarie reperiuntur in intestinis, rarius aliis in partibus.

V. *Subiectum*: Juniores præ ceteris magis obnoxii sunt vermibus, inpr. Lumbricis teretibus & Ascaridibus; lati autem magis reperiuntur in adultis.

VI. *Effectus*: Pavores in somno, tumor ventris Atrophia, appetitu nihilominus optime vigente, pallor faciei, Febres, Convulsiones, Epilepsie &c. *Plura vide in praxi Speciali de Vermibus.*

VII. *Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 In plerisque infantum morbis respiciendum est ad vermes, quo neglecto sæpius incertum de morbis infantum est iudicium & cura admodum difficilis.
- 2 Lumbrici latis sæpius ingentis sunt longitudinis, an vero unus sit vermis, an vero plures coherentes, nondum constat.
- 3 Lumbrici lati licet sæpius expellantur, facile tamen regenerantur & pristina mala excitant.
- 4 Tates lati lumbrici licet in adultis magis reperiantur, sæpius tamen etiam occurrunt juniores vermibus hisce affecti.
- 5 Morbi sæpius admodum complicati & rebelles a vermibus dependent, quibus excretis, morbi vel sub sua specie apparent, vel prorsus cessant.
- 6 Vermes extraordinarii semper graviora excitant mala, quam ordinarii.
- 7 Vermes in acutis morbis excreti, periculum utpl. portendunt.
- 8 Quo magis lacticiis & dulcibus delectantur infantes, eo facilius etiam vermibus corripuntur.
- 9 Vermes enecantia remedia, sine subjunctis evacuantibus sæpius sunt noxia, quatenus vermes putrescentes aliis gravioribus malis ansam præbent.
- 10 Mercurialia remedia sunt optima Anthelmintica, aliisque palmam præripiunt.
- 11 Amara phlegmaticis, acida vero magis Sanguineis & cholericis profunt.

### 3. De Calculis.

I. *Definitio*: **C**alculi sunt concretiones duræ, compactæ, interdum vero satis friabiles, ordinarie in renibus & vesica; extraordinarie vero in aliis quoque partibus genitæ, variorum effectuum causæ.

II. *Differentia.*

- 1 Respectu loci, aliusest Renum, alius Vesicæ, alius vero in vesicula fellea aliisque locis reperitur.
- 2 Respectu consistentiæ, alius est compactus & gravis, alius friabilis & levis.

III. *Materia*: Est materia mucida, glutinosa, & salino-terrestris, quæ excussis partibus aquosis, sensim sensimque in loco calido majorem acquirit duritiem.

IV. *Subiectum.*

- 1 Homines temperamenti sanguinei, aliique laxiorem corporis consistentiam habentes.
- 2 Senes Plethorici.
- 3 Hemorrhoidarii, Hypochondriaci.
- 4 Viri præ feminis, Plura vide in *Praxi Speciali de Calculis.*

V. *Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Calculus Renum longe frequentior est quam calculus Vesicæ.
- 2 Rariores sunt calculi in vesica fellea, qui Jctæ-

rum gravissimum & incurabilem, si ductum Cycticum obstruunt, producant.

- 3 Juniores calculo non corripuntur, nisi hæreditaria adsit dispositio.
- 4 Feminæ cessantibus Mensibus facilius calculo affliguntur, quam quando Mensium fluxum adhuc experiuntur.
- 5 Generationem Calculi cum Hæmorrhoidum imprimis externarum suppressione insignem habere connexionem experientia testatur.
- 6 Calculi interdum etiam reperiuntur in pulmonibus & glandulis colli.
- 7 Podagrici non solum ad renum calculum sunt maxime proni, sed etiam tophis calculosis in articulis corripuntur.

### 4. De Causis morborum virulentis, sive de Venenis.

I. *Definitio*: **V**enena sunt res summe noxiæ, quæ in exigua quantitate suum acum celeritate & vehementia in partes tam solidas, quam fluidas potentiam suam exerentes, brevi tempore ut plurimum, interdum vero definito, aut etiam incerto tempore lente totam œconomiam animalem, nisi mature iisdem occurratur, turbant & invertunt, ac gravissima symptomata excitant, ita ut mors certissima sequatur.

II. *Differentia.*

- 1 Respectu vehementiæ, alia brevi tempore, alia vero lente agendo homines jugulant.
- 2 Respectu operationis, alia agunt dissolvendo humores per motum fermentativo-putredinosum, uti venena animalium, morsus viperarum, serpentum &c. Alia corrodendo partes solidas & viscera, uti mineralia v.g. Arsenicum, Mercurius sublimatus &c. Alia stupore afficiendo fibras, uti vegetabilia, Napellus, Cicuta, Hyoscyamus &c. *Plura vide in Praxi Speciali.*

III. *Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Quo magis sensibilia sunt subiecta, eo citius etiam graviores turbæ in corpore excitantur, & contra.
- 2 Si ullibi, in venenis sane sumptis Naturæ relictantis & contra deleteriam causam pugnantis motus observantur.
- 3 Quamvis venena ut plur. forinsecus corpori ingerantur, nonnunquam tamen humores agiles excrementitii, remediis aut methodo inconvenienti exagitati, veneni naturam induunt, & homines cito jugulant.
- 4 Nullus fere post venenum sumptum sine convulsionibus moritur.
- 5 Venena mineralia sumpta citius motus anormales producant, quam reliqua.
- 6 Quo magis subtilia sunt venena, eo certius etiam mortem inferunt.
- 7 Rationes energiæ venenorum, quomodo in exigua quantitate & mole citissime tam deleterios effectus exerere possint, admodum in obscuro adhuc latent.

### De Motibus Naturæ extraordinariis propter causas morbificas contingentibus.

I. *Definitio*: **M**otus morbifici sunt extraordinariæ motuum alias consuetorum interdum intensiones a Natura irritata institutæ, ut res corpori insensæ expellantur, interdum vero eorundem motuum remissiones Naturæ debilitatem, aut terrorem indigantes, variis extraordinariis etiam molestiis stipatæ.

II. *Differentia.* a motibus ordinariis.

- 1 Respectu *vehementiæ*, qua extraordinarii ordinarios longe superant ita ut ab ægrotis non tantum, sed & a Medicis & adstantibus observentur, v.g. Pulsus in febribus, tonus auctus in convulsionibus.
- 2 Respectu *durationis*: præternaturales enim non solum vehementes sunt, sed etiam in vehementia



tia sua vel diu continuant, vel sæpius recurrunt.

3 Respectu *Organorum* & loci excretionis: quamvis enim utplur. pulsu & tono tam interiorum, quam exteriorum partium Natura utatur, & materias noxias per convenientia & consueta loca expellat, nonnunquam tamen in morbis ope motuum ad loca insolita materias excernendas protrudit, & per eadem expellit.

4 Respectu *ordinis*: quod extraordinarii tales motus nonnunquam vel minus præcipites & vehementes sint, nonnunquam vero vel sensibilibus remittant, vel prorsus in toto corpore, aut quibusdam ejus partibus cessent, aut etiam remota causa materiali continentur.

III. *Causa efficiens*. Uti ordinariorum, ita quoque extraordinariorum motuum vera & unica causa efficiens est Natura sive Anima humana, quæ per motus secretorios & excretorios non tantum in statu sano materias ad corporis conservationem inutiles removet, sed etiam in morbis plerisque per eosdem motus auctiores, adeoque respectu ordinariorum & naturalium præternaturales materias extraordinarie e corpore expellit, ad hoc modo corpus ab interitu imminente vindicat; unde etiam respectu finistales extraordinarii motus merito salutares vocantur. Nonnunquam tamen etiam Natura in hisce motibus errat, & hinc morbi in pejus ruunt, de quibus erroribus mox specialiter agemus.

IV. *Observationes Pathologico-Practicæ*.

- 1 Motu fere omnes in morbis observabiles utpl. certæ sequuntur excretiones, quæ, si morbo aliisque circumstantiis respondent, cum euphoria contingunt.
- 2 Morbi, ubi motus tales manifesti reperiuntur, minoris utplur. sunt periculi, quam ii in quibus imminuti sunt.
- 3 Motus in morbis antea satis sensibiles subito cessantes, aut sensibilibus ante consuetum morbi tempus remittentes, utplur. periculum portendunt.
- 4 Motus per solam consuetudinem, remota causa morbifica, continuantes, non sine insigni difficultate tolluntur.
- 5 Motus neque morbo neque temperamento convenientes, adeoque incongrui semper sunt periculosi.
- 6 Quo majus periculum in corpore latet, eo vehementiores utplurimum a Natura instituuntur motus.
- 7 Ideoque non semper ob molem materiæ morbificæ in insigni sæpius quantitate peccantis, sed ob æxistimationem periculi a Natura finaliter agente fiunt.

De *Molestiis Naturæ motus necessario consequentibus*, sive de *Symptomatibus*.

I *Definitio*: **S**ymptomata sunt molestiæ præternaturales motus Naturæ in morbis necessario, sive ut umbra corpus, sequentes.

II. *Differentia Symptomatum eorumque Generatio*:

(Quicquid Natura ad conservationem corporis in morbis molitur, tendit ad Secretiones & Excretiones, quem finem, ut obtineat, duobus utitur instrumentis, Pulsu scil. cordis atque motu tonico, tam in exterioribus, quam in interioribus partibus sese exerente, eoque vel intensiore vel remissione; & hinc etiam quæcunque in morbis observantur molestiæ, sequuntur vel pulsum, vel tonum intentum, aut remissum: id quod, ut eo melius appareat Symptomatum generationem in generalibus quibusdam morborum differentiis ostendamus, Specialis enim explicatio ad prolixitatem h.l. evitandam reservatur partim Pathologiæ speciali, partim privatæ in Collegiis explicationi.)

1 In *Hæmorrhagiis*: hæ præsupponunt Plethoram, tanquam causam materiales & quidem commotam, hanc ergo ad morbos producendos pronam, Natura imminuere satagit, quem in finem totus

in partibus remotioribus constringitur, quæ hinc fiunt pallidæ, vasa detumescunt & simul etiam in iis partibus aliquale frigus sentiunt ægrotantes: dum vero sanguis e partibus ita constrictis expellitur, & uberius influxus impeditur, necessario major sanguinis fit translatio ad partes alias, & imprimis ad eas, per quas sanguinis excretio fieri debet; intumescunt hinc vasa & molestiæ sentiuntur variæ, in *capite* quidem præter ruborem & turgescunt faciei, aliqualis vertigo, stupor, aut etiam capitis dolor, tinnitus aurium, pruritus narium &c. In *pectore* gravativus dolor, respiratio difficilis &c. In *Ventriculo*, ante vomitum cruentum angustia præcordiorum, constrictio hypochondriorum: aut etiam dolor in hoc vel illo latere se exerens, dolor dorsi &c. In *Hæmorrhoidibus*, varius motus in *abdomine*, dolor & gravitas lumborum; tensiones Hypochondriorum, sensus rei duræ in intestino recto hærentis & interdum dolor urens &c. In *Mensibus* & *Lochiis* nimis, spasmodicæ constrictiones in hypochondriis, dolor gravativus circa lumbos & inguina, horror in partibus extremis &c. In *Renibus* tensio & gravitas in lumbis &c. & hæ molestiæ omnes ex necessitate consequentiæ sequuntur, quæ tamen erumpente sanguine facile cessant.

2 In *Congestionibus* & quidem

a *Completiis* sive simplicioribus: hæ respiciunt Hæmorrhagias, quas Natura ope motus tonici molitur, ac hinc sanguinis motum versus loca Hæmorrhagiis destinata dirigit. Cum vero excretio partim ob nimiam congesti sanguinis copiam, partim ob ejus spissitudinem, partim ob motus congestorios insufficientes, aut vasorum angustiam fieri nequeat, ex necessitate consequentiæ generaliter tanquam symptomata, inflationes vasorum, dolores tensivi, gravativi, pungentes, robur, calor præternaturalis, & quidem in partibus, ubi congestiones factæ sunt, in remotioribus vero actuales stricture cum vasorum detumescencia, frigore &c. sequuntur. Specialiter vero in Congestione ad Caput, dolores capitis cum inflatione & rubore faciei, dolor oculorum cum prominentia & rubore, Odonalgia, Otalgia &c. ad Pectus: Oppletiones pectoris, respirandi difficultas insignis &c. ad Hypochondria: Anxietates præcordiorum cardiacæ, inflationes ventriculi, nausea, stricture dolorificæ in Hypochondriis &c. ad Hæmorrhoides, Renes & Uterum: pressionem & tensionem in lumbis, dolores dorsi &c. oriuntur: quæ tamen omnia symptomata insequente sanguinis fluxu tolluntur.

b *Incompleteis*: in quibus Natura quidem ope motus tonici sanguinem ad loca Hæmorrhagica, sed incomplete & minus tantum dirigit. Unde, dum sanguis hoc modo circa illa loca stagnat, ac ad eruptionem pervenire nequit, & simul dyscrasia jam antea peccat, aut eam sub hac stagnatione concipit, variæ hinc in illis partibus oriuntur molestiæ ab infarctu scil. & decubitu sanguinis, dolor tensivus, inflatio partis, gravitas ac ad movendum impotentia, a dyscrasia ejusdem acri, rodens calor, & in partibus exterioribus calor inflammatorius rubicundus; a motibus universalibus commotiones febriles, ac frigoris & caloris alternationes: a particularibus vero dolores lancinantes & vibratiles in parte affecta, rupturæ quasi sensum in partibus tensis, sub leviori motu, inferentes &c. Quæ molestiæ omnes eo graviores fiunt, si circa partes tendineas, ob humorum decubitus tales spasticæ fiunt partium fibrosarum constrictiones. In quibus tamen omnibus motibus insignem errorem committit Natura, uti mox, ubi de Naturæ erroribus sermo erit, audiemus.

3 In *Stasibus Sanguinis* & *Inflammationibus*: in hisce sanguis coagulatus & motu progressivo privatus, facile propter motum intestinum putredinem concipit,

C

cum



cum vero hæc facile latius serpere, & non solum partes solidas vicinas, sed etiam universam sanguinis massam ac reliquum corpus corrumpere soleat, Natura hancce per inflammatoriorum actum & præservat, & sæpius profligat. Præstat autem hocce motu vel partiali tantum, vel generali, uti in febribus inflammatoriis. In utroque casu sanguinem per motum tonicum dirigit ad partem affectam, ut a majori sanguinis copia, per eandem cum impetu transeunte, coagulatus sanguis sensim resolvatur, & illud quod corruptum est sensim eluatur, atque remotis hoc modo particulis activis fermentescentibus materia pulposa innoxia, quam pus vocant, relinquatur. Quamvis ergo totus hic actus tendat ad corporis conservationem, variæ tamen molestiæ eum necessario comitantur: dum enim major sanguinis copia in & per partem affectam fluit, non solum calor partis, sed etiam tumor ejusdem oritur, & si inflammatio cutim attingit, hæc insigni rubedine a sanguine, per poros minorescum impetu trajecto, & hinc maxime fluxili reddito, afficitur. Jungitur etiam huic dolor eximius, quippe si sanguis per fibras tensas & ideo admodum sensibilis trajicitur, non potest non ob fortio rem sanguinis ad fibras appulsum dolor oriri, quem pulsus arteriarum fibras continuo feriens auget, & hinc dolor ille pulsatorius originem trahit. Quando autem in partibus interioribus sive visceribus talis sanguinis contingit Stasis, majori quoque motuum apparatu opus est, nempe febrili, ut hujus ope, grave æconomix vitali imminens periculum mature tollatur, unde etiam molestiæ huicce motibus junctæ longe graviore sunt.

#### *a. In Febris & quidem*

*a. Intermittentibus*: harum causa est ordinarie materia viscida, vel in primis viis, vel circa easdem hærens, quæ etsi activæ non sit indolis, sensim sensimque tamen sensibilia incommoda, appetitum & digestionem lædenda producit, quod eo facilius contingit, si forsan materia altius ipsis impacta hæret visceribus. Cum ergo hæc materia sit præternaturalis, necessario ad præcavenda damna e corpore expelli debet. Præstat hoc Natura præcipue motu tonico, cujus ope universum habitum corporis eum quidem in finem constringit, ut major sanguinis copia feratur ad interiora, & specialiter ad ventriculum, intestina, ac viscera huicce proxima, quo beneficio uberius secretionis & excretionis liquoris serosi gastrici materia illa eluatur, & ad excretionem disponatur. Quem finem etiam Natura sæpius obtinet, dum materiam morbificam vel per superiora, vel per inferiora ejicit, ac hoc modo febrem aliquoties recurrentem in subjectis junioribus & vegetioribus, sine artis Medicæ concursu, sensim sensimque profligat. Quamvis autem primus hic actus febrilis sit salutarius, & ad corporis conservationem tendat, variæ tamen eidem molestiæ ex necessitate consequentiæ junguntur: *primo* enim ob constrictionem habitus corporis & ob denegatum hinc uberiorem sanguinis influxum, color habitus corporis floridus & turgidus ejus status perit, locumque eorum insignis pallor & contabescencia quasi, cum vasorum subsidencia occupat, quem *secundo* frigus extremorum & horror sequitur. Excipit *tertio* hæc molestias notabilis anxietas, præcordiorum & nausea, partim a congestione sanguinis circa hæc loca stagnante, partim a conatu vomendi, quem sæpius etiam actualis vomitus sequitur, dependens. Quibus *quarto*: remittente horrore & peracto vomitu insignis totius corporis lassitudo accedit.

Cum vero sub hoc ipso primo febris actu, sanguis circa interiores partes concipiat spissitudinem æconomix animali inimicam, damna ab ea metuenda necessario præcaveri debent. Quare Natura ad fluxilitatem sanguinis restituendam, relaxato aliquo modo habitu corporis antea in-

signiter constricto, ut humoribus in eum liber pateat aditus, pulsus cordis antea tardum, raram, parvum atque oppressum auget, ut sub hujus celeriore & frequentiore motu, sanguis magis conquassatus pristinam adipiscatur fluxilitatem. Redit hinc color faciei, habitus corporis calidus & turgidus redditur, ac vasa antea satis exilia iterum intumescunt, cum pulsu pleno & magno. Cum vero pulsus in celeritate & frequentia non solum per momenta augeatur, & jugiter continuet, increbescit hinc ob nimiam sanguinis conquassationem calor, & ægro satis molestus fit: jungitur huic sitis, facies turgida & rubicunda redditur, ac ob nimiam ebullitionem sanguinis vasa insigniter extensa eximium producant dolorem capitis, quæ omnia tanquam inseparabilia consecutaria motum sanguinis auctiorem sequuntur.

Dum autem sanguis sub hoc ipso æstu insignem concipit fluxilitatem, & multum simul sanguinis per frequentiore & diuturnam conquassationem, & per partes porosas transpressionem, in serum inutile convertitur, necessitas requirit, ut corpus ab eo liberetur, quod quidem omnium promptissime hoc in casu fieri potest per sudorem largiorem: & hinc etiam Natura habitum corporis & poros relaxat, ut humores majori copia eo propelli, & serum superfluum excerni possit, quod si prompte contingit, cessant priores molestiæ, atque cessantem paroxysmum nil nisi debilitas & fatigatio corporis sequitur.

#### *a. Continuis: iisque*

*1. Ardentibus*: harum causa utpl. est biliosa, unde etiam facile in subjectis Cholericis post gravem iracundiam excitantur. Bilis itaque hæc, dum in primis viis acrimonia sua varias turbas excitare solet, mature removenda est: quare Natura in hisce febribus ordinarie sub principium exacerbationis horrorem leviorum aut horripilationem excitat, ut hujus ope ex humoribus ad interiora latis, major fiat secretio & in intestina excretio, ac humores biliosi temperentur. Cum vero in subjectis biliosis humores quoque biliosi in Massa sanguinis abundant, & sanguis etiam hinc ad majorem calorem concipiendum dispositus sit, maximus quoque ob pulsus celeriore & fortiore excitatur æstus. Sed cum omnis naturæ labor ad evacuationem bilis in primis viis hærentis tendat, habitus corporis semper est strictus, & hinc calor, sive æstus ordinarie est aridus, ac circa interiora & in præcordia eo magis urget, unde anxietates, inquietudines, ariditas faucium, sitis intensa & clamosa oriuntur, quæ tamen omnia, facta bilis per Vomitus aut Diarrhœam excretionem, mitiora redduntur. Quod si vero nulla excretio sequatur, eo magis æstus circa interiora urget, & vel inflammationem intestinorum cum Febre Lipyria, vel Aphthas, aliosque mortis prodromos excitat.

*2. Continentibus sive Synochis*: harum causa materialis est Plethora, quam Natura imminuere conatur; quare pulsus auget, ut hujus ope sanguis per frequentiores conquassationes fluxilior redditus, eo facilius per Hæmorrhagiarum evacuationem, aut insignis ejus portio in serum conversa, per sudorem excerni queat. Quo autem huncce finem eo facilius obtineat, stringit simul habitum corporis & poros arctiores reddit; unde dum sanguis per poros minores magno cum impetu continuo transpellitur, in minores sensim dirimitur partes & insignem acquirit fluxilitatem. Sed hoc ipso magnus etiam excitatur æstus & sitis, cum Cephalalgia satis acerbata, rubore faciei & oculorum, vertigine, tinnitu aurium, inquietudinibus & Deliriis &c. Quæ tamen molestiæ facile, si Hæmorrhagiarum critica die quarto vel septimo in junioribus congestioni huic sanguinis in capite factæ super-



supervenerit, evanescunt: id quod etiam contingit, si in ætate consistente sudores vel critici, vel successivi erumpunt. Quod si vero prorsus nulla excretio contingit, præter anxietates insignes, facile Phrenitides, Convulsiones, Anginæ, Peripnevmonia aliaque internæ inflammationes a sanguine nimis commoto excitantur.

3 *Continuis* stricte sic dictis, sive Catarrhalibus aut Phlegmaticis Veterum, quæ etiam continuas quotidianas vocant: harum causa materialis est lymphæ mucosa, a sero falso acri inquinata, ad stagnationes & partium erosiones prona. Ut ergo Natura hæc Lymphæ vitia corrigat, ac mala majora imminetia præcaveat, excitat hæc febres lentas quidem, sed tamen acutas & periodos exacte servantes. Per tales lenes commotiones febriles, lymphæ sensim sensimque attenuatur, & optime per Diaphoresin partes serosæ successive expelluntur. Quod si vero Lymphæ spissior per motus febriles ad colatoria mucæ fertur, & ibidem stagnat, variæ circa illas partes excitantur molestiæ, ac Gravedines, Cephalalgia gravativæ, Deliria, Tussis, Pleuritides, Aphthæ, Anginæ &c. sequuntur.

4 *Exanthematicis*, e quarum classe Variolarum saltem generationem enarrasse sufficiat: harum causa ordinariæ est materia quædam subtilis, acris causæ indolis, quam Natura per febrem subigere & expellere nititur. Tribus primis diebus præparatur illa materia, & ad excretionem disponitur, sub hac ipsa autem præparatione variæ accedunt molestiæ febrem comitantes, estus, sitis, dolor capitis, dorsi, convulsiones &c. quæ partim alterationem in Tono, partim Pulsum febrilem sequuntur, ac die quarto erumpentibus Variolis cessante pulsu febrili & alteratione toni, vel notabiliter imminuuntur, vel prorsus evanescunt; atque hoc modo Variolæ placide ad finem usque septimi erumpunt. Cum vero hoc ipso tempore Variolæ facile subidere, & cum insigni periculo retrocedere queant, febris denuo accenditur, aut juxta aliorum mentem nova, nimirum inflammatoria supervenit, cujus ope sanguis ad peripheriam corporis eum quidem in finem pellitur, ut retrocessio impediatur, & maturatio pustularum promoveatur: unde sub hoc ipso maturationis tempore habitus corporis est inflatus, ac rubet & dolet; quæ symptomata maturis pustulis undecimo die cessant. Et hæc de Symptomatum generatione sufficiant.

### III. *Observationes Pathologico-Præcticæ.*

- 1 Qui generationem Symptomatum ordinariarum intelligit, facile etiam extraordinaria ab iisdem poterit dignoscere.
- 2 Multa Symptomata in morbis occurrentia magis debentur imprudenti medicationi, quam motibus Naturæ in morbis regularibus.
- 3 Quo magis a recto tramite deflectunt motus in morbis, eo graviora etiam excitantur Symptomata.
- 4 Respectus non tam ad Symptomatum vehementiam & pluralitatem remediorum in curatione dirigendus, quam mali originem & fontem.
- 5 Qui illud tantum faciunt, sæpius salutarem morbi typum sinistra medicatione insigniter pervertunt, cum posteriori modo & ipsis Symptomatibus optime succurratur.
- 6 Quo vehementiora Symptomata uno impetu & spontaneo Naturæ conatu ingruunt, eo major de graviore morbi ingressu suspicio habenda est.
- 7 Symptomata acerbiora subito evanescentia, plerumque lethalem catastrophem post se ducunt.
- 8 In morbis malignis Symptomata sæpiissime admodum sunt abscondita, Medicusque & egrotus per apparentem valetudinis speciem decipitur.
- 9 Melius est in morborum initiis & ante statum Symptomata urgere, quam in declinatione.

*De Erroribus Naturæ in motibus morborum causis oppositis & damnis exinde provenientibus.*

#### I. *Definitio:*

Errores Naturæ sunt malæ pulsus & toni, ut & motuum secretoriorum ac excretoriorum inconvenienti modo tempore ac ordine institutorum administrationes, varia mala post se trahentes.

#### II. *Differentia.*

- 1 Respectu *organi*, alii errores a Natura comittuntur in pulsu, alii in tono, alii in utroque simul.
- 2 Respectu *gradus*, quando tales motus erronei vel ob causam minoris etiam momenti nimium intenduntur, vel causa graviore præsentem, prorsus intermittuntur, aut saltem debiliter, aut cum trepidatione ac tergiversatione instituuntur.
- 3 Respectu *viarum* sive locorum excretoriorum, quando materiæ vitiosæ ad insolita loca vehuntur & per eadem excernuntur.
- 4 Respectu *quantitatis* materiæ excernendæ, quando vel in nimia copia, vel prorsus non, aut insufficienti copia evacuatur.
- 6 Respectu *temporis*, quando materia quæ criticis aut periodicis diebus excerni debebat, intermedie evacuatur.

III. *Causa efficiens* talium errorum est Anima vitaliter in corpore agens, quæ uti propter peccatum in moralibus, ita & in vitalibus actionibus ad errandum admodum prona est: & hinc vel motus necessarios in corpore instituere nescit, vel eosdem excitare neque vult, neque potest.

IV. *Effectus* & damna talium errorum sunt varia, quæ observantur.

- 1 In *Hæmorrhagiis*: quas quidem Natura in subjectis Plethoricis per diversa loca, respectu ætatum, ad imminuendam Plethoram instituit, & hoc modo corpus a multis malis, ab abundantia sanguinis pendens, vel præservat, vel liberat. Errat vero sæpius in hisce, quatenus in ipsa evacuatione sæpius excedit & plus sanguinis, quam quidem præsens corporis status postulabat, & quidem vel uno impetu, vel sæpius repetitis vicibus evacuat, ita ut corpus exinde maxime debilitetur, aut variis aliis malis, via sternatur. Pariter errat, quando iis in subjectis, in quibus tales Hæmorrhagias cum fructu instituere poterat, motus ad Hæmorrhagiam producendam necessarios prorsus intermittit, aut sanguinem per insolitas vias, aut per loca satis periculosa evacuare nititur: quemadmodum tale quid contingit in excretionem mensium per vomitum, umbilicum, aut in aliis subjectis per pulmones & renes.

#### 2 *Congestionibus* & quidem

a *Completa*, quando motibus illis quidem sanguinem ad loca Hæmorrhagiis destinata propellit & sanguinis evacuationem molitur, cito tamen a motibus illis iterum vel desistit, vel eosdem sufficienti robore non instituit, ita ut sanguis erumpere queat, vel relicto loco minus periculoso ad partes nobiles & interiores congestionem insigni cum periculo instituit, & hinc variis stagnationibus, stasibus inflammatoriis & corruptionibus ulcerosis viam sternit: vel quando in subjectis ad Hæmorrhagias minus dispositis pertinaciter in intentione sanguinem evacuandi persistit, ac hinc per motus fortiores spasticos non solum gravissimos dolores, sed & ob sanguinem, nimis diu in talibus partibus incarceratum, gravibus aliis affectibus, Inflammationibus, corruptionibus &c. occasionem præbet.

b *Incompleta*, quando in subjectis Plethoricis Hæmorrhagias quidem, sed e longinquo tantum molitur, sive ut clarius loquar, quando per motum tonicum sanguinem quidem versus, non vero in loca Hæmorrhagiis destinata propellit, ac motus spasticos semper augendo gravissimos dolores excitat: aut quando sanguinem in loca ad Hæmorrhagias prorsus non disposita, uti sunt



partes extremæ, impellit, & ibidem pertinacibus atque summe dolorificis spasmodicis excretionem molitur, ac etiam si excretio ibidem sit impossibilis, postea eadem pertinacia Plethoræ imminutionem denuo quærit, talesque excretiones tandem molitur, donec illi motus prorsus in consuetudinem abeant: quale quid contingit in affectibus arthriticis partium tam superiorum, quam inferiorum, ubi quidem in principio intentio Naturæ erat sanguinem vel per Hæmorrhagiam narium, vel per Hæmorrhoides evacuandi, quæ quoque evacuatio sæpius sequitur, quam primum vero aliquod obstaculum partim propter vasorum angustiam, partim propter sanguinis spissitudinem obijcitur, relicta illa via excretionis ordinaria, sanguis ad partes musculosas illarum partium transfertur ac per graves spasmos in cervice, capite, scapulis, dorso, pectore, lumbis, femoribus, genibus, pedibus &c. ejusdem evacuationis a Natura tentatur.

3 In *inflammationibus*, quando Natura sanguinem in levioribus etiam casibus nimia copia in partes inflammatas impellit, atque hoc modo stasim inflammatoriam auget, ubi quidem intentio laudabilis est, partes corruptas per affluentem sanguinem eluendi, sed insignis tamen, nimiam sanguinis copiam ad partem affectam transferendo, error committitur: aut quando sanguinem ad partem affectam prorsus non dirigit, ita ut hinc putredo tandem integra membrum occupet, iisque mortem inferat, uti id in Gangræna & Sphacelo observamus, qui affectus sæpius a levissimis inflammationibus originem trahunt.

4 In *Infarctibus* & Scirrhis viscerum a sanguine originem trahentibus: quando principium vitale sanguinem, qui per Hæmorrhoides aut per Vomitum cruentum excerni debebat, ope motuum spasticorum in hepate vel liene incarceratum detinet, ea quidem semper intentione dictum sanguinem evacuandi, sed cum sanguis hic ob diuturniorem moram semper spissior ac hinc inhabilis ad excretionem magis magisque reddatur, tandem absumptis partibus aquosis fluxilibus scirrhum visceris, in quo hæret, producit, qui tandem successu temporis exulcerationem & Hæcticam post se trahit. Et etiam si talis sanguis interdum per Vomitum sub forma materiæ nigricantis ad instar Rob sambuci aut picis evacuetur, raro tamen salus exinde speranda est, quoniam talem excretionem nihilominus Hæctica aut Hydrops non raro sequuntur.

5 In *motibus* & quidem

a *Auclis*, quando Natura, a levissimis etiam causis aut ab ira excitata, gravissimos statim spasticos ac convulsivos instituit motus, quibus tamen vel parum ad salutarem finem tendens obtinetur, gravioribus malis porta panditur v. g. quando præsentem Plethoræ, aut eadem leviter per iram aliasque causas etiam commota, Natura statim convulsivos motus ad imminuendam Plethoram excitat, quibus tamen vel prorsus nihil salutare efficit, siue aliquid excernit, vel sanguinem uno impetu cum insigni vitæ periculo expellit, aut etiam ubi interdum prorsus nulla excretio speranda est, nihilominus per frequentes & sæpius repetitas convulsiones, tandem in consuetudinem degenerantes, illud quod ipsi molestum videre expellere conatur.

b *Imminutis*, quando ob verum, vel imaginarium imminens periculum subito ab omni vel pulsu vel tono vel utrisque Natura desistit & corpus gravi periculo exponit, id quod non solum in statu sano, sed etiam morbofo sæpius observatur, ubi frequenter ob leviores causas remissiones talium motuum, & lipothymia oriuntur.

6 In *Febribus*, ubi quidem Natura sæpius errat, quando materiæ morbificæ, quæ per habitum corporis expelli debebant, hoc constricto ad interiora cum insigni periculo feruntur: aut quando præsentem etiam leviori causæ motus febriles fortiores, vel vice versa graviore remissiones opponuntur: aut etiam quando

Natura materiam, quæ per lenem tantum diapnoen expelli debebat, per fortiores motus febriles tam in tono, quam in pulsu se exerentes, interim tamen placidam excretionem magis impediunt, quam promoventes, aut per largiores & continuatos sudores, expellere conatur, quale quid sæpius observatur in Febribus malignis: aut quando id quod per motum tonicum partium internarum ad habitum corporis propulsum fuit, per motum partium externarum siue earundem constrictionem, & quidem ob levissimas causas externas, lenem scilicet refrigerationem, aut imaginarium terrorem retroagit, quod sæpius observatur in Febribus exanthematicis: aut tandem quando Natura vel ob terrorem panicum, uti in Peste, vel propter malam consuetudinem, vel propter timorem &c. motus cum ingenti periculo perverte & male instituit. Ut alia, quæ ob prolixitatem huc trahi nequeunt silentio prætereamus.

#### V. *Observationes.*

- 1 Quo magis sensibilis est Natura, eo magis ad errores est prona.
- 2 Animi pathemata maximos sæpius producant errores in morbis & morbos etiam optime procedentes maxime pervertunt.
- 3 Quo minus Natura motibus assueta est morbificis, eo facilius in morbis errores committit.
- 4 Si in erroribus habitum quasi acquisivit Natura, frustranea ut plurimum sunt remedia.
- 5 Errores in morbis acutis & inpr. exanthematicis citissime sequuntur damna funesta.

#### *De Erroribus Medicorum Practicorum.*

##### I. *Definitio:*

Errores Medicorum Practicorum sunt aberrationes a vera Medendi Methodo, quando, neglecta Naturæ via, remedia vel inconvenientia in morbis applicant, vel convenientia quoque debito tempore non exhibent, & sic morbos cum damno ægrotantium eorumpunt.

##### II. *Causæ* talium errorum sunt:

- 1 Theoria falsa cum Praxi nullam connexionem habens, siue Theoria imaginaria.
- 2 Defectus veræ Historiæ morborum, tam Pathologicæ, quam practicæ.
- 3 Neglectus Methodi Naturæ, cui artificialis Methodus Medendi superstructa esse debet.
- 4 Neglecta distinctio Temperamentorum, Ætatum, Consuetudinis, Sensibilitatis &c. in exhibendis remediis. Quæ & adhuc alia originem trahunt a debilitate iudicii Practici, negligentia, temeritate, timiditate &c.

##### III. *Effectus*, & damna errores tales sequentia: & quidem

- 1 In *Praxi generali*, in qua gravissimi committuntur errores a Medicis Practicis, quatenus fere in omnibus morbis, & inpr. in acutis, ad vulgo sic dicta Universalia, Vomitoria, Venæ-Sectiones & Purgantia repetita confugiunt, iisque ægrotantium vires, cum tamen Indicatio Vitalis omnium præcipua esse debeat, in morbi principio & augmento frangunt, ita ut hinc Natura in statu necessario succumbere cogatur. Certum quidem est Universalia præmitti debere, sed anne sola Vomitoria, Purgantia & Venæ-Sectiones sunt Universalia? Minime. Nam per Universalia intelligi debent omnia ea, quæ corpus ejusque humores ita disponere solent, ut postmodum Specifica, quibus præmitti debent Universalia, sine impedimento efficaciam suam exferere possint: Scilicet quæ humores superfluos evacuando imminuunt & malam eorum dispositionem corrigunt. Adeoque ad Universalium censum non sola Vomitoria, Purgantia & Venæ-Sectiones, sed & reliqua Evacuantia, Diaphoretica, Diuretica, Salivantia &c. ut & omnia Alterantia, Absorbentia, Incidentia, Resolventia &c. pertinent. Et quænam quæso sunt illa Specifica, quæ præmissis Universalibus, postmodum exhibentur? nonne sunt Evacuantia & Alterantia v. g. Antim. diaph. Mat.



ph. Mat. Perl. Conch. præp. Nitroſa, Cinnabari-  
na, Salia &c. Graviffime pariter errant Præſti-  
ci in morbis, quando nimis multa præſcribunt reme-  
dia, iisque ægrotos obruunt, quo quidem nihil aliud,  
quam neceſſariarum Secretionum & Excretionum  
in morbis perturbationem, morborumque vel in pe-  
jus mutationem vel in diuturnum tempus protractio-  
nem obtinent. Uti autem multi in exceſſu vulgo ſic  
dictorum Univerſalium & multitudine remediorum,  
ita etiam non pauci in defectu & mala remediorum  
adminiſtratione peccant, quatenus vel dicta Univer-  
ſalia prorsus, ubi tamen iisdem opus erat, negli-  
gunt, vel ea, tanquam minus neceſſaria imo noxia,  
contemnunt, aut ubi continuatio remediorum aut  
major eorum, doſis requiritur, minores tantum do-  
ſes exhibent, aut a continuato uſu deſiſtunt, & mo-  
do hæc, modo alia cum damno iisdem ſubſtituunt.

#### 2. In Praxi Speciali & quidem

a In Hæmorrhagiis, quibus non pauci ſolis, iisque  
fortioribus adſtringentibus obviam eunt, quæ ta-  
men tantum abeſt, ut aliquod emolumentum af-  
ferant, ut potius vel ſanguinis fluxum exaſperant,  
aut graviora damna, ſanguinis ſuppreſſiones alias  
excipientia, Dolores, Infarctus, Scirrhus, Inflam-  
mationes, Exulcerationes, Hæcticas, Hydropes &c.  
poſt ſe trahant. Tanto certius vero errores com-  
mittuntur, ſi Opiata in largiori doſi, uti ſæpius  
feri ſolet, iſſis admifcentur: cum tamen in largio-  
ribus Hæmorrhagiis vel revulſoriis Venæſectioni-  
bus ac temperantibus, nitroſis, leniterque adſtrin-  
gentibus remediis ac gemmatis curationem aggredi  
ſatius eſſet. Nec minores errores in ſanguinis flu-  
xuum ſuppreſſionibus committuntur, quando in  
hiſce myrrhata, ſuccinata, aloetica, Volatilia in  
majori aut ſæpius etiam repetitis doſibus exhiben-  
tur, quoniam talia utpl. aut majores ſuppreſſiones  
aut ſanguinis ad alia, & magis periculofa loca,  
translationes producant.

b In Congeſtionibus tam completis, quam incomple-  
tis, & ab iſſis dependentibus doloribus conge-  
ſtoriis, rheumaticis & arthriticis, quos multi O-  
piatis compeſcere audent, quorum tamen uſum  
utplurimum majores Infarctus, Staſes ac Inflam-  
mationes ſequuntur: ut taceam, Opiata talia in-  
terdum ad breve tempus dolores ſiſtere, eoſdem-  
que paulo poſt gravius recrudeſcere. Pariter er-  
rant, qui ſine urgente neceſſitate in talibus dolo-  
ribus Venæſectiones inſtituunt, quatenus tempo-  
rarium tantum ſunt auxilium, & utpl. ad facilio-  
rem recidivam diſponunt: præſervationis vero  
gratia tales ſanguinis miſſiones optimæ ſunt.

c In Staſibus Inflammatoriis, quando per externa  
repellentia tractantur, aut quando motus ſaluta-  
res ad resolutionem ſtaſeos neceſſarii per nimia  
refrigerantia, adſtringentia, opiata, Venæſectio-  
nes nimias, neglectis remediis reſolventibus &  
diaphoreticis, ſupprimuntur.

d In Fluxibus feri, quando ſudores aſtocratici &  
Diarrhææ ſpontaneæ per adſtringentia & opiata  
frequentius & largius exhibita cohibentur: quan-  
do Gonorrhææ & Fluor albus præmature ſuppri-  
muntur & hoc modo gravibus malis via ſterni-  
tur: aut quando tuſſes periodicæ neglectis revel-  
lentibus, reſolventibus, diaphoreticis, diureticis  
&c. per expectorantia tractantur, atque hiſce  
afluxus humorum ad pectus magis promove-  
tur.

e In Motibus: quando nimirum in auctis neglectis  
humoribus, propter quos ſæpius tales motus in-  
ſtituuntur, ad ſola ſopientia, opiata & narcotica  
confugiunt, aut fortiora commoventia exhibent,  
quibus quidem paroxyſmum aut aliquo modo  
leniunt, aut ad tempus ſopiant, faciliiori vero  
recidivæ anſam præbent.

f In Febris: quando materiam neque a Natura  
neque ab arte præparatam adhuc crudam, con-  
tra Hippocratis effatum & refragante inſuper ra-  
tione & experientia, fortioribus evacuantibus iſſis-  
que repetitis evacuare conantur, ac hiſce præmiſ-

ſis in intermittentibus ſtatim ad ſilentia conſu-  
giunt, & hoc modo infarctus viſcerum, Cache-  
xias Hydropes &c. producant. Eo gravior vero  
eſt error, ſi in acutis & exanthematicis Febri-  
bus per talia fortiora remedia Natura ſtatim in  
principio & augmento turbatur, & a ſcopo le-  
niter diaphnoico revocatur: aut ſi neglecta placi-  
da diaphoreſi & excretionem per habitum corpo-  
ris Medici Præſtici fortioribus ſudoriferis mate-  
riam morbiſicam expellere, & regimine etiam  
externo Naturam ad hancce excretionem coge-  
re conantur. Ut alios quam plurimos errores,  
de quibus hinc inde in Praxi Speciali ſub Cau-  
telis Præſticiſ ſermo erit, ſilentio prætereamus.

#### IV. Observationes.

- 1 Medici, Naturæ methodum ignorantes, graviffimos  
ſæpius errores in Praxi committunt.
- 2 Erroribus Naturæ juncti Medicorum errores, ægro-  
tantium epitaphia ſunt.
- 3 Quo minus Theoria cum Praxi cohæret, eo faci-  
lior eſt lapſus in curatione morborum.
- 4 Experientia & Ratio huic innixa ac hiſce juncta  
Medici conſtantia, temeritatis, præcipitantia & ti-  
miditatis expers, ſunt optima contra errores re-  
media.
- 5 Prudens remediorum applicatio eorundemque con-  
tinuatio, morbos ſæpius graviffimos tollit.
- 6 Uti exceſſus, ita & defectus remediorum neceſſa-  
riorum in morbis, Medicum erroris arguit.
- 7 Audaces interdum fortuna in morbis deſperatis vi-  
ſis adjuvat.

#### De cauſis morborum non-naturalibus.

I. *Definitio*: **C**auſæ morborum non-naturales ſunt,  
quæ in ſtatu naturali admodum neceſ-  
ſariæ & legitime obſervatæ ſanitatem conſervare,  
illegitime vero uſurpatæ, tam materiale corporis  
conſtitutionem, quam motus in æconomia ani-  
mali occurrentes, variis modis alterare & turbare,  
adeoque ad morbos diſponere ſolent.

#### II. Differentia, ſunt ſex

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1 Aer,           | 4 Somnus & vigiliæ.  |
| 2 Cibus & Potus. | 5 Excreta & retenta. |
| 3 Motus & quies. | 6 Animi pathemata.   |

##### 1. De Aere.

**A**er ad varios morbos pro varia ſua conſtitutione  
diſponit & quidem

- 1 Calore, cujus intuitu humores nimis reſolvuntur,  
& volatilem acrem acquirunt indolem, unde poſt-  
modum Diarrhææ, Dyſenteria, Febres & inter-  
dum ob resolutionem nimiam Lipothymia & mors  
ipſa ſequuntur.
- 2 Frigore, quod non ſolum humores condenſat, ſed  
etiam ſtagnationes & ſtaſes inpr. in partibus exte-  
rioribus, imo Gangrænam & Sphacelum produ-  
cit.
- 3 Humiditate, cujus reſpectu fibræ relaxantur & tor-  
pore quaſi afficiuntur, unde læſis ſecretionibus hu-  
morum ſpiſſitudo & mucoſitas, Catarrhi, Febres  
catarrhales &c. generantur.
- 4 Siccitate, inprimis ſi ſimul inſigniter rarefactus eſt,  
cujus intuitu humores pariter nimium reſolvun-  
tur: ut taceam aerem talem rariorem ad respira-  
tionem ineptum eſſe. Alias aer ſiccus ſatis ſalu-  
bris eſt.
- 5 Effluviis variis ipſi admixtis: unde pro diverſita-  
te talium partium modo Dyſenteria, Variolæ,  
modo Febres Petechiales, Peſtis &c. epidemice ho-  
mines affligunt.

#### Observationes Pathologico-Præſtice.

- 1 Omnes conſtitutiones aeris diu durantes facilius ad  
morbos diſponunt.
- 2 Quo frequentius aeris ſunt alterationes & qui-  
dem



dem in contrarium, eo facilius etiam ob toni & humorum alterationem sequuntur morbi.

- 3 Constitutiones aeris humidæ & calidæ omnium sunt pessimæ & morbos malignos facile inducunt.
  - 4 Luna insigniter aerem alterat, inpr. circa Novi & Plenilunium, hinc vel ad morbos disponit, vel eosdem præsentat exasperat.
  - 5 Diversus aeris status circa Æquinoctia & Solstitia ad diversos quoque morbos disponit.
  - 6 Venti & graviores tempestates interdum constitutionem aeris morbosam produciunt, interdum vero eandem tollunt.
- Saluberrima aeris Constitutio est verna; unde hoc tempore præcipue corpora nostra mire recreantur.

#### 2. De Cibo & Potu.

**A**limenta humores & motus ad morbos variis modis disponunt.

- 1 *Quantitate* quatenus per alimenta immoderate assumpta viscera digestionem inservientia sensibilibus debilitantur, Plethora generatur, spissitudo produciitur, ac secretiones & excretiones quam maxime pervertuntur.
- 2 *Qualitate*, quando cibi acidi humores condensant, falsi humores nimis falsos reddunt, aromatizati bilem augent, potus spirituosus motum humorum nimium accelerant, crudi & dyspeptici chylum vitiosum viscidum largiuntur &c.
- 3 *Tempore assumendi*, quando nimirum nullum ordinarium alimenta assumendi tempus observatur, sed ea promiscue ingeruntur, potulenta solidis præmittuntur, & quæ sunt alia.

#### Observationes Pathologico-Practicæ.

- 1 Quantitas ciborum nimia multorum morborum est productrix.
- 2 Qualitas ciborum & potus, nisi continuatus usus accedat, raro nocet.
- 3 Omnia alimenta fermentantia facile ad morbos disponunt.
- 4 Cibi contrariæ indolis digestionem lædunt & chylum minus laudabilem præbent.
- 5 Potatio in seram usque noctem continuata, cruditas & multarum partium excrementitiarum mater est.
- 6 Frequens ebrietas vel ad Hæcticam & Hydropem, vel ad apoplexiam aut tremorem paralyticum disponit.
- 7 Potus Caffee matutinus sæpius tremorem artuum post se trahit & in quibusdam appetitum prostermit.
- 8 Liqueores spirituosus matutino tempore poti, noxii sunt.
- 9 Inedia optimum quidem est Plethoricorum remedium, in aliis vero corpus insigniter debilitat.
- 10 Potus insufficiens humores spissos reddit.
- 11 Cibi, ventriculo vino repleto sumpti, multas pariunt cruditates.
- 12 Cibi nimis avidè, & non bene imasticati, ingesti difficulter digeruntur, & cruditas fiunt causa.
- 13 Meditationes post pastum & in quibusdam etiam motus nimius turbant digestionem ciborum.

#### 3. De Motu & Quiete.

**M**otus & Quies, licet corpus iis quam maxime opus habeat, pariter nocent corpori.

- 1 *Excessu*; dum in motu nimio non solum respiratio maxime intenditur, sed etiam musculi continuo modo constringuntur, modo dilatantur, sanguis hinc maxime resolvitur & insignis ejus pars in serum convertitur; cum vero hoc corpori conservando inutile sit, ac ex fibris ultra modum extensis nutrimentum simul excutitur, non solum insignis corporis debilitas hinc oritur, sed etiam humores in orgasmo constituti ad Febres & Inflammationes disponuntur, quod eo facilius contin-

git in Plethoricis, quando sanguis uno impetu simul atque semel commovetur.

- 2 *Defectu*: unde torpor partium, spissitudo sanguinis, secretionum & excretionum turbatio, Caco-chymia, Malum Hypochondriacum, Scorbutus, Scabies &c. sequuntur.

#### Observationes Pathologico-Practicæ.

- 1 Omnes commotiones fortiores sanguinem nimium commovent, & vel Hæmorrhagiis vel Congestionibus, Stagnationibus & Stasibus, inpr. circa partes Hæmorrhagiis dicatas, ansam præbent.
- 2 Præstat post motus fortiores leniter adhuc corpus aliquandiu movere, quam subito quiescere.
- 3 Potus frigidus post motum fortiores sanguinem facile coagulat, & Phthisi vel Hæcticæ ansam præbet.
- 4 Defectus motus consecutaria potissimum se in abdomine exerunt.
- 5 Quies nimia & meditationes profundiores corpus insigniter debilitant.
- 6 Optimum est in motu, & in quiete tenere medium, excessus enim & defectus in utroque noxius.
- 7 Gravissimi sæpe morbi pro diversitate causæ vel solo motu, vel sola quiete felicissime curantur.

#### 4. De Somno & Vigiliis.

**S**omnus & Vigiliæ homini summe necessariae res ad varios morbos disponunt.

- 1 *Excessu*: Somnus excedens torporem producit in tono & partibus fibrosis, unde non solum Plethora, inpr. concurrente Diæta lautiori, sed etiam spissitudo humorum ob tardiores sanguinis progressum generatur, ac Secretiones & Excretiones retardantur.
- 2 *Defectu*: quatenus in vigiliis nimis non solum organa sensuum externorum, dum in continua sunt actione, insigniter debilitantur, sed etiam Anima, dum objectis continuo intenta est, ab actionibus vitalibus avocatur, unde non possunt non Nutritio, Secretiones & Excretiones variis modis turbari, & corporis insignis debilitas sequi. Huc pertinet etiam somnus sæpius interruptus, qui itidem noxius est.
- 3 *Tempore*: quando nullum ordinarium dormiendi tempus observatur, sed vigiliis debitum tempus in somnum impenditur.
- 4 *Modo*: Somnus enim prono capite initus caput stupidum reddit, & in oculis facile defluxiones parit: supinus vero somnus ad Incubum disponit; ut taceam pollutiones nocturnas sub tali situ longe esse frequentiores.

#### Observationes Pathologico-Practicæ.

- 1 Somnus profundus in subjectis ad eum non dispositis, sine causarum manifestarum concursu semper monstri quid alit.
- 2 Somnus profundior in subjectis Phlegmaticis torporem fibrarum & humores excrementitios augeat.
- 3 Vigiliæ nimis citius & facilius ad morbos disponunt, quam somnus nimius, inpr. in hominibus sensibilibus.
- 4 Somnus meridianus multis magis prodest, quam nocet.
- 5 Somnus in loco humido & cubiculis calce recentior obductis, facile ad morbos disponit.
- 6 Qui nimio somno sese addicunt, variis catarrhalibus, & tandem apoplecticis morbis corpus exponunt.
- 7 Vigiliæ nimis extra acutos morbos cephalalgias pariunt, in acutis vero deliria.
- 8 Indicant eadem Naturam activam, sicuti somnus nimius torpidam.

#### 5. De Excretis & Retentis.

**E**xcreta & Retenta disponunt ad morbos eosque actu produciunt.

- I. Quando ea, quæ naturaliter e corpore excerni debent, præter naturam in eo retinentur, uti sunt;



- 1 Sudor, 2 Urina, 3 Bilis, 4 Mucus,
- 5 Feces alvinæ, de quibus jam dictum fuit, quo etiam referri debet
- 6 Sanguis Menstruus ac
- 7 Lochia, ut &
- 8 Sanguis superfluus alias per Hæmorrhagiam narium consuetam & Hæmorrhoides excerni solitus, præter naturam retentus: quorsum etiam spectat
- 9 Sanguis superfluus neglecta Venæsectionem & Scarificatione consuetam retentus.

II. Quando ea, quæ naturaliter in corpore remanere debent, cum detrimento corporis præter naturaliter excernuntur, uti sunt

- 1 Sanguinis Menstrui & Lochiorum fluxus nimius.
- 2 Sanguis in Hæmorrhagiis adfuetis nimium effluens.
- 3 Lactis spontaneus effluxus.
- 4 Seminis involuntaria excretio.
- 5 Salivæ nimius in oris cavitatem fluxus.
- 6 Partium inutilium nimix excretiones.
- 7 Venæsectiones & Scarificationes nimix.
- 8 Evacuantes fortiores, Vomitoria, Purgantia &c. corpus humoribus privantia.

*Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Humores inutiles retenti laudabiles sanguinis & lymphæ partes inquinant & corrumpunt, ac ad corporis conservationem inhabiles reddunt.
- 2 Corpus etiam quam maxime gravant, ac in ipsas quoque partes solidas potentiam suam exerunt.
- 3 Sanguinis fluxus in sequiori sexu suppressi, in multos affectus feminas præcipitant, a quibus redeunte fluxu liberantur.
- 4 Venæsectiones & Scarificationes consuetæ neglectæ omnibus morbis a Plethora oriundis portam pandunt.
- 5 Excretionis largiores tanto periculo non exponunt homines, ac suppressæ, inpr. si suppressio uno impetu facta fuerit.
- 6 Diu tamen continuantes & nimio impetu contingentes, corpus insigniter debilitant, ac non raro ad Hæcticam & Hydropem disponunt.
- 7 In Excretorum & Retentorum prudenti observatione & directione consistit fere Vita & Sanitas nostra.

#### 6. De Animi Pathematibus.

**A**nimi Pathemata disponunt ad morbos, quatenus motus augent, & humores simul movent, partim ad exteriora, partim ad interiora, uti sunt

- 1 *Ira*, furor ille brevis, quæ maxime agit in motus & insignem humorum ebullitionem excitat, pulsus cordis hinc augetur, vasa in habitu corporis inflantur, corpus incalescit: tumet, rubet, oculi fulgent, in quibusdam insigne accedit robur corpori, in aliis vero omnes artus tremunt, bilis in intestina effunditur, quem sæpius vel Vomitus biliosus vel Diarrhœa excipit. Ob hanc igitur nimiam Toni, Pulsus & humorum commotionem, gravia sæpius mala, Epilepsia, Convulsiones, Febres biliosæ, Hæmorrhagiæ, exacerbatio aut resuscitatio Podagræ, Doloris Nephritici &c. sequuntur. Iram vero suppressam excipiunt Cardialgiæ, Palpitationes, Congestiones sanguinis ad interiora, Hæmorrhagiæ Uterinæ in feminis, Abortus &c.
- 2 *Terror*, qui contrario modo se habet, dum spasmo quasi universali habitu corporis constricto, humores subito a partibus exterioribus ad interiores lati & moti ibidem stagnant; unde non solum Anxietates insignes præcordiorum, cum Palpitatione cordis, sed & Convulsiones, Epilepsiæ, Suffocationes, Apoplexiæ, fluxuum sanguinis in mulieribus suppressiones, aut interdum nimix sanguinis profusiones aliique affectus & interdum mors subitanea sequuntur.
- 4 *Tristitia & Metus* tollunt rubur partium sensim sensimque, unde propter tardiores sanguinis circulum, spissitudo humorum, variorum chronicorum affectuum, Infarctuum scil. Scirrhorum, Melancholiæ, Mali Hypochondriaci, suppressionis Mensium, Hæmorrhoidum &c. causa, sequitur.
- 4 *Gaudium*, quod etsi corpori raro noceat, interdum tamen propter excessum & nimiam humorum com-

motionem non solum affectuum variorum, sed etiam mortis subitanæ fit causa.

- 5 *Lascivia & Amor nimius*: hosce affectus sæpius non tantum insignis enervatio totius corporis, sed etiam actionum rationalium perturbatio, uti id in Amore infano & Furore uterino contingit, sequitur.
- 6 *Imaginatio profundior* huc etiam referri meretur, quæ mediante sæpius homines in varios morbos, quibus se affectos esse false sibi persuadent, præcipitantur.

*Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Quo magis subitanea est ira, eo facilius varios affectus excitat.
- 2 Quo gravior est ira & quo diutius durat, eo graviora etiam sequuntur mala.
- 3 Quo magis inclinat temperamentum ad motus fortiores, eo facilius quoque ira affectus præternaturam producit.
- 4 Ira gravior suppressa semper peioris est indolis.
- 5 Ira sæpius nulla alia causa materiali præsentem, humores nimium commovendo & motus in solidis augendo, varios affectus producit.
- 6 Si materialis per se jam noxia adest causa, ea per iram commota eo gravius affligit, quod in calculosis potissimum observamus.
- 7 Terror, quo magis est subitaneus, eo facilius sanitatem alterat.
- 8 Terror panicus, contagiosos & pestilenciales morborum præcedens, Naturam admodum pavidam reddit, ita ut postmodum propter summam in agendo trepidationem & metum facile succumbat.
- 9 Quo diutius durat Tristitia, eo magis etiam sanitas læditur.
- 10 Gaudium maximam tristitiam subito excipiens magnas præprimis in corpore excitat alterationes.
- 11 Quo minus assueta est Natura ad Animi affectus graviores, eo facilius & gravius etiam corpus ab iisdem affligitur.
- 12 Animi affectus graviores gravidas magis lædunt, quam alios homines.
- 13 Unde sæpiissime non tantum enormium Hæmorrhagarum sed & ipsius abortus sunt auctores.
- 14 Gravissimi quandoque motus epileptici ab amore infano originem habentes per excretionem Seminis fuere sublati.

*De Corporum dispositione ad morbos, respectu Ætatum, Sexus, Temperamentorum, Consuetudinis & Sensibilitatis.*

- I. *Definitio*: **D**ispositiones ad morbos sunt certæ circumstantiæ, quarum intuitu homines certis morbis facilius corripuntur, sive quæ quidem ut causæ veræ non concurrunt ad morborum productionem, sed saltem occasionem præbent, ut morbi vel facilius homines invadant, vel gravius affligant.
- II. *Differentia*: Dispositio talis respicit
  - 1 *Ætates*, in quibus homines ad certos morbos magis dispositi sunt.
  - 2 *Sexum*, cujus intuitu vel homines ad speciales affectus, vel ad alios quoque magis proni sunt.
  - 3 *Temperamenta*, quorum respectu ob diversum statum partium tam solidarum, quam fluidarum ac secretionum & excretionum homines quosdam morbos facilius, quam alii, incurrunt.
  - 4 *Consuetudinem & Sensibilitatem*, juxta quas homines aut in morbos facile incidunt, aut iisdem gravius, vel mitius affliguntur.

#### 1. De Morbis Ætatum.

- I. *Definitio*: **M**orbi Ætatum sunt affectus præter naturam, certa vitæ periodo magis affligentes, ab humorum per motus ad certas partes directione ut plurimum originem trahentes.
- II. *Differentia*.
  - 1 Alii occurrunt in *Incremento*, & quidem
    - a In *Infantia*, qui partim propter pilorum, partim propter dentium generationem, in capite potissimum



mum se exerunt: uti sunt *Exulcerationes* capitis & faciei superficiarię: *Dolores*, *Ardores*, *Inflammationes* aurium, oculorum, *Aphthę*, *Pavores* in somno, *Convulsiones* & *Epilepsię*.

*b* In *Pueritia*, aut etiam ultimis *Infantię* annis: *Capitis dolores*, *Faciei rubores*, *Inflationes*, *Hęmorrhagię narium*, *Odontalgia*: *Otalgia*, *Coryzæ*, *Tumores glandularum colli*, *tonsillarum inflammationes* &c.

*c* In *Adolescentia*: præter antea recensitos faucium affectus, sæpius adhuc repullulantes, *Angina*, *Hęmoptyses*, *Pleuritides*, *Tusses siccæ & humidę*, *Tubercula*, *Pulmonum*, affectus *Arthritici* circa *Scapulas*, *Pleuritis spuria*.

*2* Alii reperiuntur in *Consistentia*, scil.

*a* In *Juventute*: haud exclusis antea recensitis morbis, *Malum Hypochondriacum* in otiosis; in *Cholericis* & vino deditis *Arthritides* vagę; in *Venericis*, *dolores præmaturi lumbares*, sive *Lumbago rheumatica* aut *Nephritis spuria* & molimina ad *Hęmorrhoides* internas.

*b* In *Etate Virili & Consistente*: præter modo enarratos sæpius intercurrentes morbos, *Hęmorrhoides* internę & externę, vel fluentes, vel turgentes, vel rumenies, *Calculus*, *Malum Ischiadicum*, *Gonagra* *Podagra*, *Hęctica*, *Hydrops*, *Apoplexia sanguinea* &c.

*3* Alii deprehenduntur in *Decremento* sive *Senectute*, uti sunt: *Cessationes Hęmorrhoidum* cum insequentibus doloribus spasticis in osse sacro & lumbis, sive incompletis ad *Hęmorrhoides* moliminibus, *Mictus sanguinis*, aut materię pituitosę tenacis, *Calculus*, *Podagra* diuturna & anomala, *Catarrhus suffocativus*, *Asthmata graviora*, *Tusses chronicę*, *Paralyses*, *Apoplexię serosę*, *Marasmus*. Plura vide in *D. D. Stahl's Dissert. de Morb. Etat. Fundam. Conf. Pathol. Nost. Sect. II. cap. X. Membr. I.*

### III. Observationes Pathologico-Practice

*1* Morbi Etatum potissimum respiciunt translationes sanguinis ad certa loca, unde vel fluxus vel stases eorundem, vel motus spastici oriuntur.

*2* Morbi Etatum ratione objecti non differunt, sed differentia tantum deprehenditur in subjecto & loco: in junioribus enim occurrunt in capite, in Adolescentibus & Juvenibus in pectore, in Viris in hypochondriis, in reliquis vero magis in partibus inferioribus.

*3* Qui narium Hęmorrhagiis obnoxii fuerunt in Pueritia, facile postea in Adolescentia translationes morborum ad pectus, ac succedentibus temporibus ad Hypochondria & inferiora loca patiuntur.

*4* Morbi certis ætatibus convenientes in habitum degenerantes, facile etiam in subsequētibz vitę periodis affligunt, vel curati recrudescunt.

*5* Eo magis autem & certius priora loca, ubi congestiones antea instituerat, repetit Natura, quo minus in ætatum mutationibus in excretionibus hęmorrhagicis quas in aliis locis denuo intendit, ad scopum pervenit.

*6* Qui in juniore ætate spasticis doloribus circa caput frequenter afflicti fuerunt, ii sequētibz ætatibus similibus doloribus circa pectus & inferiores partes facile corripiuntur.

*7* Hęmorrhagię narium in senibus, in juniore ætate iisdem assuetis, recrudescētes sæpius Apoplexię sunt prodromi.

*8* Omnes morbi respectu ætatum incongrui, vel difficulter curantur, vel periculosi sunt.

*9* Venus præmatura, præmature quoque ad morbos virorum disponit, & sic quoque *malitia supplet ætatem*.

#### 2. De Dispositione Sexus ad Morbos.

**M**orbi homines diversi Sexus affligentes varii sunt, & respiciunt

*1* *Sexum Masculinum*, qui dispositus est

*a* In genere

*1* Ad *Hęmorrhagię narium*, *Hęmoptysin*, *Hęmorrhoides* & *Mictum cruentum*, quas femine rarius

ob Mensium legitimum fluxum experiuntur.

*2* Ad *Congestiones*, circa loca Hęmorrhagiis hisce destituta infestantes.

*3* Ad *Affectus Arthriticos*, varios dolores congestorios tandem excipientes.

*4* Ad *Febres* præcipue intermittentes tertianas.

*b* In *Specie* vero respectu partium genitalium.

*1* Ad erectionem membri vel læsam sive impotentiam, vel nimiam, uti in nimia Salacitate & Priapismo, vel depravatam, qualis contingit interdum in Gonorrhœa virulenta & tortura penis.

*2* Ad ejusdem membri inflammationem, Phimosin & Paraphimosin.

*3* Ad seminis generationem læsam, quando vel deficit, vel excedit, vel nimis cito, aut etiam contra voluntatem, vel nimis tarde excernitur.

*4* Ad testium tumorem, eorumque inflammationem & Scirrhum,

*5* ad Herniam completam sive Oscheocelen, aut Herniam scrotalem, ut & ad Hernias incompletas, scil. Sarcocelen, sive carnosam, Pnevmatocelen, aut Physocelen sive ventosam, Hydrocelen, sive aquosam, Cirrocelen sive varicosam.

*2* *Sexum femininum*, qui inclinatur

*a* In genere

*1* Ad *Plethoram*, non quidem ob vitam otiosam, uti multorum est sententia, sed quia fœtus nutritioni femine destinatus est, & hinc etiam plus in illis requiritur sanguinis.

*2* ad *Vomitum cruentum*.

*3* Ad *Congestiones* inpr. in infimo ventre se exerentes.

*4* Ad *Morbos convulsivos*, ob majorem, quam præ Viris habent sensibilitatem.

*5* Ad defectus motuum *Lipothymias*, *Syncopen*, *Paralyses* &c.

*b* In *Specie*, & quidem

*1* Ad *Pathemata* mulieribus communia, uti sunt:

*a* Uteri inflatio sive Empnevmatosis, a flatibus Uterum distendentibus orta, conceptionem interdum mentiens.

*b* Uteri inflammatio a sanguinis stasi ortum trahens.

*c* Exulceratio ejusdem.

*d* Hydrops Uteri a sero & lymphâ, vel in ipsa Uteri cavitate, vel ejus substantia stagnante, dependens.

*e* Procidentia Uteri, frequens in maritatis, rarissima in cœlibibus.

*f* Angustia sive clausura Uteri, coitum & impregnationem impediens.

*g* Mensium suppressio & stillicidium a variis in-et externis causis orta.

*h* Mensium fluxus nimius.

*i* Menstrua vitiosa, serosa scil. nigricantia, purulenta, fœtida &c.

*k* Mensium fluxum inordinatum.

*l* Menfes cum insignibus molestiis & doloribus fluentes.

*m* Menfes per insolita loca excreti.

*n* Fluor Albus.

*o* Passio Hysterica, sive suffocatio uterina quibusdam dicta.

*p* Tumores, Scirrhi & Cancer mammarum.

*q* Melancholia ac Furor uterinus.

*r* Cachexia & Chlorosis.

*2* Ad *Affectus* in Conjugio viventibus proprios, & quidem

*a* *Impręgnandis*, uti sunt Appetitus Veneris læsus, Sterilitas, Conceptio læsa sive Molę & Monstrorum generatio.

*b* *Gravidis*, uti sunt Nausea & fastidium ciborum, Vomitus, Pica & Malacia, Palpitatio cordis, Odontalgia, Respiratio difficilis, lassitudines artuum, Spasmi, Stranguria, Diarrhœę, Lumborum ac Coxendicum dolor, Hęmorrhoides cœcę, Varices, Tumores pedum œdematosi, ac Hydrops pudendorum, Hęmorrhagię, Abortus, Fœtus mortuus &c.



2 *Parturientibus*, quæ laborant Doloribus nothis, Partu difficili, partim a debilitate matris, nimia officii uteri angustia, defectu dolorum aut motu eorum versus superiora, Plethora &c. partim a membranis fœtum ambientibus nimium firmis, fœtu item nimis magno, præmature aquarum effluxu & hinc dependente viarum siccitate, fœtu mortuo aut malo ejus situ, nec non secundinarum retentione, tam propter nimiam earum cum utero connexionem, quam præmaturam uteri clausuram dependente.

4 *Puerperis*, quarum præcipui affectus sunt: Lochia vel nimia, insigniter corpus debilitantia, vel deficientia, aut prorsus suppressa, quæ Febres inflammatoriarum, miliares alique graviores affectus sequuntur; frequentes quoque sunt in puerperis dolores post partum, inflatio abdominis, partim a lochiis deficientibus, partim a neglecta post partum uteri ligatura originem ducentes: huc pertinent etiam Incontinentia urinæ, Diarrhœæ, Ruptura vulvæ, Tumor pudendorum, Alvus suppressa &c. de quibus suo loco in *Praxi speciali*.

5 *Lactantibus*, quæ pronæ sunt ad Lactis abundantiam, defectum, coagulationem, salsedinem, aquositatem, Febrem lacteam, Tumores sive nodos & Inflammationes mammarum, ac inde promanantes abscessus, Scirrhus, Cancrum, Fissuras papillarum.

#### Observationes Pathologico-Practicæ.

- 1 Præmatura aut tardior seminis excretio, raro ad generationem apta est.
- 2 Membrum flaccidum & scrotum continuo pendulum impotentiam indicant.
- 3 Quoniam multi morbi Mensium negotium turbant, hinc etiam feminæ gravius iisdem laborant, quam viri.
- 4 Quo magis animi affectibus obnoxie sunt femine, eo facilius legitimus mensium successus turbatur, & variis morbi insequuntur.
- 5 Quæ Mensium fluxum nunquam experiuntur, ut plurimum steriles sunt.
- 6 Femine frequentius, partim propter nimiam sensibilitatem, partim propter Mensium & Lochiorum malum successum, partim propter graviditatem ejusque consecutaria, morbis affliguntur, quam viri.
- 7 Pejores semper affectus fluxuum sanguinis in sexu feminino suppressiones, quam eorum largiorem successum sequuntur.
- 8 Nisi sanguinis fluxus in feminis in ordinem redigantur, nunquam constanter curantur affectus ab iis dependentes.
- 9 Affectus Lochiorum vitia excipientes semper pejores sunt iis, qui Mensium defectum vel excessum sequuntur.
- 10 Febres Puerperarum acutæ semper pessimæ sunt indolis.
- 11 Dolores post partum Opiatis compescere velle, periculosum est.
- 12 Adstringentia, Volatilia & Opiata mulierum affectus fere semper pejores reddunt.
- 13 Utero post partum non rite purgato, facile postmodum concreta carnosæ, conceptionem impediunt & abortum excitantia, generantur.
- 14 Lactis vitia, sæpius nullo sensu dignoscenda, in infantibus se exerunt.
- 15 Lactantibus menstrua fluere non semper tutum est: plurimi enim infantes eo tempore admodum male se habent, imo quandoque ipsis corripuntur moribus convulsivis.

#### 3. De Temperamentorum dispositione ad morbos.

3 *Vasorum sanguiferorum* exilium & amplorum.

4 *Sanguinis* tam quantitate quam qualitate peccantis intuitu.

5 *Secretionum* & *Excretionum* promptius vel tardius succedentium.

6 *Indolis animi* ad affectus animi, somnum, laborem &c. magis vel minus proni.

**H**orum ergo requisitorum intuitu inclinatur Temperamentum

I. *Sanguineum*, (ubi habitus corporis est laxior, vasa sunt minora, pori majores, pulsus moderatus, vegetus tamen, sanguis fluxilis & hinc per omnes partes facilis motus, secretionum & excretionum legitimus successus, ac animus securus, adeo ut harum rerum respectu ad morbos non adeo pronus sit, nisi accidentales superveniant turbæ).

1 Ad *Plethoram*, quam tamen raro Natura per nares, aut alias Hæmorrhagias, ob vasorum exilitatem & tonum minus vegetum, imminuit, & ob hanc rationem

2 Ad *Congestiones*, oppletiones & infarctus circa loca Hæmorrhagica potissimum se exerentes & hæc postmodum facile excipientes

3 *Affectus Rheumatico Arthriticos*, Malum schiadicum, Podagram &c.

4 Ad *Inflammationes* tam externas ac febres acutas inflammatorias.

5 Ad *varias perturbationes* motuum in morbis occurrentium: cum enim in hoc temperamento animus ob negotia vitalia legitime succedentia admodum securus atque tranquillus sit, facile hinc objectis impedimentis perturbatur, ac motus necessarii facile omittuntur, aut summa cum trepidatione ac tergiversatione procedunt; hinc etiam statim tota œconomia animalis vacillat, & lypothymia ac anxietates graviores, deliria anxia & torpida sæpius sequuntur; superato tamen periculo vigorem facile recuperant.

6 In ætate provectiori ad *Apoplexias Sanguineas*, *Hemiplexias*, *Catarrhos suffocativos* proni sunt.

II. *Cholericum*, in quo habitus corporis est strictus, poris minores, vasa ampla, pulsus cordis fortis & vegetus, sanguis summe fluxilis & calidus, motus per poros minores aliquo modo impeditus, quem tamen pulsus vigor faciliorem reddit, secretionum & excretionum ob eundem pulsum legitime succedentes, animus impatiens & ad fortiores motus pronus: & hinc tale temperamentum dispositum est

1 Ad *Hæmorrhagias*, partim propter Plethoram, partim propter vasorum capacitatem & sanguinis fluxilitatem, partim vero propter motum vigorem; quando vero hæc propter varias causas non succedunt, sequuntur

2 *Congestiones* & quidem longe majori impetu quam in Sanguineis, & dolores exinde orientes longe quoque acerbiores sunt quam in reliquis: hæc excipiunt.

3 *Affectus Spastici* gravissimi summa cum pertinacia affligentes, sæpius transeuntes

4 In *Convulsiones*, partim propter fibrarum tensionem, partim propter promptitudinem ad motus.

5 Inclinat ad *Febres* & inpr. acutas cum deliriis furiosis & violentis: si vero intermittentibus corripunt, æstus in illis quam maxime urget.

6 Ad *Alvi fluxus*, *Diarrhœas biliosas*, *Choleram*, *Dysenteriam*, quæ ut plurimum graviores iram & effusionem bilis uberiorem comitantur: bile vero acriori in intestinis remanente facile superveniunt *Colicæ*, ac *Febres biliosæ*.

7 Ad *Maniam*, quam præ cæteris experiuntur.

III. *Phlegmaticum*, in quo habitus corporis est mollis, laxus, turgidus & valde porosus, vasa minora, pulsus languidus & rarus, sanguis fluxilis, tenuis, sed valde aquosus, secretionum & excretionum commode quidem, sed lente procedentes, animus ad otium atque somnum proclivis &c. & hinc dispositum est

1 Ad *Fluxus seri*, *Coryzam*, *Tusses humidas*, *Diarrhœas pituitosas*, *sudores nimios* &c.

2 Ad

**T**emperamenta disponunt ad morbos varios & quidam respectu.

1 *Habitus corporis* vel strictioris, vel laxioris.

2 *Pulsus* magis vel minus vegeti.



- 2 Ad varias *Congestiones* serosas sive catarrhales, in iis potissimum locis se exerentes, ubi in aliis subiectis sanguinis congestiones alias fieri solent, nnde Gravedines, Asthmata, Catarrhus suffocativus, Inflammationes Ventriculi, Flatūs &c.
  - 3 Ad *Stagnationes* feri, Oedemata, Cachexiam, Hydropis varias species.
  - 4 Ad *Stases* & corruptiones feri ac inde dependentes exulcerationes capitis, aurium, cutis reliquæ, Pulmonum &c.
  - 5 Ad *Febres intermittentes* diurnas ac catarrhales &c. & id quidem propter motuum languorem.
  - 6 Ad *Affectus Soporosos*, Paralytes, Apoplexiam serosam &c.
  - 7 Ad *Deliria stupida* & Comatosa.
- IV. *Melancholicum* (in quo habitus corporis est strictus, densus, frigidus, siccus, minus porosus, vasa ampla, pulsus tardus, sed fortis, sanguis spissus, secretiones & excretiones tardiores, animus dubius, meticulosus, diffidens) dispositum est
- 1 Ad *Hæmorrhagias*, sed non sine difficultate procedentes, magis vero
  - 2 Ad *Congestiones* & spasticas contentiones circa loca hæmorrhagica se exerentes inprimis vero
  - 3 Ad *malum Hypochondriacum*: & quoniam sanguis hinc inde ob crassitiem stagnat, & ad *Stases* inclinat, sæpius exinde oritur
  - 4 *Melancholia*, cum metu incarcerationis, insidiarum &c. Plura vide in *D. D. Stablii Pathol. pag. 74. & seqq. & Ejusd. Dissert. de Temperamentis*.
- Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Doctrina de morbis *Ætatum* ac dispositione Temperamentorum ad morbos summam habet utilitatem in Praxi.
- 2 Qui proportionem inter fluida & motus in quovis temperamento noverit, facile etiam poterit prædicere ad quosnam morbos subiecta sint disposita.
- 3 Licet idem morbus diversi temperamenti homines affligat, diversa tamen in talibus hominibus occurrunt symptomata.
- 4 Quæcunque temperamenta ad faciliores perturbationes prona sunt, ea etiam facilius ad graviores morbos disponunt.
- 5 Quo magis sunt fluxiles humores, & quo tranquillores sunt motus, eo facilius etiam morbi per secretiones & excretiones solvuntur.
- 6 Uti Cholericus in morbis ob motuum excessum freno, ita Phlegmaticus ob eorundem defectum stimulo opus habent.
- 7 Quieta continentia & sufficiens potus in multis Cholicorum morbis sunt optima remedia.
- 8 In Sanguineis & Cholicis curationes spontaneæ sunt frequentiores, quam in Phlegmaticis & Melancholicis.
- 9 Melancholici ob solam imaginationem & metum multi morbis exponuntur.
- 10 Morbis acutis Phlegmatici & Melancholici non facile corripiuntur, nisi fuerint epidemici.
- 11 Temperamentum Sanguineum per malam diætam in Phlegmaticum versum, homines ad ejusdem Temperamenti morbos disponit.
- 12 Omnia temperamenta morbis chronicis admodum immutantur, ut eorum diagnosi tunc maxime sit difficilis, nisi accuratum prægressæ ætatis & constitutionis examen instituat.

#### 4. De Consuetudine agrotandi & Sensibilitate.

I. *Definitio*: **C**onsuetudo in morbis est assuefactio motuum in certis morbis occurrentium, ob quam quidem homines a levioribus causis excitati, vel in consuetum vel in congenerem morbum incidunt, sed facilius tamen restituntur, quam qui motibus morbificis non sunt assueti.

*Sensibilitas* est dispositio ad morbos, Naturam potissimum respiciens, quando hæc ob levissimas etiam causas, graviores, quam necessitas postulat, excitat motus, ad removendum illud, quod ipsi vel vere,

vel falso aut imaginarie tantum molestum est, aut videtur.

II. *Differentia*: Quamvis ntraque respiciat motus propter causas morbificas contingentes, in eo tamen differunt quod

*Consuetudo* oriatur a multiplici actuum exercitio, & hinc tandem in habitum degeneret, unde huc pertinent morbi habituales.

*Sensibilitas* vero partim ipsam corporis sensibilem structuram, partim vero & quidem præcipue ipsam Naturam, eamque ob hæreditariam dispositionem, vel ab objecto quodam adverso adeo sensibilem redditam, ut statim vel facta solum objecti istius molesti mentione, aut ejusdem oblatione, statim præ fastidio ad illud amoliendum, quamvis energia ejus tanti non sit momenti, motus insignes instituat.

#### III. Subiectum

- 1 *Consuetudinis*, omnes quidem homines habitum aut consuetudinem acquirere possunt in morbis, sed uti materiales quædam causæ ad motum magis vel minus sunt aptæ, ac motus quoque pro subiectorum diversitate sunt diversi, ita etiam probabile videtur, quosdam homines vel facilius incidere in morbos habituales, vel iisdem sæpius præ aliis affligi. Præ ceteris ad consuetudinem morbosam aptissimi videntur, qui in rebus moralibus propositi tenaces sunt, hi enim, teste experientia, morbis diuturnis facile assuescunt, præsertim cum anxietates eorundem meticolositas ac imaginatio affectus semel sopitos facile revocare soleat. Hisce accenferi merentur sanguinei, qui post graviores perpeffos insultus, sæpius adeo redduntur meticolosi, ut postea etiam ad novas egritudines eo promptiores reddantur, aut alios jam perpeffos eo facilius subeant: quod exinde apparere potest, quod nullum Temperamentum ad arthritico-spasticos affectus pertinaces & sæpius recurrentes, propter leviores etiam causas, adeo pronum sit, ac Sanguineum. vid. *D. D. Stablii Pathol. pag. 76*. Si vero Cholicorum affectus in consuetudinem degenerant, hi eo gravius & frequentius propter motuum promptitudinem & vehementiam, iisdem corripiuntur.

#### 2 *Sensibilitatis* subiecta sunt:

- a Respectu Temperamentorum, Cholericus & Melancholicus magis quam Phlegmaticus & Sanguineus.
- b Respectu *Ætatis*, juniores magis quam adulti.
- c Respectu *Sexus*, feminæ præ viris.
- d Respectu *Idiosyncrasie*, partim quibus hæreditarius impressus est character, ita ut vel generaliter ad omnia, vel specialiter ad certa tantum objecta admodum sensibiles, & hinc ad varias turbas, & inde pendentes morbos proni sint: partim qui adscititiam talem habent sensibilitatem, ita ut ob eandem facile in varias perturbationes incidunt: qualis interdum occurrit in hominibus alias satis robustis.

#### IV. *Observationes Pathologico-Practicæ.*

- 1 Homines ob solam consuetudinem ad morbos proni, sæpius diutius vivunt, quam ii, qui morbis nunquam laborarunt.
- 2 Tales etiam gravissimos sæpius affectus superant, quibus alii succumbunt.
- 3 Hujusmodi tamen consuetudo semel introducta non sine insigni difficultate tollitur.
- 4 Qui ob excretionem quandam assuetam male procedentem sæpius in morbos incidunt, facile iterum ea recurrente, pristinam recuperant valetudinem.
- 5 In morbis consuetudinalibus quam maxime ab imperita medicatione, nimirum adstringentium, Volatilium & Opiatorum præpostero usu, sibi cavendum est, gravissima enim induunt symptomata, imo non raro ipsam mortem post se trahunt.
- 6 Quo plures insultus morbidi in sensibilibus observantur, eo magis etiam enervatur energia vitalis, & eo brevior etiam vitæ universus est ambitus.
- 7 Nonnulli tamen, si crescentibus annis sensibilitas illa excitata validiori impetu excussorio & exonatorio scopum suum assequitur, nihilominus diu vivunt. vid. *D. D. Stablii Pathol. pag. 391*.



8 Quo magis sensibiles sunt homines, eo facilius etiam morbi præsentēs pervertuntur, inprimis si affectus per se ad præcipites alterationes sunt proni.

9 Nulli sensibiliores sunt, quam qui de melancholico & cholero temperamento simul participant.

## THEORIÆ MEDICÆ

## PARS III.

## DE

## SEMIOTICA.

**Definitio:** SEMiotica est tertia pars Medicinæ ministræ, quæ tradit signa tam generalia quam specialia status secundum & præter naturam.

## I. Divisio.

1 Est Generalis quæ agit in genere de signis, statum tam præternaturalem, quam naturalem manifestantibus.

2 Specialis, quæ tradit in specie signa, speciales affectus præter naturam indicantia eosque ab aliis morbis distinguunt, de quibus in *Præxi Speciali*.

## II. Observationes.

1 Nisi Medicus veram Theoriam sive solidam Physiologiæ & Pathologiæ cognitionem habeat, in SEMiotica vix ullos faciet progressus.

2 Nil Medicum magis ornat, quam solida doctrina de Diagnosi & Prognosi morborum.

3 Diagnosi & Prognosi destitutus Medicus, cæcus est in curatione morborum & Empiricum irrationalem plus, quam Medicum rationalem agit in Methodo Medendi.

## De Signis in genere.

IN consideratione Signorum quæ a Medicis tractantur notanda sunt

## Definitio:

Signum est aliquid notum, sive res in sensus incurrens, ignotum quid manifestans, sive signum est res vel naturalis vel præter naturalis, quæ Medico indaganti viam monstrat, statum vel naturalem vel præternaturalem, sive sanitatem ac morbos in genere & in specie cognoscendi.

## Differentia.

1 Alia sunt *Diagnosticæ*, quæ statum præsentem tam secundum quam præter naturam manifestant.

2 Alia sunt *Prognosticæ*, quæ statum futurum indicant: & juxta quosdam

3 Alia sunt *Anamnesticæ* sive *Memorativæ* quæ statum præteritum manifestant, quæ tamen ab aliis partim ad *Diagnosticæ*, partim ad *Prognosticæ* referuntur.

4 Alia sunt *communis*, quæ in pluribus affectibus reperiuntur, v. g. urina tenuis in febribus acutis deliria portendit, in nephriticis imminentem affectum indicat, in quibusdam potum nimium sequitur &c.

5 Alia sunt *propria*, quæ etiam *Pathognomonica* vocantur, quæ certis tantum morbis competunt; & talia interdum unicum tantum phænomenon requirunt, uti pulsus celer & frequens in febribus, interdum vero plurium concursu opus est, v. g. in Pleuritide, dolore punctorio lateris, respiratione difficili, tussi cum sputo cruento & purulento, pulsu duro ac febre acuta. Et talia signa vocantur *distinctiva*, quia certos affectus ab aliis distinguunt.

## I. Fontes. Sunt

1 *Constitutio corporis* naturalis vel præternaturalis; ubi considerari merentur non solum corporis ipsius constitutio legitima vel illegitima in genere, sed & omnium partium solidarum externarum in sensus incurrentium debita conformatio & ad usum aptitudo.

2 *Actiones corporis* legitimo vel illegitimo modo pro-

cedentes, & hinc statum secundum & præter naturam manifestantes, uti sunt Pulsus, Respiratio, Nutritio, Sensus, Motus, Memoria, Judicium &c.

3 *Effectus*; actiones hæc sequentes, Secretiones & Excretiones aliaque accidentia secundum vel præternaturam se habentia.

4 *Causæ* tam externæ quam internæ, v. g. Dispositio corporis respectu temperamentorum, Sexus, Ætatis, Sensibilitatis, Consuetudinis, Vitæ generis: assumpta, morbi prægressi, causæ lædentes variæ, animi pathemata &c.

5 *Analogismus*, comparando egrum vel cum se ipso, vel cum aliis, v. g. membrum luxatum cum altero non luxato, Petrum cum Paulo eodem vel diverso modo laborante, aut sanitate fruente.

6 *Juvantia & nocentia*, quæ sæpius signa, sed magis prognostica exhibent.

## De Signis Diagnosticis.

## I. Sanitatis.

1 Conformatio, structura & numerus omnium partium corporis internarum externarum decens plerisque hominibus sanis conveniens.

2 Habitus corporis major vel minor flacciditas aut tensio, color ejusdem vel floridus vel pallidus, calor intensior, vel remissior pro subjectorum & temperamentorum diversitate.

3 Oculi vivido aspectu præditi, fulgentes turgidi & sufficientibus humoribus irrigati, ac ad objecta quæcunque sine impedimento directi. Reliqua vide in *Physiologia de Sanitate*.

## II. Morbi tam imminentis, quam præsentis.

1 Excessus vel defectus partium solidarum, mala earundem conformatio & cohesio, solutio & læsio præternaturam, œconomiam animalem turbans.

2 Habitus præter consuetudinem strictus aut relaxatus, cum conjunctis variis molestiis.

3 Coloris ejusdem in pallidum, lividum, flavum sine causa manifesta mutatio.

4 Calor vel frigus insolitum, aut horum frequentes alternationes.

5 Pulsus a naturali ordine deflectens, celer, frequens, magnus, plenus, tardus, rarus, parvus, debilis, inæqualis &c.

6 Respiratio velox, tarda, laboriosa, anxia suffocationem minitans, inæqualis, suspiriis stipata, cum sonitu & sibilo procedens, anhelitus, fœtidus &c.

7 Sudor vel multus vel nullus, vel fœtidus cum insignibus molestiis conjunctus.

8 Urina pauca, superflua, crassa, turbida, tenuis, flammea, purulenta, cruenta, crocea, nigra, fœtida, sabulosa &c.

9 Bilis ad habitum corporis regurgitatio, vel per superiora aut inferiora evacuatio molesta.

10 Mucus copiosus e naribus fluens, acris nares & partes vicinas erodens, insignis ejus copia tussi molesta e pectore aut motu peristaltico auctiori cum torminibus per alvum ejectio, aut ejusdem fluentis subitanea suppressio insignibus molestiis stipata.

11 Feces alvine copiosæ, nullæ, nimis fluidæ, acres, fœtidæ, cum torminibus frequentius ejectæ.

12 Lac copiosum, limpidum, aquosum, acre, coagulatum, spissum &c.

13 Semen quantitate excedens, deficiens, involuntarie cum vel sine dolore excretum.

14 Saliva copiosa, deficiens, spissa, tenax, amara, falsa, fœtida, sputum cruentum, purulentum &c.

15 Lacrymæ multæ, deficientes, acres, tunicas arrodentes, involuntariæ, spissæ.

16 Appetitus vel prostratus, auctus, vel inordinatus, insolita appetens.

17 Sitis vel nulla vel intensa, continuo durans vel remittens.

18 Pressiones post sumptos cibos, nullaque ab iis refocillatio, digestio nulla, ciborum plus vel minus alteratorum per vomitum vel alvum ejectio.

19 Nutritio excedens, uti in obesitate nimia, deficiens cum vel sine tumore abdominis duro & calore hæctico.



- 20 Vox rauca clangosa, lingua arida.
- 21 Somnus nullus, nimius, insomniis anxiiis turbatus & sæpius interruptus.
- 22 Insignis fatigatio corporis post leviores motus, membra torpida, gravia.
- 23 Sensuum nimius torpor aut acies excedens.
- 24 Animus torpidus, anxius, sollicitus, inquietus, ad iram, tristitiam &c. præter morem pronus.
- 25 Insolita pathemata gravidas affligentia.
- 26 Sanguinis e diversis partibus eruptiones, corpus insigniter debilitantes, aut consuetorum fluxuum suppressiones.
- 27 Dolores varii tensivi, gravativi, punctorii, pulsatorii, rodentes &c. cum vel sine rubore & tumore hinc inde in corpore se exerentes.
- 28 Motus insoliti contractorii aut relaxatorii vel partes quasdam, vel totum corpus occupantes.
- 29 Calor insignis, cum vel sine horrore prægresso corpus insigniter excrucians. Ut alia, de quibus infrequentibus sermo erit, silentio prætereamus.

#### Observationes.

- 1 Quo major fit recessus a statu naturali, eo magis signa status p. n. se manifestant.
- 2 Signa status naturalis quæcunque in statu præternaturali apparentia, utpl. bonum morbi eventum prænunciant, nisi alia pejora obstant.
- 3 Unicum interdum malum signum in morbis majorem attentionem meretur, quam multa bona.
- 4 Pulsus bonus, urina bona, insigni tamen concurrente debilitate, anxietate & perturbatione mentis, utpl. malignitatem latentem indicant.
- 5 Quo plura status præternaturalis signa concurrunt: eo pejor utplurimum est status.
- 6 In quovis morbo mente constare bonum & contra.
- 7 Plurimum morborum, tam acutorum, quam chronicorum facies index est.

#### De Signis Prognosticis.

I. *Definitio*: Signa Prognostica sunt, quæ statum morbi futurum, eventum scil. durationem & modum eventus indicant.

#### II. Differentia.

- 1 Alia sunt, signa Prognostica, *eventum morbi* manifestantia sive salutis & mortis indicia tradentia, an scil. morbus periculi expers, an periculosus, an vero lethalis sit.
- 2 Alia sunt quæ docent *durationem*, aut universalem morbi ambitum sive longitudinem & brevitatem, an scil. morbus sit acutus, peracutus &c. an vero chronicus.
- 3 Alia tradunt *modum eventus* sive solutionem morbi, eamque vel subitanam vel lentam. Sed de hisce Prognosticis mox specialiter agemus.

#### 1. De Signis Prognosticis eventus morbi, sive de signis salutis & mortis.

I. *Definitio*: Signa salutis & mortis sunt, quæ Medico operanti monstrant eventum salutarem vel lethalem morbi.

#### II. Differentia.

- 1 Alia *salutem* indicant, sive monstrant morbum neque periculosum, neque lethalem, sed potius salutarem esse, v.g. Hæmorrhagia narium in subjectis junioribus, Hæmorrhoides in viris, Febris tertiana vernalis in ætate juniore &c.
- 2 Alia *mortem* prænunciant, sive morbum lethalem esse indicant, quales morbi sunt læsiones graviores viscerum &c.

Alia sunt *dubia*, quæ quidem insigne periculum portendunt, incertum tamen relinquunt Medicum præfagientem: ita quamvis Pestis, Febris petechialis &c. sint morbi maxime periculosi & sæpius lethales, multi tamen ab iis etiam sine Medici ope liberantur.

#### III. Fontes. Desumuntur signa hæc

- 1 A *Subiecto* morbi: ubi inquirendum an vires adhuc

consent, an vero insignis earundem adsit labefactatio: an subiecto respectu ætatis & temperamenti conveniat morbus, an ratio vacillet &c.

- 2 A *parte affecta*: an scil. pars affecta sit nobilior & absolute ad vitam necessaria, an vero ignobilior?
- 3 A *morbo ipso*: an nimirum sit magnus, an parvus, an acutus contagiosus, malignus, inveteratus?
- 4 A *Symptomatibus*: an scil. symptomata sint ordinaria, an vero extraordinaria, insolita?
- 5 A *causis*: an sit materialis, activa, sive summe mobilis, acris, corrosiva, maligna, lenta, viscida, an immaterialis, ira, terror &c.?
- 6 A *juvantibus & nocentibus*: an remedia aliis salutaria aliquem vel prorsus nullum edant effectum? an motus alias salutares ad finem perveniant? an signa coctionis aut cruditatis appareant? Sed de omnibus hisce & aliis signis inferius speciatim agemus.

#### IV. Observationes.

- 1 In præfagienda vita & morte non facile uni signo fidendum est, nisi fortius sit, ita, ut alia superet: v. g. insignis virium sine causa manifesta prostratio, licet pulsus bonus & urina laudabilis sit, semper malum portendit.
- 2 Quo magis vires in quocunque morbo supprimuntur, eo majus metuendum est periculum & contra.
- 3 Omnes morbi respectu ætatis incongrui periculum minantur, & contra.
- 4 Quo magis actiones vitales, animales & rationales perturbantur, eo pejor est status.
- 5 Quo minus assuetum est subiectum morbis, eo periculosior est status.
- 6 Quo nobilior est pars affecta, eo gravius metuendum est periculum & contra.
- 7 Affectus partium internarum ut plurimum sunt graviores, quam externarum partium læsiones.
- 8 Quo major est morbus, eo gravius periculum subest & contra.
- 9 Morbi inveterati semper pejores sunt.
- 10 Morbi acuti, maligni & contagiosi nunquam periculo vacant.
- 11 Quo magis acuti sunt morbi, eo facilius enecant & contra.
- 12 Symptomata insolita, sine causa manifesta morbis supervenientia, semper monstri quid alunt.
- 13 Symptomata gravia, statui morbi alias propria, si in principio statim apparent, lethalem utpl. exitum protendunt.
- 14 Symptomata actiones vitales nimium turbantia semper majus periculum inferunt, quam reliquarum actionum symptomata.
- 15 Quo magis activa & penetrans est causa, eo facilius etiam effectum lethalem edit.
- 16 Morbi ab immaterialibus causis producti utpl. pejores sunt iis, qui a materialibus causis dependent; nisi forsan causa horum fuerit maligna.
- 17 Remediorum efficacium usum, si prorsus nullus in morbis sequitur effectus, malum est & mortem instantem sæpius indicat.
- 18 Quo magis vero sensibilibus medicamenta convenientia operantur, eo melius est.
- 19 Si motus Naturæ, in acutis præcipue, nullæ sensibiles sequuntur excretiones, utpl. malum est.
- 20 In acutis prædictiones utplurimum sunt incertæ.
- 21 Plura tamen ex coctionis & cruditatis urine Signa præfagire licet.
- 22 Medicus semper ex pluribus Signis simul consideratis Prædictiones formet, alias facile errare potest.

#### De coctione & cruditate.

I. *Definitio*: Coctio est actio Naturæ, qua mediantem in febribus præcipue acutis materiam morbificam ita præparat, ut subacta & correctæ e corpore & inpr. per urinam expelli queat. Cruditudo vero est contrarius status.

#### II. Differentia.

- 1 Alia juxta veteres est *debilis & obscura*.

2 Alia



- 2 Alia magis manifesta, quæ potissimum in morbi augmento occurrit.
- 3 Alia est perfecta, quæ in statu morbi deprehenditur.
- 4 Alia imperfecta, ad cruditatis statum adhuc inclinans. Uti autem diversi sunt coctionis, ita & tres diversi cruditatis sunt gradus.

## III. Signa coctionis sunt

- a Universalia, quæ desumuntur potissimum ab urina.
- b Particularia, quæ in morbis pectoris a sputo, in abscessibus a pure, in affectibus vero primarum viarum ab excrementis desumuntur: quamvis hæc ultima ad universalia referri queant, quando scil. multa recrementa e Massa humorum ad intestina deponuntur, atque hoc modo de universalium humorum statu indicium præbent.

## IV. Causa efficiens:

Est Natura sola, quæ mediantibus motibus materiam crudam, continuo per varias partes transpellendo, sensim sensimque ita alterat, ut sine ulteriori noxa tandem vel subito per crisis, vellentem e corpore expelli possit: talis enim vitiosus humor nunquam ita alteratur, ut eum reliquis humoribus vitalibus in gratiam redire queat, quare expulsionem ejus absolute opus est. Concurrit tamen ad coctionem etiam ars Medica & quidem duplici modo, imminuendo scil. quantitatem & corrigendo qualitatem coctionis opusturbantes: id quod fit per convenientes evacuationes sanguinis & feri, si morbi conditio & tempus id permittunt: quorum etiam spectant remedia varia alterantia, quæ convenienti tempore exhibita Naturæ, in corrigendo, resolvendo, temperando &c. humore crudo, suppetias ferunt.

## V. Observationes.

- 1 Signa coctionis & cruditatis se manifestant in excrementis, scil. in Urina, excrementis alvinis & sputo, & in abscessibus in pure.
- 2 Coctionis signa semper bona sunt, quocumque tempore appareant.
- 3 Præsentibus etiam malis signis, coctionis signa nihilominus bona sunt.
- 4 Urina in morbis acutis constanter cruda permanens, nec ullum sedimentum deponens, morbum lethalem esse ut plurimum indicat.
- 5 Urina optima est, si candidum sedimentum fuerit pellucidum & æquale.
- 6 Morbi pectoris nunquam solvuntur, nisi sputo probe cocto & alterato.
- 7 Feces alvinæ admodum fluidæ, & fœtidæ inter signa minus salutaria referendæ.

## 2. De Signis Prognosticis Durationis.

I. Definitio: Signa Durationis sunt, quæ longitudinem vel brevitatem morborum Medico monstrant.

## II. Differentia:

- 1 Alia brevitatem morbi
- 2 Alia vero ejusdem longitudinem indicant.

## III. Fontes. Signa hæc petuntur

- 1 A Subjecto: ubi considerandum cujusnam ætatis sit æger, cujus temperamenti, an vires consentiant &c.
- 2 A parte affecta: an viscera affecta sint, an vero aliæ partes &c.?
- 3 A morbo: ejusque differentiis essentialibus & accidentalibus, an sit epidemicus, malignus, hæreditarius, adscititius &c.?
- 4 A Symptomibus: an sint mitiora, an graviora, an morbo respondeant?
- 5 A causis: an sit maligna, an benigna, an biliosa, mucosa, serosa &c.?
- 6 A Signis coctionis & cruditatis. Plura de hisce fontibus inferius sub signis dicemus.

## IV. Observationes.

- 1 Sensibiles, juniores, fœminæ, sanguinei &c. facile morbis affliguntur, sed facile etiam reconvalescunt.

- 2 Senes, Phlegmatici & Melancholici diutius morbis laborant.
- 3 Quo magis prostratæ sunt vires in acutis, eo brevior plerumque est morbus.
- 4 E contra chronici corpore debili existente diutius durant, qui tamen in robustioribus breviori tempore solvuntur.
- 5 Quo nobilior læsum est viscus, eo brevior est morbus.
- 6 Omnes morbi hæreditarii diuturni sunt.
- 7 Morbi magni brevioris sunt durationis.
- 8 Infarctus & Scirrhi morbos diuturniores reddunt.
- 9 Exulcerationes viscerum lentæ tarde admodum ad finem properant.
- 10 Morbi serosi plerumque diuturniores sunt.
- 11 Morbi epidemici & maligni brevi tempore finiuntur.
- 12 Quo citius morbi tempora particularia absolvunt, eo citius etiam ad finem universalem properant.
- 13 Quo graviora sunt symptomata, eo citius etiam morbus finem assequitur.
- 14 Quo magis activa est causa, eo citius etiam morbus vel ad salutem vel mortem terminatur.
- 15 Quo minus vero ad motum apta est materia morbifica, eo diutius protrahitur morbus.
- 16 Quo diutius protrahitur coctio, eo diuturnior quoque est morbus.
- 17 Tempus coctionis ut plurimum est medium tempus morbi, sive tantum est intervallum a signis coctionis ad finem morbi, quantum ab ejus principio ad tempus coctionis v. g. si signa coctionis die quarto apparent, morbus plerumque finitur die septimo & sic porro.

## 3. De modo eventus.

I. Definitio: Est solutio morborum vel subitanea, vel lenta, & quidem vel ad salutem, vel ad mortem, per Crisin & Lysin.

## II. Differentia.

- 1 Alius est subitaneus & quidem vel salutaris vel lethalis qui fit
  - a per subitaneam immutationem & discussionem materiæ morbificæ & quidem in melius: ita sæpius per animi pathemata podagra aliique graves morbi soluti fuere: huc etiam pertinent remedia illa Chemicorum penetrantissima, quæ inexplicabili quodam modo gravissimos in instanti quasi morbos sustulisse dicuntur. In pejus autem quando fere ex improvviso, ob retrocessionem macularum, exanthematum aliasque causas, morbi subito in deterius ruunt & lethales fiunt.
  - b per subitaneam evacuationem: idque vel cum euphoria, uti id fit in crisis veris & salutaribus, per Hæmorrhagias, sudores &c. vel cum cacophoria in excretionibus talibus symptomatice & nimis.
  - c per transpositionem: quando materia morbifica e corpore non expellitur, sed e partibus nobilioribus & e sanguine in partes exteriores sive ignobiliores deponitur, quale quid contingit in morbis acutis malignis, in quibus materia morbifica varios abscessus, parotides, & bubones format, qui abscessus, si probe maturantur & ex iisdem ruptis vel apertis materia noxia evacuat, egrotis saluti sunt, retrocedentes vero eosdem jugulant.
- 2 Alius est successivus, quem vocant Lysin: quando scil. morbi circa dies criticos, vel in iis sensim sensimque solvuntur per evacuationem lentam, quod contingit in multis febribus acutis exacte periodicis, ut & in morbis chronicis: aut quando morbi lento pede ad mortem properant, uti febres lentæ & hecticæ. Sed de singulis hisce speciatim agemus & quidem



## I. De Crisibus.

I. *Definitio*: **C**risis, est actio Naturæ in morbis præcipue acutis, ubi materiam morbificam vel quantitate vel qualitate peccantem, bene præparatam per certa corporis, emunctoria repentine expellit, & corpus ab interitu imminente vindicat: sive est impuri a puro separatio, & expulsio cum euphoria.

II. *Differentia*:

- 1 Alia est *perfecta*, quæ ope sufficientis excretionis perfecte morbum solvit: ita ut statim euphoria sequatur, ac symptomata hætenus molesta, etiam gravissima, vel insigniter mitigentur, vel prorsus evanescant.
- 2 Alia est *imperfecta*, quando materia quidem per motus febriles præparatur & ad locum excretorium fertur, sufficienti tamen copia, vel ob insufficientem præparationem, vel ob motus non satis vegetos, vel ob organi excretorii malam dispositionem, non excernitur.
- 3 Alia prorsus est *nulla* sive *Acrisis*, quando quidem Natura motibus suis, propellit materiam ad locum destinatum, prorsus tamen nulla sequitur excretio; aut quando in iis morbis, ubi probabiliter crisis expectari poterat, neque salutaris excretio, neque etiam motus ad excretionem tendens instituitur, & egrotus hinc in inevitabile vitæ periculum conjicitur.

III. *Tempus*: est status morbi, in quem incidunt vulgo sic dicti *dies critici*: qui dividuntur

- 1 In Criticos stricte sic dictos, in quibus scil. optimæ & perfectæ crises ordinariæ cum euphoria contingere solent: quales sunt septimus, decimus quartus & vigesimus: aut juxta alios vigesimus primus, quo tempore alia morbi acuti ordinariæ cursum suum absolvunt: hisce ab antiquis Medicis adhuc, in morbis scil. ultra ordinarium terminum extensis, adduntur vigesimus septimus vel octavus, trigessimus quartus aut quintus, quadragesimus aut quadragesimus secundus: ultra quem terminum rarissime crises se extendunt, sed morbi potius vel abscessibus, vel lento successu finiuntur.
- 2 In improprie sic dictos, quales sunt
  - a *Indices* sive Indicatorii, qui scil. qui die critico futurum sit, indicant; hi sunt quartus, undecimus & decimus septimus, quorum primus septimi, secundus decimi quarti, tertius vigesimi vel vigesimi primi, est index: ita si die quarto coctionis signa in morbis, quæ alias per crisin solvi solent, apparent, criseos aut saltem mutationis in melius die septimo futuræ indicium præbent: ita quoque Hæmorrhagiæ die quarto in minori quantitate contingentes, Crisin per Hæmorrhagiam narium completam die septimo futuram sperare jubent.
  - b *Intercalares* sive *Incidentes*, quos alii etiam Provocatorios appellant, in quibus interdum ob Naturæ errorem, vel ob humorum motum nimium, aut malignitatem crises, sed imperfectæ, eveniunt; tales dies sunt tertius, quintus, nonus, decimus tertius, decimus nonus &c.
  - c *Vacui*, in quibus neque criseos indicia apparent, neque crises fiunt, neque provocatio ad easdem observatur, sive in quibus vel nullæ, vel malæ vel imperfectæ crises contingunt: quales sunt, sextus, (qui; quia semper malæ in eo observantur & periculosa excretionem, tyrannicus ordinariæ ab antiquis vocatur) octavus, decimus. Hi dies vocantur etiam *Medicinales*, ideo, quod hisce diebus remedia exhibere liceat.

IV. *Subjectum* sive morbi in quibus crises contingere solent, sunt Febres (quamvis enim in aliis morbis contingere soleant excretionem cum euphoria, criseos tamen nomen a Medicis illis non tribuitur) & quidem Febres acutæ ubi tamen statim excipi debent: Febres inflammatoriæ, quæ scil. insigni cujusdam visceris labi junguntur: ac Febres exanthematicæ, quales sunt Variolæ, Morbilli, Purpura, Febris Petechialis: quamvis enim in hisce variæ sentian-

tur commotiones circa dies indicatorios & criticos, crises tamen in iis minime observantur. Ex acutarum autem censu, in quibus observantur Crises, sunt sequentes.

- 1 Febres ardentes cum insigni Plethora conjunctæ, in quibus crises contingunt
  - a Per Hæmorrhagiam narium in junioribus.
  - b Per sudorem in adultis.
- 2 Febres biliosæ ab assumptis & iracundia ortæ ubi fiunt
  - a Per Vomitum &
  - b Per Diarrhœas.
- 3 Febres continentes, sive sanguineæ sive Synochi, qui ad imminuendam Plethoram a Natura instituntur, unde in hisce fiunt vel
  - a Per Hemorrhagiam narium, quod inpr. in junioribus, ad annum circiter vigesimum quintum contingit.
  - b Per sudores largiores, in iis scil. qui dictum, vel trigessimum annum superarunt.

V. *Signa*.

- 1 Crisis imminens sive futuræ & quidem
  - a Per Hæmorrhagiam narium in Plethoricis subjectis,
    - 1 Frigus extremorum inprimis pedum, aut saltem notabilis in iisdem caloris remissio.
    - 2 Alvi adstrictio.
    - 3 Urina tenuis.
    - 4 Murmura abdominis.
    - 5 Tensio Hypochondriorum sine dolore.
    - 6 Respirationis difficultas cum oppletionem pectoris.
    - 7 Inflatio colli ejusdem vasorum, ac pulsatio.
    - 8 Cervicis dolor.
    - 9 Rubor faciei. (bus.)
    - 10 Pulsatio magna vasorum & gravitas in temporibus.
    - 11 Tinnitus aurium & sibilus.
    - 12 Insomnia turbulenta de flammis aliisque rebus, rubris.
    - 13 Oculorum hebetudo & marmariges illis observantes, robur & dolor punctorius in medulla bulbi.
    - 14 Lucis aversio.
    - 15 Lacrymarum involuntaria profusio.
    - 16 Dolor capitis gravativus inpr. circa radicem nasi.
    - 17 Narium pruritus.
    - 18 Sanguinis guttæ die indice erumpentes.
  - b Per *Menses aut Hemorrhoides*, (quæ quidem ceteris Crisibus rariores sunt, in assuetis tamen interdum contingunt.)
    - 1 Æstus circa spinam & dolor dorsi inpr. circa os sacrum.
    - 2 Tensio in lumbis & gravitas.
    - 3 Spastici dolores abdominis & inpr. Hypogastrii.
    - 4 Tensio in hypochondriis.
    - 5 Tenesmus cum sensu quodam rei apno inherentis.
    - 6 Tempus mensium instans in sexu feminino.
  - c Per *Vomitum*.
    - 1 Ventriculi morsus.
    - 2 Capitis dolor acris, vertiginosus.
    - 3 Caligo oculorum.
    - 4 Tremor labii inferioris.
    - 5 Copiosæ salivæ in cavitatem oris effusio.
    - 6 Rigor & frigus.
    - 7 Constrictio in hypochondriis.
    - 8 Nausea ac fastidium.
  - d Per *Diarrhœam*.
    - 1 Alvi libertas assueta in sanis & in morbo quoque.
    - 2 Frequentes ructus & hosce subsequens inflatio abdominis cum borborygmis.
    - 3 Tormina interdum abdominis cum lumborum dolore.
    - 4 Fluxus, aliqualis alvi die indicatorio.
  - e Per *Sudorem*.
    - 1 Essentia morbi ad saltem excretionem proclivis, ubi sunt febres acutæ.
    - 2 Subjectum alias ad sudores pronum, habitu scil. laxo & spongioso præditum.
    - 3 Causa morbi subtilior, ad excretionem per peripheriam corporis apta.
    - 4 Tempus anni aut constitutio calida habitum corporis.



poris relaxans & ad faciliorem traspirationem disponens.

5 Pulsus mollis & undosus.

6 Alvi suppressio.

7 Urinæ parciore excretio & sensibilis imminutio, aut interdum suppressio, sive Hæmorrhagiæ aliarumque criticarum excretionum signis.

8 Signa coctionis quarto die apparentia.

9 Rigor.

10 Habitus corporis relaxatio sive cutis mollis.

11 Calor ejusdem major & partium quarundam inpr. faciei color floridus.

12 Vapor ex habitu corporis versus dies criticos exhalans, & lenis mador habitum corporis occupans.

13 Deliria prægressa.

f Per urinam.

1 Absentia signorum alias excretionem indicantium.

2 Prægressa die indicatorio signa coctionis, aut urinæ copiosiores eodem die apparentes.

3 Tempus hybernium.

4 Ætas senilis.

5 Habitus corporis constrictus.

6 Gravitas in hypochondrio.

7 Sensus inflationis circa vesicam.

8 Alvi suppressio.

9 Frequens mictus aut stimulus ad mictionem.

10 Ardor sub mictione inpr. in extremo urethræ.

g Per Abscessum, per quem non solum Parotides & Bubones ad supputationem tendentes, sed & aliæ humorum translationes & decubitus intelliguntur. Crises tales Naturæ vel debilitatem, vel materiæ ad subitaneam excretionem ineptudinem indicant, satius tamen semper est materiam a partibus nobilioribus transferri ab ignobilioribus, quam eandem cum damno retineri in sanguine: indicant autem tales abscessus.

1 Natura morbi ad eosdem prona, febres scil. acutæ, pestis, aut acutæ ex decidentia, ubi perfecta crisis non amplius sperari potest.

2 Absentia signorum ad perfectam eccrisin tendentium.

3 Urinæ longo tempore tenues & crudæ, abscessuum in inferioribus partibus indices.

4 Rigor urinæ fluxum sistens, sopor & ilia sine tumore & dolore parotidem futuram indicantes.

5 Calor evidens illa fatigans, abscessus inferiorum partium prænuntians.

2 Præsentis.

Actualis, prægressa coctionis die indicatorio signa, & noctem criticum diem antecedentem graviolem, sequens humorum vel per nares, vel per vomitum &c. excretio cum euphoria, sive insigni morbi mitigatione, aut utpl. ejusdem plenaria sublatione, ita ut præter debilitatem nihil ejus superstes maneat.

IV. Causa Efficiens:

Est Natura, vitales actiones in corpore dirigens, quarum ope humores vitiosos primis febris acutæ diebus sensim sensimque alterat & ad excretionem disponit, quam etiam septimo die, nisi causæ potentiores obstant, perpetrat & in actum deducit: cum vero ad hanc excretionem insignibus moribus opus sit, insignes etiam ante eruptionem motus tales sequuntur molestiæ, quæ tamen cum ipso morbo mox cessant, quam primum scil. sufficiens humorum copia per locum excretioni destinatum evacuata fuit. Quales autem septimo & in ingenti periculo quarto die tales excretionem suscipiantur res explicatu, si non impossibilis, difficilis tamen est: quæ enim de lunæ potentia hoc loco a quibusdam afferuntur, insufficientia sunt.

VII. Observationes.

1 Omnes evacuationes criticæ, nisi per signa coctionis die indicatorio indicatæ fuerint, & in diem incidunt decretorium, merito suspectæ sunt.

2 Nisi sufficiens fiat excretio per evacuationes criticas, raro sequitur euphoria. Nihil enim paucum, juxta antiquorum regulam est criticum.

3 Execrationes criticæ, si morborum indoli aut subje-

cto non convenient, raro bonæ sunt.

4 Omnes crises, euphoriam post se non relinquentes, malæ sunt.

5 Si primo statim die coctionis signa apparent, crises etiam perfectæ quarto die contingentes salutares sunt.

6 Quo magis activa est causa morbifica, eo citius etiam sequitur eccrisis.

7 Quo major est apparatus ad crises in morbis acutis, & tamen prorsus nulli per partes excretioni alias dicatas evacuationi conceditur locus, eo facilius periculosa metastases ad alia loca metuendæ sunt.

8 Morbi acuti neque ad Crisin, neque ad successivam excretionem tendentes, vel diuturni fiunt, vel mature ægrotos jugulant.

9 Hæmorrhagias narium in Variorum & Morbillis tam juniorum quam adultorum, etsi reliquum morbi decursum, juxta experientiam nostram, sæpius satis tranquillum reddiderint, minime tamen pro vere criticis sunt habendæ.

10 Signa coctionis die indicatorio apparentia semper sunt bona, non tamen necessario crisin die decretorio futuram indicant.

11 Motus critici in adultis ad Hæmorrhagiam narium tendentes utpl. vel sunt imperfecti vel mali, nisi homines præter consuetum ordinem illi adhuc excretioni obnoxii sint.

12 In Crisibus per Menses & Hæmorrhoides, nisi in consuetum alias tempus incidant, utpl. vel excessus vel defectus metuendus est.

13 Crises per sudorem in acutis, si malum in sanguine heret, utpl. meliores sunt reliquis.

14 Ubi vero symptomata circa primas vias, a bile præcipue orta, urgent, satius est Crisin fieri vel per superiora vel pro inferiora, quod inpr. locum habet in Febribus biliosis.

15 In morbis malignis aut peste non semper fidendum est Parotidibus aut Bubonibus, nisi enim prompte ad maturationem tendant, sæpius funesti eventus fiunt causa.

16 Decubitus humorum ad partes inferiores in senibus & phlegmaticis per imprudentem medicationem sæpius, sedato etiam morbo, fiunt funesti.

17 Plures crises aut criticæ ac periodicæ commotiones sæpiissime turbantur a remediis imprudenter exhibitis, inpr. a remediis sic dictis universalibus, Vomitoriis, Purgantibus, Venesectionibus &c. in principio & statu morbi exhibitis, id quod eo promptius contingit, quo subjecta sunt magis sensibilia.

18 Opiata eo tempore, quo omnia symptomata, ob crisin instantem, graviora sunt, exhibita, motus salutares sistendo & excretionem impediendo venena potius quam auxilia sunt.

De Lysi Morborum.

I. Definitio: **L**ysis est successiva morborum solutio, qua mediante vel per certas periodos, vel lente admodum, materiæ morbificæ fiunt excretionem cum insequente euphoria.

II. Differentia.

1 Respectu temporis alia est acuta, qualis deprehenditur in multis febribus acutis, alia est chronica, quæ occurrit in febribus lentis aliisque diu durantibus morbis: alia stata & periodica, alia vaga.

2 Respectu exitus alia est salutaris, alia lethalis: illa est, quando sensim materia morbifica cum euphoria evacuatur: hæc verò quando vel nihil, vel parum tantum, vel interdum nimium excernitur, & sic morbi semper pejores redditi ad mortem tendunt.

II. Modus.

1 In Febribus & quidem

a Intermittentibus, in quibus legitime succedentibus, non solum materia morbifica in primis viis hærens sensim præparatur; & evacuatur, sed & quilibet paroxysmus excretionem per cutim finitur.



*b Continentibus*, quæ etsi interdum per Crises solvantur, sæpius tamen etiam per continuatam diaphoresin successive tolluntur.

*c Ardentibus*, quas Diarrhææ successivæ interdum solvunt.

*d Continuis*, quarum impetus sensim sensimque per placidam diaphoresin, quamvis exacerbationem excipientem frangitur.

*e Exanthematicis*, & quidem

1 *Petechizantibus*, quæ sibi relictæ, nec incondito regimine aut remediis inconvenientibus turbatæ, statas circa vespere exacerbationis horas observant, finita vero exacerbatione, quod ut plurimum superata media nocte aut versus diluculum contingit, impetus ejus postea per lenem diaphoresin aliquo modo frangitur, ita ut ægroti se melius habeant, utrum hoc modo quælibet exacerbatio procedit, tandem morbus, inpr. si Natura convenientibus remediis adjuta fuerit, plenarie solvatur.

2 *Variolis & morbillis*, in quibus Natura successive exanthemata per febrem expellit, easque tamdiu in cute conservat, donec suppurentur & exarefcent, atque hoc modo totus morbus finiatur.

*f Inflammatoriis* & aliis inflammationibus, in quibus per frequentem sanguinis appulsum & fortio-rem sanguinis per partes transpressionem, materia noxia sensim sensimque eluitur, ita ut relictæ materia innoxia morbus hoc modo successive solvatur.

*g Hæcticis*, ubi propter labem viscerum corpus sensim sensimque contabescit, donec accedentibus sudoribus & Diarrhæis colliquativis mors sequatur.

2 In *Doloribus arthriticis*, in quibus pars materiæ peccantis a sanguine eluitur & per alia loca evacuat, pars vero insensibiliter exhalat, ita ut hoc modo paroxysmus sensim sensimque imminuat.

3 In *affectionibus serosis* variis, qui sæpius excreta sensim materia morbifica lento grado finiuntur, aut magis magisque corruptis & concervatis humoribus lente ad mortem properant. Ut alios affectus in quibus tales Lyses occurrunt, silentio prætereamus.

#### IV. Observationes.

1 Uti Crises perfecte die indicatorio signa coctionis præsupponunt, ita quoque & Lyses sine hisce in febribus acutis nunquam sunt salutare.

2 Nisi Lyses tales respondeant periodis morborum, vix aliquid boni ab iis est sperandum.

3 Quemadmodum Crises, ita & Lyses sufficientem postulant excretionem.

4 Plures in nostris regionibus morbi per Lyses quam per Crises solvuntur.

5 Uti Crises ita & Lyses per imprudentem medicationem facile turbantur.

6 Nisi tales placidas excretiones alacritas animi, somnus magis placidus & remissio pulsus aliorumque symptomatum in acutis sequantur, merito suspectæ sunt.

7 Quo magis tranquille sunt eccrises in febribus, eo temperatoria etiam ab initio exhibenda sunt remedia.

8 Optimum tempus exhibendi remedia lenia evacuantia per diaphoresin est illud, quando Natura eccrissin placidam molitur, post scil. exacerbationes & diebus periodicis, quod inpr. in Febribus petechizantibus locum habet.

9 Cum die indicatorio utpl. incipiant Lyses sive placidæ excretiones, probe cavendum est, ne per malum regimen aut inconvenientia remedia turbentur.

10 Quo magis lenta est materia morbifica, eo tardius etiam procedunt Lyses & contra.

11 Quo magis læsa sunt viscera, eo minus salutaris morbi speranda est solutio.

12 Quam primum in morbis chronicis excretiones apparent, solutionis spes est & contra.

## De Signis mixtis, iisque tam Diagnosticiis quam Prognosticis.

### I. De Signis ex Pulsu.

I. *Definitio*: **P**ulsus est motus arteriarum a corde productus, dilatatione & constrictione, Medico inquirenti, pro diversitate sua varia signa præbens.

### II. Differentia.

1 Alius pulsus est *naturalis*, qui scil. est æqualis, moderatus, sine insigni arteriæ dilatione & duri-  
tiæ, vegetus tamen.

2 Alius vero est *præternaturalis*, qui scil. vel excedit vel deficit, unde diversi oriuntur pulsus præternaturales & quidem.

*a Respectu vigoris & vehementiæ* motus cordis, alius est *fortis* sive *vehemens*, qui scil. cum majori impetu, alius vero debilis, mediocriter tantum digitos tangentes, feriens.

*b Respectu temporis*, quo pulsus absolvitur & arteria dilatatur, alius est *celer*, alius vero est *tardus*.

*c Respectu quietis* inter pulsus plures alius est *frequens*, alius vero est *rarus*.

*d Respectu inflationis arteriæ sive spatii*, quod arteria pulsus tempore occupat, alius est *magnus*, aut *parvus*: alius vero aut *plenus* aut *vacuus*.

*e Respectu tensionis* arteriæ alius est *durus*, alius *mollis*.

*f Respectu rhythmii*, alius est *æqualis*, quando scil. pulsus singuli respectu pulsationis & temporis inter se conveniunt, alius vero est *inaequalis*, qui ab hac norma deflectit, cujus species sunt:

1 *Myurus*, quando pulsus semper imminuitur, ita ut fortio-rem successive semper sequantur debiliores.

2 *Intermittentes*, ubi post unum vel alterum ictum vel plures etiam pulsus intermittit.

3 *Undosus*, quando arteria instar fluctuantis aquæ inæqualiter & in alia parte magis, in altera vero minus extenditur. Ad hunc referunt alii etiam.

4 *Vermicularem & formicantem*, quorum ille undoso, hic vero formicante minor est.

5 *Tremens & palpitatorius*, quando tremor tantum quidam arteriarum, nullus autem distinctus observatur pulsus.

6 *Caprizans*, qui in medio motu inter rumpitur, ita, ut duplex quasi ictus percipiatur.

### III. Observationes

1 Alternationes in pulsu non semper sunt indicia status præternaturalis, sed sæpius ab animi affectibus aut aliis rebus non naturalibus, originem trahunt.

2 Pulsus fortis, magnus & æqualis fere in omnibus his salutaris est, si reliqua consentiant.

3 Nullæ vel parum tantum sensibiles pulsus alterationes, præsentē nihilominus insigni perturbatione in toto corpore sæpius latentis malignitatis indicium est.

4 Fortis pulsus in morbis acutis ad debilitatem periculum minatur.

5 Debilis pulsus semper est malus, inpr. si in morborum statim principio apparet, in morborum tamen sine periculum non portendit.

6 Celer pulsus in statu præternaturali febrium pathognomonicum signum est, inpr. si celeritate frequentia simul jungitur.

7 Quo magis celer & frequens est pulsus in acutis, eo breviori tempore finiuntur.

8 Frequens pulsus sæpius absque celeritate est, quod observamus post terrorem & metum, ut & in variis morbis eorum, qui mortem nimis timeant: sæpius quoque occurrit in Passione Hypochondriaco-Hysterica.

9 Uti pulsus celer in febribus Naturæ diligentiam ad removendum quoddam impedimentum, ita frequens ejusdem laboris jugem continuationem indicat.



- 10 Pulsus moderate celer, raro periculosus est, ubi vero modum excedit, ac simul magnus, plenus & durus redditur, plerumque inflammationum internarum prodromus est.
- 11 Tardus & rarus pulsus in acutis, ubi celeritate & frequentia ob morbi magnitudinem opus erat, virium prostrationem insignem indicat & hinc pessimus est.
- 12 Tardus pulsus interdum indicat nimiam materiæ tenacitatem & ad motum inhabilitatem.
- 13 Pulsus tardus & debilis in horrore intermittentium periculo vacat, quia damna exinde metuenda per insequentem in calore celerem pulsum præcauentur.
- 14 Celer frequens & debilis pulsus ut plurimum malus est.
- 15 Pulsus celer & debilis, si postmodum durus cum aliqua tensione redditur, prodromus est aut inflammationum aut convulsionum lethalium, quod in febris petechialibus sæpius observavimus.
- 16 Pulsus plenus humorum abundantiam & ebullitionem indicat.
- 17 Pulsus vacuus semper malus est.
- 18 Magnus pulsus raro periculosus est, & si durities ei jungitur, inflammationes imminentes portendit.
- 19 Pulsus durus in acutis utpl. inflammationum index est, quod in Pleuritide observamus.
- 20 Alias etiam abundantiam humorum, eorum spissitudinem, stagnationem & infarctum indicat.
- 21 Pulsus parvus, tardus, debilis, malus.
- 22 Pulsus mollis sæpius in morbis serosis observatur: in acutis interdum crisin per sudorem indicat, si alia conspirant.
- 23 Omnes pulsus inæquales mali sunt, pessimus vero Myurus.
- 24 Omnes pulsus inæquales Naturæ debilitatem indicant.
- 25 Pulsus intermittens cum aliis signis interdum indicat Hydropem pectoris.
- 26 Pulsum intermittentem in tertianis Plethoricum ac in Hypochondriacis sæpius observavimus.
- 27 Pulsus tremens maximam virium prostrationem & mortem instantem utpl. indicat.
- 28 Pulsus undosus in vermicularem aut formicantem degenerans pessimum eventum prænunciat.
- 29 Caprizans pulsus plerumque prodromus est convulsionum.

## 2. De Signis ex Respiratione.

I. *Definitio*: **V** Id. Tab. de Physiolog. pag. 3.

### II. *Differentia*.

- 1 Alia est *naturalis*, quæ absque ullo impedimento fit.
- 2 Alia est *præternaturalis*, quæ contrario modo se habet & hinc varia signa status præternaturalis præbet: & hæc est
  - a *Magna*, quando thorax insigniter extollitur, ita ut aer etiam in majori quantitate in pulmones irruere possit.
  - b *Parva* quando pectus non sufficienter dilatatur.
  - c *Difficilis*, ita ut non sine insigni labore perfici queat.
  - d *Celer*, sive frequens, quando actus inspirationis & expirationis frequenter brevi tempore reiteratur.
  - e *Tarda* sive *rara*, quæ contrario modo se habet.
  - f *Calida*, quando aer exspiratus insigniter calet.
  - g *Frigida*, ubi halitus friget.
  - h *Inæqualis*, quando scil. vel inspiratio & exspiratio, aut plures etiam pectoris extensiones sibi invicem respectu æqualitatis non respondent.
  - i *Sonora*, quæ cum sonitu, sibilo aut stertore fit.
  - k *Erecta*, quando homines non nisi erecto corpore respirare possunt.
  - l *Sublimis*, quando maxime elato pectore ac scapulis & motis ac dilatatis quoque narium pinnis ægroti respirant.

### III. *Observationes*.

- 1 In omni morbo, & inpr. in acutis, bene respirare, bonum est, & contra.
- 2 Magna respiratio robur adhuc indicat & per se non adeo mala est, si tamen simul celer est, vel insignem sanguinis turgescientiam, vel organorum respirationi inservientium, aut vicinarum inflammationem, vel imminentem vel præsentem interdum indicat.
- 3 Eo facilius vero talis partium inflammatio dignoscitur, si respiratio magna in parvam & celerem degenerat.
- 4 Respiratio parva & rara sæpius signum instantis mortis est.
- 5 Respiratio magna & rara deliriorum est indicium.
- 6 Parva & obscura respiratio semper mala est.
- 7 Difficilis respiratio utpl. impedimentum quoddam vel in ipsis pulmonibus, vel in partibus vicinis indicat, & hinc quoque gravius tale est impedimentum, eo gravius quoque est periculum.
- 8 Difficultas spirandi cum deliriis in febris acutis lethalia sunt signa.
- 9 Dyspnœa nocturna sine tussi circa mediam inpr. noctem graviter affligens, utpl. prodromus est Hydropis lethalis, quod sæpius observavimus.
- 10 Magna inspiratio & parva exspiratio & contra, semper periculum portendit.
- 11 Quo magis plures se insequentes inspirationes & expirationes sunt æquales, eo melior est status.
- 12 Orthopnœa in morbis acutis pariter ac chronicis mala est.
- 13 Respiratio difficilis cum sibilo signum Asthmatis pathognomicum est.
- 14 Respiratio cum stertore in acutis mortis indicium.
- 15 Stertor cum spuma ante os in Apoplexia lethale signum est.
- 16 Suspiriis interrupta respiratio in febris acutis semper mala est.
- 17 Respiratio sublimis cum motu pinnarum nasi in acutis insignem indicat virium prostrationem & ut plurimum exitialis est.
- 18 Respiratio calida insignem humorum fervorem, aut partium pnevmonicarum inflammationem designat.
- 19 Frigida respiratio in morbis acutis mortis instantis signum est.

## 3. De Signis ex Voce & Loquela.

I. *Definitio*: **V** Vox est simplex sonus beneficio aeris e pulmonibus per asperam arteriam eruens productus: Loquela vero est ejusdem aeris ope linguæ specifica modificatio & in sonum articulatum distributio, in statu præternaturali diversa signa præbens.

### II. *Differentia*. Utraque est

- 1 *Clara*, quando vox sine ullo impedimento prodit.
- 2 *Rauca*, clangosa &c. quando contrario modo se habet.
- 3 *Nulla*, ubi vel sonus, vel loquela prorsus cessant.

### III. *Observationes*.

- 1 Raucedo malam organorum voci inservientium dispositionem generaliter indicat.
- 2 Raucedinem phthisicorum mors brevi sequitur.
- 3 Vox rauca, acuta ac clangosa in acutis summe periculosa est.
- 4 Vocis interceptiones cum exsolutione pessimæ Hipp. *Prorrh. L. 1. §. III. 9.*
- 5 Omnis aponia in febris acutis, undecumque fit, exitialis est.
- 6 Aponiæ causa in acutis sæpius est inflammatio tum pulmonum, tum partium in hypochondriis sitarum.
- 7 Vox clangosa, ubi hypochondria in acutis retracta sunt, pessima.
- 8 Vox acuta & oculorum obscuratio convulsionem minantur.
- 9 Vox clangosa cum lingua tremula mala.
- 10 Ex vomitu nauseabundo orta clangosa vox, oculi



- pulvillum incumbentem habentes, insaniam portentunt. *Hipp. Prorrh. Lib. I. § II. 12.*
- 11 Cum voce tremula, alvi præter rationem solutio, in iis longiore tempore perseverante malo, lethale.
- 12 Si ebrius quidam repente obmutescat, convulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut qua hora crapula solvitur, vocem recuperet.
- 13 Vocis interceptiones cum singultu pessimæ. *Hipp. Prorrh. L. I. § 3. 8.*

#### 4. De Signis ex Facie.

I. **Definitio:** **F**acies est anterior pars capitis, frontem, oculos, malas, nasum, labia & mentum & etiam tempora ac aures complectens, quæ tanquam speculum animi & compendium corporis varia in statu naturali & præternaturali supeditat signa.

#### II. Differentia:

- 1 Alia est naturalis, quæ scilicet mediocriter est turgida, magis vel minus florida cum vivido oculorum aspectu, ratione individuorum differens.
- 2 Alia est præternaturalis, quæ nimirum est pallida contracta &c. sive sanæ contraria, cujus signa desumuntur.

1 a fronte	5 a labiis
2 ab oculis	6 a mento
3 a naso	7 a temporibus
4 a malis	8 ab auribus

#### III. Observationes.

- 1 Ut vultus imago est animæ, ita facies index quasi est & sermo quidam, non modo perturbationum animi, sed etiam interiorum corporis affectuum.
- 2 Quo magis facies recedit a statu naturali eo peius indicium præbet.
- 3 Nisi cognita sit facies naturalis, vix aliquid certi prædici potest ex facie, nisi alia signa simul jungantur.
- 4 Homines sæpius gravibus & chronicis morbis laborant, quorum tamen color faciei naturalis minime est mutatus.
- 5 Subitanæ faciei & frequentes mutationes, nisi ab animi pathematibus ortum traxerint, morbos imminentes indicant.
- 6 In viscerum infarctibus, si color faciei adhuc est naturalis, restitutionis spes est, sin vero maxime alterata macida & pallida fuerit, utpl. funestum est.
- 7 Faciei insignis marcor, aut Facies Hippocratica in morbis, tam acutis quam chronicis, pessima est.
- 8 Faciei Hippocraticæ signa sunt: Oculi cavi, nasus acutus, tempora collapsa, aures frigidae & contractæ, cutis dura (in facie) color pallidus aut niger, livescens quoque ex his palpebra aut labrum aut nasus. *Hipp. Coac. Prænot. § II. 108. 109.*
- 9 Faciei rubor cum inflatione, aliisque signis superius recensitis, interdum crisin imminentem per Hæmorrhagiam narium indicat.
- 10 Habitus faciei præter morem auctus & floridus merito suspectus est.
- 11 Interdum facies talis deliria phrenitica portendit.
- 12 Chronica faciei rubedo ad lividitatem vergens, cum parvis duris tuberculis in pustulas abeuntibus, Hepatitis vitium interdum indicat.
- 13 Repentinæ coloris alterationes in floridum, Hypochondriacis & Hysterias familiares, sæpius labem quandam viscerum indicant.
- 14 Rubor faciei admodum familiaris est in morbis pectoris.
- 15 Floridus faciei color in hydrope pectoris & abdominis, repente in luridum & plumbeum mutatus, mortis imminantis indicium est.
- 16 Pallor faciei, sine prægresso terrore, in hominibus, florido alias colore præditis, sanguinem versus interiora repressum indicat.
- 17 Pallor faciei chronicus vel sanguinis defectum, vel ejusdem spissitudinem, aut aliam dyscrasiam manifestat.
- 18 Pallor faciei cum aliquali inflatione Cachexiæ congenerumque affectuum indicium est.
- 19 Pallor faciei diuturnus in puellis pubertatis annos supergressis mensium vitia, accedente vero flavedine Chlorosin designat.
- 20 Quo major est pallor in morbis, eo graviores esse morbum & majorem virium prostrationem adesse significat.
- 21 Magnus pallor contractaque & livida facies in morbis magnis exitium & mortem instantem portendit.
- 22 Facies croceo vel nigricante vel plumbeo colore tincta, icteri flavi & nigri indicium est.
- 23 Colorem viridem faciei, si alia conspirant, hæmorrhoidibus homines laborare, testari, affirmat Forestus.
- 24 Facies livida plumbea & ex flavo viridescens familiaris est in obstructionibus lienis, hepatis & mesenterii ab hæmorrhoidibus non succedentibus ortis.
- 25 In magnis malis si facies fuerit bona, bonum signum est. in parvis autem, contraria significans bonæ significationi, malum. *Hipp. VI. Epidem. Sect. II. §. 61. 62.*
- 26 Subitanea faciei extenuatio in cholera aliisque morbis mala.
- 27 Turgiditas & inflatio mediocris in variolis bona est.
- 28 Fusce & late macule in facie gravidis familiares sunt.
- 29 Nigræ maculæ in acutis faciem occupantes funestum portendunt exitum.
- 30 Faciei bonus color & torvitas in morbo acuto malum est.
- 31 Frontis ex his contractio phrenitidis signum est. *Hippoc. Coac. Prænot. II. §. 110. 111.*
- 32 Sudor frigidus in fronte, pessimum est signum in acutis.
- 33 Oculi si lucem fugiant, aut involuntarie lacrymentur, aut distorqueantur, aut alter altero minor fiat, aut albus partes rubentes habeant, aut venulas lividas aut nigras in ipsis habeant, aut lemæ ac sordes circa oculos appareant, aut etiam instabiles aut eminentes, aut cavi vehementer facti, aut squalentes & obscuri fuerint, aut color totius faciei alteratus fuerit: hæc omnia mala & perniciose esse putandum est. *Hipp. Prænot. II. §. 19. & seq.*
- 34 Nimia oculorum prominentia cum venularum inflatione ac insigni faciei rubore & turgescencia, in angina strangulationem imminentem minatur.
- 35 Exserti oculi cum audaci aut feroci aspectu, deliriorum phreniticorum sunt indices.
- 36 Oculi cavi & profunde recedentes tabidam utpl. corporis constitutionem & virium insignem prostrationem indicant, si vero in alterutro tantum oculo occurrit, tabem istius oculi significat.
- 37 Rubor oculorum utpl. congestionum ad caput & dolorum indicium est: interdum in morbis acutis, si alia conspirant, crisin per Hæmorrhagiam narium instantem indicat, aut etiam ophthalmiam præsentem comitatur.
- 38 Oculorum rubor in febre natus, diuturnam ventris molestiam denotat. *Bagliv. ex Hippocr.*
- 39 Oculorum rubor est signum corrupti pulmonis, aut viscerum e directo, cerebri quoque & Ventriculi inflammati. *ibid.*
- 40 Flavi oculorum color utpl. præsentis icteri, aut malæ hepatis constitutionis index est: in Pleuritide vero, inpr. cum livore conjunctus malus est.
- 41 Oculi obscurati sive consueta antea claritate privati & aliquo modo depressi, mortis indicium præbent.
- 42 Oculos caligare & obtenebrari in pectoris acutis morbis lethale. *Bagliv.*
- 43 Extremitatum palpebrarum curvitas & oculi fixi & assidue nictare & colores permutare & palpebras inter dormiendum non committere, perniciosum est. *Hipp. Coac. Prænot. II. 124.*
- 44 Oculi semiclausi, album insuper tantum monstrantes, convulsionum sæpius prodromi sunt, aut vermium præsentiam indicant.
- 45 Lacrymæ involuntariæ in acutis extra criseos tempus semper malæ sunt.
- 46 Abolitio visus, oculo illibato apparente, sive Gutta serena post Apoplexiam vel Epilepsiam aut convulsionem fortiores, signum mortis est. *Bagliv.*



- 47 Nasus acutus, si simul reliqua facies contracta est, in acutis mortis instantis signum est.
- 48 Narium pruritus & rubor in acutis crisin instantem interdum indicat: in pueris autem sæpius verum indicium est.
- 49 Lethale est etiam habere labia resoluta & pendentia & frigida & albicantia facta. *Hipp. Prognost. III. 4.*
- 50 In febre non intermittente si labium, aut palpebra, aut oculus distorqueatur, aut non videat, aut non audiat, æger jam debilis existens, quicquid horum fiat, propinqua mors est. *Hipp. 5. Aphor. 49.*
- 51 Labium contractum alvi biliosæ eruptionem significat. *Hipp. Coac. Prænot. II. 159.*
- 52 Tremor labii inferioris vomitus instantis indicium est.
- 53 Os hians in acutis, nisi ex consuetudine id fiat, malum signum est.
- 54 Exulcerationes circa os & labia in febribus intermittibus morbi solutionem indicant.
- 55 Aures lividæ, nigræ, contractæ & frigidæ lethale signum præbent.

#### 5. De Signis ex habitu corporis.

**I. Definitio:** **H** Abitus corporis est totus ejusdem ambitus exterior cute tectus, cujus diversus status diversa etiam in morbis signa præbet.

#### II. Differentia.

- 1 Respectu coloris alius est pallidus alius floridus &c.
- 2 Respectu consistentiæ & stricturæ alius est mollis & laxus, alius est strictus & densus, & hinc magis vel minus porosus.
- 3 Respectu caloris & frigoris alius est calidus, alius vero frigidus.

#### III. Observationes.

- 1 Corpus equaliter calefcere ac molle esse, tum in Plenitudine, tum in omnibus circa pulmonem morbis, bonum est. *Hippocr. Coac. Prænot. III. 156.*
- 2 Mutationes in toto corpore & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, longitudinem morbi significat. *Hippocr. 5. aph. 40.*
- 3 Qui frequenter refrigerantur & vicissim incalescunt, sunt in periculo.
- 4 Cutis croceo colore tincta, icteri indicium est.
- 5 Color flavus vel citrinus cutis, in acutis exitiosus est.
- 6 Habitus corporis constrictus, motum humorum ad interiora indicat.
- 7 Habitu corporis in morbo magno plane nihil mutari, malum est.
- 8 Caput, pedes & manus frigidas esse, ventre & lateribus calentibus, mali morbi signum est.
- 9 Lethale est, si in acutis externa algeant & interna urantur.
- 10 Digni ac ungues si fiant lividi cum corporis gravitate, in propinquo mors est.
- 11 In morbis acutis frigiditas extremarum partium, malum est *Hippocr. 7. aph. 1.* nisi ob crisin instantem fiat.
- 12 Si cum totius corporis madore contingit frigus in morbi initio, maximam malignitatem indicat, in progressu vero certum mortis instantis indicium præbet.
- 13 Ex ægritudine bene cibum accipientis, nihil augescere corpus, malum. *Hipp. 2. aph. 31.*
- 14 Fœtor cadaverosus ex corpore exhalans mortem instantem significat.
- 15 Cutis faciei & aliarum partium dura, scabra, aut squalida, mala.
- 16 Præcordium (in acutis scilicet febribus) optimum est doloris exors & molle & æquale, tum in dextra, tum in sinistra parte. *Hippocr. Prognost. V. 11.*
- 17 At inflammatum, aut dolorem exhibens, aut dextræ partes inæqualiter affectæ ad sinistras: hæc omnia observare oportet. *ibid.*
- 18 Si vero etiam pulsus inerit in præcordio, turbationem significat, aut delirium. Verum oculos talium intueri oportet; si enim oculi frequenter moveantur, furiosos hos fore timor est. *ibid.*
- 19 Pulsatio in præcordiis cum signis ariditatis in lingua vel aliis partibus, delirium significat. *Bagliv. p. m. 63.*

- 20 Pulsus Hypochondriorum sunt signum magnæ inflammationis in acutis, inde veniunt paulo post singultus. *ibid.*
- 21 Post pulsationem insignem hypochondrii sinistri Hæmorrhagiam e nare sinistra secutam fuisse, & respirationem difficilem ingentem brevi sustulisse observavimus.
- 22 Hypochondria dolorifica cum alvo profusa, pessima, pessimæ Parotides inde natæ. *ibid.*
- 23 Tumores præcordiorum duri, dolorosi & totum præcordium occupantes, brevi mortem significant. Minus, si solum in sinistro sint. In his solet erumpere sanguis e naribus & juvat, præsertim si morbus mutet circuitum. Et si tumores tales ultra 60. dies durent, in suppurationem labuntur. *ibid. ex Hippocr. Prognost. VI. 1. & seq.*
- 24 Si in morborum, præsertim acutorum, initiis hypochondria tument aut dolent, sanguinem in supernis partibus expecta, & si morbus cum tali dolore diu protrahatur, expecta abscessus ad aures, quos præcavere potest profusa narium Hæmorrhagia: vel si diu protrahatur morbus, abscessus ab inferiora fient. *ibid.*
- 25 Horrenda est tensio hypochondrii, ubi nulla est spes Hæmorrhagiæ vel abscessus ad crura. *ibid.*
- 26 Pessimum est in morbis acutis abdomen insigniter intumescere, inpr. si alia mala signa juncta sunt, mortem enim instantem indicat, si a flatibus originem non trahit tumor, illa, *ibid.* quod etiam experientia nostra confirmare possumus.
- 27 Scrotum pendulum atque membri virilis flacciditas impotentia virilis indicium est.

#### 6. De Signis ex tono corporis ejusque partium.

**I. Definitio:** **T**onus est expansio sive dilatio & constrictio partium major vel minor, in statu p. n. variorum effectuum extraordinariorum causa & hinc etiam diversa signa tradens.

#### II. Differentia.

- 1 Tonus alius est strictus, quando nimirum partes præter consuetum morem constringuntur, & hinc sanguis non solum parce in partes admittitur per arterias, sed etiam ex illis expellitur.
- 2 Alius est laxus, quando partes præter morem relaxantur, & sanguis majori copia in illas infunditur: huc spectant etiam plenariæ & paralyticæ partium relaxationes.
- 3 Alius est strictus & rigidus, uti in spasmodis, alius strictus & sæpius interruptus, uti in motibus convulsivis.
- 4 Alius se exserit in habitu corporis, unde eodem constrictio frigus extremarum partium, relaxato vero earundem calor oritur: alius vero in partibus interioribus variis tensionibus atque spasticis ac dolorificis constrictionibus sese manifestans, sentitur. Adeoque huc spectant varia signa, quæ desumuntur
- 1 ab horrore & rigore.
- 2 a spasmodis & convulsionibus.
- 3 a sternutatione.
- 4 a singultu.
- 5 a Vomitu.
- 6 a doloribus.
- 7 a tremore.
- 8 a lipothymiis.
- 9 a lassitudine & torpore.

#### III. Observationes.

- 1 Horrores in febrium acutarum principio frequenter apparentes mali sunt.
- 2 Ex sudore horror non bonum. *Hippocr. 7. aph. 4.*
- 3 Horrore affecti caput dolentes, exsudantes, malignum est. *Hippocr. Coac. Prænot. I. 20.*
- 4 Horrore affecti, multum insuper exsudantes, difficili malo implicantur. *ibid. 21.*
- 5 Quibus sanis horrores frequentes sunt, hi ex sanguinis fluxione suppurantur. *ibid. 24.*
- 6 Horror & spirandi difficultas in doloribus signata bis sunt. *ibid. 25.*
- 7 Horrore affecti, anxii, de'assati, lumbos dolentes, alvos humectas habent. *ibid. 27.*



- 8 Qui inhorruerunt & exsudarunt iudicatorio modo, & postridie preter rationem horruerunt; si quis non vigiliis infestetur, neque concoxerit, ei sanguinem erupturum esse puto: *ibid.* 33.
- 9 Lassati cum horrore; si exsudarunt iudicatorio modo, recalescent in morbo acuto, male habent, tum alias, tum, si circa hæc sanguis de naribus stillarit, *ibid.* 55.
- 10 Qui ex perfrigeratione sudorosa cito recalescunt, malum. *ibid.* 51.
- 11 Ex dorso crebris & parvis horroribus leviter insudantes, difficile habent. Urinæ enim interceptionem plus nimio dolentem significat. *ibid.* 69. 70.
- 12 Frequens horror in sanis, signum est cruditatis aut cacochymiae: in febribus vero motus morbi aut suppurationis in ea parte, unde excitatus. *Bagliv.*
- 13 Triplex rigor est, criticus, periodicus & symptomaticus sive erraticus dominatu morbi, quod bene notandum in curatione acutorum. *Bagliv. p. m.* 80.
- 14 Rigores periodici boni sunt, juxta *Hippocr.* 4. *aph.* 63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.
- 15 A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. *ibid.* *aph.* 58.
- 16 Rigores in febribus continuis supervenientes die critico, cum præcedentibus coctionis signis, & insigni evacuatione subsequente, salutares sunt. *River. In-stit. p. m.* 244.
- 17 Rigor symptomaticus, aut suppurationis internæ signum est, aut translationis materiæ in caput, aut principium Naturæ superatæ a morbo. *Bagliv.*
- 18 Rigor, qui antecedit urinæ suppressionem & Hæmorrhagiam salutaris, qui vero ipsam succedit, lethalis. *Bagliv. ex Hippocr.*
- 19 Qui ex rigore perfrigerantur, caput ac collum dolentes, voce destituti, insuper exsudantes, postquam se recollegerint, moriuntur. *Coac. Prænot. I.* 1.
- 20 Omnis rigor fere semper in lumbis incipit primo, deinde per dorsum ad caput fertur, isque rigor a lumbis fere semper in febribus est. Si vero aliunde quis frigeat, ab abscessu latente rigebit. *Bagliv. ex Dureto.*
- 21 Ignorantia cum rigore, malum; mala quoque oblivio. *ibid.* 6.
- 22 Soporosi rigores aliquatenus perniciosi & flammei, in facie color cum sudore, in his malignus est. *ibid.* 9.
- 23 Rigor continenter vexans, corpore jam debili existente, lethalis est. *ibid.* 15.
- 24 Qui frequenter exsulant, ac insuper rigent, perniciosum hoc est, & in fine suppurationem habere compariuntur, ventresque perturbatos. *ibid.* 16.
- 25 Rigores multi torpidi, maligni sunt. *ibid.* 22.
- 26 Quibus sexta die rigores fiunt, hi ægre judicantur. *ibid.* 23.
- 27 Affectiones rigentes & quæ ad noctem aliquando exacerbantur, cum vigiliis ac delirio in somnis, aliquando urinas involuntarie emittentes in convulsionem desinunt. *ibid.* 28.
- 28 Continui rigores in acutis pravi sunt, *ibid.* 20.
- 29 Urinæ cum rigore suppressæ malæ & convulsoriæ, tum alias, tum si quis antea gravi sopore pressus fuit. Spes in his est, abscessus retro aures fore. *ibid.* 34.
- 30 Rigores velut in febre tertiana, si in media inordinata febre exacerbentur, valde maligni sunt. *ibid.* 37.
- 31 Qui ex rigore cum capitis dolore exolvuntur, in periculo versantur. Cruenta urina in his mala est. *ibid.* 41.
- 31 Anxietudines in diebus iudicatoriis, si in his sine sudore perfrigerentur, & omnes, qui sine sudore perfrigerentur citra iudicationem, male habent. Et qui insuper riguerunt ex his, ubi vomuerunt meraca, anxii, tremuli in febre, malum. *ibid.* 60.
- 33 Qui ex rigoribus parvis sudoribus perfrigerantur, malum. *ibid.* 63.
- 34 Rigores, post quos corpus non incalescit, exitiosi sunt in acutis. Si alternent cum calore, monstri quid alunt & malignitatem indicant. *Waldschmid.*
- 35 Si rigori aut horrore die critico venienti, coma superveniat, mors expectanda. *Riverius ex Pacheco.*
- 36 Tensiones dorsi spasticæ familiares sunt Synochis, variolis, morbillis ac febribus petechialibus.
- 37 Spasmus sive convulsio a vulnere, ileo, hæmorrhagia, pessimè est notè. *Waldschmid.*
- 38 Convulsio aut singultus ex veratro, aut superflua purgatione, aut multo sanguine effuso lethalis, aut mala est. *Hippocr.* 5. *aph.* 1. & 4.
- 39 Quicumque Tetano corripiuntur, in quatuor diebus pereunt, hos vero si effugierint: sani fiunt 5. *aph.* 6.
- 40 In pueris convulsiones minus periculosæ sunt, quam in adultis. *Riverius.*
- 41 Convulsiones, quæ in principiis morborum acutorum apparent, minus periculosæ sunt, quam quæ in statu contingunt. *ibid.*
- 42 Febrem in convulsione fieri melius est, quam convulsionem in febre. *Hippocr.* 2. *aph.* 26.
- 43 Convulsiones phrenitidi supervenientes pessimæ sunt & mortem instantem indicant.
- 44 In febribus acutis convulsiones & circa viscera dolores fortes, malum. *Hipp.* 4. *aph.* 66. *Conf.* 67.
- 45 Convulsio in febre manuum ac pedum dolores, maligni sunt. *Coac. Prænot. I.* 44.
- 46 Ex ardoribus vehementibus convulsio, aut distentio, malum. 7. *aph.* 13.
- 47 Ex vigilia convulsio aut delirium. 7. *aph.* 18.
- 48 In fluxu muliebri convulsio & animi deliquium, si accedat, malum est. 5. *aph.* 56.
- 49 Convulsio in febre oborians & eadem die desinens, bona est, & sedat febrem eadem die, aut postera aut tertia. Si vero tempus, in qua incepit, transgrediat, & non desinat, malum est. *Coac. Prænot. I.* 230.
- 50 A convulsione aut distentione nervorum vexato, febris accedens morbum solvit. 5. *aph.* 57.
- 51 In furiosis convulsio accedens dissipationem facit. *Coac. Prænot. III.* 330.
- 52 In meracis vomitibus singultus malus, mala etiam convulsio, *ibid.* IV. 20.
- 53 Seniores septem annis in febre non corripiuntur convulsione: sin minus perniciosum est. *ibid.* III. 85.
- 54 Observatum est, si ægrotans vix semel tantum sternuat, quod is morbi ferocia succumbet; si vero bis sternuat, profligato morbo reconvalescet. Contra in feminis, si qua graviter habens bis sternuat, funestum & exitiale; si semel sternuat, salubre sanguini existit. *Riverius ex Foresto.*
- 55 A singultu detento, sternutationes accedentes solvunt singultum. 6. *aph.* 13.
- 56 Gravedines & sternutationes in morbis circa pulmonem, & antecessisse & succedere, malum est. Reliquis autem sternutatio non incommoda est. *Coac. Prænot. III.* 174. *Conf.* XIII. 10. 11.
- 37 Mulieri, quæ ab uteri strangulationibus vexatur, aut difficulter parit, sternutatio accedens bonum. 5. *aph.* 35.
- 58 Ex volvulo vomitus aut singultus, aut convulsio aut delirium, malum. 7. *aph.* 10.
- 59 Ex vomitu singultus & oculi rubicundi, malum 5. *aph.* 3.
- 60 Ex hepatis inflammatione singultus, malum. 7. *aph.* 17.
- 61 Si senioribus nimium purgatis singultus accedat, non bonum est. 7. *aph.* 41.
- 62 Vocis interceptione cum singultu pessimæ. *Hippocr. Proreth.* III. 8.
- 63 Si quis in laboriosa febre singultiat, morbo laborat pessimo. *Riverius.*
- 64 Singultus Diarrhææ & Dysenterię superveniens, malus.
- 65 Vomitus ex bile flava & pituita mixtus, qui nec valide crassus est, nec admodum copiosus & qui duos & istos humores habet exquisite permixtos, bonus. *Riverius.* meraciores vero deteriores sunt. *Hipp. Prognost.* XII. 9.
- 66 Vomitus biliosi aut pituitosi, die critico erumpentes, boni. *ibid.*
- 67 A profluvio alvi longo correpto, vomitus sponte accedens, solvit profluvium. 6. *aph.* 15.
- 68 Fluxione ex capite fluente vomitus conducit. *Hippocr. de Loc. in Homine* XLVII. 2.



- 69 Vomitus stercoreus pessimus est.
- 70 Vomitus & surditas vulvulosis, malum, *Coac. Prænot.* III. 303.
- 71 Quibus est Vomitus sanguinis, febris & dolor circa mammam, thoracem & dorsum: quibus hæc omnia sunt, brevi moriuntur. Quibus autem non omnia, neque valde, tardius. *ibid.* 238.
- 72 Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum surditate & vigiliis, cito insaniam affore denuntiant. *I. Prorrhæ.* II. 1.
- 73 Si id quod vomitu rejectum est, prasini fuerit coloris aut lividum, aut nigrum: quicumque horum fuerit colorum, malum esse putandum est. *Hippocr. Prognost.* XII. 11.
- 74 Si vero omnes colores idem homo vomit, valde perniciosum hoc est. Celerrimam autem mortem significat lividus vomitus, si graveolens fuerit. Omnes vero subputridi ac fœtidi odores in omnibus vomitibus mali sunt. *ibid.*
- 75 Dysentericis vomitus biliosus in principio, malus est. *Hipp. Coac. Prænot.* III. 293.
- 76 Ex quacunque causa male affligente qui atram bilem revomuerit, moritur qui vulnus habet. *Hippocr. de Loc. in Homine* XLIV. 5.
- 77 Vomitus paucus & laboriosus in acuta febre, malus. *Riverius.*
- 78 Quibuscunque morbis incipientibus, si atra bilis sursum aut deorsum prodierit, lethale est. *4. aph.* 22.
- 79 Dolores partes ignobiles & a visceribus longe remotas occupantes, easque diu exercentes, apparentibus concoctionis signis, & qui præcipue decretorio die cœperint, salutare. *Riverius.*
- 80 Dolores a partibus superioribus ad inferiores descendentes, salutare. *ibid.*
- 81 Quibus capitis dolor in febre inceperit primis diebus & quarta ac quinta magis premuntur, hi se prima a febre liberantur. *Hippocr. de Crisibus* II. 2.
- 82 Capitis dolores fortes & continui cum febre, si quidem lethali signorum quid accesserit, perniciosi sunt valde. Si vero sine talibus signis dolor viginti dies transierit & febris tenuerit, sanguinis e naribus eruptionem, aut abscessum ad partes infernas oportet expectare. Sanguinis tamen eruptio etiam in aliis doloribus expectanda, præsertim in junioribus triginta quinque annorum, in senibus vero puris eruptio. *Bagliv. ex Hippocr.*
- 83 Dolores capitis post sudores criticos evenientes, mortem upl. præfagiunt. *River.*
- 84 Cervicis dolores in principio vel augmento morbi affligentes mali. *Id.*
- 85 In ardentibus & aliis, quibus colli dolor & temporum gravitas & caligo vertiginosa circa oculos, aut etiam præcordiorum distensio non cum dolore sit, his sanguis per nares erumpit. *Hippocr. I. Epidem. Sect.* II. 98.
- 86 Auris acutus dolor cum febre continua & vehementi gravis est. *River. ex Hippocr. Prognost.*
- 87 Fauces dolorosæ, graciles, cum egre tolerabili molestia, strangulatoriæ, perniciosæ acute. *Hippocr. I. Prorrhæ.* XI. 4.
- 88 Dolor cervicis terrificus, pestiferus in delirantibus. *Bagliv.*
- 89 Dolor fixus sterni, terebrans, chronicus, sæpius indicat Luem Veneream inveteratam.
- 90 Dolor affixus pectori cum torpore pestiferus, superveniente acuta febre, crudeliter moriuntur. *Riverius ex Hippocr.*
- 91 Ex lumborum dolore ad eos ventriculi recussiones fabriculosæ, horridæ, removentes aquosa tenuia multa, mente motæ, voce destitutæ, nigrum vomitu factò destituuntur. *Hippocr. I. Prorrhæ.* XI. 1.
- 92 Quæ ex dolore dorsi principia morborum ducuntur difficilia sunt. *Riverius ex Hippocr. Coac. Prænot.*
- 93 Diuturni circa lumbos acilia, tum qui ad hypochondria prorepunt dolores cum febre & cibi fastidio, si inde transierit fortis dolor ad caput, crudeliter convulsifico modo necat. *Bagliv. ex Hippocr.*
- 94 Lumborum dolor cum comate anxio pestiferus. *Id.*
- 95 Lumborum dolor nulla ex manifesta causa reverrens, signum est morbi terrifici. *Id.*
- 96 Quibus lumborum & lateris dolor, carens evidenti causa, icterici fiunt. *Id.*
- 97 Dolorifica in lumbis mala sanguifica, sive hæmorrhoidem vel mensium signa sunt. *Id.*
- 98 Dolores lumborum in ischiadem & hæmorrhoides facile transeunt. *Id.*
- 99 Dolores partium ignobilium in principio apparentes, aut cum aliis malis signis, lethales. *River.*
- 100 Dolores qui primo a longinqua parte incipientes, postea ad viscera ascendunt, mali. *Id.*
- 101 Dolores ignobilium partium, qui cito evanescunt atque occultantur sine causa manifesta, periculosi.
- 102 In acutis parvi tremores & vomitus æruginosi perniciosi. *Coac. Prænot.* I. 91.
- 103 Quibus ab atra bile mente motis, tremores fiunt, malum est. *ibid.* 136.
- 104 In vehementer phreniticis tremores lethales sunt. *ibid.* 140.
- 105 Quibus melancholico modo mente motis, tremores accedunt, malignum hoc est. *I. Prorrhæ.* II. 9.
- 106 Quibuscunque morbo jam fractis atque extenuatis tremores accidunt funestum. *River. ex Hippocr.*
- 107 Tremor manuum cum vertigine sæpius Apoplexiæ prodromi sunt.
- 108 Lingua & vox tremula in acutis perniciofa.
- 109 Animi deliqua frequentia, in acutis sine causa manifesta orientia, latentem sæpius indicant malignitatem & summum portendunt periculum.
- 110 Oculorum obscuratio cum animi deliquo brevi convolutionem inducit. *Coac. Prænot.* II. 135.
- 111 Insignes lassitudines & torpor totius corporis morborum prodromi sunt.
- 112 Lassitudo & torpor cum vertigine in senibus Apoplexiam minantur.
- 113 Rigores multi, torporem in acutis inferentes, maligni sunt.

## 7. De Signis ex Sudore.

I. *Definitio:* **S**udor est excrementum tertiæ digestionis, respectu quantitatis & qualitatis varia in morbis signa exhibens.

II. *Differentia.*

- 1 Respectu *quantitatis* alius est nimius aut largus, alius vero est deficiens.
- 2 Respectu *qualitatis*, alius est falsus, acris, alius est fœtidus &c. calidus, frigidus &c.
- 3 Respectu *temporis*, alius est tempestivus, alius vero intempestivus.
- 4 Respectu *virium*, alius fit cum euphoria, alius vero cum insigni fatigatione corporis.

III. *Observationes.*

- 1 Sudor multus ex somno, citra manifestam causam oboriens, corpus multo alimento uti significat. Si vero cibum non capienti hoc fiat, significat quod evacuatione opus habeat. *3. aph.* 41.
- 2 Sudores nocturni & matutini extra morbos ut plurimum salutare sunt, & a multis morbis præferant.
- 3 Sudores, qui cum manifestæ concoctionis signis, die critico & rigore præcedente, ex toto corpore, calidi, copiosi, stillantes, & cum vapore erumpunt, & quibus Febris vel perfecte solvitur, vel admodum imminuitur, boni. *Riverius.*
- 4 Sudores copiosi, sine causa manifesta corpus sensibilibiter fatigantes, nunquam boni sunt.
- 5 Sudor multus in Febribus acutis oboriens, malus est. *I. Prorrhæ.* VII. imprimis si eam non imminuat, aut statim in principio appareat.
- 6 Sudores assidui, sive modici illi sint, sive copiosi, in febre acuta mali. *Riverius.*
- 7 Febricitanti sudor superveniens, febre non remittente, malum. *4. aph.* 56.
- 8 Sudor multus frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus vero minorem morbum significat. *4. aph.* 42.



- 9 Copiosus sudor cum repentina virium prostratione in principio variolarum lethalis est. *Waldeschmid.*
- 10 Sudores frigidi, cum acuta quidem Febre evenientes, mortem: cum mitiore vero morbi longitudinem significant. 4. *ap.* 37
- 11 Sudores frigidi in acutis, internas viscerum inflammationes denotant. *Bagliv.*
- 12 A sudore horror, non bonum. 7. *aph.* 4.
- 13 Sudoris & horrores frequentes alternationes malæ.
- 14 Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt tertia & quinta & septima & nona, & undecima & quarta decima & septima decima & vigesima prima & vigesima septima & trigesima prima & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos judicant. Qui vero ita non fiunt, laborem significant & morbi longitudinem & recidivas. 4. *aph.* 36
- 15 Fœtidi sudores in morbo acuto pessimi, *Riverius.*
- 16 Si eodem tempore in acutis & gravibus morbis, duæ crises, sudor scilicet & alvi fluxus, superveniant cum paucis levamine, fere omnes moriuntur, vel si non moriuntur, perniciose laborant. *Bagliv.*
- 17 Sudor in acutis partialis, sive e toto corpore non erumpens, malum est: quod in Febris malignis aliquoties observavimus.

## 8. De Signis ex Urina.

I. *Definitio:* URINA est excrementum serosum, partim propter quantitatem, partim propter qualitatem varia signa exhibens & statum tam naturalem, quam præternaturalem manifestans.

II. *Differentia.*

- 1 Respectu *Quantitatis*: alia est copiosa, alia pauca.
- 2 Ratione *Consistentiæ* & sive *Substantiæ* alia est spissa, sive crassa, alia tenuis sive limpida, alia turbida, alia clara.
- 3 Ratione *Coloris*, alia est.
  - a *Flava* eaque
    - 1 *Flava pallida*, ex flavedine & albedine.
    - 2 *Flava aurea*, ex flavedine & rubedine.
    - 3 *Flava viridis*, ex flavedine & rubedine purpurea.
    - 4 *Flava fusca*, ex flavedine & nigredine.
  - b *Alba*, quæ est
    - 1 *Sub alba*, ex albo & flavo.
    - 2 *Alba incarnata*, ex albo & rubro.
    - 3 *Alba pallida*, ex albo & cœruleo.
    - 4 *Alba cineritia*, ex albo & nigro.
  - c *Rubra*, quæ juxta quosdam est
    - 1 *Rubra pallida*, sive dilute rubea, quam alii quoque flammæam appellant.
    - 2 *Rosea*.
    - 3 *Purpurea*.
    - 4 *Sanguinea*.
  - d *Viridis*
    - 1 *Prasina*.
    - 2 *Æruginosa*.
  - e *Livida* sive *plumbea*.
  - f *Nigra*.
- 4 Ratione *Contentorum* quæ sunt
  - a *Essentialia*, quæ, utpl. in urinis sanorum & sæpius quoque in egrorum urinis apparent, uti sunt
    - 1 *Πρόσχω* sive *Sedimentum* quod infimum in urina occupat locum.
    - 2 *Ενώπιον* sive *Suspensum*, quando contentum in urine medio hæret.
    - 3 *Νεφέλη* sive *Nubecula*, quæ summam in urina superficiem attingit.
  - b *Accidentalia*: quæ rarius in urina observantur, qualia sunt
    - 1 *Circulus* sive *Corona*, urinae superficiem ambiens.
    - 2 *Spuma*, eaque vel copiosa, vel pauca, urinae superficiem tegens.
    - 3 *Bulle*, sive parvæ vesiculæ, modo magnæ, modo parvæ, hinc inde in eadem urinae superficie occurrentes.
    - 4 *Filamenta*, sive juxta alios Pili, urinae innantes.
    - 5 *Atoni* minutissimæ, sive pulvis alcoholifatus.
    - 6 *Sabulum* parcius vel copiosius, tenerius vel crassius.

- 7 *Sanguis* gumosus, floridus, fluxilis &c.
- 8 *Pus*.
- 9 *Mucus*.
- 10 *Semen*.
- 11 *Materia fuscæ*.
- 12 *Vermes*.
- 13 *Pinguedo*.

- 5 Ratione *odoris* alia est *fœtida*, alia nullum, alia naturalem habet odorem: interdum quoque in urina observatur post assumpta Terebinthinata odor urine violaceus.
- 6 Respectu *ponderis* alia est gravior, alia levior.

III. *Observationes.*

- 1 Licet Uroscopia in quibusdam morbis usu suo non careat, male tamen ea a multis nimium ad omnes morbos extenditur, quasi ii cum omnibus circumstantiis ex urina dignosci possint.
- 2 Usus præcipuus Uroscopiæ est in dijudicanda fectione febrili, sive coctione Veterum: postea in Jctero; Hydrope, Calculo renum, Mictu cruento, ulcerosa renum aut Vesicæ affectione. Minor in affectibus Pectoris, Hypochondriacis flatulentis & Hystericis; minimus omnium in capitis affectibus: nullus in specialium, quatenus speciales sunt, solidarum & organicarum, quæ talium. *Vid. D. Stahl's Dissert. de Uromantia & Uroscopiæ abusu tollendo §. XV.*
- 3 Authores qui Uroscopiam commendant sequentia observare jubent.
  - a Medicus inquiret cujus sexus sit eger? quamvis enim feminarum urina colore cedat virili & sæpius sit pallida cum copioso sedimento, hæc tamen regula non est universalis, sed sæpiissime urina femine cholericæ colore viri phlegmatici urinam superat. Cognito sexu, si est femina, querat: an sit gravida, puerpera, an menses fluant &c.
  - b Querat, cujus ætatis sit? puerorum enim urina utpl. crassa est & pallida, aut juxta quosdam alba, juvenum vero & virorum ob fortiorem digestionem majoremque calorem magis colorata est: sed & hoc loco temperamentum sæpius huncce ordinem invertit.
  - c Inquiret, quo victu utatur & annon urinæ color vel aliæ mutationes ab assumptis, tam alimentis, quam medicamentis dependeant.
  - d Certus sit Medicus de tempore morbi, quo urina emissæ fuit? an sit morbi initium, status &c. an vero morbus diu duraverit, ut hinc concludere queat, an mutationes in urina occurrentes criticæ, an vero symptomatice sint.
  - e Perpendat quo tempore excreta fuerit? an matutino, an vero alio.
  - f Inquiret an urina simul & semel, an vero repetitis vicibus emissæ fuerit, & an recens sit? si enim est vetustior, pluribus vicibus emissæ, aut ejus portio tantum vase excepta, reliqua vero abjecta fuerit, commodum de ea judicium ferri nequit.
  - g Querat, an diu aeri exposita fuerit? aer enim admissus urinam maxime alterare solet.
  - h Non dijudicet urinam, nisi vase claro & pellucido excepta fuerit, quo eo accuratius colores & contenta urinæ discernere possit.
  - i Pariter quoque locus, ubi urinam inspicit Medicus, neque nimium obscurus sit, neque sole nimis illustratus, utroque enim modo Medicus in inspectione impeditur. Ut alia silentio prætereamus. An vero omnia hæcce insignem habeant usum & hinc ubique necessaria sint, cordatorum Practicorum judicio relinquo. Pergo potius ad ea, quæ ab Authoribus hinc inde tanquam signa ex urina afferuntur.
- 4 Urinæ quantitas vel excedens, vel deficiens sive causa manifesta, in genere corporis humani statum præternaturalem indicat.
- 5 Urina copiosa in acutis die critico erumpens, salutem promittit.
- 6 Urina copiosa post ejus suppressionem a calculis, hydrope &c. salutaris est & morbi solutionem indicat.



- 7 Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos abscessu liberat urina multa & crassa. *Hipp. 4. aph. 74.*
- 8 Quibus urine crasse, grumose, paucæ, non sine febre, copia ex his succedens tenuis, juvat. Tales autem maxime prodeunt, quibus ab initio, aut brevi, subsidentiam continent. *4. aph. 69.*
- 9 Urine e contra multe, tenues, aquosæ sine contentis, nullo critico die contingentes, nihilque sublevantes, male.
- 10 Mala quoque est copiosa urine excretio in corporibus alias macilentis & exsuccis, quoniam ea facile ad Hecticam consumptionem disponit.
- 11 Deficiens urina feri defectum aut ejus per alia loca excretionem indicat.
- 12 Nonnunquam etiam feri & lymphæ visciditatem & stagnationem aut extravasationem indicat, uti id observamus in Cachexia & Hydropes.
- 13 Urine stillicidium vel plenaria suppressio, cum dolore nephritico subito exorta, renum calculum sæpius indicat.
- 14 Quod si vero dolor in imo ventre cum urine suppressione vel stillicidio observetur, calculi vesicæ, urethram obstruentis & urinæ exitum impediens, indicia præbet.
- 15 Urinæ suppressio & stillicidium sæpius quoque a malo ureteres obstruente originem trahit.
- 16 Urinæ suppressio a diuturna ejusdem retentione originem trahens, utpl. admodum periculosa est.
- 17 Urinæ suppressio brevi tempore vel mortem, vel Hydropem post se trahit.
- 18 Largior mictio in acutis mala: in intermittentibus Hecticæ est prodromus.
- 19 Urinæ suppressio in acutis post frigus, pestifera. *Bagliv. ex Hippocr.*
- 20 Urina crassa non raro reperitur in Ventriculi morbis aut quando reliqua viscera sanguinis depurationi inservientia læsa sunt.
- 21 Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos abscessu liberat urina multa & crassa & alba reddita, qualis in Febribus cum lassitudine quarta die quibusdam fieri incipit. *Hipp. 4. aphor. 74.*
- 22 Quibus in Febre urinæ conturbata, qualis jumentorum, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt. *4. aphor. 70.*
- 23 Si cum talibus urinis adsint vigiliæ, sitis, dolor capitis &c. delirium denuncia. Si sopor, capitis gravitas cum pulsu parvo, Lethargum prædico. *Bagliv.*
- 24 Crassæ sæpius urinæ fiunt ob salium copiam & Scorbutum interdum indicant.
- 25 Crassæ urinæ & lixiviosæ, cum sedimento limoso copioso, in Hydropes pessimum indicant statum.
- 26 Crassiores & pallidæ urinæ meliores sunt, quam tenuiores & nigre.
- 27 Urina crassa, turbida, talisque permanens, ut igni apposita clarescere non possit, mala. *River.*
- 28 Urine tenues diu perseverantes, si alia crisis non venerit, in magno humorum apparatu, ad abscessum in inferiora desinit res. *Bagliv.*
- 29 Urine tenues semper suspectæ in acutis. *Idem.*
- 30 Urine tenues cum bono colore in morbis acutis salutares. *Riverius.*
- 31 Quibus urine pellucidæ, albæ, malum. Maxime autem in phreniticis observantur. *4. aphor. 72.*
- 32 Urina tenuis & biliosa in Febribus diuturnum morbum portendit. *Hipp. Coac. Prænot. V. 6.*
- 33 Si fulva ac tenuis fuerit urina multo tempore, periculum est ne homo sufficere possit, donec concocta fuerit urina: & si alias superstitis futuri signa fuerint, his abscessum affore expecta ad locum infra septum transversum. *Hipp. de Cris. VII. 5.*
- 34 Tenuis urina si densa fiat, sudorem futurum indicat. *Hippoc. Coac. Prænot. V. 54.*
- 35 Urina tenuis & aquosa in nephriticis doloris instantis indicium est.
- 36 Urina quæ clara mejitur primum, deinde vero post aliquod tempus conturbatur, bona. *Riverius.*
- 37 Quæ urina crassa, turbida & confusa mejitur, deinde per se ipsam clara evadit & limpida, bona. *Idem.*
- 38 Urine paucæ & tenues & assumpto potui non respondentes, in quolibet morbo male. *Idem.*
- 39 Urina flava citrina sufficienti copia emissa, cum paucissimo vel nullo sedimento, aut saltem nubecula rariore, indicat statum sanum Cholerici.
- 40 Similis urina cum paucis, albicante & mobili sedimento, sanguineis sanis utpl. propria est.
- 41 Pallide citrina, nec adeo pellucida, cum sedimento submucido, Phlegmaticum indicat temperamentum.
- 42 E contra saturate citrina, aliquo modo crassa, sine insigni sedimento, utpl. indicat temperamentum Melancholicum.
- 43 Pallida urina phlegmaticis ac lenibus familiaris est, & sæpius etiam potum largiorem sequitur.
- 44 Alias viscerum digerentium insignem debilitatem, calorisque naturalis suppressionem, cruditates in primis viis &c. denotat.
- 45 Nonnunquam quoque viscerum obstructionem, Cachexiam, Mensium suppressionem excipientem & Hydropem imminuentem indicat.
- 46 In ætate consistente si observatur, crudiatum denotat copiam, ac Apoplexiam, præsertim in Plethoricis, interdum minatur.
- 47 Urina crassa, citrina, minus pellucida, non tamen turbida ordinario cruditates primarum viarum ac minus laudabilem alimentorum digestionem indicat.
- 48 Urina intense flava vel fusca, aut crocea, ita ut etiam liuteamina tingat, icteri imminentis & præsentis indicium est.
- 49 Urina aurantii coloris, reposita turbida evadens ac aliquamdiu talis permanens, cum sedimento ejusdem coloris, indicat calorem præternaturalem.
- 50 Urina fusca instar cerevisiæ denotat pathemata Hypochondriaco Hysterica.
- 51 Urina ochrei coloris & simul ad lateritium colorem aut obsoletum aurantium tendens, multa & crassa cum sedimento roseo, indicium est Febris lentæ ad Hecticam tendentis.
- 52 Sin vero ejusmodi urina in pauca quantitate emititur, indicat Ascitem cum Hecticis caloribus.
- 53 Urina obsoleti aurantii coloris & crassa cum sedimento squamis parvis prædita, ardorem ischuretici cum urinæ cum dolore circa lumbos & os sacrum manifestat.
- 54 Fusca, tenuem cerevisiam æmulans cum sedimento furfuraceo aut squamoso, Fluorem album cum angustis præcordiorum hypochondriaco-flatulentis indicat.
- 55 Sin vero citrini coloris, crassa & minus pellucida, non tamen turbida, sed instar muriæ brassicæ, aut vini crassioris fuerit, cruditates circa primas vias indicat.
- 56 Urina sanorum urinæ in Febribus acutis similis mala est, provectiore vero morbo funesta.
- 57 Pallida tenuis, & limpida instar aquæ, signum semper est lethale, præcipue si morbus jam sit provectior.
- 58 Alba lactea ab assumptis emulsivis originem non trahens, in infantibus denotat bonam quidem coctionem, sed malam nutritionem.
- 59 Maxime pallida, tenuis & pauca obstructionem primarum viarum & appetitum prostratum: copiosa vero potum copiosum & diabetem indicat.
- 60 Pallida, tenuis, limpida, viridescens & pauca, Cachexiæ & hepatis affecti indicium est.
- 61 Pallide rubra, crassa & pauca, staseos salso mucidæ lymphæ hydropicæ signum est.
- 62 Florida, subrosei coloris & turbida. Febrem acutam malignam catarrhalem indicat.
- 63 Si vero aliquo modo est pellucida & latera lactescente cuticula tingit, Febris lentæ Hecticæ indicium est.
- 64 Purpurea, tenuis & maxime pellucida æstum sanguinis febrilem indicat.
- 65 Purpurea, crassa, turbida, minus pellucida, cum sedimento instar sanguinis grumosi & huic incumbente liquore fusco, vasorum in renibus læsorum signum est.



- 66 Purpurea, tenuis, pellucida cum spuma Pleuritidis indicium est.
- 67 Rutilans, crassa, nubeculam quasi formans, circa dies criticos in Febribus emissæ, difficilem morbi solutionem indicat, nisi forte per Hæmorrhagiam aut sudorem criticum auxilium feratur.
- 68 Rutilans, pellucida, crystallos tartareos vitri lateribus affligens, Hypochondriaco-spasmodico-arthriticos & scorbuticos affectus indicat.
- 69 Saturate rubra ad nigredinem vergens, cum pauco aut multo etiam obsoleti coloris sedimento, inpr. si ægrotus jam diu decubuerit, Hæcticæ ex acuta factæ indicium est.
- 70 Urina instar cerevisiæ nigræ, turbidæ, Scorbutum & apud juniores scabiem retropulsam interdum indicat.
- 71 Nigræ urinae in morbo acuto apparentes, perniciosæ,
- 72 Urinae nigræ, lividæ, plumbeæ, virides &c. hypochondriacis confirmatis & melancholicis familiares sunt.
- 73 Diu turbida permanens & pallida, ac si lutum in ea dissolutum esset, flatulentias spasmodico torminales in feminis, aut, si simul sedimentum feculentum mucidum deponit, Diarrhœas torminales in junioribus indicat.
- 74 Sin vero nullum prorsus sedimentum in eo observatur ac urina coloris est pallidi obsoleti ac si feces cerevisiarum in ea dissolutæ essent, deperditionem sanguinis ex utero, ut Hæmorrhoidibus, prægressam significat.
- 75 Urina antea clara sedimentum postmodum in Febribus deponens, inpr. si id die indicatorio contingit, morbi solutionem brevi futuram promittit.
- 76 Sin vero clara sine ullo sedimento ad undecimum diem vel ultra permanferit, funestum morbi eventum portendit.
- 77 Urina citrina instar vini, clara, cum sedimento roseo, pauco, flocculento, motus hæmorrhoidales floridæ ætatis apud personas sanas 26. vel 30. annorum indicat.
- 78 Sedimentum roseum in urina statum Plethoricum cum æstu febrili indicat.
- 79 Sedimentum urinae flocculentum cum pellicula pingui, excretionis seminis indicium est.
- 80 Urinae, quæ nullum aut sedimentum, aut enæorema, aut nubeculam habent, malæ. *Riverius*.
- 81 Urinae paucam subsidentiam habentes, malæ. *Idem*.
- 82 Sedimentum in urinis divulgum & inæquale, malum. *Idem*.
- 83 Sedimentum tenue initio morbi apparens & in dies sensim crassescens, bonum. *Idem*.
- 84 Sedimentum crassum in quovis morbi tempore apparens, malum. *Idem*.
- 85 Urinae sedimenta livida aut nigra, pessima. *Idem*.
- 86 Urina cum nubecula flocculenta & spuma diu durante Phthisin indicat.
- 87 Enæorema divulgum, inæquale aut nigrum, malum. *Idem*.
- 88 Nubecula juxta superficiem circuli modo evecta, in morbis acutis pessima. *Idem*.
- 89 Pellicula pinguis pellucida, post urinae agitationem non descendens, Tabis cum Hæctico calore indicium est.
- 90 Urina spumosa ab agitatione sive motu vasis urinarii talis non reddita & bullas diu servans, muciditatis sanguinis, tussis & catarrhalium affectuum indicium est.
- 91 Urina crassa instar muriæ, cum pellicula mucido-pingui, nulla præsentē tussi, Luem Veneream indicat.
- 92 In Spuma granula si fuerint parva, Paralytin indicat, & quanto fuerint minora, tanto certius est signum.
- 93 Urina oleosa & cum pingui araneis similia innatant, mala. *Riverius ex Hipp.*
- 94 Sedimentum album & leve in febribus optimum est & celerem morbi solutionem indicat.
- 95 Sedimentum rubens, die quarto apparens, morbi solutionem septimo die futuram indicat.
- 96 Album instar cretæ indicium est partium terrestrium & crudarum, ac familiare est naturis frigidioribus, senibus, calculis vesicæ laborantibus &c.
- 97 Album viscosum aut mucidum familiare est pituitosis.
- 98 Rubrum instar farinae laterum aut Boli Armenæ, nimiam partium falsarum & terrestrium exaltationem indicat & non raro observatur in Febribus intermittentibus.
- 99 Farinaceum cruditatum crassarum, fixarum & terrestrium copiam digestionumque defectum indicat, & nisi criticum fuerit, malum est.
- 100 Si hocce sedimentum simul squamosum est, interdum vesicæ exulcerationem indicat.
- 101 Quibus in urina crassa existente, carunculæ parvæ aut veluti pili una exeunt, his de renibus excernuntur. *Hipp. 4. aph. 76.*
- 102 Atomini minutissimæ, urina clara existente, hinc inde volitantes, graviditatis signa esse multi Medicorum volunt.
- 103 Urinae sabulum rubicundum cito fundum petens est indicium calculi renum.
- 104 Sanguis floridus cum urina sine dolore, aliisque Nephritidem comitantibus signis, emissus, interdum signum est suppressionis Hæmorrhoidum.
- 105 Urina cruenta in Variolis & Morbillis aliisque morbis exanthematicis, est lethale signum.
- 106 Si quis sanguinem mingat & grumos, & urinae stillicidium habeat, & dolor incidat in imum ventrem & ani ac scroti intercapedinem, partes circa vesicam affectæ sunt. *Hipp. 4. aph. 80. & 7. aph. 39.*
- 107 Qui sponte sanguinem mingunt his in renibus venæ ruptionem significat. *4. aph. 78.*
- 108 Siquis sanguinem & pus mingat & squamas & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem significat. *4. aph. 81.*
- 109 Eundem statum vesicæ indicat, si cum urina multum muci visci & tenacis fundum petentis & furfuraceis & quasi squamosis punctulis interspersi, mingitur.
- 110 Quod si vero talis mucus cruentus est, aut sanguis purus simul emittitur, indicium est ulcerationis renum.
- 111 Mucus fundum statim petit, etiam si urina agitetur: Semen non facile subsidet, sed diu in urina hæret. Pus vero fundum quoque, sed non adeo cito petit, ac facta aliquali urinae agitatione, eam purulento colore imbuat.
- 112 Vermes cum urina excreti ulceris sordidi, verminosi prope partes urinarias latitantis, indicium sunt.
- 113 Urina pinguis nunquam bona est, eo peior vero, si in Hæctica aut Phthisi observatur.
- 114 Urina foetida in morbis acutis factæ putredinis & mortis instantis indicium est.
- 115 Quo magis ponderosa est urina, eo peior, & contra.
- 116 Urinae, quæ insciis, & non recordantibus minguntur, pessimæ. *Riverius*.

## 9. De Signis ex Bile.

## I. Definitio.

II. Differentia. Vid. Tabula de Physiologia p. 5. Conf. Theor. Hominis Sani p. 39.

## III. Observationes.

- 1 Morbis quibusvis incipientibus, si bilis atra vel fursum, vel deorsum prodierit, lethale. *Hipp. 4. aph. 22.*
- 2 Quibuscunque ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocunque modo extenuatis, bilis atra, vel qualis sanguis niger, prodierit, postridie moriuntur. *4. aphor. 23.*
- 3 Dysenteria, si ab atra bile inceperit, lethale. *4. aph. 24.*
- 4 Quo magis bilis est atra, quæ excernitur, eo facilius in partibus, quas transit, vel excoriationem vel inflammationem producit.

## 10. De Signis ex Muco.

## I. Definitio:

II. Differentia: Vid. Tabula de Physiologia p. 5. Conf. Theoria Hominis Sani p. 42.

## III. Observationes.

- 1 Mucus, per quæcunque loca excretus, testis est status humorum minus laudabilis.
- 2 Quo magis spissus est mucus excretus, eo facilius me-



metuenda est obstructio partium, per quas mucus fecernitur.

- 3 Quo magis vero tenuis & falsus est mucus, eo facilius metuendæ sunt partium erosiones.
- 4 Mucus tenuis per pulmones excretus, plus damni post se trahit quam crassus.
- 5 Quo magis mucus a colore naturali deflectit & ad viriditatem vel flavedinem vergit, eo major de ejus corruptione metus est.
- 6 Excretio muci per pulmones semper majus periculum minatur, quam ea, quæ per alia loca fit.

#### 11. De Signis ex Fecibus alvinis & Vomitu.

I. *Definitio*: Vid. *Tab. de Physiol. pag. 5.*

#### II. *Differentia*.

- 1 Ratione *quantitatis*, aliæ sunt *copiosæ*, aliæ vero *paucae*.
- 2 Ratione *qualitatis*, & quidem
  - a *Consistentiæ*, aliæ sunt *compactæ*, *duræ*, *crassæ* &c. aliæ vero sunt *liquidæ*.
  - b *Contentorum*, aliæ sunt *biliosæ*, *acres*, aliæ *mucosæ*, aliæ *cruentæ*, aliæ *chylosæ*, aliæ *cibos semidigestos* continent.
  - c *Coloris*, aliæ sunt *albæ*, aliæ *flavæ*, aliæ *nigræ*, aliæ *virides*, *æruinosæ*, *vitellinæ* &c.
  - d *Odoris*, aliæ sunt *fœtidæ*, *cadaverosæ*, aliæ vero minus *fœtidæ*.
- 3 Ratione *modi excretionis*, aliæ *cum dolore*, aliæ *sine dolore*, aliæ *involuntariæ*, aliæ *frequentius*, aliæ *tardius* excernuntur.
- 4 Ratione *loci excretionis*, aliæ & quidem *ordinarie per alvum*, aliæ vero *extraordinarie per os*, sive *per vomitum* ejiciuntur.

#### III. *Observationes*.

- 1 Copiosior alvi dejectio in quolibet morbo mala. At si cum ventre tumido afferatur, pessima. *River.*
- 2 Paucae dejectiones, vel quæ statim, ubi inceperint, sistuntur, malæ. *Idem.*
- 3 Alvi egestio optima est mollis, cohærens ac compacta, subfulva, non valde graveolens, prodiens hora consueta, copia pro ratione ciborum ingestorum. *Hipp. Coac. Prænot. VI. 1. 2. 3.*
- 4 Aquosæ dejectiones malæ sunt in febribus & in morbis infantum. *Waldschmid.*
- 5 Omnis dejectio copiosa in morbis pectoris mala est. *Idem.*
- 6 Uno die fluere alvum sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus, si absit febris & intra septimum diem conquiescat.
- 7 Alvi liquida dejectio in progressu morbi & inpr. circa dies criticos crassitiem acquires, bona. *Conf. Hipp. l. a.*
- 8 Alvi excrementa nimis sicca & compacta humidi defectum & depurationem sanguinis per intestina male procedentem indicant.
- 9 Alvi interceptæ, sed parva nigra velut caprarum stercora ad necessitatem coacte emittentes, nasus in his erumpens, malum. *Hipp. I. Prorrh. V. 11.*
- 10 In alvo liquida lassato, caput dolenti, siticuloso. vigilanti, obscure loquenti, impotenti, quibus talia sunt, his timor est, ut mente moveantur. *Hippocr. I. Prorrh. 6.*
- 11 A Pleuritide, aut Peripnevmonia detento alvi profluvium superveniens, malum. *Hippocr. 6. aphor. 16.*
- 12 E contra Ophthalmia laborantem ab alvi profluvio corripitur, bonum. *6. aphor. 17.*
- 13 Ab Hydrope detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio fit. *Hipp. 6. aphor. 14.*
- 14 Dejectiones crebræ, biliosæ dysentericæ in acutis morbis pessimæ & exitiales. *Prosp. Alpin.*
- 15 A tabe detento alvi profluvium superveniens, lethale. *5. aphor. 14.*
- 16 Dejectiones virides, æruinosæ, lividæ & versicolores exitiosæ sunt. *Waldschmid.*
- 17 Si a dysenteria detento velut carunculæ secesserint, lethale est. *4. aphor. 26.*
- 18 Sanguis fursum quidem, qualiscunque sit, malum. Deorsum vero, bonum, niger subtus secedens. *4. aphor. 25.*

- 19 Excrementa cruenta interdum indicant fluxum Hæmorrhoidalem internum, si alia conspirant.
- 20 Excrementa mucosa & cruenta cum torminibus & tenesmo ejecta, signum sunt dysentericæ.
- 21 Excrementa carniæ loturæ similia, signum sunt Fluxus Hepatici.
- 22 Dejectiones cruentæ in Variolis aliisque acutis periculossimæ sunt. *Waldschmid.*
- 23 Malum est, si sanguis splendidus per secessum ejiciatur. *Idem.*
- 24 Dejectiones chylosæ indicant Fluxum Cœliacum.
- 25 Si vero cibi semidigesti ejiciuntur per alvum, signum est Lientericæ.
- 26 Albæ dejectiones in morbis quibuslibet apparentes malæ.
- 27 Albescentia excrementa utpul. ictericis familiaria sunt.
- 28 Alvi dejectiones fœtidæ, cadaverosæ, in acutis pessimæ.
- 29 Excrementa alvina meraca aut nigra in acutis, malæ.
- 30 Spumosæ dejectiones in febribus acutis, malæ. *Riverius.*
- 31 Pingues & viscosæ dejectiones lethales. *Idem.*
- 32 In morborum principio vermes prodire; tam vivos quam mortuos, malum; potissimum, si soli & sine stercore exeant. *Idem.*
- 33 Lumbrici in declinatione morbi cum excrementis exeuntes & jam coctione apparente, bonum.
- 34 Feces vomere in ileo, lethale est.
- 35 Ab ileo vomitus, aut singultus, aut convulsio; aut delirium, malum. *7. aphor. 10.*
- 36 Vomitus commodissimus est, ex pituita & bile quam maxime permixtus, & non crassus valde, neque multus. *Hipp. Prognost. XII. 9.*
- 37 Vomitus biliosi aut pituitosi die critico erumpentes, boni. *Riverius.*
- 38 Vomitus meraciores mali sunt. *Hipp. l. a.*
- 39 Si vero id, quod vomitu rejectum est, prasinum fuerit coloris, aut lividum, aut nigrum: quicumque horum colorum fuerit, malum esse putandum est.
- 40 Si vero omnes colores idem homo vomit, valde perniciosum hoc est.
- 41 Celerimam autem mortem significat lividus vomitus, si graveolens fuerit, omnes vero supputridi ac fœtidi odores in omnibus vomitibus mali sunt.
- 42 Vomitus in acutis augures sunt periculi.
- 43 Vomitus paucus & laboriosus in acuta febre, malus.
- 44 Vomitus in vulneribus semper mali sunt.
- 45 A diuturno alvi profluvio detento, sponte superveniens vomitus alvi profluvium solvit. *6. aphor. 15.*

#### 12. De Signis ex Sanguine menstruo.

I. *Definitio*: Vid. *Tab. de Physiologia p. 11.*

#### II. *Differentia*.

- 1 Respectu *quantitatis* alii menses sunt excedentes; alii vero deficientes.
- 2 Respectu *qualitatis* alii sunt floridi, alii nigri, alii pallidi &c. alii sunt acres & mofcantes, alii fœtidi &c.
- 3 Respectu *modi excretionis* alii cum, alii sine dolore excernuntur.
- 4 Respectu *temporis excretionis*, alii legitimo & ordinario, alii extraordinario tempore fluunt.
- 5 Respectu *loci excretionis*, alii per vias ordinarias, alii vero per extraordinarias excernuntur.

#### III. *Observationes*

- 1 Menses nimium fluentes, vel statum plethoricum, vel orgasmum sanguinis, vel præternaturalem sanguinis ad uterum directionem indicant.
- 2 Mensibus pluribus prodeuntibus, morbi fiunt, & non prodeuntibus, ab utero morbi contingunt. *5. aph. 57.*
- 3 Caligines, mensibus multis comparentibus, solvuntur. *Hipp. Coac. Prænot. III. 461.*
- 4 Largior sanguinis menstrui quantitas non statim indicat statum præternaturalem, inpr. si absque defectu virium fluxus contingit.



- 5 Stillicidium mensium arguit vel sanguinis defectum, vel ejusdem spissitudinem, vel motuum defectum,
- 6 Suppressio mensium in maritatis, si alia conspirant, est signum graviditatis.
- 7 Mensium fluxus pubertatis tempore erumpens, morbos presentes sepius tollit, si vero non solvuntur isti morbi, perseverare solent. 3. *aphor.* 28.
- 8 Mulieri mensibus deficientibus, sanguinem ex naribus fluere, bonum est. 5. *aphor.* 33.
- 9 Mulieri menses decolores, & non eodem tempore semper prodeuntes, purgatione opus esse significant. 5. *aphor.* 36.
- 10 Mulieri sanguinem vomenti, mensibus erumpentibus, solutio fit. 5. *aphor.* 32.
- 11 Quibus alvo tumefacta, ad pudendum rubor devenit, mensibus albis humidis de repente progressis, in longis febribus moriuntur. *Hippoc. Coac. Prænot. III.* 430.
- 12 In muliere purgationis fluxus febres solvit. *Hippoc. Coac. Prænot. I.* 226.

### 13. De Signis ex Lacte & Mammis.

- I. *Definitio*:
  - a *Lactis*. Vid. *Tab. de Physiol. p. 6.*
  - b *Mammæ*. Mammæ sunt duo corpora globosa utrinque in Pectore mulierum sita, pro diverso statu diversa signa Medico Practico exhibentia.
- II. *Differentia*.
  - a *Lactis*, quod
    - 1 Respectu *quantitatis* aliud est copiosum, aliud vero paucum.
    - 2 Respectu *qualitatis*.
      - α Aliud est *spissum*, aliud *fluxile & tenue*.
      - β Aliud *album*, aliud *aquosum*, aliud *subcæruleum*, aliud *subflavum*,
      - γ Aliud *subsalsum*, aliud *dulce*.
    - 3 Respectu *modi excretionis*, aliud sine magna difficultate, aliud vero non sine sensibilibus doloribus excernitur, aliud sponte effluit.
  - b *Mammæ*,
    - 1 Aliæ sunt *globosæ & duræ* sive *compactæ*, aliæ sunt *flaccidæ & pendulæ*.
    - 2 Aliæ sunt *æquales*, aliæ vero *inequales*.
- III. *Observationes*.
  - 1 Insignem sæpe lactis copiam fœminæ quædam absque ulla noxa in mammis continent.
  - 2 Abundantia lactis facile viam sternit variis mammæ tumoribus, inpr. si spissius evadit, vel prorsus coagulatur.
  - 3 Lac in lactantibus sine causa manifesta subito disparens, infantis lugentis mortem significare, mulieres, experientia edoctæ, asserunt.
  - 4 Lac tenue & aquosum ad nutritionem infantum sæpius ineptum est.
  - 5 Lac subcæruleum, aut subflavum, aut falsum sæpius bilis abundantiam, aut viscerum ac humorum malum statum indicat.
  - 6 Si Mulier, quæ nec prægnans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua defecerunt. *Hipp.* 5. *aphor.* 39.
  - 7 Mulieri in utero gerenti, si multum lactis ex mammis fluxerit, infirmum fœtum significat. Si vero solidæ fuerint mammæ, saniolem fœtum significat. 5. *aphor.* 52.
  - 8 Mulieribus, quibus in mammis sanguis convertitur, insaniam significat. 8. *aphor.* 40.
  - 9 Mulieri in utero gerenti, si mammæ ex improvviso, graciles fiant, abortit. 5. *aphor.* 37.
  - 10 Mulieri in utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat, gemellos gestanti, alterutrum abortit. 5. *aphor.* 38.
  - 11 Quæ perdituræ sunt fœtus, his mammæ graciles fiunt. Si vero rursus duræ fiant, dolor erit, aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus & non perdunt. 5. *aphor.* 53.
  - 12 Mammæ tumidas ac magnas habere, ad conceptionem bonum est. *Hipp.* II. *Prophet.* XXXIII. 5.

### 14. De Signis ex Semine & Scroto.

- I. *Definitio*:
  - 1 *Seminis*: Vid. *Tab. de Physiol. p. 7.*
  - 2 *Scroti*: Est sacculus ex duabus tunicis, altera interiore altera vero exteriori constans, sub membro virili hærens & testes includens, pro diverso sui statu diversa signa exhibens.
- II. *Differentia*.
  - 1 *Seminis*.
    - a Respectu *quantitatis* vel abundat, vel deficit.
    - b Respectu *consistentiæ* aliud est fluidum & tenue, aliud vero est spissum.
    - c Respectu *coloris*, aliud album, aliud flavum, aliud ex flavo viride est.
    - d Respectu *emissionis*, aliud cum impetu prodit, aliud lente & tarde admodum emittitur, aliud vero involuntarie excernitur.
  - 2 *Scroti*: quod est
    - a Vel *contractum*.
    - b Vel *pendulum*.
    - c Vel *frigidum*.
- III. *Observationes*.
  - 1 Appetitus venereus auctus in maribus cum tentigine, frequens esse solet calculosis, arthriticis & Elephantiasis laborantibus.
  - 2 Appetitus venereus in morbis, vel post hos obveniens, virium robur ac restitutionem indicat.
  - 3 Seminis frequentior emissio, inpr. quæ noctu contingit, interdum ad Tabem disponit.
  - 4 Semen nimis spissum, aut tardius emissum, raro ad generationem aptum est.
  - 5 Semen variagatum aut acre cum dolore emissum, utpl. signum est gonorrhœæ virulentæ.
  - 6 Semen involuntarie emissum, vel ejusdem acrimoniam, vel partium semen continentium debilitatem indicat.
  - 7 Testis dexter frigidus & convulsus, lethale. *Hipp.* 8. *aphor.* 11.
  - 8 Flacciditas Scroti, in pueris præcipue, vitæ periculum minatur, rugositas vero & contractio ejusdem, salutem promittit.
  - 9 Flacciditas, Scroti & membri virilis impotentia signum est.
  - 10 Testes & pudenda revulsa, dolores fortes significant, & periculum lethale. *Hipp. Prognost.* VIII. 20. *Coac. Prænot. III.* 352.
  - 11 Quibus tussis sicca est, his non solvitur; nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat. *Hippocr.* II. *Epidem. Sect. V.* 23.

### 15. De Signis ex Sputo.

- I. *Definitio*: **S**putum est materia excrementitia, partim a Saliva, partim vero e confiniis oris & pectore originem trahens.
- II. *Differentia*.
  - 1 Respectu *quantitatis*, aliud est copiosum, aliud paucum.
  - 2 Respectu *consistentiæ*, aliud est spissum, aliud fluxile.
  - 3 Respectu *coloris*, aliud est album, aliud cruentum, purulentum, viride &c.
  - 4 Respectu *odoris*, aliud est fœtidum, aliud vero nullum habet odorem.
  - 5 Respectu *saporis*, aliud est amarum sive biliosum, aliud falsum, insipidum &c.
- III. *Observationes*.
  - 1 Multa & frequens sputatio solennis est lienosis.
  - 2 Copiosum sputum interdum Ptyalismum, interdum vero dentitionem in infantibus indicat.
  - 3 Paucum sputum, vel nullum prorsus, in Pleuritidis & Peripneumoniarum statu, utpl. funestum est.
  - 4 E contra in pleuriticis sputum, si statim appareat veniente morbo, abbreviat. *Hipp.* I. *aphor.* 12.
  - 5 Sputa alba, lævia, æqualia, non admodum tenuia, vel crassa, quæve prompte facileque excernuntur, & sine dolore ullo vehementi aut multa tussi, salutaria. *Riverius.*



- 6 Capitis dolorem solvit pus per nares, aut sputa crassa & non olentia. *Hipp. Coac. Prænot. II. 25.*
- 7 Ex Angina sputa viscosa, crassa, valde alba, quæ violenter educuntur, malæ sunt. *ibid. III. 118.*
- 8 Ex Angina subarida frequentia sputa, cum tussi, lateris dolorem inducentia, perniciofa. *ibid. III. 121.*
- 9 Sputum flavum sanguine permixtum non multo, si in pulmonis inflammatione in principio morbi rejiciatur, salutare est, & valde prodest. Si vero septimo die, aut posterius, minus securum est. *Hipp. Prognost. XIII. 12. 13.*
- 10 Omnia sputa mala sunt, quæ dolorem non sedant. Quæ vero dolorem sedant, omnium optima existunt. *ibid.*
- 11 Malum etiam est, si nihil repurgetur, neque emitmitat pulmo, sed plenus ferveat in gutture. *ibid.*
- 12 Sputum viscosum, crassum & glutinosum in Pleuritis & Peripneumonia pessimum est.
- 13 Sputa meraca & nigra omnium pessima sunt.
- 14 Sputum flavum meracum periculosum est, & album ac viscosum ac rotundum inutile est. *ibid.*
- 15 Sputum in omnibus doloribus, qui circa pulmonem & costas fiunt, cito ac facile exspui convenit & flavum sputo valde permixtum apparere. *ibid.*
- 16 Sputa viscida & glutinosa cum raucedine, pessima. *Riverius ex Hippocr. Coac.*
- 17 Omnis sputi suppressio in Pleuritis & Peripneumonia pessima est.
- 18 Sputa flava pallida, aut ruffa in sanis apparentia, sive amara illa sint, sive dulcia, Phthisin astuturam & inde mortem prænuntiant. *Riverius.*
- 19 A sanguinis sputo, spuris sputum, malum. 7. aphor. 15.
- 20 A puris sputo tabes & fluxus. Postquam vero sputum retinetur, moriuntur. 7. aphor. 16.
- 21 Qui sanguinem spumofum despuunt, his ex pulmone talis rejectio fit. 5. aphor. 13.
- 22 Qui suppurati futuri sunt, primum sanguinosum spuunt, deinde dulcius. *Hipp. Coac. Prænot. III. 209.*
- 23 Lateris dolor in sputo bilioso, præter rationem evanescens, mentem emovet. *ibid. 228.*
- 24 Sputum rotundum, aut grandinis formam referens, exitiolum. *Riverius.*
- 25 Excretiones in Febris non intermittentibus lividæ & cruentæ & graveolentes & biliosæ omnes malæ. At probe secedentes, bonæ. 4. aphor. 47. 7. aphor. 96.
- 26 A tabe vexatis si sputum, quod extussiunt, prunis superfusum graviter oleat, & capilli de capite defluant, lethale. 5. aphor. 11. 7. aphor. 78.

## 16. De Signis ex Dentibus.

- I. Definitio:
- II. Differentia. Videantur in Anatomicis.
- III. Observationes.

- 1 Dentibus stridere in Febris, quibus non familiare id est a pueris, furiosum ac lethale est. *Hippocr. Prognost. IV. 4. Jam vero delirans, si hoc faciat, penitus lethale est. Coac. Prænot. II. 132.*
- 2 Perniciosum est rescicari dentes. *ibid.*
- 3 Dentis correptio abscessum, circa gingivam factum, solvit. *ibid.*
- 4 Ex dentis corruptione, vehemens Febris super accedens, & delirium, lethale est. Si vero ferventur, ulcera suppurant & ossa discedunt. *ibid.*
- 5 Quibus in Febre ad dentes viscosa circumnascuntur, his Febres fiunt vehementiores. 4. aphor. 53.
- 6 Quibus in dentibus circum circa viscosa fiunt, malum est subtrahere ac fixis oculis intendere. *Hippocr. IV. Epidem. XXVII. 13.*

## 17. De Signis ex Lingua.

- I. Definitio. Vid. Anatom.
- II. Differentia.

- 1 Alia est rubra, alia nigra &c.
- 2 Alia est humida, alia sicca, aspera &c.
- 3 Alia mucosus vario est obducta, alia eodem caret.

- 4 Alia est cum, alia sine pustulis.
- 5 Alia est tremula.

## III. Observationes.

- 1 Lingua, quæ in principio quidem inhorruit, in colore vero permanet: progressu autem temporis exasperatur & livescit, & rumpitur, lethalis est. *Coac. Prænot. II. 138.*
- 2 Periculosissima est nigra & cum virore pallida. *ibid.*
- 3 Humidam & puram retinere linguam, in omnibus morbis bonum est.
- 4 Lingua circa bifidam sui partem veluti saliva alba obduci, Febris remissionis signum est, si quidem id, quod superinductum est, crassum fuerit, eadem die: si vero tenuius postridie, si vero adhuc tenuius, tertia die. *ibid.*
- 5 Lingua tremula cum rubore juxta nasum, & alvo liquida, si reliqua sine signis sint circa pulmonem, malum est, & celeres purgationes perniciosas significat. *ibid.*
- 6 Lingua nigra cum siccitate, scabritie, scissuris & ustione lethalis. *Riverius Conf. Hippocr. l. a.*
- 7 Peripneumonias, quibus lingua tota alba ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflammatae sunt: quibus vero dimidium, una, juxta quam apparet. *Hippocr. l. a. III. 176.*
- 8 Anginosi in linguis tumores, citra signa disparescentes, perniciosi. *ibid. III. 9.*
- 9 Linguae tremulae quibusdam alvum liquidam quandoque faciunt. *ibid. II. 147.*
- 10 Denigratae vero in his celerem mortem significant. *ibid.*
- 11 Linguae asperae & rescicatae, phreniticae sunt. *ibid.*
- 12 Lingua tremula in acutis mortifera. *Riverius.*
- 13 Si lingua derepente impotens fiat, aut aliqua corporis pars siderata, atrabilarium tale existit. 7. aphor. 40.

## 18. De Signis ex Fauibus.

- I. Definitio: Consule Anatomicos.
- II. Differentia.

- 1 Aliæ sunt naturales, aliæ præternaturales & harum
- 2 Aliæ sunt doloribus affectæ, aliæ dolorum expertes.
- 3 Aliæ sunt inflammatae, aliæ vero exulceratae.
- 4 Aliæ sunt graciles, parvæ, suffocatorie &c.

## III. Observationes.

- 1 Fauces dolorosæ, graciles cum ægre tolerabili molestia, strangulatoriæ, perniciosæ, acute *Hippocr. I. Prorrh. XI. 4. & Coac. Prænot. II. 201.*
- 2 Dolores in faucibus gracilibus strangulatorii, a capitis dolore originem trahentes, convulsorii sunt. *Coac. Prænot. II. 197.*
- 3 Quibus circa fauces irritamenta sunt, hi tumores circa aurem leniter erumpunt. *ibid. 200.*
- 4 Fauces modice exasperatae & alvus vanis conatibus nitens frontis dolores, ægri palpando contrectantes, dolorosis: quæ ex hi augescunt, difficilia sunt. *ibid. 204.*
- 5 Dolores fortes circa fauces, tumores circa aurem & convulsiones efficiunt. *ibid. 206.*
- 6 Dolores parvi in acutis juxta fauces graciles, in gracili ubi hiarit, non facile os contrahente, mentem emovet. Ex his phrenitici perniciosi habent. *ibid. 217.*
- 7 Fauces exulceratae in Febre, cum alio signo ex his quæ difficilia sunt, periculosæ sunt. *ibid. 220.*
- 8 In faucibus sonitus frequentes, cum salivæ sputatione. In his in somnis sudores, boni. *Hippocr. I. Prorrh. XV. 16.*

## 19. De Signis ex Deglutione.

- I. Definitio Vid. Tab. de Physiolog. p. 9.
- II. Differentia.
- 1 Alia est facilis, alia est difficilis &
- 2 Hæc vel cum dolore vel sine dolore contingit.
- III. Observationes.
- 1 In Febris derepente suffocari & deglutire non posse, citra tumorem, malum est. *Hippocr. Coac. Prænot. II. 22.*
- 2 Collum convertere non posse, neque deglutire, ut plurimum lethale est. *ibid.*



- 3 Deglutitio violenta mala est. *ibid.* III.
- 4 Deglutitio læsa ob Paralyfin musculorum semper curatu difficilior est, quam quæ ab eorum inflammatione originem trahit.
- 5 Si in morbis tam chronicis, quam acutis potulenta repente & cum sonitu adstantibus perceptibili incidunt quasi in Ventriculum, utpl. lethale est signum.

## 20. De Signis ex Appetitu.

I. *Definitio.* Vid. *Tab. de Physiolog.* p. 8II. *Differentia.*

- 1 Alius est laudabilis.
- 2 Alius prostratus.
- 3 Alius depravatus.
- 4 Alius auctus.

III. *Observationes.*

- 1 Appetitum constare, in quovis morbo bonum.
- 2 E contra appetitum in morbis præsertim chronicis prorsus prostratum esse, malum est.
- 3 In morbo diuturno appetitus prostratus & meracæ dejectiones, malum. 7. *aphor.* 6.
- 4 Non satietas, non fames, neque aliud quidquam bonum est, quod naturæ modum excedat. 2. *aphor.* 4.
- 5 A morbo belle comedenti, nihil proficere corpus, malum est. 2. *aphor.* 31.
- 6 In longis dysenteriiis appetitus prostratus, malum: & cum febre, pejus. 6. *aph.* 3.
- 7 Appetitus insolitus in morbis utpl. malus est & mentis emotionem indicat.
- 8 Interdum tamen insigni cum desiderio ingesta alimenta remedii vim obtinent.
- 9 Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente; cibi autem fastidia ipsi accidunt, hanc in utero gerere putato. 5. *aph.* 61.
- 10 Qui in principio morbi bene appetunt, postmodum vero cibos averfantur, morbo diutius torqueri solent.
- 11 Depravata appetentia, quæ Pica seu Malacia dicitur, in morbis chronicis mala. *Riverius.*
- 12 Sitis præter rationem soluta in acutis morbis, mala est. I. *Prorrh.* VII. 7.
- 13 Sine siti esse tum in Pleuritide, tum in omnibus circa pulmonem morbis, bonum. *Coac. Prænot.* III. 156.
- 14 Qui in medicamentorum potionibus, dum purgantur, non sitiunt, non cessant, priusquam sitierint. 4. *aphor.* 19.
- 15 Sitis sine causa manifesta aucta, dispositionem ad statum præternaturalem indicat.
- 16 Sitis inexhausta, quæ nullo potu expleri potest, mala. *Riverius.*

## 21. De Signis ex Sensibus externis &amp; internis.

I. *Definitio.*II. *Differentia:* Vid. *Tabula de Physiologia* p. 12.III. *Observationes.*

- 1 Sonitus aurium cum visus hebetudine & narium gravitudine mentem emovet & sanguinem profundit. *Hippoc. Coac. Prænot.* II. 69.
- 2 Quibus surditas cum capitis gravitate & præcordii intensione & ad splendorem turbatio, sanguinem profundit. *ibid.*
- 3 Tinnitus in acutis & sonitus in auribus lethale. *ibid.*
- 4 In febre acuta aures obsurdescere, furiosum est. *ibid.*
- 5 Valde surdi in accipiendo tremuli, linguam resoluti, torpidi, malum. *ibid.*
- 6 Accedente ægritudine surditas & urina subrubicunda subsidentiam non habens, sed id, quod in medio innatat, mentem emovet. *ibid.*
- 7 Surditas, quæ in acutis critice fit, bona est. Mala est, quæ per intervalla in acutis observatur & quæ citra crisin evenit. *VValdschmid.*
- 8 Sonitus & tinnitus aurium in puerperis pessimi. *ibid.*
- 9 Qui citra febrem, aurium tinnitibus, capitis doloribus aut tenebrosa vertigine & votis tarditate, manuumque stupore tentantur, in eis aut siderationem, aut morbum comitalem, aut etiam obli-

nem sperare oportet. *ibid. ex Hippocr.*

- 10 Capitis concussiones & aurium sonitus sanguinem effundunt, aut mulieri menses deducunt, tum alias, tum, si juxta spinam ardor consequatur. *Hippoc. Coac. Prænot.* II. 15. 16.
- 11 Visum aut auditum per somnum læsa habere, morbum circa caput significat. *Hippocr. de Insomniis.* XII 11.
- 12 In febre non intermittente, si labium aut supercilium aut oculus aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, corpore jam debili existente, quicquid horum fiat, in propinquo mors est. 4. *aphor.* 49.
- 13 Si post Phrenitidem, aut gravem alium capitis morbum surditas succedat priore morbo cessante, aut allevato & facultate non debilitata, bonum. *Riverius.*
- 14 In ardentibus & aliis febribus, quibus colli dolor & temporum gravitas & caligo vertiginosa circa oculos, aut etiam præcordiorum distentio non cum dolore fit, his sanguis per nares erumpit. *Hipp. I. Epidem. Sect.* II. 98.
- 15 Olfactus in extrema virium debilitate si perit, mortem instantem indicat.
- 16 Si omnia fœtida apparent, indicat vel ulcus narium aut partium vicinarum, aut humorum corruptorum in Ventriculo copiam, aut sanguinis interdum insignem corruptionem.
- 17 Cibos & potus atque medicamenta oblata putria atque graveolentia videri, malum. *Riverius.*
- 18 Torpores & Sensus stupiditates, præter morem contingentes, futuræ siderationis signum sunt. *Hippoc. Coac. Prænot.* III. 315.
- 19 In omni morbo mente valere, & bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonum est: contrarium vero malum. 2. *aphor.* 33.
- 20 Prædebilitatorum desipientiæ pessimæ sunt. *Hippocr. I. Prædict.* I. 9.
- 21 In biliosis meracis alvi egestionibus rari circa latus dolores desipientiam significant. *ibid.* III. 7.
- 22 Mentis percussiones cum voce clangosa, linguæ convulsiones tremulæ & voces tremulæ evadentes, mentem alienant. *ibid.*
- 23 Deliria circa necessaria pessima sunt. *Hippoc. Coac. Prænot.* I. 141.
- 24 Deliria cum sopore convulsoria sunt. *ibid.* 123.
- 25 Mente moti, acute insuper febrientes phrenitici sunt. *ibid.* 138.
- 26 Mentis emotiones modice feroces, ferinæ sunt, sed & convulsiones significant. *ibid.* 124.
- 27 Desipientiæ cum risu oborientes, securiores sunt: cum studio vero serio, periculosiores. 6. *aphor.* 53.
- 28 Dentes collidere aut stridere, quibus non familiares id est a pueris, furiosum ac lethale est. *Coac. Prænot.* II. 151.
- 29 Quibus in febribus ardentibus tremores facti fuerint, mentis emotio solvit. 6. *aphor.* 26.
- 30 Ex plaga in caput, stupor aut delirium, malum. 7. *aphor.* 14.
- 31 In principiis febrium, si delirium accesserit, perituum hominem sciendum est. II. *Prorrh.* XIII. 9.
- 32 Ex sanguinis fluxu aut nimio potu aut volvulo delirium, malum. *ibid.* 7. 9. & 10.
- 33 Ubi in febre non intermittente, difficultas respirandi & delirium fit, lethale est. 5. *aphor.* 50.
- 34 Ubi somnus delirium sedat, bonum est. 2. *aphor.* 2.
- 35 Ex vigilia convulsio aut delirium malum. 7. *aph.* 18.
- 36 Delirium in spiritu, singultu & sudore lethale est. *Coac. Prænot.* I. 150.
- 37 Oblivio subito exorta, mala est. Oblivio post Epilepsiam vel Apoplexiam, pessima. *VValdschmid.*
- 38 Delirii minus periculosi signa sunt, si fit cum risu & absque ferocia, si habeat intervalla, si leve fuerit, si vires consent, & si somnus superveniat.
- 39 Ignorantia cum rigore, malum. Malum item oblivio. *Hipp. I. Prorrh.* VIII 3. 4.
- 40 In Phrenitide subitanea resipiscentia, febre acuta perseverante, & nulla crisi prægressa, mortem in propinquo esse significat. *Riverius.*
- 41 Phrenitis Lethargo succedens, salutaris. *ibid.*



22. De Signis ex Motu voluntario  
& Decubitu

## I. Definitio: Vid. Tab. de Physiolog. p. 13.

## II. Observationes

- 1 In quovis morbo, si æger facile surgat & erigat se; si de latere in latus facile convertatur salutare; si contra, vix sese commovere possit, malum. *Riverius ex Coac. III. 347.*
- 2 Multa corporis jactatio, anxietas & inquietudo in febre acuta, mala. *ibid.*
- 3 Spontaneæ lassitudines morbos denunciant. 2. *aphor. 5.*
- 4 Gravitas totius corporis, & manuum ac pedum, mala est. *Hipp. Coac. Prænot. III. 348.*
- 5 Decubitus optimus est, velut qui sanus solitus fuit. *ibid.*
- 6 At supinum jacere cruribus extentis, bonum non est. *ibid.*
- 7 Si vero etiam delabatur pronus ad pedes, deterius est. *ibid.*
- 8 Lethale autem est & hiare & dormire semper & crura supine jacentis valde incurvata esse ac complicata. *ibid.*
- 9 In ventrem autem decumbere, si quis non sit adfuetus, delirium significat, & dolores circa ventrem. *ibid.*
- 10 At pedes nudos habere & manus, si quis non vehementer calidus sit, & crura disjecta, malum est; anxietatem enim significat. *ibid.*
- 11 Erectum sedere velle, malum est in acutis, pessimum autem in peripnevmonicis ac pleuriticis. *ibid.*
- 12 Perniciosum etiam est, pervolvere se ad margines lecti, ac primum pedes excludere, deinde corpus erigere, & nisi cohibeantur, vel excidere, vel surgere. *Riverius ex Hollerio.*
- 13 Manus quæ in febribus acutis, aut peripnevmonicis, aut in phrenitide, aut capitis dolore, ante faciem feruntur & frustra venantur, & festucas legunt, & floccos de vestibus evellunt, & de pariete paleas detrahunt, eæ omnes malæ sunt. *Hippocr. Prognost. IV. 10.*

## 23. De Signis ex Somno &amp; Vigiliis.

## I. Definitio: Vid. Tab. de Physiol. pag. 13.

## II. Differentia.

- 1 Somni, qui est
  - a Vel nimius vel paucus.
  - b Vel sæpius interruptus & insomniis turbatus.
- 2 Vigiliarum, quæ sunt
  - a Vel immoderatæ.
  - b Vel continuæ.

## III. Observationes.

- 1 Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum. 2. *Aphor. 3.*
- 2 Quo in morbo somnus laborem facit, lethale: si vero somnus juvet, non est lethale. *ibid. 1.*
- 3 Ubi somnus delirium sedat, bonum. *ibid. 2.*
- 4 Somni profundi, non turbulenti, firmam judicationem significant. *Hippocr. Coac. Prænot. I. 220.*
- 5 Somni soporosi & perfrigerationes perniciosæ sunt. *ibid. II. 41.*
- 6 Somnus multus in faucibus exasperatis convulsorius. 1. *Prorrhet. xv. 5.*
- 7 Quibus bibendi appetentiæ, noctu valde sitientibus si obdormierint, bonum est. 5. *aphor. 27.*
- 8 Oculorum rectitudo in morbo acuto & motus velox & somnus turbulentus & vigiliæ & quandoque sanguinis e naribus stillationes, nihil boni. *Coac. Prænot. II. 137.*
- 9 Exitiosum est, ubi ægrotus ore hianti assidue dormit. *Waldschmid. ex Hippocr.*
- 10 Sopor in principio morbi malus est. *ibid.*
- 11 Somnus comatosus in febre acuta perniciosus. *River.*

- 12 Siquis in laboriosa febre obstupescat, & veluti catoche afficiatur, morbo laborat pessimo. *Ibid. ex Hipp.*
- 13 Excitationes a somno, quæ cum pavore fiunt & turbulentia, periculosæ. *ibid.*
- 14 Si per somnum candidæ partis oculorum demissis palpebris aliquid apparet, nec alvi fluor, nec inedia in causa est, nec ita æger dormire consuevit, vitiosum indicium, lethaleque admodum est. *Ibid. ex Galeno.*
- 15 Vigiliæ in acutis, exceptis iis, quæ instantem mutationem criticam comitantur, malæ sunt. *Waldschm.*
- 16 Vigiliæ immoderatæ in juvenibus magis periculosæ, somni vero in senibus. *Riverius.*
- 17 Quicumque ægrotantes neque noctu neque interdiu dormire possunt, valde periclitantur.
- 18 Ex vigilia convulsio aut delirium, malum. 7. *aph. 18.*
- 19 Insomnia in phrenitide evidèntia, bona sunt. 1. *Prorrhet. I. 6. & Coac. Prænot. I. 132.*
- 20 Quæcunque insomnia mens hominis in noctem per somnum offert de diurnis actionibus, & reddit quomodo facta sunt, ea quæ seria ac iusta in re per diem facta sunt, aut de quibus consilium initum est: hæc homini bona sunt, quæ vero contrario modo se habent,urbationem in corpore significant. *Hippocr. de Insomniis III. 1.*
- 21 In eo, qui periculose ægrotat, insomnia mortuorum, sepulchrorum, & sacerdotum, futuram mortem prænuntiant. *Riverius.*

## 24. De Signis ex Abscessibus.

I. Definitio: Abscessus sunt tumores, materiam purulentam ex suppuratione ortam in se continentes, varia signa in morbis præbentes.

## II. Differentia.

- 1 Respectu magnitudinis, alii sunt magni, alii parvi.
- 2 Respectu sensus, alii sunt dolorifici, alii vero indolentes.
- 3 Respectu coloris, alii sunt rubicundi, alii pallidi &c.
- 4 Respectu loci, alii post aures, alii in inguinibus &c. generantur.

## III. Observationes.

- 1 Si abscessus post signa coctionis in partibus remotioribus erumpunt & cito suppurantur, boni sunt, & contra.
- 2 Omnes abscessus minores & in acumen elevati, boni sunt: qui vero contrario modo se habent, mali.
- 3 Quo laudabilius est pus, quod ex suppurato abscessu fluit, eo magis sunt salutares abscessus & contra.
- 4 Omnes abscessus morbum non alleviantes, in principio statim apparentes, aut cito regredientes, mali sunt.
- 5 In febribus abscessus, qui non solvuntur ad primas judicationes, morbi longitudinem significant. 4. *aphor. 51.*
- 6 Urinæ in abscessibus retro aures cito & modice maturescences, malæ sunt. *Coac. Prænot. II. 92.*
- 7 Abscessus circa aurem in morbis diuturnis suppurati, non valde albo & inodoro pute, occidunt, & maxime mulieres. *ibid.*

## 25. De Signis ex Hæmorrhagiis.

## I. Definitio:

## II. Differentia. Vid. Praxis Specialis.

## III. Observationes.

- 1 Hæmorrhagiæ narium in acutis die critico in junioribus sufficiente quantitate contingentes salutares sunt: in adultis vero & trigésimum annum supergressis raro bonæ sunt.
- 2 Hæmorrhagiæ narium in principio morbi apparentes malæ sunt.
- 3 Melancholicis & nephriticis Hæmorrhoides supervenientes bonum.
- 4 Syderatis, si Hæmorrhoides accedant, utile est. *Coac. Prænot. III. 318.* Plura de Hæmorrhagiis Vid. in Praxis Speciali.



# FUNDAMENTORUM MEDICINÆ THEORETICO PRACTICORUM PRAXIS GENERALIS

Complectens METHODUM MEDENDI CUM PHARMACIA,  
CHIRURGIAM ET DIÆTAM.

P R A X I S G E N E R A L I S  
P A R S I.

## DE METHODO MEDENDI.

*De Methodo Medendi in genere.*

I. *Definitio*: **M**ethodus Medendi, quam etiam Therapeuticam, five Therapiam & Praxin Generalem vocant, est pars Medicinæ principalis, quæ tradit modum per indicationes juventia, summis morborum causis opponenda, inveniendi.

### II. *Differentia*.

- 1 Alia est *Generalis*, quæ tantum generales & summas morborum causas respicit, & monstrat quomodo per debita auxilia & media causis illis occurrere possit.
- 2 Alia est *Specialis*, quæ docet modum speciales morbos necessariis & convenientibus remediis tractandi.
- 3 Alia est *Specialissima*, quæ individua certis morbis laborantia respicit, & viam monstrat, quomodo specialium circumstantiarum in individuo occurrentium intuitu, auxilia & remedia applicari debeant. Cum vero specialis & specialissima Methodus ad Praxin specialem pertinent, h. l. tantum de Methodo Generali agemus.

### III. *Fundamentum* est

- 1 *Experientia*, a qua originem traxit fere tota Medicina: dum homines non solum Naturæ methodum in morbis observarunt, sed & post varia tentamina, sæpiusque reiterata experimenta, hæc vel illa remedia in morbis proficua & incertis affectibus specifica deprehenderunt. Huic E. experientiæ tanquam firmissimo fulcro innititur Medendi Methodus.
- 2 *Ratio*: quæ experientiæ debet esse comes; Hæc tamen firmis & veris Naturæ principiis imbuta sit necesse est, alias facile committuntur errores.
- 3 *Analogismus*: Si Medicus Practicus vel a simili concludit ad similem, vel ad congenerem affectum, v.g. Paulus laboravit Febre tertiana intermittente & ipsi profuerunt Salia neutra in larga quantitate exhibita, E. etiam proderunt Johanne eodem morbo laboranti: aut hoc vel illud prodest in Podagra E. etiam proderit in Calculo.

### IV. *Regula & Cautela Practicæ*.

- 1 Medicus esto Naturæ minister non magister: motus & intentiones Naturæ imitetur & juvet, raro maturare & corrigere audeat.
- 2 Nunquam moveat, seu etiam motum excitulet, nisi materia sit mobilis & viæ expeditæ.
- 3 Si Natura materiæ morbificæ emotionem jam intendit, aut plane suscepit, caveat, ne superaddito stimulo fiat nimium.
- 4 Facilius est motus in solidum suppressere, quam moderari.
- 5 Specifica, ut & evacuationes particulares non adhibeat, nisi præmissis universalibus, hoc est, instituta antea, ubi opus, Venæsectione, Catharsi, suda-

tionem &c. non vero his omnibus simul in omnibus individuis.

- 6 *Experientiæ* semper potior habenda est ratio in Praxi, quam rationis ipsius, quare hæc illam semper sequatur: cum ratione tamen omnia applicentur.
- 7 In Analogismo probe caveatur, ne nimium extendatur, alias enim facile lapsus fit ad nudam Empiriam.

*De Indicationibus, Indicantibus & Indicatis.*

### I. *Definitio*.

- 1 *Indicationes* sunt certæ regulæ aut conclusiones, quæ Medico quid agendum sit monstrant.
- 2 *Indicantia* sunt res vel secundum vel præter naturam, quæ vel sui conservationem vel remotionem postulant.
- 3 *Indicata* sunt ipsa auxilia & remedia per indicationes detecta, quæ vel conservando vel alterando vel removendo agunt.

### II. *Differentia*.

- 1 *Indicationum*, quarum
  - a Alia est *Vitalis*, quæ virium conservationem respicit.
  - b Alia est *Curatoria*, quæ morbi remotionem & curationem postulat.
  - c Alia est *Preservatoria*, quæ morbi causam respicit.
- 2 *Indicantium*, quæ sunt,
  - a Vires, quæ conservari debent.
  - b Morbus.
  - c Causa Morbi, quæ removeri & preservari debent.
- 3 *Indicatorum* five auxiliorum, quorum alia sunt
  - a *Dietetica*, h. e. prudens regimen non solum circa cibum & potum, sed & calorem, & refrigerationem per vestimenta & stragula, aut concafactiones conclavium, moderandum, item admonitiones & consilia pro refræmandis, aut evitandis Animi commotionibus patheticis.
  - b *Chirurgica*, v.g. Venæsectio, Scarificatio, Miridines, Setacea, Fonticuli, Vesicatoria, Frictiones, Pediluvia, quin omnes actiones manuales, Deligationes, Repositiones artuum, Incisiones, Trepanatio, Cataractæ depositio, Paracentesis.
  - c *Pharmaceutica*, seu stricte sic dicta *Medicamenta*, quæ respiciunt.
    - a *Materiam morbificam* ejusque
      - 1 *Corractionem*, ut Alterantia
      - 2 *Eliminationem*, ut Evacuantia, Diuretica, Diaphoretica, Salivantia, Emmenagoga.
    - β *Motus quoslibet*
      - 1 *Excitant* pleraque jam enumerata Evacuantia, item Analeptica & Confortantia, ut & Aphrodisiaca &c.



2 *Corrigunt & sedant* specifica, Anodyna, Pa-  
regorica.

III. *Regulæ & Cautelæ Prædictæ:*

- 1 Nisi quis veris Pathologiæ principiis imbutus sit, nunquam veras formabit Indicationes, & hinc non potest non falsa sequi Medendi Methodus.
- 2 Indicatio præservatoria, quoniam virium conservationem respicit, primum semper occupare debet locum.
- 3 Præsentibus contra indicantibus semper respiciendum est ad id, quod magis urget, Indicans scil. vel contra indicans.
- 4 In omni morborum curatione Medicus probe attendat, ut tuto, cito & jucunde curet, quo fine poriri poterit.
  - a Si in genere ab omnibus vehementioribus remediis abstinere.
  - b Si Naturæ methodum sequitur, & salutarem ejusdem conatus non supprimit.
  - c Si juxta 1. *Aphor* 22. & 24. non cruda sed cocta & turgescens purgat, & in acutis affectibus validioribus remediis non nisi summa urgente necessitate utitur.
  - d Si fractis jam viribus, Venæsectionem & evacuantia vitat.
  - e Si præsentem Plethoram mature imminuit.
  - f Si in copia remedium non excedit.
  - g Si remedia morbo convenientia continuat, & singulis diebus ea non variat.
  - b Si in corporibus plethoricis & cacochymicis a fortioribus commoventibus abstinere.
  - i Si suavia medicamenta, dosi parva & pauca, morbo tamen debellando sufficientia, ægrotis propinat.
  - k Si, quantum quidem possibile animi tranquillitatem ægroti conciliare studet. Ut alia silentio prætereamus.

PARTIS I.

SECTIO I.

De Evacuatione Humorum.

- I. *Definitio.* **E** Vacuatio humorum est eorundem per certa & convenientia locaeductio, eum quidem in finem a Naturæ ministro per certa exhibita remedia instituta, ut remotis causis materialibus eo citius sanitas labefactata restitui possit.
- II. *Differentia.*
  - 1 Alia fit per incisionem Vasorum & cutis, ut sanguis evacuetur, quale quid contingit in *Venæsectione*, *Scarificatione* & *Hirudinum* applicatione.
  - 2 Alia fit per remedia, ut consuetæ sanguinis evacuationes revocentur.
  - 3 Alia est evacuatio, quando sanguis extravasatus, aut pus collectum educitur.
  - 4 Alia instituitur per alvum, quæ stricte vocatur *Purgatio*, & remedia hancce efficientia, *Purgantia*: quorum etiam pertinet evacuatio per *Clysteres*.
  - 5 Alia fit per superiora sive per *Vomitum*, cui scopo inserviunt *Emetica* sive *Vomitiva*.
  - 6 Alia fit per vias urinarias, & audit *Diuresis*, remedia vero eidem inservientia *Diuretica*.
  - 7 Alia vero per habitum corporis instituitur, quam *Diaphoresin*, remedia vero *Diaphoretica* vocant.
  - 8 Alia fit per ductus salivales, quæ est vel *universalis*, uti in *salivatione Mercuriali*, vel *particularis*, qualis instituitur per *Apophlegmatizantia*.
  - 9 Alia fit per *Nares*, per remedia scil. *Errhina* & *Parmica*.
  - 10 Alia evacuatio fit per *Pectus* ope scil. remedium *expectorantium*. De quibus singulis jam seorsim agemus.
  - 11 Alia fit lente per *Vesicatoria*, *Fonticulos* & *Seta-*  
*cea*.

I. De Plethoræ imminutione per Venæsectionem.

- I. *Definitio.* **V**enæsectio est evacuatio artificialis eum in finem a Chirurgo instituta, partim ut sanguis in corpore abundans imminuatur, partim ut ad alia loca derivetur, vel a partibus revellatur.
- II. *Differentia.*
  - 1 Alia est simpliciter *Evacuatoria*, quando scil. Plethoram tantum imminuendi animus est, & hæc est vel larga, vel mediocris, vel parva.
  - 2 Alia est *Revulsoria*, quando sanguis in locis a parte affecta admodum remotis mittitur, v. g. urgentibus affectibus capitis, in pede.
  - 3 Alia est *Derivatoria*, quando in vicina partis affectæ instituitur, v. g. in Pleuritide in brachio, aut in Angina in venis raninis.
- III. *Indicans.*
  - 1 Primarium est *Plethora* sive abundantia sanguinis, quæ omnium citissime per Venæsectionem imminuitur.
  - 2 Secundarium *Spissitudo*, quatenus remota portione sanguinis reliquus eo facilius motu cordis propellitur, & hinc spissitudinem amittit.
  - 3 Congestiones sanguinis in variis partibus factæ.
  - 4 Hæmorrhagiæ interdum nimium urgentes, ubi revulsoria Venæsectio insignem habet usum. Reliqua vid. infra de usu V. S.
- IV. *Tempus*: quod est
  - 1 Electionis, quod est vel vernalis vel autumnalis, ubi præservationis gratia in subjectis, quæ eam ferre possunt instituitur: quo tempore etiam eligatur matutinum tempus diei serenæ, jejuno ventriculo, luna vel decrescente vel tempore Novilunii.
  - 2 Necessitatis, quod nullum alligatum est legibus, unde præsentis necessitate in affectibus Venæsectionem admittentibus omni etiam tempore instituitur sanguinis missio.
- V. *Locus.*
  - 1 *Brachium*, in quo ordinarie aperitur *Mediana*, nonnunquam vero *Cephalica*, interdum *Basilica* circa juncturam humeri ac brachii, in manu vero inter digitum minorem vena *Salvatella*.
  - 2 *Pedes*, in quibus utpl. *Saphena* secatur.
  - 3 *Caput*, ubi vel vena *frontis*, vel *ranina* sub lingua secantur.
- VI. *Ufus*
  - 1 Venæsectionis usus insignis est in Plethora tam simplici, quam cum spissitudine conjuncta, a quacunque causa orta.
  - 2 In Hæmorrhagiis suppressis, aut non legitime succedentibus.
  - 3 In Hæmorrhagiis nimis metuendis præservationis, in præsentibus vero revulsionis gratia.
  - 4 In doloribus congestiis & spasticis, magis tamen præservationis, quam curationis gratia, interdum tamen urgentibus doloribus in ipso quoque paroxysmo cum fructu instituitur.
  - 5 In præoccupandis Inflammationibus, majores congestiones facile excipientibus, quacunque etiam in corporis parte fiant.
  - 6 In Convulsionibus, Epilepsia & defectibus motuum cum Hæmorrhagiis suppressis & Plethora connexionem habentibus.
- VII. *Regulæ & Cautelæ Prædictæ.*
  - 1 Quamvis Venæsectio summe sit utilis, abusus tamen quam maxime vitandus est, quatenus corpus per eam insigniter debilitatur & morbi multi pervertuntur.
  - 2 Si partes inferiores laborant, Venæsectio in partibus superioribus utilis est, & contra, si superiores affliguntur, Venæsectio in pede.
  - 3 In infantili & puerili ætate non facile suadenda est Venæsectio, quoniam per alia media incommoda a Plethora facile & præcaveri, & tolli possunt.
  - 4 Hec etiam senibus temere Vena secetur, nisi consuetudo, status Plethoricus, aut aliæ circumstantiæ sanguinis missionem suadeant.



- 5 Gravidæ Plethoricæ Venæsectionem etiam repetitam optime ferunt; imo in principio graviditatis instituta, omnia illa incommoda graviditas affligentia, præcavet & tollit. Interim tamen Medicus circumstantias omnes bene ponderet prius, quam sanguinis evacuationem suadeat.
- 6 Venæsectio in pede facillime ad abortum disponit, quare fugienda est in gravidis,
- 7 Venæsectio in nullâ febre qua tali & jam formata absolute necessaria aut utilis est, nisi corpora sint summe Plethorica, ac Venæsectioni, in principio morbi institutæ, statim subjungantur Diaphoretica, atque regimine conveniente motus febriles in ordine conserventur.
- 8 Multo minus usum habet, in malignis febribus, petechialibus, hungaricis, epidemicis & contagiosis, vid. D. D. Stahl's Dissert. de V. S. Patrocino p. 35.
- 9 In quovis morbo Venæsectionem admittente consultius est eam, vel in principio, vel in declinatione morbi adhibere, aut extra paroxysmum ad præservationem præscribere.
- 10 Venæsectio in statu dolorum congestiorum & spasticorum instituta, sæpius quidem prodest, sed paroxysmi postea citius & gravius redeunt, ac non nisi secta vena iminuantur.
- 11 Venæsectioni raninarum in Angina semper præmittatur Venæsectio larga in pede.
- 12 Quantitatem sanguinis emittendi determinat subjectorum conditio: in sensibilibus pauca quantitas sufficit, in aliis vero largior.
- 13 Venæsectio magis convenit subjectis vasis amplioribus præditis, quam aliis.

## 2. De Sanguinis Evacuatione per Scarificationem.

I. **Definitio.** Scarificatio est actio Chirurgica, eum in finem instituta ut sanguis e porosa partim substantia per vulnuscula instrumento appropriato cuti inflicta, ope cucurbitularum extrahatur, & hinc stases & corruptiones sanguinis in porosis partibus præcaveantur.

### II. Differentia.

- 1 Respectu incisionis: in alia enim vulnuscula tantum parva cuti infliguntur, in alia longæ incisiones juxta veteres, quos etiam Galli adhuc imitantur, fiunt.
- 2 Respectu loci, alia fit in pedibus, alia in brachiis, alia in dorso, alia in naribus juxta Ægyptios.
- 3 Respectu cucurbitularum, alia cum, alia sine cucurbitulis instituitur.

### III. Indicantia.

- 1 Temperamenta Sanguinea & Phlegmatica, sive corpora succulenta multum sanguinis in poris habentia.
- 2 Scabies aliæque cutis efflorescentiæ e feri corruptione natæ.
- 3 Morsus animalium venenatorum, ut una cum sanguine pars veneni simul extrahatur.
- 4 Interdum quoque Palpitatio cordis, de qua insigne exemplum refert. D. D. Stahl's in Dissert. de V. S. in pede p. 25. & 26.

### IV. Modus.

Scarificata per instrumentum appropriatum cute, imponitur cucurbitula, ex qua beneficio flammæ expulsum est aer, unde aer circumstans cutim premens, exprimit ex vulnusculis sanguinem in ære vacuum cucurbitulam.

### V. Regula & Cautela Practicæ.

- 1 Si cucurbitula firmiter non adhæret, aut decidit, denuo exhibeatur flamma, donec adhærescat.
- 2 Repleta aliquo modo sanguine cucurbitula removeatur, ac evacuata denuo applicetur, donec sufficiens sanguis extractus fuerit.
- 3 Scarificationes minus profunt subjectis ficcioribus, quoniam parum sanguinis habent in porosa partium substantia, quare hisce Venæsectio magis est suadenda.

- 4 Si sanguis nimis est crassus, Scarificatio inutilis est, quia sanguis crassior per vulnuscula inflicta non profuit.
- 5 Quoad quantitatem cucurbitularum, vitetur excessus & ultra sex vel octo non applicentur.
- 6 Si sanguis nimis diu effluit, locus scarificatus inungatur oleo, ut hoc modo consolidatio promoveatur.

## 3. De Sanguinis evacuatione per Hirudines.

I. **Definitio.** Hirudines sunt animalcula reptilia oblonga, capite latiusculo & ore subrotundo, ac veluti calloso, aspero, dentibus instructo, prædita, in aquis degentia, quæ certis corporis partibus eum quidem in finem apponuntur, ut sanguinem ex iisdem fugant.

### II. Differentia.

- 1 Aliæ sunt *benignæ*, quæ sunt longæ & tenues, capite minori præditæ, ex viridi flavescetes in dorso, in ventre vero parum rufescentes & hæ potissimum aquas fluentes incolunt.
- 2 Aliæ sunt *malignæ*, quæ caput habent magnum, colore sunt rufescentes nigricantes aut valde fulvæ, & in dorso maculis lividis distinctæ: hæ potissimum aquas stagnantes & putridas inhabitant, & hinc in usum non trahuntur.

### III. Preparatio.

Quamvis benignæ tantum in usum trahantur, non tamen statim post earum capturam sunt applicandæ, sed prius sunt exprimendæ, ut palustre & limosum illorum nutrimentum excutiat, ac deinde per aliquot dies in aqua limpida sunt asservandæ, quo quicquid ipsis adhuc inest sordidi, ex ipsis elutietur. Ne vero fame pereant, sanguine pullorum, agnorum, vitulorum &c. sunt nutriendæ: non tamen nimis sunt saturandæ, quo postmodum eo avidius sanguinem ex partibus, quibus applicantur, fugant: quare convenit, ut, si matutino tempore applicari debent, vespere ex aqua eximantur, & in capsula asserventur, sic enim avide admodum sugunt.

### IV. Modus applicandi.

Quoniam in sordidis & inquinatis locis non facile sugunt, pars prius madido linteo aut spongia abstergatur: aut, ut eo facilius sugant, lacte vel sanguine pars fricetur: postea vero digitis tantum nudis, aut ne in hos morsum suum deflectant, linteo prius obvolutis parti applicantur. Quod si vero loco specialissimo sunt admovendæ, v. g. venis hæmorrhoidalibus, commode frustulo arundinis, ex uno latere secundum longitudinem fisso, ita ut aperiri & denuo applicari possit, aut metallicæ cannulæ includantur, ac parti applicantur. Si vero locus, cui applicari debent, latioris est ambitus, in cucurbitula vitrea admoventur. Relinquuntur autem tam diu, donec sufficientem sanguinis copiam suctione extraerint, quod, si vero unica non sufficiat, & hæcce sanguine plena decidat, aliæ ei substituendæ sunt, aut etiam prima relinquitur, & cauda ei præciditur, sic enim omnis sanguis per caudam effluit, & ita unica sanguinis tot, quot aliæ tres vel quatuor exfugunt.

### V. Usus.

#### 1 Generalis.

Ut Plethora, quam alias Venæsectio atque Scarificationes imminuere solent, pariter per eas imminuatur.

#### 2 Specialis.

Ut sanguis etiam ex iis partibus, ubi Venæsectio & Scarificatio institui nequit, evacuetur, & morbi etiam magis quam per prædictas evacuationes imminuantur: ita plures affectus (Tinea scilicet cum roseo cutis tumentis colore, pustula faciei inveterata, Phrenitis ex retentis lochiis, Epilepsia ex eadem causa, Dolor capitis rheumaticus, Dolor temporum, Melancholia, Vertigo, Lingue anginodes intumescencia, Apoplexia, Ophthalmia, Dolor dentium, Gutta rosacea, Angina, Lienis durities, Quar-



tana &c. curati fuerunt. Vid. D.D. Stahliani Dissert. de Sanguisugarum utilitate.

### 3 Specialissimus.

Ut sanguis ex vasis Hemorrhoidalibus extrahatur: unde in Hemorrhoidibus non succedentibus, aliisque cum hisce arctam connexionem habentibus affectibus v. g. Malo Hypochondriaco, Lenis obstructione, Doloribus rheumaticis, Malo Ischidiaco, Podagra &c. optimum ferunt auxilium: Uti id pluribus exemplis probavit D.D. Stablius l.a.

### 4. De Evacuatione humorum per Purgationem.

I. **Definitio.** Purgatio est evacuatio artificialis, eum in finem per remedia purgantia excitata, ut humores superflui serosi, mucosi, biliosi &c. tam in primis viis, quam in ipsa sanguinis Massa herentes evacuentur, atque hoc ipso humorum laudabilis status restituatur.

### II. Differentia.

- 1 Alia est lenis, quando tantum lenia laxantia aut lubricantia ac alvum referantia, exhibentur.
- 2 Alia est media, quando paulo fortiori stimulo alvas per proprie sic dicta purgantia referatur.
- 3 Alia est fortissima, quando per remedia drastica humores magno impetu e corpore expelluntur.
- 4 Alia una vice contigit, alia vero successive fit, quam Purgationem per epicroasin vocant.

### III. Indicantia.

- 1 Abundantia feri generalis sui remotionem & immutationem postulans.
- 2 Varii humores recrementitii partim a bile, partim ab aliis humoribus ad intestina depositis orti, in primis viis herentes & digestionem varie turbantes.

### IV. Tempus: quod est

- 1 Commoditatis, quando purgantia tempore verno & autumnali preservationis gratia assumuntur, ut humores inutiles estivo, vel hyemali tempore collecti, removeantur.
- 2 Necessitatis: quod nullas habet leges: quare si necessitas urget, quovis tempore purgatio institui poterit.

V. **Remedia:** quæ sunt vel Lenientia, vel Purgantia strictæ sic dicta; hæc vero sunt vel mitiora, vel fortiora.

#### 1 Lenientia.

Crysal. Tart. a ʒj. ad ʒiij.

Sal Tart.

Tart. tartariz.

Tart. vitriolat.

Ter. sol. Tart.

Arcan. dupl.

Nit. ʒiat.

Sal cathart. amar. a ʒij. ad ʒvj.

Polychrest. a ʒss. ad ʒj.

Decoct. prunor.

Passular. ab ʒij. ad ʒss.

#### 2 Purgantia.

Magnesia alba. a ʒss. ad ʒiss.

Manna ab ʒj. ad ʒij.

Mannaliquida. ab ʒij. ad ʒiv. per se, cum aliis ad ʒvj. ʒj.

Tamarindi. ab ʒj. ad ʒiij. in decocto

Cassia. eadem dosis.

Pulpa Tamarind. ab ʒj. ad ʒij.

Liquor. aperit. miner. ab ʒij. ad ʒiv.

Rhabarbarum. a ʒss. ad ʒj. per se, majori dosi in Infusis.

Folia Sennæ. raro per se in pulvere, frequentius in Infusis a ʒij. ad ʒj.

Agaricus a ʒj. ad ʒij. iij. in Infusis.

Aloe.

violata. ) a ʒss. ad ʒj.

rosata. )

Extract. Aloes gummos. eadem dosis.

Jalapa. a gr. xv. ad ʒss.

Refina Jalape ) a gr. v. ad xv.

Scammonii. )

Diacyd. Luc. Jalap. a ʒij. ad ʒss.

Specif. Jalap. a ʒj. ad ʒss.

Pulv. Carnach. a ʒj. ad ʒss.

Essent. Jalap. a ʒj. ad ʒij.

Mechoacanna. a ʒj. ad ʒij.

Helleb. niger. a ʒj. ad ʒss. in Infusis.

Extract. Helleb. nigr. ʒss. ad ʒj. in Pilulis.

Colocynth. a gr. j. ad iij. stimuli loco.

Panchymag. Croll. a ʒss. ad ʒj.

Pulvis laxans Hall. a gr. xv. ad gr. xxv.

Essent. Antihypoc. Hall. gutt. 40. singulis duabus horis, usque dum purget sufficienter.

Sirup. de Cichor. cum rhabarb.

rosar. solut.

de spina cervina.

de pomis laxat.

Flor. Persic.

Violar.

ab ʒss. ad ʒiss. edulcorationis gratia.

### VI. Formule Remediorum & quidem

#### 1 Pulverum

R. Rhabarb. elect. ʒss. ʒij.

D. pro una dosi.

R. Rhabarb. elect. ʒss.

Resin. Jalap. gr. iij.

Sal Absint. gr. viij. M.

R. Tart. Vitriolat. ʒss. ʒj.

S. pulvis digestivus pro

una dosi.

R. Tart. Vitriolat. ʒss.

Res. Jalap. gr. v. M.

R. Pulv. lax. Hall. ʒj.

D. pro 1. dosi.

R. Pulv. Jalap. ʒj.

Tart. Vitriolat. ʒss. M.

R. Pulv. Jalap. gr. xv.

Res. Scammon. gr. iij.

Sal tartar. viij. M.

R. Specif. Jalap. vel

Pulv. Cornach. gr. xxv.

D. pro dosi.

R. Magnes. alb. ʒss.

div. in 4. p. eq. D. mane

& vesperi dosis.

#### 2 Bolorum.

R. Conserv. rosar. ʒj.

Spec. Jalap. gr. xv.

Res. scammon. gr. iij.

Tart. Vitriolat. gr. vj.

Sir. ros. sol. q. s.

M. F. Bolus.

R. Conf. Fl. Persic. ʒj.

Spec. Jal. gr. xxiv.

Sir. ros. sol. q. s.

M. F. Bolus: S. ut antea.

R. Conserv. ros. ʒj.

Pulv. Cornach. gr. xxiv.

Sir. Fl. Persic. q. s.

M. F. Bolus.

R. Conf. gratiol. ʒj.

Pulv. Jal. gr. xv.

Resin. scammon. gr. iij.

Cryst. Tart. gr. viij.

Sir. fl. Pers. q. s.

M. F. Bolus.

R. Conf. ros. ʒj.

Q. dulc. gr. xvij.

Res. Jal. gr. ij.

Sir. fl. Pers. q. s.

M. F. Bolus.

R. Conserv. ros. ʒj.

Pulv. Rhab. el. ʒss.

Sir. ros. sol. q. s.

M. F. Bolus.

R. Conf. fl. Persic. ʒj.

Pulv. Rhab. el. ʒss.

Res. Jal. gr. iij.

Sir. ros. sol. q. s.

M. F. Bolus.

#### 3 Electuarium.

R. Pulp. Tamarind.

Passul. ʒj.

Diac. luc. Jal. ʒvj.

Specif. jal. ʒj.

Sir. de pom. lax. ʒss.

M. F. Elect.

D. ʒij. iij.

R. Pulp. Tamarind.

Rob. junip. ʒ. ʒvj.

Diac. luc. jal. ʒss.

Tart. Vitriolat. ʒij.

Sir. d. Cich. c. Rhab. ʒss.

f. q. s.

M. F. Elect.

#### 4 Pilularum.

R. Extr. Aloes gummi ʒj.

Colocynth. gr. iij.

Sal Tart. gr. vj.

Essent. Absynth. q. s.

M. F. pilula ad pond. gr. ij.

R. Q. dulc. ʒj.

Resin. jalap. gr. iij.

Mic. Pan. alb. q. s.

M. F. Pilula N. 8.

pro una dosi.

R. Extr. Rhab. gr. xv.

Resin. scammon. gr. iv.

Tart. Vitriolat. gr. viij.

Elix. p. p. q. s. M.

F. Pilula.

R. Extr. Panchym. Croll. ʒj

Q. dulc. gr. xxiv.

Resin. scammon. gr. iv.

Essent. succin. q. s. M.

f. Pilula pro 2. dosi.

R. Flo. Sennæ s. f. ʒss.

Sal Tart. ʒss.

Aq. s. ʒvj. inf. per noct.

Colatur. adde

Sir. ros. solut. ʒss.

M. D. in calide.

R. Rad. Cichor. Oxon. ʒ. ʒij.

Summit. Cent. min. mss.

Fol. Sennæ s. f. ʒj.

Rhabarb. elect.

Fibr. Helleb. nigr. ʒ. ʒij.

Sal Tart. ʒss.

Inc. includ. facc. en sind. rubr.



## 6 Decoctorum.

- R. Dec. Antifebr. ℥iij. l. iv. R. Dec. antifebr. ℥iv.  
 In quibus dissolve. Mannæ elect. ℥j.  
 Mannæ Calabr. ℥i℥. Colat. adde  
 Colat. adde. Diac. luc. jac. ℥iss.  
 Aq. Cinam. ℥ij. M. Sir. d. pom. lax. ℥ij. M.  
 R. Tamarind. ℥iss. R. Decoct. Citr. ℥v.  
 Coq. in f. q. ∇ a. f. in quibus dissolve  
 In Colat. ℥v. solve Mannæ Calabr. ℥j.  
 Mannæ Calabr. ℥ij. M. Colat. adde  
 R. Decoct. prun. ℥v. Diac. luc. jal. ℥ij.  
 Fol. Sennæ s. f. ℥iij. Aq. Cinnam. ℥j.  
 Rhabarb. elect. ℥j. sumatur calide.  
 Sal Tartari ℥ss.  
 Infunde per noct. mane leniter bulliant, in vase clauso, Co-  
 lat. adde Mannæ Calabr. ℥j. Coletur denuo & calide su-  
 matur.

## 7 Potiuncularum.

- R. Mannæ liquid. ℥vj. R. Sir. de pom. lax. ℥ss.  
 Diac. luc. jal. ℥ij. Diac. luc. jal. ℥ij.  
 Aq. fragor. ℥ss. Aq. rub. id. ℥vj.  
 Cinnam. ℥j. M. Cinnam. ℥iss. M.  
 R. Sir. Ceras. acid. R. Sir. Ceras. acid. ℥ij.  
 Aq. acac. ā. ℥iss. Aq. rub. id. ℥vj.  
 Specif. jalap. gr. xxv. M. Diac. luc. jal. ℥iij. M.  
 R. Sir. Ceras. acid. R. Sir. herb.  
 Aq. fragor. ā. ℥ss. Aq. acac. ā. ℥ss.  
 Extr. Diac. gr. xv. M. Diac. luc. jal. ℥ij.  
 R. Resin. scam. gr. xij. Extr. Diacitr. gr. xij. M.  
 teratur Sacch. Canar. ℥iij. R. Essent. jalap.  
 affund. succ. Citri. ℥v. Sir. ros. sol. ā. ℥ij. M.

## 8 Emulsionum.

- R. Res. scam. gr. viij. R. Res. jal. gr. viij.  
 Amygd. dulc. excort. N. iij. teratur cum vit. ovi.  
 Adde aq. ros. Adde aq. frag.  
 Acac. ā. ℥ss. Acac. ā. ℥ss.  
 Colat. adde F. l. a. Emulsio.  
 Tab. M. Xsti perl. ℥j. Colat. adde  
 M. sumatur pro una vice Sacch. perlat. ℥j. M.

## 9 Spirituum Purgantium.

- R. Res. scam. gr. vj. R. Res. jal. gr. viij.  
 solv. in spiritu solve in Aq. Anisi ℥iij.  
 Ceras. nigr. ℥iij. adde adde julep. Violar. ℥j. M.  
 Julep. rosac. ℥j. M.

## VII. Regimen.

- 1 Assumpto purgante sumantur jacula calida, ex carne vel hordeo parata, minus pingua; hic enim non solum operationem adjuvant sed etiam ob vim abstergentem impediunt, quo minus purgantia inprimis resinosa, tunicis intestinorum firmiter adhærere & tormina excitare queant.
- 2 Corpus in loco calido placide moveatur, sic enim humores fluxiles & ad excretionem magis apti reduntur.
- 3 Si promptum effectum purgans non edit, bibatur decoctum passularum minorum cum Tamarindis, quod blande lubricando & stimulando purgantis operationem optime promovet.
- 4 Peracta purgatione vitetur abusus ciborum & inpr. potus frigidus, hic enim sæpius inpr. assumptis purgantibus resinosis hypercatharsin excitat.

## VIII. Modus operandi remediorum.

- 1 Quædam emolliendo & lubricando leniterque tantum stimulando agunt, uti lenitiva.
- 2 Quædam abstergendo & stimulando operationem suam edunt, uti salia digestiva & neutra, quæ in majori dosi exhibita etiam purgant.
- 3 Quædam vias stimulant propter amaritatem & acridinem salinam, v. g. Folia Sennæ, Agaricus &c.
- 4 Quædam agunt particulis Salino-Sulphureis sive Resinosis in vias easque irritant uti Jalappa, Mechoacanna, Scammonium.
- 5 Quædam acrimoniam causticam possident & hinc vis quam maxime stimulant, uti sunt Helleborus niger & albus, Colocynthis &c.
- 6 Quædam in humores agunt, easque particulis suis gummosis & resinosis insigniter funiunt & resolvunt, uti sunt potissimum Gummata, Ammoniacum, Sagapenum, &c.

- 7 Quædam & humores resolvunt & vias simul stimulant, uti sunt antea recensita fortiora stimulantia, Helleborus, Resina Jalapæ, Scammonii &c.

## IX. Regula &amp; Cautela Practica.

- 1 Distinctio Purgantium in Cholagoga, Phlegmago-ga &c. juxta Veteres, in totum rejici non debet, quoniam experientia ipsa testatur diversos humores a certis remediis magis evacuari, & certa etiam Purgantia certis affectibus magis convenire, quam alia.
- 2 Fortiora evacuantia Medicus nunquam præscribat, ubi mitioribus res peragi potest: si vero necessitas efflagitat, iis quoque utatur, quoniam fortioribus talibus remediis morbi chronici & admodum rebelles sæpius feliciter tolluntur.
- 3 Si status humorum viscidus præsens est, commode Purgantibus præmittuntur Digestiva & Incidentia, præparatis enim humoribus longe facilius postmodum procedit evacuatio.
- 4 Infantibus & Senibus, inpr. debilibus, purgantia non facile præscribantur, sed blanda laxantia ipsis substituantur.
- 5 Omnes infirmi facilius ferunt Laxationem, quam Purgationem.
- 6 Purgantia in gravidis facile abortum produciunt, quare laxantia eis magis profunt: id quod observandum quoque est in puerperis.
- 7 Purgantia in acutis raro bonum, sed utpl. noxium edunt effectum, lenientia tamen in morbi principio exhibita profunt.
- 8 Summe quoque noxia sunt Purgantia in inflammationibus internis.
- 9 Si Purgans nullam operationem edit, aliud non superingeratur, sed potius alvus clystere aperiatur.
- 10 Sin vero hypercatharsin excitat, theriacalia, aromata, cinnamomum ejusque aqua cum vino destillata &c. exhibeantur, quæ prompte admodum nimiam sistunt purgationem.
- 11 Cholericis remedia purgantia fortiora minus conveniunt, quoniam humores nimium commovent.
- 12 Purgantia per epicrasin laxantia cum solventibus mixta, optime conveniunt Phlegmaticis.

## 5. De Humoribus evacuatione per vomitum.

I. **Definitio:** Vomitum est h. l. evacuatio artificialis a Medico Naturam imitante, per peculiaria remedia eum in finem excitata, ut humores heterogenei in Ventriculo & locis proximis hærentes evacuentur.

## II. Differentia.

- 1 Alius est lenis, quando scil. vel per relaxantia tantum oleosa, mucilaginosa, pingua & nauseam excitantia vomitus produciuntur.
- 2 Alius medio modo se habet, quando nimirum assumpta vomitoria materiam non solum resolvunt, sed & ipsas fibras stimulando efficiunt, ut ventriculi contenta per superiora ejiciantur.
- 3 Alius est fortissimus, quando remedia sale accerrimo magno cum impetu fibras ventriculi aggrediuntur atque motus fortissimos excitant.

## III. Indicantia.

- 1 Humores mucosi & biliosi in Ventriculo hærentes & digestionem turbantes.
- 2 Materia viscosa tenax Ventriculi parietibus adhærens & sæpius tertianam intermittentem excitans.
- 3 Mucus copiosus in pulmonibus hærens & respirationem difficilem, aut Asthma efficiens.
- 4 Cephalalgia diuturna, obstructions partium & non pauci alii morbi chronici, qui sæpius sine præmissis vomitoriis frustra tractantur, aut interdum unico vomitorio tolluntur.

## IV. Remedia: quæ sunt.

- 1 Lenia uti sunt  
 Aqua tepida vel calida in copia assumpta.  
 Pingua & oleosa v. g.  
 Butyrum calidum aquæ calidæ immixtum.  
 Oleum Amygdalarum dulcium.
- 2 Fortia, & Fortissima sive Drastica.



*Radix Ipecacuanhæ* ā. gr. xv. ad ℥ss.  
*Folia Sambuci prima*,  
*Nicotiana*,  
*Gratiola pulverisata*,  
*Radix asari*, in pulvere ā. ℥ss. ad ℥j. in forma decocti  
 vero ab ℥ij. ad ℥iij.  
*Gummi Guttae*. a gr. vij. ad xij.  
*Tartarus emeticus*. a gr. ij. ad iv.  
*Mercurius vitæ* a gr. ij. ad iij.  
*Sal Vitrioli*. a ℥ss. ad ℥j.  
*Sirupus emeticus* a ℥ij. ad ℥ss. aut in fortioribus ad ℥vj.  
*Turpethum minerale*. a gr. ij. ad vj.  
*Aqua benedicta Rulandi ex infusione Vitri* ℥ij. aut  
*Croci Metallorum in vino facta* a ℥ij. ad ℥j.  
*Semen Cataputiae*. a gr. vj. ad ℥ss.  
*Helleborus albus*.

V. Formule Remediorum.

1 Pulveres.  
 R. Tart. emet. gr. ij. iij.  
 Sacch. albiss. gr. xij. M.  
 R. Tart. emet. gr. iij.  
 ℥ diaph. non edulc. ℥ss. M.  
 R. Ipecac. gr. xxv.  
 D. pro i. dos.  
 R. Ipecac. gr. xxiv.  
 Sal. Tart. gr. xv. M.  
 R. Specif. Jalep. gr. xxiv.  
 Tart. emet. gr. j. M.  
 R. ℥. vit. gr. ij.  
 Sacch. ℥ss. M.  
 R. Salvitrioli gr. xv.  
 Sacch. ℥ss. M.  
 R. Rad. asar. ℥j.  
 Tart. emet. gr. j.  
 Vitriolat. gr. viij. M.  
 R. Rad. asar. gr. xxvj. ad ℥ss.  
 D. pro i. dos.  
 R. Tart. emet. gr. ij.  
 Res. scammon. gr. iij.  
 Arcan. dupl. ℥ss. M.  
 2 Boli.  
 R. Conf. rosar. ℥j.  
 Tart. emet. gr. ij.  
 Sir. ros. solut. q. s.  
 M. F. Bolus.  
 R. Conf. gratiol. ℥j.  
 Ipecacuanh. gr. xxiv.  
 Sir. ros. sol. q. s.  
 M. F. Bolus.  
 R. Conf. ros. ℥j.  
 Pulv. jalap. gr. xv.  
 Res. scammon. gr. iij.  
 Tart. emet. gr. j.  
 Sir. flor. Persic. q. s.  
 M. F. Bolus.  
 R. Conf. gratiol. ℥j.  
 Rad. asar. ℥ss.  
 Sir. flor. Persic. q. s.  
 M. F. Bolus.  
 R. Conf. gratiol. ℥j.  
 Specif. jalap. gr. xxiv.  
 Tart. emet. gr. j.  
 Sir. ros. solut. q. s.  
 M. F. Bolus.  
 3 Potiunculæ.  
 R. Aq. rub. id. ℥ss.  
 Tart. emet. gr. iij.  
 Sacch. perl. ℥ss. M.  
 R. Aq. Fragar. ℥ss.  
 Cinnam. ℥j.  
 Tart. emetr. gr. ij.  
 Sir. Cort. Ont. ℥j. M.  
 R. Acq. acac. ℥ss.  
 ℥. vit. gr. ij.  
 Sir. rub. id. ℥j. M.  
 R. Diacyd. luc. Jalap.  
 Oxyfacc. emet. ā. ℥ij.  
 Aq. rub. id. ℥j. M.  
 R. Aq. Borrag.  
 Bugloss. ā. ℥ss.  
 Cinnam. ℥j.  
 Oxyfacc. emet. ℥iij.  
 R. Oxyfacc. emet.  
 Sir. Ceras. acid. ā. ℥iij.  
 Aq. acac. ℥vj.  
 Cinnam. ℥ij. M.  
 R. Sir. ros. sol. ℥ss.  
 Ipecac. gr. xv.  
 Aq. Borrag. ℥vj.  
 Cinnam. ℥ij.  
 R. Diacyd. luc. jalap. ℥iij.  
 Tart. emet. gr. j.  
 Aq. acac. ℥ss. M.

4 Pilulæ.

R. Extr. Helleb. nigr. ℥ss.  
 Tart. emet. gr. iij.  
 Eff. absint. q. s. M.  
 F. Pil. No. xij.  
 R. Extr. Aloes gummos. ℥ss.  
 ℥. vit. gr. iij.  
 Elix. P. P. q. s. M.  
 F. Pilulæ.  
 R. Extr. Helleb. nigr. gr. xv.  
 trochisc. alband. gr. ij.  
 Tart. emet. gr. j. cum  
 Eff. absinth. q. s. M. F. Pil.  
 R. Extr. Panch. Croll. gr. xv.  
 Res. jalap. gr. iij.  
 Tart. emet. gr. j.  
 Elix. P. P. q. s. M. F. Pil.

VI. Modus operandi.

Quædam emetica nauseam, tantum partim copia, par-  
 tim adverso sapore, partim oleaginitate excitant,  
 unde etiam mature a Natura cum contentis ventri-  
 culi motu fibrarum spasmodico ejiciuntur.  
 2 Alia, quæ, præterea quod nauseam excitent, simul  
 sale stimulante Ventriculi fibras aggrediuntur, par-  
 tim ad evitandam nauseam, partim ad stimulum  
 illum fibris molestum tollendum, pariter contra-  
 ctis inferioribus Ventriculi partibus, per superiora  
 expelluntur.

3 Quæ vero acri salino-corrōsiva vi pollent, & ipsam  
 Ventriculi tunicam interiorem admodum sensibilem  
 arrodere possunt & solent, a Natura per uberio-  
 rem humorum affluxum & transcolationem in Ven-  
 triculi cavitatem mature diluuntur, ac una cum  
 contentis e stomacho ad evitandas noxas per supe-  
 riora evacuantur.

VII. Regula & Cautela Practica.

- 1 Quamvis vomitoria sint optima remedia in multis  
 affectibus, sæpius tamen eorum usum dissuadent cir-  
 cumstantiæ v. g.  
 a Collum breve nimis & crassum.  
 b Corpus nimis obesum.  
 c Herniæ, ut & procidentia ani vel uteri.  
 d Graviditas, ob metum abortus.  
 e Mala pectoris dispositio & inde dependens spiran-  
 di difficultas.  
 f Dispositio ad Hæmoptysin & Phthisin.  
 g Oculorum affectus inpr. inflammatorii.  
 h Idiosyncrasia, five naturalis horror a vomitoriis.  
 i Passio Hypochondriaco-Hysterica inveterata.  
 k Scirrhi viscerum inveterati.  
 l Calculus renum.  
 m Dispositio ad Lipothymias & convulsiones.  
 n Nimia sensibilitas.  
 o Memoriæ & capitis debilitas.
- 2 Sunt qui vomitoriorum usum in Epilepsia dissua-  
 dent & majora mala exinde metuunt, sed tantum  
 abest, ut quædam noceant, ut potius, si legitimo  
 modo exhibentur, summe proficua sint: imo vidi-  
 mus Epilepsiam duobus pulveribus, præter alias vir-  
 tutes vim emeticam possidentibus in studioso vigin-  
 ti duorum annorum sublatam fuisse.
- 3 Nec etiam vertigo, licet sit caduca, vomitoriorum u-  
 sum semper prohibet, eodem enim modo laudato pulve-  
 re vertiginem caducam chronicam curatam vidimus.
- 4 In Apoplexia & Hemiplexia sæpius admodum profici-  
 cua sunt emetica, quemadmodum idem pulvis No-  
 bili virgini Hemiplecticæ datus, aphoniam brevi su-  
 stulit, & motum manus atque pedis sinistri, ita ut  
 ei insistere queat, aliquo modo restituit.
- 5 In exhibitione vomitoriorum semper respiciendum  
 est ad securiora, nec facile drastica sunt exhibenda.
- 6 Vomitoria Mercurialia & Vitriolica legitime corre-  
 cta & præparata, in affectibus chronicis cæteris fa-  
 cile palmam præripiunt.
- 7 Radix ipecacuanhæ est tutissimum vomitorium ac  
 cito operatur, inpr. si sal quoddam alcali ipsi admi-  
 scetur.
- 8 Nitrum huic radici additum, in Dysenteria vim ejus  
 emeticam insigniter obtundere, ab amico mihi re-  
 latum est.
- 9 Asari radix a quibusdam tanquam specificum vo-  
 mitoriorum laudatur in Quartana.
- 10 Vomitoria fumantur tempore matutino aut Ven-  
 triculo vacuo, ac superbibantur ad præcavendas car-  
 dialgicas anxietates & promovendam operationem  
 jussula calida, corpusque leniter moveatur.

6. De Evacuatione Humorum per Diuresin.

I. Definitio. **D**iuresis est evacuatio artificialis, in-  
 stituta a Medico per remedia conve-  
 nientia, partim, ut humores serosi superflui alii-  
 que recrementitii a sanguine separentur, & per vias  
 urinarias expellantur, partim, ut impedimenta,  
 urinæ excretioni obicem ponentia, removeantur.

II. Differentia.

- 1 Alia est proprie & stricte sic dicta, quando per re-  
 media positive diuretica & stimulantia ac resolven-  
 tia diuresis instituitur.
- 2 Alia improprie ita vocatur, quando scil. vel per  
 copiosorem potum serum deficiens restituitur, vel  
 impedimenra, urinæ excretionem retardantia mu-  
 cus v. g. sabulum, calculus &c. removeantur.

III. Indicantia.

- 1 Cachexia, Leucophlegmatia, Hydrops & omnes se-  
 re alii morbi, a vitiosa feri abundantia, consisten-  
 tia & motu pendentes.



- 2 Icterus: in quo casu inpr. remedia Tartarea, Sal. Tart. Ol. Tart. per deliq. Liq. Ter. fol. Sulph. Tinct. St. Lud. &c. conveniunt.
- 3 Malum Hypochondriacum, quatenus remedia diuretica sanguinem spissorem resolvunt, & ad motum aptiorem reddunt.
- 4 Sabulum renum & vesicę, urinę excretionem turbans.
- 5 Exulcerationes viarum urinariorum, partim a calculo, partim vero a Lue venerea ortę.
- 6 Stranguria, Dysuria & Ischuria.
- 7 Febres, inpr. ubi solutio morbi per Diuresin speranda est.

## IV. Remedia: &amp; quidem

Radix Onomid.

Petrosel.

Apii

Vincetox.

Raphan.

Urtic.

Pimp. alb.

Saxifrag.

Herb. Veron.

Hed. Terrest.

Virg. Or.

Petrosel.

Capill. ♀.

Charesfol.

Nasturt.

Bellid.

Cochi.

Flor. Bellid.

Violar.

Linar.

Genist.

Hyperic.

Sem. Hyperic.

Violar.

Milii ☉.

Bacc. Junip.

Alkek.

Amygd. amar.

Nuch. Persic.

Fruct. cynosb.

Terebinthina.

Succinum.

Balsamus Ind. uterq;

G. Ammoniac.

Bdellium.

Galbanum.

Conch. citrat.

Lap. ☉.

## V. Formula Remediorum.

## 1 Pulveres.

Rx. Lap. ☉.

Cryst. Tartari. ā. ʒij. M.

pro 3. vel 4. dof.

Rx. Tart. Vitriolat.

Sal. absint.

Arcan. dupl. ā. ʒij. M.

pro 2. vel 3. dof.

Rx. Nitr. ʒiat.

Sal. Tart.

Oc. ☉ ā. ʒij. M.

pro 6. dof.

Rx. Arcan. dupl.

Asell. preparat.

Sal Genist. ā. ʒij. M.

Pro 2 vel 3. dof.

Rx. Lap. Percar.

Millep. preparat.

Sal Onon. ā. ʒij. M.

pro 3. vel 4. dof.

## 2 Potiunculę.

Rx. Aq. Petrosel. ʒiv.

Lap. ☉.

Tart. Vitriolat.

Sal. Absint. ā. ʒij.

Sir. Hed. Terrest. ʒij. M.

Percar.

Test. ovar.

Millep. preparat.

Lumbr. Terrestr.

Sal. Onon.

Genist.

Tartari.

Stipit. fabar.

Polychrest.

Nitr. depur.

fixum.

regenerat.

ʒiatum.

Arcan. dupl.

Cryst. Tart.

Tart. Vitriolat.

Tartarizat.

ʒialis.

Extr. Veron.

Alkek.

Hed. Terrest.

Rob. junip.

Aq. fragor.

Petrosel.

Charesfol.

Tinct. Tart. acris.

ʒ acris.

Resolv.

Ess. Succin.

Liq. Ter. sol. Tart.

Tart. Tartarizat.

Ol. Tart. per deliq.

Spir. Sal. f. &amp; d.

Nitr. f. &amp; d.

Tart.

Junip.

Malvat. Junip. &amp;c.

Rx. Conch. citrat.

Sal absint. ā. ʒij. M.

pro 2. vel 3. dof.

Rx. Test. ovar.

Lap. percar.

Cryst. Tartari. ā. ʒij. M.

pro 3. vel 4. dof.

Rx. Tart. Tartarizat.

Lap. ☉.

Sal Absint. ā. ʒij.

pro 3. dof.

Rx. Sal Polychr.

Genist. ā. ʒij.

Volat. Tart. ʒij. M.

pro 2. dof.

Rx. Lap. ☉.

Millep. preparat.

Sal Onon. ā. ʒij.

Tart ʒial. gr. xij. M.

pro 3. dof.

Rx. Aq. Charesfol.

Petrosel. ana ʒij.

Lap. Percar.

Nitr. ʒiat.

Sal Polych. an. ʒij.

Rx. Aq. Alkekeng. ʒiv.

Liq. Ter. fol. Tart. ʒij.

Sir. fragor. ʒij. M.

Rx. Aq. Charesfol.

Fragor. ā. ʒij.

Tinct. Tart. ʒij.

Spir. Nitr. dulc. ʒij.

Sir. fragor. ʒij. M.

Rx. Aq. Saxifrag.

Petrosel. ā. ʒij.

Sal absint.

Arcan. dupl. ā. ʒij.

Sacch. perlat. ʒij. M.

Rx. Aq. Fragor.

Saxifrag. ā. ʒij.

Tinct. resolv. ʒij.

Sir. fragor. ʒij. M.

## 3 Boli &amp; Electuaria.

Rx. Rob. Junip. ʒij.

Lap. percar.

Tart. Vitriolat. ana. gr. x.

Sir. frag. q. f.

M. F. Bolus.

Rx. Conch. citrat.

Lap. ☉. ana. gr. xv.

Tereb. q. f.

M. F. Bolus.

Rx. Rob. Junip. ʒij.

Lap. ☉. preparat.

Sal Absint. ana. ʒij.

Millep. preparat. ʒij.

Sir. Hed. Terrest. q. f.

M. F. Elect.

Rx. Conf. rosar. ʒij.

Sem. Milij. ☉.

Hyper. ana. ʒij.

Sir. Violar. q. f.

M. F. Elect.

## 4 Emulsiones.

Rx. Amygd. d. ʒij.

Sem. Violar. ʒij.

Aq. petrosel. q. f.

F. l. a. Emulsio.

Colat. ʒij. adde

Spir. fragor. ʒij.

Lap. ☉. ʒij. M.

Rx. Sem. cartham.

Violar. ana. ʒij.

Aq. fragor. q. f.

F. l. a. Emulsio.

Colat. ʒij.

Sp. fragor. ʒij.

Lap. percar. ʒij.

Sacch. perlat. ʒij. M.

## 5 Infusa.

Rx. Rad. Onon.

Urtic. ana. ʒij.

Herb. Petrosel.

Charesfol. ana. mss.

Flor. Violar.

Hyper.

Bellid. ana. p. ij.

Cort. Cappar.

Tart. solut. ana. ʒij.

Inc. infund. in vini al-

bi ʒij. &amp; D. bis vel

ter per diem ʒiv. vel vj.

## VI. Modus operandi.

1 Quędam agunt resolvendo humores, uti potissimum sunt salia digestiva &amp; neutra, Gummata &amp;c.

2 Quędam serum deficiens restituunt, &amp; sic diuresin promovent: quod præ ceteris præstant potulenta in copia assumpta.

3 Alia utroque modo agunt, dum &amp; serum restituunt &amp; simul resolvunt, qualia sunt Herbę antiscorbuticę,

Tab. M. Xst. f. ʒij. M.

Rx. Aq. fl. acac.

Saxifrag. ana. ʒij.

Conch. citrat.

Tart. Vitriolat. ana. ʒij.

Sal volat. Tart. ʒij.

Sir. fragor. ʒij. M.

Rx. Aq. fragor. ʒiv.

Malvat. Junip. ʒij.

Extr. Hed. Terrest.

Alkek. ana. ʒij.

Tinct. Tart. ʒij.

Sacch. perlat. ʒij.

Rx. Aq. Charesfol. ʒiv.

Malvat. Junip. ʒij.

Tinct. resolv. ʒij.

Sir. Hed. Terrest. ʒij. M.

## 3 Boli &amp; Electuaria.

Rx. Extr. Veron. spiss. ʒij.

Lap. ☉. ʒij.

Millep. preparat. ʒij.

Sir. Hed. Terrest. q. f.

M. F. Bolus.

Rx. Extr. Alkek.

Lap. ☉. ana. ʒij.

Sir. Violar. q. f.

M. F. Bolus.

Rx. Rob. Junip. ʒij.

Extr. Alkek.

Veron. ana. ʒij.

Tereb. Venet. ʒij.

Sir. Violar. q. f.

M. F. Elect. molle.

Rx. Conserv. rosar.

Rob. Junip. ana. ʒij.

Extr. Veron.

Sem. Violar. ana. ʒij.

Sir. Hed. terrest. q. f.

M. F. Elect.

Rx. Sem. Violar. ʒij.

Aq. Violar. q. f.

F. l. a. Emulsio.

Colat. ʒiv. adde

Lap. ☉. ʒij.

Sacch. Canar. ʒij. M.

Rx. Sem. Violar. ʒij.

Milii ☉. ʒij.

Aq. fragor.

Saxifrag. ana. q. f.

F. l. a. Emulsio,

Colat. ʒv adde

Lap. ☉.

Percar. ana. ʒij.

Sacch. perlat. ʒij. M.

## 5 Infusa.

Rx. Rad. Apii.

Onon.

Vincetox. ana. ʒij.

Herb. Capill. ♀.

Virg. Or. ana. mj.

Flor. Genist.

Violar. ana. p. ij.

Cort. Tamarisc. ʒij.

Bacc. alkek. No. viij.

Ciner. Genist. ʒij.

Inf. in Vin. alb. fervent.

ʒij. sumantur quotidie

bis vel ter ʒiv. cum Succ.

raphan. rec. ʒij. vel iij.







C. C. citr. ana. ℥ij.  
 Diascord. ℥iss.  
 Ther. cæl. gr. iij.  
 Sir. contraj. ℥iss. M.  
 R. Aq. flor. Samb.  
 acac. ana. ℥ij.  
 theriac. ℥iss.  
 Ther. Androm. ℥j.  
 Sir. C. B. ℥iss. M.  
 R. Aq. scord. ℥iv.  
 Succ. Citr. rec. ℥iss.  
 Tinct. bezoard. ℥ij.  
 Sir. acetos. citr. ℥iss. M.

Sir. Card. bened. ℥iss.  
 R. Aq. scord. ℥iv.  
 Tinct. bez. ℥iss.  
 Sir. contraj. ℥iss. M.  
 R. Aq. scord. ℥iv.  
 ♂ diaph.  
 Matr. perl. præp. ā. ℥ij.  
 Ther. cæl. gr. iij.  
 Sacch. perl. ℥ij. M.  
 R. Aq. flor. acac. ℥iv.  
 Acet. bez. ℥iss.  
 Ther. Androm. ℥iss.  
 Sir. ceras. acid. ℥iss. M.

## 3 Emulsiones.

R. Amygd. dulc. ℥iss. M. R. Sem. citr. ℥iss.  
 Aq. Card. bened.  
 Galeg. ana. q. s.  
 F. l. a. Emulsio.  
 Colat. ℥vj. adde  
 Matr. perl. præp.  
 Bez. min. ana. ℥iss.  
 Sacch. perl. ℥ij. M.  
 R. Sem. Aquileg.  
 Card. Mar. ā. ℥ij.  
 Aq. Scorz. q. s.  
 F. l. a. Emulsio.  
 Colat. ℥vj. vel viij. adde  
 Lap. ♂. præp.  
 ♂ diaph.  
 Dent. apr. præp. an. ℥iss.  
 Sacch. perl. q. s. M.

R. Sem. citr. ℥iss.  
 Aq. fl. acac.  
 Scord. ā. q. s.  
 F. l. a. Emulsio.  
 Colat. ℥vj. adde  
 ♂ diaph.  
 Mandib. luc. pisc. ā. ℥iss.  
 Sacch. canar. q. s. M.  
 R. Sem. Citr. ℥iss.  
 Aquileg. ℥ij.  
 Aq. rub. id.  
 Flor. acac. q. s.  
 F. l. a. Emulsio.  
 Colat. ℥vj. adde  
 Ebor. ast.  
 Bez. min. ā. ℥iss.  
 Tab. M. Xst. f. q. s. M.

## 4 Boli &amp; Electuaria.

R. Conf. fumar. ℥ij.  
 ♂ diaph. ℥j.  
 Salvol. C. C. gr. ij.  
 Sir. C. B. q. s.  
 M. F. Bolus.  
 R. Conf. fumar.  
 Rob. Junip. ā. ℥iss.  
 Diascord. Frac. ℥ij.  
 Pulv. viper.  
 C. C. Phil. ā. ℥j.  
 Sir. C. B. q. s.  
 M. F. Elect.

R. Diascord. Frac. ℥iss.  
 Unic. foss.  
 Bez. min. ā. ℥iss.  
 Sir. acet. citr. q. s.  
 M. F. Bolus.  
 R. Conf. pulp. citr. ℥j.  
 Ther. Androm. ℥iss.  
 ♂ diaph.  
 Pulv. viper.  
 Unic. foss. ā. ℥ij.  
 Sir. acet. citr. q. s.  
 M. F. Elect.

## 5 Essentia &amp; Mixtura.

R. Tinct. Bez. ℥ij.  
 D. ad vitr.  
 R. Ess. Lign.  
 Tinct. ♂ ij ā. ℥iss. M.  
 R. Ess. Alexiph. ℥ij.  
 Spi. Tart. ℥j.  
 Vitrioli gutt. v. M.

R. Mixt. simpl. ℥ij.  
 D. ad vitr.  
 R. Ess. Alexiph.  
 Tinct. resol. ā. ℥ij. M.  
 R. Ess. Alexiph.  
 Succin.  
 Tinct. ♂ ij ā. ℥ij. M.

## 6 Pilulæ.

R. Extr. Card. bened. ℥iss.  
 Ther. cæl. gr. iij.  
 Ess. Alexiph. q. s.  
 M. F. Pil. N. xij.

R. Extr. torment. ℥j.  
 Ther. cæl. gr. v.  
 M. F. Pil. N. xxv.  
 D. singulis 5. vel 6. horis.

R. Ther. cæl. g. viij.  
 F. Pil. N. viij.  
 D. vesperi 4. pro dosi.

R. Extr. Torment. ℥j.  
 Ther. cæl. gr. iij.  
 L. O. gr. ij.

7 Decocta.  
 R. Ras. L. Sassaf. ℥ij.  
 Sanct.

R. Ras. L. Sassaf. ℥ij.  
 Sanct.

Rad. lap. acut.  
 Liquir. a. ℥j.  
 Passid. min. ℥vj.  
 Caric. ping. N. iv.  
 Incis. Coq. in Aq. s. ℥. vj. ad  
 remanent. ℥. iv.

Rad. Sarsap.  
 Chin.  
 Liquirit. a. ℥vj.  
 Caric. ping.  
 Dactyl. a. N. vj.  
 Coq. ut antea.

## VI. Modus operandi.

- 1 Quædam agunt diluendo Massam sanguineam, uti potus calidus: eo promptius vero potulenta suam exerunt efficaciam, si in iis Herbæ, Radices, Ligna &c. coquantur, sic enim eo magis resolvunt.
- 2 Quædam incidunt & resolvunt humores, uti potissimum sunt, quæ partes salinas & resinosas in se continent, uti sunt multæ supra laudatarum radicum & lignorum.

- 3 Quædam potenter in fibras & etiam in sanguinem agunt, atq; hinc insignem in humoribus commotionem producendo efficiunt, ut sanguis insigniter fluxilis reddatur, ac hoc modo excretio per sudorem promoveatur.
- 4 Alia nimium humorum motum excretionem impediunt refrænant, uti sunt terrea Lap. ♂. Mat. Perl. ♂. diaph. Nitrosa, Salia neutra, Succu aciduli, Sp. acidi minerales &c. reliquis remediis admixti.
- 5 Alia motus nimios placide deinulcendo & Naturam placando excretionem sudoris promovent, uti sunt Opiata legitimo modo correctæ, Theriaca Androm. Cælest. Pil. Wildegansii, Laudanum Opiatum & insigne illud anodynum Essentia dulcis Hallensium.
- 6 Alia agunt relaxando habitum corporis & poro aperiendo, uti calor lecti, calor ambiens humidus &c.

## VII. Tempus exhibendi remedia.

- 1 Commôdissimum & Naturæ maxime conveniens sudoris tempus est matutinum, ab hora scil. tertia ad nonam usque, quoniam etiam Natura hoc ipso tempore in statu sano sudoris excretionem molitur.
- 2 In Febribus proprium exhibendi tempus est, declinatio Paroxyfmi, ubi Natura ordinarie quoque excretionem sudoris instituit.
- 3 In acutis autem malignis, quæ paucam, summe tamen mobilem materiam pro causa agnoscunt, v. g. in Peste, sudor etiam in principio & continuatus prodest.

## VIII. Regula &amp; Cautela Practica.

- 1 Si humorum lentor adest, sudorifera minime conveniunt, nisi antea humores resolvantur.
- 2 In corporibus siccioribus & etiam in iis morbis, ubi serum deficit, magis nocent, quam profunt Diaphoretica.
- 3 Nec etiam in Hydrope conveniunt, nisi Natura ipsa spontaneos sudores, quod tamen rarius contingit, excitaverit.
- 4 Si vires jam sunt fractæ, sudorifera minime exhibenda sunt.
- 5 Qui ad sudores minus proni sunt, ad eos per remedia fortiora non cogantur.
- 6 Volatilia aliaque fortiora diaphoretica Plethoricis & Cholericis in morbis acutis exhibita, venena potius, quam remedia sunt.
- 7 Terrea remedia in acutis nimium usurpata, facile post se trahunt tumores pedum.
- 8 Regimen nimis calidum in omnibus affectibus exanthematicis morbos semper peiores reddit.
- 9 Tranquilla in lecto continentia in talibus morbis plus præstat, quam regimen calidum.
- 10 Potus calidus sufficiens in hisce affectibus egregie lenem promovel transpirationem.
- 11 In talibus morbis Confortantia & lenia acida commode remediis junguntur diaphoreticis, ut hoc modo vires conserventur, & nimia humorum resolutio impediatur.
- 12 Si multæ in primis viis sunt cruditates, diaphoretica cum damno exhibentur.
- 13 Si morbi ab ira fortiori nati sunt, sudorifera plus nocent, quam profunt, quoniam bilis per ea magis exagitur & profundius in Massam Saaguineam conjicitur.
- 14 Nec etiam facile sudorifera exhibeantur post terrorem graviolem, sed potius leni corporis & continuato motu fluxilitas humorum restituatur.
- 15 Stuphæ sudatoriae sive Balnea Laconica in morbis chronicis, a lymphæ & feri vitiis ortis, insignem habent usum & præcipue in Lue Venerea, si humores prius ad excretionem dispositi sunt.
- 16 Balnea tam artificialia, quam naturalia maxime promovent transpirationem.
- 17 Siccioribus tamen minime conveniunt, quoniam transpirationem nimium excitando corpus magis exsiccant.
- 18 Humidioribus, multum humorum in poris habentibus, maxime profunt, quatenus humores colliquant & eorum excretionem promovent.
- 19 Qui dispositionem ad Hecticam habentibus thermas & acidulas suadent, tortorum potius quam verorum Medicorum titulum merentur, quatenus per talia humores ad colliquationem proni magis resolvuntur.
- 20 Thermæ, inpr. Vitriolicæ, materiam morificam in morbis arthriticis magis figunt, ac morbos tales magis rebelles reddunt.
- 21 Minus quoque conveniunt corporibus impuris, visce-



scerum debilitate & obstructione laborantibus, quatenus ægrotos facile hydropicos reddunt.

- 22 Nisi corpus per legitima remedia sufficienter præparatur, thermæ nullum salutarem edunt effectum.
- 23 Sub usu Thermarum alvus semper aperta servanda est per lenia laxantia, quod omnium optime fit per Sal catharticum amarum aliaque neutra.
- 24 Thermæ semper magis prosunt tempore matutino, quoniam Natura tunc temporis excretionem sudoris molitur.
- 25 Dum e Thermis egrediuntur ægrotantes aerem vitent frigidum, & potius lecto se committant, ut illud quod adhuc per transpirationem evacuari debet, transpirare possit.

#### 8. De Evacuatione Humorum per Salivationem Universalem.

I. *Definitio.* **S**alivatio est evacuatio artificialis per remedia, inpr. Mercurialia, instituta, ut humores superflui & corrupti per ductus salivales expellantur.

#### II. *Differentia.*

- 1 Alia est universalis, quando per remedia appropriata tam interna quam externa universa Massa Sanguinea a partibus impuris & corruptis liberatur.
- 2 Alia est particularis, quando per remedia in ore dentata vel masticata copiosa saliva partim ex ore, partim ex partibus vicinis evacuatur.
- 3 Alia excitatur per remedia interna, alia vero per externa, Unguenta scil. Suffimigia &c.
- 4 Alia respectu gradus est levior, alia est fortior.

#### III. *Indicantia.*

- 1 *Lues Venerea* & præcipue inveterata, quæ utpl. aliorum ordinariorum remediorum vim eludit.
- 2 Alii morbi inveterati & chronici, *Quartana*, *Amavrosia*, *Struma*, *Cancer*, *Mania*, *Melancholia*, *Vertigo*, *Epilepsia*, *Paralysis*, *Podagra*, *Cephalalgia diuturna*, *Leprosia*, *Elephantiasis*, *ulcera antiqua* &c.

#### IV. *Remedia.*

##### 1. *Externa.*

℞ *Viv. in Unguentum redactus.*  
*Merc. vel Cinnab. in Suffimigiis.*  
*Soleæ ex amalgamate Mercurii paratæ & plantis pedum suppositæ.*  
*Pediluvia ex ℞ io dulci aut sublimato parata.*  
*Emplastra ℞ ialia, v. g. Expl. de Ran. Vig. c. triplo vel quadruplo ℞ iii.*  
*Cingulum Sapientie sive ℞ iale.*

##### 2. *Interna.*

℞ *vivus in Pilulis ad ℞s quotidie exhibitus.*  
 ℞ *dulcis a gr. XV. ad ℞j.*  
*Panacea ℞ ialis a gr. XII. ad ℞ss.*  
*Turpethum minerale a gr. ij. ad gr. vj.*  
*Arcanum Corallinum a gr. ij. ad gr. vj.*

#### V. *Formule Remediorum.*

##### 1. *Boli.*

℞. <i>Conf. Ros. ℞ss.</i>	℞. <i>Conf. fumar. ℞ss.</i>
℞ <i>dulc. gr. XV.</i>	<i>Panac. ℞ ial. gr. XII.</i>
<i>Sir. rosar. sol. q. s.</i>	<i>Sir. fl. persic. q. s.</i>
<i>M. F. Bolus.</i>	<i>M. F. Bolus.</i>
℞. <i>Conf. gratiol. ℞j.</i>	℞. <i>Conf. fl. persic. ℞j.</i>
<i>Turp. miner. gr. iij.</i>	<i>Arcan. corall. gr. iij.</i>
<i>Sir. fl. persic. q. s.</i>	<i>Sir. ros. solut. q. s.</i>
<i>M. F. Bolus.</i>	<i>M. F. Bolus.</i>

##### 2. *Pilulæ.*

℞. ℞ <i>dulc. gr. XV.</i>	℞. <i>Panac. ℞ ial. gr. XII.</i>
<i>Muc. pan. alb. q. s.</i>	<i>Muc. Pan. alb. q. s.</i>
<i>M. F. Pil.</i>	<i>M. F. Pil.</i>
℞. ℞ <i>viv. ℞ss.</i>	℞. <i>Panac. ℞ ial. gr. XII.</i>
<i>Suc. liquirit. q. s.</i>	<i>cum Mucilag. Tragac.</i>
<i>M. F. Pil.</i>	<i>F. Pil.</i>

##### 3. *Unguenta.*

℞. <i>Pingu. porcin. ℞ss.</i>	℞. ℞ <i>viv. c. Salivæ extinct. ℞ss.</i>
℞ <i>viv. ℞ij. M.</i>	<i>Tereb. Venet.</i>
<i>F. Unguentum.</i>	<i>Ungu. de pom. q. s.</i>
<i>M. F. Unguentum.</i>	<i>M. F. Unguentum.</i>

#### VI. *Modus operandi.*

Quamvis modus quo operationem suam edit Mercurius admodum sit obscurus & variæ hinc atque diversæ Authorum occurrant sententiæ, probabile tamen videtur, eum ob globulos minutissimos in quos motu aut effusus dirimitur, & ob quos ad motum

admodum idoneus est, penetrare non solum humores & minutissimos poros & hoc ipso dividere ac dirimere viscidos humores eosque ad excretionem aptos reddere. Cur aut potissimum per os evacuationem excitet, firmis hætenus nondum demonstratum fuit argumentis.

#### VII. *Regule & Cautelæ Practicæ.*

- 1 Salivatio nostris temporibus est quidem remedium satis commune, sed nihilominus infidum est auxilium & non raro insignia & admodum periculosa post se trahit incommoda: quare in ejus administratione magnis opus est cautelis.
- 2 Minoris tamen periculi sunt incommoda illa quæ inunctionem Mercurialem, quam quæ internorum remediorum usum sequuntur.
- 3 Cura Lues Venereæ per Suffimigationem cum cinnab. vel ℞ dulci, quamvis caput etiam optime obvolutum sit & munitum, nihilominus gravissima excitat Symptomata, quare etiam a modernis prorsus rejicitur.
- 4 Pariter summe noxius est fumus Mercurialis ore per infundibulum salivationis gratia exceptus, quatenus caput & Pulmones admodum lædit.
- 5 Securiot est salivationem excitandi modus, si emplastra ℞ ialia locis illis, quæ alias Unguento ℞ ialii inungi solent, imponuntur, sic enim Mercurius facile per poros in corpus penetrat.
- 6 Eundem usum præstare solent soleæ superius allegatæ, inpr. si pedes lateri calido imponuntur, sic enim Mercurius ope caloris excitatus facile per poros plantæ pedis corpus ingreditur.
- 7 Pediluvia ℞ ialia si ℞ dulcis Aquæ ferventi injicitur, potest aliquem habere usum: sin vero ℞ sublimatus huic substituitur, partes facile arroduntur: quare horum usus consultius omittitur, præsertim cum talis modus sit minime consuetus.
- 8 Cingulum ℞ le interdum cum fructu usurpatum fuit in malo mitiori, sed cum sæpius insignia tormina excitaverit, merito ei præfertur inunctio locorum convenientium.
- 9 Non tamen facile instituatur Salivatio in iis, qui jam emaciati ac viribus fracti sunt.
- 10 In siccioribus temperamentis vel nulla Salivatio inunctionem sequitur, vel corpus magis exsiccatur, quare corpus prius probe humectandum est.
- 11 Si viscera interna sunt corrupta, Salivatio non solum nullam habet utilitatem, sed & mortem accelerat.
- 12 Pueri, Senes & Gravidæ non facile ferunt Salivationem, imo gravia interdum eam sequuntur incommoda.
- 13 Antequam corpus Unguento ℞ ialii inungatur, prius Purgantia exhibeantur, Vena aperiatur, ac corpus Balneis aquæ dulcis immittatur, ut hoc modo humores ad faciliorem Salivationem disponantur.
- 14 Facta præparatione inungantur primo plantæ pedum, tarsus ac postmodum flexura genuum, sequentibus vero diebus juncturæ manuum & cubiti, donec salivationis signa appareant.
- 15 Nunquam autem sumatur nimia unguenti dosis, sed talis tantum quæ ultra ℞ ii ℞ij aut ℞ss ad summum, & quidem in robustioribus, haud continet.
- 16 Nucha atque dorsum ob gravia metuenda symptomata non inungatur, quamvis sint, qui hancce inunctionem commendant.
- 17 Facta inunctione æger committatur lecto in conclavi calido, & ab aere frigido probe arceatur, alias enim gravia sequuntur symptomata.
- 18 Si glandulæ oris, gingivæ ac lingua intumescunt, ab ulteriori frictione abstinendum est, hæc enim Salivationem imminere indicant.
- 19 Interdum in subjectis succulentis & alias ad salivationem pronis post primam statim inunctionem salivatio sequitur.
- 20 Ultra quintam vel sextam inunctionem facile non est progrediendum, nisi subjecta admodum robusta fuerint.
- 21 Si Salivatio nimis tarde aut prorsus non post peractas frictiones succedit, exhibendum est vomitorium ℞ iale, quod optime eam promovet.
- 22 Quod si vero nec post horum usum Salivatio succedat, satius est ab ulterioribus frictionibus & remediis abstinere, ne usum continuatum gravia sequantur damna.
- 23 Ori & faucibus inflammatis prospiciendum est per



Gargarismata lenientia & detergentia ex lacte tepido, decocto hordei cum Radice liquiritiæ, althææ & melle rosaceo.

- 24 Hisce subjungantur adstringentia Gargarismata ex rosæ v. g. rubris, salvia, hordeo &c. parata.
- 25 Adstringentia talia Gargarismata in principio adhibita symptomata oris & faucium exasperant.
- 26 Si nimium fuit Saliva, statim exhibeatur purgans cum aliquo stimulo, hæc enim optime nimiam Salivationem imminuunt.
- 27 Fortiora tamen Purgantia vitentur, ne Salivatio prorsus cum insigni periculo sistatur.
- 28 Non raro Salivatio degenerat in alvi fluxum, qui clysteribus ex lacte & vitellis ovorum paratis, aut Theriaca, Diascordio aliisque opiatissimis sisti potest.
- 29 Diætâ durantē Salivatione sit tenuis, & ægrotis præter juscula hordæacea, aut carniū cum paucō pane, nihil exhibeatur.
- 30 Loco potus conveniunt decocta Lignorum secundaria, quæ scilicet ex residuo prioris decocti parantur.
- 31 Toto Salivationis tempore ægri vitent aerem frigidum, quia Salivationem maxime impedit & gravia mala excitat.
- 32 Si spatio quindecim dierum vel trium septimanarum Salivatio pro circumstantiarum ratione duravit, tandem sensim sensimque imminuitur & sponte cessat.
- 33 Si ante ordinarium tempus cessat, vel exhibeatur Mercurius dulcis aut Panacæa ꝑ̄ialis, vel corpus adhuc aliquoties unguento ꝑ̄iali fricetur.
- 34 Quod si vero ultra terminum ordinarium extendatur Salivatio, exhibeantur aliquoties Purgantia, ut hoc modo materia quæ sursum fertur, ad inferiora revellatur & evacuetur.
- 35 Cum sæpius post Salivationem adhuc ꝑ̄ii aliquid in corpore remaneat, & hinc omnis generis symptomata metuenda sint, ejus excretio promovenda est, quod partim præstant Laxantia repetita ac Diaphoretica, partim vero monetæ aureæ linguæ impositæ: sed hisce facile palmam præripiunt Pulveres Solares D. Richteri, & inpr. Tinctura resolvens, quæ quod reliquum est in corpore ꝑ̄ii interdum per Salivationem ejicit, quo facto Salivatio statim cessat: sæpius vero ꝑ̄ium summe resolutum aut per urinam, aut per sudorem expellit.
- 36 Expulso hoc modo ꝑ̄io ægroti adhuc per aliquod tempus vitent aerem frigidum, & abstineant a nimis cibis, nimio potu, Venere &c.
- 37 Mercurius dulcis & Panacæa ꝑ̄ialis excitant quidem Salivationem, sed longe tardius operantur, quam Unguentum ꝑ̄iale.
- 38 Si per ꝑ̄ium dulcem Salivationem instituere animus est, exhibeantur prima vice gr. XV. secunda ꝑ̄j. tertia ꝑ̄ss. & sic semper usque ad ꝑ̄j. donec Salivationis signa appareant.
- 39 Panacæa Mercurialis, quæ nil nisi Mercur. dulcis decies vel duodecies sublimatus est, eodem modo, sed minori dosi, exhibetur, prima scilicet die gr. XII. secunda XV. tertia ꝑ̄j. quarta gr. XXV. quinta ꝑ̄ss. idque mane & vespere, donec superius recensita Salivationis signa in conspectum veniant.
- 40 Quo fluxus hicce eo melius succedat, singulis binis vel ternis diebus Panacææ gr. XII. vel XV. ægro exhibeantur.
- 41 Et ut omne virus cum Saliva expellatur, per integrum mensem fluxus hicce conservetur.
- 42 Si per Arcanum Corallinum aut Turpethum minerale Salivatio institui debet, dentur prima vice gr. ij. postea vero IV. donec in universum grana XV. sumpta fuerint.
- 43 Multa quidem de Arcani Corallini mira virtute proferuntur, sed vulgare laudes illas mirificas minime meretur.
- 44 Qui Luem Veneream legitime correctis ꝑ̄ialibus & Tincturis alcalinis summe penetrantibus, qualis est Tinctura resolvens nobis familiaris sine Salivatione curare novit, is omnibus modo dictis cautelis facile carere poterit. Plura Vid. in Prax. Tom. II. de Lue Venerea.

## 9. De Salivatione particulari.

**I. Definitio:** Salivatio particularis est evacuatio artificialis, a Medico per remedia Apophlegmatizantia & Masticatoria eum in finem instituta, partim ut Saliva e ductibus & glandulis salivalibus, partim vero alii humores e confiniis oris sive partium adjacentium evacuentur.

### II. Differentia.

- 1 Alia fit per remedia sicca, alia vero per humida.
- 2 Alia excitatur a remediis acris, alia ab insipidis.

### III. Indicantia.

- 1 Saliva viscida ad excretionem minus apta, quam resolvunt & glandulas stimulant Salivantia acris.
- 2 Quidam affectus oculorum, qui interdum Apophlegmatizantium usum postulant.

### IV. Remedia.

Radix Pyrethri.	Bacc. Laur.
Diptamni.	Cubeb.
Helleb.	Cardamom.
Ireos.	Zingib.
Calam. arom.	Piper.
Herb. Nicot.	Cinnamom.
Puleg.	Mastiche.
Major.	Mel. rosat.
Piperit.	anthosat.
Nasturt.	Oxymel.
Sem. Sinap.	Theriaca.
Nigell.	Mithridat.
Eruc.	Essentiæ aromaticæ.

### V. Formula Remediorum.

#### 1 Radices.

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Rx. Rad. Pyrethr. q. s. | Rx. Zingib. q. s.   |
| teneatur sub lingua.    | usurpatur ut antea. |

#### 2 Herbæ.

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Rx. Fol. Nicot. convol. q. s. | Rx. Fol. Nasturt. q. s. |
| masticetur probe.             | usurpetur ut antea.     |

#### 3 Electuaria.

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Rx. Mastich. el. ꝑ̄j.  | Rx. Sem. Sinap.       |
| Sem. Sinap.            | Zingib.               |
| Rad. Pyrethr. a. ꝑ̄ss. | Rad. Pyrethr. a. ꝑ̄j. |
| Cardamom.              | Cubeb.                |
| Cubeb. a. ꝑ̄j.         | Cardamom. a. ꝑ̄ss.    |
| Mell. Anthos. q. s.    | Oxymell. q. s.        |
| M. F. Electuarium,     | M. F. Electuarium.    |
| cujus portio quædam    | D. ut antea.          |
| teneatur in ore        |                       |

#### 4 Decocta.

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Rx. Rad. Pyrethr. ꝑ̄j. | Rx. Rad. Cyclam. ꝑ̄j.          |
| Hb. Nicot. mj.         | Hb. Nicot.                     |
| Sem. Sinap. ꝑ̄j.       | Piperit. a. mj.                |
| Coq. in Aq. s. ꝑ̄j. &  | Sem. eruc.                     |
| Aceti ꝑ̄iv.            | Sinap. a. ꝑ̄j.                 |
| Colat. ꝑ̄ss. M.        | Coq. in aq. set acet. a. q. s. |
| teneatur calide in ore | Colat. ꝑ̄j, adde               |
|                        | Oxymel. ꝑ̄j. M.                |

#### 5 Fumus.

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Rx. Herb. Rosmar. | Rosar. a. p. ij.       |
| Salv.             | Sem. Anis.             |
| Major. a. mfs.    | Fenic. a. ꝑ̄j.         |
| Flor. Lavend.     | Fol. Nicot. miiij. M.  |
| Lil. convall.     | usurpetur loco Tabaci. |
| Tunic.            |                        |

#### 6 Rotulæ sublinguales.

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Rx. Rad. Pyrethr.  | Sacch. canar. q. s.     |
| Zingib.            | Solv. Sacch. in         |
| Cubeb.             | Aq. rosar. &            |
| Cinnam.            | Cinnam. q. s.           |
| Pip. long.         | M. F. l. a. Rotulæ, sub |
| Cost. ver. a. ꝑ̄j. | lingua tenendæ.         |

### VI. Modus operandi.

- 1 Quædam, etsi minime sint acris, sed prorsus insipida, diu saltem in ore masticata, Salivam e glandulis eliciunt, uti sunt charta, globulus plumbeus, crystallus, Mastiche &c. & hæc proprie vocantur masticatoria.
- 2 Alia vero quæ stricte Apophlegmatizantiæ audiunt, particulis acris aggrediuntur ductus Salivales & glandulas



dulas easque irritant, unde Natura ad amoliendum illud quod partibus infestum est, copiosam Salivam in oris cavitatem infundit, cujus ope partes illæ acres diluuntur & absterguntur.

#### VI. Regula & Cautela Practica.

- 1 Masticatoria & Apophlegmatizantia interdum insignem habent usum, in capitis præcipue affectibus ferros, quatenus multum feri per ea evacuatur, atque a partibus vicinis revellitur.
- 2 In affectibus oculorum sæpius irritis aliis Apophlegmatizantia profunt.
- 3 Masticatoria nunquam nisi præmissis universalibus remediis & sublata Cacochymia in usum trahantur.
- 4 Masticatoria non nisi tempore matutino vacuo adhuc ventriculo usurpentur, cibus enim repleto ventriculo digestio ob deficientem salivam impeditur.
- 5 In horum remediorum usu media tenenda est via, si enim nimis diu usurpantur, nimia salivæ laudabilis copia evacuatur, si vero nimis parce in usum trahuntur, nil juvant.
- 6 Saliva non deglutitur, quoniam facile Cardialgiæ aut Vomitus sequuntur, quare semper exspuatur.

#### 10. De Evacuatione Humorū per Nares.

**I. Definitio.** **E**st evacuatio artificialis eum in finem per Errhina & Ptarmica instituta, ut humores superflui circa nares hærentes evacuentur.

#### II. Differentia.

- 1 Alia fit sine sternutatione, quando scil. per remedia appropriata, quæ Errhina vulgo vocantur, humores in glandulis narium hærentes resolvuntur, & glandulæ leniter ad excretionem stimulantur.
- 2 Alia vero fit cum sternutatione, quando per remedia Ptarmica, glandulæ & membrana narium fortiter stimulantur, ac humores cum impetu excutiuntur.

#### III. Indicania.

- 1 Humores copiosi circa nares & in partibus vicinis hærentes.
- 2 Dolores capitis, quos interdum sensibilibiter levant Ptarmica.
- 3 Partus difficilis, ubi Ptarmica fœtus exclusionem promovent.
- 4 Apoplexia.
- 5 Singultus &c.

#### IV. Remedia.

<i>Rad. Jalap.</i>	<i>Cyan.</i>
<i>Mechoac.</i>	<i>Anthos.</i>
<i>Helleb. alb.</i>	<i>Calend.</i>
<i>Pyrethr.</i>	<i>Sem. Nigell.</i>
<i>Iridis flor.</i>	<i>Nasturt.</i>
<i>Fol. Tabac.</i>	<i>Sinap.</i>
<i>Herb. Major.</i>	<i>Euphorbium</i>
<i>Beton.</i>	<i>Piper, aliaque aromata.</i>
<i>Serpill.</i>	<i>Spec. de Major. Myns.</i>
<i>Thym.</i>	<i>Ol. Major.</i>
<i>Orig.</i>	<i>Aqua Majorana.</i>
<i>Ptarmic.</i>	<i>Saccharum.</i>
<i>Flor. Lavend.</i>	<i>Vitriol. album.</i>
<i>Lil. convall.</i>	<i>Sal. Ammon. in lixiv. injectū.</i>
<i>Spic.</i>	<i>Salia Volatilia.</i>
<i>Violar.</i>	<i>Spir. Salis Ammon.</i>
<i>Rosar.</i>	<i>Ess. castor.</i>

#### V. Formulæ Remediorum.

1 Pulveres.	
<i>Rx. Fol. Tabac. mj.</i>	<i>Rx. Summit. Beton.</i>
<i>Herb. Major.</i>	<i>Origan.</i>
<i>Serpill.</i>	<i>Serpill. ā mfs.</i>
<i>Thymi. ā. mfs.</i>	<i>Flor. Rosar.</i>
<i>Flor. Lavend.</i>	<i>Cyani.</i>
<i>Lil. conv.</i>	<i>Violar. ā. p. j.</i>
<i>Anth. ā. p. j.</i>	<i>Ol. Major. gt. vj. M.</i>
<i>M. F. Pul. subtilissimus.</i>	<i>F. Pulv. subtilissimus.</i>
<i>Rx. Fol. Tabac.</i>	<i>Rx. Pulv. irid. flor. Zij.</i>
<i>Herb. Ptarmic.</i>	<i>Herb. Origan.</i>
<i>Summit. Serpill.</i>	<i>Rosmar.</i>
<i>Orig. ā. mfs.</i>	<i>Major. ā. mfs.</i>

*Flor. Violar.*

*Anth. ā. p. j.*

*Ol. dest. Major. gt. viij.*

*Mosch.*

*Zibeth. ā. gr. ij. M.*

*F. Pulv. subtilissimus.*

Sequentes Pulveres Errhino Ptarmicos commendat DD. Hoffmannus in Dissert. de Pulverum Sternutatorium usu & abusu.

*Rx. Sacch. opt. Zss.*

*Bals. apopl. gr. XII.*

*Flor. Benz.*

*Res. L. Guaja. ā. Zss. M.*

*F. Pulvis.*

*Rx. Fol. Tabac. infusione*

*Aquæ rosarum prius*

*mitigat. Zss.*

*Flor. Ont. exsicc. Zij.*

*Ol. Flor. Ont. Zss. M.*

*F. Pulvis.*

*Rx. Pulv. L. aloes*

*Succ.*

*Tabac. ā. Zij.*

*Castor. Zss.*

*Ol. Major. gt. X. M.*

*F. Pulvis.*

*Rx. Sal Vol. Ammon. Zij.*

*Ol. Major. gt. X. M.*

*F. Pul. solo odore errhinae vim exerens.*

*Rx. Rad. Ir. flor. Zij.*

*Flor. Balaust.*

*Ros. rubr. ā. Zij.*

*Anthos.*

*Rx. Flor. lil. convall.*

*Major.*

*Pulv. Tabac. ā. Zij.*

*Helleb. alb. gr. XII.*

*Flor. Calend.*

*Cyan.*

*Lavend. ā. p. j.*

*Sem. Nigell. Zss.*

*Ol. dest. Major. gt. vj. M.*

*F. Pulv. subtilissimus.*

*Ol. Major.*

*Cubeb. ā. gt. IV. M.*

*F. Pulvis.*

*Rx. Rad. Valer.*

*Sem. Fœnic.*

*Pulv. Tabac. a. Zij.*

*Flor. Benz. gr. XII.*

*Ol. Cubeb.*

*Fœnic.*

*Major. gt. a. ij.*

*Spir. Rosar. gt. XII. M.*

*F. Pulvis.*

*Rx. Ol. Succin. Zss.*

*Lavend.*

*Ror. mar.*

*Salv.*

*Rut.*

*Spic. gt. a. iij.*

*Bals. Apopl. gr. viij.*

*Incorporentur cum Sacch. canariensi finissimo.*

*Lavend. a. Zss.*

*Helleb. alb. gr. viij.*

*Mosc. in Spi. ros. sol. gr. ij.*

*M. F. Pulvis.*

*F. Pulvis, in variis & quibus gravissimis capitis affectibus, teste clariss. Lentilio, optimos edens effectus.*

#### 2. Aquæ.

*Rx. Aq. Major. Zij.*

*Vitriol. alb. gr. ij. M.*

*attrahatur in nares.*

*Rx. Aq. Major. Zij.*

*Vitriolat. alb.*

*Elater. an. gr. ij. M.*

#### 3. Mixturæ.

*Rx. Aq. Reg. Hung. Zss.*

*Sp. Sal. Ammon. Zij. M.*

*odor attrahatur in nares.*

*Rx. Spir. Sal. Ammon. Zij.*

*Ess. Castor. Zij. M.*

*D. ut antea.*

#### VI. Modus operandi.

1 Quædam particulis suis Salino-acribus humores in glandulis contentos fundunt, & excretionem ex iisdem promovent.

2 Quædam vero potentius ipsam narium membranam aggrediuntur, ac motum quasi convulsivum in ipsa excitando cum insigni motu materiæ, in glandulis contentæ, excretionem promovent.

3 Quædam utroque modo agunt; unde in hisce casibus Natura ad amoliendum id quod membranæ & glandulis molestum est, humores in copia ad nares mittit, ut hoc modo partes acres diluantur & mitigentur, ac simul cum humoribus motu fortiori e naribus expellantur.

#### VII. Regula & Cautela Practica.

1 Ubique serum deficit, v. g. in cholericis aliisque vel a morbis vel senio exsiccatis, ibi Errhina & Ptarmica minus consulto præscribuntur, usurpantur, quatenus corpora magis exsiccantur.

2 In senibus, quorum corpora pituita viscida repleta sunt, Sternutatoria non semper tuta sunt.

3 In Vertigine inpr. essentiali Ptarmica facile ad Apoplexiam disponunt.

4 Quamvis in Apoplexia & Epilepsia præsentē, Ptarmica sæpius cum fructu usurpentur, imminentes tamen facile in actum deducunt.

5 Ptarmica oculorum affectus, inprimis inflammatorios, quam maxime exasperant.

6 Si propensio adest ad Hæmorrhagiam narium nimiam, Ptarmica nullum habent usum, quoniam eandem facile excitant: ad revocandam tamen Hæmorrhagiam consuetam Semen Nigellæ laudatur.



- 7 In dispositione ad Hæmoptysin, aut alias malo constituto Pectore, Ptarmica minus tuta sunt, quoniam Hæmoptysin promovent, reliquaque mala exasperant.
- 8 Nec etiam in memoriæ debilitate, Ptarmica insignem habent usum.
- 9 In gravidis Ptarmica facile propter motum gravio-rem ad Abortum disponunt.
- 10 Non oculis tantum sed etiam auribus aliisque sensuum organis Ptarmica facile nocent.
- 11 Infantibus propter teneram cerebri & nervorum constitutionem, Ptarmica minus conveniunt.
- 12 Quo frequentius usurpantur Errhina & Ptarmica, eo magis læditur Olfactus.
- 13 Errhina & Ptarmica sæpius in usum tracta congestionibus sanguinis ad caput ansam præbent.
- 14 Ptarmica fortiora inpr. ex Helleboro albo Convulsionem excitasse observavimus.
- 15 Errhina solummodo ex vicinis partibus eliciunt serum, Ptarmica vero etiam in diffitis partibus humores commovent & excretionem per easdem promovent.
- 16 Reperiuntur Errhina fortissima, uti sunt Salia Volatilia urinosa, quæ tamen nullam sternutationem excitant.
- 17 In Coryza consueta suppressa Errhina insignem habent usum, quatenus omnia mala exinde provenientia præcavent & tollunt.

### II. De Humorum Evacuatione per Pectus sive de Expectoratione.

I. **Definitio:** Expectoratio est evacuatio artificialis per remedia convenientia eum in finem instituta, ut humores quantitate & qualitate Pectori inimici mature expellantur.

#### II. Differentia.

- 1 Alia fit per remedia præparantia, ita ut materia ad exceptionem inepta præparetur & disponatur ad exitum, quo a Natura ipsa per tussim expelli possit.
- 2 Alia fit per stimulantia, quando vel tussis præsens, aut insufficiens per remedia convenientia augetur, vel tussis excitatur, ita ut materia noxia eo facilius expelli possit.

#### III. Indicantia.

- 1 Materia nimis fluxilis & acris glandulis & pulmonibus infensa, quæ incrassatione & correctione ante evacuationem opus habet.
- 2 Mucus viscidus & tenax Pulmonum tubulos obstruens & respirationem admodum difficilem reddens, quæ tamen prius quam excernatur, resolutionem indiget.
- 3 Materia cruenta & purulenta in Pleuritide & Peripneumonia multa & insignia incommoda pariens.

#### IV. Remedia.

##### 1. Incrassantia.

Rad. Alth.	Nulc. Pini.
Malv.	Pistac.
Liquirit.	Lac.
Herb. Veron.	Sperma ceti.
Virg. Or.	Decoct. pect.
Hed. terr.	Flor. & Fruct.
Flor. Violar.	Cremor bordei.
Papav. err.	Gelatina variæ.
Sem. Althææ.	Succ. liquirit.
Malva.	Pulvis Haly rec.
4. frig. maj.	Species diatragac.
Lini.	Conf. rosar.
Fœnugræci.	Tinct. pap. rh.
Hyosc.	Sir. pap. rh.
Papav.	Liquirit.
Ficus.	de Sympb. Fern.
Passula minores.	M. P. de Cynogl.
Jujuba.	Theriaca.
Siliqua.	Laud. Op.
Sebesten.	Diacodium.
Tragacantha.	Trochisci bech.
Gummi Arab.	nigr.
Amyd. dulc.	rubr.

Extr. Hed. terrestr.  
Veron.

Liquirit.  
Ungu. Pector.

##### 2. Incidentia.

Rad. Helen.	Flor. Sulph.
Bardana.	Myrrha.
Irid. flor.	Succinum.
Petasit.	Species diatreos.
Angelic.	Elix. Pect. Wed.
Ari.	Ess. Alexip. Stablii.
Trisol. fibr.	Helen.
Fœnic.	Succin.
Pimpin. alb.	Mirrha.
Levistic.	Tinct. Antim. aeris.
Vincetox.	Resolvens.
Squilla.	Pectoralis.
Imperat.	Tartari.
Salsaparilla.	Spir. Sal. Ammon. anis.
Herb. Scabios.	Aq. Scabios.
Tussilag.	Hyssop.
Hyssop.	Cheresol.
Pilosell.	Taraxac.
Bellid.	Scord.
Nicot.	Bellid.
Erysm.	Asthmat.
Rorell.	Sir. Tussilag.
Cheresol.	Scabios.
Marrub. alb.	Hyssop.
Pulmon. mac.	Nicot.
Scord.	de Erysmo Lob.
Capill. ♀	Capill. ♀
Flor. Tussilag.	Pilosell.
Sambuci.	Conf. Bellid.
Scabiosæ.	Hyssop.
Croci.	Scabios.
Sem. Anisi.	Extr. Scabios.
Feniculi.	Helen.
Card. bened.	Bellid.
Marie.	Irid. flor.
Lign. Sassafr.	Oxym. squillit.
Sanct.	Loch. ad asthma
Gumm. Ammoniac.	de far sar.
Bdell.	Bals. Sulph. anis.
Benzoes ejus- que flores.	Pil. Polychrest.
	Stablii.
	Balsam. visc.

#### V. Formula Remediorum.

##### 1. Decocta.

Rx. Spec. pro Dec. pect. ʒiv.	Rx. spec. pro Dec. fl. & fr. ʒiv.
Coq. in aq. f. ʒiij.	Coq. in s. aq. f.
usque ad consumpt. ʒij.	D. sapius calide.
Colat. D. ad Vitr.	Rx. Herb. Veron.
dosis ʒvj. calide.	Scabios.
Rx. Rad. Enul.	Hed. terr.
Pimpin. alb.	Tussilag.
Vincetox. ʒ. ʒss.	Virg. Or. ʒ. mj.
Herb. Scabios.	Inc. D. ad Ch.
Hyssop.	Rx. Rad. Enul.
Bellid.	Liquirit.
Pilosell. ʒ. mj.	Pimp. alb. ʒ. ʒiij.
Inc. ad Ch.	Irid. fl. ʒij.
quarta harum specierum	Ari ʒiss.
pars injiciatur in aquæ	Herb. Scabios.
ferventis ʒij. bulliant	Erysm.
leniter & colat. suman-	Marrub. ʒ. mj.
tur ʒiv. vel vj. ter vel	Flor. Tussilag. mss.
quater singulis diebus.	Incis. usurpentur instar in-
Rx. Ras. L. Sassafr. ʒij.	fusi Thee.
Sanct.	Rx. Herb. Hed. terr.
Rad. Chin.	Scabios.
Liquirit. ʒ. ʒi.	Veron.
infund. per noct. & coq.	Millesol.
in s. q. aq. simpl. sub fi-	Coq. in aq. f. ʒij.
nem coctionis adde	Colat. adde
Herb. Hyssop.	Sir. Hed. terr.
Veron.	Pap. rhæad. ʒ. ʒij. M.
Scabios.	D. sapius calide
Bellid. ʒ. mss.	in Hæmoptysi alijsq; Pectoris
Colat. D. in vitro pro po-	affectionibus ubi resolutione &
sup. pector. in tussi Venerea	consolidatione opus est.



## 2 Pulveres,

- Rx. Rad. ir. flor. ℥j. Rx. Spec. diatr. ℥ij.  
 Flor. sulphuris ℥ss. Flor. sulphuris ℥ij.  
 Sacch. ℥ij. Benz. ℥ss. M.  
 Ol. dest. anis. gt. xij. M. Rx. Pulv. Haiy. contr. Phthif.  
 D. bis vel ter per diem dispens. ℥ss. (rec.  
 aliquot cusp. cultri. div. in 4. p. eq.

## 3 Potinulæ.

- Rx. Aq. Scabios. ℥ij. Rx. Aq. Veron.  
 Asthm. Hyssop. a ℥ij.  
 Acet. squillit. a ℥vj. Asthm. ℥vj.  
 Sir. Hyssop. ℥ss. M. Sirup. Scabios. ℥ss. M.  
 Rx. Aq. Tarax. Rx. Aq. Veron.  
 Cherofol. a ℥ij. Tussilag. a ℥ij.  
 Asthm. Elix. Pector. ℥ss.  
 Oxym. squillit. Spir. sal. Ammon. anis. ℥ss.  
 Sir. Nicot. a ℥ss. M. Sir. Nicot. ℥ss. M.  
 Dos. Coch. ii. iij. D. ut antea.  
 Rx. Gum. Ammon. ℥j. solv. Rx. Aq. Scord.  
 in Vin. Rhen. ℥ij. adde Scabios. a ℥ij.  
 Aq. Hyssop. ℥iv. M. Ess. alexiph. ℥ss.  
 D. aliquot cochlearia re- Tinct. resolv. ℥j.  
 petitis vicibus in asth- Sir de Hyssop. ℥ss. M.  
 mate.

## 4 Rotulæ.

- Rx. Spec. diatr. ℥ij. Rx. Succ. liquirit. ℥ij.  
 Flor. sulph. ℥j. Extr. enul. ℥j.  
 c. s. q. Sacch. in Aq. Flor. Benz. ℥ss.  
 Scabios. sol. F. Rotulæ. c. s. q. Sacch. in aq. Hyssop.  
 Rx. Pulv. orid. Flor. ℥ij. sol. F. Rotulæ.  
 Flor. sulph. Rx. Pulv. irid. Flor. ℥j.  
 Extr. liquirit. a ℥ss. Extr. Liquirit.  
 c. s. q. Sacch. in aq. Enul. an. ℥ss.  
 Hyssop. solut. F. Rotu- c. s. q. Sacch. in aq. Cheref.  
 læ. sol. F. Rotulæ.

## 5 Electuaria.

- Rx. Conf. Hed. terr. Rx. Conf. Hyssop.  
 Scabios. a ℥vj. Bellid. a ℥ss.  
 Extr. Veron. Antihect. Poter. ver. ℥ss.  
 millefol. a ℥ss. Flor. Sulph. ℥j.  
 Succ. præpt. ℥ij. Benz. ℥j.  
 Sir. Hyssop. q. s. M. Sir. de Farfar. q. s.  
 F. Electuorum contra M. F. Elect.  
 Hemoptysin. Rx. Conserv. Ros. antiq. ℥ss.  
 Rx. Conf. ros. antiq. Antih. Poter.  
 Hed. terr. a ℥ss. Bals. de Capaib. a ℥ss.  
 Pulv. Haly. ℥ij. Sir. flor. bellid. q. s.  
 Sir. Scabios. q. s. M. F. Electuarium contra  
 M. F. Elect. sæpius Phthisin a Riedlino lau-  
 usurpandum. datum.

## 6 Linctus &amp; Eclegmata.

- Rx. Locq. de Pulm. vulp. Rx. Loch. ad Asthma  
 San. O' expert. a ℥vj. de Pulm. vulp. a ℥j.  
 Pulv. Haly ℥ss. Elix. Pector. ℥ss.  
 Sir de Farfar. q. s. Spec. diatr. simpl. ℥j.  
 M. F. Linctus. D. Sir. Papav. rhæad. q. s.  
 cum bacillo liquiritiæ. M. F. l. d. Loch.  
 Rx. Loch. de Farfar. Rx. Sir. Hyssop.  
 ad Asthma a ℥ss. Scabios.  
 Troch. beccic. nigr. ℥ij. Pap. rh. an. ℥j.  
 Elix. Pector. ℥ij. Elix. Pector. ℥j.  
 Aq. Sal. Ammon. anis. ℥j. Extr. Liquirit.  
 Sir. de jujub. Enul.  
 Viol. Veron.  
 Papav. rh. a q. s. Troch. becc. nigr.  
 M. F. Linctus. Spec. diatr. frig. an. ℥ij.  
 D. cum bacillo Liquirit. M. F. Linctus.

## 7 Mixturæ.

- Rx. Ess. alexiph. ℥ij. dos. 15. 30. gr.  
 succin. Rx. Tinct. resolv. ℥ss.  
 Tinct. Antimon. an. ℥j. M. dos. 30. 40. gt.  
 Rx. Tinct. Tartar. acr. Rx. Tinct. Pector. ℥ij.  
 Ess. Amar. Hall. an. ℥ij. dos. 30. gr.  
 succ. ℥j. M. Rx. Tinct. resolv.  
 Rx. Elix. Pector. ℥ij. Ess. Lign. an. ℥ij. M.

## VI. Modus operandi.

- 1 Quædam materiam nimis tenuem & acrem incref-  
 sant, ac in pulpofam consistentiam redigunt, ut eo  
 commodius sine Pulmonum noxa excerni possit, uti

sunt supra enumerata Incrassantia, mucilaginosæ,  
 dulcia, leniter adstringentia, Opiata &c. ad quæ  
 etiam referri merentur Unguenta ex Pinguedine &  
 olei præparata, uti Unguenta Pectoralia varia.

- 2 Alia mukum nimis tenacem & viscidum incidunt  
 & resolvunt, fluxilitatemque ei conciliant, ut ope  
 tussis per asperam arteriam eo facilius ejici queat,  
 qualia sunt superius laudata Resolventia acria, a-  
 mara, Sulphurea, Gummatosa &c.

- 3 Quædam specificè quasi materiam seroso mucosam  
 ad Pectus ducunt, ut postea per asperam arteriam  
 evacuetur: quorsum potissimum referri merentur,  
 Jujubæ, Sebesten, Tactyli, Ficus, Squillia, Vio-  
 læ &c.

- 4 Quædam fibras asperæ arteriæ aggrediendo & acri-  
 monia sua stimulando tussim excitant, & materiæ  
 præparatæ excretionem promovent, uti sunt acria  
 & volatilia, potissimum vero Spiritus acidi, Nitri,  
 Salis, Vitrioli.

## VII. Regule &amp; Cautelæ Practicæ.

- 1 Inter Incrassantia & Resolventia merito semper di-  
 stinctio fieri debet, pro diversa scil. materiæ Pul-  
 monibus infusæ & hinc excernendæ conditione,  
 qua neglecta facile committuntur errores, quate-  
 nus materia per perversam medicationem vel ni-  
 mis resolvitur & magis tenuis & acris, vel ma-  
 gis adhuc spissa redditur.

- 2 Expectoratio nunquam est instituenda, nisi mate-  
 ria antea satis mobilis reddita, aut sufficienter præ-  
 parata fuerit.

- 3 Expectorantibus commode semper Resolventia ad-  
 miscentur, quoniam hoc modo excretio commodius  
 procedit.

- 4 Quando affluxus humorum ad Pectus est nimius,  
 cavendum est a nimis expectorantibus, quoniam  
 affluxum augment, potius E. conveniunt Laxantia,  
 Diuretica, Diaphoretica ac Discutientia.

- 5 Adstringentia quamvis poros Pulmonum constri-  
 gendo nimiam expectorationem impendant, facile  
 tamen nisi caute admodum usurpentur, magna eo-  
 rum præposterum usum sequuntur incommoda,  
 quatenus materiam inspissant atque in Pulmoni-  
 bus incarcerant, und mucus acrior redditus facile  
 Pulmones aggreditur,

- 6 In Tussi sicca aut etiam humida corpore simul infi-  
 gniter extenuato, esiccantia & inprimis Antihecti-  
 cum Poterii magis exsiccando nocent.

- 7 Expectorantia dulcia, inpr. Scylla, Jujubæ & Sebe-  
 sten nunquam diu usurpentur, quoniam expectora-  
 tionem quidem promovent, sed simul affluxum hu-  
 morum nimium ad Pectus mirum quantum promo-  
 vent.

- 8 In Tussi chronica, quæ interdum personas humi-  
 dioris temperamenti affligit, cum corporis contabe-  
 scentia, Venæsectio sæpius utilis, imo fere semper  
 necessaria est, & Expectorantium usui præmitti di-  
 bet,

- 9 Tusses suppressos sanguinis fluxus sequentes, nun-  
 quam expectorantibus cedunt, nisi præmissa fuerit  
 Venæsectio.

- 10 Si Pulmones sunt affecti, summe noxii sunt spiritus  
 acidi minerales, quoniam & tussim augment & exul-  
 cerationem vel producant, vel promovent.

- 11 In Pleuritide, quoniam tota fere salus in expectora-  
 tione consistit, expectorantibus & resolutivis per  
 totum morbum semper insistendum est, ne matè-  
 ria vel copia suffocationem producat, vel acrimo-  
 nia Pulmones magis exedat.

- 12 Pilulæ Becherianæ & Balsamicæ viscerales in affe-  
 ctibus Pectoris, excepta Hemoptysi, insignem ha-  
 bent usum, quatenus resolvunt & revellunt.

- 13 Pulvis Haly contra Phthisin nisi recens sit, nullum  
 habet usum.

- 14 Tinctura antiphthisica in plerisque Pulmonum affe-  
 ctibus magis nocet, quam prodest.

- 15 Opiata præpostere & materia nondum evacuata ex-  
 hibita, tussim quidem sedant, sed simul etiam mu-  
 cum cum damno in Pulmonibus detinent.

- 16 Unguenta pectoralia, aut alia interdum, nimis re-  
 laxan-



laxando Pectus, efficiunt, ut major humorum copia ad Pectus feratur.

12. De Sanguinis subsistentis evacuatione per remedia.

I. Definitio.

Est evacuatio artificialis eum in finem instituta, ut per remedia convenientia Hæmorrhagiæ suppressæ & inprimis Menses ac Hæmorrhoides revocentur.

II. Differentia.

- 1 Respectu Hæmorrhagiarum suppressarum, alia instituitur ut Hæmorrhoides, alia ut Menses in ordinem redigantur.
- 2 Respectu remediorum, alia mediantibus mitioribus præparantibus & Resolventibus fit, alia vero per fortiora pellentia instituitur.

III. Indicantia.

- 1 Hæmorrhoides vel parcius justo fluentes, vel prorsus suppressæ.
- 2 Menses ultra debitum tempus emanentes, cum insigni dolore fluentes, parce nimis aut guttatim saltem prodeuntes, prorsus suppressi, decolores, ac tandem nimis mature cessantes.
- 3 Chlorosis & multi adhuc alij affectus ab Hæmorrhoidum vel Mensium vitiis pendentes, ut per convenientia remedia fluxus revocetur.

IV. Remedia.

Rad. Aristol. rot.	Vitæ mul.
Angelica.	Cinnam.
Rub. Tinct.	Meliss.
Levis.	Puleg.
Zedoar.	Matricar.
Bryonia.	Artemis.
Galang.	Spir. sal. Ammon.
Ari.	C. C.
Pimp. alb.	Fulig.
Helleb. nigr.	Sal Succin. Volat.
Herb. Puleg.	Essent. Castor.
Artemis.	Succin.
Sabin.	Cinnam.
Meliss.	Myrrh.
Serpill.	Croc.
Rosmar.	Millefol.
Marrub. alb.	Carminat.
Calamintb.	Elix. Uterin.
Matricar.	Propriet.
Meliss.	Tinct. Resolv.
Flor. Cheiri.	Antimonii acris.
Calend.	Tartari acris.
Crocus.	Stis Ludov.
Bacca lauri.	Helleborat.
Cicer. rubr.	Extr. Hell. nigr.
Myrrha.	Castor.
Camphora.	Sabin.
Gummi Ammon.	Artemis.
Galbanum.	Pil. Polychrest.
Aloe.	Emmenagog. Richt.
Succinum.	Balsam. Visc.
Borrax.	Tartar.
Castoreum.	Antirheumat.
Hepar Anguillæ.	Ol. Sabin.
Cinnamomum.	Castor.
Pulv. ad Part.	Succin.
Aq. Hyster.	Cinnamom.

V. Formula Remediorum.

I Infusa.	
Rx. Rad. Aristol. rot.	Rx. Rad. Arist. rot.
Rub. Tinct. ana. ʒss.	Angel. ana. ʒss.
Ari. ʒij.	Galang.
Herb. Puleg.	Zedoar. ana. ʒij.
Rosmar.	Herb. Puleg.
Meliss. ana. mj.	Artemis.
Flor. Cheir.	Rosmar. ana. mj.
Calend. ana. p. ij.	Bacc. Laur. ʒss.
Bacc. Laur. ʒss.	Cinnam. ʒij.
Inc. infund. in Vin. alb.	Croc. ʒj.
ʒ. vj. & sumantur singulis	Incis. infund. in Vini albi ʒ.
diebus ter ʒiv. vel vj.	vj. & usurpentur ut antea.

Rx. Rad. Arist. rot. ʒss.  
Zedoar.  
Ari. ana. ʒj.  
Herb. Puleg.  
Rosmar.  
Capill. ♀ ana. mls.  
Fol. Senn. f. f. ʒj.  
Rhab. elect.  
Fibr. Hell. nigr. ana. ʒij.  
Cinnam. ʒiss.  
Croc. ʒj.  
Tart. solub. ʒijij.  
Incis. superfundatur aq. fervent. ʒj. postea adde Vin. alb. ʒijij. vel iv. & bibantur quovis die mane ʒvj.

Rx. Rad. Aristol. rot.  
Bryon.  
Rub. Tinct.  
Pimp. alb. ana. ʒij.  
Herb. Artemis.  
Puleg. ana. mj.  
Fol. Senn. f. f. ʒj.  
Fibr. Hell. nigr.  
Agar. in pet. lig. ana. ʒij.  
Bacc. Laur.  
Cort. Ont. ana. ʒijij.  
Winteran.  
Cinnam. ana. ʒij.  
Croc. ʒj.  
Sal Tart. ʒiss.  
Incis. infund. & usurpentur ut antea.

2. Pulveres.

Rx. Borrac. Venet. ʒj.  
Myrrh.  
Cinnam. ana. ʒss. M.  
div. in 2. p. aq.  
Rx. Borrac. ʒj.  
Myrrh. ʒj.  
Croc. ʒss. M.  
Div. in 2. p. aq.  
Rx. Borrac. ʒj.  
Myrrh. gr. xv.  
Castor gr. vj. M.  
div. in 3. p. aq.

Rx. Borrac.  
Hepat. Anguill. ana. ʒss.  
Myrrh. ʒss. M.  
div. in 2. p. aq.  
Rx. Pulv. Stomach. Birek. ʒss.  
D. 2. cusp. cultr. bis vel ter per diem  
Rx. Pulv. Stomach. ʒss.  
5 & le Cacheet. ʒss.  
Cort. Winter. ana. ʒij. M.  
D. ante prandium & cenam aliquot cuspides cultri.

3 Potiunculae.

Rx. Aq. Meliss. ʒijij.  
Puleg. Spir.  
Cinnam. ana. ʒvj.  
Ess. Carm. ʒij.  
Cinnam. ʒj.  
Sir. Cort. Citr. ʒss. M.  
D. singulis 3. vel 4. horis cochl. aliquot.  
Rx. Aq. Meliss. c. Vin. ʒiv.  
Elix. Uterin.  
Ess. Carmin. ana. ʒj  
Sir. Cinnam.  
Cort. O. ana. ʒij M.  
D. ut antea.  
Rx. Aq. Artemis.  
Puleg. ana. ʒij.  
Cinnam ʒvj.  
Tinct. ʒij. acr. ʒiss.  
Ess. Succin. ʒj.  
Sir. Cinnam. ʒss. M.  
D. at antea.  
Rx. Aq. Meliss. ʒijij.  
Cinnam. c. Vin. ʒj.  
Hepat. Anguill. ʒiss.  
Sir. Cort. Ont. ʒss. M.  
dos. cochl. aliquot repetitis vicibus in partu difficili.  
Rx. Aq. Serpill. c. Vin. ʒijij.  
Ess. Myrrh. ʒj.  
Castor. ʒj.  
Sir. Artemis. ʒijij. M.  
D. ut antea.

Rx. Aq. Vit. mul.  
Cinnam. ana. ʒiss.  
Ess. Carmin. ʒj.  
Succ.  
Myrrh. ana. ʒss.  
Sir. Capill. ♀ ʒss. M.  
Dof. cochl. j. singulis 4. horis.  
Rx. Aq. Serpill. c. Vin. ʒiv.  
Tinct. resolv. ʒj.  
Ess. Succin ʒss.  
Sir. Cort. Ont. ʒss. M.  
dos. cochl. ij. singulis 4. horis superbibendo jusculum.  
Rx. Aq. Puleg. ʒij.  
Serpill. c. Vin.  
Meliss. c. Vin. ana. ʒj.  
Ess. Alexiph. ʒj.  
Succ. ʒss.  
Tinct. Tart. acr. ʒiv.  
Sir. Cort. Citr. M.  
Rx. Aq. Puleg.  
Matric. ana. ʒiss.  
Cinnam. ʒj.  
Borrac. Venet.  
Hep. Anguill. ana. ʒij.  
Sir. Artemis. ʒss. M.  
D. ut antea.  
Rx. Aq. Meliss.  
Puleg. ana. ʒiss.  
Vit. Mul. ʒj.  
Ess. Cinnam.  
Hep. Anguill. ana. ʒj.  
Sir. cort. citr. ʒss. M.  
D. ut antea.

4 Tincturae & Essentiae.

Rx. Ess. Carmin. ʒij.  
Succin.  
Cinnam. ana. ʒj. M.  
Dof. 25. 30. gutt.  
Rx. Ess. Carmin. ʒij.  
Elix. Uterin. ʒj. M.  
Dofis eadem.  
Rx. Ess. Alexiph. ʒij.  
Succin. ʒj.  
Myrrh.  
Castor. ana. ʒss. M.  
Dofis eadem.

Rx. Tinct. resolv. ʒij.  
Ess. Succ. ʒj.  
Myrrh ʒss. M.  
dofis eadem.  
Rx. Tinct. St. Lud.  
Ess. Adiantb. al. ʒijij. M.  
Dofis eadem.  
Rx. Tinct. ʒij. acr. ʒij.  
Ess. Cinnam.  
Succin. ana. ʒj.  
Myrrh. ʒss. M.  
Dofis eadem.



## 5 Pilulæ.

R. Extr. *Abſynth.*

Cent. min.

Fumar.

Gent.

Meliss. ana. ℥ij.

G. Galb. ℥iſs.

Eſs. Succ. q. ſ.

M. F. Pil. ad pond. gr. j.

D. x. xii. mane &amp; vespere.

R. Pil. Balsam. D. Stahl.

℥j.

Dof. xv. xx.

R. Pil. emmenag. D. Ri-

cht. ℥. j.

Dof. eadem.

R. Extr. Card. Ben.

Fumar.

G. Ammon. in acet. squillit.

ſolut. &amp; in ſpiſſ. ā ℥j.

Myrrh. elect.

Aleos succotr. ana. ℥j.

G. Heder. ℥ij.

Croc. pulveriſ. gr. xv.

Elix. propr. q. ſ.

M. F. Pil. ut antea.

R. Pil. Beccher. ℥j.

Dofis eadem.

R. Pil. Balsam. viſc. ℥j.

Dofis eadem.

## 6 Unguentum.

R. Ung. dialth. ℥ſs.

Ol. Cheiri.

Axung. Anſerin. ā ℥ij.

Petrol. ℥ſs.

Croc. ℥j.

Ol. deſt. Sabin. gutt.

vii. M.

F. Unguentum Regioni u-

teri &amp; umbilici inungen-

dum.

## 7 Suffitus.

R. Fol. Sab. mſs.

Myrrh. ℥iſs.

Lign. Aloes ℥j.

Troc. alband. ℥ij.

Mixta injiciantur carban-

ibus &amp; fumus cum tritorio ex-

cipiatur, ita ut vaginam at-

tingere queat.

## 8 Emplaſtra.

R. Empl. Matric. de Galb.

℥j.

Galb. in Acet. ſol. ℥ſs.

Malax. cum.

Ol. Caſtor.

Cheirin. ana. q. ſ.

Induc. ſuper alutam in for-

ma orbis medii.

Irrotetur cum

Ol. deſt. Succ.

applicetur umbilico.

R. Galb. in Aceto ad pultis

conſistent. liquefacti ℥iſs.

Extract. Caſtor.

Croc. ana. ℥ij.

Ol. deſtill. ſpica.

Succ. ana. ℥j.

M. F. Emplaſtrum.

Induc. ſuper alutam &amp; ca-

lide applicetur regioni uteri

vel umbilico.

## 9 Balneum.

R. Rad. Valer. Sylv.

Ariſtol. rot. ana. ℥ij.

Lil. alb.

Bryon.

Helen. ana. ℥j.

Herb. Artemiſ.

Puleg.

Nepeth.

Calaminth.

Matricar. ana. Mij.

Sabin.

Flor. Chamom. ana. mij.

Bacc. Laur.

Junip. ana. ℥j.

Incif. &amp; Contuſ. ſacco in-

cludantur &amp; coq. in ſ. q. aq.

ſimpl. pro Balneo.

## VI. Modus operandi Remediorum.

1 Quædam impedimenta ſanguinis fluxum retardantia

removent, uti Venæſectio Plethoram imminuendo.

2 Quædam ſanguinem ſpiſſum reſolvunt &amp; fluxilita-

tem ei conciliant, ut eo facilius excerni queat, uti

omnia ſupra recenſita incidentia &amp; reſolventia.

3 Quædam orgaſmum in ſanguine excitant, qualia

ſunt potiſſimum Myrrhata &amp; ſuccinata.

4 Alia ipſas fibras aggrediuntur, eaſque fortiter ſti-

mulant ac ſimul humores commovent, uti potiſſi-

mum ſunt omnia volatilia &amp; purgantia aliaque ſti-

mulantia.

5 Quædam poros aperiunt &amp; vias relaxant, ac ſimul

ſtimulant, uti Unguenta, Balnea, Emplaſtra, ſuf-

ſitus &amp; Clyſteres.

## VII. Regula &amp; Cautela Præctica.

1 In evacuatione ſanguinis per remedia ſemper reſpi-

ciendum eſt ad ſanguinis fluxilitatem &amp; ad vias, an

ſint liberæ, quod ſi negligatur, fere nunquam ſine

damno exhibentur remedia.

2 Si Plethora urget, evacuationes ſanguinis ſemper

præcedere debent uſum remediorum.

3 Si ſpiſſitudo ſanguinis præſens eſt, per incidentia &amp;

reſolventia hæc prius tolli debet.

4 Niſi humores prius probe fuerint præparati, Pellen-

tibus inprimis fortioribus nunquam utendum eſt.

5 Pellentia non niſi iſtantibus Menſibus exhibeantur:

intermedio enim tempore data, Menſium negotium

magis turbant, quam promovent.

6 Si per Incidentia &amp; Reſolventia leniterque Pellen-

tia reſ peragi poteſt, nunquam ad fortiora progre-

diendum eſt.

7 Tali in caſu ceteris remediis omnibus facile palmam præripiunt Pilulæ Stahlianæ, Beccherianæ veræ, Polychreſtæ, Emmenagogæ D. Richteri &amp; Baſfamicæ viſcerales nobis uſuales, quippe quæ, ſi prius Plethora, ubi opus eſt, imminuta fuerit, certiſſime ſine ulla noxa fluxus ſanguinis ſuppreſſos revocant.

8 Parem efficaciam poſſident Pilulæ noſtræ, reſolventes antiſtrematicæ, quæ ſine ullo alio adminiculo brevi fluxus ſanguinis reſtituunt &amp; inſarctus quoque a ſanguinis ſuppreſſionibus natos &amp; jam ad ſcirrhum pronos, ob ſummam, qua pollent, reſolvendi vim diſſolvunt.

9 Si translationes ſanguinis jam ad alias partes &amp; inprimis ad ſuperiores factæ ſunt, cauſſime procedendum eſt, quoniam Pellentium uſum, facillime Vomitus Cruentus, Hæmoptiſis aliaque graviora mala ſequuntur.

10 Si poſt morbos graviores &amp; diuturnos ob defectum humorum ſanguinis fluxus, ceſſarunt, nunquam remedia Pellentia exhibeantur, ſed potius humores convenienti diætâ reſtituantur.

11 Reſpectu Temperamentorum ſelectus remediorum inſtituatur, ne iſdiſcretum eorum uſum majores perturbationes ſequantur.

12 Tinctura reſolvens nobis familiaris omnium Temperamentorum hominibus ſine ullo periculo exhiberi poteſt, hoc ſaltem obſervato diſcrimine, ut ſicioribus cum multo vehiculo exhibeatur.

13 In Partu difficili a defectu dolorum originem trahente, reliqua remedia facile ſuperat Hepar Anguillæ cum Aqua ſpirituosa exhibitum, quod ſæpiſſime obſervavimus.

14 In partu difficili ob vitioſum ſitum fœtus Pellentia ſemper noxia ſunt.

15 In pellenda mola cauſſime procedendum eſt, quoniam Pellentium uſum ſæpiſſime graves ſequuntur Hæmorrhagiæ.

16 Ad revocandam Hæmorrhagiam narium ſuppreſſam quidam laudant Millefolium, Nigellam, aut Radicem Crocodilii naribus immiſſam.

## PARTIS I.

## SECTIO II.

## DE

## ALTERATIONE.

## I. Definitio.

Alteratio humorum eſt eorundem varia correctio &amp; præparatio, eum in finem a Medico inſtituta, ut humores debito modo correcti, poſtmodum ſine noxa e corpore evacuari queant.

## II. Differentia.

1 Alia reſpicit Humores, ut ſcil. ſpiſſi incidantur, tenuiores increſcantur, acres edulcorentur, vappidiſque debitus ſtatuſ per remedia Baſſamica reſtituatur.

2 Alia reſpicit Partes ſolidas, ut duræ emolliantur, flaccidis &amp; debilibus vero naturalis tonuſ reſtituatur.

3 Alia pro ſcopo habet Motuſ, ut nimirum motuſ excedentes refrænentur, deficientes vero exſtimulentur.

## III. Regula &amp; Cautela Præctica.

1 Humores vitioſi nunquam alterari ita poſſunt, ut cum Natura in gratiam redeant.

2 Omnis alteratio reſpicit excretionem quandam, per certa emunctoria pro diverſa materiæ conditione.

3 Alterantia, niſi circumſtantiæ aliud poſtulent, nunquam nimis diu continentur, ſed ipſis evacuantia vel jungantur, vel poſtponantur.

4 In evacuatione tali ſemper reſpiciendum eſt ad intentionem Naturæ: ſi enim illa ſemper humores ad peripheriam corporis pellit, Diaphoretica exhibenda ſunt &amp; ſic porro.



## I. DE ALTERATIONE HUMORUM.

## 1. De Humorū Spissorum Resolutione.

## I. Definitio.

Resolutio est humorum spissorum incisio & præparatio, eum quidem ob finem a Medico instituta, ut per remedia convenientia debita fluxilitas ipsis restitatur.

## II. Differentia.

- 1 Alia fit per remedia Diluentia & Aquosa, quæ fluxilitatem aliquo modo restituit, inpr. si motus corporis ipsis jungitur.
- 2 Alia instituitur per remedia Salina alcalina & neutra.
- 3 Alia obtinetur per acria & aromatica.
- 4 Alia fit per volatilia & spirituosā.
- 5 Alia tandem per externa instituitur.

## III. Indicantia.

- 1 Resolutionem in genere indicat omnis humorum spissitudo, tenacitas & visciditas, ad motum progressivum & intestinum inepta.
- 2 In specie vero infarctus & scirrhi viscerum.

## IV. Remedia.

## 1 Diluentia.

Potus aquæ calidæ. Decoct. Hord.  
Thee. Aven.  
Caffee. Serum Lactis.  
Veronica.

## 2 Salina.

Sal Tartari. Tart. Vitriol.  
Genist. Arcan. duplic.  
Onon. Sal Polychrest.  
Absinth. Tart. Tartaris.  
Centaur. min. Liq. Terr. fol. Tart.  
Nitr. Stat.

## 3 Acria &amp; Aromatica.

Rad. Angel. Cyani.  
Art. Sem. 4. calid. maj.  
Bryon. Card. bened.  
Bardan. Mar.  
Carlin. Aquileg.  
Caryoph. Sinap.  
Cichor. Dauci.  
Diptamn. alb. Lign. Sassafr.  
Gentian. Sanct.  
Galang. Myrrha.  
Zedoar. G. Galban.  
Doren. Sagapen.  
Imperat. Ammon.  
Levisst. Bdellium.  
Enula. Camphora.  
Pimp. alb. Cinnab. nativ. Gu.  
Petasit. Succinum.  
Vincetox. Cinnam.  
Herb. Matricar. Caryoph.  
Meliss. Cardam.  
Origan. Cubeb.  
Puleg. N. M.  
Serpill. Calam. avom.  
Salv. Piper.  
Rosmar. Zingib.  
Marrub. Ess. Lignor.  
Hyssop. Alexiph.  
Nasturt. Succ.  
Beccabung. Pimp. alb.  
Cochlear. Tinct. Jii.  
Flor. Anthos. Tart.  
Salvia. Resolv.

## 4 Volatilia &amp; Spirituosa.

Sal Volat. C. C. Spir. Sal. Ammon.  
Succin. anif.  
Viper. Eboris.  
Urinæ. C. C.

## 5 Externa.

Rad. Fol. Bardan.  
Sigill. Salom. Empl. de Ammon.  
Irid. Flor. Galban.  
Symphyt. Tacamah.

Mebl.

Cicut.

Hyosc.

Ol. Charesfol.

## V. Formulæ Remediorum.

## 1 Infusa.

Rx. Rad. Angel. Rx. Rad. Bardan.  
Pimpin. alb. Carlin.  
Vincetox. ʒ. Zij. Caryoph. ana Zij.  
Herb. Marrub. alb. Aoi. ʒj.  
Meliss. Herb. Menth.  
Hyssop. Rosmar.  
Puleg. ʒ. mfs. Orig.  
Cort. Ont. Serpill. ana. mfs.  
Winteran. Cort. Citr.  
Cinnam. acut. Cinnam.  
Sem. Anis. Cardam.  
Fenic. ana. Zij. Cubeb.  
Incis. Cont. g. m. Sem. Dauc. ana Zij.  
Infund. in Vin. alb. ʒiv. D. Sal. Tart. ʒiss.  
Singulis diebus 1. vel 3. ʒiv. Incis. infund. in Vin. alb. ʒiv.

## 2 Decocta.

Rx. Ras. L. Sassafr. ʒij. Rx. Ras. L. Sassafr. ʒij.  
Rad. Chin. Sanct.  
Sarsap. Rad. Lapath. ac.  
Liquirit. Vincetox.  
Pimpin. alb. ʒ. Zij. Caryoph.  
Cort. Winteran. Diptamn. alb.  
Cinnam. acut. ana. ʒij. Liquirit. ana. ʒvj.  
Incis. coq. in aq. simpl. ʒ. vj. Cort. Winteran. ʒij.  
vj. ad remanent ʒ. iv. Incis. coq. ut antea.

## 3 Pulveres.

Rx. Pulv. Stomach. Birck. Rx. Lap. ʒ. Zij.  
ʒss. Sem. Anis. Fenic.  
Cort. Winteran. ʒj. Cinnam. acut.  
Ol. dest. Anis. gutt. vj. Tart. Vitriolat. ana. ʒj.  
Cinnam. gutt. ij. M. Elæosacch. Cinnam. ʒss.  
D. 2. cusp. cult. ante prandium & cœnam. M.

## Potiunculæ.

Rx. Aq. Meliss. Rx. Aq. Hyssop.  
Menth. ana. ʒij. Salv. ana. ʒiss.  
Cinnam. ʒj. Serpill. c. Vin. ʒj.  
Tinct. Tart. Ess. Alexiph.  
Ess. carm. ana. ʒiss. Cinnam. ana. ʒj.  
Sir. Cort. Ont. ʒvj. Succ. ʒss.  
Dof. cochl. ij. sing. 2. hor. Sir. Cinnam. ʒss. M.  
Rx. Aq. Matric. ʒij. Rx. Aq. Puleg.  
Meliss. c. Vin. Serpill. ana. ʒiss.  
Chamom. c. Vin. ʒ. Zij. Cinnam. c. Vin. ʒj.  
Ess. Cort. Ont. Ess. Cort. Citr.  
Tinct. Antim. acr. an. ʒj. Pimpin. alb.  
Spir. Nitr. dulc. ʒss. Cinnam. ana. ʒij.  
Sir. cort. cit ʒss. M. Sir. Cort. Ont. ʒss.  
D. ut antea. Conf. Alkerm. ʒj. M.

## 5 Mixturæ.

Rx. Tinct. Resolv. Rx. Tinct. Antimonis. acr.  
Ess. Cortic. Ont. ʒ. Zij. M. Ess. Alexiph. ana. ʒj.  
Dof. 30. 40. gutt. Succin. an. ʒj. M.  
Rx. Ess. Alexiph. Rx. Tinct. Tart.  
Cort. Ont. Essent. Cort. Citr.  
Cinnam. ana. ʒj. M. Lignor. ana. ʒj. M.  
Dofis eadem. Dofis eadem.

## 6 Spiritus.

Rx. Spir. Vin. Camph. Rx. Aq. Apoplect. ʒj.  
Aq. Reg. Hung. ʒ. ʒss. M. Spir. Sal. Ammon. ʒij.  
Applicetur externe cum Ol. dest. Fenic. ʒss.  
linteraminibus. Applicetur ut antea.

## 7 Emplastra.

Rx. Empl. de Ammon. Rx. Empl. de Galb.  
Cicut. Tacamah.  
Hyosc. ana. ʒss. Ammon. ʒ. ʒss.  
Malax. c. Ol. Bals. Peruv. ʒij. M.  
Charesfol. M.

## VI. Modus operandi Remediorum.

- 1 Quædam agunt diluendo Massam sanguineam & reliquos humores spissos.
- 2 Alia incidunt particulis suis Salinis humores spissos, eosque dirimendo fluxiliores reddunt.
- 3 Alia particulis acris itidem intime resolvunt humores



mores spissiores, fluxilitatemque restituant, uti aromatica, gummata &c.

4 Alia potentissime in fibras agunt & motum augendo ac circulationem accelerando sanguinem fluxiliorem reddunt, ut salia volatilia.

5 Alia externe applicita per poros penetrant & humores stagnantes resolvunt, uti spiritus externi, facculi, emplastra &c.

#### VII. Regula & Cautela Practica.

1 In resolutione humorum semper initium fiat a mitioribus, fortiora enim in principio exhibita, humores nimium commovendo, insignes excitant turbas.

2 In morbis chronicis, Incidentia & Resolventia diu continentur, alias frustra laborat Medicus.

3 Resolventibus hisce semper interponantur evacuantia & inpr. talia quæ simul resolvendi vi pollent, uti Mercurius dulcis & Pilulæ ex Gummatibus & Extractis amaris præparatæ.

4 Tincturæ alcalinæ acerrimæ, reliquis Resolventibus facile palmam præripiunt, quatenus sine ulla insigni humorum commotione incidunt & resolvunt: semper tamen aliquandiu continuandæ sunt.

5 Si spissitudo humorum a neglecta Venæsectione aut fluxuum sanguinis suppressione ortum traxit, Missio sanguinis optimo consilio Resolventibus præmittitur.

6 Salia fixissima, certa encheiresi volatilia reddita, in morbis chronicis optimum ferunt auxilium, sed in eorum usu prudentia opus est.

7 In Infarctibus & Scirrhis viscerum externa & inpr. Emplastra nunquam negligenda sunt, quatenus resolutionem optime promovent & operationem remedium internorum adjuvant.

8 Spirituosa externa in tali casu raro laudabilem edunt effectum, imo sæpius dum majorem crispaturam in visceribus produciunt, malum augent.

9 Motus corporis moderatus & continuatus, in resolvendis humoribus spissioribus optima est Medicina, nimius vero in multa mala præcipitat.

10 Si spissitudo sanguinis ab acidorum abusu ortum, traxit optime conveniunt Absorbentia salibus alcalinis & neutris juncta.

11 Antiscorbutica acia reliquis Resolventibus juncta, sæpius laudabilem quoque edunt effectum.

12 Diuretica & Diaphoretica optime consilio sociantur Resolventibus, quoniam non solum incidunt, sed etiam materiæ noxiæ excretionem promovent.

#### 2. De Humoribus tenuium Incrassatione.

#### I. Definitio.

Incrassatio est operatio artificialis, qua mediante humores nimis tenues & acres per remedia convenientia inspissantur, ut absque noxa evacuari queant.

#### II. Differentia.

1 Alia fit per alimenta gelatinosa & mucilaginosas.

2 Alia vero per remedia Absorbentia, figentia, acida &c.

#### III. Indicantia.

1 Acrimonia humorum biliosa tam universalis in tota Massa sanguinea, quam particularis primarum viarum.

2 Coryza & Tussis a materia tenui salsa & acri orta, aut etiam Tussis sicca gravior.

3 Diarrhœa biliosa.

4 Sudores nimii ab humorum resolutione orti.

#### IV. Remedia.

##### 1 Gelatinosa, Pingua & Mucilaginosas.

Lac Vaccin.	Ova sorbilia.
Afinin.	Sperm. Cet.
Caprill.	Rad. Alb.
Human.	Liquir.
Jusc. Carn. jun. inpr.	Tussilag.
Pedum.	Malv.
Gelat. C. C.	Lil. alb.
Ped. Vitul.	Symph.
Mucilag. Hord.	Herb. Matv.
Butyram.	Flor. Lil. alb.
Pingued. Animal.	Malv.
Medulla Animal.	Violar.

Verbasf.  
Sem. 4. frig. maj.  
min.

Lini.  
Milii.  
Cydon.  
Amygd. dulc.  
Nucl. Pin.  
Pistac.  
Avellan.  
Emuls. ex hisce.

Mastiche.  
G. Arab.  
Cerasf.

Conch. præparat.  
Lap. S.  
Percar.  
Mat. Perl.  
Test. ovor. calcin.  
C. C. ust.

Rad. Bistort.  
Tormet.  
Sanguisorb.  
Fol. Querc.  
Salic.

Rob. Rib.  
Berb.  
Cydon.  
Cerasf. acid.  
Granat.  
Succ. Citr.  
Sir. acetos. citr.  
Berb.  
Cerasf. acid.  
Granat.  
Cydon.  
Myrtill.

#### V. Formula Remediorum.

Rx. Lap. S.  
Percar.  
Conch. Citr.  
Tart. Vitriolat. ã. ðj. M.  
Div. in 4. p. æq.  
D. sing. 3. vel 4. horis.

Rx. Aq. Borræg.  
Bugloss. ã. ʒij.  
Tinct. Rosar.  
Sir. Granat. acid. ã. ʒss. M.  
D. cochleatim.  
Rx. Aq. Millefol.  
C. C. citr. ana. ʒij.  
Succ. citr. rec. ʒij.  
Matr. perl. præp.  
Corall. rub. præp. ã. ʒss.  
Sir. Cerasf. accid. ʒss. M.  
D. ut antea.

Rx. Amygd. dulc.  
Sem. 4. frig. maj. ana. ʒss.  
Aq. Plantag.  
Millefol.  
F. l. a. Emulsio.  
Colat. ʒvij. adde  
Conch. præp.  
Crystall. mont. ana. ʒss.  
Sacch. perlat.  
D. sapiens cochleatim.

Rx. Aq. Portul.  
Sanic. ana. ʒiv.  
Rob. Rib.  
Cerasf. acid.

Ficus.  
Dactyli.  
Jujubæ.  
Sebesten.  
Hord. excort.  
Ol. Amygd. dulc.  
Lini.  
Oliv.  
Nuc.  
Hypet.

##### 2 Glutinosa.

Tragac.  
Elemi.

##### 3 Absorbentia.

Unic. foss.  
Mandib. luc. pisc.  
Bolus. Armen.  
Terr. sigill.  
Corall. rubr. &c.

##### 4 Austeras adstringentia.

Flor. Balaustr.  
Rosar.  
Fruet. Myrtill.  
Cort. Granat.  
Chin. Chin.  
Galle.

##### 5 Acida.

Tinct. Rosarum.  
Violar.  
Flor. Tun.  
Conserv. Pulp. Citr.  
Ros. Vitriol.  
Spir. Vitriol. f. & d.  
Nitr.  
Salis.  
Clyss. Antimonii.  
Aceta varia.  
Nitrosa.

##### 1 Pulveres.

R. Unic. Fossil.  
Test. Ovor. calcin.  
Corall. rubr. ã. ðj.  
Terr. Sigill. gr. xij. M.  
div. in 3. p. æq.  
D. ut antea.

##### 2 Potiunculæ.

Rx. Aq. Plantag. vij.  
Rob. Berb.  
Rib.  
Tinct. Fl. Tunic. ã. ʒij.  
Sir. acetos. citr. ʒss. M.  
Rx. Aq. Sanic.  
Tormet. ã. ʒij.  
Lap. S.  
Mandib. Luc. pisc. ã. ðij.  
Acet. Ros. rubr. ʒij.  
Sir. acetos. Citr. ʒss. M.  
D. ut antea.

##### 3 Emulsiones.

Rx. Nucl. Pin.  
Pistac.  
Sem. Cannab.  
Lactuc. ana. ʒij.  
Aq. Nymph.  
Portulac. ana. q. s.  
F. l. a. Emulsio.  
Colat. adde  
Conch. præp. ʒj.  
Sacch. canar. q. s. M.

##### 4 Julepi.

Rx. Aq. Millefol. ʒvj.  
C. C. citr. ʒij.  
Rob. Cydon.  
Granat.

Succ.



*Succ. citr. rec. ana. ℥iij.*  
*Spir. Vitr. dulc. ℥ij.*  
*Sir. Granat. acid. ℥j. M.*  
*D. sapius cochleatim.*

*Tinct. Rosar. ana. ℥ss.*  
*Sir. acet. citr.*  
*M. F. Julepus.*  
*D. ut antea.*

## 5 Decocta.

*R. Rad. Alth.*  
*Liquir.*  
*Tussilag. ā. ℥iij.*

*R. Rad. Bistort.*  
*Torment. ā. ℥ss.*

*Jujub.*  
*Sebest.*

*Fol. Querc.*  
*Summit. Millefol. ana. mj.*  
*Flor. Balauft.*

*Fic. a N. vi.*

*Hyper. a p. ij.*

*Hord. excort. ℥j.*

*Coq. in Aq. simpl. ℥ss.*

*Coq. in Aq. simpl. ℥ss.*

*Colat. adde*

*Colat. D. calide.*

*Sir. Ceras. acid. ℥iij. M.*

## VI. Modus operandi Remediorum.

- 1 Quædam particulis suis gelatinosis pinguibus, mucilaginosus ac glutinosis inviscant & obvolvunt partes volatiles sanguinem resolventes & crasin sanguinis restituunt.
- 2 Alia partibus suis crassioribus ad motum non adeo aptis, retardant motum sanguinis & hoc ipso ulteriore resolutionem impediunt.
- 3 Quædam partes constringunt & austeritate sua adstrictiora humores aliquo modo figunt.
- 4 Ac tandem alia humores magis vel minus coagulant & hoc ipso nimiam resolutionem tollunt.

## VII. Regule &amp; Cautela Practica.

- 1 In Incrassandis humoribus tenuibus semper eo respiciendum est, ut per laxantia mitiora quantitas insignis humorum tenuium & salino-biliosarum evacuetur, sic enim reliqua humorum correctio eo melius procedit.
- 2 Facta tali evacuatione præscribantur lenia Diaphoretica & Diuretica, Nitro, salibus neutris & acidis temperata, ut hoc modo humores aliquo modo condensentur & partes salino-sulphureæ per vias urinarias & habitum corporis evacuentur.
- 3 Jungantur hisce nutrientia, Emulsiones Gelatinæ Mucilagine hordei cum Amygdalis dulcibus præparatæ, ut per hæc humores acres temperentur & crasis sanguinis restituatur.
- 4 Hoc ipso tempore, aut post prædicta exhibeantur incrassantia, tam absorbentia, quam acida & austeriora pro subsectorum conditione.
- 5 Si incrassantia fortiora statim ab initio, sine præmissis evacuantibus usurpantur, partes acres sæpius cum damno in corpore retinentur.
- 6 In affectibus pectoris, ubi incrassatione opus est, caute mercandum est cum Incrassantibus, nisi enim perite tractentur tales affectus, facile exulcerationes Pulmonum sequuntur.
- 7 Quare in tali casu semper præmittantur lenia evacuantia, ut hoc modo affluxus humorum ad pectus interceptiatur, ac postea incrassantia exhibeantur.
- 8 Incrassantia autem talia non sint nimis emollientia, ne major ad pectus humorum affluxus excite-tur.
- 9 Inter incrassantia pectori potissimum dicata eminet præ ceteris Liquiritia & remedia ex eo parata.
- 10 Possunt hisce jungi Anodyna correctæ, & hinc summo cum fructu circa vespertinam Pilulæ ex succo Liquiritiæ & Massa Pilularum de Cynoglossa paratæ exhibentur, quæ iussim a materia acris ortam, optime compescunt.
- 11 Si materia tenuis & acris biliosa, est temperanda & incrassanda, Nitrum & Crystallus montana optimam ferunt opem.
- 12 In Hæctica humorum resolutione Gelatinæ cum Amygdalis dulcibus paratæ & Mucilagine non cochleatim sed quotidie ad ℥vj. vel ℥viij. aliquoties sumptæ, plus præstant quam cetera remedia, quatenus non solum humores nimis fluxiles incrassant, sed & viscera constricta relaxant, ita ut humores stagnantes in visceribus sensim sensimque resolvantur.
- 13 Dum humores incrassandi sunt, vitari debent omnia salsa, aromatizata, Vinum aliique potus spirituosus, ira, Venus, motus fortior.

## 3. De Cacochymia correctione.

## I. Definitio.

Cacochymia correctio est species Methodi Medendi, qua perversus & corruptus humorum status per remedia convenientia ita alteratur, ut excreti per certa loca partibus corruptis, reliqui humores laudabilem acquirant statum & consistentiam.

## II. Differentia.

- 1 Alia respicit Cacochymiam falsam eamque removet.
- 2 Alia fit propter humorum statum biliosum.
- 3 Alia tollit mucositatem eorum.
- 4 Alia instituitur propter aciditatem in humoribus.
- 5 Alia removet nimium serum.
- 6 Alia tandem respicit humorum statum corruptum.

## III. Indicantia.

- 1 In genere omnis humorum mala constitutio, serosa, salsa, biliosa, mucosa &c.
- 2 In specie omnes affectus speciales e tali mala constitutione originem trahentes, scorbutus, scabiei variæ species &c.
- 3 Morbi contagiosi & putridi, tam acuti, quam chronici.
- 4 Gangræna, ad impediendam ulteriorem noxam.
- 5 Exulcerationes partium internarum.

## IV. Remedia.

## 1 Ad Cacochymiam falsam.

*Diluentia.*

*Potus Thee.*

*Coffee.*

*Juscula non salita & alia superius de Resolventibus recensita diluentia.*

*Gelatinosa & Mucilaginosa sub Incrassantibus laudata.*

*Diuretica varia inpr. Infusa & Decocta.*

## 2 Ad Cacochymiam biliosam.

*Nitrosa omnia.*

*Cryst. montana.*

*Diluentia.*

*Cholagoga.*

## 3 Ad Cacochymiam mucosam.

*Resolventia omnia superius recensita.*

## 4 Ad Cacochymiam acidam.

*Absorbentia.*

*Lap. &c.*

*Percar.*

*Conch. præp.*

*Mat. Perl. &c.*

## 5 Ad Cacochymiam ferosam.

*Purgantia Phlegmagoga.*

*Diuretica.*

*Diaphoretica superius laudata.*

## 6 Ad Cacochymiam corruptam.

*Balsamica remedia.*

*Rad. Alexipharmaca.*

*Angel.*

*Contraj.*

*Petasit.*

*Imperat.*

*Sarsap.*

*Chin. &c.*

*Herb. Scord.*

*Rut.*

*Galeg. &c.*

*Flor. Ulmar.*

*Aquileg.*

*Sem. Card. Mar.*

*Citr.*

*L. Sassafr.*

*Sanct.*

*Myrrha.*

*Terebinth.*

*Aq. Scord.*

*Ess. Myrrh. aliaque sub Diaphoreticis laudata.*

## V. Formulæ Remediorum.

## 1 Infusa Diuretica ad Cacochymiam falsam.

*R. Rad. Apii.*

*Onon.*

*Vincetox. ā. ℥ss.*

*Herb. Bellid.*

*Capill. ♀.*

*Nasturt. ā. mfs.*

*Flor. Bellid.*

*Violar. a. p. ij.*

*Tart. solub. ℥iij.*

*Incis. infund. in Aq. f. &*

*Vini albi ana. ℥. ij. Dos.*

*℥iv. & vj. bis vel ter per diem.*

*R. Rad. Caryophyll.*

*Apii.*

*Cichor.*

*Polyp. ā. ℥iij.*

*Herb. Cochlear.*

*Lingu. cervin.*

*Nasturt.*

*Summit. cent. min.*

*Bellid. ā. mfs.*

*Pom. Ont. N. 1.*

*Rad. & Herb. recentes cum*

*pom. Ont. Incis. infund. in*

*Vin. alb. ℥. vj.*

## 2 Potiunculæ &amp; Pulveres ad Cacochymiam biliosam.

*R. Aq. Borrag.*

*Bugloss. ana. ℥iiss.*

*Conch. præp.*

*Cryst. mont. præp. ana. ℥ss.*

*Tabacc. succ. Berb. ℥iij. M.*

*D. sapius aliquot cochl.*

*R. Aq.*



R. *Aq. Plantag.*  
*Cichor. ana. ℥iiss.*  
*Succ. cur. rec. ℥ss.*  
*Lap. ℥b. ℥j.*  
*Nitr. depur.*  
*Tart. Vitriolat. ana. ℥ss.*  
*Sir. ceras. acid. ℥vj. M.*  
*D. ut antea.*

### 3 Formulæ ad Cacochymiam mucosam.

*Vid. supra de Resolventibus.*

### 4 Pulveres ad Cacochymiam acidam.

R. *Lap. ℥b. præp.*  
*Matr. perl. ana. ℥j. M.*  
*div. in 4. p. æq.*  
*D. singulis 4. horis.*  
R. *Test. ovor. calc.*  
*D. ut antea.*

### 5 Formulæ ad Cacochymiam serosam.

R. *Specif. Jalap. ℥ss.*  
*D. pro una vice.*  
R. *Rad. Vincetox. ℥iv.*  
*Cog. in Vin. alb. ℥b. iv.*  
*ad consumpt. ℥b. ij.*  
*Dof. cochl. ij. iv. mane pro*  
*scopo Diuretico.*  
*D. cochleatim.*

### 6 Formulæ ad Cacochymiam corruptam.

R. *Aq. Scord.*  
*Galeg. ana. ℥ij.*  
*C. C. citr. ℥j.*  
*Mixt. simpl. ℥ij.*  
*Sir. contraj. ℥vj. M.*  
*D. cochleatim.*  
R. *Aq. Scorzan.*  
*Flor. acac. ana. ℥ij.*  
*Theriac. ℥ss.*  
*Ess. Alexiph. ℥ij.*  
*Spir. Nitr. dulc. ℥ss.*  
*Sir. acetos. citr. ℥ss. M.*  
*D. ut antea.*  
R. *Pulv. Bez. Wed. ℥ij.*

R. *Arcan. duplic.*  
*Nitr. regener.*  
*Crysell. mont.*  
*Matr. perl. præp. ana. ℥ss.*  
*div. in 6. p. æq.*  
*D. sing. 2. vel. 3. horis.*  
R. *Pulv. antispasm. ℥ij.*  
*div. & D. ut antea.*

*Lap. Percar.*  
*Conch præp.*  
*Crysell. mont. ana. ℥ss. M.*  
*div. in 6. p. æq.*

R. *Aq. scord. ℥iv.*  
*Theriac. ℥vj.*  
*Antimon. diaph.*  
*Matr. perl. ana. ℥ss.*  
*Ess. Alexiph. ℥j.*  
*Sir. contraj. M.*  
*D. cochleatim.*

*div. in 6. p. æq.*  
*D. sing. 6. horis.*  
R. *Pulv. Bez. Hull. ℥ij.*  
*Myrrh. elect. gr. xvij.*  
*div. in 6. p. æq.*  
*D. ut antea.*  
R. *Ess. Alexiph.*  
*Succin.*  
*Lignor. ana. ℥j. M.*  
*Dof. gutt. 30. in scabie.*  
R. *Tinct. Resolv. ℥ss.*  
*Dof. gutt. 40.*  
*Reliquas Formulas vid. su-*  
*pra de Diaphoreticis.*

- 5 Nullum fere datur remedium quod in Cacochymia biliosa præsentibus ferat auxilium quam Nitrum, quoque modo exhibitum.
- 6 Insignem quoque habet usum Tinctura Stis Ludovici, quæ sola sæpius Icterus tollit.
- 7 Si saburra bilis acris inflammationem intestinorum minitans in primis heret viis, Nitrosa, Crysellus montana & Salia Neutra optima sunt remedia, sed statim laxantia ipsis vel jungenda, vel subjungenda sunt.
- 8 In Cacochymia biliosa omnia calida & acria remedia, quoniam bilem magis acrem reddunt, noxia sunt.
- 9 In Cacochymia mucosa Resolventia aliquandiu continuanda sunt, alias nullum laudabilem edunt effectum.
- 10 Mercurialia remedia, & inpr. Mercurius dulcis, in tali Cacochymia optima sunt remedia, quatenus non solum incidunt, sed etiam evacuant.
- 11 Si propter acida copiosa assumpta cruditates acidæ in primis viis generatæ fuerunt, & sanguis ipse quoque iis inquinatus est, Absorbentia sunt optima remedia.
- 12 Nunquam tamen nimis diu usurpentur, quoniam digestionem primam lædunt.
- 13 Si partes aquoso serosæ prædominantur, exhibeantur Purgantia, Diuretica & Diaphoretica.
- 14 In Cacochymia maligna Alexipharmaca Resolventibus & Balsamicis remediis semper jungantur.
- 15 Talia remedia, inpr. in morbis chronicis, semper diu continentur, ut vappida humorum consistentia eo melius corrigi queat.
- 16 Uti interne ita & externe in omnibus ulceribus sordidis Balsamica ad abstergendum & consolidandum sunt optima.
- 17 In tali casu præ cæteris eminet Myrrha, interne tamen, quatenus sanguinem insigniter commovet, caute usurpetur.

## II. De Alteratione Partium Solidarum.

### 1. De Adstrictione.

#### I. Definitio.

Adstrictio est Operatio artificialis, eum in finem instituta, partim ut partes & pori nimis relaxati constringantur, partim ut humores præter naturam nimis fluentes coerceantur.

#### II. Differentia.

- 1 Alia respicit partes solidas nimis relaxatas.
- 2 Alia respicit Hæmorrhagias & interdum pro scopo habet saltem moderamen & ad mediocritatis statum fluxuum sanguinis, per loca consueta & convenientia fientium, reductionem, v. g. in Hæmorrhagia Narium, Hæmorrhoidibus, Mensibus, Lochiis &c. interdum vero eum in finem instituitur, ut plane extraordinariæ & enormes, aut a causis violentis ortæ Hæmorrhagiæ, sialicæ circumstantiæ non obstant, plane supprimantur.

#### III. Indicantia.

- 1 Laxitas partium solidarum & pororum.
- 2 Hæmorrhagiæ variæ tam a causis externis quam internis ortæ.
- 3 Alii quoque serosi fluxus.

#### IV. Remedia.

##### 1 Interna.

*Rad. Symp.*  
*Torment.*  
*Bistort.*  
*Rub. Tinct.*  
*Aristol. rot.*  
*Platang.*  
*Herb. Millefol.*  
*Plantag.*  
*Pyrol.*  
*Sanic.*  
*Veron.*  
*Alchimill.*  
*Hed. terrest.*

*Virg. Or.*  
*Flor. Ros. rubr.*  
*Balaust.*  
*Hyperic.*  
*Gallæ.*  
*Sorba.*  
*Succinum.*  
*Mastiche.*  
*Sang. Dracon.*  
*Hirci.*  
*Gumm. Arab.*  
*Mastiche.*  
*Univ. fossil.*  
*G*

*Or.*

## VI. Modus operandi Remediorum.

- 1 Quædam diluunt, dissolvunt & imbibunt partes sanguinis falsas, ut eo commodius postmodum per loca excretoria evacuari possint, ut sunt Diluentia omnia.
- 2 Quædam inviscant partes falsas in humoribus hærentes, ita ut non amplius partes irritare queant, uti sunt Mucilaginosæ, Gelatinosæ &c.
- 3 Quædam dum partes falsas & acres correxerunt, leniter stimulant renes, & excretionem dictarum partium promovent, qualia sunt Infusa Diuretica.
- 4 Quædam bilis acrimoniam infringunt & primas vias abstergunt, ita ut bilis iis nullum damnum inferre queat, qualia sunt Nitrosa, Acida, Salia neutra &c.
- 5 Quædam particulis suis acris & salinis humores crassos incidunt, ut omnia resolventia.
- 6 Quædam acidum in primis viis & in sanguine hærens infringunt, & eum eo in neutrum abstergens abeunt, uti Absorbentia.
- 7 Quædam serum nimium per convenientia loca excretoria evacuant.
- 8 Ac tandem quædam partes corruptas sanguinis corrigunt & partim ad excretionem disponunt, partim vero actu expellunt.

## VII. Regule & Cautelæ Practicæ.

- 1 Cum ex Cacochymia multi & graves morbi propullulent, mature ea corrigenda est.
- 2 In Cacochymia Salsa ceteris fere omnibus copiosa diluentia, quæ simul sunt leniter Diuretica, passim præripiunt.
- 3 Diuretica non sunt exhibenda, nisi prius Salia per diluentia ad excretionem sint præparata.
- 4 Inviscantia & Mucilaginosæ hoc in casu suo quoque non carent usu, semper tamen in majori copia sumi iisque evacuantia per diuresin sunt postponenda.



Oc.  $\Sigma$ .  
Mumia.  
C. C. ust.  
Bolus Armen.  
Terr. Catechu.  
Lemnia.  
Sigill.  
Lap. Hamat.  
Samaragd.  
Corall. rubr.  
Sperniol. Croll.  
Croc.  $\mathcal{J}$ t. adstr.  
Pulv. dysenter.  
Styp.  
Aq. Plantag.  
Torment.  
Hyper.  
Millefol.  
Fol. querc.  
Theriac.  
Cinnam. cydon.  
Tinct. Fl. Hyper.  
Corall.

Rad. Sympb.  
Herb. Aristol.  
Agrimon.  
Salv.  
Virg. Or.  
Plantag.  
Scord.  
Flor. Rosar.  
Millefol.  
Hyper.  
Balaust.  
Plumb. ust.  
Minium.  
Cerussa.  
Lithargyr.  
Tutia.  
Sacch. Saturni.  
Camphora.  
Terelinth.  
Aloe.  
Myrrha.  
Mel.  
Theriaca.  
Bals. Sulph. tereb.  
Arcxi.

## V. Formula Remediorum.

## 1. Internorum.

## 1 Decocta.

R. Rad. Torment.  
Bistort.  $\mathcal{J}$ .  $\mathcal{J}$ ss.  
Herb. Sanic.  
Millefol.  $\mathcal{J}$ . mj.  
Coq. in Aq. f. q. f.  
Colat.  $\mathcal{J}$ ij. adde  
Sir. de Sympb. Fern.  
e ros. sic.  $\mathcal{J}$ .  $\mathcal{J}$ ss. M.  
R. Rad. Sympb.  
Torment.  $\mathcal{J}$ .  $\mathcal{J}$ ij. Dos. ut. antea.  
2 Pulveres.  
R. Unic. Fossil.  
Mandic. luc. pisc.  
Sang. Hirc. ana.  $\mathcal{J}$ ij. M.  
div. in 4. vel 6. p.  $\mathcal{J}$ q.  
D. singulis 4. vel 6. horis.  
R. Herb. Millefol.  
Virg. Or.  
Scabios.  
Veron.  
Tussilag.  
Hed. terr. ana.  
mj.

$\mathcal{J}$ t. adstr.  
Terr. Catech.  
Antiphthif.  
Essent. Traumat. Wed.  
Anod.  
Conf. Rosar. antiq.  
viriol.  
Pulp. Cur.  
Acetosa.  
Balaust.  
Extr. Torment.  
Hed. terr.  
Lisfort.  
Myrtill.  
Theriac. Androm.  
Celest.  
Laud. Op.  
MP. de Cynogl.  
Sir. de Sympb. Fernel.  
Corall.  
e ros. sic.  
Papav.  
Plantag.

## 2 Externa.

Peruv.  
de Capaib.  
Ungu. rubr. Camph.  
alb. Camph.  
de Litharg.  
ad Ambusta.  
Diapomphol.  
de Tutia.  
ad Scabiem.  
Empl. ad Ruptur.  
Fractur.  
alb. Coct.  
Griseum.  
Saturnin.  
Diapalm.  
Sperm. ran.  
Opoteldoch.  
Stictic.  
Nigr. August.  
Spir. Vini.  
Camphor.  
Theriac. Camph.  
Tinct. Aloes.  
Ess. Myrrh.  
Ol. Terelinth.

Colat. p.  $\mathcal{J}$ . adde  
Syr. de Sympb. Fern.  
Corall.  $\mathcal{J}$ .  $\mathcal{J}$ ss. M.  
R. Mandib. luc. pisc.  
Sang. Hirc.  
Sulph. Citr. ana.  $\mathcal{J}$ ss. M.  
div. in 4. vel 6. p.  $\mathcal{J}$ q.  
D. ut antea in sanguinis stasi  
R. Corall. rub. prap.  
Lap. Hamat.  
 $\Sigma$ . prap.  $\mathcal{J}$ .  $\mathcal{J}$  M.  
div. in 6. p.  $\mathcal{J}$ q.  
D. ut antea.  
R. C. C. Phil.  
Lap.  $\Sigma$ . prap.  
Corall. rubr.  
Succ. prap.  
Mastich. ana.  $\mathcal{J}$ ss. M.  
R. Nitr. depur.  
Tart. Viriolat. ana.  $\mathcal{J}$ .

Corall. v. prap.  
Matr. perl. ana.  $\mathcal{J}$ ij. M.  
div. in 6. p.  $\mathcal{J}$ q.  
D. singulis 2. horis.  
R. Corall. rubr. prap.  
Unic. foss.  
N.M.  
Succ. prap.  
Terr. Catech.  $\mathcal{J}$ .  $\mathcal{J}$ ss. M.  
R. Corall. rubr. prap.  
Croc.  $\mathcal{J}$ t. adstring.  
Lap. Hamat. ana.  $\mathcal{J}$ ij. M.  
div. in 5. p.  $\mathcal{J}$ q.  
R. Pulv. antispas. Hall.  $\mathcal{J}$ .iv.  
Corall. rubr. prap.  
Spec. de Hyac. ana.  $\mathcal{J}$ ij.  
MP. de Cynogl. gr.  $\mathcal{J}$ ij. M.  
div. in 6. p.  $\mathcal{J}$ q.  
D. ut antea.

## 3 Boli.

R. Conf. ros. antiq.  $\mathcal{J}$ ij.  
Corall. rubr. prap. gr. xxiv.  
Croc.  $\mathcal{J}$ t. adstring. gr. iv.  
Sir. Corall. q. f.  
M. F. Bolus.  
R. Conserv. Bellid.  $\mathcal{J}$ ij.  
Sang. Drac.  $\mathcal{J}$ ij.  
Terr. sigill. gr. viij.  
Sir. Matang. q. f.  
M. F. Bolus.

R. Conf. Acetos.  $\mathcal{J}$ ij.  
Unic. fossil.  
Lap. Hamat. ana. gr. xv.  
Sir. de Sympb. q. f.  
M. F. Bolus.  
R. Conf. Balaust.  $\mathcal{J}$ ij.  
Lap.  $\Sigma$ . prap.  
Hamat. ana. gr. xv.  
Sir. e ros. sic. q. f.  
M. F. Bolus.

## 4. Electuaria.

R. Conf. Bellid.  
Ros. rubr. ana.  $\mathcal{J}$ vj.  
Lap.  $\Sigma$ . prap.  
Corall. prap.  
Unic. foss.  
Bals. Peruv.  
Croc.  $\mathcal{J}$ t.  $\mathcal{J}$ ij.  
Sir. Bellid. q. f.  
M. F. Electuar.  
D. bis vel ter per diem  $\mathcal{J}$ ij.  
ad  $\mathcal{J}$ .

R. Conf. scabios.  
Hed. terr. ana.  $\mathcal{J}$ vj.  
C. C. Phil.  
Unic. fossil.  
Mastich.  
Terr. Japon.  
Lap. Hamat. ana.  $\mathcal{J}$ ij.  
M. Pil. de Cynogl. gr. xii.  
Sir. scabios. q. f.  
M. F. Electuarius.  
Dos. eadem.

## 5 Potiunculae.

R. Aq. Mentb.  
Torment. ana.  $\mathcal{J}$ ij.  
Unic. fossil.  
Sang. Drac.  
Corall. rubr. prap.  $\mathcal{J}$ .  $\mathcal{J}$ ss.  
Sir. Corall.  $\mathcal{J}$ ss. M.  
D. sing. 3. hor. cocbl.  $\mathcal{J}$ ij.  
R. Aq. Plantag.  $\mathcal{J}$ iv.  
Tinct. Corall.  
Terr. Catech. ana.  $\mathcal{J}$ ij.  
Sir. Corall.  $\mathcal{J}$ ss. M.  
R. Aq. Mentb.  $\mathcal{J}$ iv.  
Diascord.  $\mathcal{J}$ ij.  
Extr. Torment.  $\mathcal{J}$ ij.  
Ther. cal. gr. iv.  
Sir. Pap. f.  $\mathcal{J}$ ss. M.  
Dos. eadem.

R. Ag. Plantag.  
Torment. ana.  $\mathcal{J}$ ij.  
Corall. rubr. prap.  
C. C. ust. ana.  $\mathcal{J}$ ij.  
Lap. Hamat.  $\mathcal{J}$ ij.  
Tab. e succ. citr.  $\mathcal{J}$ ij. M.  
Dos. eadem.  
R. Aq. Torment.  $\mathcal{J}$ iv.  
Ess. Traumat. Wed.  $\mathcal{J}$ ij.  
Sir. Myrtill.  $\mathcal{J}$ ss. M.  
Dos. eadem.  
R. Aq. Meliss.  $\mathcal{J}$ ij.  
Cinnam. cydon.  $\mathcal{J}$ vj.  
Ther. Androm.  $\mathcal{J}$ ij.  
Extr. Torment.  $\mathcal{J}$ ij.  
Sir. Pap. rhaad.  $\mathcal{J}$ ss. M.  
Dos. eadem.

## 6 Mixturae.

R. Tinct. Corall.  
Terr. Catech. ana.  
 $\mathcal{J}$ ij. M.  
D. bis vel ter per diem  
gutt. 30.

R. Ess. Traumat. Wed.  
Tinct. Corall. ana.  $\mathcal{J}$ ss. M.  
M. D. ad Vitr.  
Dos. eadem.

## 7 Pilulae.

R. Extr. Torment.  
Plantag. ana.  $\mathcal{J}$ ij.  
Tinct. Corall. q. f.  
F. Pil. ad pond. gr. j.

R. Extr. Torment.  $\mathcal{J}$ ij.  
Ther. celest. gr. v.  
Tinct. Opii q. f.  
F. Pil. xxv.



## 2. Externorum.

## 1 Decidua.

R. Herb. Aristol.

Agrimon.

Plantag.

Salv. ana. mj.

Coq. in Vino & eluantur  
vulnera recentia.

R. Herb. Plantag.

Virg. Or.

Millefol.

Scord. ā. mj.

Coq. in Aq. f. ℥. ij.

Colat. adde

Mell. &amp; ial. ℥ss.

Ungu. Egypt. ℥vj. M.

injiciantur cum Syringa in  
ulcera sinuosa.

R. Herb. Virg. Or.

Plantag.

Millefol. ana. mj.

Flor. Ros. rubr. mfs.

Incis. coq. in Vino & usur-  
pentur ut antea.

R. Herb. Virg. Or.

Veron.

Plantag.

Scord. ana. mj.

Coq. in Aq. calc. viv. ℥. ij.

Colat. adde

℥. dulc. ℥ss.

Campb. p. ℥ij.

Ungu. Egypt. ℥j. M.

ad ulcera fistulosa.

## 2 Unguenta &amp; Balsama.

R. Mellis ℥vj.

Terebinth. ℥ij.

Vit. Ov. iv. j. M.

F. Ungu. digestiv.

R. Mellis ℥j.

Bals. sulph. ℥ss.

Myrrh.

Aloes ana. ℥ss. M.

M. F. Unguent.

R. Mellis ℥j.

Terebinth. ℥ss.

Bals. Peruv. ℥ij.

Myrrh. Aloes ā. ℥ss.

Ol. Cinnam. ℥j. M.

F. Unguent.

R. Mellis.

Terebinth. ana. ℥ss.

Bals. Peruv. ℥ij.

Vit. Ov. N. j. M.

F. Unguent.

R. Bals. sulph. Tereb.

Peruv. ana. ℥ij.

Gumm. Elemi q. s. pro

consistentia Balsami.

R. Bals. sulph. Terebinth.

Ol. Hyper. ana. ℥ss.

Ess. Myrrh. ℥ij. M.

R. Bals. Arcæi. ℥ss.

D. ad Oll.

## 3 Spiritus.

R. Spir. Vin. rectif. ℥j.

applicetur calide.

R. Spir. Vin. Campb. ℥j.

Ther. Androm. ℥ss. M.

ad Gangrenam.

R. Spir. Vin. rectif. ℥ss.

Tereb. ℥ij. M.

applicetur calide in pun-  
dura tendinum.

R. Spir. Vin. Campb. ℥j.

Ess. Myrrh.

Tinct. Aloes ana. ℥ij.

Ol. Cinnam. ℥j. M.

ad Gangrenam.

R. Spir. Theriac. Campb. ℥ss.

Bals. Peruv.

Ess. Myrrh. ana. ℥j. M.

applicetur calide.

## II. Modus operandi remediorum.

1 Quædam agunt temperando motum sanguinis, in-  
primis in talibus Hæmorrhagiis, quæ a sanguinis  
orgasmo originem trahunt, quod inprimis Nitro-  
sa & Salia neutra præstant.2 Alia incrassant & coagulant aliquo modo sanguinem  
& sic uberiores ejus effluxum impediunt, uti sunt  
modo laudata Nitrosa, Absorbentia, species de  
Hyac. acida &c.3 Alia fibras stringunt & poros minores reddunt,  
qualia sunt stricte sic dicta Adstringentia.4 Alia motus spasticos & expressorios leniunt & sic  
Hæmorrhagias temperant, uti. correctæ Opiata  
Anodyna, species de Hyacintho cum MP. de Cy-  
nogl.5 Quædam externe applicita sanguinem affluentem  
incrassant & in pulvem quasi redigunt, uti farina  
volatilis largiter vulneribus inspersa, quæ poros  
vulneris obstruit & sanguinis ex illis effluxum im-  
pedit.6 Alia condensant sanguinem & fibras simul constri-  
gunt, id quod optime præstat Spiritus Vini rectifica-  
tissimus.7 Alia citissime sanguinem coagulant ac fibras poten-  
ter stringunt, uti Vitriolum ejusque oleum, quæ  
escharam utpl. partibus vulneratis indicunt: eun-  
dem usum habent etiam cauteria actualia.

## II. Regule &amp; Cautelæ Practicæ.

1 In fluxibus sanguinis tam activis, quam passivis ad  
Adstringentia fortiora non statim confugiendum est,  
sed mitiora prius tentanda sunt.2 Si Hæmorrhagiam insignes sanguinis ebullitiones  
comitantur, sanguis minime per Adstringentia si-  
ve interna, sive externa sisti debet: magis conve-  
niunt Venæsectiones revulsoriæ & remedia orga-smum sanguinis sistentia, quo facto postmodum le-  
nia etiam Adstringentia Hæmorrhagias sistunt.3 Si Hæmorrhagiæ inpr. a causis internis & in sub-  
jectis Plethoricis præpostere sistuntur, facile se-  
quuntur sanguinis ad alias partes translationes,  
Oppletiones, Inflammationes, Infarctus, Scirrhi  
&c.4 Resolventia & temperantia Adstringentibus mi-  
xta, in Hæmorrhagiis activis optime conve-  
niunt.

5 Opiata caute reliquis remediis admisceantur.

6 Fluxus feri, Diarrhææ, Dysenterici &c. per Ad-  
stringentia suppressi, multis malis ansam præbent.  
Plura vid. in Praxi Speciali de Hæmorrhagiis.7 In constriungendis partibus relaxatis interne Nervi-  
na Adstringentibus optimo consilio junguntur.

## 2. De Partium durarum Emollitione.

## I. Definitio.

Emollitio est species Methodi Medendi, cujus ope du-  
rities præternaturalis, solidas partes occupans, tol-  
litur, & debita mollities ipsis restituitur.

## II. Differentia.

1 Alia instituitur per remedia interna, si nempe du-  
rities præternaturalis in partibus hæret internis.2 Alia vero procuratur per externa, si scil. durities  
externas magis occupat partes.

## III. Indicantia.

1 Emollitionem indicat omnis durities in partibus  
præter naturam occurrens, earumque functionem  
impediens.2 Varii tumores & infarctus viscera aliasque partes  
occupantes.

3 Feces alvinæ induratae.

4 Calculus ureteribus impactus.

## IV. Remedia.

Mucilag. Hord.

Gelatinæ.

Rad. Alth.

Lil. alb.

Malv.

Herb. Malv.

Pariet.

Branc. ursin.

Atrippl.

Mercurial.

Chamom.

Verbasc.

Flor. Chamom.

Melilot.

Verbasc.

Linar.

Violar.

Persic.

Sem. Lini.

Fan. græc.

Ficus.

Dactyli.

Passule.

Crocus.

G. Ammon.

Galb.

Sperm. cet.

Mel.

Pinguet. human.

Cerv.

Hirc.

Anser.

Canis.

Ol. Amygd. dulc.

Chamom.

Lil. alb.

Lini.

Hyosc.

Scorpion.

Ungu. de Alth.

Anodyn.

Medull. crur. vit.

Decoct. Nephrit. Forest.

Empl. de Hyosc.

Cicut.

Ammon.

Diach. f. &amp; c. G.

Melilot.

Sperm. ranar.

## V. Formulæ Remediorum.

## 1 Emulsiones Mucilaginosæ.

R. Amygd. d. excort. ℥iv. R. Amygd. d. excort. ℥iv.

c. Mucilag. hord. q. s. c. Gelat. C. C. cal. q. s.

F. Emulsio.

F. l. a. Emulsio.

D. sæpius calide.

D. sæpius calide.

## 2 Linctus emolliens.

R. Ol. Amygd. dulc.

Sir. violar.

Sacch. Cand. ā. ℥ss.

Sperm. cet. ℥ij. M.

R. Ol. Lini. ℥ss.

Sperm. cet. ℥j. M.

D. pro una vice.

## 3 Decoctum emolliens.

R. Rad. Alth.

Liquirit. ā. ℥ss.

Herb. Malv.

Flor. Chamom. ā. mj.

Violar. p. ij.

Dactyl.

Fic. pingu. ā. N. iv.

Incis. Coq. in Aq. f. ℥. ij.

Colat. D. calide.



4 Clyster. emolliens.  
*Rx. Rad. Alth.* *Lini ana. ℥ij.*  
*Lil. alb. ana. ℥ss.* *Incis. coq. in f. q. Aq. f.*  
*Herb. Malv.* *Colat. ℥x. adde*  
*Pariet.* *Ungu. Clysmat.*  
*Violar.* *Ol. Lil. alb. ana. ℥ss.*  
*Flor. Chamom. ana. mfs.* *Vitell. Ovor. N. 1. M.*  
*Sem. Fenugr.*

5 Cataplasma emolliens.  
*Rx. Rad. Alth.* *Melil. ana. mj.*  
*Lil. alb. ana. ℥ij.* *Incis. coq. in Lact. q. f. tra-*  
*Herb. Malv.* *jiciatur per setac. adde*  
*Parietar.* *Farin. Sem. Lin. ℥j.*  
*Mercur.* *Ol. Lil. alb. q. f. M.*  
*Flor. Chamom.* *F. Cataplasma.*  
*Verbasc.*

6 Unguentum emolliens.  
*Rx. Ungu. de Alth. ℥j.* *Ol. Aneth.*  
*Anod. ℥ss. M.* *Ping. hum. ana. ℥vj.*  
*applicetur calide.* *M.*  
*Rx. Ung. de Alth. ℥ij.* *applicetur calide.*

7 Balneum emolliens.  
*Rx. Herb. Malv.* *Chamom. ā. mvj.*  
*Pariet.* *Incis. includ. facc. & coq.*  
*Violar.* *in f. q. Aq. f. pro Balneo.*

8 Emplastrum emolliens & resoluens.  
*Rx. Empl. de Ammon.* *Melle. Ol. Charesol.*  
*Hyosc.* *applicetur calide locis Scirr-*  
*Cicut. ana. ℥j.* *rho affectis.*

#### VI. Modus operandi Remediorum.

- 1 Quædam humectando tantum partes duras emolliunt, uti aqua calida.
- 2 Quædam solo calore emolliunt & simul resolvunt, uti lintamina calida, aut fatus sicci calidi.
- 3 Quædam emolliunt mucilaginem aquosam, uti Balnea Decocta, Fatus, Clysteres, Cataplasmata &c. ex emollientibus herbis & radicibus parata.
- 4 Quædam relaxant ob partes oleosas, quibus fibras nimis tensas flexiles reddunt, & emolliunt, uti olea & Pinguedines & ex his parata Unguenta.
- 5 Quædam emolliunt & resolvunt ob partes pingues oleosas & gummatosas, uti emplastra recensita.

#### VII. Regula & Cautela Practice.

- 1 Pro diversitate affectuum emollientibus modo jungantur resolutiva, modo Carminativa, modo Alexipharmaca.
- 2 In tumoribus scirrhus malignis, emollientia minime applicentur, quoniam tales affectus exasperant.
- 3 In Tumoribus emolliendis, remediis externis semper jungantur interna resolutiva.
- 4 Si ulceribus emollientia applicantur, propter pororum relaxationem major humorum fit affluxus & ulcera magis sordida redduntur.
- 5 In Scirrhis Hepatis Empl. de Cicut. de Hyoscya- mo, & Emplast. de Ammoniaco ceteris facile pal- mam præripiunt, diu tamen continuari & interne resolutiva exhiberi debent.
- 6 Numquam nimis diu emolliendum est, ne nimius ad partes affectas fiat affluxus.
- 7 In affectibus Pulmonum, ubi copiosa mucosa ma- teria hæret in Pulmonibus, emollientiatam inter- na quam externa minus profunt, quia poros rela- xando majori humorum affluxui ansum præbent.

### III. De Alteratione motuum.

#### 1. De motuum excedentium correctione.

##### I. Definitio.

Motuum excedentium correctio est operatio artifi- cialis, cujus ope motus excedentes per convenientia remedia ad mediocritatis statum reducuntur.

##### II. Differentia.

- 1 Alia instituitur per remedia interna, opiata scilicet temperantia &c.
- 2 Alia vero per externa.

### III. Indicantia.

- 1 Omnis generis affectus spastici & convulsivi.
- 2 Motus febriles excedentes.
- 3 Vigilæ nimia.

### IV. Remedia.

#### 1 Interna.

*Nitrum.* *Extract. Opii.*  
*Antimoniat.* *Croci.*  
*Cinnabar. nat.* *Pap. rh.*  
*Crocus.* *Theriac. Androm.*  
*Sem. 4. frig. maj.* *cælest.*  
*Papav. alb.* *Diascord.*  
*Lactuc.* *Essent. Anodyn.*  
*Amygd. dulc.* *dulc.*  
*Aq. flor. Sambuc.* *Tinct. Papav. rh.*  
*Pap. rhæad.* *Sir. Pap. f. & rh.*  
*Laud. Opiat.* *Conf. Pap. rh.*  
*Liquid. Syd.* *Pil. de Cynogl.*

#### 2 Externa.

*Herb. Hyosc.* *Mica Panis simil.*  
*Linar.* *Ol. Hyosc.*  
*Chamom.* *Aneth.*  
*Scrophul.* *Scorpion.*  
*Flor. Chamom.* *Lumbric.*  
*Verbasc.* *Nucl. Persic.*  
*Aneth.* *Nucist. expr.*  
*Pap. rh.* *Ungt. Dialtb.*  
*Melil.* *Anod.*  
*Crocus.* *Alabastr.*  
*Furf.* *Empl. de Hyosc.*  
*Sem. Hyosc.* *Cicut.*  
*Papav.* *Melilot.*  
*Lin.* *Bacc. laur.*  
*4. Carmin.* *Theriaca.*  
*Nucl. Persic.*

### V. Formula Remediorum.

#### 1. Internorum.

##### 1 Pulveres.

*Rx. C. C. Philos. ℥j.* *Rx. Pulv. antispasm. ℥j.*  
*Cinnabar. nat. gr. xv.* *Spec. de Hyac. gr. xv.*  
*L. O. gr. iij. M.* *MP. de Cynogl. gr. ijs. M.*  
*div. in 3. p. aq.* *div. in 3. p. aq.*  
*Rx. Succ. alb. præp.* *Rx. Nutr. depur.*  
*Cera. l. r. præp. ā. ℥ss.* *Tart. Vitruclat. ā. ℥ss.*  
*Cinnabar. Antimon. ℥j.* *Spec. de Hyac.*  
*L. O.* *Cinnabar. Antimon. gr. xv.*  
*Extr. croc. ā. gr. j. M.* *MP. de Cynogl. gr. ij. M.*  
*pro 3. vel 4. dof.* *D. ut antea.*

##### 2 Potiunculæ.

*Rx. Aq. Menth.* *Rx. Aq. fl. samb. ℥iv.*  
*Papav. rh. ā. ℥ij.* *Pulv. antispasm. ℥iv.*  
*Tinct. anod. ℥j.* *Spec. de Hyac. gr. xv.*  
*Sir. Pap. rh. ℥ss. M.* *L. O. gr. ij.*  
*D. fino. 4. horis aliquot co-* *Sir. Pap. simpl. ℥ss. M.*  
*chlearia.* *D. ut antea.*

##### 3 Emulsiones.

*Rx. Amygd. dulc. ℥ss.* *Rx. Sem. 4. frig. maj. ana. ℥ij.*  
*Sem. Pap. alb.* *Pap. alb. ℥ss.*  
*Card. Mar. ā. ℥ij.* *Aq. Card. Mar.*  
*Aq. fl. Samb.* *Bened. q. f.*  
*Rub. id. q. f.* *F. l. a. Emulsio.*  
*F. l. a. Emulsio.* *Colat. ℥vi. adde*  
*Colat. ℥vj. adde* *Antimon. diaph.*  
*C. C. Phil. ℥ij.* *Matr. perl. ana. ℥ss.*  
*Sacch. perlat. q. f. M.* *Satch. Canar. q. f. M.*  
*D. cochleatim.* *D. cochleatim.*

##### 4 Pilulæ.

*Rx. Extr. torment. gr. xv.* *Rx. Ther. cal. gr. iv.*  
*Ther. cal. gr. ij.* *F. Pil. iv.*  
*L. O. gr. ii. M.* *Deaurentur.*  
*F. Pil. N. xx.* *D. vesperi.*

##### 5 Boli.

*Rx. Conf. Pap. rh. ℥j.* *Rx. Conserv. rosar. ℥j.*  
*C. C. ust. ℥j.* *Matr. perlar.*  
*Cinnabar. nat. gr. vj.* *Antimon. diaph. ana. gr. xv.*  
*Ther.*



*Ther. cal. gr. ij.* *L. O. gr. ij.*  
*Sir. Papav. f. q. f.* *Sir. pap. rh. q. f.*  
*M. F. Bolus.* *M. F. Bolus.*  
*D. Vesperi.* *D. ut antea.*

## 2. Externorum.

## 1 Cataplasmata.

*R. Rad. Lil. alb. ℥ij.* *R. Mic. pan. albiss. q. f.*  
*Herb. 5. emoll. mii.* *Lact. vaccin. q. f.*  
*Flor. Chamom.* *Coq. ad consist. Catapl. adde*  
*Verbasc. ana. m.* *Vitell. ov. N. iij.*  
*Coq. inf. q. Lact. ad putri-* *Croc. ℥ij. M.*  
*loginem.* *Hocce Cataplasma instar o-*  
*Pulpæ traxeatæ adde* *mnium esse potest, egregie*  
*Pulv. Sem. Lin. ℥ij.* *enim emollit & dolores se-*  
*Ol. Chamom. ℥j. M.* *dat.*

## 2 Linimenta.

*R. Ungu. Alabastr. ℥ij.* *R. Ungu. Alabastr.*  
*Ol. Nucl. Persic. ℥j. M.* *Anod. ana. ℥ij.*  
*illinantur temporibus.* *Ol. Aneth. M.*

*Reliquas Formulas externas vide supra, ubi de Partium*  
*duarum emolitione actum fuit.*

## VI. Modus operandi Remediorum.

- 1 Quædam fibras nimis tenfas relaxant & emolliunt, & hoc modo dolores sistunt, unde huc pertinent omnia Emollientia.
- 2 Quædam nimium fibrarum motum compescunt, uti Cinnabarina & opiata legitime correctæ.
- 3 Quædam humorum motum nimium temperant & aliquo modo sistunt, uti Nitrosa, Emulsiva, & ipsa etiam acida ac absorbentia.

## VII. Regule &amp; Cautela Practica.

- 1 Anodyna non quovis tempore conveniunt, maxime proficua sunt tempore vespertino, si morbi conditio illorum usum permittit.
- 2 Opiata nisi legitime correctæ sint, nunquam in usum trahantur.
- 3 Pilulæ genuinæ Wildegansii reliquis Opiatis facile palmam præripiunt, sed vera earum descriptio satis est rara.
- 4 Opiata minus conveniunt in motibus nimis cum magna humorum turgescencia conjunctis, aut ad excretionem tendentibus, suppressis enim motibus, materia noxia remanet in corpore & corrumpitur, quod inpr. deprehenditur in Febribus.
- 5 Fractis viribus opiata minime sunt exhibenda, quoniam majorem post se trahunt debilitatem, aut mortem ipsam.
- 6 In motibus febrilibus nimis compescendis, Nitrosa longe tutiora sunt quam Opiata.
- 7 In affectibus spastico Arthriticis, Opiata quidem sistunt aliquo inodo dolorem, sed pauco elapso tempore dolores utpl. longe graviores fiunt, aut facile sequitur materiæ morbificæ cum summo periculo ad interiora recessio.
- 8 In affectibus chronicis a materiæ lentore originem trahentibus, Opiata maxime noxia sunt, quoniam materiam motus sistendo magis incrassant.
- 9 Opiata nunquam dentur, nisi universalis præmissa fuerint.
- 10 In Febrium augmento, Opiata nunquam conveniunt, magis vero profunt, si in declinatione earum cum aliis dosi refracta exhibentur.
- 11 Cinnabarina in Febribus tantum non omnibus tantum tutissima anodyna usurpari possunt.
- 12 Essentia dulcis optimum est anodynum & hinc in omnibus morbis sine ullo periculo reliquis remediis vel interponi vel jungi potest, quatenus Naturam confortando quascunque excretionem promovet, uti id millies observavimus.
- 13 Emulsiones, Mucilagines, aliaque temperantia sæpius plus præstant quam Opiata, & longe etiam tutiora sunt, inpr. in Febribus,
- 14 Anodyna externa in affectibus arthriticis partibus dolentibus applicata, stuporem sæpius diu durantem inducunt.
- 15 Emulsiones anodynæ externæ sæpius ad profligandas vigilias nimias cum insigni fructu usurpantur.

16 Pediluvia versus vespem aut nocturno tempore usurpata, somnum sæpius optime promovent, sed febris absit, necesse est.

17 Frustra utpl. laborant, qui vigilias nimias in exacerbatione Febrium narcoticis externis compescere volunt.

## 2. De Corroboratione per Analeptica frigida.

## I. Definitio.

Corroboratio hæc est species Methodi Medendi, eum in finem instituta, partim ut nimius humorum æstus temperetur, partim etiam, ut nimia fibrarum agitatio aliquo modo per remedia convenientia compescatur.

## II. Differentia.

- 1 Alia respicit humores nimis resolutos & inde dependentem virium debilitatem.
- 2 Alia vero pro scopo habet motum nimium fibrarum, resolutionem humorum producentem.

## III. Indicantia.

- 1 Sunt omnis generis morbi & inprimis variæ febres, ubi tali Analepsi opus est.
- 2 Nimia humorum resolutio a calore externo aut etiam ab assumptis.

## IV. Remedia.

<i>Corallia rubra.</i>	<i>Succ. citr. rec.</i>
<i>Nitrum.</i>	<i>Tinct. Rosar.</i>
<i>Cryst. mont.</i>	<i>Violar.</i>
<i>Santalum.</i>	<i>Bellid.</i>
<i>Sem. 4. frig. maj.</i>	<i>Rob. Berber.</i>
<i>Amygd. dulc.</i>	<i>Cydon.</i>
<i>Aq. fl. cord.</i>	<i>Ceras. acid.</i>
<i>Cord. ex succ.</i>	<i>Rib.</i>
<i>Spir. Nitr.</i>	<i>Cynosbat.</i>
<i>Sir. Ceras. acid.</i>	<i>Acet. Rosac.</i>
<i>Corall.</i>	<i>Condit. Berb.</i>
<i>Acetof. Citr.</i>	<i>Ceras. acid.</i>
<i>Conserv. Ros. f. &amp; Vitriolat.</i>	<i>Carn. Citr.</i>
<i>Fl. Tunic.</i>	<i>Cydon.</i>
<i>Acetof.</i>	<i>Cynob.</i>
<i>Pulp. citr.</i>	<i>Rib.</i>

## V. Formule Remediorum.

## 1 Potiunculae.

<i>R. Aq. Bugloss.</i>	<i>R. Aq. Borrage. ℥iv.</i>
<i>Borrag. a. ℥ij.</i>	<i>Cinnam. cyd. ℥vj.</i>
<i>Cord. frig. ℥j.</i>	<i>Rob. Rib.</i>
<i>Succ. Citr. rec.</i>	<i>Berb. a. ℥iij.</i>
<i>Rob. Cydon. a. ℥iij.</i>	<i>Conf. Alex. inc. ℥j.</i>
<i>Conf. Alk. inc. ℥j.</i>	<i>Ess. dulc. ℥ss.</i>
<i>Sir. acetof. citr. ℥ss. M.</i>	<i>Sir. Ceras. acid. ℥ss.</i>
<i>D. sæpius cochleatim.</i>	<i>D. ut antea.</i>

## 2 Julepi.

<i>R. Decoct. C. C. B. j.</i>	<i>R. Decoct. Citr. B. j.</i>
<i>Succ. citr. ℥j.</i>	<i>Rob. Ceras. acid. ℥j.</i>
<i>Rob. Ceras. acid.</i>	<i>Rib.</i>
<i>Sir. acetof. Citr.</i>	<i>Berb. a. ℥ss.</i>
<i>Cydon. a. ℥vj.</i>	<i>Sir. acetof. Citr.</i>
<i>Spir. Nitr. gutt. vj. M.</i>	<i>Granat. a. ℥vj.</i>
<i>D. sæpius.</i>	<i>Spir. Vitrioli gutt. vj. M.</i>

## 3 Emulsiones.

<i>R. Sem. Citr. ℥iij.</i>	<i>R. Amygd. d. exc. ℥ss.</i>
<i>4. frig. maj. a. ℥j.</i>	<i>Sem. Citr. ℥iij.</i>
<i>Aq. 4. fl. cord. q. f.</i>	<i>Aq. Borrage.</i>
<i>F. l. a. Emulsio.</i>	<i>Bugloss. ana. q. f.</i>
<i>Colat. ℥vj. adde</i>	<i>F. l. a. Emulsio.</i>
<i>Cryst. mont. ℥ss.</i>	<i>Colat. ℥vj. adde</i>
<i>Sacch. perlat. q. f. M.</i>	<i>Matr. perl. ℥ij.</i>
<i>D. sæpius cochl. aliquot.</i>	<i>Sacch. Canar. q. f. M.</i>

## 4 Electuaria.

<i>R. Conf. Rosar.</i>	<i>R. Conserv. fl. Tunic.</i>
<i>Pulp. citr. ana. ℥vi.</i>	<i>Acetofell.</i>
<i>Rob. Ceras. acid.</i>	<i>Mixt. Cydon. ana. ℥ss.</i>
<i>Cinosb. ana. ℥ij.</i>	<i>Rob. Rib.</i>
<i>Condit. carn. citr. ℥ss.</i>	<i>Berb. ana. ℥iij.</i>
<i>Conf. de Hyac. inc. ℥j.</i>	<i>Conf. Alk. incis. ℥ss.</i>
<i>Sir. acetof. citr. q. f.</i>	<i>Sir. ceras. acid. q. f.</i>
<i>M. F. Elect. D. aliquot cusp.</i>	<i>M. F. Electuarium.</i>
<i>cultr.</i>	<i>D. ut antea.</i>



VI. *Modus operandi Remediorum.*

- 1 Quædam incrassant humores & nimiam eorum fluxilitatem tollunt, uti sunt Nitrosa & blanda acida.
- 2 Quædam ipsas fibras stringunt & nimium eorum motum hoc ipso impediunt, uti modo dicta acida & lenia Adstringentia.

VII. *Regula & Cautela Practica.*

- 1 Cum talis Analepsis potissimum in Febribus locum habeat, ab initio tantum blanda acida aut Nitrosa exhibeantur, in declinatione vero corallia reliquis adduntur; in principio enim data, facile excretionibus necessarias impediunt.
- 2 Nitrosa magis conveniunt subjectis cholericis, acida vero sanguineis.
- 3 Emulsiones in tali casu optimæ quoque sunt, quatenus humores acres in sanguine obtundunt.
- 4 In febribus acutis Diaphoretica & Alexipharmaca Refrigerantibus semper sunt interponenda, ut partes acres sanguini inhærentes, per Diaphoresin expellantur.
- 5 Abusus refrigerantium remediorum maxime est vitandus, ne motus febriles nimium imminuantur.

3. *De Motuum deficientium exstimulatione per remedia calida.*I. *Definitio.*

Operatio hæc est species Methodi Medendi, eum in finem instituta, ut per remedia convenientia, Tonica scil. & Nervina, debitus partium motus restitatur.

II. *Differentia.*

- 1 Alia est *universalis*, quæ scil. debilitatem universalem respicit & viribus prospicit per remedia *Analeptica* & *Confortantia*.
- 2 Alia est *particularis*, quæ scil. motum debilem & laxitatem partium quarundam restituit: unde huc pertinent vulgo sic dicta Cephalica, Pectoralia, Stomachica, Uterina, Aphrodisiaca &c.

III. *Indicantia.*

- 1 *Universalis* virium defectus in omnis generis morbis.
- 2 *Particularis* partium laxitas aut debilitas, Ventriculi v. g. uteri, partium genitalium in viris.
- 3 *Resolutio* partium in Apoplexia, Paralyfi &c.

IV. *Remedia.*

<i>Rad. Ari.</i>	<i>Aq. Meliss.</i>
<i>Galang.</i>	<i>Cinnam. c. Vin.</i>
<i>Zedoar.</i>	<i>cydon.</i>
<i>Pimp. alb.</i>	<i>Cordial.</i>
<i>Herb. Major.</i>	<i>Carbunc.</i>
<i>Rosmar.</i>	<i>Vit. Mul.</i>
<i>Serpill.</i>	<i>Ess. Cinnam.</i>
<i>Meliss. &amp;c.</i>	<i>Ambr.</i>
<i>Flor. Anth.</i>	<i>Dulc.</i>
<i>Lavend. &amp;c.</i>	<i>Pulv. Solar.</i>
<i>Cinnam. aliaq; aromat.</i>	<i>Niger. Hall.</i>
<i>Ambra.</i>	<i>Spir. reser.</i>
<i>Moschus.</i>	<i>Sal * ci.</i>
<i>Zibethum.</i>	<i>Sal volat. oleos.</i>
<i>Crocus.</i>	<i>Sir. Cinnam.</i>
<i>Spec. Cordial.</i>	<i>Conf. Alk.</i>
<i>Diamb.</i>	<i>de Hyac.</i>

V. *Formulæ Remediorum.*1 *Pulveres.*

<i>R. Pul. Stomac. Birckm. ʒij</i>	<i>R. Pulv. Solar. dos. vj.</i>
<i>Ambr. gr. iv.</i>	<i>D. singulis 2. 3. 4. horis.</i>
<i>Ol. Cinnam. gutt. ij. M.</i>	<i>dos. j.</i>
<i>R. Spec. Cordial.</i>	<i>R. Pulv. nigr. dos. j. ij.</i>
<i>Diamb. ʒ. ʒj. M.</i>	<i>D. in summa virium dejectione.</i>
<i>D. 2. cusp. cult.</i>	

2 *Potiunculæ.*

<i>R. Aq. Meliss. ʒij.</i>	<i>R. Aq. ceras. nigr. ʒijj.</i>
<i>Cinnam. c. Vin.</i>	<i>Cinnam. cydon. ʒj.</i>
<i>Cordial. ʒ. ʒvj.</i>	<i>Ess. dulc.</i>
<i>Ess. Ambr.</i>	<i>Ambr. ʒ. ʒj.</i>
<i>Cinnam. ʒ. ʒj.</i>	<i>Conf. Alk. ʒiss.</i>
<i>Sir. Cinnam. ʒij. M.</i>	<i>Julep. gemmat. ʒss. M.</i>
<i>D. cochleatim.</i>	<i>D. cochleatim.</i>

3 *Electuaria.*

<i>R. Conf. Menth.</i>	<i>R. Consero. Meliss. ʒj.</i>
<i>Fl. tunic.</i>	<i>Zingib. condit. ʒss.</i>
<i>N. M. condit. ʒ. ʒss.</i>	<i>Pulv. Zedoar.</i>
<i>Cinnam. ʒss.</i>	<i>Caryoph.</i>
<i>Caryoph.</i>	<i>Cubeb. ʒ. ʒij.</i>
<i>Zingib. ʒ. ʒij.</i>	<i>Conf. Alk. compl. ʒij.</i>
<i>Ess. Cinnam.</i>	<i>Ess. Ambr.</i>
<i>Ambr. ʒ. ʒss.</i>	<i>Dulc. ʒ. ʒss.</i>
<i>Sir. Cinnam. q. s.</i>	<i>Sir. Cort. Ont. q. s.</i>
<i>M. F. Elect.</i>	<i>M. F. Elect.</i>
<i>D. ter vel quater quovis die 2. cusp. cult.</i>	<i>D. ut antea in confortando stomacho aliisque partibus.</i>

VI. *Modus operandi Remediorum.*

- 1 Quædam agunt in ipsas fibras, easque stimulando Naturam excitant, ut fibras constingat vel humorum cursum promoveat, uti sunt omnia aromatica, salia volatilia &c.
- 2 Quædam agunt in humores eorumque motum restitunt, uti sunt resolventia fere omnia, aromatica &c.
- 3 Quædam tonum partium restitunt, uti blanda Adstringentia aliaque jam recensita.
- 4 Quædam in humores & fibras agunt, atque omnia perficiunt, quæ ab aliis expectari possunt, uti sunt *Essentia dulcis* & *inpr. Pulvis niger Hallensium*.

VII. *Regula & Cautela Practica.*

- 1 Si debilitas ab aliquali remissione partium animalibus actionibus inservientium dependet, quando scil. Natura in morbis acutis actionibus vitalibus unice incumbit, & res corpori infensas remove nititur, confortantia calida minus tuta sunt.
- 2 Vinum generosum modicè & medice exhibitum, sæpius melius roborat, quam alia *Analeptica*.
- 3 *Essentiam dulcem* & *Pulveres Solares* plus quam simplici vice in *Paralyticis* partium relaxationibus summe proficuum deprehendimus.
- 4 *Pulverem Solarem* in *Lipothymiis* post nimias *Hæmorrhagias* sæpius summo cum fructu dedimus, sed doses vel sæpius in tali casu reiterandæ, vel duplicandæ sunt.
- 5 Majorum adhuc virium sunt *Pulveres nigri*, qui fere agonizantibus vires paucis momentis restituerunt, uti id sæpius observavimus.
- 6 Si vires per longinquos morbos consumptæ sunt, nutrientia reliquis præferenda sunt remediis, commodum tamen est, iis interponere *Analeptica*.
- 7 Si experientia docuit quædam remedia magis in certis partibus efficaciam suam edere, ea merito reliquis præferenda sunt, nam non obstantibus quorundam ratiunculis, certissimum est, quædam remedia certis partibus magis convenire.
- 8 Blanda adstringentia & inpr. *Martialia* legitime præparata, tonum viscerum optime restitunt, quare præmissis præmittendis in tali casu in usum trahantur.
- 9 Si infantes juniores insigni debilitate corripuntur, summo cum fructu spirituosique liquores fontanellæ applicantur.
- 10 *Confortantia* externe quoque regioni cordis aut pulsibus applicata, insignem ad roborandum habent usum.
- 11 In stimulantibus partibus genitalibus relaxatis, eo respiciendum semper est, ne *Massa sanguinea* per remedia calida nimis in motum conjiciatur.
- 12 *Stimulantia* talia, inpr. si *cantharides* ipsis admiscuntur, interdum mictum cruentum produciunt, uti id in duobus senibus observavimus.

De rerum toto genere præter naturam e corpore expulsionem.

I. *De flatuum expulsionem.*I. *Definitio.*

Flatuum expulsio est medicatio artificialis, cujus ope flatus in corpore geniti & multas molestias creantes, per remedia convenientia & inpr. *Carminativa* a corpore expelluntur.

II. *Dif-*



I. *Differentia.*

- 1 Alia respicit flatum ipsos, quando scil. flatum per remedia *Carminativa* expelluntur.
- 2 Alia ipsam materiam præparat & removet, per Incidentia & Resolventia, laxantia, Clysteres.

II. *Indicantia.*

- 1 Flatum ipsi intestina præter naturam extendentes & varia incommoda parientes.
- 2 Materia flatuum, quæ ad præcavendam flatuum generationem removeri debet.

IV. *Remedia.*

<i>Rad. Acori.</i>	<i>Tinct. resolv.</i>
<i>Galang. Zedoar.</i>	<i>Ess. Carmin.</i>
<i>Herb. Meliss.</i>	<i>Alexiph.</i>
<i>Flor. Chamom.</i>	<i>Cinnam.</i>
<i>Sem. 4. Carmin.</i>	<i>Cort. Ont.</i>
<i>Citr.</i>	<i>Aq. Meliss.</i>
<i>Cinnamom.</i>	<i>Chamom.</i>
<i>Cort. Ont. Citr.</i>	<i>Fenic. Cinnam.</i>
<i>Extr. Acor.</i>	<i>Carminat.</i>
<i>Acor. condit.</i>	<i>Pil. Becher.</i>
<i>Cond. Carn. Citr.</i>	<i>Balsam. visc.</i>
<i>Sir. Cinnam.</i>	<i>Spir. Nitr. dulc.</i>
<i>Cort. Ont. Citr.</i>	<i>Ol. Carminat.</i>
<i>Acetof. Citr.</i>	<i>dest. Meliss.</i>
<i>Cons. Meliss.</i>	<i>Fenic. Carv.</i>
<i>Pulp. citr.</i>	<i>Cumin. Aneth.</i>

V. *Formula Remediorum.*1. *Pulveres.*

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <i>R. Pulv. Stomac. Birkm.</i>                       | <i>R. Pulv. Zedoar.</i>          |
| <i>3ss</i>   | <i>Galang.</i>                   |
| <i>Ol. dest. Anis. gutt. viii.</i>                   | <i>Anis. ʒi.</i>                 |
| <i>Cinnam. gutt. iv.</i>                             | <i>Cinnam. 3ss.</i>              |
| <i>Caryoph. gutt. ii. M.</i>                         | <i>Ol. dest. Anis. gutt. vi.</i> |
| <i>D. 2. cusp. cultri ante prandium &amp; cenam.</i> | <i>Sacch. 3ss. M.</i>            |

2. *Potiusculæ.*

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <i>R. Aq. Fenic. ʒiii.</i>    | <i>R. Aq. Meliss. ʒiii.</i>      |
| <i>Chamom. c. Vin. ʒi.</i>    | <i>Astomat. ʒi.</i>              |
| <i>Ess. Carmin. ʒii.</i>      | <i>Ess. Alexip. ʒii.</i>         |
| <i>Spir. Nitr. dulc. 3ss.</i> | <i>Spir. Vitrioli dulc. 3ss.</i> |
| <i>Sir. Cort. Ont. 3ss.</i>   | <i>Sir. Cort. Citr. 3ss. M.</i>  |
| <i>D. cochleatim.</i>         | <i>D. ut antea.</i>              |

3. *Essentiæ.*

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>R. Ess. Carmin.</i>         | <i>R. Ess. Cinnam.</i>            |
| <i>Alexiph.</i>                | <i>Spir. Cort. Citr. an. ʒii.</i> |
| <i>Tinct. resolv. ʒ ʒi. M.</i> | <i>Nitr. dulc. 3ss. M.</i>        |
| <i>Dof. 30. 40. gutt.</i>      | <i>D. ut antea.</i>               |

VI. *Modus operandi Remediorum.*

- 1 Quædam materiam stimulo & augendo motum peristalticum expellunt, uti aromata & Resolventia.
- 2 Quædam portam pandunt flatibus, uti clysteres emollientes, Laxantia, Salia neutra &c.
- 3 Quædam materiam flatuum præparant, uti modo dicta evacuantia, absorbentia, incidentia.

VII. *Regula & Cautela Practica.*

- 1 Carminativa nunquam exhibeantur, nisi alvus sit aperta.
- 2 In subjectis Plethoricis, Venæsectio carminativis præmissis præsentaneum sæpius est remedium. Reliqua vid. in Praxi Speciali.

2. *De Vermium expulsionem.*Vid. *Praxis Specialis.*3. *De Calculorum remotione.*Vid. *Praxis Specialis.*

*Regula & Observationes, reliquas Methodi Medendi species complectentes.*

I. *De Methodo Medendi causis morborum virulentis opposita.*

- 1 Ubique virulentæ occurrunt causæ morbificæ, ibi Bezoardicis ac Alexipharmacis opus est.
- 2 Omnia Bezoardica respiciunt vel promptam veneni

expulsionem, vel ejusdem mitigationem & successivam excretionem.

- 3 Si miasmata maligna hærent in Massa sanguinea, eorum excretionem optime promovent supra laudata diaphoretica varia v. g. *Rad. Contraj. Diptamn. Petasit. Imperat. &c. Herb. Scord. Galeg. &c. Sambus. Succinum* aliaque ex his parata.

- 4 Si miasmata illa sunt admodum volatilia, acida bezoardicis optimo consilio junguntur, ut hoc modo miasmata illa figantur & expellantur.

- 5 Nimiam humorum resolutionem, quam ordinarie talia miasmata producant, optime præcavent partim acida modo laudata, partim absorbentia & leniter adstringentia, partim vero emulsiva & mucilaginosa.

- 6 In morbis malignis bezoardica & volatilia cum regimine data, fere semper malum edunt effectum, transpiratio vero lenis & continua, bezoardicorum usum sequens, optima est in talibus morbis.

- 7 Contra venena animalium, motum humorum fermentativo putredinosum excitantia, optime conveniunt Theriacalia, Tinct. bezoardica, venenum prompte expellentia, quibus jungantur acida ad impediendam humorum resolutionem.

- 8 Externe locus statim scarificetur, ut cum sanguine pars veneni extrahatur, ejusque promptus in Massam sanguineam ingressus impediatur, vulnus vero sive pars læsa simul aceto, theriaca, ruta &c. fricetur.

- 9 Sumpto veneno corrosivo, optima remedia sunt Lac calidum copiose haustum, & oleosa, quæ inviscant partes corrosivas, ut absque noxâ postmodum eiici queant.

- 10 Venenorum ex vegetabili regno desumptorum vim deleteriam maxime domant acida, post venena sumpta statim exhibita.

II. *De Motibus Naturæ extraordinariis & Symptomatibus.*

- 1 In motibus Naturæ extraordinariis in morbis occurrentibus, semper respiciendum est, an motus excedant vel deficient.

- 2 Si motus morbo sunt convenientes, nunquam neque stimulandi neque supprimendi, sed in mediocritate conservandi sunt, ut humores vitiosi expelli queant.

- 3 Motus deficientes per remedia confortantia excitandi sunt, excedentes vero per Nitrosa, Acida, Gummata, Anodyna &c. optime refrænari possunt.

- 4 Motus extraordinarii, nunquam nisi remota prius causa morbifica supprimi debent, si sponte non cessant.

- 5 In cura morborum ad symptomata; nisi urgeant, non est respiciendum.

- 6 Si motus ad mediocritatis statum rediguntur, eo ipso etiam mitigantur symptomata.

- 7 In morbis malignis, symptomatibus levibus visis nunquam est fidendum, latet enim anguis in herba.

III. *De Erroribus Naturæ & Medicorum.*

- 1 Si medicus errores Naturæ corrigere cupit, cognitionem veram & exactam omnium actionum & motuum habere debet, qua si destituitur, frustra laborat, & errantem Naturam adhuc magis confundit.

- 2 Etiam si Natura in motibus erret, Medicus tales motus nunquam plane & plenarie supprimat, quoniam, non obstante errore circa modum, nihilominus causæ præter naturali opponuntur: corrigendi itaque potius sunt, quantum quidem possibile est.

- 3 In Hæmorrhagiis, ubi per errorem Naturæ vel plus sanguinis quam decet, vel per inconvenientia loca evacuat, adstringentia fortiora nunquam, nisi summa urgente necessitate, exhibeantur, ne plenaria fluentis sanguinis cum damno sequatur suppressio.

- 4 Contumaces & pertinaces affectus spastici, nunquam subito supprimantur, sed potius temperentur, ne



ne materia morbifica vel majora mala producat in parte affecta, vel ad interiora summo cum periculo regrediatur.

- 5 Nunquam Medicus drastica præscribat remedia, ubi mitioribus res peragi potest.
- 6 Medicus semper in morbis respiciat ad secretiones, ad Excretiones, an scil. illæ contingant in morbis, ubi fieri debent, an humores sufficienti copia excernentur, & an debito etiam tempore contingant.
- 7 In habitualibus morbis, Medicus admodum caute procedat: Si enim eos uno impetu suppressere conatur, semper pejora sequuntur mala, quare Natura sensim sensimque ab errore revocanda est. Reliquas Cautelas vid. hinc inde in *Praxi Speciali*.

IV. De rebus non naturalibus.

Vid. Tab. de *Dieta*.

V. De Causis Naturalibus.

- 1 Juniores nunquam remediis fortioribus, sed potius mitioribus tractandi sunt, quoniam admodum sunt sensibiles.
- 2 In quavis ætate respiciendum est ad peculiare excretionem & sanguinis translationes, an scil. respectu ætatis congruæ sint: si sunt incongruæ, Naturæ placide succurrendum est per remedia convenientia.
- 3 Adolescentibus & Juenibus volatilia & commoventia remedia minus conveniunt, quoniam sanguinem jam satis mobilem magis commovent & resolvunt.
- 4 Senibus confortantia & resolventia remedia præ ceteris conveniunt & hinc etiam in variis morbis reliquis interponenda sunt remediis.
- 5 Fœminæ in quovis morbo semper mitius tractandæ sunt, quam viri, propter majorem sensibilitatem.
- 6 Omnia fortiora commoventia sanguineis & cholericis sunt noxia & ad graviora mala vel disponunt, vel actu etiam illos in ea præcipitant.
- 7 In morbis cum siti & æstu conjunctis, blanda acida Sanguineorum, nitrosa vero Cholericeorum sunt solatium.
- 8 Qui vasa ampliora habent, iis Venæsectio qui vero minoribus præditi sunt, scarificatio magis convenit.
- 9 Motus & labor, sed non præceps, Phlegmaticis & Melancholicis quam maxime convenit.
- 10 In Phlegmaticis ad excitandas excretiones semper diutius insistendum est remediis, quam in aliis, ubi secretiones & excretiones prompte procedunt, ut copiosum serum moderate evacuetur.
- 11 Acidularum usus, non nisi pure sanguineis aut temperamento sanguineo prædominante præditi convenit: Thermarum circumspæctus usus non nisi iisdem & Phlegmaticis.
- 12 Quo magis sensibilia sunt subjecta, eo minus ferunt omnia commoventia.
- 13 Consuetudo semel introducta, non temere uno impetu est infringenda, ne graviora sequantur mala.
- 14 Si homines excretionibus quibusdam assueti sunt, sensim subtrahenda est materia, aut ad alia loca derivanda, ut per ea evacuetur, quod optime fieri potest, si medicatio brevi tempore ante paroxysmum instituitur.
- 15 Ad invertendam consuetudinem, semper diu remediis insistendum est, alias frustra laborat Medicus.
- 16 Mutato vitæ genere, sæpius mutatur ipsa consuetudo morbosa.

# CHIRURGIA.

## De Chirurgia in genere.

I. *Definitio*. **C**hirurgia est ars nobilissima, mediante manuum ministerio, læsiones humani corporis remove satagens.

II. *Differentia*.

- 1 Alia est *Theoretica*, inexacta omnium Operationum cognitione consistens, qualis Medicis plerisque nostro tempore familiaris esse solet; alia *Practica*, cum theoria sive cognitione ipsam Praxin conjungens, quam Chirurgi nostrates, si Magistrorum titulum mereri volunt, exacte possidere debent.
- 2 Alia in genere circa plures Operationes, v. g. vulnera, ulcera, luxationes, fracturas &c. occupata est, easque curandas in se suscipit, qualis vulgo sic dictis Chirurgis solet esse solennis, alia *specialiter* unam tantum & alteram Operationem, eamque vel graviolem, vel delicatiorlem pro scopo habet, v. g. Extractionem fœtus, Sectionem calculi & Herniæ, Depositionem Cataractæ &c. cujus magistri *Operatores* vulgo vocantur.

III. *Operationes*.

- 1 Alii recensent quatuor.
  - a *Synthefin*, quæ separata iterum conjungit.
  - b *Diæresin*, quæ ea separat, quæ contra naturæ ordinem sunt conjuncta aut continua.
  - c *Exæresin*, quæ superflua & heterogenea a corpore removet & tollit.
  - d *Anaplerofin* seu *Prosthesisin*, qua ea restituere tentamus, quæ natura negavit, aut per infortunium corpori nostro sunt abrepta.
- 2 Alii Clariss. van. Horne secuti, quibus & nos adjungimus, ea dividunt in *Generales* & *Speciales*.
  - a Sub *generalibus* comprehendunt:
    - 1 *Explorationem*.
    - 2 *Fasciarum circumductionem*.
    - 3 *Splenium applicationem*.
  - b Ad *speciales* referunt.
    - 1 *Synthefin*.
    - 2 *Diæresin*.
    - 3 *Exæresin*.
    - 4 *Prosthesisin* seu *Anaplerofin*.
    - 5 *Aphæresin*, quæ in ablatione supervacui occupata est.
    - 6 *Diorthofin*, qua membra, malam conformationem referentia, ad naturalem reducuntur figuram.

IV. *Instrumenta*.

- 1 Ratione usus sunt vel *generalia*, pluribus operationibus intervientia: ut *forcipes* varii generis, *scalpella*, *lanceolæ*, *novicula*, *forfices*, *spathæ*, *acus*, *styli* pro pervestigandis vulneribus, *ferræ*, *fasciæ* & *splenia* varia &c. vel *specialia*, huic vel illi tantum Operationi propria: ut *acus* oblonga pro deponenda cataracta, *trepanum* seu *mediolus* pro perforando cranio, *Catheter* ad suppressam urinam & vesica evacuantum, vel calculum vesicæ explorandum, *cannula perforata* circa extremitatem acuminata, *Gallic Trocar* dicta, *Paracentesibus* destinata, *forceps* peculiaris, *pelicanus* appellatus, pro evellendis dentibus, *falcatus culter* latus & acutus pro incidenda cute & carne in amputationibus &c.
  - 2 Ratione figuræ, sunt vel longa vel brevia, rotunda vel oblonga, acuta vel minus acuta.
- Ratione materiæ, alia fiunt ex *argento*, ut *styli* pro investigandis vulneribus, *catheteres*, *cannulæ*, *acus* pro deponenda cataracta, cujus tamen extremitas ut plurimum & quidem optime e chalybe paratur, *spathæ*; alia ex *ferro*, vel chalybe potius, ut *forfices*,



fices, forcipes, novaculæ, lanceolæ, scalpella, ferre; ex *stanno* alia, ut siphones; alia ex vitro, orichalco vel cornu ut *Cucurbitula*; ex lino alia, ut varii generis fasciæ, splenia.

V. *Remedia.*

Sunt vel *interna*, vel *externa*.

- 1 *Interna*, quæ Chirurghi nostrates adhibent, in *Decoctis* saltem vulnerariis consistunt, reliqua, si quibus opus est, Medici Directorio committi debent.
- 2 *Externa* varia sunt, nimirum *Cataplasmata*, *Emplastra*, *Epithemata*, *Fomenta*, *Suffumigia*, *Gargarismata*, *Injectiones*, *Clysteres*, *Unguenta*, *Balsama* &c.

VI. *Finis.*

- 1 Chirurgiæ finis idem est ac Medicinæ, strictè sic dictæ, ut nimirum læsiones corporis humani removeantur.
- 2 Differunt in eo, quod hæc magis circa internas læsiones sit occupata, illa circa externas.
- 3 Adhibet Medicina pro fine suo obtinendo remedia e triplici regno desumpta, Chirurgia instrumenta magis quam remedia interna.
- 4 Respicit Chirurgia magis mala circa solidas partes externe evenientia, Medicina vero læsiones partium & fluidarum & solidarum interne contingentes.

VII. *Cautela & Observationes.*

- 1 Medicinæ & Chirurgiæ perpetuus debet esse nexus, nullus enim perfecti Medici titulum meretur, qui non Chirurgiæ cognitione probe est imbutus, & vice versa Chirurgiæ nemo potest ex omni parte satisfacere, nisi & corporis humani structuram & remedia, fini suo convenientia, cognoscat.
- 2 Anatomia cuique Chirurgo maxime est necessaria: ab hujus enim neglectu innumeri errores suam habent originem.
- 3 Male olim Chirurgia Practica, tanquam pars admodum nobilis a Medicina fuit separata: dantur enim casus, ubi nil solidi perficitur, nisi persona, quæ hanc artem exercet, utraque sit instructa.
- 4 Interim rara hæc avis est, quæ hodie apud paucissimos invenitur Medicos.
- 5 Sufficit autem, rebus sic stantibus, cum pars hæc in speciale artificium transferit, Medicum ejusdem exactam habere cognitionem, ut quid ante, in & post operationem agendum sit, ordinare possit.
- 6 Chirurghi autem a Medicinæ sacris, quæ hodie communiter impuris manibus i. e. indocta mente ingredi conantur, abstineant, & potius cognitionem partium solidarum situs atque figuræ, nec non ipsarum Operationum Chirurgicarum actualem Praxin cum encheirisis sibi commendatas habeant. Sic & Medici & Chirurghi, quivis cum laude suo poterit de fungi officio.
- 7 Chirurgia strictè sic dicta saltem occupata est circa Operationes tam generales quam speciales; adeoque non confundenda est cum Pharmacia & Diætâ, circa quas plures Auctores admodum sunt prolixi:

## D E

## OPERATIONIBUS GENERALIBUS.

I. *De Exploratione.*

I. *Definitio.* **E**Xploratio est actio, mediante qua ad certiore alicujus rei dignotionem pervenire contendimus.

II. *Differentia.*

Alia fit *ratiocinatione*.

2 Alia *sensibus externis*: tactu visu, olfactu, auditu.

3 Alia *instrumentis*.

III. *Modus.*

- 1 *Ratiocinatione* utimur, quando læsiones sunt absconditæ, ita ut in sensus externos haud incurrant, ubi ex prægressis & conjunctis symptomatibus prope nata ferimus judicium; quale quid in læsioni-

bus cranii, abscessibus internis &c. contingit.

- 2 *Sensus externi* vario nobis inserviunt modo: vel enim *tangendo* tumores, fracturas & similia exploramus; vel *inspicendo*, vulnura, ulcera dignoscimus, ubi quandoque etiam in profundis læsionibus instrumenta dilatatoria in usum trahimus, ut eo melius oculis nostris pateant, v.g. Speculum oris, ani, matricis; vel *olfactu* de puris natura judicamus; vel *audiendo* de extravasationibus humorum gravioribus, fracturis &c. concludimus.

- 3 *Instrumentis* nobis opusest, quando profunditas vulneris & ulceris a nobis exploranda est, ubi stylos plerumque argenteos adhibemus: In calculo vesicæ explorando specialiter inservit nobis Catheter. Pertinent etiam huc turundæ, quæ ulcera profunda, ossa cariola sæpius nobis manifestant.

III. *Cautela & Observationes.*

- 1 In læsionibus, quæ non admodum sunt manifestæ, maxime opus est exploratione, ne jussu citius ad Operationem properemus.
- 2 Ad explorationem, eo melius proficiendam, multum contribuit justus patientis situs & tranquilla ejusdem continentia.
- 3 Styli, qui in explorationibus adhibentur, nulla vi, sed leniter sunt intrudendi: alias maximos non tantum pariunt dolores, seu dilacerant quandoque partes adhuc illæsas.

2. *De Fasciatione.*I. *Definitio.*

Fasciatio est operatio, qua læsiones corporis median-  
tibus fasciis deligantur, & splenia, Cataplasmata, emplastra, vel alia, quæ imponi solent, obfirmantur.

II. *Differentia.* Fasciæ differunt

- 1 *Ratione materiæ*: aliæ fiunt ex corio, aliæ ex pan-  
no laneo, ex tela lineæ aliæ, quæ ultimæ maxime sunt solennes.
- 2 *Ratione figuræ*, sunt
  - a Vel longæ vel breves
  - b Latæ vel angustæ.
  - c Simples; ex linteo unico constantes, vel compositæ ex pluribus fasciis conjunctis assutæ.
  - d Communes, pluribus operationibus inservientes, vel propriæ, ad hanc vel illam tantum Operationem *specialem pertinentis*.
- 3 Simples iterum sunt vel *glomeratæ* vel *extremis partibus sciis*.
- 4 *Glomeratæ* vel ex uno tantum capite ab una extremitate ad alteram convolutæ, vel ex duobus capitibus, utraque extremitate versus medium æqualiter complicata, constant.
- 5 Et ex his generalibus divisionibus exurgunt differentiæ speciales fasciarum, huic tantum vel illi operationi inservientium, amplissimumque constitutum campum, quas in Chirurgia speciali accuratius perspicere licebit.
- 6 Porro quælibet fascia ratione formæ dividitur in corpus & capita. Capita nihil aliud sunt, quam quatuor extremitates, eæque vel longitudinales vel laterales. Corpus vocatur illud, quod inter 4. extremitates medium occupat locum.

III. *Modus applicandi.*

In fasciarum applicatione

- 1 Justus patientis situs requiritur.
- 2 Deligatio autem ratione intentionis & casuum variat: quandoque enim initium deligandi a fasciarum extremitatibus fit, quandoque ab earundem medio, quandoque vero proximo ab extremitatibus loco.
- 3 Differt etiam deligatio ratione partis, in qua illa facienda est, sæpius enim immediate in loco affecto deligationem incipimus, quandoque in parte vicina, non raro etiam in parte opposita.
- 4 Modus deligandi est vel simplex, quando unicum & simplicem tantum observamus tractum, vel *compositus*, si diversi tractus adhibentur. Simplex est vel *æqualis* vel *inaequalis*.

a *Æqua-*



a *Æqualis simplex* circulariter fit, quando fascia aliquot vicibus circa partem convolvitur, ut extremitates laterales sibi *exakte* correfpondeant, & unicum quasi circulum efficiant.

b *Inæqualis simplex* quatuor comprehendit species:

- 1 *Asciam*, qua circumvolutiones vel inferiora vel superiora versus producantur & paulatim declinant.
- 2 *Simam* five *incurvatam*, quando circumvolutiones adhuc magis oblique fiunt, sese tamen semper in declinando excipiunt.
- 3 *Repeatem*, quando tractus se invicem non contingunt, sed spatia aperta inter se relinquunt.
- 4 *Inversam* seu reduplicatam, quando ob partis inæqualitatem fasciæ ductus invertuntur & reduplicantur.

c Compositæ etiam variant, prout quæque pars affecta requirit.

#### IV. *Ufus.*

- 1 Ut retineant medicamenta & splenia.
- 2 Ut membra luxata & fracta in situ justo conservent.
- 3 Ut labia vulnerum comprimant.
- 4 Ut in abscessibus & ulceribus effluxum materiæ in profundo vel declivi delitescens adjuvent.
- 5 Ut in quibusdam casibus affluxum nimium humorum prohibeant.

#### V. *Cautelæ & Observationes.*

- 1 Fasciæ efformandæ sunt ex lintheaminibus mundis, aliquali usu jam contritis.
- 2 Non autem nimis molles debent esse, ne in operatione rumpantur.
- 3 Melius est, si secundum flaminum rectitudinem sunt scissæ, quam transverse.
- 4 Neque etiam nodis, futuris aut limbis præditæ sint, ne molestiam parti affectæ pariant.
- 5 In deligatione, nec nimis arcte, nec laxè nimis sunt constringendæ.
- 6 Per constrictionem nimiam facile inflammatio & Gangræna excitatur.
- 7 Quando dolorem parit deligatio, signum est constrictionis iusto majoris.
- 8 A quavis legitima deligatione aliqualem tumorem exurgere necesse est, qui si mollis, indolens & mediocris sit, iustam indigitat fasciationem, si durus atque valde dolorificus, nimiam constrictionem, si vero plane nullus apparet, iusto maiorem laxitatem arguit.
- 9 Finis ipsius deligationis non in loco immediate affecto fieri debet, facile enim exinde dolor excitatur.
- 10 Quando latera fasciarum ab effluxo forte humore conglutinata sunt, & sibi coherent, emollire eadem prius decet, vel per oleum olivarum, vel vinum calefactum.
- 11 Loco fasciarum adhibentur, quandoque laquei, quando nimirum fortiori modo aliquid constringi debet v. g. in castratione, si testiculi sunt abscindendi, in amputationibus, si effluxus sanguinis nimius præcavendus est.

#### 3. *De Spleniorum applicatione.*

##### I. *Definitio.*

Splenia sunt panni linei, aliquoties complicati, partibus affectis, pro replendis cavitatibus vel læsionibus a frigore defendendis, impositi.

##### II. *Differentia.*

- 1 Ratione formæ: alia sunt *quadrata*, alia *oblonga*, splenis quasi figuram referentia, a qua splenia nomen reportavere, *rotunda* alia, alia *triangularia*, alia *integra*, scissa alia, alia *longa*, alia *brevia*.
- 2 Ratione modi imponendi: alia sunt *sicca*, alia *humida*.

##### III. *Materia.*

Fiunt splenia haud ex alia materia, quam pannis lineis, aliquali usu jam contritis, futuris, nodis & limbis destitutis & nulla immunditie præditis.

#### VI. *Ufus.*

- 1 Intervinunt pro implendis cavitatibus, v. g. quæ occurrunt in pedibus, vel brachiis.
- 2 Fasciationi auxilium præstant, ut eo firmitus possit fieri.
- 3 Remedia imposita contegunt,
- 4 Ipsam partem affectam calore blando fovent, ut a frigore nullas injurias patiat.

#### V. *Cautelæ.*

- 1 Splenia neque crassa nimis, neque tenuia esse oportet.
- 2 Efformanda sunt ratione casuum & partium læsarum diversa forma.
- 3 Nullis rugis aut inæqualitatibus debent esse prædita; alias dolorem pariunt.

## D E

### OPERATIONIBUS SPECIALIBUS.

#### I. DE SYNTHESI.

I. *Definitio.* **S**ynthesis est Operatio Chirurgica, qua ea, quæ sunt separata, iterum conjungere conamur.

##### II. *Differentia.*

- 1 Exercetur Synthesis vel in partibus duris & ossis, vel mollibus & carnosis.
- 2 Idque, vel quoad in continuitate sunt læsæ, ut in fracturis, carie, vulneribus, ulceribus; vel in contiguitate, ut in luxatione, prolapsu intestinorum, omenti, uteri &c.

#### I. De Synthesi partium durarum.

##### I. *De Fracturis.*

I. *Definitio.* **F**ractura est separatio continui, in partibus ossis, a vi quadam externa facta.

##### II. *Differentia.*

- 1 Est vel *simplex*, præter fracturam ossis nihil insoliti conjunctum habens; vel *composita*, vulnere, luxatione, inflammatione simul stipata.
- 2 Simplex, ratione modi, fit vel *transversim*, vel per *longitudinem* ossis, ubi fissura audit, vel *confusse*, ita ut os in plura frustula & lamellas comminatur.
- 3 Differt etiam ratione partis, alia enim fit in pedibus, in brachiis alia, alia in costis, in scapulis, alia quando etiam in capite.

##### III. *Causa.*

Est vis quædam externa, lapsus, ictus, contusio fortior, rarissime interna.

##### IV. *Signa.*

- 1 Præcedit lapsus, ictus aut vis quædam externa.
- 2 Præter dolorem, quem ægrotus in parte affecta percipit, movendi facultatem amittit.
- 3 Sequitur fractæ partis intumescencia æqualis, ut plurimum etiam inflammatio.
- 4 Hanc vero, si gravior fuerit, neglectam comitatur quandoque abscessus & Gangræna.
- 5 Aliquando membrum, in quo accidit fractura, altero fit brevius.
- 6 Cognoscuntur autem species fracturæ, partim ex ipso tactu, partim ex concomitantibus symptomatibus, utpote quæ in fissura admodum tarde, quamvis deinde satis violenter, se produnt; si vero simpliciter per transversum os frangitur, mitiora symptomata sequuntur, quam si cum comminutione contingit fractura.

##### V. *Prognosis.*

- 1 Fractura, quæ æqualiter & transversim fit, curatu facilius, quam quæ oblique, & cum prominentia extremitatum contingit.
- 2 Quando ossa fracta e loco sunt propulsa, curatio diffi-



difficilius procedit, quam si pristinum locum haud deseruere.

- 3 Melius est, si unum tantum os est fractum, quam duo, ubi majus periculum.
- 4 Quæ circa mediam partem contingit, melioris notæ censetur, quam quæ circa ossis capita sit.
- 5 Si os in plura frustula comminuitur, periculosum est, propter vulnera & læsiones partium membranacearum, quibus facile abscessus supervenit.
- 6 Quæ circa partes tendinosas contingit, periculosior est, quam quæ in partibus musculosis evenit.
- 7 Fissura Cranii admodum est periculosa.
- 8 Ossa arida & lue Venerea consumpta, facilius franguntur, quam succulenta, robusta.
- 9 Fracturæ cum vulnere fientes, semper periculosiores sunt quam simplices: quia non raro Inflammationem, Gangrænam & Convulsiones pariunt.
- 10 Ossa fracta ut plurimum intra 20. 30. dies consolidantur, quod si vero majora sint, exposcunt quandoque 50. vel 60. dies.
- 11 Facilius autem consolidatio in junioribus & vegetioribus procedit, quam senibus & emaciatis.
- 12 Ossa semel fracta & curata, si iterum franguntur, nunquam in priori loco, sed in alio fracturam patiuntur.

#### VI. Cura.

- 1 Quando de fractura ossis certi sumus, membrum vel manibus vel habenis tantum est extendendum, quantum patientis ætas, ossis magnitudo, repositionis dilatare mora requirit.
- 2 Deinde ad pristinam reducendum est figuram, impellendo ubique extremitates & inæqualitates ad consuetum locum, quem ante fracturam possederant, cujus rei feliciter peractæ & doloris mitigatio & æqualitas partis succedens nos certiores reddit.
- 3 Hoc facto, fractura Emplastro Catagmatico est munienda, & deliganda per duas fascias, unam longiorem, alteram brevior, quarum hæc sursum versus, illa vero primo deorsum, deinde etiam sursum circumvolvitur.
- 4 Ut autem hæc repositio eo firmitus conservetur, consuetudo & necessitas fert, ut partem deligatam ferulis sive plangulis ligneis vel chartaceis crassioribus obfirmemus.
- 5 Imo pro majori securitate & feliciori consolidatione præter hæc membrum affectum in convenienti situ est detinendum, quod vel in capsula lignea, vel pulvinari molliusculo fieri potest, cavendo, ne pars affecta neque sursum, neque deorsum nimis inclinet: quia utrumque membri repositi æqualitatem mutare potest. Sit igitur hæc positio æqualis, paululum tamen sursum versus directa.
- 6 In fissura, si abscessus superveniat, aperiendus est scalpello & caries ossis, si quæ adest, auferenda remediis vel instrumentis convenientibus.
- 7 Si fractura levior cum vulnere fuerit conjuncta, primo, post factam extensionem, repositionis ratio est habenda, postea vulneris labia futuris vel emplastris vulnerariis sunt tractanda.
- 8 Quod si vero aliquid de osse fracto, promineat & extremitas ab aere corrupta sit, hæc antequam os reponatur, lima erit abrasenda, vel forcipe absumenda, interim difficillima est harum fracturarum tractatio.
- 9 Si os in frustula plura fuerit comminutum & cum vulnere conjunctum, ea, quæ sunt separata, eximenda sunt, quæ vero adhuc coherent, naturæ committantur: ipsa enim eadem vel consolidabit vel suo tempore foras extrudet.
- 10 Interim hic maxima prudentia agendum est, ut nimirum symptomata, graviora, supervenientia præcaveantur.
- 11 Consultum igitur est, statim ab initio post impostum Emplastrum Catagmaticum partem affectam exquisitis Discutientibus nervinis & Camphoratis munire.
- 12 Haud fortiter etiam deliganda est pars, facile enim stasis & corruptio contingit; unde frequentiori deligatione & conspectione opus habet.

#### VII. Cautela & Observationes.

- 1 Si Chirurgus adveniens magnam in parte affecta deprehendat inflammationem, eidem mederi prius oportet, antequam repositio instituat.
- 2 In fractura simplici membrum tantum est extendendum, ut alterum in magnitudine adæquet; quod si exterius undique æquale & circa locum affectum vacuitas quædam conspiciatur, bene se res habet.
- 3 Repositionem membri justam ex æqualitate ejusdem colligito.
- 4 Antequam fasciatio instituat, partem affectam spiritui vini, vel vino rubro calefacto illinire decet, postea Emplastro Catagmatico contegere.
- 5 Interne pro Callo promovendo exhibentur quandoque decocta vulneraria.
- 6 Necessaria etiam in quibusdam casibus sunt Venæsectio, lenes purgationes vel clysteres.
- 7 Deligatio non nimis arcte est instituenda: justa est, si dolorem tolerabilem & tumorem mollem digitis cedentem pariat.
- 8 In simplici fractura post tertium vel quartum diem fasciæ sunt resolvendæ, & si tunc omnia æqualia reperias, repositionem ex voto successisse concludas.
- 9 Fracturæ cum comminutione difficulter admodum reponuntur, eo igitur tantum respiciendum, ut durante curatione membrum, quantum possibile, in justo situ & naturali conformatione detineatur.

#### 2. De Luxationibus.

##### I. Definitio.

Luxatio est mutatio situs naturalis ossium, motum naturalem impediens, causæ vel externæ violentæ, vel internæ originem debens.

##### II. Differentia.

Alia est *totalis*, quando universum ossis caput e sinu prolabitur, quæ proprie luxatio sive dislocatio appellatur, alia *partialis*, si quoad partem tantum os extra sinum suum protruditur, quæ *subluxatio* audit.

##### III. Causa. Est vel externa vel interna.

- 1 *Interna* est vel laxitas ligamentorum, vel paralyss nervorum, vel nimius humorum influxus.
- 2 *Externam* constituunt casus, ictus, extensio nimia.

##### V. Signa.

- 1 Conspicitur in loco, in quem os secessit tumor, in illo vero, quem deseruit, cavitas.
- 2 Motus non amplius eodem modo, qui prius membro fuit solennis, potest exerceri.
- 3 Membrum ut plurimum brevius, quam antea fuerat, evadit.

##### V. Prognosis.

- 1 Quo magis inveterata est luxatio, eo curatu difficilior.
- 2 Facilius repositio in junioribus, quam senibus procedit; in brachiis, quam pedibus.
- 3 Capitis luxatio lethalis.
- 4 Vertebrarum admodum periculosa.
- 5 Luxatio ossis femoris curatu difficillima.
- 6 Maxillæ quandoque periculosa, ob succedentes Convulsiones.
- 7 Quæ causæ internæ originem debet, semper difficilem curationem admittit.

##### VI. Curatio.

- 1 Membrum luxatum eadem ratione, ac in fractura præcepimus, est extendendum, idque vel solis manibus, quod in luxatione recenti communissime fit, vel laqueis aut fasciis, vel instrumentis sive machinis peculiaribus, ut in luxationibus gravioribus, vel magis jam inveteratis.
- 2 Si satis extensum est membrum affectum, quod ex cavitate quadam inter utriusque ossis extremitatem sese repræsentante colligitur, reducendum est in primum locum, cujus rei feliciter peractæ ipse sonus, in reductione partis sese prodens, solet esse testis.
- 3 Ne autem membrum reductum ob tendinum & ligamentorum laxitatem iterum excidere possit, prospiciendum est eidem convenienti deligatione, me.



mediantibus fasciis & spleniis peragenda.

- 4 Et hæc deligatio ante quintum vel sextum diem, si nulla symptomata hoc peculiariter requirant, haud est resolvenda.
- 5 Membrum etiam reductum non tantum in convenienti situ, sed etiam iusta quiete detineatur, ut partes relaxatæ debitum iterum possint acquirere robur.

#### VII. *Cautela & Observationes.*

- 1 Quod si luxationi ante repositum membrum inflammatio jam supervenit, antequam membrum reducatur, eadem prius discutienda est.
- 2 In extensione cavendum, ne partem reducendam excipiendæ extremitatibus fortius allidamus, ex quo satis gravia quandoque sequitur symptomata.
- 3 Observandum etiam, ut in reductione membri naturalis situs atque figura servetur, ne musculorum aut ligamentorum contorsio fiat.
- 4 In omni Luxationis tractatione sufficiens Anatomia cognitio requiritur, alias Chirurgus maximos committere potest errores.

#### 3. De Carie.

##### I. *Definitio.*

Caries est erosio ossium, vel a corruptis humoribus vel vi externa ossa maximopere lædente originem trahens.

##### II. *Signa.*

- 1 Ossa in superficie sunt inæqualia, aspera, & spongiosam quasi tumescencia referentia.
- 2 Gryseo vel nigricante colore prædita sunt, & friabilem præ se ferunt texturam.
- 3 Caro vero, qua conteguntur, est spongiosa, mollis, pallida, inflata.
- 4 Et si, medicamentorum ope, Cicatricem format, facile iterum in ulcus dissolvitur.

##### III. *Causa.*

- 1 Vulnerationes graviores, cum ossium diuturno refrigerio.
- 2 Contusiones ossium vehementes per casum, ictum &c.
- 3 Humores cacochymici, falso corrupti, in ossa vim suam exerentes.
- 4 Medicamenta acria, acida, ossibus inimica.

##### IV. *Prognosis.*

- 1 Abscessus & ulcera solide curari haud possunt, quam diu caries subest: facillime enim, etiam si curatæ videantur, levi ex causa iterum disrumpuntur.
- 2 Quo major nervorum, vaorum sanguiferorum & tendinum concursus adest, eo difficilius cura procedit.
- 3 Difficilis etiam est curatio, ubi ulcus in loco a carie longe remoto sese sitit, adeoque cariei locus incertus est.

##### V. *Cura.*

- 1 Absumitur caries vel medicamentis vel ferro.
- 2 Medicamenta, quæ huc pertinent, debent esse penetrantia balsamica ex Spir. Vin. rectificatiss. cum succino, myrrha, terebinthina &c.
- 3 Ferrum in profundiori ossis corruptione adhibitum, vel rasione vel ustione vim suam exercere debet.

##### V. *Cautela & Observationes.*

- 1 Septica, e Venerea prolapia desumta, in ossium carie nocent magis quam profunt.
- 2 Mercurialia etiam septica non semper tuta observantur.
- 3 Peculiare quid oleum Cinamomi verum, nec non Caryophyllorum ad ulteriorem corruptionem præcavendam exercere observatur.

## II. De Synthesi partium mollium.

### 1. De Vulneribus.

I. *Definitio.* **V**ulnus est divisio unitatis, in partibus molliibus five exanguibus facta, a causa vel interna vel externa violenta originem habens.

### II. *Differentia.*

- 1 Aliud est *simplex*, aliud *compositum* cum contusione, fractura, luxatione complicatum.
- 2 Ratione *formæ*, aliud est *rectum*, aliud *obliquum*, *magnum* aliud, aliud *parvum*, *profundum* vel *superficiale*.
- 3 Ratione *partis*, sit vel *externe* in artubus, capite, abdomine, vel *interne* in visceribus, vasis vel similibus partibus.
- 4 Ratione *eventus* est vel *lethale*, vel *non lethale*.

### III. *Causa.*

Omnia huc pertinent, quæ continuitatem partium corporis nostri mollium vi quadam solvere solent, v.g. gladii, cultri, vitra, acus, dentes, & similia acuminibus & cuspidibus in extremitatibus prædita, nec non ea, quæ magna vi partes nostras corporis contundunt, & premunt & hac ratione unitatem earundem solvunt.

### IV. *Signa.*

- 1 Externa sensibus patent.
- 2 Interna ex Pathologia speciali sunt petenda.

### V. *Prognosis.*

- 1 Vulnera quæ in partibus carnosiss contingunt, facilius curantur, quam in exanguibus.
- 2 Vulnera vaorum majorum ut plurimum sunt lethalia.
- 3 Quæ in nervis majoribus eveniunt, difficulter curantur, quandoque etiam mortem post se trahunt.
- 4 Quo nobilius est viscus, & pluribus vasis & nervis est præditum, eo majus a vulnere periculum eidem imminet.
- 5 Quæ in extremitatibus sunt non tantum periculum post se trahunt, ac quæ in ipsum visceris medium sese extendunt.
- 6 Nervi, arteriæ & venæ partim tantum dissectæ, majora incommoda conjuncta habent, ac si prorsus solutæ fuissent.
- 7 Febris, vomitus, & convulsiones vulneribus supervenientes, periculosæ.
- 8 Vulnera, ab instrumentis venenatis vel ejusmodi animalibus ortum habentia, utplurimum sunt lethalia.
- 9 Cordis vulnera semper sunt lethalia.
- 10 Vulnera spinalis medullæ, proxime circa caput inflicta, lethalia.
- 11 Lethalia etiam sunt vulnera pulmonum profunda; nec non hepatis.
- 12 Vulnera ventriculi curari posse, præter cultrivorum varia exempla probant, quæ vero in orificio superiori contingunt, ob concursum nervorum lethalia observantur.
- 13 Vulnera Vesicæ & renum, non quidem absolute sunt lethalia, interim ob Urinæ concursum curatu satis difficilia.
- 14 Quæ diaphragmati infliguntur & quidem ejusdem parti nerveæ, admodum sunt periculosa.
- 15 Quæ lienis ipsum centrum transeunt, lethalia, secus, si saltem superficiem tangunt.
- 16 Vulnera, quæ punctione aut sectione sunt, facilius curantur, quam quæ contusione.

### VI. *Curatio.*

- 1 Ipsa natura mediante suo balsamo naturali, quem secum vehit, omnia vulnera curat.
- 2 Nostrum est, ut impedimenta removeamus, & Naturam in opere suo adjuvemus.
- 3 Huic scopo satisfaciendo opus est, ut vulneris divisa labia jungamus.
- 4 Hæc ubi cruenta non amplius sunt, sed callosa, mediante forfice iterum cruenta reddantur.
- 5 Tum vel fasciatione, vel futura combinentur, ut natura officio suo defungi possit.



- 6 Prius mediantibus fasciis, iisque vel brevioribus, vel longioribus, prout pars affecta requirit, peragimus; posterius aut glutine aut acu, ex una parte cuspide triangulari, ab altera filo lineo vel serico prædita, perficimus, cavendo semper ne partes tendinosas aut nerveas lædamus.
  - 7 Fit autem futura variis modis, interdum enim acum unam alteramque in carne relinquimus, iisque fila circumducimus, quale quid in labiis leporinis aut profundis vulneribus contingit, aliquando vero modo vulgari fila sæpius traducimus, & labia consuimus, relinquendo inter singula puncta justum intervallum, ut oræ convenienti modo adduci & sese contingere possint, nec non parvam portionem apertam, turundæ insertioni inservientem, ut puri superfluo detur exitus, quod præprimis in magnis vulneribus est observandum.
  - 8 Plerumque futuræ opus non est, sed sufficit deligatio, idque in vulneribus secundum longitudinem membri factis, & non admodum profundis.
  - 9 In vulneribus faciei loco futuræ stricte sic dictæ, pro deformitate præcavenda, adhibemus quandoque futuras siccas, quæ cum medicamentis glutinosis fiunt.
  - 10 In magnis quoque vulneribus, cum Hæmorrhagiis nimis conjunctis, in usu quandoque sunt peculiaris instrumenta, compressioni arteriarum & venarum inservientia, vel loco horum cauteria potentialia, compressis & fasciis firmanda.
  - 11 Imo si alia gravia symptomata v. gr. lipothymia, febris, inflammatio, dolores concurrant, aut superveniant, convenientibus remediis iisdem est succurrendum.
- VII. *Cautela & Observationes.*
- 1 In hæmorrhagiis vulnerum gravioribus cauteria potentialia præ aliis usum habent.
  - 2 Ligaturæ nimis quandoque Gangrænam inducunt.
  - 3 Si aliquid heterogenei in vulneribus reperitur, ante consolidationem eximendum est.
  - 4 Sanguis etiam coagulatus mediante suctione aut expressione evacuandus est, ut minora symptomata succedant.
  - 5 Quod si vero hæmorrhagia adhuc metuitur, coagulum omne ex venis haud debet auferri.
  - 6 In vulneribus haud adeo profundis, sanguini effluenti conveniens debet concedi exitus, postea vasa sunt exprimenda, sic facilius procedet consolidatio.
  - 7 Sutura convenit tantum in vulneribus transversim inflicta, aut ubi magna pars pendula hæret, vel quando fasciationi soli locus non conceditur.
  - 8 Digestivis in recentibus vulneribus opus haud est, sed sufficiunt farcotica.
  - 9 Ubi vero vulnera aperta servantur, aut sanguis extravasatus in pus abiit, digestiva farcotica sunt præmittenda.
  - 10 In vulneribus carnosus pro scopo vulnerario conducunt balsama temperiora, in tendinosis vero & nerveis magis calidiora, cavendo a pinguibus & unguitosis.

## 2. De Ulceribus.

### Definitio.

Ulceres sunt solutiones continui in partibus mollibus plerumque exanguibus fientes, a corruptione sero-lymphaticæ substantiæ originem habentes.

### Differentia.

- 1 Ratione formæ, alia sunt parva, alia magna, lata alia, alia angusta, profunda vel superficialia.
- 2 Ratione temporis, alia sunt antiqua, alia recentia.
- 3 Ratione eventus, alia sunt rebellia, alia minus rebellia, periculosa alia, alia absque periculo.
- 4 Ratione partis, modo in brachiis vel pedibus, modo in facie, mammis, inguine aliisque partibus eveniunt.
- 5 Distinguenda etiam ab abscessibus, utpote qui carnosas magis partes pro sede agnoscunt, ulcera ve-

ro magis glandulosas, membranaceas & osseas ubi cariem constituunt.

### III. Causæ.

Est vel interna, a corruptione feri originem trahens, vel externa ambustioni, contusioni, medicamentis corrosivis ortum debens.

### IV. Signa.

- 1 Cognoscuntur ex materia ichorosa, saniosa, limpidâ, acri.
- 2 Non tantam ac Apostemata, imo sæpius nullam inflammationem conjunctam habent.
- 3 Et propterea etiam neque tam sensibili stipata sunt dolore.
- 4 Internorum ulcerum signa ex Pathologia speciali petenda sunt.

### V. Prognosis.

- 1 Ulcera, quo diffusioris sunt ambitus, eo difficilius curantur.
- 2 Quo magis sunt inveterata, eo minus tuto consolidantur.
- 3 Sanies multa, tenuis, deterioris coloris, ulcus malæ notæ portendit.
- 4 Quæ cum multa manatione conjuncta sunt ulcera, difficilem curationem admittunt.
- 5 Quo magis a partibus sanguineis sunt remota, eo magis rebellia.
- 6 Contumacissima sunt ulcera in glandulosis partibus evenientia.
- 7 Ulcera nervorum, partiumque exquisito sensu gaudentium, sunt periculosa.
- 8 Omnia ulcera interna magis sunt periculosa, quam externa.
- 9 Aqua inter cutem laborantibus ulcera in corpore facta difficulter sanantur. Hipp. Aph. 8. Sect. VI.
- 10 Si ulcus, postquam curatum est, recrudescat, de carie subjecti ossis metuendum est.

### VI. Curatio.

- 1 Requiritur ulcera sufficientem abstersionem, quod per septica medicamenta fieri debet.
- 2 Deinde ulcere probe absterfo adhibeantur digestiva cum balsamicis mixta, ut tumor vicinæ partis emolliatur, & ulcerosa sanies evacuetur.
- 3 Tandem subjungantur Sarcotica, non neglectis circa ipsam partem discutientibus.
- 4 Imprimis autem convenienti Diæta uti oportet, ut dyscrasia sanguinis corrigatur, imo pro eodem scopo necessaria quandoque sunt interna sanguinem mundificantia.

### VII. Cautela & Observationes.

- 1 Ulcera quo sordidiora sunt, eo exquisitiora abstergentia exposcunt.
- 2 Quando labia ulceris callosa sunt, emollire eadem & callum absumere oportet.
- 3 Et si medicamenta scopum nostrum non adimplent, scarificanda sunt labia vel callositas forcice auferenda.

## 3. De Prolapsibus sive Procidentiis.

### I. Definitio.

Prolapsus sunt mutationes situs naturalis partium mollium in contiguitate læsarum, extensioni & relaxationi nimis ortum debentes.

### II. Differentia.

Alii sunt in inguen, in scrotum, in umbilicum, ut intestinorum & omenti, ob extensionem & relaxationem peritonæi: alii extra vaginam uteri, ut uteri cum vagina ejusdem ob ligamenta uteri relaxata: alii extra anum, ut intestini recti cum sphinctere ani ob hujus relaxationem.

### III. Causa.

- 1 Causa immediata omnium prolapsuum est partium affectarum nimia relaxatio & extensio.
- 2 Causa vero mediata, occasionalis & antecedens ratione speciei ipsius prolapsus varia esse potest: sic in hernia umbilicali & inguinali nimius corporis nifus, tussis nimia, saltus, vociferatio, in prolapsus uteri infelix puerperium & incondita uteri tractatio, in procidentia ani, tenesmus nimius & ani



refrigerium, vel paralyſis nervorum anſam præbere poſſunt.

## II. *Signa.*

- 1 In prolapſibus inteſtinorum conſpicitur tumor mollis, fere indolens, modo in umbilico, modo in inguine, modo in ſcroto.
- 2 Manu compreſſus, vel ægro reſupino jacent, quod imprimis noctu fit, retrocedit.
- 3 Quandoque vero immania tormina ſuperveniunt, ob fæces in inteſtiniſ ſtagnantes & reductionem prohibentes.
- 4 Uteri procidentiam ex relatione paupercularum patientium percipimus.
- 5 Tumor quandoque extra pudenda conſpicitur, quandoque vero inter vaginæ confinia ſubſiſtit.
- 6 Plerumque dolorem hypogaſtrii, lumborum & oſſis ſacri conjunctum habet.
- 7 Anus prolapſus cuilibet ſeſe manifeſtat, nec ullis ſignis indiget.

## V. *Prognofis.*

- 1 Hernia umbilicalis & inguinalis in junioribus facilius curatur, quam in adultis.
- 2 Utraque quo magis inveterata, eo minus curabilis.
- 3 Quando inteſtina non reducuntur, facile ſtagnatio fæcum contingit, exinde vero inflammatio inteſtinorum, tandem Gangræna & mors.
- 4 Quo magis itaque reductio negligitur, eo majus periculum expectandum eſt.
- 5 Uteri procidentia quo major & diuturnior eſt, eo curatu difficilius.
- 6 Nunquam eſt lethalis, niſi negligatur, ut partes prolapſæ corruptionem concipiant.
- 7 Interim moleſtiſſimus eſt affectus, qui inſuper ſterilitatis poteſt eſſe cauſa.
- 8 Anus prolapſus in junioribus facillime reponitur, in ſenioribus quandoque admodum difficulter.
- 9 Frequentiſſime Dyſenterix & Diarrhœæ ſolet eſſe comes, quibus curatis & ipſe facili negotio curari ſolet.
- 10 Quando ex paralyſi nervorum oritur, malum admodum rebelle, imo plerumque incurabile eſt.
- 11 Si inteſtinum prolapſum diu negligatur, ita ut ab aere alterari & corrumpi poſſit, maxime periculolum.

## VI. *Cura.*

- 1 Eo reſpiciendum ubique eſt, ut partes prolapſæ reducantur in priſtinum locum.
- 2 Fit hæc reductio vel manibus concurrente commodo patientis ſitu, vel fomentis & autocratico Naturæ conſuſu.
- 3 Ut autem reductæ partes in loco ordinario detineantur, utimur ſaſciis & ſubligaculis, uti hoc in herniis in uſu eſſe conſuevit, vel peſſariis circularibus e ſubere conſectis, utero reſoſito in loco ſuo detinendo inſervientibus, vel medicaminibus ſubadſtringentibus & roborantibus, ut in ano reducto.
- 4 Ubique etiam congrua medicamina interna, & præcepta Diætetica ordinamus, ut eo melius ſcopo noſtro potiamur.

## VII. *Cautela & Observationes.*

- 1 Antequam prolapſus reponatur, ad faciliorem reductionem, fomenta emollientia in uſum trahere convenit.
- 1 In reductione nulla vi uti oportet, alias facile inflammatio ſequitur.
- 3 Herniæ diu neglectæ, ſi partes jam ſibi ſint annatæ, nullam abſque Chirurgica operatione reductionem patiuntur.
- 4 In procidentia ani præprimis frigus eſt evitandum, item niſus fortior in excernendis fæcibus.

## II. DE DIÆRESI.

### I. *Definitio.*

Diæreſis eſt operatio Chirurgica, mediante qua continuitatem, vel in duris, vel in mollibus corporis noſtri partibus, ſeparamus.

### II. *Differentia.*

- 1 Exercetur Diæreſis vel in duris vel mollibus partibus.
- 2 Ratione modi operandi, fit vel perforatione ſeu trepanatione, vel raſione, ſeu limatione, vel ſerratione, idque in partibus duris; vel ſectione & punctione, in partibus mollibus, vel uſione in utriſque.

### I. De Diæreſi partium durarum.

#### 1. De Trepanatione.

##### I. *Definitio.*

**T**repanatio eſt Operatio Chirurgica, qua per Trepanum ſeu Modiolum oſſa ob intus latitantem cauſam perforamus, & portionem eorundem excindimus, ut ad locum immediate affectum perveniamus.

##### II. *Indicantia.*

- 1 Sanguis extravafatus ſub cranio aut interdum ſub dura matre corruptionem ſubiens.
- 2 Contuſio Cranii violenta, cum feſtucarum & fruſtulorum ſeparatione meninges pungentium.
- 3 Contuſio ſimilis abſque tamen læſione meningum.
- 4 Depreſſio violenta Cranii figuram ſuam mutantis & foveam acquirentis.
- 5 Rima ſeu fiſſura Cranii & quidem tam ſimplex conſpicua & apparens, quam capillaris, ob anguſtiſſimam & arctiſſimam figuram ita dicta, necnon Contrafiſſura in loco plagæ oppoſito vel remoto, ob reſiſtendi minorem efficaciam contingens.

##### III. *Modus Operandi.*

- 1 Peragitur hæc operatio inſtrumento peculiari, modiolus ſeu Trepanum appellato, & quidem duplici, quorum alterum in medio cuſpidem habet, ut initium operationis eodem faciamus, circumducendo nimirum illud, donec circulum mediocriter profundum incidamus: vocatur hoc vulgo *mas*; alterum vero cuſpide ſeu fulcro hoc deſtitutum, quo poſt primum utimur & quo cum calvariam penetramus, *fœmina* vocatur.
- 2 Antequam autem inſtituatur perforatio, opus eſt, ut cutim, quod in forma crucis fieri ſolet, incidamus & pericranium reſolvamus.
- 3 Obſervandum etiam, ut in proximo partis affectæ loco eandem faciamus, cavendo ne dentes Trepani neque fracturam, neque futuram attingant.
- 4 Quando trepanum fœmina ubique penetravit, & oſſiculum omnino ſolutum eſt, voſſella eximi & pari vel ſanguini ſtagnanti exitus parari debet.

##### IV. *Uſus.*

- 1 Hujus Operationis uſus eſt, ut ſanguis intra Cranium & duram meningen extravafatus evacuetur.
- 2 Ut depreſſio cranii vehementior tollatur.

##### V. *Cautela & Observationes.*

- 1 Trepanatio, ſi utilitatem habere debet, mox primis diebus inſtituenda eſt.
- 2 Trepanum non nimis profunde eſt adigendum, imprimis in illis locis, ubi dura meninx calvarix fortiter adhæret: gravia enim exinde excitari poſſunt ſymptomata.
- 3 Quando dura meninx portiunculæ cranii auferendæ fortiter adhæret, inſtrumento decuſſorio deprimi debet.
- 4 In temporibus non facile trepanatio eſt inſtituenda, neque etiam in fronte prope palpebras, illic ob oſſis petroſi duritiem, hic ob ſinus occurrentes.

#### 2. De Raſione & Serratione.

1. *Raſio.* Fit hæc vel mediante ſcalpello vel lima, & exercetur non tantum in oſſium fiſſuris & corruptionibus, quæ tamdiu raduntur, donec hæ plane obliterentur, obſervando ſemper, ut pericranium ſeu perioſtium prius reſolvamus, ſed & in dentium Tartaro eorumque deformitate & inæqualitate abſumendis, cavendo in poſteriori caſu, ſi lima adhibetur, ne inconcinna operatione dentes vel a vin-



vinculis relaxemus vel plane evellamus.

- II. *Serratio*. Fit mediantibus Serris varii generis & exercetur potissimum in amputationibus pro offibus sphacelatis separandis. Observandum & hic, ut ante operationem periostium prius solvatur.

## II. De Diæresi partium mollium.

### 1. De Arteriotomia.

#### I. *Definitio*.

Arteriotomia est apertio arteriæ mediante lanceola facta.

#### II. *Locus*.

Vix alibi celebratur, quam in temporibus, & fronte.

#### III. *Modus Operandi*.

Idem est ac in Venesectione.

#### IV. *Ufus*.

In vehementibus cephalalgiiis commendant præcipue sectionem Arteriæ temporalis. Generaliter vero convenit ejusdem usus cum Venesectione.

#### V. *Cautele*.

- 1 In fasciatione omnis opera collocanda, ut arteria secta bene comprimatur, quia facillime aneurisma exinde originem habere potest.
- 2 Adhibent pro hac intentione laminas plumbeas, quas spleniis superponunt.

### 2. De Venesectione.

#### I. *Definitio*.

Venesectio est apertio Venarum, variis in locis per lanceolam instituta.

#### II. *Modus*.

Antequam Vena pertunditur, ligatur pars, ut vena aperienda turgescat, deinde oblique inciditur. Quando in pedibus instituitur, aquæ calidæ prius immergendi sunt pedes, ut venæ eo melius turgidæ reddantur.

#### III. *Ufus*.

Intervit potissimum pro evacuanda plethora, tum etiam ebullitione sanguinis temperanda, nec non revulsionibus, & derivationibus humorum in alium locum præstandis.

#### IV. *Cautele & Observationes*.

- 1 Sectio Venarum non in loco divaricationis, ubi valvulæ præsto sunt, faciendæ; alias sanguis non fluit.
- 2 Incisio paulo latior sit, ut sanguis liberum inveniat exitum, sic major contingit alteratio, justo vero minor non tantum sanguinis fluxum intercipit, sed quandoque etiam in sensibilibus subjectis lipothymias parit.
- 3 Parva incisio, imprimis quando prope valvulam facta est, sæpius insignem tumorem post se ducit, qui tamen post relaxatam fasciam & adhibitum Spir. Vini Camphoratum, mox iterum disparere solet.
- 4 Si in subjectis spongiosioribus musculus imprimis circa tendinem simul læditur, oritur Ecchymoma, quod discutientibus tractandum.
- 5 Imo si tendo simul lædatur, tanto magis hæc locum habent.
- 6 Nervi autem compunctio requirit magis balsamica.

### 3. De Scarificatione.

#### I. *Definitio*.

Scarificatio est vulneratio cutis mediante gladiolo peculiari facta.

#### II. *Instrumenta*.

Præter Scalpellum cucurbitulæ, sanguinem effluentem excipientes, quoque necessariæ sunt ad operationem, quæ ab aere crassiori, mediante candela, liberatæ, cuti vulneratæ admoventur.

#### III. *Locus*.

Varius hic esse solet, applicantur tamen cucurbitulæ plerumque scapulis, dorso; brachiis vel pedibus.

#### IV. *Ufus*.

1 Conducit itidem pro plethora evacuanda & definitionibus præstandis.

2 Imprimis autem locum habet in subjectis spongiosioribus, in carne magis, quam venis sanguinem gestantibus.

#### V. *Cautele*.

Scalpellum seu gladiolum post ejusdem usum semper purgare decet: immundæ enim personæ eidem aliquid contagiosi imprimere solent, quod aliis, nisi purgatum sit scalpellum, facile communicari potest.

### 4. De Hirudinum applicatione.

#### I. *Definitio*.

Hirudines sunt animalcula oblonga, capite latiori & ventre utpl. rubicundo prædita, in palustribus locis degentia.

#### II. *Selectus*.

Meliores censentur exiles, oblongæ, ventre rubicundo & capite non admodum magno præditæ, aquas pura inhabitantes, præ viridibus, laryginosis in aquis fœtidis absconditæ.

#### III. *Modus applicandi*.

- 1 Antequam applicentur, jam per aliquot dies in aqua limpida asservatas fuisse decet.
- 2 Deinde loco, intentioni nostræ convenienti, sunt appropinquande, ut sanguinem ex illo sugant.
- 3 Longiores ad 21. usque sugere possunt; applicantur igitur communiter 3. 4. 5. imo 6.
- 4 Si tantum effluxit, quantum conveniens judicamus, adspargendum est Sal, vel Cinis ipsorum Capiti, sic sponte remittunt & decidunt, evomendo, quicquid suxerunt.

#### IV. *Ufus*.

- 1 Consistit earundem usus in evacuando sanguine & quidem ex ejusmodi locis, ubi neque Venesectionem nec Scarificationem commode adhibere licet v. g. e. vasis hæmorrhoidalibus.
- 2 In omnibus igitur affectibus, ab insufficiente excretionem hæmorrhoidali originem trahentibus, cum fructu applicantur, & majorem effectum exerunt, quam Venesectiones & Scarificationes adhibita.

#### V. *Cautele*.

- 1 Animalcula, antequam applicentur, non debent irritari, alias vulnuscula mali moris post se relinquunt.
- 2 Optime igitur linteamine leniter comprehenduntur & loco destinato applicantur.
- 3 Debet autem locus esse mundus; aliqui eundem lacte illinunt vel scarificant, vel etiam linteaminibus fricant, ut eo facilius apprehendant hirudines.
- 4 Post remotionem earundem stillicidium sanguinis, quod per tempus adhuc continuat, non est inhibendum, sed quandoque per vaporem aquæ calidæ potius promovendum.

### 5. De Setaceis.

#### I. *Definitio*.

Setaceum est Operatio, qua cervicem acu compungimus & vulnus per setam seu funiculum apertum servamus, ut serum vitiatum evacuari possit.

#### II. *Locus*.

Hodie vix aliam, quam Nuchæ, regionem eligunt; olim & brachiis, pedibus aliisque locis fuit applicitum.

#### III. *Modus operandi*.

- 1 Peragitur tota Operatio forcipe utrinque perforata, acu & seta seu funiculo.
- 2 Mediante forcipe elevatur cutis, ut eo melius trahi possit acus.
- 3 Acus ipsum vulnus infligit.
- 4 Seta vero vel funiculus, qui hodie plerumque ex lino vel serico fit, vulnus apertum servat.

#### IV. *Ufus*.

- 1 Ut superfluum serum evacuetur,

H. 2.

Ut



- 2 Ut derivatio feri ab oculis, auribus, cerebro &c. ad hanc partem fiat.
- VI. *Cautela & Observationes.*
- 1 Antequam instituatur operatio, capilli sunt abradendi.
  - 2 Cavendum etiam, ne tendines sub cute positi simul comprehendantur, aut lædantur.
  - 3 Funiculus butyro nonfalito aut Unguento basilico est inungendus, ut eo facilius dextrorsum & sinistrorsum duci possit, quod sæpius faciendum, ne ulcus sordidum fiat.
  - 4 Ad arcendam etiam inflammationem discutientia & repellentia haud sunt negligenda.

#### 6. De Fonticulis.

##### I. *Definitio.*

Fonticuli sunt ulcuscula artificialia, cauterio actuali vel potenciali, aut etiam instrumentis acutis in variis corporis partibus pro evacuandis serositatibus facta.

##### II. *Locus.*

Præcipue usitatum est brachium, & quidem regio humeri intra musculum bicipitem & Deltoidem: sunt tamen & alia loca, in quibus excitari solent.

##### III. *Modus excitandi.*

Secundum Medici & patientis intentionem variat:

- 1 Quandoque enim Cauterio actuali cutis aduritur & eschara excitatur, quandoque medicamento corrosivo idem perficitur, quandoque vero forfice vel lanceola cutis inciditur & aperitur.
- 2 Postea aperturæ corpus quoddam rotundum v. g. pifum, vel globulus ex cera, ligno vel argento imponitur, iisque tam diu aperta servatur, quamdiu morbi status requirit.

##### IV. *Usus.*

- 1 Adhibentur fonticuli pro humoribus serosis noxiis evacuandis.
- 2 Instituuntur iisdem derivationes & revulsiones a locis nobilioribus ad ignobiliora.

##### V. *Cautela & Observationes.*

- 1 Nunquam ipse musculus eligi pro loco debet, sed interstitium inter duos musculos.
- 2 In Cauterio potenciali, antequam corrosiva applicentur, locus Emplastro firmo in medio ad magnitudinem pisi perforato muniri debet, ne corrosiva diffuere & partes vicinas corrodere possint.
- 3 Fonticulus semel excitatus non temere suppressi debet, unde quotidie mundificandus & globulis apertus servandus,
- 4 Inflammationum etiam, quæ facile accedunt, ratio habenda, ut discutientibus arceantur.

#### 7. De Paracentesi.

##### I. *Definitio:*

Paracentesi est perforatio abdominis, thoracis vel scroti, pro evacuandis stagnantibus humoribus, diversis instrumentis facta.

##### II. *Instrumenta.*

Sunt vel scalpella latiora, vel cannulæ perforatæ circa extremitates acuminatæ, mediantibus quibus cutis pertunditur.

##### III. *Locus.* Rationes partis affectæ variat:

- 1 Quandoque in abdomine fit, ubi vel umbilicus ipse, si protuberet, eligitur, vel locus proxime eodem vicinus, nimirum 3. digitorum spatium circiter ab eodem remotus.
- 2 Quandoque in thorace, ubi locus intra quartam & quintam costam inferiorem eligitur.
- 3 Quandoque vero in scroto, ubi nullo peculiari selectu opus est. Ut plurimum tamen in parte inferiori instituitur apertio, ut humores eo promptius evacuentur.

##### IV. *Modus operandi.*

- 1 In Paracentesi abdominis cutis atramento scriptorio notata peculiari instrumento, Gallis Trocar dicto, ad intestina usque pertunditur, & tantundem aquæ emititur, quantum e re esse judicatur, postea locus pertusus emplastro Cerussæ munitur, donec nova eva-

cuatio instituatur, quæ toties repetitur, quoties tumor aquosus abdominis exigit.

- 2 In Paracentesi thoracis scalpellum adhibetur, & apertio paulo amplior fit, ut spissi & purulenti humores effluere possint, postea cannula argentea immittitur, ut pus relictum per vices evacuari possit.
- 3 Scroti apertio fit vel scalpello latiori, vel simili fere instrumento, quale in Paracentesi abdominis adhiberi solet, quamvis minori, postea aqua stagnans unica vice evacuatur, vulnus vero emplastro Cerussæ contegitur.

##### V. *Cautela & Observationes.*

- 1 In Paracentesi abdominis quo major aquarum copia adest, eo minus eadem simul & semel est evacuanda.
- 2 Imprimis hic ponderandæ sunt ægroti vires & secundum easdem evacuatio instituenda.
- 3 Rarissime ultra tres libras simul evacuatur.
- 4 Et ab una évacuatione ad alteram semper 12. vel 24. horarum intervallum requiritur.
- 5 In Paracentesi thoracis idem etiam observandum est.
- 6 Nam ultra 3. vel 4. uncias simul haud est emitendum.
- 7 Non adeo cito etiam vulnus debet consolidari, sed ad minimum per 12. dies apertum servari.
- 8 Injici quoque hic possunt, post évacuationem puris, discutientia & balsamica temperiora.
- 9 In scroti apertione cavendum, ne testiculi lædantur.
- 10 Imponi hic possunt post operationem, ad præcavendum ulteriorem affluxum, resolventia & carminativa.

#### 8 De apertione Abscessuum.

##### I. *Definitio.*

Abscessus est tumor inflammatorius cum intus latente purulenta materia conjunctus & fibrillarum vasorumque eundem constituentium dilacerationem corruptionemque post se ducens.

##### II. *Locus.*

Generantur abscessus mediante inflammatione & fœdem magis figunt in partibus sanguineis, sicuti ulcera in magis exsanguibus.

##### III. *Signa.*

Cognoscitur abscessus ex prægressa insigni alicujus partis inflammatione, ejusdem tumore & dolore, subsequente vero post aliquot dierum intervallum horum symptomatum remissione, tumoris mollietie, & quandoque coloris in medio tumoris, si non admodum profundus sit, mutatione in album vel subflavum.

##### IV. *Prognosis.*

- 1 Quo diutius apertio abscessus protrahitur, eo peior fit status: facile enim exinde oriuntur sinus partium mollium & caries solidarum.
- 2 Omnes abscessus interni magis sunt periculosi, quam externi.
- 3 Pus album, æquale, leve bonæ notæ censetur, peioris, si aquosum, tenue vel viscidum nimis est.

##### V. *Cura.*

- 1 Quando materia satis concocta est, quod ex ejusdem fluctuatione judicatur, abscessus mediante lanceola aperitur & puri exitus conceditur.
- 2 Postea mundificandus est abscessus per Ungu. ex Vitello ovi, Terebinthina & melle.
- 3 Si post évacuatum pus & mundificatum etiam abscessum adhuc tumor circum circa observatur, emollientia & resolventia in usum sunt trahenda v. g. Diachylon simplex vel cum Gummatibus.
- 4 Consolidationem ipsa Natura perficit, adjuvat autem hanc Naturæ operationem Chirurgus per adhibita convenientia balsamica remedia, qualia sunt Myrrhata, Terebinthinata, Succinata.

##### VI. *Cautela & Observationes.*

- 1 In apertione semper musculorum habenda est ratio, ut nunquam transversim, sed per longitudinem incidantur.



- 2 Qualem igitur situm musculi habent, tali modo debet etiam fieri incisio.
- 3 Ad venas etiam arterias & nervos inprimis majores respiciendum est, ne temere dissecentur.
- 4 Apertio non admodum parva sit, ne puri exitus recludatur.
- 5 In abscessibus majoribus pus non simul est evacuandum: facile enim vel ulcera foeda vel sphacelus exinde oriuntur.
- 6 Alii in apertione abscessuum loco lanceolarum Cauteriis potentialibus utuntur: praefendus autem prior modus ob plura, quibus alter stipatus est, incommoda.

### 9. de Clausurarum partium apertione.

#### I. Definitio.

Est reseratio earum partium, quas ipsa Natura lege sibi consueta apertas esse cupit.

#### II. Differentia.

Ratione loci variant ejusmodi clausurae: aliae enim fiunt in ano, quibus infantes aliquando in lucem eduntur; aliae in vulva, quando vel orificium vaginae membrana est obductum, vel labia post male tractatum ulcus coaluere, vel ipsum uteri orificium caruncula est obstructum; aliae in auris principio; aliae sub lingua, quando frenulum justo longius est, ut infantes in suctione, adultos vero in loquela impediat.

#### III. Signa.

- 1 Omnia haec Naturae vitia facile externo nostro conspectui sese offerunt.
- 2 Sola uteri clausura speculum matricis quandoque exposcit, ut pars affecta eo melius possit conspici.

#### IV. Prognosis.

- 1 Vitia haec, quo magis sunt profunda, eo difficilius sunt curabilia.
- 2 Crassae etiam obductiones curatu sunt difficiliiores, quam lenes tenuisque.

#### V. Methodus medendi.

- 1 Anus non perforata vel digitis, si membrana tenuis est, aperitur, vel lanceola fortiori, si crassior fuerit: aperta deinde servatur per cannulam plumbeam, donec consolidatio labiorum sit perfecta.
- 2 Vagina uterina membrana obducta, nec non concreta labia uterina, mediante quodam scalpello, partim linteis circumvoluto, secundum longitudinem aperiuntur; quando vero prope orificium uteri tale quid contigit, speculum matricis pro aperienda vagina in usum vocandum, deinde ipsa operatio mediante sectione instituenda est.
- 3 In obstructo meatu auditorio cura itidem per incisionem peragitur, si in principio meatus membrana obducta fuerit; quod si vero obstaculum magis interne haeserit, cura admodum difficulter procedit.
- 4 Linguae frenulum justo longius incisione ad debitos limites est reducendum.

#### IV. Cautela & Observationes.

- 1 In perforatione ani cavendum est, ne sphincter ani laedatur.
- 2 Ubi Haemorrhagiae fortiores superveniunt, adhibenda sunt remedia subadstringentia.
- 3 In vaginae uterinae perforatione intruduntur pessi, subadstringentibus conspersi, ut haemorrhagia sistatur & vagina aperta conservetur.
- 4 Linguae frenulum non unguibus est dilacerandum, evitanda etiam est lesio partium vicinarum & inprimis ductuum salivalium: gravia enim exinde oriuntur symptomata.

### 10. De fistulis.

#### I. Definitio.

Fistulae sunt ulcera angusta, longa, & sinuosa, callosis labiis praedita, a materia acri manante ortum habentia.

#### II. Differentia.

- 1 Ratione loci, aliae fiunt in ano; aliae in oculorum cantho majori, aliae in pectore &c.

2 Ratione figurae, alia est obliqua & flexuosa, alia recta.

3 Differt fistula a sinu, callositate & duritie labiorum, quae in sinu non occurrit: si tamen & huic non medeatur celeriter, facile fistula exinde oriri potest.

#### III. Signa.

- 1 Cognoscuntur fistulae ex foraminulis angustis, rotundis & callosis in profunditatem, si explorantur, sese extendentibus.
- 2 Fundunt modo saniem serosam, tenuem, subviridem, foetidam, quandoque per tempus sunt siccae.
- 3 Dolorem vel exiguum vel nullum conjunctum habent.

#### IV. Causa.

Generantur ab abscessibus, ulceribus, vel vulneribus per sepe male tractatis, vel etiam humoribus impuris, falso-serosis.

#### V. Prognosis.

- 1 Fistula recens haud profunda, in loco carnosio & corpore juvenili, facile curatur.
- 2 Admodum vero profunda ad arterias, nervos, tendines & articulos sese extendens, difficulter curatur.
- 3 Curatu etiam difficiles sunt fistulae ani, uteri, thoracis, vesicae, vertebrarum &c.

#### VI. Cura.

- 1 Nulla fistula curari potest, antequam callus fuerit ablatus.
- 2 Absumitur autem callus vel cauterio potentiali, vel actuali, vel instrumentis incidentibus.
- 3 Si fistulae orificium admodum est arctum, turundis extendendum est, ut facilius ad fundum possimus pervenire.
- 4 Remoto callo adhibenda sunt remedia vulneraria & pars cicatrice obducenda.

#### VII. Cautela & Observationes.

- 1 Quando fistula ad os usque pertingit, illudque cariosum reddidit, removenda est caries, antequam cicatrix inducatur.
- 2 Non negligenda etiam est interna corporis purificatio, inprimis si ab humoribus impuris ortum traxerit fistula.
- 3 Inter omnes fistulas curandi modos est optimus, qui per sectionem fit.

### 11. De Ustione.

#### I. Definitio.

Ustio est Operatio Chirurgica, qua vel ferro ignoto vel medicamentis causticis partibus vel mollibus, vel duris crustam seu escharam inducimus.

#### II. Differentia.

- 1 Alia fit in partibus duris, in mollibus alia.
- 2 Alia peragitur medicamentis, ferro candente alia.

#### III. Prognosis.

- 1 Ustio est operatio in quibusdam causibus admodum utilis.
- 2 Praefertur ustio actualis potentiali, ob egrum tamen molliorem sepius haec praeter illa adhibetur.

#### IV. Modus.

- 1 Quando ferrum adhibetur, fit vel profunda ustio vel superficialis, prout res ipsa requirit.
- 2 Cauterium vero potentiale, si in usum trahitur, tamdiu in loco designato relinquitur, donec eschara sit excitata, quod intra 4. 5. 6. horas contingit.

#### V. Usus.

- 1 Adhibentur Cauteria pro corruptionibus ulterioribus praecavendis.
- 2 Pro excitandis vesicis, fonticulis.
- 3 Pro inhibendo sanguinis fluxu.

#### VI. Cautela.

- 1 Ustio actualis citissime peragenda est.
- 2 Crustam inductam non solis oleosis illinire decet, sed praestat ad emplastrum diapalmæ confugere.
- 3 Cavendum etiam, ne in operatione tendo aut nervus laedatur.



## III. De Exæresi.

I. *Definitio.* Exæresis est Operatio Chirurgica, qua ea, quæ superflua vel corpori noxia sunt, auferuntur.

II. *Differentia.*

Occupata est Diæresis circa res noxias vel in corpore genitas, vel forinsecus in illud illatas.

## I. De Catheterismo seu Catheteris applicatione.

I. *Definitio.*

Catheterismus est Operatio Chirurgica, qua, mediante Cathetere, i.e. fistula argentea incurvata, urina retenta evacuat.

II. *Differentia.*

Ratione instrumentorum, seu Catheterum, alii sunt rotundi, fulcati alii, alii crassiores, tenuiores alii, alii longiores, alii breviores, incurvi magis alii, alii minus incurvi.

III. *Indicantia.*

Instituitur Catheterismus ob res in meatu urinario hærentes & urinæ excretionem impediētes, puta calculum, sanguinem congruatum, carunculas &c.

IV. *Modus applicandi.*

1. In sexu virili penis sinistra manu est comprehendendus & dextra Catheter, oleo olivarum vel amygdalarum dulcium illitus, leniter in Urethram intrudendus.

2. Quando ad cervicem vesicæ, ubi urethra in viris obliquum situm observat, perventum est, Catheter versus hypogastrium vertitur & leniter in vesicæ cavitatem propellitur, sic mox contingit urinæ effluxus.

3. In fœminino vero sexu, ob breviorē & latiorē urethram, Catheter facile immittitur.

V. *Cautele & Observationes.*

1. In Operatione omnino cavendum, ne vim adhibeamus, & in viris carunculas vasis feminalibus adjacentes lædamus, quod Gonorrhœæ viam sternere potest.

2. Fœminæ non exposcunt tam longum, incurvum & tenuem Catheterem ac viri, quia illarum Urethra ampla & parva est.

3. Quando post immisum Catheterem Urina non effluit, abdomen comprimendum & sic effluxui succurrendum est.

4. Si suppressio ab inflammatione vesicæ ortum traxit, loco Catheterum, candelæ tenues parum inflexæ adhiberi solent, quia priores hoc in casu vix absque periculo applicantur.

## 2. De Lithotomia sive Sectione Calculi.

I. *Definitio.*

Lithotomia est Operatio Chirurgica, eum in finem instituta, ut calculus vesicæ, vel per vulnus perinæo vel ejus vicinæ inflectum, vel per urethram convenientibus instrumentis extrahatur.

II. *Differentia.*

Sectionis Calculi variat secundum sexum & ætatem.

1. In sexu fœminino extractio fit per Urethram, in virili vero per incisuram seu aperturam perinæi, vel, secundum Fratris Jacobi Methodum, loci lateralis 2. transversorum digitorum spatium a perinæo remoti.

2. Longe minori etiam apparatu opus est in sexu fœminino & infantibus, quam viris.

III. *Exploratio.*

1. Antequam Sectio Calculi instituatur, explorandum est, an revera calculus in vesica lateat, & cujus magnitudinis ille sit?

2. Fit autem exploratio dupliciter: vel digitis, qui ano in viris, in fœminis vero vaginæ intruduntur, comprimendo abdomen cum vesica versus digitos, ut calculus eo melius possit prehendi; vel Cathetere per urethram in Vesicam immisso, quo per tactum de calculi præsentia & magnitudine judicatur, qui modus hodie magis usitatus & priori certior est.

V. *Operatio.*

1. In pueris, postquam scamno peculiari obliquo, pro justo situ obtinendo, fuerunt impositi, digitis in anum intrusis & abdominis compressione calculus ad perinæi locum adigitur, & novacula in perinæi sinistro latere fit incisio & quidem tam ampla, qualis magnitudo calculi requirit, deinde forcipe exteriorio calculus comprehenditur & extrahitur.

2. In viris vero, post observatum convenientem situm, adhibetur Catheter fulcatus, qui vesicæ intruditur & versus perinæum adigitur: hujus sulcus inservit novaculæ pro incisione juxta ejusdem ductum faciendæ: intruditur deinde instrumentum, conductior appellatum, Catheter vero auferitur, & illius cavitati dilatatorium inferitur, remoto deinde conductore assumitur forceps & calculus extrahitur.

3. Fœminæ aliam requirunt Methodum; fit in illis extractio ex urethra & quidem mediantibus solo dilatatorio & forcipe.

4. Fratris Jacobi Methodus magis compendiosa est quam vulgaris, & felicissime hic locorum ab Auctore administrata. Exercuit eandem jam aliquoties ab Auctore edoctus D. le Maire, Chirurgus Gallicus hujus loci exquisitissimus, non absque felici successu.

5. Ubique, postquam operatio est finita, vulneris habenda est ratio & cavendum, ne ex neglecto vulnere in viris fistula oriatur.

V. *Cautele & Observationes.*

1. Extractio calculi exercitatissimum requirit Chirur-  
gum.

2. Justus per aliquot dies post Operationem situs est observandus, alias, si urina frequenter vulnus tetigerit, ejusdem consolidatio impeditur, & fistulæ via sternitur.

3. In sexu fœminino, si orificium vesicæ calculi magnitudini haud respondeat, parva incisio faciendæ est.

4. Sequitur tamen, tam a nimia dilatatione, quam læsione sphincteris, posthac facillime involuntarius urinæ effluxus.

3. De Fœtus mortui & Secundinarum  
Extractione.I. *Definitio.*

Est Operatio, qua vel manibus, vel hamulis fœtus mortuus vel secundinæ in utero retentæ extrahuntur.

II. *Signa.*

1. Cognoscitur fœtus mortuus ex abdominis subsidencia & refrigerio probe pubem, motu uteri omnino cessante & concurrentibus non tantum insigni virium prostratione, sed quandoque etiam lipothymicis insultibus.

2. Spasmodicæ quoque uteri contractiones, quibus infantes excluduntur, deficere, easque vero febriles insultus comitari solent.

III. *Prognosis.*

1. Fœminæ quo majori corporis & animi robore & vigore adhuc pollent, eo magis Operationem Chirurgicam sustinere valent.

2. Facilius procedit Operatio, si fœtus in situ naturali, quam præternaturali, est constitutus.

3. Quo diutius fœtus mortuus jam in utero hæsit, eo majori periculo mater exponitur.

4. Febris quo intensior, eo magis status ægrotæ periculosus.

5. Si hæc deest, pur plures quandoque menses, imo annos fœtum mortuum gestare possunt, cujus rei hinc inde plura habentur exempla.

IV. *Modus Operandi.*

1. Quando infans in justo positus est situ, hamulo orbitæ oculi infixo modeste ad exitum invitandus est.

2. Extractum sic caput reliquum corpus facile sequitur.

3. Quod si vero fœtus in præternaturali constitutus est situ, eo, quantum possibile, est contendendum, ut vertatur, & in situm naturalem ponatur.

4. Hoc vero ob circumstantias concurrentes non pro-



cedente, mediante cultello corpus est dissecandum & per frustula eximendum.

- 5 Placentæ evulsio ut plurimum manum ministerio fit, dummodo uterus nondum clausus sit, quo in casu, si placenta putrescat, Pilulæ Polychrestæ D. Sthalii vel Beccheri veræ specificum exerunt effectum.

#### V. *Cautela & Observationes.*

- 1 In Extractione fœtus cavendum, ne uterum vel ejusdem vaginam hamulis lædamus.
- 2 Pessimo ausu initium extractionis a pedibus fit.
- 3 In adhibitione cultelli inprimis caute agendum est, ne uterum simul dissecemus, aut vulneremus.
- 4 Placenta uterina modeste extrahi debet, ne funiculus umbilicalis rumpatur.
- 5 Quod si fortius utero adhæreat, mediantibus digitis leniter est resolvenda.

#### 4. De Dentium Evulsione.

##### I. *Definitio.*

Evulsio est Operatio, qua dentes carie affectos ob dolorum ferociam mediantibus forcipibus ex alveolis educimus.

##### II. *Indicans.*

Est dolor vehemens sæpiusque recurrens, ipsiusque vero dentis conspicua erosio.

##### III. *Instrumenta.*

Sunt forcipes, quorum varia dantur genera, maxime tamen usitatus est ille, qui pelicanus audit.

##### IV. *Modus.*

- 1 Ægrotus sedeat in sella humiliori & caput ad posteriora reclinet.
- 2 Chirurgus vero gingivam a dente separet & admodum forcipe dentem cum modestia extrahat.
- 3 Deinde os vino vel oxycrato eluatur.

##### V. *Cautela.*

- 1 Dentes non sunt evellendi, nisi manifesta carie sint affecti: odontalgia enim sympathica non exposcit eorum evulsionem.
- 2 Nulla etiam vi in extractione uti oportet, ne maxillam simul lædamus, quod pessima post se ducit symptomata.
- 3 Si extractioni gravior hæmorrhagia succedat, colutiones sub-adstringentes in usum sunt trahendæ.

#### 5. De Polypi Narium extractione.

##### I. *Definitio.*

Polypus narium est concrementum fungosum vel carnosum, ob figuram polypus dictum, in narium cavitatibus hærens & loquelam, respirationem & deglutitionem impediens, quod per peculiarem operationem Chirurgicam removetur, ac hoc ipso molestia symptomata tolluntur.

##### II. *Differentia.*

- 1 Alius est *durus*, carnosus, alius *fungosus* & mollis.
- 2 *Magnus* alius, ad palatum usque sese extendens, alius *minor*, narium alterutram saltem cavitatem opplens.
- 3 *Benignus* alius, albicans, indolens, alius *malignus*, sublividus, foetidus & dolorosus.

##### III. *Prognosis.*

- 1 Quo major, durior, pluribusque venis est instructus polypus, eo difficilior curatu.
- 2 Benignus facilius curæ obedit, quam malignus.
- 3 Nunquam etiam benignus omni periculo & curandi difficultate caret.

##### IV. *Modus operandi.*

- 1 Varie olim secundum cuiusque sententiam & placitum instituebatur.
- 2 Alii Cauterio potenti, vel actuali, concrementum absumere tentarunt.
- 3 Alii instrumento acuto instar spathæ formato polypum a partibus, quibus adhæret, separare conati sunt.
- 4 Alii filum lineum crassius, multis modis præditum per nasi & palati cavum mediante acu traducere & extremitatibus, quorum una extra nares, altera vero extra os prominebat, continuo filum instar ferræ huc & illuc trahere, sicque polypum absumere allaborant.

- 5 Alii eundem in radice ligare & nutrimento privare in se susceperunt.

- 6 Hodie vero extractio plerumque fit peculiaribus forcipibus, interius dentatis, quibus polypi proxime ad radicem, quantum possibile,prehenduntur, & huc illucque moventur, donec manui attrahenti cedant.

#### V. *Cautela & Observationes.*

- 1 Curatio per Cauteria, tam potentia quam actualia, periculosa est, ob angustiam loci, qui dextram eorundem applicationem vix permittit, quin simul partes sanæ lædantur.
- 2 Altero etiam modo sc. scindente ferro facile partes sanæ vulnerantur, ut ideo parum sese commendat.
- 3 Cum filis vero, sive traducantur sive ligentur saltem, res prorsus non procedit.
- 4 Optimus igitur est modus ultimo descriptus.
- 5 Si hæmorrhagia gravior extractionem comitetur, subadstringentia in usum sunt vocanda, sub sicca vel liquida forma, per insufflationem applicanda.

#### 6. De Globorum plumbeorum, Sagittarum & similium educatione.

##### I. *Definitio.*

Est Operatio, qua extranea, per ictus vulnera corpori communicata, iterum extrahuntur, ut solida possit fieri consolidatio.

##### II. *Differentia.*

Desumitur hæc partim a rebus, quæ corpori inferuntur, quales sunt globuli, lapilli, sagittæ, spicula, cultrorum, gladiorum, vestimentorum frustula &c. partim a modo diverso, quo iterum extrahi solent.

##### III. *Prognosis.*

- 1 Quo profundius res ejusmodi sunt immersæ, eo difficilior extrahuntur.
- 2 Idem quoque judicium esto, si pars affecta aut vicina admodum est nobilis.
- 3 Facilius ex mollibus, quam solidis partibus, fit extractio.
- 4 Per plures sæpe annos globuli plumbei absque singulari sanitatis detrimento gestantur.
- 5 Sæpius etiam gravitate sua ad alia loca descendunt, & sponte exitum sibi parant.
- 6 In locis autem nervosis, nisi extrahantur, maximos non tantum pariunt dolores, sed & febres, vigiliæ, inquietudines excitant.
- 7 Si vestimentorum aliquid cum globulis corpori nostro communicatur, plus molestiæ exinde excitatur, quam si hi soli fuissent.

##### IV. *Modus.*

- 1 In Extractione globulorum, si hi admodum profunde sunt immersi, ut per locum, per quem ingressi sunt, haud possint extrahi, in parte opposita si nihil obstiterit, Sectio & Extractio faciendæ est.
- 2 Duplex autem in extrahendo adhiberi solet instrumentum, vel terebella acuta, quam globo infigimus, vel forceps artificiosa, qua eundem comprehendimus.
- 3 Quod si autem tali in loco absconditus lateat, ut commode educi haud possit, sibi relinquendus est, donec Natura eundem sponte ad alia loca protrudat.
- 4 Difficilior etiam extractio procedit, quando ossi est immersus, ubi perforatio vel trepanatio, si os majus fuerit, quandoque instituitur, ut voti nostri deinde possimus fieri compotes.
- 5 Sagittæ, si profunde penetraverunt, in opposita parte, post sectionem factam, sunt extrahendæ: inæqualitas enim earum vix permittit, ut absque periculo retrahantur, quod etiam in omnibus aliis instrumentis, uncis & hamis munitis, est observandum.
- 6 Quæ vero sunt æqualia, nullam dilacerationem partium vicinarum post se ducentia, ea via, qua ingressa sunt, extrahi debent.
- 7 Instrumenta, quibus hæc extractio perficitur, sunt vel vossellæ vel alia forcipum genera, vel etiam sola manus.



V. *Cautela & Observationes.*

- 1 In operatione iustus patientis situs requiritur, ut nimirum eundem, quo tempore vulnerationis erat constitutus, observet.
- 2 Si vulnus non satis patulum est, ut immissa commodè extrahi possint, dilatandum est; alia ex ulteriores partium dilaceratione gravia oriuntur symptomata.
- 3 Ante extractionem sæpius etiam requiritur exploratio, digitis vel specillo conveniente peragenda.
- 4 Curiosum, quod globi carnibus, vel ossibus immerfi rotunditatem suam quandoque perdant, ubi in extrahendo maiorem patiuntur difficultatem.
- 5 Quando in parte opposita extractio instituitur, cavendum, ne vasa & nervi insigniores occurrentes difsecentur.

## IV. DE APHÆRESI.

I. *Definitio.*

Aphæresis est Operatio Chirurgica, qua ea, quæ noxia vel supervacua sunt, auferuntur.

II. *Differentia.*

Peragitur Aphæresis vel *occulte*, quando v. g. aliquid per frictionem in balneis familiarem absumitur, aut per Cucurbitulas non scarificatas ab uno corporis loco ad alterum transfertur & ibi educitur; vel aperte, si nātæ grandiores, verrucæ penfiles, mammæ cancræ, partes putridæ separantur vel abscinduntur.

1. *De Mammæ Cancræ amputatione.*I. *Definitio.*

Est Operatio Chirurgica, quæ mediante mamma cancræ convenientibus instrumentis extirpatur, ut reliquæ partes salvæ maneant.

Cancer autem mammæ est vel scirrhus eandem tumor vel corruptio sphacelofo-ulcerosa a stagnante sero ortum habens.

II. *Differentia.*

- 1 Duplex in mammis observatur cancer: alius est occultus, scirrhus tantum formam, cum concurrentibus tamen doloribus, præ se ferens, alius ulceratus, cum mammæ actuali ulceratione, intus & extus cutem erodente, fœdamque saniem fundente, conjunctus.
- 2 Distinguendæ etiam sunt ulcerationes mammæ profundæ, oris labiorum duris præditæ, & male spirantes, ab illis ulcerationibus, lividas vasorum ambientium inflationes conjunctas habentibus, propriumque demum constituentibus cancerum.

III. *Signa.*

- 1 Duritiem in aliqua parte præ se ferunt mammæ.
- 2 Accedunt dolores plus minus vehementes ægrum excruciantes.
- 3 Extendit se malum magis magisque & ad instar cancri fluvialis serpit.
- 4 Venæ etiam inflantur & lividam exhibent faciem.
- 5 Tandem ulcus mali moris cum exquisitissimis doloribus succedit.

IV. *Causa.*

- 1 Est vel externa, vel interna.
- 2 Ad externam pertinent vehementes mammæ contusiones, compressiones, stagnationes sanguinis ferrosi post se ducentes.
- 3 Ad internam referuntur decubitus sanguinis fortiores ad has partes, lactis coagulationes, hæreditaria dispositio.

V. *Prognosis.*

- 1 Cancer occultus per plurimum annorum seriem in corpore latere potest, antequam ulcerationem concipiat.
- 2 In principio curationem sui admittit, si vero inveterascit, difficillime curatur.
- 3 Melius est cancer occultum incuratum relinquere, quam medicaminibus incertis curationem su-

scipere. Secundum Hippocr. Sect. VI. Aph. 38. Cancros occultos omnes melius est non curare; curati enim citius intereunt, non curati longius tempus perdurant.

- 4 Ulceratus medicamentis aut nunquam aut rarissime curatur.
- 5 Qui sectione extirpatur, radicitus ni auferatur, semper adhuc ulterius serpit.
- 6 Fit quandoque, si mamma alterutra cancro correpta extirpatur, ut post sectionem & altera eodem afficiatur, imprimis si malum ab interna ortum fuerit causa.

VI. *Curatio.*

- 1 Quando malum eo processit, ut remediis discutientibus, resolventibus & balsamicis haud amplius obtemperet, tunc ad extirpationem ejusdem procedendum.
- 2 Conati olim sunt Cauteriis vel potentialibus, vel actualibus, hoc perficere.
- 3 Hodie vero amputatio magis usitata & convenientior videtur.
- 4 In cancro nimirum occulto mediante incisione in forma crucis facta glandulæ scirrhusæ excinduntur.
- 5 In cancro vero ulcerato, ubi sola mamma est amputanda, æger in convenienti situ detineatur, brachio illius lateris retroducto, ut musculus pectoralis retrahatur tumorque magis in conspectum veniat.
- 6 Deinde trajiciantur per ipsam mammæ basin duæ acus filis robustioribus instructæ cruciatim, ut pars amputanda attolli & a partibus, quibus adhæreret, paulisper removeri possit.
- 7 Postea lato & falcato cultro amputatio celerrime, quantum possibile est, instituat, incipiendo sectionem a parte inferiori, ut vasa mammaria, hæmorrhagiam post se ducentia, ultimo difsecentur.
- 8 Tandem Stypticis, digestivis & Sarcoticis Operationi finis imponatur.

VII. *Cautela & Observationes.*

- 1 Cavendum, ne quaslibet mammæ scirrhusitates, vel etiam ulcerationes, cancræ saltem indolem æmulantes, pro ipso cancro accipiamus.
- 2 Excisio scirrhusitatum non absque periculo instituitur: ægrum adhuc juvenem & viribus pollentem esse decet.
- 3 Inter medicamina, quæ cancri progressum inhibent, in primis referenda sunt Camphorata, Myrrhata & Terebinthinata in Spiritu Vini rectificatissimo soluta.
- 4 Solus etiam Spir. Vini Crocatus multum levaminis affert.
- 5 Omnia corrosiva septica mineralia & alcalia cancrum vehementer exacerbant.

2. *De tumorum tunicarum Curatione.*I. *Definitio.*

Tumores tunicati sunt tumores plus minus duri, propria tunica seu membrana obvoluti, in variis corporis partibus evenientes.

II. *Differentia.*

- 1 Differunt tumores ratione loci & consistentiæ.
- 2 Alii contingunt circa articulos & loca tendinosa membranaceæ, nodosam & duram faciem præ se ferentes, Gangliorum nomine insigniti.
- 3 Alii in locis carnosissimis eveniunt, & quidem vel sub liquidiori forma, ubi Atheromata dicuntur, vel magis spissiori ad instar mellis, ubi Melicerides audiunt, vel solidiori, ubi Steatomatum nomen assumunt.

III. *Signa.*

- 1 Cognoscuntur ex consistentia & magnitudine.
- 2 Ganglia avellanæ aut nucis juglandis magnitudinem vix superant, solidam etiam duramque habent consistentiam.
- 3 Atheromata vero, Steatomata & Melicerides insignem sæpius adæquant proportionem & consistentiam plus minus molliori prædita sunt.
- 4 Nullis etiam doloribus ægrotis sunt molesta, sicut & Ganglia.

IV. *Prognosis.*

- 1 Rarissime aliquis horum tumorum est periculosus.



- 2 Per plurium sæpe annorum decursum absque molestia possunt gestari.
- 3 Adeoque, præter deformitatem, vix aliquid incommodi præstant.
- 4 Interdum tamen, quando in insignem magnitudinem excrescunt & ægro molesta, & sanitati, ob nutrimenti corporis privationem, præjudiciosa esse incipiunt.

V. *Curatio.*

- 1 Quando tumores tunicati medicamentis adhibitis neque resolvi, neque suppurari possunt, ad Operationem Chirurgicam procedendum est.
- 2 Dupliciter autem administratur, vel deligatione, quando tumores basin habent angustiore ut penduli quasi sint, vel amputatione quando basiseorum est latior.
- 3 Prius fit mediantibus filis sericis vel setis equinis, quæ circa basin constringuntur & tamdiu ibidem relinquuntur, donec tumor sponte decidat. Posterior peragitur mediante vel scalpello, quo cutis longitudinaliter, vel cruciatim inciditur, & post separata cutis labia universus tumor tunicatus excinditur, vel cultro latiori, quo totus tumor, cum carne contegente amputatur.

V. *Cautela.*

- 1 In Operatione cavendum, ne tunica tumorem continens, imprimis si hic fluidus nimis sit, laceretur, difficilius enim deinde radicitus extirpatur, sed faciliore regenerationi ansa præbetur.
- 2 Quando nervi vel vasa majora eisdem ingrediuntur vel circumdant, imprimis eorum ratio habenda est.
- 3 Si Operationem hæmorrhagia nimia comitatur, pulvere styptici vel Cauteria actualia adhibenda sunt.

3. *De Amputatione Artuum.*I. *Definitio.*

Amputatio est Operatio, quæ artus sphacelo correpti, ad inhibendam ulteriorem putredinem, abscinduntur.

II. *Differentia.*

Ratione loci, in quo fit; quandoque in brachiis, quandoque in pedibus instituitur.

III. *Signa.*

- 1 Cognoscitur sphacelus, ex partis affectæ tumore, nigredine, sensus & motus omnimoda privatione, etiam si pungatur vel scindatur.
- 2 Putridum insuper & cadaverosum spirat odorem.
- 3 Caro vero mollis & putrilaginosa est.

IV. *Causa.*

- 1 Causa primaria, ob quam Amputatio instituitur, est ipse sphacelus.
- 2 Occasionalis: contusio gravior, inflammatio, vulnera profunda, frigus intensum, animalia venenata.

V. *Prognosis.*

- 1 Pars sphacelo correpta nulla arte restitui potest; ideo ense recidenda, ne pars sincera trahatur.
- 2 Sphacelus sibi relictus magis magisque serpit & partes sanas inficit, & rarissime sponte subsistit.

VI. *Operandi modus.*

- 1 Pro abscindendis membris Auctores varia eligunt loca: alii enim amputationem in parte sana, in corrupta alii instituunt: alii in ipsis articulis, extra eosdem alii; alii remote a sphacelo præprimis in pede, alii proximo ab eodem loco.
- 2 Hodie amputatio communissime paulo infra genu, si supra mallæolum sphacelus sese extendit, & quidem in parte sana instituitur; sunt vero alii, qui tantum relinquunt, quantum sphacelus permittit, ut parti relictæ eo melius pede artificiali possit succurri. Si in brachio celebratur, itidem parti sanæ, quantum possibile est, parcitur.
- 3 Antequam autem fiat amputatio, pars infra & supra fortiter ligatur, carne ubique probe retracta.
- 4 Deinde cultro lato & falcato celerrima fit circumcisio & periosto mediante scalpello ubique separato, ferra applicatur, aliquotque ictibus os pertunditur.
- 5 Hæmorrhagiæ vero metuendæ prospicitur vel ligatura vasorum majorum, vel Cauterio actuali, vel stypticis remediis exquisitis.

- 6 Tandem vero pars splenis & fasciis convenientibus munitur.

VII. *Cautela.*

- 1 Amputatio, quæ in parte demortua, nec non quæ in ipsis articulis fit, prorsus improbat; illic ob metum reliquarum sphacelofarum, hic ob plura, quæ sequuntur incommoda.
- 2 Semper eo prospiciendum, ut post carnis incisionem periostium bene separetur, relictum enim acerbissimos in Operationis persecutione parit dolores.
- 3 Si os est geminum, ut in brachio, ferra ita est applicanda, ut utrumque contingat, ressecando primo tenuius, post & crassius.
- 4 Membra minora v.g. digiti scalpello saltem vel forfice sunt abscindenda.
- 5 Quando sphacelus ultra poplitem vel cubitum sese extendit, Operatio non est instituenda ob plurimum musculorum & vasorum majorum concursum.

4. *De Castratione.*I. *Definitio.*

Castratio est Operatio, qua testes, seminis elaborationi inservientes, ob causam, vel Medicam, vel Politicam, aut Physicam excinduntur.

II. *Differentia.*

Instituitur hæc Operatio in uno tantum testiculo vel duobus. Primum contingit, quando ratio Medica ad eandem faciendam nos incitat, posterius vero, si aliæ & magis externæ adsunt rationes impulsivæ.

III. *Indicantia.*

- 1 Peragitur hæc Operatio ob causas Medicas quando post contusionem graviolem testiculi & subsequentem inflammationem sphacelus accedit, ut vicinis partibus similis metuenda sit corruptio; vel si secundum perversam quorundam Operatorum consuetudinem Curatio Herniæ per Processus peritonæi deligationem, & amputationem testiculi suscipitur, ut posthac prolapsus intestinorum inhibeat.
- 2 Causæ Politicæ apud Turcas locum habent, ubi personas certas uxoribus suis observandis destinatas castrari, seu testiculis privari jubent, ne commercium cum iisdem habere possint. Insignitæ olim fuere Evnuchorum nomine.
- 3 Ob physicam vero rationem non raro apud Italos hæc Operatio instituitur, ut nimirum vox clara & sonora conservetur; unde omnes fere Magnates Cantores suos, suavitatem vocis alios longe superantes, ex Italia petunt.

IV. *Prognosis.*

- 1 Suscipitur hæc Operatio sæpissime non absque vitæ periculo.
- 2 Juniores vegeti facilius eandem superant, quam seniores, debiles.
- 3 Redduntur eadem homines effæminati, adque sobolem procreandam prorsus incapaces.

V. *Operatio.*

- 1 Æger seu persona castranda in tali situ sit constituta, ut scrotum patulum, corpus vero scamno vel mensa firmiter impositum sit.
- 2 Facienda deinde est incisio proximo ad flexuram femoris loco & tunica elythroides a processu peritonæi originem habens, digitis separanda est.
- 3 Postea testiculus vel digitis, vel castratore Instrumento comprehendatur, & post traductam acum per vasorum spermaticorum intermedium, fortissime eorum deligatione, forfice abscindatur, relictæ longiori filo, extra vulnus ducendo, ut si forte Natura aliquid separare suscipiat, eodem possit fieri extractio.
- 4 Vulnus vero digestivis, sarcoticis & defensivis tractetur.

VI. *Cautela & Observationes.*

- 1 Castratio vix alibi locum habet, quam in corruptione sphacelosa testiculi.
- 2 In aliis casibus non absque peccato instituitur.
- 3 Pluribus etiam incommodis observantur esse obnoxii castrati, ob privationem partium principalium, præter usum primarium, quem præstant ad sa-



ad sanitatis quoque conservationem concurrentium.

- 4 Castratos ab Apoplexia, Podagra aliisque morbis immunes esse cum Experientia haud convenit.

### 6. De Extirpatione Uvulae.

#### I. Definitio.

Extirpatio Uvulae est operatio, qua pars hæc ulcerata, corrupta vel nimium inflata, suffocationisque metum inferens, per sectionem aufertur.

#### II. Indicantia.

- 1 Abscinditur uvula ob ulcerationem vel corruptionem, quam aliquando concipit.
- 2 Vel si in locis frigidioribus ab humoribus viscidis ita infarcitur, ut suffocationis pericula incutiat.

#### III. Prognosis.

- 1 Qui uvulam amittunt, loquelæ impedimenta incurunt.
- 2 Sectionem gravis quandoque hæmorrhagia comitatur.
- 3 Uvula destituti posthac facilius morbis pectoris tussiculosis, asthmaticis exponuntur: quia humores tunc magis ad pectus ruunt.

#### IV. Operatio.

- 1 Peragitur abscissio communiter peculiari instrumento a rustico olim invento, a Sculteto vero delineato.
- 2 Potest tamen commode etiam fieri forfice longiori.
- 3 Post sectionem adhibentur styptica.

#### V. Cautela & Observationes.

- 1 Nisi summa necessitas jubeat, ad hanc operationem haud est procedendum: contribuit enim uvula multum ad vocis modulationem.
- 2 Prolongationi uvulae nimiae, convenientibus remediis plerumque absque sectione occurrere potest.
- 3 Rarissime igitur apud nos instituitur.
- 4 Magis solennis autem est in regionibus Borealibus.
- 5 Fabricius Hildanus ope fili & deligatione eandem celebrare docuit.
- 6 Alii Cauteria actualia commendavere.
- 7 Uterque vero modus modo laudato, qui per sectionem fit, postponitur.

### V. DE PROTHESI sive ANAPLEROSI

#### I. Definitio.

Prosthesis est Operatio Chirurgica, qua partes a primo ortu vel per infortunium denegatae vel abreptae, restituntur.

#### II. Differentia.

Alia est vera, quæ naturales partes ablatae vere refarcit, v. g. nasum vel aurem amputatam, musculi partem absumentam. Exercuit hanc olim magna industria Gasp. Taliacotius Italus, Med. Doct. & Prof. Bononiensis; alia palliativa, quæ naturalem defectum arte restituere satagit, v. g. dentes amissos, factitiis ex ebore, oculum vitreo oculo, palatum exesum lamina argentea; nasum factitio ex argento, aures peculiari artificioso organo, pedes cruribus ligneis.

#### III. Materia.

- 1 Prosthesis vera materiam non nisi ex corporibus vivis recipit, & quidem quæ parti ablatae restituendæ apta est.
- 2 Palliativa vero tam ex animalibus mortuis, quam mineralibus & vegetabilibus desumit materias, scopo suo convenientes, v. g. dentes, stannum, cuprum, argentum, aurum, lignum, vitrum &c.

#### IV. Modus.

- 1 In Prothesi vera sumuntur vel partes ablatis prorsus conformes, vel carnis frustula in formam amissæ partis demum conformanda. Eo, autem in utroque casu allaborandum est, ut ambo labia ubique adhuc cruenta & calentia sibi adaptentur & perite deligentur.
- 2 Prosthesis palliativa a variis artificibus sua recipit adminicula, pro ablatae partis differentia, diversa.

#### V. Usus.

Hujus operationis usus est, ut deformitatem externam, tum etiam ablatarum officium refarciamus.

#### VI. Cautela.

- 1 In prothesi vera, si partes ab aliis mutuuntur animalibus, contingit aliquando, ut post mortem horum mutuata portio per sympathiam etiam putrescat.
- 2 Melius itaque ex proprio desumitur corpore aliqua portio, quam ex alieno.
- 3 Respiciendum etiam est ad ætatem, temperamentum, dispositionem hominum, tempus anni, ut operatio eo facilius procedat.
- 4 Præterea exercitatus requiritur artifex, cui hæc medendi methodus per omnes circumstantia nota sit.

### V. DE DIORTHOSI.

#### I. Definitio.

Diorthosis est Operatio Chirurgica, qua membra vel ab ortu, vel ex infortunio malam figuram referentia, ad naturalem reducuntur ordinem.

#### II. Differentia.

Ratione loci fit vel in artubus & imprimis pedibus, vel trunco & maxime ejusdem vertebrae.

#### III. Instrumenta.

Peragitur Diorthosis instrumentis ex ferro, corio fortiori, vel alia materia confectis.

#### IV. Modus.

- 1 Incurvationi dorsi thoraces inserviunt.
- 2 Pedum curvaturam mediantibus ocreis restituere conamur.
- 3 Cranii depressioni vel Cucurbitulae, vel Dropaces, vel elevatoria instrumenta consulunt.
- 4 Aliis partibus deformibus alio occurrimus modo.

#### V. Usus.

- 1 Ut partium deformitas corrigatur.
- 2 Ut functiones, ob vitiatam structuram turbatae, refarciantur.
- 3 Ut pericula, in depressione Cranii, v. g. imminetia, removeantur.

#### VI. Cautela.

- 1 Deformitas Curvaturæ vix restituitur, nisi membra aequaliter adhuc sint mollia.
- 2 Unde restitutio facilius procedit in junioribus, quam adultis.
- 3 Infantes Rachitide laborantes, sæpius post mutationem annorum sponte a deformitate ossium, curantur.
- 4 Quæ in fracturis & luxationibus contingunt, dextram harum Operationem administrationum requirunt.
- 5 Ossa fracta, si male sunt reposita & callum nondum formavere, secundariam fracturam exposcunt.

### P A R S III.

#### D E

## H Y G I E I N E

#### S I V E

### D I A E T A.

- I. Definitio: **H**ygienæ est pars Medicinæ. Principalis modum sanitatem conservandi & restituendi per sex res, n. n. tradens.

#### II. Differentia.

- 1 Sumitur *strictè* pro *Diætâ Sanorum*, quatenus scilicet monstrat, quomodo per legitimum rerum sex non-naturalium usum Sanitas conservari possit.
- 2 *Late* quoque pro *Diætâ Ægrotorum*, quando scilicet regimen certum & usum rerum non-naturalium præscribit, ita ut morbus eo facilius superari possit: quamvis hoc modo magis pertineat ad Methodum Medendi.

#### III. Ma-



III. *Materia.*

Tractat Diæta usum legitimum rerum sex nonnaturalium, Aeris scil. Cibi & Potus, Motus & Quietis, Somni & Vigiliarum, Excretorum & Retentorum ac Animi Pathematum, quomodo scil. & Sanis & Ægris convenient.

## S E C T I O I.

## D E

## D I Æ T A S A N O R U M.

1. *De Aere.*

**I. Definitio:** **A**er est congeries particularum ramosarum & ætherearum globum terraqueum ambiens & varia inpr. in inferiori regione effluvia continens & hinc ad sanitatem & morbos multum conferens.

II. *Differentia.*

- 1 Alius est *calidus*, alius *frigidus*.
- 2 Alius vero *humidus*, alius *siccus*.
- 3 Alius est *mixtus*, *calidus* scil. & *humidus*, *calidus* & *siccus*, *frigidus* & *humidus*, *frigidus* & *siccus*.
- 4 Alius a *Meteoris* & *ventis commotus*, alius vero *quietus* & *tranquillus* est.
- 5 Alius multis *repletus* est *effluviis*, alius *purior* & *serenus*.

III. *Regula & Observationes.*

- 1 Calidus aer sanguinem nimis resolvit; habitum corporis relaxat, insignes excitat sudores ac corpus insigniter debilitat, quare ad sanitatis conservationem minime est idoneus.
- 2 Frigidus habitum corporis nimis condensat & transpirationem impedit, humores spissos reddit ac varios morbos internos a spissitudine sanguinis oriundos producit, minus tamen noxius est, quam calidus nimis.
- 3 Humidus aer habitum corporis nimis relaxat, unde humores majori copia in partes exteriores ruentes facile ibidem stagnant & corrumpuntur, & varii affectus catarrhales oriuntur.
- 4 Si nimis siccus est aer, partes quoque corporis nimis exsiccantur & flexilitas earum debita perit.
- 5 Omnium ferè pessimus aer est humidus & calidus, hic enim gravissimos & contagiosos parit morbos.
- 6 Aer nimis spissus, & multis effluviis repletus inspissat humores & ad varias stagnationes disponit, imo sæpius homines fere suffocat.
- 7 Effluvia noxia & maligna in aere contenta facile putredinem inferunt humoribus & morbos malignos producant.
- 8 Omnes subitanæ aeris alterationes frigidi in humidum, calidi in humidum &c. sanitatem, humores & tonum nimis subito alterando, maxime lædunt.
- 9 Aer subterraneus sanitati maxime contrarius est.
- 10 Magis salutaris est aer in locis superioribus & ventis aliquo modo expositis, quoniam effluvia noxia facile tolluntur, quare domicilia in superioribus domuum contignationibus præ inferioribus eligantur.
- 11 Conclavia non semper clausa teneantur, sed sæpius aperiantur, ut ab aere transeunte effluvia expellantur.
- 12 Aer liber in locis compestribus maxime confert ad sanitatem, inprimis si corpus in illo simul commovetur.
- 13 Aer in conclavibus recenter calce obductis propter effluvia varia ad sanitatem minime confert, quare talia conclavia non eligantur, nisi antea probe exsiccata fuerint.
- 14 Aer a ventis nimium commotus sanitatis non raro contrarius est.
- 15 Ad depurationem aeris, grassantibus, morbis contagiosis maxime confert ignis flammans, aut varia suffimigia prunis injecta.
- 16 Optimus ad Sanitatem conservandam aer est tem-

peratus, scil. neque calidus, neque frigidus, neque humidus nimis & serenus, pauca nimirum effluvia in se continens.

2. *De Cibo.*

**I. Definitio:** **C**ibus est alimentum vel solidum vel mædiæ naturæ, vel fluidum, corporis nutritioni destinatum.

II. *Differentia.*

- 1 *Ratione consistentiæ* alii sunt solidi, alii molles, alii fluidi, uti panis, carnes, pultes, juscula &c.
- 2 Alii desumuntur ex Regno animali, alii vero ex vegetabili.

III. *Regula & Observationes.*

- 1 Cibi ex Regno vegetabili desumpti, quoniam ad putredinem non adeo proni sunt ac carnes, magis profunt ad vitam longam, quam cibi ex Regno Animali.
- 2 Optimum nutrimentum præbet panis fermentatus ex tritico & secali paratus, non adeo recens, nec etiam nimis siccus.
- 3 Optime quoque nutriunt cibi ex hordeo excorticato, oryza, avena, milio parati.
- 4 Legumina quoniam copioso flatu producunt, non adeo conveniunt ad sanitatem, quare durioribus laboribus assuetis sunt relinquenda.
- 5 Olera etsi multum aquæ in se contineant, & hinc multum non nutrant, optimum tamen sunt nutrimentum si cum carne coquantur, aut aliis additis condiuntur.
- 6 Quo majorem aquæ copiam Fructus continent, eo magis ad corruptionem proni sunt & hinc sanitatem lædunt.
- 7 Fructus acidi optime temperant nimium humorum calorem.
- 8 Omnes fere fungi, quoniam multum viscidæ & mucosæ materiæ continent, parum nutriunt, imo sæpius noxii sunt, si condimentis non corrigantur.
- 9 Inter carnes bubulæ prærogativa debetur, quoniam neque laxam nimis, neque duram nimis habet consistentiam & teste experientia optime nutrit.
- 10 Caro suilla propter pinguedinem & molliorem consistentiam ad corruptionem præ cæteris magis pronæ est.
- 11 Caro agnina & vitulina optime nutriunt, propter laxiorem tamen consistentiam facile quoque corrumpuntur.
- 12 Carnes ferinæ etsi insigniter nutriant, non tamen adeo facile digeruntur ac reliquæ.
- 13 Carnes assatæ meliores semper sunt coctis.
- 14 Juscula ex carnibus plus nutriunt, quam carnes ipsæ.
- 15 Pisces propter mucosam consistentiam laudabile nutrimentum minime præbent.
- 16 Lac copiosum & præstantissimum largitur nutrimentum, sed præsupponit corpus purum.
- 17 Quantitas ciborum nimia plus semper negotii facessit, quam qualitas.
- 18 Bis die cibum capere potius quam semel potest homo, nisi consuetudo aliud quid postulet.
- 19 Tenuis victus ex carnibus mollioribus, jusculis &c. tenerioribus convenit.
- 20 Victus mediocris, nec nimis crassus, nec nimis tenuis optimus est.
- 21 Corpora impura quo magis nutraveris, eo magis læseris.
- 22 Prandium cœna semper sit liberalius.
- 23 Præstat certis & statis temporibus cibos assumere, quam vagis.
- 24 Quo melius cibi masticantur, eo felicius procedit digestio & contra.
- 25 Quibus Ventriculus est debilis, iis largior ciborum ingestio nocet.
- 26 Sedentariam vitam agentibus neque victus crassus, neque copiosus convenit.
- 27 Uti multiformis alimonia morborum, ita victus simplex sanitatis causa est.



- 28 Quibus Ventriculus est debilis, iis cibiaromatibus conditi optime conveniunt.

### 3. De Potu.

I. *Definitio*: **P**otus est alimentum fluidum corporis nutritioni & alimentorum resolutioni intervens ac fluxilitatem sanguinis conservans.

#### II. *Differentia*.

- 1 Alius est *naturalis* uti *Aqua & Vinum*.
- 2 Alius vero est *artificialis*, uti *Cerevisia*, *Mulsa*, *Potus Thee Caffee &c.*

#### III. *Regule & Observationes*.

- 1 Aquæ potus est maxime naturalis & ad vitæ longævitatē insigniter confert.
- 2 Aqua crystallini coloris levis & insipida & quæ in glaciem non facile vertitur, optima est.
- 3 Aqua ex montibus scaturiens reliquis præferenda est.
- 4 Aqua palustris sanitatem maxime lædit.
- 5 Qui continuo acidulis utuntur præ ceteris longævitate gaudent, uti id in nostra vicinia observamus.
- 6 Vinum quo magis Diuresin excitat, uti Rhenanum, eo magis confert ad sanitatem.
- 7 Vinum generosum moderate sumptum est optima Medicina, abusus vero ejusdem in multos morbos præcipitat.
- 8 Vina Hungarica, Austriaca & superioris Alsatie maxime ad Podagram & Calculum disponunt, si continuo assumuntur.
- 9 Spiritus vini alique liquores spirituosi immoderate sumpti ad multos morbos disponunt, post cœnam autem & prandium in parva quantitate assumpti, digestionem inpr. ciborum minus laudabilem optime promonent.
- 10 Cerevisiæ bonæ notæ sunt, si sunt tenues, probe defecatæ, claræ & lupulo modice conditæ, non facile acefcunt, caput non replent, & Diuresin excitant.
- 11 Cerevisiæ maxime inebriantes magis nocent, quam vina talem effectum edentia.
- 12 Potus sufficiens maxime ad Sanitatem confert, quatenus æstum sanguinis temperat, ejusque fluxilitatem conservat, & resolutionem ciborum promovet.
- 13 Potus matutinus aut in seram noctem protractus sanitatem lædit.
- 14 Potus calidus fluxilitatem sanguinis optime conservat.
- 15 Potus frigidus æstuante corpore sumptus sæpius febres aliosque affectus producit.
- 16 Potus Caffee Phlegmaticis & Sanguineis magis convenit, Thee autem Cholericis.
- 17 Abusus potus Caffee tremores producit.
- 18 Omnis potus nimius sive calidus, sive frigidus sit, Ventriculum debilitat ac digestionem lædit.

### 4. De Motu & Quiete.

I. *Definitio*: Vid. *Tab. de Physiol. p. 13.*

#### II. *Differentia*.

- 1 Alius motus est fortis, alius lenis, alius continuatus.
- 2 Quies vel est nimia, vel est sufficiens ad restaurandas vires.

#### III. *Regule & Observationes*.

- 1 Motus corporis non excedens & legitima agitatio corporis non solum multum confert ad sanitatem conservandam, sed etiam ad morborum chronicorum curationem.
- 2 Per motum corporis fluxilitas sanguinis & calor conservatur & secretiones ac excretiones optime promonentur.
- 3 Ejusdem motus ope abundantia sanguinis sensim sensimque consumitur, roburque partium ac fluxilitatis partium conservatur.
- 4 Motus appetitum prostratum optime excitat.
- 5 Motus fortior post sumptos cibos non semper convenit, quatenus non raro digestionem turbat.
- 6 Motus semper continuetur usque ad placidam sudoris excretionem.
- 7 Motus in aere libero magis confert ad Sanitatem, quam in locis clausis susceptus.
- 8 Equitatio Hypochondriacis & Hæctica incipiente laborantibus maxime salutaris est.

- 9 Quies post motum fortiorem non statim suscipiatur, sed corpus adhuc aliquandiu leniter moveatur, ut partes Sulphureo-Salinæ eo commodius per transpirationem expelli queant.

- 10 Quies nimia enervat corpus & ad labores suscipiendos ineptum reddit.

- 11 In quiete nimia humores increassantur, ac Secretiones & Excretiones admodum tarde procedunt, unde humores inutiles in corpore coacervantur, & multis malis porta panditur.

### 5. De Somno & Vigilis.

I. *Definitio*: Vid. *Tab. de Physiol. p. 13.*

#### II. *Differentia*.

#### III. *Regule & Observationes*.

- 1 Somnus organa sensoria & motoria a laboribus fatigata admodum refocillat.
- 2 Humidioribus subjectis majus tempus somni concedendum est, quam siccioribus.
- 3 Somnus pomeridianus infantibus, senibus & debilibus non denegandus est.
- 4 Qui continuis meditationibus caput nimium fatigant, diutius dormiant necesse est.
- 5 Inter labores corporis & somnum continua debet esse proportio.
- 6 Somnus nimius corpus enervat, hominesque stupidos reddit.
- 7 Somnus statim post cœnam initus noxius est.
- 8 Præstat in conclavibus frigidis aut temperatis quam in calidis dormire.
- 9 Nil corpus magis debilitat quam continuæ vigiliæ.
- 10 Uti somnus nimius humidioribus nocet subjectis, ita vigiliæ moderatæ ipsis quam maxime proficiæ sunt.

### 6. De Excretis & Retentis.

I. *Definitio*: **E**xcreta & Retenta sunt humores corporis inutiles & utiles, quorum illi e corpore expelli, hi vero in eo retineri debent, ut Sanitas conservetur.

II. *Differentia*. Vid. *Tab. de Physiol. & Patholog. p. 30.*

#### III. *Regule & Observationes*.

- 1 Si ea quæ excerni debent, excernuntur, ea vero, quæ retinenda sunt, retinentur, optimum est.
- 2 Subjectis humidioribus sudores spontanei maxime sunt proficui: imo consulto etiam, si primæ viæ sunt liberæ, per remedia assumpta instituuntur.
- 3 Eruptentibus sudoribus matutinis corpus quietum in lecto contineatur, nec etiam finito sudore aeri statim exponatur.
- 4 Sudores tales neglecti, aut imprudenter suppressi, gravia sæpius post se trahunt incommoda.
- 5 Urina nunquam retineatur, sed si urget, statim excernatur, ne varia mala sequantur.
- 6 Urinæ secretio naturalis neque per copiosa potulenta, neque per acria nimis & calida assumpta turbetur, alias varia sequuntur mala.
- 7 Motus moderatus urinæ secretionem optime promovet, nimius vero eandem turbat.
- 8 Omnia pingua, aromatica & vina fortiora non tantum bilis acrimoniam & proventum augent, sed etiam eandem insigniter commovent.
- 9 Muci secretio & excretio multum confert ad vitam sanam.
- 10 Muci resolutionem & excretionem promovet motus corporis moderatus.
- 11 E contra ejus proventum auget immoderatus usus alimentorum.
- 12 Si excretionem mucosæ e pectore & naribus Natura instituit, mucositas illa prompte ejiciatur.
- 13 Feces alvinæ nunquam diu retineantur in corpore, sed statim ac stimulus sentitur, excernantur.
- 14 Si feces alvinæ nimis induratae sunt, assumantur potulenta sufficientia ac corpus motu exerceatur.
- 15 Si excretionem alvinæ quotidie non excernuntur, excretio per lenia stimulantia & lubricantia promoveatur.
- 16 Cibi non bene masticati, potus defectus & vita sedentaria multum conferunt ad alvi obstructionem.
- 17 Qui ad alvi laxitatem proni sunt, vitent refrigerationem corporis & inprimis pedum.



- 18 Saliva non semper exspuatur, sed maximam partem deglutiatur, ut ciborum digestio promoveatur, flexibilitas fibrarum conservetur, & excrementa alvi aliquo modo diluantur.
- 19 Mensium fluxus per diætam inordinatam non turbetur, ne ravia sequantur mala.
- 20 Motus corporis moderatus optime hanc excretionem promovet.
- 21 Fluentibus mensibus vitentur cibi acidi male digestionis, flatulenti, refrigeratio corporis & inpr. pedum &c. quoniam talia mensium fluxum sistere solent.
- 22 Vitentur quoque vina generosa, motus nimius, ira &c. ne Mensium fluxus nimius sequatur.
- 23 Concubitus, neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est: rarus, corpus excitat, frequens solvit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura ratione ætatis & corporis, scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur. *Celsus Lib. I. Cap. I. p. 21.*
- 24 Venus Hyeme non perniciofa, Vere tutissima: neque Æstate vero, neque Autumno utilis est, tolerabilior tamen per Autumnum est. Æstate in totum, si fieri potest, abstinendum. *Idem l. c. Cap. 4. p. 33. 34.*

### 7. De Animi Pathematibus.

**I. Definitio.** **A** Nimi pathemata sunt motus ab objectis externis excitati, corpus & inprimis humores maxime alterantes & hinc ad Sanitatem & morbos multum contribuentes.

### II. Differentia.

- 1 Quædam humores maxime commovent & ad exteriora expellunt, uti Ira potissimum.
- 2 In aliis contrarius fit effectus, uti in Terrore.
- 3 Alia humores in interioribus sensim inspissant, uti Tristitia.

### III. Regule & Observationes.

- 1 Nil est quod magis & promptius in morbos præcipitat, quam Animi pathemata immoderata.
- 2 Qui animi pathematibus mature frenum injicere novit, is magnum ad sanitatem conservandam possidet arcanum.
- 3 Ira affectum gravissimus est, & maximas non solum propter bilis effusionem, partim propter nimiam humorum commotionem turbas excitat.
- 4 Ad præcavenda damna a bile & commotione humorum originem trahentia, optime conveniunt temperantia & nitrosa, ut & blandæ laxationes.
- 5 Post iram graviores alimenta non assumantur, ne graviora sequantur mala.
- 6 Optima contra iram remedia sunt, si homines ad iram proni objecta eam excitantia fugiunt, post iram alia statim negotia tractant, corpus leni motu in aere libero exercent, cum aliis conversantur &c.
- 7 Magna ad iram pronitas sine causa manifesta, malam sæpius viscerum dispositionem indicat.
- 8 Continua tristitia enervat totum corpus, unde motibus tardius procedentibus, variæ sequuntur humorum stagnationes & viscerum, præcipue lienis, infarctus & Scirrhi.
- 9 Contra tristitiam optime convenit deambulatio in aere libero, vinum, consortium hominum &c.
- 10 Tristitia insignis sine causa manifesta semper monstri quid alit.
- 11 Terror subitaneus sæpius gravissimos producit morbos.
- 12 Post terrorem motus corporis, vinum ac alia confortantia optime profunt.
- 13 Amor moderatus excitat corpus, nimius vero illud destruit.

De Differentia Diætæ respectu Ætatum, Sexus & Temperamentorum.

### I. De Diætâ respectu Ætatum.

**I. Definitio.** **D**iætâ ætatum est quando respectu certarum ætatum unicuique competentes Regulæ diæreticæ præscribuntur.

### II. Differentia

- 1 Alia respicit diætâ a prima Infantia usque ad mediam ætatem.
- 2 Alia tractat diætâ mediæ ætatis.
- 3 Alia Senibus vivendi regulas præscribit.

### III. Regule & Observationes.

- 1 Infante in lucem edito & a fordibus purgato, cibi non statim exhibendi sunt, sed potius meconium per lenia abstergentia, uti est *Butyrum & Saccharum, Sirupi laxantes, Oleum Amygd. dulc. &c.* evacuandum est.
- 2 Optimum infantum nutrimentum præbent lacticia & pulles ex illis paratæ.
- 3 Lac maternum magis illis convenit, quam Lac nutricum.
- 4 Reliqua potulenta, inpr. quæ flatus & fermentationes excitant, ipsis minime conveniunt.
- 5 Abusus ciborum & dum quasi infarciuntur cibis, infantes ad multos morbos disponit.
- 6 Potus nocturnus & frigidus infantibus maxime nocent.
- 7 Primum lac quamvis sit admodum ferosum, infantibus minime est denegandum, quia Meconium optime evacuat.
- 8 Cunarum nimia agitatio ad somnum conciliandum infantibus magis nocet, quam prodest.
- 9 Quo magis infantes juniores primis mensibus dormiunt, eo meliorem eorum statum indicat somnus talis.
- 10 Si infantes nimis & præter consuetudinem vigilant, morbi imminet.
- 11 Aer calidus & temperatus infantibus optime convenit, frigidus vero ipsis nocet & ad Tusses ac Diarrhæas disponit.
- 12 Transpiratio semper libera esse debet, hac enim legitime procedente, infantes a multis morbis præservantur: quem in finem infantibus optime conveniunt balnea.
- 13 Pari modo semper quoque ad alvi libertatem respiciendum est: nimis siccam promovent butyrum puliculis additum, manna eodem modo usurpata: nimiam laxitatem præcavet & curat lenis sudor.
- 14 Infantibus maxime nocent matrum animi pathemata, quoniam lac maxime alterant, unde infantes sæpius Convulsionibus, Diarrhæis aliisque malis corripiuntur.
- 15 Ablactatis infantibus carnes & vinum non facile concedantur, illud enim facile corrumpitur, propter digestionem non satis fortem, ac vermes producit, hoc vero propter calorem corpora nimis exsiccat & auctorem impedit.
- 16 In infantum diætâ quoad cibum, potum, somnum &c. semper respiciendum est ad certum ordinem & cibi non quavis hora sunt ingerendi.
- 17 Addephagia puerorum est multorum morborum fundamentum, unde lenia laxantia & interdum blandæ vomitoria ad removendas cruditates, ex immoderata Diætâ natas, infantibus & pueris profunt.
- 18 Motus corporis pueris concedendus est sufficiens, ut hoc modo Secretiones & Excretiones promoveantur.
- 19 Pueri studiis dicati multis laboribus non obruantur, ne ingenium hebes fiat.
- 20 Infantes & pueri præmature judicio pollentes, vel stupidi postea fiunt, vel mature moriuntur.
- 21 Somnus sufficiens pueris maxime prodest, quoniam auctorem corporis optime promovet.
- 22 Affectibus animi puerorum mature frenum injiciendum est, ne iisdem affuescant, & multa damna exinde oriantur.
- 23 Adolescentes Juvenes & viri in cibo & potu mediocritatis leges semper observent.
- 24 Quo simpliciores sunt cibi, eo meliores.
- 25 Abusus vini & spiritus vini ad multos affectus spastico arthriticos disponit.
- 26 Excessus in venere corpora admodum enervat.
- 27 Motus corporis laboriosus in hisce ætatibus optimus est, quoniam Secretiones & Excretiones maxime promovet.
- 28 Literati vitæ sedentariæ dediti, in studendo intra mediocritatis terminos subsistant, ne quod studiis accedit,



- cedit, corporis & actionibus vitalibus decedat.
- 29 Litteratis excessus in cibo & potu nocet, magis vero ipsis convenit Diæta mediocris.
  - 30 Potus Vini spirituosus aut generosus ipsis tanquam remedium convenit, excessus vero sanguinem nimis inflamat.
  - 31 Somnus sufficiens vires Litteratorum optime restaurat.
  - 32 Motus corporis lenis, sed aliquandiu continuatur sanguinem spissum, qui ordinarie in Litteratis ob vitam sedentariam reperitur, optime resolvit & excretionem promovet.
  - 33 Aer temperatus maxime confert ad Sanitatem Litteratorum.
  - 34 Qui durioribus laboribus corpus exercent, plus alimenterum assumant necesse est, ut corpus laboribus ferendi par esse queat.
  - 35 Tales potum frigidum estuante corpore maxime vitent, quoniam facile Diarrhœe, imo non raro Hemorrhicæ & Phthises exinde originem trahunt.
  - 36 A laboribus fortioribus statim quiescere non conducit.
  - 37 Nimia quies & nimius somnus homines laboriosos torpidos reddit.
  - 38 Senes durioribus vel mollioribus cibis assueti, eosdem continent, mutatio enim varia damna post se trahit.
  - 39 Excessus in cibis facile cruditates producit, quoniam digestio in senibus admodum debilis est.
  - 40 Vinum est quidem lac senum & optimum confortans, sed ejus abusus ad varios Catarrhos, Calculum, Arthritidem, Vertiginem & Apoplexiam disponit.
  - 41 Qui vitæ laboriosæ assueti fuere, labores quantum vires permittunt, continent, ut fluxilitas sanguinis conservatur & excretionem promoveantur.
  - 42 Somnus vires per labores deperditas in senibus optime restaurat.
  - 43 Somnus meridianus assuetis non est denegandus.
  - 44 Venæsectio, uti multis ad imminendam Plethoram & præcavendos morbos prodest, ita senes eidem assueti eandem continent.
  - 45 In hac quoque ætate in animi pathematibus medium teneatur.

## 2. De Diæta respectu Sexus.

I. *Definitio.* **D**iæta respectu sexus est, quæ unicuique Sexui certas & convenientes regulas præscribit, ut Sanitas conservetur.

### II. *Differentia.*

- 1 Alia respicit Sexum virilem, de qua maximam partem jam antea actum est, quare h. l. potissimum de Diæta mulierum fermo erit.
- 2 Alia vero Sexum femininum, & quidem respectu fluxus mensium, Graviditatis, Partus, Puerperii & Lactationis.

### III. *Regule & Observationes.*

- 1 Vita mulierum sedentaria ad multos morbos disponit, quatenus sanguis ob defectum motus nimis spissus redditur, ac necessariæ Secretiones & Excretionem impediuntur.
- 2 Immoderatus alimentorum usus facilius morbos producit in Sexu feminino, quam masculino.
- 3 Feminæ Diætam magis colant necesse est, quam viri, quoniam menses facile perturbantur.
- 4 Potus sufficiens feminis maxime necessarius est ad fluxilitatem sanguinis conservanda & excretionem consuetas promovendas.
- 5 Instantibus aut fluentibus mensibus abstineant a cibis flatulentis & malæ digestionis, quoniam facile sequitur mensium perturbatio.
- 6 Panis recens & calidus, potus frigidus, refrigeratio corporis & inpr. pedum, facillime mensium fluxum sistunt.
- 7 Hoc ipso tempore etiam quam maxime vitent abusum acidorum & animi pathemata graviora.
- 8 Venæsectiones & Scarificationes tempore æquinoctiali Plethoricis optime conveniunt, quoniam Plethoram & spissitudinem tollunt, atque exinde provenientia mala præcavent.
- 9 Gravide exactam semper servare debent Diætam,

ne fœtus lædatur.

- 10 In principio Graviditas intemperantia in cibo & potu quam maxime nocet, quoniam per eam Plethora & omnia gravidis alias consueta pathemata augentur: ut taceam ob Plethoram abortum facile sequi.
- 11 Venæsectio in Plethoricis primo Graviditatis tempore instituta, sæpius consueta symptomata mitigat.
- 12 Appetitui perverso in principio Graviditatis, non semper indulgendum est.
- 13 Cibi flatulenti & malæ digestionis, multa Gravidis incommoda pariunt.
- 14 Quæcunque sanguinem nimis commovent, uti cibi largiter aromatizati, vinum generosum, Liquores spirituosus &c. noxia sunt.
- 15 Motus moderatus gravidis optime convenit, nimius vero motus abortum producit.
- 16 Quies nimia consueta symptomata auget, ac arctiori secundinarum cum utero cohæsioni, ac tumoribus pedum œdematosis ansam præbet.
- 17 Aer nimis calidus sanguinem nimis, commovet, frigidus vero colicam flatulentam producit.
- 18 Animi pathemata graviora non solum nimium sanguinem commovendo ad Abortum, sed etiam, inpr. ira, fœtum ad convulsiones disponunt.
- 19 Parturientes legitimum tempus partus expectent, & ante illud ad labores non adstringantur.
- 20 Clysteres emollientes & carminativi, dolores spurios tollunt & partum promovent.
- 21 Parturientes sint semper in loco calido, aut ad minimum temperato, frigidus enim aer noxius est.
- 22 Venæsectio in Plethoricis ante partum instituta, interdum insignem habet usum ac nimium lochiorum fluxum præcavet.
- 23 Tranquillitas animi in partu semper servanda est, per multos enim anxios clamores, dolores magis augentur.
- 24 Labores in partu non interrumpendi, sed continuandi sunt, ut partus eo melius procedat.
- 25 Post partum Puerpera tranquillitati animi & quieti corporis studeat.
- 26 Frigus externum quam maxime fugiatur, quoniam lochiorum fluxus facillime ab eo sistitur.
- 27 Primis diebus nil nisi juscula exhibeantur Puerperis & quidem sæpius, cibi vero solidioris consistentiæ & malæ digestionis fugiantur.
- 28 Aromata quæ sæpius potui Puerperarum ad pellenda Lochia admiscuntur, sæpius nimium eorum fluxum producant.
- 29 Potus frigidus maxime noxius est & non solum tormina excitat, sed & lochia sistit.
- 30 Sudores exacto septimo die admodum proficui sunt Puerperis.
- 31 Alvus in puerperis sit aperta, quem in finem juscula, mucilago hordei, oleum Amygd. dulc. &c. exhibeantur, ut aliqua laxitas procuretur.
- 32 Omnes animi commotiones vitentur, quoniam lochiorum fluxum vel imminuunt, vel augent.
- 33 Lactis proventum optime promovent juscula ex carne, hordeo &c. Gelatinæ, Emulsionem.
- 34 Cibi flatulenti & malæ digestionis ut & potius frigidus, ordinarie tormina tam matri, quam infanti conciliare solent.
- 35 Frigus externum, inpr. si mammæ eidem exponuntur, lactis suppressionem & coagulationem producit.
- 36 Motus moderatus fluxilitatem sanguinis & lactis conservat.
- 37 Si mammæ lacte nimis turgent, ac infans id sufficienter extrahere nequeat, emulgeantur.
- 38 Animi pathemata maxime alterant Lac, unde post illa satius est lac emulgere, quam mammam infanti præbere.

## 3. Diæta respectu Temperamentorum.

I. *Definitio.* **D**iæta respectu Temperamentorum est præscriptio certarum regularum unicuique Temperamentum convenientium.

### II. *Differentia.*

- 1 Alia respicit homines Temperamenti Sanguinei & Cholericæ.
- 2 Alia



2 Alia vero regulas præscribit Phlegmaticis & Melancholicis.

### III. Regula & Observationes.

- 1 Sanguineis aer temperatus maxime convenit, nimis enim calidus Plethoram, ad quam præ ceteris proni sunt, nimium commovet, frigidus vero eisdem figit & condensat.
- 2 Ad Plethoram evitandam in cibo & potu non facile fiat excessus, sed victu simplici contenti sint Sanguinei.
- 3 Cibi crassioris consistentiæ magis ipsis conveniunt, quam cibi molliores, quoniam hi laxam constitutionem in Sanguineis adhuc laxiorem reddunt.
- 4 Potus spirituosos & vina generosa, quoniam Plethoram nimis commovent, fugiant, quare potius vinum mediocre aliaque diluentia pro potu eligant.
- 5 Somno nimium indulgere non debent, ne major fibrarum sequatur laxitas & humorum spissitudo.
- 6 Quies ipsis non adeo convenit, quare corpus leniter moveant ad placidam usque sudoris excretionem, ut per motum Plethora semper imminuatur.
- 7 Quamvis Secretiones & Excretiones commode satis procedant in Sanguineis, per inordinatam tamen Diætam facile perturbari possunt.
- 8 In animi affectibus mediocritatem semper teneant.
- 9 Cholericis aerem calidum minime bene ferunt, sed propter commotionem sanguinis doloribus capitis facile corripuntur, quare eligant potius temperatum.
- 10 Cibi aromatici & salsi pingues, ipsis minime conveniunt, quoniam nimium calorem excitant, magis E. ipsis suadendi sunt cibi liquidiores ex vegetabilibus, hordeo &c.
- 11 Potus vini sanguinem magis inflamat, unde potus maxime diluens & aquosus aut cerevisia tenuis ipsis, pro potu concedendus est.
- 12 Quamvis ad somnum minime sint proclives cholericis, is tamen ipsis suadendus est, ut nimius partium & humorum motus aliquo modo infringatur.
- 13 Quies magis ipsis convenit, quam motus corporis laboriosus, quoniam humores nimium excitat & sæpius ad morbos inflammatorios disponit.
- 14 Cum omnes humores in Cholericis jam in magno sint motu, excretiones minime stimulantur sunt, sed sufficiunt ipsis sufficientia diluentia, quibus datis omnes excretiones legitime procedunt.
- 15 Ira humores adhuc magis commovet, quare tranquillitati animi quantum possibile est studere debent.
- 16 Phlegmatici neque aerem frigidum, humores condensantem, neque calidum nimis eos maxime debilitantem ferre possunt, quare moderate calidus ipsis suadendus est.
- 17 Cibi siccioris consistentiæ, carnes affatæ, Salsæ, aromatibus conditæ ipsis prosunt, flatulenti vero & mucosi ipsis nocent.
- 18 Vinum generosum & Liqueores spirituosos motus torpidos excitant, ut etiam vinum pro potu magis quam cerevisia & aqua suadenda est.
- 19 Somnus & quies torporem fibrarum magis augent, quare a somno nimio quantum quidem possibile arcendi sunt.
- 20 Labor ipsis summe proficius est, quoniam fibræ magis firmæ redduntur ac sanguis ad mucositatem pronus optime resolvitur.
- 21 Secretiones & Excretiones ob copiam feri prompte, imo ut pl. in majori copia procedunt, quod vitium facile per cibos aromatizatos aut exsiccantia præcaveri potest.
- 22 Quo minus ad meditationes sunt proni, eo magis ad illas sunt excitandi, ut Natura per illas excitata humores magis commoveantur.
- 23 Negotia iram & fastidia creantia, ipsis sunt optima remedia, quoniam per illa motus aliquo modo excitantur.
- 24 Melancholici aerem frigidum melius ferunt, quam calidum, quoniam hic transpirationem augendo sanguinem adhuc crassiorem reddit.
- 25 Cibi siccioris consistentiæ & salsi illis minus prosunt, quia sanguinem magis increasant, quare humidis potius fruuntur.
- 26 Victus tenuis nulli magis quam huic competit Temperamento, quoniam ad frugilitatem admodum sunt proni.

27 Vinum moderate sumptum excitat motus torpidos, abusus vero crassos humores nimis commovendo magna excitat mala.

- 28 Potus sufficiens ipsis semper est concedendus, ut humores eo melius diluantur.
- 29 Cum Melancholici propter metum & suspicionem ipsis familiarem ad somnum minus proni sunt, somnus paucio longior ipsis suadendus est.
- 30 Ad labores continuatos præ ceteris proni sunt, qui etiam ipsis minime nocent, quoniam motus excitantur, dum humores crassi in continuo servantur motu.
- 31 Ad promovendas excretiones diluentia Melancholicis admodum conveniunt.
- 32 Melancholicis præ ceteris mediocritas in affectibus animi suadenda est, quoniam etiam præ ceteris ad excessus & defectus magis proni sunt.
- 33 In Diætâ Temperamentorum mixtorum ad prædominans semper respiciendum est.

## S E C T I O II.

D E

## D I Æ T A Æ G R O R U M.

### I. Regula & Observationes generales.

- 1 In omni morbo aer temperatus maxime necessarius est ad promovendas salutare excretiones.
- 2 Aer nimis frigidus condensat humores & excretiones necessarias impedit, calidus vero corpus transpirationem & calorem sanguinis nimium augendo, enervat.
- 3 Aer siccus in omni morbo magis convenit quam humidus, qui corpus adhuc magis debilitat.
- 4 In quovis morbo Diætâ tenuis ægrotis quam maxime commendanda est.
- 5 Præsentē appetitu prostrato, ægroti ad cibos nunquam cogendi sunt.
- 6 Corpora impura quo magis, in morbis præcipue, nutriveris, eo magis læseris.
- 7 In morbis chronicis tantum ciborum concedendum est, quantum conservatio corporis requirit.
- 8 Cibi ex animali regno desumpti, plus detrimenti afferunt, quam cibi vegetabilium.
- 9 Potus sufficiens in omni morbo est optima Medicina, quatenus fluxilitatem sanguinis conservat, æstum ejus temperat & Secretiones promovet.
- 10 Pro morborum diversitate potus variis rebus additis, Nitro v.g. Scorzon. Ceras. acidis, Succo citri &c. alterari potest.
- 11 Ubi calor jam maxime urget, ibi potus vini noxius est, potest tamen ejus usus concedi, si modice & modice tantum usurpatur.
- 12 Potus nimis nutriens & crassus, sanguinem spissorem reddit & secretiones impedit.
- 13 Potus frigidus in morbis, ubi diaphoresis opus est, quam maxime vitandus est.
- 14 Quies in omni morborum principio summe utilis est, quoniam Natura sub hac quieta corporis continentia eo facilius causam morbificam superare & expellere potest.
- 15 In morbis chronicis cum sanguinis spissitudine conjunctis, lenis sed continuatus motus maxime convenit.
- 16 Si ægroti in morbis non dormiunt, per remedia soporifera ad somnum minime disponendi sunt, sin vero dolores capitis, æstus nimius &c. Vigiliis excitant, symptomata hæc urgentia tollenda sunt, sic enim facile postmodum somnus sequitur.
- 17 In omni morbo respiciendum est ad necessarias excretionem unicuique morbo convenientes.
- 18 In quovis morbo alvum apertam habere, quam obstructam satius est.
- 19 Venæsectioni assueti eam facilius ferunt in morbis, quam reliqui.
- 20 In omni morbo tranquillitas animi summa est Medicina.

### II. Regula & Observationes speciales.

- 1 Uti Hæmorrhagiæ Plethoram præsupponunt, ita intemperantia ad easdem maxime disponit, & causam earum regenerat.



- 2 Omnis potus generosus & spirituosus, aer nimis calidus, motus fortior, ira &c. sanguinem commovendo Hæmorrhagias curatas facile revocant.
- 3 Motus moderatus ad imminuendam Plethoram summe proficius est.
- 4 Venæsectiones legitimo tempore institutæ, Hæmorrhagias præcavent.
- 5 In omni Hæmorrhagia quies & abstinencia a rebus commoventibus maxime utilis est.
- 6 Quæcunque ad Hæmorrhagias præservative conveniunt, ea quoque in Doloribus congestoriis locum habent, quare omnis intemperantia, vinum, ira &c. aliæque commoventia fugienda sunt.
- 7 In Doloribus arthritico-spasticis præservationis gratia potus diluens, diætâ tenuis & mediocris motus continuatus, promotio excretionum necessariorum, Venæsectiones debito tempore institutæ, animus tranquillus & abstinencia a Venere, optima sunt remedia.
- 8 In omnibus talibus morbis præsentibus omnia commoventia fugienda sunt; e contra vero quies & calor moderatus transpirationem promovens summe commendandus est.
- 9 In colica quies, continentia & calor sæpius plus præstant, quam omnia alia.
- 10 Aer frigidus, cibi flatulenti, potus feculentus &c. maxime disponunt ad colicam, quare fugiantur.
- 11 Ad præservandum dolorem nephriticum, fugienda sunt omnia commoventia.
- 12 In malo Hysterico, ubi ordinarie sanguinis spissitudo reperitur, Potus diluens & motus sufficiens optima sunt remedia.
- 13 In Diarrhœis & Dysenteriis quies & calor maxime conveniunt, e contra vero aer frigidus, cibi & potus fermentantes, ac potus frigidus insigniter nocent.
- 14 In sudoribus nimis Diætâ temperans, Mucilaginosa, Gelatinosa &c. maxime conveniunt.
- 15 In omnibus stagnationibus feri, Hydrops, Cachexia &c. potus diluens diureticus & laxans, motus moderatus, & cibi moderate aromatizati maxime proficui sunt.
- 16 In omni sanguinis impuritate, tam scorbutica, quam scabiosa, cibi laudabilis digestionis, potus diluens, aer temperatus, motus moderatus & continuatus, & promotio excretionum optima sunt remedia.
- 17 In tussi & asthmate aer frigidus, cibi malæ digestionis, falsi & potus frigidus nocent.
- 18 Potus calidus, Veronica, Enula, Aniso &c. alteratus, in affectibus pectoris maxime convenit.
- 19 In convulsionibus juniorum, a scabie suppressa aliisque impuritatibus originem trahentibus, maxime prodest aer moderate calidus diaphoresin promovens.
- 20 Si spissitudo sanguinis causa est convulsionum in adultis, omnia quæ fluxilitatem sanguinis promovere solent, uti potus & motus sufficiens, maxime proficua sunt.
- 21 Si adest dispositio ad affectus soporosos & Paralyticos, aer moderate calidus, diætâ tenuis, potus & motus sufficiens & animus liber optima sunt remedia.
- 22 In Melancholia omnia diluentia & motus corporis maxime conveniunt, quoniam spissitudinem sanguinis tollunt.
- 23 Grassantibus morbis malignis homines abstineant præservationis gratia a carnibus, quoniam magis ad putredinem disponunt.
- 24 Vegetabilia & acida, utpote putredinem arcentia, tum temporis magis conveniunt.
- 25 In omnibus morbis malignis diætâ tenuis & potus sufficiens, sæpius & moderate datus, maxime proficius est.
- 26 Calor moderatus & quies in lecto continentia transpirationem & excretionem miasmata malignorum optime promovent.
- 27 In talibus morbi alvus semper aperta servanda est, id quod optime præstat potus sufficiens emollientibus alteratus.
- 28 In Variolis & Morbillis omnis calor nimis noxius est, e contra prodest calor moderatus & quies.
- 29 Si appetitus non est prostratus, ægrotantibus variolis laborantibus, cibi in moderata quantitate concedantur.
- 30 Potus sufficiens & inpr. calidus excretionem variolarum optime promovet.
- 31 Alvus, quæ in variolis ordinarie obstructa est, laxantibus non aperiatur, quoniam talis obstructio maturationis tempore, vel eo exacto, sponte cessat.
- 32 In Febris continuis & ardentibus eadem diætâ ac in malignis locum habet.
- 33 In Febris intermittibus aer moderate calidus sive temperatus optime convenit, quoniam excretionem sudoris finito calore promovet.
- 34 Abstinencia a cibis multum confert ad faciliorem Februm intermittentium curationem, si autem appetitus viget, victus tenuis sufficit.
- 35 Potus sufficiens & inpr. calidus in paroxysmo sæpius datus optime promovet excretionem in Febris hisce necessarias.
- 36 Quies in hisce Febris maxime convenit, quoniam multum ad excretionem per vomitum, alvum & sudorem contribuit.
- 37 Morus moderatus & continuatus, die intercalari institutus, humores ad faciliorem excretionem disponit.
- 38 Erumpente sudore fugiatur aer liber, quoniam transpirationem necessariam supprimit.
- 39 In Febris lentis & Hæcticis aer maxime sit temperatus, quoniam aer calidus calorem febrilem augeat, frigidus vero transpirationem impedit.
- 40 Cibi optime nutrientes, Mucilagines, Gelatinæ, Emulsiones, potus sufficiens, in talibus Febris sæpius plus præstant, quam ulla alia remedia.
- 41 Motus corporis moderatus, & quidem equitatio, si Hæctica a viscerum abdominis labe dependet, insignem habet usum ad resolvendas viscerum obstructiones.
- 42 Alvus per alimenta lubricantia v. g. pruna, Paspulas, Mucilagines hordei, semper aperta servetur in Febris lentis.
- 43 Ira in talibus Febris maxime fugienda est.



## L I B E R I.

D E

## H Æ M O R R A G I I S.

## C A P U T I.

## De Plethora.

**I. Definitio.** **P**lethora est excessus Sanguinis vel per se laudabilis & boni, vel vitiosi quoque, mole corpus gravans & variis morbis occasionem præbens.

**II. Differentia.** Plethora est

- 1 Abundantiæ ubi sanguis simpliciter abundat.
- 2 Exundantiæ, ubi jam congestiones & stagnationes minatur, aut eruptiones molitur.
- 3 Simplex, ubi sanguis in se bonus, sed superfluus Naturam onerat.
- 4 Composita cum Cacoehymia, i. e. dyscrasia sanguinis, imprimis spissitudine ejus conjuncta.

**III. Signa sunt:**

- 1 Reliqua sanitas satis illibata.
- 2 Appetitus bonus, & tolerantia quoque ciborum assumptorum optima, bonæ coctionis & digestionis index.
- 3 Somnus bonus & profundus, quietus etiam valde, nisi quod calidiore loco & tempore inquietus, seu jectigabundus evadat.
- 4 Insomnia anxia, sive præfigurationes onerum portandorum, incendiorum, effusionum sanguinis.
- 5 Segnities ad paulo laboriosiores motus, aut sub his repentina fatigatio, præcipue vero inter ambulandum, currendum & scandendum per loca acclivia, respirationis velox difficultas cum palpitatione cordis.
- 6 Aspectus in paulo habitioribus valde rubicundus, in macilentioribus vero, aut strenuo labori assuetis, qui utrique valde amplas venas habere solent, insignis harum plenitudo & distensio.
- 7 Sub levi sudatione obtingens sensus in cute levissime punctorius, quasi hic illic seta leviter compungeretur.
- 8 Vertigo, capitis inclinationem profundiorē excipiens.

**IV. Subiectum.** Plethoræ communiter obnoxii sunt homines

- 1 Et te juniores.
- 2 Fœminæ præ viris.
- 3 Otio dediti.
- 4 Diæta plena ac lauta utentes.
- 5 Antea evacuationibus sanguinis, sive spontaneis, sive artificialibus largioribus assueti, aut vitæ generi laborioso addicti, qui labores depofuerunt & tamen lautis utuntur cibis.

**V. Pognos.** Plethorici non solum variis morbis v.g. Hæmorrhagiis, febribus continuis, inflammationibus &c. propter sanguinis abundantiam sunt expositi; sed & si alias ob causas morbos incurrunt, v.g. vulnera, fracturas, luxationes, febres intermittentes, variolas &c. his ipsis gravius & periculosius decumbunt.**VI. Remedia.**

- 1 Victus parcior & diæta tenuior.
- 2 Motus corporis laboriosior, non impetuosus quidem, interim tamen diutius continuandus, frequentius repetendus, quæ physice quidem satis efficacia, sed ob mollitiem & desidiam plerorumque subiectorum moraliter fere inutilia sunt. Restat itaque
- 3 Sincera sanguiniseductio per Venæ sectiones & Scarificationes.

- 4 Laxantia reiterata, imprimis Helleborus niger & Essent. Antiphyp. Hallens. &c.
- 5 Diaphoretica, Diuretica.

## Formule Remediorum.

## 1 Infusum laxans.

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Rx. Rad. cichor.</i>        | <i>Cort. Citra.</i>                   |
| <i>anon. ana. ℥ss.</i>         | <i>Tar solub. ana. ℥iij.</i>          |
| <i>Summit. cent. min. maj.</i> | <i>Inc. includ. nodulo.</i>           |
| <i>Fol. Senn. f. ℥j.</i>       | <i>in men. j. f. ℔. iv. Vini albi</i> |
| <i>Fibr. bell. nigr. ℥ss.</i>  | <i>intund. ndo.</i>                   |

## 2 Pilulæ Purgantes.

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Rx. Extr. bell. nigr.</i>   | <i>Ess. absinth. q. s.</i>        |
| <i>panchymag. Cr. ana. ℥j.</i> | <i>M. F. Pil. pro 2. vicibus.</i> |
| <i>Res. scam. gr. iv.</i>      |                                   |

## 3 Essentia laxans.

- |  |  |
|--|--|
| <i>Rx. Ess. antihyp. Hal. ℥ss.</i>                   | <i>superbibendo ad minimum potus, vel infusa</i> |
| <i>sumantur mane hora sexta, octava &amp; decima</i> | <i>Tæ aut. musculorum ℔. iv. l. v.</i>           |
| <i>gutt. 40. 50. pro dosi.</i>                       |  |

## 4 Potio diaphoretica.

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Rx. Aq. card. bened.</i>  | <i>Sal. absinth. ana. ℥ss.</i>                 |
| <i>fl. sa. ab. ana. ℥ij.</i> | <i>Sacch. perlat. ℥ij. M.</i>                  |
| <i>℥ diaph.</i>              | <i>dentur singulis duabus horis cochl. ij.</i> |
| <i>Matr. perl.</i>           |  |

## 5 Mixtura diaphoretico diuretica.

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <i>Rx. Ess. alexiph.</i>  | <i>dosi 30. 40. gutt. mane &amp; vesperi.</i> |
| <i>succin. ana. ℥j.</i>   |   |
| <i>Tinct. ℥ i ℥ij. M.</i> |   |

## 6 Potio diuretica.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Rx. Aq. Chereol.</i>    | <i>Tart. Variolat.</i>                   |
| <i>petrosel. ana. ℥ij.</i> | <i>Nitr. Gint. ana. ℥ss.</i>             |
| <i>Sal. Onon.</i>          | <i>Malv. Junip. j. M. dos. ut supra.</i> |

**VII. Methodus medendi.**

- 1 Libertas alvi promoveatur & expediatur ante sanguinis missionem.
- 2 Venæ sectio in junioribus in brachio, in provec-tioribus in pede adornetur circa Æquinoctia, luna decrescente.
- 3 In fœminis prægnantibus Venæ sectio in brachio instituatür circa medium gestationis tempus, quo alias sanæ hunc fluxum expertæ sunt.
- 4 Post ventilationem sanguinis sub ungi possunt Analeptica, ad æqualem sanguinis distributionem promovendam.
- 5 Eandem quoque æqualem sanguinis distributionem promovet motus moderatus post venæ sectionem institutus.
- 6 Hæmophobis ab consumendum sanguinem prosunt Noduli laxantes cum Helleboro nigro, quibus subungi possunt lenia Diaphoretica & Diuretica.

**VIII. Cautele Practicæ.**

- 1 Plethorici per Scarificationem insufficientem, aut Venæ sectionem parciorem, facile in febres acutas, affectus arthriticos aliaque mala præcipitantur, ita, ut sanguinis missione plane abstinuisse, quam eandem non sufficiente quantitate adornasse præstitit.
- 2 Plethoricis Alexipharmaca calidiora, præsertim cum regimine sudorifico data, item diuretica violentiora, olea destillata acriora, & quælibet sanguinem fortiter commoventia, item balnea & pediluvia fervidiora aut frequentiora, repentini & violenti corporis motus, vini generosioris immodestior ingurgitatio, summe noxia, quin fere venena sunt.



- 3 Venæsectio generalis omnis generis habitus, sexus & ætatis hominibus convenit; Scarificatio vero non nisi corporis habitui spongiosiori, affectibus magis sursum ad caput, collum, scapulas, humores &c. vergentibus & chronicam pertinaciam ac repullulationem minitantibus, ætati etiam adhuc vegetiori debetur, & frequentiores repetitiones, ad minimum singulis annis quadrantibus, poscit.
- 4 Evacuationes sanguinis assuetæ, licet interdum nullum positivum usum habere videantur; neglectæ tamen & omissæ positivum damnum afferunt.
- 5 Motus corporis non solum frequentius repetendus, sed etiam ad sensibilem usque sudoris excretionem continuandus est, ut hoc modo sanguinis portio per motum localem in serum conversa, non per sudorem tantum, sed & per alia convenientia loca evacuetur.
- 6 Sit autem ab initio moderatus postea vero magis magisque intendatur, donec consueta corporis & actionum alacritas redeat.

## CAPUT SECUNDUM.

## De Hæmorrhagiis in genere.

I. *Definitio.* **H**æmorrhagiæ sunt excretiones sanguinis e variis locis partim a Natura ipsa per motum tonicum ad superfluum sanguinem e corpore expellendum institutæ, partim vero a causis violentis externis, rupturam vasorum sanguiferorum producentibus, excitatæ.

II. *Differentia.*

- |   |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
| 1 | Aliæ sunt Activæ,      | Aliæ magis Passivæ, |
| 2 | Criticæ,               | Chronicæ,           |
| 3 | Period. & statæ,       | Vagæ,               |
| 4 | Tolerabiles & innoxie, | Nimie               |

hoc est nimis frequenter repullulantes, aut nimis impetuose invalescentes, quæ proprie huius loci sunt.

- 5 Differunt etiam ratione loci excretionis, dum junioribus Narium Hæmorrhagiæ, juvenibus Hæmoptyses, viris Hæmorrhoides, & senibus Mictus cruentus magis familiares sunt. In feminis vero sanguis magis per ventriculum, uterum & varices evacuetur.

III. *Signa.*

- 1 Antecedunt tonicæ corporis stricture ad hunc vel illum locum sanguinem dirigentes.
- 2 In locis ubi ejusmodi stricture fiunt, externe habitus extenuatus pallidus conspicitur.
- 3 Urinæ sudoris & fecum alvinarum excretiones sepiissime hoc tempore imminuuntur.
- 4 Venæ in confiniis, ubi excretiones fieri debent sunt inflatæ.
- 5 Sub levi corporis motu interne angustie & oppressiones sentiuntur.
- 6 Corpus præterea ad functiones voluntarias peragendas aliquantisper languidum est.
- 7 Somnus inquietus cum insomniis de rebus rubris, flammis, de vulneribus, magnis angustis, oppletivis, lapsibus in loca profunda, stipatus.
- 8 In locis ipsis ante ejus eruptionem varii sepe sensus molestis observantur; in naribus quidem pruriginis & morsus, in pectore titillationes, in & circa uterum, gravitates, tensiones & pressionem, in intestino vero recto morsus & tenesmodi irritationes.
- 9 Multis autem plane tacite atque tranquille, sine præcedentibus ejusmodi sensationibus, sanguis ex his vel illis locis erumpit.

IV. *Subiectum.* Hæmorrhagiis facilius & frequentius obnoxii sunt homines.

- 1 Ætate juniores,
- 2 Temperamento sanguineo, vel cholericò, aut melancholico cum his mixto, præditi.
- 3 Indole animi activiores, iracundi.
- 4 Statu corporis plethorici, evacuationibus sanguinis assueti.
- 5 Diætæ lautiori, imprimis vinosæ dediti.
- 6 Qui corpus & plethoram uno impetu commovent & aer calidiori corpora exponunt.

V. *Prognosis.*

- 1 Incredibilem fere sanguinis jacturam homo tolerare potest sine lethali exitu.
- 2 Hæmorrhagiæ, utut enormes, sibi vero relicte, donec illarum impetus sponte recedat, non tam facile tabidos affectus, hydropicos, aut œdematosos tumores post se trahunt, quam quæ variis artificis, imprimis vero adstringentibus fortioribus tractatæ & oppresse fuerunt.
- 3 Hæmorrhagias impetuosiores, imprimis vero criticas, repente cohibitas, mox gravissimæ anxietates, imo lipothymie, motus spasmusmodici, aut stupor, imo Paralysis partium consentientium excipiunt.
- 4 Omnes hæmorrhagiæ sepius recrudescunt, refractariæ & vagæ, mali semper sunt ominis: quæ vero contrario modo se habent, bonæ sunt.
- 5 Hæmorrhagiæ per loca periculosa, pulmones scilicet, ventriculum & renes, prodeuntes majori periculo exponunt egrotantes, quam Narium Hæmorrhagiæ ac Hæmorrhoides,
- 6 Hæmorrhagiæ (a causis etiam violentis excitatæ) in subiectis dispositis, præsentibus, Plethoram commoventibus, causis, facile recrudescunt, & in habitum degenerant, atque hinc coram difficulter admittunt.
- 7 Hæmorrhagiæ, respectu ætatis, temperamenti & sexus, incongruæ, semper monstri quid alunt, & ut plurimum viscerum labem indicant.
- 8 Quo magis tacite Hæmorrhagiæ erumpunt congruæ, eo sunt meliores, quo majora vero eos præcedunt & comitantur incommoda, eo pejoris sunt ominis.
- 9 Hæmorrhagias congruas ante ordinarium ætatis terminum cessantes, vel ordinarii a tali hæmorrhagia pendentis affectus, vel alii circa eas partes, ad quas juxta naturæ leges fieri debebat sanguinis translatio, sed in majori gradu, sequuntur.
- 10 Omnes acutorum morborum Hæmorrhagiæ, nisi ætati, morbo, ejusdemque tempori definito respondeant, ac respectu subiecti in conveniente quantitate contingant, merito suspectæ sunt.

VI. *Remedia.*

- 1 Venæsectio extra paroxysmum præservationis gratia, in paroxysmo revellendi intentione, administrata.
- 2 Ligaturæ, frictiones, aut quæcunque sensibiles alterationes repentinae partium remotiorum, aut oppositarum.
- 3 Nimiam sanguinis tenuitatem & agilitatem temperantia, absorbentia, emulsiones, acida lenia.
- 4 Turgescentiam ejus moderantia: Pulv. Salin. ruber Stahlii, Pulv. Antispasmod. Hallens. Nitr. depur. Lap. prunellæ &c.
- 5 Antispasmodica: Cinnabarina, Spec. & confect. de Hyacinth. Smaragd. præparata.
- 6 Tonico-Nervina: Salia Volat. Urinosa, præsertim cum Tinctura Alcalica: v. g. Tinct. Tartari, vel Antimonii Tartarifata sociata.
- 7 Sedativa confortantia: Essent. Dulc. Hallens. Pulv. Solar. Richreni, imprimis Pulv. Niger Hall. & Anodyna: Semen Hyoscyami, M.P. de Cynoglossa &c.
- 8 Adstringentia: Lapis Hæmatites, Corall. rubr. cum acido exhibitæ, Crocus & is subtilior, solutio Vitrioli & is ex minera Hassiaca ad Almanrotham.
- 9 Amuletica & Sympathetica: Bufo exsiccatus, pulvis Sympatheticus Digbey, lignum sympatheticum, hoc est, lignum fraxini circa Solstitium æstivum ante Solis ortum cæsum, item Rad. Papav. rhæad. ipso festo D. Johannis instrumento aureo effossa, sanguis proprius tostus & exhibitus.

## Formule Remediorum.

- |   |   |
|---|---|
| 1 Pulv. Temperans Dn. D. Stahlii.                 |   |
| R. Ocul. $\overline{\text{ss}}$ .                 | Lap. prunell. $\overline{\text{ss}}$ .                            |
| Corall. rubr. præp. ana. $\overline{\text{ss}}$ . | Cinab. $\overline{\text{ss}}$ vel nativ. $\overline{\text{ss}}$ . |
| Matr. perlar. præp.                               | M. div. in 6. p. æq. dosis una                                    |
| Arcan. duplic. vel                                | singulis vel binis horis exhib.                                   |
| Tart. Vitriolat. ana. $\overline{\text{ss}}$ .    | vid. Dissert. de hæmoptysi §. 30                                  |
| Nitr. depur. vel.                                 |   |
| 2. Pulv. Antispasmod.                             | Conch. præp. $\overline{\text{ss}}$ .                             |
| R. Tart. Vitriolat.                               | Cinab. Antim. $\overline{\text{ss}}$ .                            |
| Nitr. depur. ana. $\overline{\text{ss}}$ .        | M. f. pulv. dosis $\overline{\text{ss}}$ .                        |



- 3 Pulvis moderate fistens. *M. P. de Cynogl. gr. iij.*  
*R. Pul. Antispasmod. ʒ. j. M. div. in 4 pari. æq.*  
*Spec. de Hyacint. g. xvi. D. dos. j. vel ij. circa vesper.*
- 4 Mixtura Tonico-Nervina, five Diuretico discutiens.  
*R. Tinct. Sal. Tartar. vel Tinct. Nitri cum Regul.*  
*ʒij. Martiali fixati,*  
*Spir. C. C. mediocriter dephegmatis probe tamen re-*  
*disicati ana.*  
*M. Dos. gutt. a 30. 40. bis vel ter de die, tam in*  
*ipso paroxysmo, quam extra eandem, preserva-*  
*tionis gratia.*

## VII. Methodus medendi.

In omni Hæmorrhagia attendere decet

- 1 Sanguinis quantitatem,
  - 2 Crasin & motum ejusdem,
  - 3 Intentionem Moventis.
- α Sanguinis quantitati consulitur, partim etiam intentioni Moventis satisficit, per Venæsectionem præservatoriam extra paroxysmum, aut fieri jam eruptioni sanguinis in paroxysmo aliquatenus indulgendo.

## β Crasin Sanguinis

- 1 Tenuiorem corrigunt absorbentia, emulsiva acidula.
- 2 Spissiore emendant, potus dilutior & simul motus corporis proportionatus, Salia media digestiva, Antiscorbutica temperata.

## Motum ejusdem

- 1 Turgefactorium compescunt Nitrosa & acidulenta.
- 2 Congestorium præoccupant & revellunt, Hirudines, pediluvia, frictiones & ligaturæ extremorum, cucurbitulæ non scarificatæ, tandem Tonico-Diuretica Discutientia, Salia Volatilia cum Tinct. Alcalica sociata.

## γ Exacerbationem ipsius agentis seu principii vitalis demulcent Anodyna, sedativa e gemmis, Analeptica, Amuletica. Externa vi quasi reprimunt terror tam moralis quam physicus.

- 1 Extra paroxysmum itaque ejusdem recursus præoccupandus Venæsectione præservatoria, Temperantibus Nitrosis, Tonico-Nervinis & Diuretico-Discutientibus, v. g. Tinctura Salina Richteri, Mixtura e Spir. C. C. & Tinct. Tartari. Item Diæta tenuiore, motibus corporis moderatis, evitacione causarum occasionalium, sanguinem fortiter & repente commoventium, imprimis iræ & potus vini immoderatoris.
- 2 In Paroxysmo Temperantibus, Divertentibus, Demulcentibus, Tonicis res gerenda, & non nisi summa urgente necessitate ad Adstringentium usum confugiendum.
- 3 Post Paroxysmum, Analeptica, Tonica, Discutientia subjungenda.

## VIII. Cautela Præcæ.

- 2 Hæmorrhagiæ non immodicæ, non nimium frequentes, in ætate adhuc juniore, præsentente sensibili Plethora, causarum quoque occasionalium incitamentis, demum ad eruptionem pertinentes, nullam sensibilem fatigationem, sed sublevationem potius post se trahentes, nequaquam suppressendæ, imo ne quidem curandæ sunt.
- 2 Alterantia in Hæmorrhagiis, sensibili Plethora, aut assuefactione subnixis, absque prægressa aut subjuncta imminutione sanguinis ventilatoria, nihil unquam solidi aut constanti efficiunt, licet in præsens paroxysmum compescant.
- 3 Anodyna minus locum habent, ubi ab immateriali potius causa v. g. periodo temporis, animi pathematibus, hæreditaria dispositione, consuetudine, quam materiali aliquo incitamento v. g. Plethora evidente, potu æstuosiore, motu vehementiore &c. Hæmorrhagiæ concitantur & exacerbantur.
- 4 Fatiscientibus jam propter prægressam sanguinis enormem profusionem viribus, præstat ab Anodynis abstinere, ne major inde virium dejectio sequatur,

& solis Analepticis atque Nervinis non nimium acris insistere.

- 5 Amuletica & Sympathetica, vel sub his plane initiis, vel sub declinatione, non in *anxiæ* seu summa exacerbatione adhibenda sunt.
- 6 Amuletica ejusmodi præsentiosem effectum præstant in subjectis sensibilibus, & animi magis pensitabundi, qui vix expectandus est in iis, qui indolis torpidioris aut turbulentioris, & impatientis sunt.
- 7 Salia Volatilia, præsertim largioribus dosibus exhibita, in subjectis habitu spongiosiore præditis, seu Sanguineis, ubi Plethora concurrens per Venæsectionem, aut ipsum fluxum sanguinis, nondum aliquatenus imminuta, aut quando febris complicata est, præter alia incommoda, tumores œdematosos plerumque inducunt.
- 8 Adstringentibus extra paroxysmum, ejusque recursus his ipsis interciperi & præoccupare velle, plerumque conamen irritum, quin periculosum est. Imo ne in ipso quidem paroxysmo ad ea confugiendum est, nisi summa demum & urgente necessitate. Per sola adstringentia *ad* nimium fluxus compescere, plerumque vanus conatus est.
- 9 Exiguæ adstringentium doses fluxum sæpe augent, largiores vero, aut subjectis sensibilibus exhibitæ, fluxum plane supprimunt; & facile aliorum viscerum constipationes & graviores læsiones inducunt.
- 10 Nullibi vero minus efficiunt, quam in Hæmorrhagiis narium interne exhibita, extrinsecus vero narium injecta aut insufflata, paulo præsentiosem efficaciam exerunt.
- 11 Circa Hæmorrhagiam criticam notandum, quod paucum nihil sit criticum: paucitas enim hic indicat, ægrum esse debilem & enervatum, Naturam movere quidem, sed parum promovere.
- 12 Talis Hæmorrhagia sæpius a spumescencia sanguinis oritur, unde ægroti Plethorici die 3. vel 5. refrigerantibus tractandi sunt, ut nimia spumescencia occurratur. Cavendum vero sibi ab usu Spiritus Salis in febribus, imprimis si petus male se habeat, tussim enim exasperat, urinam nimis stimulat, & facile obstructionem hepatis parit.
- 13 Si vero critica hæc Hæmorrhagia nimis vehemens sit, interne leniter adstringentia simulque confortantia v. g. Pulv. Solares Richteri & Pulv. Niger. Hallens. item Corall. præpar. Species de Hyacinth. Smaragd. præpar. & si summa urgeat necessitas Anodyna in refracta dosi usurpari possunt.
- 14 Externe vero nihil est tentandum, alias anxietates repentinæ coarctantur, præter ligaturas & frictions, item Spir. Vini Camphoratum leniter crocatum vertici & temporibus illitum.

## CAPUT TERTIUM.

## De Hæmorrhagia Narium.

I. *Definitio.* **E**st eruptio sanguinis superflui & molesti ut plurimum a Natura ipsa ministrante motu tonico per nares producta.

II. *Differentia.*

## 1 Alia

- α Est Chronica & homines de reliquo sanos affligit; quæ iterum vel periodica, vel anomala; alia
- β Morbis acutis supervenit, & hæc est vel Critica vel symptomatica.

## 2 Utraque est vel

- α Tolerabilis & innoxia:
- β Excessiva, nimis frequens & vehemens, aut in Crisibus nimis parca.

III. *Signa fluxus.*

- 1 Imminentis: Congestiones versus superiora & hinc in partibus remotioribus frigus, extremorum, alvi adstrictio, urina tenuis, murmura abdominis, hypocondriorum coarctatio spastica, sine dolore tamen.



- 2 In proximioribus vero & circa partem affectam, pectoris oppletio cum spirandi difficultate, colli ejusque valorum inflatio & pulsatio, cervicis dolor, rubor genarum, gravitas & pulsatio in temporibus cum valorum inflatione, tinnitus aurium, oculorum hebetudo, rubor, dolor gravativus, imo compunctorius, dolor capitis non tam exquisitè punctorius, quam gravativus, circa nasi radicem magis urgens, pruritus narium, somnus turbulentus, insomnia de vulneribus, sanguine, incendiis.

IV. *Subjectum.*

- 1 Hæmorrhagiis narium familiaris exposita est ætas puerilis & adolescens ab anno octavo ad decimum octavum vel vigesimum circiter.
- 2 Infantes quoque interdum narium Hæmorrhagiis corripiuntur propter dispositionem hæreditariam.
- 3 Pariter & adulti, in juventute frequentius has Hæmorrhagias experti, postmodum vero per evacuationes vicarias, & aliis locis institutas inde sublevati; his vero jam destituti, facile postliminio Hæmorrhagias narium patiuntur.
- 4 Facilius quoque Hæmorrhagiæ narium eveniunt hominibus, qui sunt temperamenti Sanguinei, aut cum Sanguineo prædominante mixti, item qui post potum paulo spirituosiores, aut motum corporis rubore faciei suffunduntur, ac debilitate capitis tentantur.

V. *Prognosis.*

- 1 Hæmorrhagiæ narium bene procedentes, non nimis ctebræ, neque excedentes, non tantum sublevant subjectum Plethoricum, sed etiam in perfecta crisi patientem restitunt.
- 2 Nimis autem enervant ægrotum & in Cachexiam, Hydropem, Tabem, imo mortem non raro præsentaneam præcipitant.
- 3 Prognosticum vulgi, pueros frequentioribus narium Hæmorrhagiis obnoxios, in Phthisin pronos esse pronunciantis, sæpe ipso eventu comprobatur, partim quia violenta Hæmorrhagarum ejusmodi per adstringentia imprimis interna oppressio, obstipationem Viscerum inducere solet; partim quia, sponte cessantibus per ætatem Hæmorrhagiis narium, impetus sanguinis ad pectus & pulmones ruit.
- 4 Hæmorrhagiæ narium in provectioribus semper periculosiores & majori circumspectione tractandæ sunt quam in junioribus.
- 5 Hæmorrhagiæ narium adultorum, Hæmorrhoidum aut mensium suppressionem insecutæ, per Adstringentia suppressæ, gravissima mala, Dolores, Inflammationes, Febres acutæ, Apoplexiam &c. post se trahunt.
- 6 Hæmorrhagiæ narium Hypochondriacorum, Cachecticorum & Hydropicorum mali ut plurimum sunt ominis & morbos graviores reddunt, imprimis si e contrario latere sanguis fluat, v. g. affecto hepate ex parte sinistra, liene vero male se habente e dextra.
- 7 Funestæ quoque ut plurimum sunt Hæmorrhagiæ narium in febribus acutis, malignis, petechialibus & quartanis juxta Hippocr. Aphor. 3 Sect. VIII. tolerabiliores sunt in Variolis & Morbillis, imprimis in principio eorundem, ubi morbi impetum maxime frangunt.
- 8 Hæmorrhagiæ narium in junioribus vel sponte ante ordinarium tempus emanantes, vel malo regime aut arte suppressæ variorum dolorum capitis ejusque partium, Inflammationum, & pectoris etiam præmaturorum morborum fiunt causæ.
- 9 Hæmorrhagiæ narium in senibus, antea iisdem affuetis, recrudescentes vel suppressæ, vel subito cessantes, certissime Vertiginem, Apoplexiam & soporosos affectus excitant.
- 10 Eo certius autem narium Hæmorrhagiæ, tam critica, quam symptomaticæ, vitæ periculum inferunt in acutis, si supprimuntur; pressio enim eadem pede vel stupores & inflammationes meningum cum deliriis aut convulsionibus, vel translationes sanguinis ad alias partes, ut plurimum funestæ, sequuntur.

VI. *Remedia.*

- 1 Divertentia: extra paroxysmum tempestivæ ventilationes sanguinis, item blandæ laxationes apertio Hæmorrhoidum & promotio fluxus menstrui.
- 2 Temperantia: Nitrosa, acidula, emulsiva & gelatinosa. v. g. Pulv. Antispasmod. Tinct. Flor. Bellid. vel Papav. errat. Decoct. CC. vel Rasur. eboris (cujus decocti ℥. ij. addi potest ℥ss. Tinctur. Bellid. vel Papav. errat.)
- 3 Anodyna: M. P. de Cynogloss. ad gr. i. vel 2. pulveribus Cinnabarinis addita. vid. de Hæmorrhag. in genere pulv. moderate sistens.
- 4 Leviter adstringentia: Corall. Species de Hyacinth. Smaragd. præparata.
- 5 Topica: Stercus suillum recens verberibus extortum vel fronti calide applicatum, vel vapor ejusdem, lapidibus calidis impositi, excipiendo, vel alias calidum naribus applicandum: item turunda ex Alumine naribus immissa: Solutio sacchari Saturni iisdem injecta: fuligo tenerior insufflata: Rad. psevdacori sive Iridis luteæ palustris recens sub lingua detenta, cujus frustulum hoc modo usurpatum Hæmorrhagias refractarias compescuit: Spiritus Vini Rectif. toti abdomini & hypochondriis applicatus. Externe collo & temporibus applicari potest Epithema ex aceto rosar. Camphor. Nitro & Opio compositum. Epithema ex nucleis Persicorum, vel Amygdalis amaris contusis & in aceto coctis, collo calide impositum: Umbilicus marinus parte plana saliva humectatus & interstitio oculorum, ubi decurrit vena frontis admotus: Crepitus lupis naribus intrusus: Acetum fronti applicatum, aut vapor ejusdem lapidi calido immissi naribus exceptus.
- 6 Sympathetica: Bufo exsiccatus sub axillis gestatus, aut in manu detentus; Lignum fraxini circa Solstitium cæsum, & fronti sursum versus affricatum, aut in manibus detentum; sanguinis exstillantis exceptio pulvere Sympathetico Dygbæano aut ferro ignito facta; Hæmatites in manu detentus donec incalescat. Jaspis. item collo appensus. Lapis carpcionum triangularis sub lingua detentus. Jaspis genuinus cujus rubedo venulis herbaceis est distincta, argentoque cinctus, si in ista manu sub pollice, ex cujus lateris foramine narium sanguis fluit, tenetur.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pluvius temperans.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Rx. Nitr. depur.    | M. f. pulv. dos. ℥j. singulis dimidiis horis dosis j. |
| Arcan. duplic. ana. | ad mitigationem usque mali propinando.                |
| ℥j.                 |   |
| Cinnab. ℥ij. ℥j.    |   |

## 2 Potio temperans.

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Rx. Aq. Plantag.  | Syr. e Symp. Fern. ℥ij.                                |
| Portulac. ana ℥j. | M. loco præscripti pulveris aliquot vicibus usurpanda. |
| Lap. prunell. ℥j. |  |

## 3 Pulvis temperans &amp; moderate sistens.

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Rx. Pulv. supra descripti | M. Pil. e Cynogl. gr. ij.   |
| ℥ss.                      |   |
| Corall. rubr. præparat.   | M. div. in 2. part. æq. duabus vicibus in casu necessitatis exhibendus. |
| ℥ss.                      |   |
| Spec. de Hyac. gr. v.     |   |

## 4 Sympatheticum externum.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Rx. Aq. font. vel plantag. | M. d. ad vasc. Sanguis eadem instillandus & festuca lignea subagitantus. |
| ℥j.                        |  |
| Pulv. Sympath. Digb.       |  |
| ℥j.                        |  |

VII. *Methodus medendi.*

1. Hæmorrhagiæ narium non immodicæ, non nimium frequentes, sanguinem etiam bonæ notæ & satis floridum exhibentes, in ætate adhuc juniore, præsentè sensibili Plethora, & fortiora insuper causarum occasionalium incitamenta expectantes, nullam sensibilem fatigueationem, sed sublevationem potius post se trahentes, imo prægressam qualemunque gravitatem, tensionem Cephalalgiam, sensibilibiter solvantes, nequaquam curandæ sive supprimendæ, sed potius tolerandæ sunt.



## CAPUT QUARTUM.

## De Hæmoptysi.

2 Sufficit in ejusmodi casu diætā convenientem, scil. sufficientem potum, placidum motum, abstinētiā ab æstuosis cibis & potionibus, evitātionem æstus ambientis, succēssum reliquarum debeatū excretionum, animi etiā pathematū moderamen injungere.

3 Quādo vero Hæmorrhagiæ vel frequentiores, vel copiosiores eveniunt, vel ob leves (præsertim magis evitandas, & sæpe occurrentes,) causas occasionales, prorumpunt, ætas insuper jam adultior, præsto est; ibi & securum & certum remedium præbet Venæsectio, commodo tempore, Verno, vel Autumnali, vel pro re nata utroque instituta, & postea anniversariis istis periodis continuanda.

4 In ætate vero teneriore, & concurrente, ut plerumque fit, dyscrasia sanguinis, sufficit diætā congruam ordinare, succēssum alvi promoverē, (per clysteres, infusa laxantia, & salia aperitiva v. g. Tart. Vitriolat. Sal Cathart. amar. Angl. verum. Magnes. alb. &c. vitando autem aloetica) sanguinis item tenuitati nimie & mobilitati per temperantia & demulcentia, visciditati ejusdem per Antiscorbutica temperantiora occurrere.

5 Præsentē Hæmorrhagiā & urgente necessitate, instituitur Venæsectio in brachio aut majoris revulsionis gratia in pede, postea exhibeatur pulvis temperans singulis binis vel ternis horis, quibus non sufficientibus aut recrudescēte Hæmorrhagiā, Corall. Spec. de Hyacinth. & MP. de Cynogl. addantur.

6 Quieta continentia sanguine fluente summe necessaria est, & sæpius plus præstat quam reliqua remedia.

7 Immissio pedum in aquam calidam ad gēna usque, egregium sæpius edit effectum.

8 Remedia Topica, Sympathetica & Amuletica, ligaturæ extremorum & aquæ frigidæ aspersio interdum aliquid præstant in subjectis sensibilibus.

9 Viribus per nimiam Hæmorrhagiā dejectis per Analeptica, Gemmata, Ess. Dulc. Hall. Concent. & Ordīn. parvis & repetitis dosibus, v. g. Ess. Dulc. Hall. gutt. 8. vel 10. exhibitam, succurrendum, ab opiatīs vero abstinendum.

10 Viribus aliquantisper restitutis convenit Mixtura Tonico-Nervina D. Stahlī bis vel ter de die ad 30. vel 40. guttas exhibenda.

## VIII. Cautela Practicæ.

1 Adstringentibus insolentioribus Hæmorrhagias narium præoccupare, neque integrum, neque tutum est.

2 Adstringentia præsertim interne data, nullibi minoris sunt efficacis, quam hoc loco.

3 Plus fere præstant extrinsecus applicita: nunquam tamen adhibenda, nisi vere urgente necessitate & subjunctis Discutientibus sive Diaphoreticis temperatis.

4 Talia quoque adstringentia & sistētia externa in usum trahi non debent, nisi præmissa sit Venæsectio & totum corpus æqualiter caleat, alvusque sit libera: multo minus si pedes frigent, & facies pallet.

5 Cautissime quoque usurpanda sunt adstringentia in Hæmorrhagiis criticis, sive quæ morbis acutis superveniunt; ut ut enim illæ modum excedant; vix tamen tantum & tam certum periculum inde metuentum, ob sanguinis jacturam per ipsum fluxum factam, quam ob viscerum indurationem scirrhosam per adstringentia inducendam.

6 In ancipiti tali casu præstat summam negotii Naturæ committere, atque temperantibus Tonicis, & Analepticis insistere, neque ultra Corallor. Specier. de Hyac. Margar. Orient. Smaragd. præp. aut lenium Anodynor. usum, ligaturas extremorum, applicationem Spirit. Vin. Camph. crocati circa verticem & tempora, progredi.

7 Remedia Topica, Sympathetica & Amuletica sæpius partim infida, partim minus secunda sunt.

8 Post enormes Hæmorrhagias narium superatas, caput tum a frigore, tum ab æstu nimio defendat, oculis etiā parcat patiens.

I. *Definitio.* **H**æmoptysis est ejectio sanguinis sinegesti, vel a Natura ipsa ope motus tonici instituta, vel a causis violentis, externis, producta.

II. *Differentia:* differt Hæmoptysis.

1. A sputo cruento, quando sanguis in exigua quantitate post fortiolem sreatum sputo mixtus ejicitur.

2. A sputo cruento Pleuriticorum, Peripnevmonicorum & Phthisicorum, qui vel sanguinem crassum, vel pus sanguine tinctum non simul & semel, sed repetitis vicibus cum tussi ejiciunt.

3. A Vomitu cruento, ubi sanguis vel cum cibis & potu commixtus, vel solus, sub nigricante specie, & in grumos quasi conversus, per vomitum excernitur.

III. *Signa.*

1. Imminentis: Spasticæ compressiones scapularum & humerorum, angustia, aut titillationis sensus in profundioribus faucibus. Gravativus item pectoris dolor, flatulentia circa primas vias, frigus extremorum, horror, sanguinis interdum ascensus sensibilis ex partibus inferioribus ad ipsa præcordia, anxietas, palpitatio cordis, rauco &c.

2. Præsentis: expuitio, sive egestio sanguinis per os floridi & spumidi in aliqua copia notabili, cum vel sine tussi præcedente, nunquam tamen absque eadem comitante, contingens.

IV. *Subjēctum.*

Hæmoptyseos periculo familiarius exponuntur.

1. Juvenes ab anno Vigesimo ad Trigesimum quinarum circiter.

2. Homines temperamenti Choler. sanguinei, aut sanguineo Melancholici staturæ proceræ, habitus gracilioris, collum oblongum & scapulas elatas habentes.

3. Personæ, quibus necessitas multum cum contentione vocis loquendi, cantandi, incumbit &c. aut saltationibus, & similibus motibus repentinis indulgentes, item quibus a motu corporis citatiori & præcipiti, mox valde angustatur respiratio, cum intercurrente irritatione quadam tussiculosa.

4. Homines qui in pueritia & adolescentia frequentius narium Hæmorrhagiis correpti fuerunt, quæ postea mature emanferunt: aut qui alias insigni calidiore coryza cum dolore capitis laborarunt; ut & qui Scarificationes & Venæsectiones assuetas neglexerunt.

5. Femine, quibus Menses ex quacunque causa suppressi sunt.

6. Ut & Viri Hæmorrhoidibus, consuete alias fluentibus, suppressis.

7. Quorum parentes tabidi fuerunt, aut etiam antea hoc morbo laborarunt: Item qui Parentibus podagricis & nephriticis nati sunt.

8. Literati, vitæ sedentariæ dediti, Hypochondriaci, corpus subito motu fortiori exercentes, imprimis in aere frigidiori.

9. Homines ad iram aut terrorem proni, vino & liquoribus spirituosius abutentes, corpus ventis, maxime Septentrionalibus, refrigerantes.

10. Homines qui sub aere densiori ac crassiori nati & educati, postmodum in aere subtiliori vivunt, ac Plethoram motu fortiori commovent.

11. Quibus addi possunt causæ externæ violentæ, plaggæ, casus ab alto, onerum graviorum gestationes, cum respirationis cohibitione, vapores corrosivi &c.

V. *Prognosis.*

1. Hæmoptysis omnium Hæmorrhagarum est periculosissima & maxime fontica; si non statim in præsentem lethifera, in posterum tamen exitus funestus periculum, hoc est Phthiseos, ulcerisque, & nodose indurationis Pulmonum metum inducens.

2. Quæ tamen periodice, & statis veluti temporibus recurrit, nullam quoque tussim, aut dyspnœam suscipit.



ſpectam poſt ſe relinquit, minus quidem periculofa, curationi tamen maxime refractaria exiſtit.

- 3 Quamvis ubique periculofa ſit Hæmoptiſis, facilius tamen, quæ a cauſis internis, quam quæ ab externis violentis dependet, curatur.
- 4 Præ cæteris maxime periculofa eſt, quæ a vaporibus corroſivis originem traxit.
- 5 Hæmoptyci a parentibus tabidis nati, omnium facillime in Phthiſin incidunt.
- 6 Quo majores in diætâ commiſſi fuerunt errores, imprimis per vini & liquorum ſpirituorum abuſum, eo gravior & periculofior, ob ſanguiniſturgelcentiam, ſuccedit Hæmoptiſis.
- 7 Hæmoptiſis morbis chronicis, Hydropi, Scabiei inveteratæ retropulſæ, Ulceribus, quæ diu manarunt; ſuppreſſis &c. ſuperveniens, maxime periculofa & ut plurimum funeſta eſt.

#### VI. Remedia.

##### α Curatoria.

- 1 Nimii ſanguinis ad pectus ruentis diverſio per Venæſectionem revulſoriam, in pedibus inſtitutam, per ligaturas extremorum, item per fotus calidos, manibus & imprimis quidem plantis pedum applicandos; ut & per clyſteres.
- 2 Orgaſmi ſanguinis ſedatio per Nitroſa & Cinnabarina, quibus gr. j. vel ij. MP. de Cynogl. caſu magis urgente, addi poteſt.
- 3 Ipius eruptionis violentioris cohibitiſio per Adſtringentia, v. g. Crocum Mart. Antimoniat. ad gr. vj. vel viij. cum MP. de Cynogl. gr. j. exhibitum, per pulv. Heurnii contra Hæmoptiſin, vid. ejuſdem Comment. in Aphor. Hipp. Lib. V. Aphor. 3. Item Species de Hyacinth. Pil. de Styrace, Pulv. ex raſur. dent. Hippopot. Rhinocer. Unic. animal. Hæmatit. præp. Sem. Hyoſc. & per pulverem Sympathet. Dygbæanum in aqua diſſolutum, cui dein ſanguis egeſtus immittitur.
- 4 Aequalis ſanguinis per totum habitum corporis diſtributio per Diaphoretica temperata, v. g. doſin moderatam Eſſent. Alexipharmacæ, aut, ſi quid febrilis, uti non raro contingit, ſubſit, per potiunculas Diapnoicas cum Antimonio diaph.
- 5 Sanguinis forte congrumati reſolutio & pulmonum reſtauratio per Decocta Pectoralia leniter Abſtergentia, non manifeſto Adſtringentia, aut nimis dulcia, v. g. ex Flor. Bellid. pratenſ. Borrag. Bugloſſ. Papav. rhœad Herb. Agrimon. Hyſſop. Tuſſilag. Scabioſ. Capill. ꝯis Epithym. Virg. Œæ, Veron. Urtic. min. Heder. Terr. Rad. Pimpin. alb. Irid. Florent. Symphyt. Helen. raſura C. C. vel Eboris parata. Prodeſt quoque hoc in caſu Nitrum & ſanguis hirci pulveribus ſuperioribus mixtus: aut etiam potio ex Vini ꝯ. j. & Oc. ꝯ. ꝯj.

##### β Præſervatoria per

- 1 Venæſectionem Autumnalem & Vernam, imo Scarificationes præſertim in aſſuetis.
- 2 Mixturam ex Tinct. Tart. acri & Spir. C. C. ana. vel ex Tinct. Tart. ꝯij. & Sal. Vol. Oleos. Sylv. ꝯj.
- 3 Per temperantia & laxantia, quæ nimiam ſanguinis generationem impediunt.

#### Formula Remediorum.

##### 1. Pulv. Anodyno-subadſtringens.

Rx. Specier. de Hyac. MPil. de Cynogl. gr. iij.  
Corall. præparat. M. pro 3. doſibus.  
Pulv. Chacarill. an. ꝯſs.

##### 2 Pulv. adſtringens Heurnii.

Rx. Corall. rubr. præp. an. Sem. papav. alb. ꝯ. ꝯſs.  
ꝯj. Hyoſcyam. ꝯj.  
Lap. hæmatit. M. detur cum Conſerv. roſ.

##### 3 Eſſent. Diaphoret. diſcutiens.

Rx. Eſſent. Alexiph. Stahl. M. doſis gutt. 30. biſ de die  
Tinct. ꝯii Tartar. ꝯ. ꝯj. in vehiculo.

##### 4 Potio Diaphoretica.

Rx. Aq. flor. Samb. ꝯii. Diaph.  
Card. Mar. Oc. ꝯ. præp. an. ꝯſs.  
Galeg. an. ꝯj. Syr. acetos. Citr. ꝯſs.  
C. C. Citr. ꝯſs. M. coctileatim 2. vel 3. horis propinanda.

##### 5 Infuſum reſolvens & abſtergens.

Rx. Herb. Agrimon. pap. rb. an. p. j.  
Veron. Inciſa infunde in Aq. ſerv. ꝯ  
Scabioſ. an. mſs. loco potus Thee uſurpentur 3.  
Flor. Bellid. min. vel quater de die ꝯiv. ad ꝯvi.

##### 6 Pulv. Temperans.

Rx. Antimon. ꝯlis Ca- Arcan. dupl. an. ꝯj.  
cheſt. M. div. in 6. part. æq. ſin-  
Nitr. depur. gulis diebus mane 1. doſis.

##### 7 Pilulæ reſolventes & laxantes.

Rx. Extract. Rhabarb. Limat. ꝯis.  
Fumar. Myrrh.  
Agrimon. Succin. an. ꝯj.  
Cent. min. Sal. Succin. ꝯſs.  
Card. Ben.

M. ſiant Pil. ad pond. gr. j. 12. pro doſi circa noctem.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Excretiones ſanguinis per pulmones omnium eſſe periculoſiſſimas, adeoque quantocyus ſiſtendas, conſentiunt omnes præctici; de modo tamen atque mediis diſſentiunt, dum alii Adſtringentia, alii Opiata, alii Venæſectionem ſuadent.
- 2 Venæſectio in ipſo vigore paroxyſmi nihil juvat, niſi copioſa ſit, emiſſio parciſor potius exacerbare videtur affectum.
- 3 Nitrum cum Abſorbentibus aut Diaphoreticis & Cinnab. junctum omnibus hiſ palmam præripit, dum non ſolum ſatis præſenter (3. vel 4. doſibus) eruptionem ſanguinis cohibet; ſed & tutiſſime & tranquille ſine omni anguſtia & oppreſſione pectoris reſidua hoc præſtat.
- 4 In malo tamen urgentiori non ſemper ſatisfacit.
- 5 Poſſunt tunc addi Anodyna & ſubadſtringentia, v. g. Species de Hyac. & MP. de Cynogl. imo in caſu neceſſitatis ad poſitive Adſtringentia confugiendum.
- 6 Pulvis Digbæi Sympatheticus, ſeu Vitriolum in radiis Solaribus calcinatum, ſi ejus circiter ꝯj. in Aqua font. ꝯj. diſſolutum patienti pro excipiendo ſputo ſanguinolento offeratur, ipſique, ut aquam hanc ſubinda baculo ligneo agitet, injungatur, aliquoties ſenſibilem opem attulit, dum non ſolum fluxum maxime impetuoſum efficaciter cohibuit, ſed & in futurum conſtanter compeſcuit.
- 7 Mixtura ſupra laudata Tonico-Diuretica ex Spir. C. C. & Tinct. Tart. part. æq. remiſſa non tam præſervative ad recurſum mali præoccupandum, ſed etiam curative, in paroxyſmo leniore, pertinaciter tamen recrudelcente, tuto, imo cum fructu ad gutt. 30. biſ vel ter de die exhiberi poteſt. Non enim æque humores alterat, (ut vulgo creditur) ſed potius tonum partium ſolidarum roborat. Conf. Diſſ. Stahl. de Hæmoptiſi ꝯ. 37. item Hoffmann. de Tract. Præct. Hæmorrh. pag. 12.

#### VIII. Cautelæ Præcticæ.

- 1 Sicuti in aliis Hæmorrhagiis, per loca magis periculofa erumpentibus, repentina per Adſtringentia fluxus ſuppreſſio fontica damna inferit: ita multo magis talis violenta Hæmoptiſeos cohibitiſio, aut Hæcticam ex conſtipatione hepatis, aut Phthiſin ſtrictè dictam ex cruoris retenti putredine prognatam, inducit.
- 2 Opiata ſæpius quoque effectu deſiderato hic deſtituuntur; imo ipſi quoque eorum Patroni cautelam, ex infauſta procul dubio experientia ſubnatam, addunt: Opiata pectori eſſe inimica.
- 3 Qui diſpoſiti ſunt ad hunc affectum, omni ſtudio caveant aeris inæqualitatem, præſertim frigidos boreales ventos; item temperent ſibi ſemper ab iracundia, ad quam ordinarie ſolent eſſe paratiſſimi. Hoffmann. l. cit.

#### CAPUT QUINTUM.

##### De Vomitu Cruento.

1. Definitio. **V**omitus cruentus eſt ſanguinis grumoli ut plurimum, qui a vaſe brevi diſru-



disrupto in Ventriculum depositus erat, per superiora ope motus ventriculi tonici ejectio.

## II. Differentia.

Vomitus cruentus est vel

- 1 Spontaneus, atque ut plurimum periodicus.
- 2 Violentus magis a causis externis, v.g. a purgantibus & emeticis drasticis, aut Septicis improvide assumptis, proritatus.

## III. Signa.

- 1 *Imminentis*: Spastica & Cardialagica pathemata circa præcordia & hypochondria, imprimis in latere sinistro, non perpetua & stataria, sed per intervalla, imo statas interdum periodos recrudescuntia; singultuosæ item præcordiorum & hypochondriorum concussiones, interdum cum Vertigine & Deliriis.
- 2 *Præsentis*: Egestionis sanguinis, ut plurimum nigricantis & congrumati per vomitum, interdum a vomibunda torsione & reiectione ciborum incipientes, tandem vero magis sanguinem sincerum excernentes.

## IV. Subjectum.

- 1 Fœminis familiarior est hic affectus quam Viris, & ut plurimum quidem illis evenit, quæ fluxus menstrui ataxia, aut plenaria suppressione laborant, aut quibus Menses justo maturius cessarunt.
- 2 Familiarior quoque est fœminis plethoricis, animi activioris, temperamentis Sanguineo-Cholerici.
- 3 Frequentius quoque eam experiuntur adultæ, quam juniores.
- 4 Cessantibus justo tempore Mensibus, Vomitu cruento non amplius corripuntur mulieres.
- 5 Viri Hypochondriaci & Hæmorrhoidarii, quibus Hæmorrhoides vel emanferunt, vel suppressæ fuerunt.
- 6 Qui Venæsectionem in pede assuetam intermiserunt.
- 7 Quin & ipsæ prægnantes ex Mensibus retentis interdum affliguntur tali vomitu, idque fere sine periculo, conf. Ettmull. T. II. p. m. 95.
- 8 Quibus ulcera antiqua consolidata fuerunt; Ettmull. ibid. conf. historia a D. Nenter Introduct. ad Pathol. p. 30. allegata.

## V. Prognosis.

- 1 Raro ita copiosus contingit, ut præsens vitæ periculum ob jacturam sanguinis urgeat.
- 2 Gravius tamen minatur periculum si *αὐτὸ καὶ πάλιν*, simul sanguis, & quidem vere floridior rejiciatur. vid. Forest. L. XVI. Observ. 24.
- 3 Minoris periculi est in sexu fœmineo, quam virili, item qui sponte cooritur, quam qui a causis violentis inducitur; denique qui periodicus existit, quam qui incertis intervallis recurrit. Forest. L. XVI. Observ. 25.
- 4 Facile tamen in consuetudinem degenerat, & Cachexiam tandem inducit.
- 5 Idque tanto certius, quo violentior & copiosior contingit, aut quando per Adstringentia perperam tractatur. Horum enim abusus Cachexia, Oedemata, Hydrops, Hæctica, Colica convulsiva, & alia Hypochondriaco-Spastica Hysterica pathemata satis effera presso pede sequuntur.
- 6 Vomitus materiæ nigricantis instar Rob Sambuci, (quando nihil aliud quam sanguis congrumatus) in Acutis lethale signum; in Chronicis vero post Quartanas, aut Hypochondriacas passiones, diutius toleratas, melioris spei sunt.
- 7 In quocunque sanguinis vomitu, sæpius recurrente, Hæmorrhoides supervenientes salutem afferunt morbi certam. Ettmull. T. II. p. 96.

## VI. Remedia. (α) in Paroxysmo.

- 1 Temperantia: Pulv. Antispasmod. ex Nitro, Tart. Vitriol. & Cinnab. factitia paratus, item Pulv. rubeus Salinus Stahlī, aut etiam Nitrum per se datum; Salia reliqua digestiva neutra.
- 2 Lenia adstringentia: Corallia, Species de Hyac. Margarit. præp. Tinct. Mart. Aperitiv. Tinct. Terr. Catech. Quibus jungi potest M. P. de Cynogl. & Pulv. Chacarill. Crocus *ῥίαιος* Stahlī, Lap. Ma-

nati & Dens Hippopot. in forma pulveris.

- 3 Revellentia: Venæsectio in pede, frictiones pedum, ligaturæ extremorum, cucurbitularum applicationes cum multa flamma ad furas, applicatio Hirudinum, pedum immissio in aquam calidam, injectio clysterum lenientium, Pil. contr. Obstruct. Hallens. aut similibus lenium laxantium usus pro referenda alvo.
- 4 Discutientia: Infusum & Essentia Millefolii vid. Stahlī Dissert. de Motu Tonico Vitali p. 11. item ejusd. Pathol. pag. 740. & 1023. aut Essent. hæc cum Essent. aliqua carminativa temperata, e radicibus Helenii, Cariophyllat. Pimpinell. alb. Gentian. rubr. &c. vel cum Essent. Alexipharm. remixta. Salia item volatilia Urinosa cum modo dictis Essentiis aut Tinct. Tart. vel *ῥίι*, aut per se exilibus dosibus, sæpius data.

## (β) Extra Paroxysmum.

- 1 Sanguinem grumofum ex Ventriculo evacuantia, Rhabarbarum cum absorbentibus mixtum: Vina laxantia ex Rhabarb. Rab. Helen. Gentian. rubr. Rubia Tinct. Absinth. Cent. min. Millefol. Card. Ben. Flor. bellid. &c. parata.
- 2 Discutientia superius allegata.
- 3 Plethoram imminuentia & a Ventriculo sanguinem revellentia, uti Venæsectio in pede, tempore verno & autumnali celebrata, Scarificationes, Pediluvia.
- 4 Provocatio fluxuum suppressorum, Hæmorrhoidum scil. & Mensium, per remedia consueta, de quibus suo loco.

## Formula Remediorum.

### 1 Pulv. Antispasmod.

R. Nitr. depur. M. div. in 6. part. equal.  
Tart. Vitriolat. an. ʒi. singulis duabus horis 1. dosin  
Cinnab. ʒi j gr. xvij. sumendo.

### 2 Alius.

R. Arcan. duplic. Cinnab. ʒi j gr. xv.  
Lap. ʒi. M. div. in 3. part. eq.

### 3 Pulv. Temp. adstringens.

R. Corall. rubr. præp. M. pro 4. dosib. singulis tribus vel quatuor horis dosin.  
Nitr. depur. an. ʒss. 1. exhibendo.  
Dent. Hippopot. ʒj.  
MP. de Cynogl. gr. iij.

### 4 Alius.

R. Corall. rubr. præp. Cinnab. ʒi j ʒss.  
Chacarill. an. ʒss. M. dentur singulis duab. horis gr. xv. vel 2. cusp. cultri.  
Nitr. depur.  
Croc. ʒi ʒiat. an. ʒj.

### 5 Alius.

R. Corall. rubr. præp. Spec. de Hyac. ʒj.  
Arcan. duplic. MP. de Cynogl. gr. iij.  
Conch. præparat. aa. ʒss. M. D. ut antea.

### 6 Alius.

R. Matr. perlar. præparat. Lap. Manat.  
Tart. Vitriolat. Spec. de Hyac. aa. ʒss.  
Nitr. depur. MP. de Cynogl. gr. iij.  
Pulv. Chacarill. aa. ʒj. M. D. ut supra.

Fœminæ cuidam irritis omnibus aliis profuit sequens decoctum.

### 7 Decoct. subadstringens.

R. Rad. Symphyt. Coque in Aq. ʒ. iij. ad remanent. ʒ. ij. Colat. adde  
Torment. aa. ʒvj. Syr. e ros. sicc.  
Herb. Hed. Terr. papav. rhæad. aa. ʒij.  
Virg. Cr. M. de quo sumebat singulis  
Millefol. aa. M. j. horis aliquot uncias calide.  
Flor. balauft.  
rosar. rubr. aa. p. ij.

### 8 Essentia tonico-resolvens & discutiens.

R. Ess. Alexiph. M. dosis gutt. 35. ad 30. ter de die.  
Millefol. aa. ʒi.

### 9 Alius.

R. Ess. Millef. Spir. Sal. Ammon. ʒss.  
Pimp. alb. aa. ʒj. M. dosis ut antea.

### 10 Alius.



- 10 Alia.  
*M. dosi ut supra.*
- 11 Alia.  
*Spir. C. C. ʒss.*  
*M. dosi eadem.*
- 12 Pulvis resolvens & evacuans.  
*M. div. in 3. part. æq.*
- 13 Alius.  
*Nitr. depur.*  
*Solut. lap. ʒss. an. ʒss.*  
*M. dosi est ʒss.*
- 14 Infusum laxans.  
*Flor. Bellid. an. mss.*  
*Cort. Aurant.*  
*Tart. Solub. an. ʒij.*  
*Incis. d. ad Ch infund. in Vin*  
*& Aqua an. ʒj. vel ʒss.*
- R. *Eff. Millefol.*  
*Adianth. alb. an. ʒj.*
- R. *Tint. ʒij. acris.*  
*Eff. Alexiph.*  
*pimp. alb. an. ʒj.*
- R. *Lap. Canc. præp. ʒij.*  
*Rhabarb. elect. ʒj.*
- R. *Rhabarb. elect. ʒj.*  
*ʒ. Diaph.*  
*Corall. rub. præparat.*  
*Mum.*
- R. *Rad. Gentian.*  
*Helen.*  
*Rub. Tinct. an. ʒij.*  
*Rub. elect. ʒij. ad ʒss.*  
*Summit. Cent. Min.*  
*Comar. Millef.*

VII. *Methodus medendi.*

- 1 In Paroxysmo. Temperantibus, moderate sistentibus junctis, utendum.
- 2 Egregie hic se gerunt Spiritus urinosi exilissimis dosibus (ad gutt. 3. 4.) Essent. Carminat. ex rad. Helen Pimp. alb. Gentian. rubr. remixti. Ess. Millefol. & quæ huic quoad specificam virtutem par est, Ess. Adianthi albi.
- 3 Interponantur hæ Essentiæ temperantibus & sistentibus.
- 4 Neque plane contemnendæ sunt: Tinct. Corall. rubr. cum cera aut Spir. panis, vel succo citri, paratæ: aut mitiora Adstringentia cum anodynis sociata.
- 5 Externa Ventriculi regioni applicata insignem usum hic non præstant, nisi quatenus conatum vomitorium in genere sedare dicuntur. Parum etiam prosunt Frictiones, Ligaturæ & Fetus partium externarum.
- 6 Alvum adstrictam esse non decet, unde conveniunt Clysteres lenientes & salino stimulo imbuti.
- 7 Cessante Vomitu, si quid sanguinis congruati in ventriculo restitare suspicio sit, lene laxans Rhabarbarinum subungere non inconsultum erit.
- 8 Ventriculus roboretur per Tinct. Vitriol. Martis Ludov. rite par aut Tinct. Martis cydoniat. vel pomat. per succum Cydoniorum aliaque acidula.
- 9 Ad præoccupandum recursum paroxysmi Venæsectio in pede & Essent. Millefol. usus versus instantem fluxus Menstrui periodum, aut ubi Hæmorrhoidum suppressio subest, Hirudinum applicatio suadenda est.
- 10 Tempore intercalari medicamenta fluxum Menstruum & Hæmorrhoidalem placide promoventia ex usu sunt.
- 11 Quibus etiam in aliis casibus associari possunt crassin sanguinis & lymphæ corrigentia, inter quæ præceteris eminet Tinct. ʒij acris, juxta methodum D. Stahliani parata & eum ejusdem Ess. Alexipharmaca remixta, non neglectis remediis laxantibus, Pilulis v. g. Stahlianis aut vere Polychrestis.

VIII. *Caute Præcæ.*

- 1 In Paroxysmo abstinendum ab Adstringentibus fortioribus, nisi summa necessitas eorum usum suadeat, ne graviora mala sequantur.
- 2 Ad alvum aperiendam, non exhibeantur purgantia interna, minime omnium vero Aloetica, quæ etiam in omnibus sanguinis eruptionibus suspecta sunt.
- 3 Ab Adstringentibus tanto magis cavendum quando Vomitus cruentus, ut fere fit, consueta fluxus Menstrui periodo contingit, aut a suppressione Hæmorrhoidum dependet; imo ne specifica superius laudata Millefolium scilicet & Adianthum album, tunc locum habent: Subiecta enim remediis talibus tractata facile in Hydropem vel Hæticam incidunt, si vel humidiora vel sicciora fuerint.

- 4 Cum Vomitus hoc loco minoris considerationis sit, imo quamdiu notabilem quantitatem, aut grumos sanguinis adhuc excerni videmus, non temere sistendus sit, abstinendum est a Topicis externis, quoniam Vomitum sistendo, grumorum excretionem impediunt, & sanguinis putredinem, ac graves cardialgias aliæque mala excitant.
- 5 In Paroxysmo quiescentia continentia maxime prod-est.
- 6 Extra Paroxysmum vitetur motus fortior Plethoram commovens, ut & omnia remedia alia drastica & imprimis Vomitoria.
- 7 Diæta sit tenuis & omnis ciborum infarctus summo studio vitetur.
- 8 In provocatione Mensium & Hæmorrhoidum suppressorum fugiantur omnia fortiora pellentia, ne Vomitus cruentus revocetur.

## CAPUT SEXTUM.

*De Fluxu Hæmorrhoidali in genere, & in specie de Nimio.*

I. *Definitio.* **H**æmorrhoides sunt excretiones sanguinis per intestinum rectum & specialiter per ejus venas Hæmorrhoidales, tam internas quam externas a Natura institutæ per motum Tonicum, ut viscera infimi ventris a sanguine superfluo liberentur, & multi morbi exinde oriundi præcaveantur.

II. *Differentia.*

- 1 Hæmorrhoidum aliæ sunt *externæ*, a ramo Iliaco originem trahentes & sanguinem prope Sphincterem ani cum scybalis durioribus effundentes: aliæ sunt *internæ*, e ramo Splenico ortæ, cruorem paulo profundius in intestinum rectum vehentes & fecibus jungentes.
- 2 Aliæ sunt legitime succedentes, corporis constitutioni respondentes & sine insignibus molestiis fluentes. Aliæ contrario modo se habent, & vel excedunt, uti nimix, vel deficient, uti suppressæ, vel magnos dolores excitant, uti cæcæ.
- 3 Aliæ sunt *periodicæ*, statas scilicet periodos & anni tempora observantes: aliæ vero *vixæ* sunt, quæ nullam servant periodum, sive sine ullo ordine, modo rarius, modo frequentius homines affligunt.
- 2 In aliis sanguis excernitur floridus, quando scilicet Hæmorrhoides, sine ullo impedimento frequentius fluunt: in aliis vero nigricans, sive obscure nigricans & crassus, ubi contrario modo se habent Hæmorrhoides.
- 5 In quibusdam excernitur sincerus sanguis, in aliis vero mucus sanguine tinctus.

III. *Signa.*

- 1 *Imminentium.*
  - a In ætate virili post varios spasticos in hypochondriis sensus, aliaque Symptomata hypochondriaca, dolor tensivus & spasticus circa os sacrum & lumbos.
  - b Tenesmus & sensus rei cujusdam duræ in ano hærentis, aut quasi pali infixi ossi sacro cum ardore.
- 2 *Fluentium.*
  - a Internarum: ubi post varia prægressa symptomata sanguis sincerus cum Scybalis alvi durioribus, aut potius post illa, durantibus adhuc vacuis illis egerendi conatibus, sine ullo sensu molesto excernitur. Si vero aliquis mediocris sensus concurrat, est Tenesmodes, ulteriorem quasi adhuc excretionem efflagitans, vid. Stahliani Patholog. p. 162.
  - b Externarum: Vesiculæ molles sanguinem nigro purpureum contentum scalpendo, vel majoriniflu disruptæ, fundentes; quæ postmodum in papulas abeuntes, sanguinem sub fortiori pressione & nisu plorant.
- 3 Cæcarum & suppressarum vide infra.



## 4. Nimiarum.

- a Quando Hæmorrhoidum fluxus iusto frequentius v. g. singulis octiduis recurrit.
- b Quando solito diutius, ad duas, tres septimanas, imo fere continue durat.
- c Quando denique nimis largam quantitatem sanguinis eliminat, ita, ut tantum fere singulis dejectionibus egeratur, quantum alias larga Venæsectione educi solet, adeo, ut vires inde notabiliter alterentur, gravitas in coxis, crurum imbecillitas, imo Cachexiæ hæud obscura vestigia appareant.

## IV. Subiectum.

1. Quamvis fluxus Hæmorrhoidalis omnibus fere sine discrimine temperamentis evenire soleat, præceteris tamen dispositi sunt ad eundem, Sanguineo-Cholerici aut Sanguineo-Melancholici, Plethorici.
2. Fluxus Hæmorrhoidalis respectu ætatis ordinarie evenire solet ætati virili & senili.
3. Qui vero ante ordinarium tempus eum experiuntur, in iis vel hæreditaria dispositio vel contagium latet.
4. Junioribus fluxus Hæmorrhoidalis proprie sic dictus raro contingit, nisi ab hæreditaria dispositione; evenit vero iisdem aliquando copiosa dejectio sanguinis per inferiora, post prægressam in juniore ætate frequentiore Hæmorrhagiam Narium, & hanc in adultiore insecuta diuturna pathemata hypochondriaca, quæ genere quidem cum fluxu hæmorrhoidali convenit, modo excretionis tamen ab eodem differt, dum non post fæces alvinas, aut cum iisdem exprimitur, neque ex infimis intestini recti vasis, sed procul dubio ex superioribus intestinis exit, atque uno impetu effunditur.
5. Respectu sexus, frequentior est in sexu virili quam fœmineo, nisi forte gestatio fœtus, partus laboriosior, Mensium cessatio præmatura, dispositionem quandam propiorem inducant.
6. Hæmorrhoidum fluxum facilius experiuntur, qui in pueritia & adolescentia Narium Hæmorrhagias, postea vero congestiones in pectore & circa illud, ac pathemata Hypochondriaca passi sunt.
7. Qui Venæsectiones & Scarificationes consuetas neglexerunt, iræ graviori indulgent, & corpus diuturno frigori inpr. vero pedes exponunt.
8. Ad Hæmorrhoidum fluxum homines porro disponunt equitatio paulo fortior, præsertim in Sole: nifus violentior expressorius sæcum induratarum ob alvi siccitatem familiarem: item abusus, Allii, Aloeticorum & crocatorum, nominatim vero Elix. Prop. Parac. sine acido & Pilul. Francos. Diæta item acrior aromatica, potus vinorum Austriacorum & Hungaricorum, iracundia frequentior, Venus præmatura aut immodica &c.

## V. Prognosis.

1. Fluxus Hæmorrhoidalis cum multis affectibus connexionem habet, eosque legitime succedens vel præcavet, vel, iis superveniens, solvit, vel ad eosdem disponit, aut actu producit. vid. Raymundi Fortis Consilia, ubi in Indice primo, secundo & tertio Catalogus morborum cum Hæmorrhagiis connexionem habentium reperitur.
2. Fluxus Hæmorrhoidalis raro tanta copia, aut violentia erumpit, ut præsens ob iacturam sanguinis effusi vitæ periculum metuendum sit.
3. Longe major enim, imo vix credibilis sanguinis copia spontaneis huiusmodi egestionibus, absque adeo notabili noxa, aut certe sine lethali eventu, excernitur, quam artificialibus emissionibus educenda foret. Conf. Stahl. Pathol. p. 754. seqq. ubi 4. exempla memoratu dignissima adducuntur.
4. Hic ipse fluxus tamen, si nimis diu continuat, nimis frequenter recurrat, virium prostrationem, quin Cachexiam tandem inducit.
5. Majus tamen periculum a repentina Hæmorrhoidum, præsertim vero affuetarum, aut post pertinacia molimina tandem erumpentium, cohibitione, quam a fluxu earundem, licet immoderato & satis copioso, impendet.

## VI. Remedia.

1. Antispasmodica & temperantia Salina, præcedente capite laudata. orgasmum sanguinis sistentia, & in casu necessitatis cum moderate sistentibus & Anodynis mixta, Spec. scil. de Hyacith, Cinnab. ℥ij, & MP. de Cynogl. præ ceteris vero Pil. Stahlianæ aut Polychrestæ veræ Beccher &c.
2. Nervino-discutientia: Mixtura ex Tinct. ℥ii acris & Spir. C.C. Essent. Millefol. & Adianth. albi.
3. Venæsectio Revulsoria in brachio, immisso manuum in aquam calidam.
4. Lenia Diaphoretica fixa, æqualem sanguinis circulum producentia.
5. Lenia laxantia usum habent non contemnendum, imprimis Rhabarbarina, quæ biliosam acrimoniam abstergunt, adeoque tenesmodem conatum mitigant, dumque egestionem alvinam faciunt, nifum illum expressorium fortiolem præoccupant. Nec minus etiam profunt Pil. contr. Obstru. Hall. num. 3. aut. 4. ut & Clysteres.
6. Specifica in sistendo fluxu Hæmorrhoidali efficacia pollent Millefolium, Adianthum album & Efs. exinde paratæ, Dens Hippopot. Lap. Manati, Priapus Ceti, Mus-marinus &c.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis temperans.

Rx. Pulv. Antispasm. Hall. binis vel ternis horis  
℥ij. div. in 6. part. æq. dosi j.

## 2 Alius temperans &amp; subadstringens.

Rx. Pulv. Antispasm. M. div. in 4. part. æq. D.  
Corall. rub. præp. æ. ℥ij. ut supra.  
Spec. de Hyac. gr. viij.

## 3 Pulvis diaphoretico-temperans.

Rx. Pulv. Antispasm. ℥ij. M. div. in 4. part. æq.  
Matr. perlar. Conf. Formulæ præced. capitibus allegatæ.  
℥. diaph. ana. ℥j.  
Cinnab. ℥ij. gr. xij.

## 4 Potio laxans.

Rx. Fol. Senn. Or. ℥ij. destill. ℥viij.  
Rhab. elect. ℥ij. Stent. infus. per noctem. dos.  
Sal. Absinth. ℥j. 2. vel 3. Cochlearia hor. matur.  
Aq. Millefol. vel alius tuis quotidie sumenda.

## 5 Alia Potio laxans

Rx. Rhab. elect. ℥ss. Card. Ben. ana ℥j  
Fol. Senn. Aq. destill. ℥viij.  
Sal. Absint. M. pro j. dosi.

## VII. Methodus medendi.

1. Exhibeantur pulveres temperantes, & hisce subjungantur aut interponantur Nervino-Discutientia, imprimis Mixtura Tonica sæpius laudata, aut Essent. Millef. &c. Aut loco horum fumantur vesperi per aliquot dies Pilul. Stahlian. num. 15. vel 20. & simul usurpentur Pulv. Antispasmodici aut Pulv. Rubeus Salinus Stahlian aut Tinct. Salina. D. Richter ter de die.
2. Jungatur hisce Venæsectio in brachio & immisso manuum in aquam calidam.
3. Exhibeantur remedia fixa diaphoretica, æqualem sanguinis distributionem promoventia.
4. Sequantur lenia laxantia ( vitentur autem purgantia resinosa & Aloetica ) clysteres lententes & abstergentes, & hisce omnibus non proficientibus, progressus fiat ad Specifica.
5. Quæ si præter intentionem sequatur plenaria suppressio, tum ventilationibus sanguinis vicariis per Venæsectiones in pede, circa Æquinoctia instituentas, aut si pathemata graviora increbescant, per Hirudinum applicationem succurrendum. Plura vide cap. sequente.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

1. Hæmorrhoidum fluxus, si quis alius, circumspiciatissime tractandus, neque temere sistendus, aut supprimendus est; certe minime omnium fluxum hunc suppressum licet, præsertim  
a Ubi fluxus hic post longa & vehementia molimina, sive pathemata Hypochondriaca, Colica, Nephritica, Ischiadica, sese exeruit.



- b Ubi jam diutius affuefactus est.
- c Ubi stas fere periodis rediit.
- d In habitu corporis spongiosiori &
- e Ætate jam consistente, vel seniore.
- 2 Fœminæ quidem exhibitionem illam facilius ferunt.
  - a Si in ea sint ætate, qua ipsis Menses adhuc succedunt.
  - b Si cohibitio illa per externa potius, aut interna illa remedia prorsus extra Mensium tempus exhibita, peracta fuerit.
  - c Si excretio Hæmorrhoidalis ipsis non a directo molimine, sed ab extrinseco, ut sæpius fieri solet, gravamine, nempe ab Uteri imprægnati incubitu, aut alvi valde siccæ laborioso conatu expressio orta sit.
  - d Annosioribus tamen, quibus jam Menses cessant, aut quæ in illis consuetis constitutæ sunt, non secure cohibentur Hæmorrhoides.
- 3 Neque etiam traditionibus illis multum fidendum, quasi moderari saltem, non vero penitus suppressere fluxum Hæmorrhoidalem liceat. Longe enim facilius plenaria & pertinax suppressio, quam moderamen ejusdem obtinetur.
- 4 Specifica, quia sæpius præsentius fluxum Hæmorrhoidalem cohibent, quam sæpe expedit, non nisi cum summa cautela exhibeantur.
- 5 Par ratio est adstringentium, quamvis enim satis potenter alioquin operentur, v. g. Crocus Mart. Adstring. ad ʒj. datus, raro tamen hic aliquid efficiunt, aut si vel maxime cohibitionem præsent, gravissima Hypochondriaco-Spastica, Asthmatoidea, Cardialgica, Colica, imo Ascitica, aut Hæctica Pathemata presso pede sequuntur.
- 6 Hæmorrhoidum suppressionem per infausta talia artificia inductam, si Oedemata excipiant, cum abdominis intensa inflatione, fonticum certe est malum, cui neque qualitercunque revocatus fluxus (quod ipsum tamen satis difficulter, & vix cum sufficiente successu obtinetur) effatu dignum solamen affert, nisi in vegetioribus subjectis, & habitus minus diffuse spongiosi.

## CAPUT SEPTIMUM.

### De Fluxu Hæmorrhoidali deficiente.

- I. *Definitio*: **D**efectus Hæmorrhoidum est vel cessatio fluxus consueti, vel earundem emanatio, cum vel sine moliminibus ad fluxum earum tendentibus, a causis vel internis (sanguinis spissitudine, defectu vel insufficientia motuum) vel externis (perverso scil. vitæ regimine aut mala medicatione) ortum trahens.
- II. *Differentia*.  
Defectus fluxus Hæmorrhoidalis dupliciter considerandus est. Quatenus
  - 1 α emanet, h. e. non succedit, ubi secundum pleraque circumstantias probabiliter expectari debebat.
  - β Vel jam assuetus iterum cessat, h. e. sponte subsistens, aut arte cohibitus, solitis periodis non redit.
  - 2 Quatenus fluxus suppressus.
    - α Vel adhuc eruptionem molitur, atque hinc circa locum excretorium varia hujus moliminis indicia præbet.
    - β Vel nulla novæ eruptionis signa edit, verum pristina potius fluxum antegressa, per fluxum vero subsequenter sublata; pathemata, aut alia nova incommoda in partibus remotioribus inducit.
- III. *Signa*.
  - 1 Suppressi & deficientis per se patent, defectus scil. consuetæ excretionis, aut molimina imperfecta, quæ nulla excretio sequitur.
  - 2 Imminentis.
    - a Fluxum Hæmorrhoidalem probabiliter expectare licet, quando in ætate virili, post prægressa varia pathemata Splenetico-hypochondriaca, varii

spastici circa regionem ossis sacri & lumbos, dolores, imprimis cum tenesmode conatu egerendi sese exerunt, intercurrente sensu rei alicujus puræ, v. g. nuclei intus in intestino recto hærentis, imo cum actualibus ani protuberantiis dolorificis, quas Hæmorrhoides cæcas vocant, aut cum excretionem muci viscidæ instar gummi Tragac. soluti.

- b Motus Hæmorrhoidalis, eruptionem denuo molientis, proxima signa sunt dolores tenervi per longitudinem ossis Sacri, & juxta ejus latera in Coxis, item morsus intus in intestino recto prope exitum, sæpe admodum sensibiles: nec non alia symptomata consuetæ v. g. tussis, fluxum ani antecedere vel comitari solita, circa statas periodos, vel majores anni mutationes, hoc est Verno, vel Autumnali tempore, revertentia.
- IV. *Subjectum*.
    - 1 In genere omnes qui alias ad fluxum Hæmorrhoidum dispositi sunt.
    - 2 In specie respectu temperamenti Phlegmatici, Sanguineo-Phlegmatici, Melancholici &c.
    - 3 Senes debiles, torpidi.
    - 4 Plethorici, quorum sanguis simul est spissus.
    - 5 Terrore graviore fluentibus Hæmorrhoidibus percussi.
    - 6 Qui partes inferiores & imprimis abdomen frigori exposuerunt, ac potum frigidum, & cibos flatulentos assumerunt.
    - 7 Quibus per Specifica & Adstringentia nimius fluxus suppressus fuit.
    - 8 Quibus febres intermittentes per Chinam Chinæ aliaque Adstringentia male curatæ fuerunt.
  - V. *Prognosis*.
    - 1 Fluxus Hæmorrhoidalis rite succedens, uti a gravibus variis malis, v. g. Melancholia, Nephritide, Mictu cruento, Podagra &c. præservat, imo liberat, testes Hippocrat. L. VI. Aphor. II. ita ejusdem suppressio pristina hæc mala ut plurimum revocat. vid. Prognost. 1. Tab. præced.
    - 2 Sponte tamen subsistens non ita præsentissimas & gravissimas noxas infert, majorem etiam renovationis spem relinquit, quam arte oppressus.
    - 3 Infausta enim per artem imperitam cohibitio non solummodo dicta incommoda certo certius revocat; sed & nova, imo pejora, v. g. Asthma convulsivum, Catharrhum suffocativum, Vertiginem, quin Apoplexiam, Hæcticam, Hydroperem, monente jam Hippocrate L. VI. Aphor. 12. inducit.
    - 4 Tolerabilius omnino est, fluxum Hæmorrhoidalem secundum præsentis circumstantias non injuria expectandum, emanere, quam eundem, post factam eruptionem, vel crebriorem, præsertim stas periodis, recursum subsistere, vel incongruis medicamentis suppressi: quorum utrumque etiam in ætate senili nunquam periculo vacat.
  - VI. *Remedia*.
    - 1 Massam humorum attenuant, atque obstructions in genere referant Diluentia, Aperitiva amara, Hepatica, & Splenetica dicta v. g. Rad. Helen. Imperator. Pimpin. alb. Caryophyllat. Zedoar. Galang. Gentian. rubr. Ari. Vincetox. Cichos Apii &c. Rad. lign. Sassafr. Lign. Sanct. &c. Herb. Card. Ben. Cent. min. Absinth. Pont. Fumar. Scolopendr. Scord. Mar. rub. Meliss. Cappil. &c. Herb. & flor. Bellid. prat. Nasturt. Cochlear. &c. Cort. Citr. Aurant. Winter. Flor. Stœchad. Arab. Lavend. Anth. &c. Sem. 4. Carmin. Salia neutra, Gummata, v. g. Galban. Ammoniac. &c. & pleraque, quæ alias in Obstructionibus Mensium commendari solent.
    - 2 Motum sanguinis ad inferiora blande invitant, laxantia, præsertim cum modo dictis aperientibus sociata, v. g. Pil. Beccher. ver. vel Tartar. Bootii de Ammoniaco Quercet. aut aliæ ex Gummat. & Extractis amaris ex tempore paratæ: Folia Senæ, Rhabarb. in infusis cum prioribus radicibus, herbis, floribus &c.



3 Eruptionem fortius incitant stimulantia tuta interna, v. g. Aloetica, Pil. Francof. Elix. Prop. Par. f. acid. Colocyntiaca, Helleborina, tum externa v. g. Suppositoria acria, frictiones cum foliis ficulneis, querci, vel panno asperiore, Hirudines, Equitatio &c.

## Formula Remediorum.

## 1 Infusum laxans.

R. Rad. Gentian. rubr. Cort. Aur.  
Pimpinell. alb. Cinnam. acut. ana. ℥ij.  
Caryophyll. ā. ℥iij. Fol. Senn. Alex. S. S. ℥j.  
Herb. Card. Ben. Rhab. elect. ℥iij.  
Cent. min. Tart. Solub. ℥iss.  
Meliss. Incis. d. ad Ch.  
Flor. Bellid. ana. p. ij.

## 2 Aliud.

R. Rad. Cichor. winteran.  
Aprii. Cinnam. acut.  
Vincetox. Sal. Tartar. ana. ℥iss.  
Imperat. ana. ℥ij. Incis. d. ad Ch.  
Herb. Marrub. Hisce speciebus affundatur  
Scolopendr. an. mss. Aq. fervent. ℔. j. & post-  
Fol. Sen. S. S. ℥vj. modum ℔. iij. Vini albi,  
Rhab. elect. ac bibantur quotidie mane  
Agar. alb. ana. ℥ij. ℥vj. ad ℥viii.  
Cort. Citr. ℥iij.

## 3 Pulvis incidens atque aperiens.

R. Pulv. Stom. Birckm. cuius dosis detur ante pran-  
℥ss. div. in 6. part. æq. dium & cœnam.

## 4 Alius.

R. Pulv. Stom. Birckm. ℥ss M. D. ante prandium & cœ-  
℥. Al. Cachect. ℥iss. nam aliquot cuspides cul-  
Cort. winteran. ℥ij. tri.

## 5 Alius.

R. Pulv. Pimpin. alb. Lap. S. ana. ℥ij.  
Galang. Ol. dest. Anis. ℥ss.  
Zedoar. ana. ℥j. Sacch. ad pond. omn.  
Ari. M. D. singulis quatuor  
Cort. winter. ana. ℥ij. horis 2. Cuspid. cultri vel ℥ss.  
Tart. Vitriol.

## 6 Essentia incidens &amp; deobstruens.

R. Ess. Pimp. alb. M. D. ter de die 30. ad 40  
Cort. Aurant. gutt.  
Tinct. ℥ij. ac. ana. ℥j.

## 7 Alia.

R. Ess. Alexiph. Myrrh. ℥ss.  
Tinct. Tart. ana. ℥iss. M. 30. ad 40. gutt. ter de  
Succin. ℥j. die.

## 8 Pilulæ laxantes &amp; aperientes.

R. Pil. Beccher. vel Stahlī ℥j.

## 9 Aliæ.

R. Pil. Bont. vel Pil. de Mane aut vesperi num. 15. vel  
Ammon. ℥j. 20. sumendæ.

## 10 Aliæ purgantes.

R. Pil. Polychr. Hall. ℥j. Elix. Prop. P. q. f.  
Extr. Hell. nigr. ℥j. M. f. Pil. ad gr. j. pro 4.  
Colocynt. gr. iij. vel 5. dosib.

## 11 Aliæ.

R. MP. de Ammon. Querc. Elix. P. P. q. f.  
Extr. Helleb. nigr. M. f. Pil. ad gr. j. 15. vel  
Cent. min. ana. ℥ss. 20. pro dosi.

## 12 Suppositorium stimulans.

R. Pulv. jalapp. ℥j. Mel despum. q. f.  
Sal. Gemm. ℥ss. M. P. suppositorium.

## 13 Clyster stimulans.

R. Herb. Mercurial. Adde  
Matric. ana. mj. Elect. Cathol. ℥vj.  
Rad. Helleb. nigr. ℥ij. Mel. Mercurial. ℥j.  
Pulp. Colocynt. in petia Sal. Gemmæ ℥iss.  
lig. ℥j. Vit. Ov. num. j.  
Coque in f. q. Aq. Colat. ℥x. M. fiat Clyster.

## VII. Methodus medendi.

1 Vicariæ sanguinis ventilationes vix unquam quidem fluxum hæmorrhoidalem suppressum sufficienter compen-  
sant; conducit tamen plurimum generalem ta-  
lem ventilatoriam evacuationem medicamentis præ-  
misse.

2 Postmodum omni studio sanguinis dilutioni, at-  
tenuationi, atque obstructionem refectioni opera de-  
tur per antea præscripta remedia resolventia, præ-  
parantia & evacuantia.

3 Tandem, si aliqua, aut solita circa locum excre-  
tionis molimina compareant, modeste stimulantia  
subjungantur, v. g. dosi auctior Pil. Beccher. ver.  
Clysteres & Suppositoria stimulantia, quin & hi-  
rudinum applicatio tentetur, & frictiones instituan-  
tur.

4 Suppositoriis, si non satisfaciunt intentioni, adda-  
tur pulv. Euphorb. Blazer.

5 Incommoda in partibus remotis sese exerentia, vel  
motum hæmorrhoidalem eminus saltem respicien-  
tia, temperantibus Nitrosis, blandioribus laxan-  
tibus, Venæsectione præservatoria in pede, circa  
Æquinoctia repetenda, imo, si importunius urge-  
ant, hirudinum applicatione præcaveantur & le-  
niantur.

6 Irritis omnibus aliis, Pulveres Solares Richt. & Ess.  
Dulc. Hall. tam ordinaria, quam concentrata non  
solum Hæmorrhoides suppressas, sed & alios san-  
guinis fluxus in ordinem redegerunt, exhibendo  
quotidie mane & a meridie pulverem Crem, in-  
termedio vero tempore & imprimis vesperi datis  
quatuor dosibus Ess. Dulc. ad gutt. 15. vel 20.

## VIII. Cautela Practicæ.

1 Interne omnia Salia Volatilia & gravius commo-  
ventia cane & angue pejus fugiantur, quoniam  
sanguinem magis ab Hæmorrhoidibus revellunt,  
& graviora mala, decubitus ad alias partes, do-  
lores, inflammationes &c. aut majorem infarctum  
in ipsis vasis hæmorrhoidalibus producant.

2 Opiata vero & marina illa Antispasmodica & spe-  
cifica alias credita, v. g. Lapis Manati, Dens Hip-  
popotami. Unic. veri, Priapus Ceti &c. exulent.  
Certe enim hæc ultimo loco allegata virtute pol-  
lent fluxum hæmorrhoidalem specificè veluti cohi-  
bendi: utinam æque certa innotescerent Specifica  
eundem revocandi!

3 Si in suppressione Hæmorrhoidum decubitus san-  
guinis fiunt ad alias partes, tam propiores, quam  
remotiores cum variis doloribus in illis partibus  
spasmodicis, exulent Opiata, quippe quæ excre-  
tionem, præter alia incommoda adhuc magis re-  
tardant.

4 Motus moderatus corporis uti ad fluxilitatem san-  
guinis promovendam, & revocationem Hæmor-  
rhoidum multum confert, ita nimius humores ni-  
mium commovendo majoribus turbis ansam præ-  
bet.

## CAPUT OCTAVUM.

## De Fluxu Mensium Nimio.

I. Definitio. **F**luxus Mensium nimius est sanguinis  
singulis mensibus excerni soliti, vel ni-  
mia, justo tamen tempus accidens, vel inordina-  
ta & præter consuetum Naturæ ordinem contin-  
gens excretio, comitata cum insignibus molestiis  
& præsertim magno languore, partim a causis in-  
ternis, partim vero ab externis commoventibus,  
originem trahens.

I. Differentia: Fluxus Mensium nimius differt.

1 Respectu impetus, quando insignis sanguinis copia  
cum impetu simul & semel cum magnis quoque  
gramis excernitur.

2 Respectu durationis, quando sanguinis effluxus ad  
longum tempus extenditur.

3 Respectu termini ordinarii, quando bis aut ter sin-  
gulis mensibus sanguis erumpit.

4 Respectu ætatis, quando in fœminis ultimo termino  
proximis, non solum irregularis, sed & nimius Men-  
sium fluxus observatur; quod quidem etiam inter-  
dum in junioribus contingit ab externis causis vio-  
lentis, quæ si non adsunt, suspicio ut plurimum re-  
me-



mediorum Menses & fœtum pellentium sumptorum, adest.

### III. Signa.

- 1 Fluxus Menstruus ille reputari debet nimius, qui vel nimis confertim & copiose, contingit, atque etiam cum frustorum coagulatorum excussione conjunctus est, vel nimis cito & ut plurimum inordinate, revertitur, vel justo diutius durat.
- 2 Præcipuum autem Criterium, quo fluxus Mensium nimius a fluxu saltim largiori & abundantiori distinguere potest, est tolerantia, vel *ὑποπόσις* patientum, nimirum, ubi ante fluxum talem largiorem gravativus quidem languor adest, quem communiter pro debilitate interpretatur, qui tamen non solum non augetur, fluxu largiori insequente, sed potius mitescit, ibi nondum excessus Mensium agnosci potest.
- 3 Ubique vero hujusmodi valde largum fluxum & diuturnum aut sæpius recrudescentem non solum comitatur, sed etiam insuper sequitur & superstes manet vera aliqua debilitas, sive lassitudo & artuum gravitas imprimis cum malo colore patientis magis magisque increbescente, ac tensionibus & pressionibus in abdomine antecedentibus aut fluxum concomitantibus, ibi utique fluxus nimius incusandus est.

### IV. Subj. ctum.

- 1 Mensium fluxus nimius imprimis confertim, & cum impetu factus, raro obtingit junioribus, & annosioribus potius, sive circa confinia plenariæ cessationis Mensium constitutis, vel post abortum, vel molæ exclusionem, vitium aliquot uteri fovit.
- 2 Junioribus quidem Plethoricis, Cholerico-Melancholicis iracundiæ, aut speculationibus Venereis indulgentibus, fluxus Mensium largior, imo immoderatio & frequentior evenire potest; sed si cum impetu & violentia insigni erupisse dicitur, talis Hæmorrhagia ut plurimum abortiva est.
- 3 In quibus hæreditaria adest dispositio.
- 4 Quæ Plethoram, saltationibus aut aliis gravioribus corporis motibus, commoverunt.
- 5 Quæ ad talem fluxum jam assuetæ sunt; in hisce enim ob leviores causas nimia statim sequitur excretio.
- 6 Quæ sæpius abortum passæ sunt, aut etiam quibus aliquid secundinarum remansit.
- 7 Quæ pellentibus remediis sæpius usæ sunt, quales sunt, quæ coitum exercentes virgines videri volunt, sive quæ magis coire, quam parere amant.
- 8 Quibus vasa uteri erosa sunt.
- 9 Quæ Venæsectiones & Scarificationes neglexerunt.
- 10 Diæta calida & aromatica abutentes.

### V. Prognosis.

- 1 Mensium excessus, præterquam plane summus, quod tamen in menstruo fluxu proprie sic dicto revera inauditum quiddam est, longe pauciores ultiores noxas post se trahit, quam qualiscunque defectus.
- 2 Abit tamen facile in assuetudinem, & trahit post se varia incommoda, partim circa concipiendum & gestandum fœtum, partim circa partum & post eundem.
- 3 Quæ sæpius abortum passæ sunt, difficulter concipiunt, aut si conceperunt, facile abortum denuo patiuntur.
- 4 Quibus Menses ob vitium uteri in nimia quantitate fluxerunt, aut quæ ob idem vitium abortui obnoxie redditæ fuere, remoto illo vitio ad conceptionem, interdum denuo aptæ redduntur. vid. Stahl. Pathol. pag. 525. & seqq. ubi casus occurrit lectu dignissimus.
- 5 Diu durans immodicum uteri profluvium, disponit corpora ad Cachexiam, Febrem lentam, pedum Oedemata, Hydropem, Tabem, magnamque debilitatem affert toti corpori.
- 6 Imo mors interdum subitanea graviores uteri Hæmorrhagias cum convulsionibus sequitur.
- 7 Imprudentem fluxus nimii & simultaneam suppres-

sionem excipit interdum Suffocationes Hysterico-Epilepticæ.

### VI. Remedia.

- 1 Orgasmi sanguinis generalem temperant pulveres absorbentes, nitrosi, cinnabari, Vennæsectio.
- 2 Motum sanguinis ad uterum ruentis divertunt ligaturæ, & juxta Hippocr. consilium, cucurbitulæ majoris applicatio sub mammis. vid. ejusd. Aphor. 50. L. V.
- 3 Fluxum specifica quadam energia moderantur Pilulæ Beccher. genuinæ, & securius, ac lenius, Pilul. Stahlianæ, & Balsam. Viscerales nobis familiares, & in casu graviore pulv. Niger Hallens. confortando & sistendo in omnibus Hæmorrhagiis uteri mira præstans: ut & Pulv. Solar. tonic. Richteti.
- 4 Fluxum positive cohibent cum anodynis sociata Adstringentia, v.g. Pulv. Heurnii, quem in Commentar. ad Hippocr. Aphor. sup. citato proponit. Item Vitellus ovi ex gallina mactata extracti cum Nuce Moschata a Lentilio commendatus in Miscell. Pract. p. 440. Denique Millefolium ejusque Essentia.
- 5 Tonum partium roborant Martialia, vulgo aperitiva dicta. Item Salia volatilia aut Spiritus Urinæ cum Tinct. Tartari.

### Formula Remediorum.

#### 1 Pulvis temperans.

Rx. Nitr. depur. M. div. in 4. part. æq.  
Arcan. dupl. Singulis duabus vel tribus  
Conch. præparat. ana. ʒss. horis exhibendo 1. dosin.  
Cinnab. ʒij. ʒss.

#### 2 Potio diapnoico-temp.

Rx. Aq. Meliss. Matr. perl.  
Millefol. Tart. Vitriol. ana. ʒj.  
C. C. citr. Cinnab. ʒij. ʒss.  
cord. frig. ana. ʒj. Sacch. perlat. ʒij. M.  
Nitr. regener. dentur sing. hor. 2. cochlearia.  
ʒ. diaph.

#### 3 Pulvis diapnoico-temperans.

Rx. Nitr. depur. Tart. Vitriol. ana. ʒj.  
Lap. ʒ. Cinnab. nat. præp. g. xij.  
ʒ. diap. divis. in 4. dos.

#### 4 Pulvis moderate sistens.

Rx. Nitr. depur. vel Crystal. Corall. rubr.  
Matr. perl. ana. ʒss. Cinnab. nat. ana. gr. v.  
Spec. de Hyacinth. ʒss. M. div. in 4. part. æq.

#### 5 Alius.

Rx. Lap. ʒ. præparat. Cinnab. ʒij. ana. ʒss  
Pulv. Chacarrill. MP. de Cynogl. gr. ij.  
Nitr. depur. ana. ʒj. M. div. in 4. part. æqual.  
Spec. de Hyac.

#### 6 Pilulæ laxantes specificæ.

Rx. Pil. Stahlian. ʒj. vel dentur mane & vespere 15.  
Pil. Bals. Visceral. ʒj. vel 20. pro dosi.

#### 7 Potio specifica.

Rx. Aq. Meliss. ʒiiij. Syr. Cort. Aurant. ʒss  
Pil. Bals. Visc. ʒj. M. D. sing. hor. cochlearia 2.

#### 8 Essentia subadstringens.

Rx. Ess. Millefol. M. dentur singulis 6. horis  
Tinct. ʒis Ludov. an. ʒj gutt. 25. ad 30.

#### 9 Essentia tonico-nervina.

Rx. Tinct. ʒij. ac. ʒij. M. ter de die gutt. 30. ad 40.  
Spir. C. C. ʒj.

#### 10 Alia subadstringens.

Rx. Tinct. ʒis Ludov. ʒss. dosis ut supra.

#### 11 Emulsio anodyno-temperans.

Rx. Sem. 4. frig. maj. F. l. a. Emulsio cum qua  
Cannab. Emulsione detur pulv. tempe-  
Agn. cast. ana. ʒiss. rans & leniter adstringens sup.  
Hyosc. alb. ʒss. descript. aut pulv. Heurnii qui  
Aq. Millefol. hic est.  
Plantag. ana. ʒiiij.

#### 12 Pulvis Heurnii.

Rx. Corall. rub. præparat. ʒj. Sem. Papav. alb. an. ʒss.  
Lap. Hematit. Hyoscyam. alb. ʒj. M.



VII. *Methodus medendi.*

- 1 Præfente Plethora, Venæfectio instituatur in brachio, emittendo saltem aliquot uncias & alvus aperiatur: in malo enim tam confertim, quam iusto diutius & sæpius infestante, infusa cum epicrafi laxantia, etiam cum vino parata fatis commodam operam præstant.
- 2 Postea dentur remedia orgasmum sanguinis tollentia & æqualem humorum motum producentia, inpr. Nitrofa & Absorbentia acido citri imprægnata: uti Conchæ citratæ, aut solutio Conchar. cum cremore Tartari.
- 3 Deinde progressus fiat ad specifica, imprimis ad Pilul. Beccher. Stahl. & Balsamico-Viscerales, quæ in fluxu Mensium nimio ad iustum moderamen redigendo plus præstant, quam ullum medicamentum.
- 4 Hisce vero deficientibus, dentur remedia orgasmum temperantia & simul leniter adstringentia.
- 5 Aut in casu graviore, ubi impetus sanguinis nimius, magna quoque jam quantitas excreta est, & graviora pericula minatur, exhibeantur positive Adstringentia cum Anodynis v. gr. Crocus ꝑis. ꝑiatius Stahlii ad gr. 4. vel 5. cum MP. de Cynogl. gr. j. vel pulv. Heurnii, cui interponi vel jungi potest E-mulsiō temperans anodyna.
- 6 Sedato hoc modo fluxu dentur Tonica Uterum roborantia & sanguinem ad Uterum consuetis temporibus nimia copia ruentem, discutientia.
- 7 In qualicunque nimio fluxu, præservative plurimum prodest Venæfectio, intermedio tempore & juniore adhuc ætate in brachiis, aut sine ullo scrupulo in pedibus instituta.
- 8 Neque etiam pro diversione affluxus in tali casu contemnendæ sunt Ligaturæ.

VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 Venæfectio in brachio non sit larga, ne nimia ad partes superiores fiat revulsio, & plenaria fluxus sequatur suppressio.
- 2 Purgantia acria & aloetica magis exasperant malum.
- 3 Fluxus Menstruus pariter ac Hæmorrhoidalis nimis promptius plenariam suppressionem, quam aliqualem saltem moderationem admittit.
- 4 Abusus Opiatorum hic utique etiam vitandus, alias, præsertim cum adstringentibus data, modo plenariam suppressionem & Hecticam, aut ad minimum febrem lentam, modo Oedematata, quin Hydropicos tumores invitant. Ubi tamen observandum, quod plenaria fluxus menstrui cohibitio, præter intentionem facta, facilius convenientibus medicamentis corrigi queat, quam Hæmorrhoidum suppressio.
- 5 Cucurbitulæ majores sub mammis non applicentur nisi præmissa Venæfctione: satius tamen est ipsis substituere Ligaturas.
- 6 Diæta, tam fluente sanguine, quam intermedio tempore, probe observetur, ac omnes commotiones animi & corporis vitentur.
- 7 Pariter etiam omnis & inpr. pedum refrigeratio fugiatur.

## CAPUT NONUM.

*De Mensium Defectu.*

I. *Definitio.* **D**efectus Mensium est sanguinis in sexu fœminino juxta Naturæ leges singulis mensibus, ex utero fluentis, vel præter consuetum ordinem, tempore quamvis ordinario in junioribus præfente, emanatio, vel ejusdem ordinarie fluentis tam parcius fluxus, quam totalis obstructio sive suppressio, vel ante consuetum terminum in annosioribus cessatio, a variis causis ortum trahens.

II. *Differentia.*

Defectus fluxus Menstrui triplicem meretur consi-

derationem, quando

- 1 Iusto tardius erumpit, atque ultra tempus solitum, annum scil. 14. imo ad 20. usque aut per totum vitæ tempus emanet.
- 2 Maturius quam par erat, hoc est, ante annum 42. cessat.
- 3 Solito majora intervalla format, h. e. ultra tres septimanas subsistit, aut iusto parcius, vel brevius fluit.

III. *Signa.*

- 1 Nulla conspicua sanguinis, præsentibus etiam ad excretionem tendentibus motibus, elapso decimo quarto anno aut legitimo alias tempore, evacuatio.
- 2 Sanguinis, ultra ordinarium terminum extensa, tardior excretio.
- 3 Mensium in fœminis largum alias fluxum expertis, & simul Plethoricis, nimis parvus fluxus.
- 4 Præmatura ante consuetum terminum cessans sanguinis excretio.
- 5 Plenariæ suppressioni juncta insignis debilitas totiusque corporis gravativa lassitudo, post motum etiam leniores magis increbescens.
- 6 Palpitatio cordis & respirandi difficultas, motum quemcunque, imprimis per acclivia, sive ascensorium, inequens.
- 7 Dolores tensivi & gravativi in lumbis, præcordiorum anxietas, motus turbulenti varii in Hypochondriis & abdomine.
- 8 Appetitus prostratus, vagus, aut major frigidorum & acidorum, quam calidorum appetentia.
- 9 Capitis dolores gravativi & tensorii in quibusdam, in aliis vero lancinantes spasticis aut rheumatici.
- 10 Crebriores motus tonici in corpore mutationes, sive caloris & frigoris alternationes.
- 11 Pulsus inordinatus, modo æqualis, modo inæqualis, celer, tardus &c.
- 12 Excretionem male procedentes, sudores vel nulli, vel multi; alvus modo præter naturam sicca, modo lubrica.
- 13 Urina in quibusdam pallida, turbida, crassa, in aliis flammea; verbo, insignis a naturali statu recessus, & color, consistentia &c. inconstans.
- 14 Somnus vel multus, sed insomniis terrificis sæpius interruptus, vel nullus.
- 15 Tristitia insignis, amor solitudinis, ad lacrymarum profusionem, ob leviozem etiam causam propensio.
- 16 Facies pallida, labia livida, habitus universi corporis respectu coloris & turgescentiæ diversus, pallidus scil. & in quibusdam turgidus, in aliis contractus, cum majori vel minoris vasorum intumescencia.
- 17 Aspectus oculorum tristis, absentia fulgoris eorundem, circulus interdum lividus eo ambiens, intumescencia palpebrarum.
- 18 Dolores variis artuum rheumatici, hinc inde se exerentes.
- 19 Sanguinis consueto Mensium tempore, per loca insolita excretionem.
- 20 Inflationes pedum œdematosæ & abdominis tumor aliquis.
- 21 Tabida vero in aliis corporis consumptio, cum variis Hecticis symptomatibus.
- 22 Fluor albus aut excretio muci, plus vel minus spissi, tempore mensium ordinario vel intermedio.
- 23 Scabies modo sicca, modo humida, utraque vero chronica, & curatu admodum difficilis.
- 24 Convulsionem circa Novilunium aut consuetum Mensium terminum affligentes.
- 25 Morbi varii, præsentibus talibus signis affligentes, admodum anomali & nullum ordinem aut typum servantes.

IV. *Subjctum.*

- 1 Mensium defectus, imminutio, & pedetentim invalescens suppressio familiaris evenit præsertim Plethoricis, spisso tamen sanguine affectis, & mucido lentore feri laborantibus, vitæ sedentariæ deditis, potui parcius assuetis, frigori frequentius



expositis, mœrori, terrori, anxio desiderio, obnoxiis.

2 Repentinam autem oppressionem facile incurrunt, quæ proxime instante, aut jamjam emicante fluxu, largas e partibus superioribus sanguinis emissiones frivole suscipiunt, aut ventriculum emeticis drasticeis, aut assumptis dyspeptis, v. g. placentis pinguioribus & calidis, pane recens ex furno extracto turbant & onerant, ac sub illo ipso fluentium Mensium articulo pedes ac partes inferiores aquæ frigidae immittunt, ibique diutius commorantur.

3 Fœminæ, quibus fluxus Mensium cum phasibus Lunæ conspirat, ita, ut circa Novilunium, vel Plenilunium contingat, illæ plerumque & ordinationem & constantiorem fluxum experiuntur; quibus promiscue sine observatione phasium Lunæ, Menses fluunt, & nunquam satis has certas periodos observant, sed communiter, vel anticipant, vel postponunt, donec magis magisque titubando sensim imminuantur, facile postmodum plenaria suppressione corripuntur.

4 Quibus febres imprudenter per adstringentia febri-fuga supprimuntur, aut Mensibus excedentibus fortiora exhibentur sistunt cum Opiatis juncta.

5 Quæ, præsentem Mensium fluxum ingenti & subitaneo percelluntur terrore, aut etiam ira nimium excandescunt.

#### V. Prognosis.

1 Mensium defectus longe familiarior est, præsentiora quoque & graviora damna infert, quam eorum excessus. Morbi enim muliebres tantum non omnes defectum Mensium aut causam, aut comitem habent.

2 Mensium defectui, multo magis eorundem suppressioni familiarissime succedunt angustiae sub motibus corporis, præsertim ascensoriis, lassitudo artuum, dyspnœa, palpitantes cordis, pathemata hypochondriaca, suffocationes imo Epilepsiæ hystericæ, spasmi artuum, convulsivi affectus, Paralytes Spuriæ, dolores Arthritici, Vertigines Cephalalgiae conrumaces, Hemicraniae, Erysipelata, ulcera crurum Cacoethæa, denique Hæmorrhagiæ effrenes narium, Hæmoptysis, Vomitus cruentus periodicus, Cachexia, Oedemata, quin Hydrops.

3 Quibus fluxus Mensium, admodum præcox emicat, iis quoque maturius cessat, & vice versa: quibus tardius erumpit, iis minus cito desinit.

4 Quæ fluxum menstruum plane non experiuntur, illæ ut plurimum aut sunt steriles aut valetudinariæ.

5 Mensium emanatio aut suppressio lente succedens, tanto periculo non exponit mulieres, ac subitanea Mensium fluentium obstructio.

6 Quo citius Menses cessant, eo maturius etiam fœminæ morbis hypochondriaco-hystericis & cognatis affectibus & podagricis malis, a quibus alias, ob Menses fluentes, immunes erant, exponuntur.

7 Vicariæ evacuationes sanguinis naturales, præmaturæ Mensium cessationi supervenientes, cessantes, aut artificiales, iisdem substitutæ, neglectæ, iisdem malis exponunt ægrotantes, ac plenaria Mensium suppressio.

8 Fluxus Menstruus in annosioribus per aliquot septimanas imo menses suppressus, larga sæpissime compensatur iterum evacuatione per 14 dies imo quandoque tres septimanas durante, non absque incommodis ejusmodi personarum.

#### VI. Remedia.

1 Plethoræ ventilandæ inservit, adeoque nimiae vasorum distensionis, & porro oppletioni succurrit Venæsectio, tempore intermedio, in brachio, instante autem fluxu, in pede instituta.

2 Sanguinem spissorem attenuant, & seri mucositatem resolvunt.

3 Quæ Aperitiva vulgo audiunt, v. g. Rad. Ari, Rub. Tinctor. Curcum. Cichor. Taraxac. Gramin. Herb. fumar. Absinth. Centaur. min. Chamædr. Cuscut. Capill. Ven. Marrub. Abrotan. Gum. Ammon. Galban. Sagapen. & Salia digestiva.

β Pleraque Alexipharmaca & Anticatatarrhalia, v. g. Rad. Angel. Pimpin. alb. Helen. Imperator. Vincetox. Petasit. Levist. Marum Verum, Rosmarinus, Serpillum, Costus verus, Cinnamom. Macis, Sem. Anisi, Fœnicul. Myrrhata, Crocata, Succinata.

3 Specifica virtute Emmenagoga pollere creduntur Flor. Calendul. Cheiri, Herb. Meliss. Puleg. Sabinæ, Rad. Bryon. Borraç Veneta. Ol. ex arillis Cynosbati expressum, Pilul. Beccher. & Balsam. Visceral. Fuligo tum cruda, tum spiritus & oleum ejusdem.

4 Motum ad locum excretionis debitæ invitant Venæsectio in talo, pediluvia, infusus, laxatione per otiduum continuandæ, sive per Pil. Beccher. Stahlian Polychrest. nostras Balsam-Viscerales aut Pil. Polychrestas Emmenagogas Richter, sive per infusum aliquod, ex supradictis aperitivis, cum Senna & Rhabarb. ac Helleb. Nigr. paratum; tandem applicatio Salis volatilis urinosis, ope instrumenti Glauberiani immediate ad uterum; instruendo præprimis horum subsidiorum apparatus, versus tempora consueta & debita hujus excretionis, aut versus extantiores phases Lunæ, scil. Novi-vel Plenilunium.

5 Blandam Venæ Portæ, & vasorum vicinorum stricturam inducunt, hincque expressionem sanguinis per uterum promovent Martialia, temperatiora tamen, neque acidis fortioribus nimis alterata, v. g. Limat. Martis tenerior, Crocus ꝑis cum Sulphure, Crocus ꝑis cum Salibus Stahlian, Essent. ꝑis cum succo pomorum, Essent. ꝑis Helleborat. Wedelii, Tinctura Vitrioli ꝑis Ludovici, ut & Zwolfferi; imo huc etiam faciunt Flor. recent. Acaciæ, nec non Essent. Millefolii.

6 Symptomata graviora, v. g. anxietates, dolores & phlogoses intercurrentes, mitigant Nitrosa cum Cinnabari sociata, certe hoc nomine longe præferenda.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Infusum attenuans & resolvens.

℞. Rad. Rub. tinct.	Sem. Anis. fœnic.
Cichor.	Cort. Aur. Citr.
Gramin. ana. ℥ij.	Cinnam. acut. ana. ℥iss.
Ari. ℥j.	Incis. & contus. gr. m. infund. in Vin. ℔. iij. & sumantur quotidie bis vel ter
Herb. fumar.	Ziv. pro dosi.
Absinth.	
Cent. min. ana mss.	

##### 2 Aliud.

℞. Rad. Bryon.	Puleg. ana. mj.
Angelic.	Flor. Calendul.
Vincetox.	Cheiri ana. p. ij.
Petasit. ana. ℥ij.	Cort. aurant. ℥ss.
Zedoar.	Incis. infund. in Vin. alb.
Ari. ana. ℥j.	℔. iv. dosi ut antea.
Herb. Meliss.	

##### 3 Aliud.

℞. Rad. Helen.	Winteran.
Pimpin. alb.	Cinnam. acut. ana. ℥iss.
Imperator.	Incis. infunde in ℔. iij. vel 4.
Curcum. ana. ℥ij.	Vini & usurpetur ut sup.
Herb. Meliss.	Hiscæ infusus si sol. Senn.
Serpill.	℥j. & Rhab. ℥ij. vel iij.
Rosmar. ana. mss.	adduntur, laxandi vim obinent.
Cort. Aurant. ℥ss.	

##### 4 Essentia emmenagoga.

℞. Essent. Millef. ℥ij.	Myrrh. ℥j.
Succin. ℥ij.	M. dos. 30. 40. gutt. bis de die

##### 5 Alia.

℞. Ess. Millef. ℥ss.	Croc. Or. ℥j.
Succin. ℥ij.	M. dos. ut supra.

##### 6 Pulvis temperans.

℞. Pulv. Antispasm. ℥ij.	quovis die 3. doses.
div. in 6. part. æq. dentur	

##### 7 Essentia tonico-aperiens.

℞. Tinct. Vitriol. ꝑ. Lud. ℥ss.	dosis 40. gutt. mane & vesp.
---------------------------------	------------------------------



## 8 Pilulæ emenagogæ &amp; laxantes.

R. Extract. Card. Ben. Aloes Succotr. ana. ℥j.  
 fumar. Gumm. Heder. 3℥ss. ℥ij.  
 Gumm. Ammon. in Acet. Croc. pulver. gr. xv.  
 Squillit. solut. Elix. P. P. q. s.  
 & inspiss. ana. ℥j. M. f. Pilul. dosi gr. xv.  
 Myrrh. elect.

## 9 Aliæ.

R. Gumm. Heder. Aloes gummos.  
 Junip. ana. 3vj. Myrrh. elect. ana. 3ijss.  
 Extr. Absint. Cent. min. Tereb. Venet. q. s.  
 Card. Ben. Fumar. M. f. Pil. gr. xv. pro dosi ma-  
 Cochlear. ana. 3ijj. ne vel vesperi.  
 enulæ 3j.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Tria potissimum in cura attendenda (1) Plethora, quo magis urget, eo magis ejusdem imminutio reliquæ medicationi præmittenda, (2) debita sanguini fluxilitas concilietur, & viæ expédiantur, (3) tum demum motus ad locum excretorium invitetur, leniter stimuletur, revocetur.
- 2 In Junioribus, infra annum 18. constitutis, sæpe absque Venæsectione, solis aperientibus & leniter stimulantibus adjuta Natura excretionem peragit.
- 3 Ubi vero tam præsentiora incommoda urgent, quam pro commodiore sanguinis spissiusculi attenuatione, necessario præmittenda videtur, ibi etiam non adeo anxie de Venæsectione dubitandum est.
- 4 Antè omnia prudens subordinatio medicationum hic est necessaria, ita ut alterantia & quomodocunque aperientia subjungantur debitis ventilationibus, conjungantur vero modestis commotionibus sanguinis per agiliorem vitæ rationem; stimulantia autem, non nisi his præmissis, & sanguine jam ad exitum disposito, veluti colophonis loco addantur.
- 5 Hinc, si Menses fluant, non rite tamen nec sufficiente copia, aut consistentia debita, tum omnino placidum eorum successum, per lenia stimulantia promovere licebit.
- 6 Cessante vero fluxu, diluentibus potius & aperientibus per totum illud tempus intermedium insistendum, ac non, nisi versus periodum excretionis instantis, ad emmenagoga recurrendum. Inter quæ eminent Myrrhata & crocata, quibus si conamina ad excretionem laboriosa concurrunt; Eff. Millefol. jungi potest. Vide supra in Formulis.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Venæsectio non instituat tempore Novilunii & Plenilunii, ne major Mensium sequatur perturbatio.
- 2 Pellentia & Stimulantia improvide adhibita, h. e. in statu insigniter Plethorico, non præmissa primarum viarum repurgatione & alvi apertione, sanguinis dilutione & attenuatione, familiariter majores obstipationes cum summis angustiis & anxietatibus, aut heteroclitias per loca aliena sanguinis eruptiones, imo. hecticas, aut sane lentas extenuantes febriles, phthisicas, cephalalgicas, spasticas, imo convulsivas, consecutiones, inducunt; in spongiosioribus vero Cachexiam, imo tandem Oedemata post se trahunt.
- 3 Idem quoque tenendum est de Martialibus volatilibus, quæ pariter quantitati sanguinis abundantis & qualitati non satis dilutæ plane non quadrant.
- 4 Vulgata illa opinio in ipsis paroxysmis febrilibus, ut & fluxu menstruo durante, usum remediorum minus fore tutum, error est; siquidem illo ipso tempore exhibita remedia (sed NB. convenientia) longe feliciter atque efficacius operantur, quam extra hanc opportunitatem temporis data.

## CAPUT DECIMUM.

## De Hæmorrhagia Uterina.

I. *Definitio.* Hæmorrhagia Uterina est nimia sanguinis per uterum excretio, vel abortum, vel partum legitimum, vel causas externas aut gravioris animi commotiones in foeminis plethoricis excipiens.

II. *Differentia.*

- 1 Alia sequitur partum præmaturum sive abortum.
- 2 Alia observatur post partum legitimum.
- 3 Alia a causis violentis externis & vaforum ruptura originem trahit.

III. *Signa.*

- 1 Hæmorrhagia abortiva est, quando foeminæ maritatæ post 3. vel quartam Mensium, hætenus subsistentium, periodum, successivam ventris turgescientiam, & alia imprægnationis signa, sanguis ex utero manare incipit, satis quidem leniter & modeste ab initio, instar legitimi fluxus menstrui, (qualem & gravidis citra abortum contingere posse, Observationes docent,) tandem tamen enormi copia ac violentia erumpit, cum insignibus anxietatibus & lipothymicis, imo syncopis deliquis, præcipue post abortum, semel jam, vel iterata vice, & fere circa idem gestationis tempus, factam.
- 2 Aut quando post vehementiorem Animi corporisque motum, v. g. casum ab alto, iram, terrorem, potum æstuosorem, pellentium improvidum usum, statim cum impetu, enormis sanguinis profusio gravidæ evenit.
- 3 Partum legitimum non æque frequenter, ut abortum comitatur, rarius antecedit; non ita raro vero insequitur insignis sanguinis profusio, aut fluxus lochiorum nimius, cum anxius, ut plurimum torminosis & valde dolorificis spasticis in abdomine, & circa Uterum imprimis, sensationibus, idque fere sub tardiore secundinarum successu, aut portionis earundem avulsæ restitutione in Utero.

IV. *Subjectum.*

- 1 Hæmorrhagia talis uterina, tam abortiva, quam partum legitimum comitans, aut insequens, facilius evenit Plethoricis, Cholericis, diætæ vinosæ & aromaticæ addictis.
- 2 Fluxum menstruum largiorem, quin fere nimium, experiri solitis.
- 3 Venæsectionem medio gestationis tempore negligentibus.
- 4 Abortum etiam semel, iterumque passis.
- 5 Atque a puerperio proxime prægresso minus recte expurgantis.
- 6 Ac præterea gravioribus animi affectibus, & inpr. iræ deditis.

V. *Prognosis.*

- 1 In abortu, quo immaturior est conceptus, eo gravior Hæmorrhagia comitatur ejus elisionem.
- 2 Hæc ubi admodum jam invaluit, ante abortus exclusionem peractam, nulla speranda est remissio, nedum cessatio.
- 3 Idem etiam de fluxu Lochiorum nimio sentiendum, ubi secundinæ vel in totum, vel ex parte restitant, scil. nullam, nisi secundinis perfecte excretis, fluxus hujus obtineri posse mitigationem.
- 4 Fluxus lochiorum nimius, imprimis cum impetu erumpens, fonticum certe periculum minatur, & sæpe intra quadrantem horæ puerperam gravissime exhaurit, imo jugulat.
- 5 Lentior etiam, diuturnus tamen, & pariter justo copiosior fluxus, vel gravem Mensium perturbationem, vel sterilitatis, aut certe infeliciores gestationis, periculum inducit.
- 5 Mediocris tamen excessus minoris periculi est, quam notabilis defectus, nedum plenaria suppressio, etiam post fluxum largiorem facta.



VI. *Remedia.*

- 1 Metum ejusmodi Hæmorrh. præoccupant.
  - α Venæsectio medio gestationis tempore administrata, imo si reliquæ circumstantiæ exigere videantur, etiam circa partus instantis tempus repetita.
  - β Blanda laxatio cum Rhabarbaro.
  - γ Decens item post legitimam fœtus & secundinarum exclusionem, ligatura abdominis.
  - δ Quies & tranquilla continentia puerperæ, imprimis abstinencia a temere affectata orthostadia, aut multis fermocinationibus.
- 2 Commotionem sanguinis orgasmicam sedant pulveres absorbentes Nitrosi & Cinnabarini, ter vel quater singulis diebus exhibiti.
- 3 Ipsum sanguinis profluvium cohibent adstringentia, inter quæ tamen mitiora eligantur, v.g. Corallata, Martialia, v.g. Croc. &is Gialis ad gr. 5. 6. aut 7. cum absorbente aliquo, & gr. j. vel iss. MP. de Cynogl. item Tinct. Vitriol. &is Ludovici, potro Spec. de Hyac. trochisci de Carabe, tandem Millefol. sive in forma Essent. sive Infusi, sive Extracti, adhibendum; præ ceteris vero eminent Pulv. Oris tonicus Richteri, & inpr. Pulv. niger Hallens.
- 4 Fluxum ad justam mediocritatem reducant, sine plenaria suppressione, Pilul. Stahlii, in robustioribus etiam Polycrestæ Beccherianæ sed genuinæ.

*Formula Remediorum.*

- 1 Potio temperans & subadstringens.
 

R. Aq. Millefol. ℥iv. M. D. singulis aut duabus  
Pulv. Antispas. ℥ij. horis duo cochlearia.  
Syr. Corall. ℥ss.
- 1 Pulvis anodyno-adstringens.
 

R. Matr. perl. præparat. MP. de Cynogl. gr. iij.  
Corall. rub. præp. ana. ℥ss. M. D. 2. cuspid. cult. singul.  
Spec. de Hyac. ℥j. duab. vel tribus horis.  
Croc. &is Giat. ℥ss.
- 3 Tinctura subadstringens.
 

R. Tinct. Vitriol. &is. ℥ss. dosis 40. 50. gutt. bis de die.
- 4 Essentia Tonico-discutiens.
 

R. Essent. Alexiph. M. D. 30. 40. gutt. bis vel  
Millefol. ana. ℥ij. ter de die.
- 5 Pulvis adstringens.
 

R. Lap. ☉. præparat. Spec. de Hyac. ℥j  
Corall. rubr. præparat. M. D. dosis 2. cuspid. culti  
Troch. de Carab. an. ℥ss. singulis duabus horis.

Reliquæ formulæ videantur supr. de Nimo Mensum Fluxu.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Præservatiouis gratia instituat Venæsectio in brachio, alvus aperiatur, & remedia orgasmum sanguinis præoccupantia, ac æqualem motum ejusdem producentia exhibeantur.
- 2 In ejusmodi casibus, ubi vehemens talis sanguinis ex utero imprægnatis profusio in horas invalescit, & præsentissimum lethalis eventus metum incutit, præprimis, ubi Lipothymia jam prævaluerunt, adeoque nulla fœtus conservandi spes superest, ibi neque otiosum spectatorem esse, neque adstringentibus & roborantibus abortum retardare decet, sed potius ejusmodi exclusio maturanda & promovenda est, quod fieri potest per hepar Anguillæ ad ℥j. in Mixture analeptica datum.
- 3 Secundinis aut laciniis illarum restituantibus exhibeantur vel idem hepar Anguillæ, vel Pilulæ Stahlianæ num. 15. ad 20.
- 4 Abortu excluso & secundinis perfecte excretis, moderamen Hæmorrhagiæ Uterinæ tentetur per remedia temperantia & orgasmum sanguinis sistentia, ac lenia adstringentia ut & ligaturam abdominis.
- 5 Hisce omnibus tamen palmam præcipiunt Pil. Stahlii, quibus tale moderamen facile obtinetur.
- 6 Urgente Hæmorrhagia, & majus periculum minitante, exhibeantur adstringentia & ligaturæ extremorum instituantur. Aut hisce omnibus irritis de-

tur Pulv. niger Hallens. quem uti alias, ita paucis elapsis abhinc diebus, Hæmorrhagiam a concremento uterino oriundam & quidem adeo enormem, ut mortem instantem frigus extremorum, sudores frigidi ac graves lipothymia, indicarent, paucis elapsis momentis sustulisse observavimus; adeo ut post exhibitas adhuc alias duas hujus pulveris doses, ægrota, pro desperata habita, sine ulteriori remediorum usu restituta fuerit. Similem fere efficaciam observavimus in Pulv. Solaribus D. Richteri, cujus quatuor doses gravem, post abortum, Hæmorrhagiam una cum convulsionibus gravissimis brevi tempore supprimebant.

7 Alvo clausa iniciatur clyster emolliens & leniter carminativus.

8 Sedata Hæmorrhagia, discutientia interna, qualis est Mixture Tonica superius descripta, præscribantur.

VIII. *Cautele Practicæ.*

- 1 Adstringentia & roborantia præsentibus signis abortus, nullum habent usum; quamvis enim abortum interdum retardent, facile tamen majori postmodum periculo exponunt mulieres.
- 2 Si partum legitimum impetuosa sanguinis lochialis effusio subsequitur, quamdiu secundinæ, aut laciniæ illarum restitant, irrita sunt omnia conamina aliter subveniendi; medicatio vero per adstrictionem, etiam actu noxia.
- 3 Non inconsultum est, imprimis post abortum, etiam moderamine debito obtento, usum Pilul. Stahlianarum per dies aliquot continuare, ut uterus rite expurgetur, id quod post abortum Natura sibi relicta, raro sufficienter peragit, & hinc novi abortus causa esse potest.
- 4 Adstringentia non nisi summa urgente necessitate exhibeantur, ne suppressio lochiorum, febris acuta, inflammatio uteri, &c. sequantur: quarum tamen periculum, summo studio per temperantia, discutientia & diaphoretica blanda præoccupandum est.
- 5 Post abortum motus moderatus ad æqualem sanguinis distributionem multum confert, nimius tamen facile in novam Hæmorrhagiam uterinam mulieres præcipitat: eundem quoque effectum edunt onerum gestationes.

## CAPUT UNDECIMUM.

*De Lochiorum defectu.*

- I. *Definitio:* Defectus Lochiorum est sanguinis ordinarie post partum ex Utero fluentis, vel parciore excretio, vel præmatura cessatio, vel plenaria & subitanea suppressio a variis causis tam internis, quam externis orta.
- II. *Differentia.*

Alius defectus est.

  - 1 Quando in nimis parca quantitate excernuntur Lochia.
  - 2 Quando ante terminum consuetum cessant.
  - 3 Quando fluentes subito a variis causis supprimuntur.
- III. *Signa.*
  - 1 Parciore Lochiorum in fœminis Plethoricis largum alias mensium, aut in aliis puerperiis Lochiorum fluxum expertis, excretio.
  - 2 Nimis præmatura ante consuetum terminum cessatio. Fluxus enim Lochiorum legitimus vix intra 14. dies penitus cessat, non quod toto hoc tempore sanguis fluat, rarius enim fluxus septimum diem transit, sed post sincerum sanguinis fluxum ichor, magis magisque pallescens, tandem quantitate quoque indies decrescens plane definit.
  - 3 Aut sanguinis debito modo fluentis subitanea suppressio.
  - 4 Anxietates cum variis spasmodicis & torminibus abdominis.



- 5 Abdomen tumen, tensum & durum.  
6 Dolor gravativus, tensivus, lancinans, cum sensu ardoris & pulsationis infimum ventrem & imprimis lumbos & inguina occupans.

IV. *Subiectum.*

- 1 Imminutionem, quin omnimodam suppressionem Lochiorum facile incurrunt fœminæ Plethoricæ, mœrori, timori, terrori valde obnoxie, refrigerium incaute admittentes.  
2 Inordinatum alias Mensium fluxum expertæ, aut ad Mensium suppressionem pronæ.  
3 Spissitudinæ sanguinis, ob vitam sedentariam, aut Venæsectiones tempore graviditatis intermissas, laborantes.

V. *Prognosis.*

- 1 Lochiorum malus successus, si non semper in præfenti, in posterum tamen certissimum creat periculum.  
2 Eo facilius autem graviora sequuntur incommoda, si Lochiorum fluxus subito suppressus fuerit.  
3 Suppressio Lochiorum sæpiissime est causa febrium acutarum & purpuratarum, aut etiam inflammationum, cum summis anxietatibus, respirandi difficultate, animi deliquiis, sudationibus frigidis, deliriis, &c.  
4 Nulla est Hæmorrhagia suppressa, quam tam certe fontica excipiunt mala, nisi forsancum vulnere sensibilioris partis conjuncta, quam Lochiorum suppressio.  
5 Lochiorum defectus in posterum fœcunditatem & feliciorem conceptionem ac gestationem non parum turbat, & stabiles inflationes abdominis, ac varios spasticos hypochondriaco-hystericos affectus post se trahit.

VI. *Remedia.*

- 1 Debitum Lochiorum successum promovent & conservant. Crocata, v. g. Crocus in cibis, parcissime tamen ad levem fusculationem tincturam usurpatus; item Essent. Croci saturatior, sed itidem moderatissimis dosibus, ad pauculas guttulas cum aliis adhibenda.  
2 Fluxum nimis parcum stimulant Myrrha, imprimis ejusdem Essentia aliis juncta.  
3 Febriles exæstuationes præoccupant pulveres leniter diapnoici, ex Oc.  $\mathfrak{z}$ . vel Matr. perl. p. iij. &  $\mathfrak{z}$ . diaph. p. ij.  
4 Præsentès exæstuationes febriles temperat Nitrum, pulveribus Diaphoreticis in minori dosi additum.  
5 Idem etiam Nitrum Diarrhœas puerperis alioquin formidabiles præoccupat, & præsentès mitigat.  
6 Pilulæ Beccherianæ aut Stahlianæ nec non nostræ Balsamico-viscerales hoc in casu, cuicumque uti vel integrum, vel libitum fuerit, omnibus aliis palmam præripiunt, & hinc commode cæteris stimulantibus & pellentibus, utpote minus fidis minusque tutis supersedere possumus.

*Formula Remediorum.*

## 1 Essentia aperiens.

Rx. Ess. Scordii per Sp. Vin. extrahi poterit  $\mathfrak{z}$ ij.  
rectif. paratæ  $\mathfrak{z}$ j. Croci  $\mathfrak{z}$ j. M. dos.  
Pimpin. alb. quæ gutt. 35. bis vel ter de  
cum Spir. Vin. debiliori die.

## 2 Alia aperiens &amp; pellens.

Rx. Essent. Pimp. alb.  $\mathfrak{z}$ ij. Croci  $\mathfrak{z}$ j.  
Myrrh. M. dos. ut supra.  
Scord. ana.  $\mathfrak{z}$ j.

## 3 Pulvis diapnoicius.

Rx. Matr. perl. præparat.  $\mathfrak{z}$ j. Cinab.  $\mathfrak{z}$ ij  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\mathfrak{z}$  diaph.  $\mathfrak{z}$ j. M. div. in V. part. æq.

## 4 Alius diapnoico-temperans.

Rx. Conch. præp.  $\mathfrak{z}$ j. M. dos. 2. cusp. cultri singulis 4. horis.  
 $\mathfrak{z}$ . diaph.  $\mathfrak{z}$ j.  
Nitr. depur.  $\mathfrak{z}$ ss.

## 5 Pilulæ aperientes.

Rx. Pil. Stablii  $\mathfrak{z}$ j. aut urgente necessitate bis  
dos. 15. vel 20. semel per diem.

## 6 Potio aperitiva.

Rx. Aq. meliss.  $\mathfrak{z}$ iv. Sir. cort.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
Pil. Polychr.  $\mathfrak{z}$ j. dos. singul. duab. hor. cochl. ij.

VII. *Methodus m. dendi.*

- 1 Urgente Plethora instituatur Venæsectio in pede & quidem statim in principio.  
2 Dentur postea Mixturæ solventis & leniter stimulantis mane & a meridie guttæ 35. vesperti vero dosis pulveris diapnoici.  
3 Præsentè sanguinis orgasmo, aut estu febrili, singulis quatuor horis aut ter de die exhibeatur dosis pulveris temperantis diapnoici.  
4 Cui interponantur lenia Alexipharmaca, sed parcissimis & moderatis dosibus, conjuncto regimine modestissime diaphoretico.  
5 Alvus obstructa referetur per Clysteres emollientes oleosos & leniter carminativos, cui scopo etiam Pil. Beccher. veræ & Stahlianæ aut Polychrestæ, Hall. aliis simul indicationibus satisfaciunt, inserviunt.

VIII. *Cautelæ Praticæ.*

- 1 Quando Lochia intempestive subsistunt, aut plane supprimuntur, nihil magis cavendum, quam ne illorum revocationi opera impendatur per calidiora Castoracea, Myrrhata, Aloetica, Uterina, copiosius ingesta, Vel enim obstructio augetur, & febres inter gravia abdominis pathemata provocantur; vel Lochiis etiam denuo erumpentibus, inflammatio uteri & febres perdurant.  
2 Præstat potius orgasmum sanguinis temperare & cohibere absorbentibus, diapnoicis ac cinnabarinis, æstuosos vero impetus etiam Nitratis, adeoque incommodis potius ex Lochiorum suppressione metuendis præoccupandis, quam fluxui directe revocando operam dare, præsertim si jam ultra  $\nu\chi$   $\mathfrak{z}$ ij.  $\mu\sigma\sigma\omega\nu$  substituerit.  
3 Regimen sudatorium febrem magis auget, cum reliquis symptomatibus, & hinc fugiendum est.  
4 Abstinentum quoque est ab omnibus irritationibus ad evacuationes, imprimis per alvum, unde omnia purgantia, alias in Mensium provocatione usu non carentia, actu hic sunt noxia.  
5 Opiata, ad sedanda tormina colica & spasticos infimi ventris affectus corrigendos, quibusdam usualia, majorem causantur Lochiorum suppressionem, & hinc morbum augent.

## CAPUT DUODECIMUM.

*De Mictu Cruento.*

I. *Definitio.* **M**ictus cruentus est sanguinis ex venis renum vel vicinarum partium erumpentis cum urina excretio, & præternaturali vasorum illorum apertura (per motum tonicum autiorem, producta) originem trahens.

II. *Differentia.*

Mictus cruentus verus, a renum vasis emulgentibus proveniens, differt.

- 1 a Mictu cruento vesicæ.  
2 Ab Hæmorrhoidibus vesicæ, de quibus vide Histor. Morbor. Uratislav. T. I. pag. 283.  
3 A Mictu sanguinis ex varicibus proveniente vid. ibid.  
4 A mictu cruento Nephriticorum a calculo asperiore, renes lædente, oriundo.

III. *Signa.*

- 1 *Imminentis:* Mictus cruenti signa adeo evidentia non dantur, præter levem tensionem & gravitatem lumborum, aut fatigationem totius corporis: tacite enim plerumque cooritur. Quo vero magis sensibilis dolor conjunctus est, eo justior de Calculi præsentia & concursu suspicio subest.  
2 Præcedit interdum in quibusdam dolor fixus & acerbis; vel etiam dolor circa Ilia & inguina gravativus percipitur; interdum horrendus dolor circa pubem præcedere solet cruentæ mictioni, dum sanguis



guis contumatus stagnans in ureterum ductu obliquo circa introitum vesicæ distensionem dolorificam parit. vid. Hoffm. Dissert. de Hæmorrhag. p. 19.

3 *Præsentis* signum evidentissimum est ipsa urina non solum cruenta, aut sanguine imbuta, sed larga sæpe quantitate liquidi sanguinis remixta, cui sensim coagulascenti, & fundum petenti deinde supernat clara.

4 Interdum tamen sanguis jamjam congrumatus cum urinam excernitur, & quidem formam vermis alicujus referens, crassitiem vero calami scriptorii æquans, qui procul dubio in ureteribus ita concrevit.

5 Hæmorrhoidum Vesicæ signa sunt juxta Aurel. pag. 153. cum non coacervata primo fit effusio, sed augmentis quibusdam promota, interjectis defectionibus: quando retento sanguine dolor pubetenus vexat ac inguina & clunes (i.e. illa ac forte testes) tenduntur, effluente autem iterum sanguine, symptomata hæc omnia cessant.

6 Eo certius autem sanguinem ex Hæmorrhoidibus provenire, concludere licet, si fluxus Hæmorrhoidum consuetus antea fuerit suppressus, lapilli nunquam antea excreti, nec ulla ruptorum vasorum indicia præsto fuerint, & tandem si ejusmodi fluxus periodos statas servaverit. vid. Histor. Morb. Uratisl. pag. 283. & seqq.

7 Si vero ex ipsa vesica vel urethra miætus cruentus originem trahit, non sine dolore & ardore urina cruenta emittitur, & simul ichore vel pure sanguis ille mixtus est.

#### IV. *Subjectum.*

1 Familiarior est sexui Virili, quam fœminino.

2 Floridiori ætati admodum raro obtingit, nisi violentia calculi asperioris, vel impetuose abrupti, sublit, aut casus ab alto, Cantharidum improvidus usus, abusus fortiorum diureticorum simileque causæ externæ præcesserint.

3 Spontaneo autem magis exortu evenit senioribus, Plethoricis tamen, & alias floridiore habitu instructis.

4 Succedit tamen satis sæpe Hæmorrhoidum alias consuetarum emanationi, sub diætâ interim vinosa & iracundia familiari, concurrente itidem motu corporis succussatorio per equitationem vel vecturam, nec abusu rei venereæ.

#### V. *Prognosis.*

1 Effectus hujus evacuationis nullo modo est utilis, quin præponderent incommoda, imo pericula vere fontica.

2 Est enim hoc malum ita obstinatum, ut, nisi maxime tempestive iterum mitescat, & quidem cum vicariæ ventilationis sanguinis prudente subordinatione, contumacissimum & sensibillissimum sese gerat, tum ad irregulares erumpendi, tum emanendi, excessus propendens.

3 Qui in Miætum talem cruentum devolvunt senes, vix diu supervivunt, nisi quidem admodum commode, atque libere hic fluxus ipsis succedat.

4 Repente si cohibeatur Miætus cruentus, præsertim affluens, variorum spasticorum, aut tabidorum affectuum pericula omnino fontica succedunt: imo, uti in pulmonibus ab Hæmoptysi, immediate solum adstringendo oppressa, ulcerationes remanere solent, ita a Miætu cruento repente constricto facile ulcerationes renum oriuntur, aut loco sinceri sanguinis post hac mucum subcruentum cum urina effundunt: quam mucii excretionem suppressam postmodum facile mors non sine præcedentibus variis anxiiis pathematibus sequitur, quod aliquoties observavimus.

5 Hæmorrhoides vesicæ tanti periculi non sunt, ac Miætus cruentus ex renibus aut vesica originem trahens.

6 Quamvis interdum insignis sanguinis copia in Miætu cruento excernatur, non tantum tamen a sanguine manente imminet vitæ periculum, quantum in aliis Hæmorrhagiis.

7 Uti narium Hæmorrhagia a causis violentis primo

producta, facile postmodum spontanea redditur, & in consuetudinem abit, ita & Miætus cruentus.

8 Miætus cruentus a calculo in junioribus ortus, facilius curationem admittit, quam Miætus cruentus spontaneos in senilibus.

9 Urina cruenta in Variolis & Morbillis, Petechiis, Peste, magnum prænuntiat periculum Hoffm. loc. cit.

10 Criticum & salutarem fuisse Miætum cruentum in vetula, pectoris oppressione & gravibus incommodis circa abdominis viscera afflictâ observavit Hoffmannus loc. cit.

#### VI. *Remedia.*

1 Venæsectio revulsoria, etiam paulo largior, in superioribus, scil. manu, vel brachio instituta, Hirudines item ano applicatæ.

2 Temperantia & orgasmum sanguinis sedantia: Pulv. Nitrosi, Cinnabarini, cum MP. de Cynogl. Coral- lia &c.

3 Adstringentia: Succus Urticæ & decoct. Equiseti. vid. Observ. Uratisl. pag. 384. Sang. Dracon. Hirci. Spec. de Hyac. Crocus &is Aperit Zwolff. aut &iat Stahjii, Tinct. Vit. &is Ludovici, Tinct. Terr. Catechu, Troch. de Carabe, ut & Tinct. Opii Langelotti, Vitriolum e minera &is Hassiaca cum aqua pluviali extractum, atque a magmate, quod ultimo restat, difficulter crystallisabili, & summe austero, crystallizando segregatum, ac denuo in aqua resolutum, atque in forma liquida, ad Zij. pro dosi propinatum.

4 Topica: Unguent. Comitissæ, Infrigid. Galeni, Emplastr. Saponat. Barbetti, abstinendo tamen a Camphora.

5 Balsamica: Gumm. Mastich. & Junip. abstinendo ab acrioribus. imo ipso Balsamo Peruviano, substituendo potius ea, quæ alias pulmonum exulcerationi destinantur, scil. Herb. Hederæ Terr. Alchimill. Sanicul. Pentaphyll. Vincæ pervinc. Hyperic. imprimis, vero Virgam Auream Gesneri.

6 Clysteres & lenia laxantia ex Rhabarbaro, item Serum lactis tamarindinatum &c.

7 Alexipharmaca, post sedatum unum & alterum paroxysmum, æqualem sanguinis circulum promoventia.

#### *Formulae Remediorum.*

##### 1 Pulvis temperans.

R. Pulv. Antispasm. Zij. tribus heris.  
div. in 6. p. æq. dosi sing.

##### 2 Alius.

R. Nitr. depur. Cinnab. &ij. gr. xviii.  
Lap. &c. ana. Zij. M. div. in 6. p. æq. ut antea

##### 3 Pulvis subadstringens & anodynus.

R. Nitr. depur. MP. de Cynogl. gr. iij.  
Corall. r. præp. ana. &ls. M. div. in 3. q. æq. detur do-  
Spec. de Hyac. gr. xij. sis singulis 6. vel 8. hor.  
Cinab. &ij. ana. gr. xv.

##### 4 Alius adstringens & anodynus.

R. C. C. ust. MP. de Cynogl. gr. ij.  
Corall. r. præp. ana. &ij. M. div. in 3. p. æq. dosi sing.  
Spec. de Hyac. gr. xij. 4. aut. 6. h. ris.  
Croc. &is &iat. gr. vj.

##### 5 Potio anodyno-adstringens.

R. Aq. Millefol. Sang. Hirc. &ij.  
Plantag. Laud. Op. gr. ij.  
Equiset. ana. &ij. Syr. Myrtin. &ls.  
Acet. destill. &ls. M. cochleatim sumenda.  
Corall. r. præparat. &ij.

##### 6 Decoctum adstringens.

R. Decoct. Equiset. &vj. M. detur cochleatim.  
Succ. Urtic. min. &ij.

##### 7 Emulsio anodyno-adstringens.

R. Sem. 4. frig. maj. an. &ls. Millefol. ana. &ij.  
Papav. alb. &ij. f. l. a. Emulsio adde  
Aq. Urticæ. C. C. ust. &ij. M.



8 Infusum adstringens.

R. Herb. Heder. Terr. Incis. detur ad Ch.  
 Vinc. per Vinc. Usurpetur ut infusum Thee:  
 Virg. Aur. ana. mj.

9 Decoctum adstringens:

R. Herb. Veron. Colatur. adde  
 Equiset. Syr. de Sympb.  
 Virg. Aur. ana. mj. e Ros. sicc. ana. ℥iss.  
 Rad. Sympbit. ℥j. M. dos. ℥iij. sing. 4. hor.  
 Coq; in aq. simpl. ℥. ij. iij

10 Essentia subadstringens.

R. Tinct. Vit. & is Lud. ℥ss dos. 40 gutt. 2. l. ter de die.

11 Tinctura tonico-nervina.

R. Tinct. ℥ij. acris ℥ij. dos. gutt. 30. bis per diem.  
 Spir. CC. ℥j. M.

12 Essent. tonico-discutiens.

R. Ess. Pimp. alb. Spir. C. C. ℥j. M.  
 Tinct. ℥ij acris an. ℥iss dosis ut supra.

13 Pilulæ laxantes.

R. Pil. Stahlian ℥j. ad aperiendam alvum.  
 dos. xv. pro dosi.

14 Potio laxans.

R. Seri Lact. ℥vj. Coque. Colat. d. ad. Vit.  
 Tamarind. ℥iss. pro una vice.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Mictus cruentus nullo modo tolerandus est, ut asuescat, fontifica enim minatur pericula, hinc omnino sistendus est.
- 2 Id ipsum tamen moderate fiat, præmissis, si nondum ipso fluxu sufficiens sanguinis copia evacuata fuerit, Venæsectione revulsoria, & orgasmum sanguinis universalem sedantibus, Nitrosis & Cinnabarinis, subjuncta quoque in assuetis, aut manifesto plethoricis, Venæsect. præservatoria in pede, tempore intercalari administrata.
- 3 Commodissime blanda ejusmodi cohibitio præstatur per supra laudatum medicamentum Martiale in aqua solutum, atque ad ℥j. successivis dosibus propinatum; eidem fini inserviunt supra descripta infusa, ac pulveres adstringentes, ut & Tinct. & is Ludov. ac Tinct. Terr. Catechu.
- 4 Alvum semper expeditam esse convenit, id quod optime per Clysteres & decoctum fericum Tamarindis & infusa laxantia Rhabarbariana, ut & per Pilulas Stahlianas obtinetur.
- 5 Præsente ardore & æstu exhibeantur Emulsiones temperantes & anodynæ, quibus adhuc amygdalæ dulces addi possunt. Eundem usum habet oleum amygd. dulc. cum Sperm. Ceti. Item Decoct. Nephrit. Foresti, imprimis si a calculis Mictus cruentus dependet.
- 6 Si Mictus talis ortus est a remediis fortioribus, stimulantibus, Cantharidibus &c. præter supra laudata temperantia conveniunt lacticia, cremor nordei &c. in copia assumpta.
- 7 In Mictu cruento pulveribus temperantibus addatur sanguis Hirci, aut supra descripta potio num. 5. usurpetur.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Omnia adstringentia fortiora & narcotica incaute usurpata, multorum malorum sunt causæ, inflammationis scilicet & ulceris Renum, Vesicæ &c. quare semper mitiora illis præferantur.
- 2 Balsamica acria & fortiora, uti Balsam. Peruv. de Copaiba, ut & Terebinthinata ac succinata, aliæque hujus generis magis nocent & malum exasperant.
- 3 Tinctura antinephritica Rothii Lipsiensis in calculo sæpius Mictum cruentum producit, id quod etiam præstat Balsamum Augustanum dictum, quare eorum usus dissuadendus est, aut si in usum trahi debent, summa id fiat cum prudentia.
- 4 Præsente dispositione ad Mictum cruentum vitetur equitatio, vectura, motus nimius, Venus, Diæta aromatica, Vini abusus &c.
- 5 Mictus cruentus criticus, utpote salutaris, non supprimatur. vid. Hoffm. loc. cit. & Ettmuller. Tom. II. pag. 720.
- 6 Si alvus per alia laxantia & clysteres expediti potest, Pilulæ Polychrestæ aut aliæ his similes non facile in

usum trahantur, nisi Plethora imminuta & orgasmus sedatus fuerit.

## CAPUT XIII.

## De Hæmorrhagiis Passivis.

I. *Definitio.* Hæmorrhagiæ passivæ sunt excretiones sanguinis præternaturales a vasis sanguiferis, propter causas violentas, vel disruptis, vel dissectis, originem trahentes.

II. *Differentia.*

- 1 Aliæ magis immediate e vasis capacioribus imprimis arteriosis dissectis, aliæ mediate magis e partibus porosis prorumpunt.
- 2 Aliæ nudo passivo affluxui ortum debent: aliæ cum activo simul appulsu & affluxu conjunctæ sunt: Illæ in vulnere recentiore, hæ in progressu demum circa quartum diem eveniunt.
- 3 Aliæ excipiunt evulsionem dentium, & sæpius factis sunt enormes.
- 4 Aliæ junguntur carni luxurianti seu fungo in vulnere & ulceribus male tractatis nato, aut ejusdem extirpationem per septica junguntur.
- 5 Aliæ nonnunquam observantur in mammis aliisque partibus cancris, per vices redeunt, sæpius quoque diu continuantes, ita ut nullis fere remediis curari queant.

III. *Signa.*

Sanguis arteriosus ut plurimum cum subsultu, cum pulsu arteriarum coincidente, prorumpit, venosus vero placide profluit. Ille faciem præ se fert tenuiorem & floridiorem, hic vero paulo obscuriorem.

IV. *Subjectum.*

- 1 Omnis generis, cujuscunque ætatis & sexus homines, sanguinei tamen Plethorici majorem patiuntur Hæmorrhagiam, quam cholericis, nisi vasa ampliora dissecta sint, illi enim plus sanguinis in poris, hi in vasis habent.
- 2 Carni luxurianti & exinde proveniente Hæmorrhagiæ magis obnoxii sunt homines temperamenti humidi, quam sicci.
- 3 Hæmorrhagiam dentium majorem facilius experiuntur homines sanguinis congestionibus versus caput obnoxii, quam alii.

V. *Prognosis.*

- 1 Hæmorrhagiæ, quæ vulneribus corpori Plethorico, aut homini, in ipso ebrietatis, vel excandescentiæ actu constituto, infligitis superveniunt, si repente & violenter per adstringentia & sanguinem coagulantia reprimantur, plerumque tumores & inflammationes partis læsæ, imo febres vulnerarias, interdum satis æstuosas, post se trahunt, aut majori cum impetu, circa statum recrudescunt.
- 2 Quo justo tardius autem Hæmorrhagiæ compescuntur, eo magis virium lapsus & Lipothymix expectandæ sunt, præsertim si enormes fuerint.
- 3 Post immodicas plane sanguinis per partes vulneratas & vasa disiecta profusiones, universo corpori cachectica dispositio, vulneratæ vero parti insignis debilitas, tumor œdematosus, aut contra aridura imminet.
- 4 Homines Plethorici, vinosi, iracundi, Hæmorrhagias largas a vulneribus passi, plerumque anniversario tempore, vel circa ipsa loca affecta, vel circa loca Hæmorrhagiis aliis dicata, spasticos, tumefcentes, inflammatorios, quin febriles affectus, qui alias evacuationes sanguinis consuetas suppressas subsequi solent, incurrunt, nisi vel actuali evacuatione artificiali, vel matura talium commotionum præoccupatione Pharmaceutica iis occurratur.
- 5 Hæmorrhagiæ ex arteriis dissectis ortum trahentes majoris semper periculi sunt, quam quæ e venis originem ducunt, imprimis si majores fuerint.
- 6 Eo majori autem periculo exponunt vulneratos, si e vasis viscerum dissectorum aut læsorum prodit Hæmorrhagia.



- 7 Hæmorrhagiæ partium cancroriarum, si non summum, huic tamen proximum indicant cancri gradum, & hinc summe periculosa sunt.
- 8 Hæmorrhagiæ dentium per adstringentia incaute suppressa, imprimis si in maxilla inferiori fuerit, facile inflammationem & exulcerationem gingivarum, cum maxillæ carie post se trahit.
- 9 Quo magis dolet caro luxurians, eo facilius est metuenda Hæmorrhagiæ, quæ etiam facillime sequitur usum causticorum, quæ simul sanguinem non coagulant.

## VI. Remedia.

- 1 Venæsectio revulsoria, compressiones & strictiones partium vulneratarum, aut ipsorum vasorum discissorum Ligaturæ interceptoriæ, vel materiales obturationes.
- 2 Vasorum discissorum majorum Cauterisatio.
- 3 Partis vulneratæ, in recens macerati animalis adhuc calentis corpus, immersio.
- 4 Sanguinem erumpentem coagulantia, partesque poroas constringentia, & obturantia: Sp. Vin. rectificatissimus, Ol. Terebinth. æthereum, Acida concentrata, Solutio Aluminis, Vitrioli, Colcothar ejusdem, Medulla crepitus Lupi, Farina volatilis, Pulvis ranarum exsiccatarum, & Albumen ovi siccatum & pulverisatum, fuligo pulveris. Lap. hæmatit. pulveris. Rad. Symphyt. maj. cancri combusti pulverisati, Telæ araneæ, Folia vitis sicca &c. Ex compositis celebris est liquor stypticus Boudeti, cujus mentio fit in Act. Hafnienf. Vol. II. Obs. 41. item 133. nec non Vol. III. Obs. 45. Item liquor stypticus Soc. Reg. Angl. in Officina Chymica Staphorstii descriptus; porro liquor stypticus Weberi, peculiari tractatulo, Anchora Sauciatorum inscriptio, commendatus, tandem Pulvis Ischmæus Hildani & Barbette.

## Formula Remediorum.

## 1 Liquor Stypticus weberi.

R. Vitrioli Hungar. Alumn. ana. ℥ss. Phlegmatis Vitrioli ℥. iv. Coque tandem donec omnia dissoluta fuerint: liquorem frigescentem filtra, & a crystallis subinde natis separa, adde singulæ libræ. Ol. Vitriol. ℥j. & serva pro usu. Linteamina quintuplicia liquore hoc styptico probe humectata, vulnere, vel orificio arteriæ vel trunco membri extirpati, superimponere cum adæquata ligatura, & videbis sanguinem in momento congelatum. Linteamina per aliquot dies superimposita relinque, ne crusta sanguinis, vel sanguis incrustatus simul detrahatur & sanguini via aperiatur, & vulnus nullo alio amplius adhibito remedio perfecte sanatum reperies.

2 Aqua Arterialis Caroli Mustani, experta in arteriarum vulneribus cujuscunque conditionis.

R. Colcothar Vitrioli, Alum. ust. Sacch. Cand. ana. ℥ss. Urina junior. homin. Aq. rosar. ana. ℥ss. Aq. Plantag. ℥ij. Diu simul omnia agitentur in mortario, postea phiolæ vitreæ committantur. Tempore usus liquor decantetur, & mediante linteo eidem imbuto, parti vulneratæ applicetur, manu simul imposita, ut eo citius sistatur.

## 3 Pulvis Stypticus Ejusd.

R. Sang. ovill. exsicc. ℥v. Gum. tragac. ana. ℥j. Croci & lis subtiliss. F. Ex omnibus pulvis impalpabilis probe invicem mixtus

## 4 Alius ejusd. Auctoris.

R. Pulv. rad. symph. maj. ℥ij. Cancr. combust. ℥vj. Vitriol. alb. crud. Gypsi ℥j. Sarcocoll. ana. ℥ss. Terr. sigill. ℥iiss. Croc. & lis. Lapid. hæmat. præp. ℥iss. Fulig. Cam. ana. ℥ij. Sang. Drac. ℥ij. M. f. Pulv. sub.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Hæmorrhagiæ, ni presentissimi periculi metus contrarium suadeat, quin urgeat, ab initio aliquatenus indulgeatur.
- 2 Quodsi vero vas capacius arteriosum læsum, adeoque periculum in mora fuerit, quantocunq; & quibuscunque remediis eadem reprimatur, sive interceptione &

ligatura, sive cauterisatione, sive sanguinis erumpentis coagulatione.

- 3 Compressio digitis facta egregium sepe fert auxilium, præsertim in iis casibus, ubi vas sauciatus non admodum profunde delitescit.
- 4 Quodsi Hæmorrhagiæ, ex arteria non plane discissa erumpens, pertinaciter quoque sæpius recrudescens alia subsidia eludat, transversim penitus dissecetur, & extremitas superior cauterio tangatur.
- 5 Tumor partis vulneratæ, aut febris vulneraria si repentinè sanguinis restrictioni superveniat, aut ipsa Hæmorrhagiæ circa statum cum violentia insigni recrudescat, Venæsectione revulsoria in parte opposita, internis antifebrilibus, & externis camphoratis, opus est.
- 6 Factæ nimie profusionis damnis per Analeptica, dietam restaurantem, vini generosioris usum medicum, partisque læsæ per nervino-balsamica externa roborationem, succurritur.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Compressiones & strictiones fortiores partis vulneratæ non sint nimis fortes, ne exinde oriatur inflammatio.
- 2 Pars vulnerata semper calida servanda est, & ambiens frigus evitandum, præstat etiam emplastro stictico vulnus munitum semper conservare.
- 3 Cauterisatio sæpius infidum est remedium, quare remedia fida sanguinem sistencia eidem sunt præferenda.
- 4 Cauterisatio in partibus tendinosis summo studio est fugienda, ne partium motus per eandem lædatur.
- 5 Liquoribus stypticis non semper est fidendum, quoniam interdum magis nocent quam prosunt. vide Act. Hafn. Vol. III. Obs. 45.
- 6 Styptica in Hæmorrhagiis partium cancroriarum fugiantur, quoniam malum exasperant.
- 7 In vulneribus circa juncturas & partes tendinosas, acida pro sanguine sistendo non conveniunt, rectius officio suo tum fungetur Ol. Terebinth. æthereum cum Spiritu Vini Rectificatissimo mixtum.
- 8 Ideoque etiam ipsum Vitriolum album ad albedinem calcinatum, quoquo modo applicatum, in hoc casu haud convenit, ob periculosa, quæ exinde sequi possunt symptomata.
- 9 In Varicum apertione admodum caute etiam in restrictione sanguinis procedendum est, alias facillime majora insequuntur mala.

## LIBER II.

## DE

## CONGESTIONIBUS

## EORUMQUE EFFECTIBUS.

## De Congestionibus in genere.

- I. Definitio. **C**ongestiones sunt compressiones (convulsiones) activæ partium, mediante motu tonico, quibus sanguis, & cum hoc reliqui humores versus & in certa loca restringuntur & recipiuntur, copiosioris secretionis, vel hæmorrhagicæ perruptionis gratia. Vel adhuc brevius: Sunt restrictiones & detentiones sanguinis, versus & in loca, hæmorrhagiis destinata. Accidunt circa caput, nares, fauces, pectus, ventriculum, renes, intestinum rectum, & occurrunt circa ventriculum, sive circa Venam portæ.

## II. Differentia.

- 1 Ratione effectus, vel sunt *Completæ*, quæ tali in loco contingunt, ubi actualis perruptio sanguinis sperari potest, v.g. in Naribus, Ventriculo, Vasis Hæmorrhoidalibus, Pulmonibus, Utero &c. Vel *Incompletæ*, quæ in locis, a viis hæmorrhagicis remotis, a Natura fiunt, v. in Scapulis, Dorso, Lumbis, Pedibus &c.
- 2 Ratione loci diriguntur vel  
a ad Caput: unde Cephalalgicæ cum rubore faciei, & infla-



inflatione vasorum circa tempora, Ophthalmiæ & dolores compunctorii quasi in intimo meditullio bulbi oculi, cum inflatione exilissimorum vasculorum sanguiferorum, imo actuali bulbi protuberantia, Otagiæ, & Anginæ, Aphthæ, affectus deliriosi & comatosi (quo in casu jam Antiquiores raptum humorum ad caput accusarunt,) circa dies criticos, cum urina tenui & pauca, Epilepsiæ juniorum cum vehementibus oculorum torsionibus, Apoplexia sanguinea, Vertigo, profundiori capitis ad terram inclinationi, aut pedum vel præcordiorum refrigerationi superveniens, Memoriam debilitas.

b Ad *Pectus*: quas Angustia, respirationes oppletivæ, Asthmata convulsiva periodica sequuntur.

c Circa *Hypochondria*: unde dolores Cardialgici, tensorii, lancinantes, vomibundæ torsiones ventriculi, quin universa pathematum Hypochondriaco-Hæmorrhoidalium scena, imprimis alvi non tam simplex siccitas, quam actualis strictura, sensibiliores tales exacerbationes vel antecedens, vel comitans.

d Ad *Renes & Hæmorrhoides*: unde Varices crurum, variaque Nephritica, Ischiadica, & Podagrica præludia.

### III. Signa.

a In parte affecta, occurrit hujus (1) infarctus, (2) inflatio & distensio vasorum, ita ut exilissima visumque alias fugientia vascula in conspectum prodeant, (3) augmentum caloris & coloris naturalis, (4) dolor quandoque gravativus, quandoque tensivus & punctorius, arteriarum pulsui respondens, (5) partis ita laborantis ad motum ineptitudo.

b In partibus remotioribus vero aut oppositis occurrit spastica quædam strictura & aspectu quasi exsanguis & exsuccus, major etiam frigoris sensibilitas, aut actualis harum partium refrigeratio.

### IV. Subjectum.

Congestionibus fere cujuslibet ætatis & temperamenti homines expositi sunt, magistamen ad eas proni sunt Plethorici & vitæ sedentariæ, lautæ & vinosæ diætæ dediti, evacuationibus sanguinis five artificialibus five spontaneis assueti. Non tamen quævis ætas ad quasvis congestiones prona est, sed his tantum, quæ ab Hæmorrhagiis cuiusvis ætati competentibus dependent, plerumque exponitur.

### V. Prognosis.

1 Congestionibus facile complicantur & succedunt tumores, dolores, inflammationes, ulcerationes manantes, stupores & debilitates paralytodes partium.

2 Quo magis hujus generis affectus assuefiunt, eo promptius etiam, citra materialis, aut occasionalis causæ veram proportionem, facile recrudescunt, crebrius insultant, diutius continuant; imo veluti in jugem habitum transmigrant. Idque tanto certius, si diætæ præpostera, animi turbulentis commotionibus, medicamentis & regiminibus calidioribus, intempestivo narcoticorum usu exacerbentur, aut perturbentur.

3 Sanguinis ventilationes in ipso paroxysmo administratæ, non raro in præsens sensibile quidem levamen afferunt, sed, restituta eadem sanguinis abundantia, tanto promptius affectus hi repullulant, tantoque pertinacius idem subsidium denuo exposcunt.

4 Completæ Congestiones ut plurimum facilius curantur, quam incomplete.

5 Quo minus Natura scopum Hæmorrhagicum attingit, eo magis dolores, spalmi, convulsiones, toni remissiones, inflammationes &c. in variis corporis partibus sunt metuendæ.

6 Congestiones ad pectus semper majori periculo exponunt egrotantes, partim propter viscera nobilia ad vitæ conservationem summe necessaria, partim quia evacuatio sanguinis per pectus difficilior est, partim propter metuendas lésiones pulmonum, quæ frequenter hujusmodi evacuationem per pectus sequuntur.

### VI. Remedia.

1 Causam antecedentem, sanguinis nempe abundantiam, tollunt Venesectio & Scarificationes præservatorie, item hirudinum applicatio congrua.

2 Motus ccongestorios avocant, revellunt, divertunt, pediluvia, frictiones, cucurbitulæ non scarificatæ, fonticuli, rubefacientia sive Sinapismi veterum, Vesicatoria, Setacea, tandem alvi quoque cum aliquo stimulo expeditio per clysteres vel infusa laxantia.

3 Equalem universæ massæ humorum distributionem promovent blanda diaphoretica, diluentia, paulo largius calide hausta, v. g. Infusa Thee, Caffee, Veronicæ, Salviæ, flor. Lavendulæ &c. Ipsa quoque Alexipharmaca moderatis dosibus, & justis temporum opportunitatibus data.

4 Nimiam sanguinis expansionem compescunt Absorbentia, Nitrosa.

5 Spasticam fibrarum stricturam demulcent Cinnabarina v. g. Pulvis Antispasmodicus &c.

6 Ipsius moventis exacerbationem demulcent anodyna, emulsiva, gratiora analeptica, Specifica.

7 Sanguinis congesti & restagnantis discussionem promovent externa Topica, v. g. Spir. Vin. Camphoratus, Epithema ex Semine Carvi, bacc. Juniperi, Sale communi & mica panis fermentati &c. achilæ subordinata lenia repellentia ex Nitro, Saccharo Saturni, Aceto rosaceo.

8 Tonum partium roborant succinata, Salia Volatilia Urinosa, v. g. Essent. Succini cum Ess. lignorum, fassafra, mixtura tonico-nervina ex Spir. C. C. & Antimonii Tinct. vel Salis Tartari.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Potio laxans.

Rx. *Tamarind.* In Colat. ℥iij.  
*Passul. min. ana.* ℥ss. Dissolv. Sal. Polychr. ℥ss.  
*Rhabarb. elect.* ℥iss. Mann. Calabr. ℥j.  
 Infund. in f. q. Aq. M. D. ad Vitr.

##### 1 Pulvis temperans.

Rx. *Conch. preparat.* Cinnab. ℥ii gr. xxxvj.  
*Antimonii diap.* M. f. Pulv. in 22. p. æq. dividendus, cujus quotidie 2.  
*Tart. Viriol.* videndus, vel 3. portiones assumantur.  
*Nitr. depurat. ana.* ℥j.

##### 3 Alius Anodyno-temperans.

Rx. *Pulv. modo descripti* ℥j. M. f. Pulv. div. in 6. p. æq.  
*Mass. Pil. e Cynogl.* Quotidie versus somni tempus dosin unam porrigendo.  
 gr. vj.

##### 4 Essentia alexipharmaco-discutiens.

Rx. *Essent. Alexiph. Stablii* mane & circa meridiem in  
*Scord. ana.* ℥ss. juseculo vel alio vehiculo ordinando.  
*M. dos. gutt. 25. ad 30.*

##### 5 Alia.

Rx. *Essent. Pimpin. alb.* ana. ℥ss.  
*Tinct. Antimonii Tartar.* M. dosis est ut præcedentis.

##### 6 Essentia tonico-nervina.

Rx. *Tinct. ℥ii Tartarifat.* M. dos. 25. ad 35. gutt. bis  
*Spir. C. C. rect. ana.* ℥ss. vel ter de die.

##### 7 Alia.

Rx. *Tinct. Tart. acris* ℥j. M. dosis usque ut præcedentis.  
*Ess. Succin.* ℥j.

### VII. Methodus medendi.

1 In paroxysmo ante omnia alvus expediatur per clysteres, aut blandum aliquod laxans, subjungantur absorbentia, nitrosa, cinnabarina cum diaphoreticis fixis, imo si dolorum atrocitas, aut affectus vehementia postulat, potest his lene anodynum versus tempus somni adjungi. Subjungantur denique & interponantur Alexipharmaca temperata, adhibitis simul in subsidium externis topicis, nec neglectis ubique specificis.

2 Extra paroxysmum ventilationes sanguinis præservatorie circa Æquinoctia instituantur, assuefactæ jam constanter repetantur, neque temere negligantur, præmissis, interpositis, subordinatis pediluvii, laxantibus cum epicrasi, succinatis, Salibus Volatilibus, concurrente simul conveniente rerum non naturalium usus, imprimis circa motum & potum sufficientem.



VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 Ventilationes in ipsa affectus exacerbatione administratæ, non nisi præsentis paroxysmo subveniunt, rebus autem tranquillioribus adornatæ, magis in futurum quoque suam extendunt efficaciam.
- 2 Anodyna ut & Diaphoretica positiva, sive Alexipharmaca non facile exhibeantur, nisi alvo prius expedita.
- 3 Si copiosior subsit congestio, & corpus insuper spongiosius, vel suspicio obstructionis viscerum, abstinendum est in incremento & æquum affectus, a Salibus Volatilibus, præsertim sæpius datis.
- 4 In notabili vero declinatione, a paucis imprimis dosibus incipiendo, non male se gerunt.
- 5 Martialia quoque imprudenter adhibita, absque humorum prius præparatione & discussione, facile insignia damna possunt producere.
- 6 Durante adhuc restrictione reliquarum partium, adeoque nondum patente reditu e loco suæ restagnationis, & libera distributione sanguinis, ad externa Topica discutientia, vel repellentia, non est præparandum: exacerbantur enim inde tensiones & dolores potius, quam leniuntur.
- 7 In omnibus congestionibus sanguinis ad superiores partes, ubi æstus febrilis abest, multum levaminis afferunt pediluvia, multum quoque confert in tali constitutione pedes & præcordia densioribus integumentis a frigore præmunire.
- 8 Pediluvia calidiora, præsertim, si altius pedes immergantur, aut nimis diu immergi detineantur, in corporibus valde Plethoricis, alvi concurrente obstipatione, facile commotiones febriles exsuscitant.
- 9 Vesicatoria magis in acutis, Fonticuli & Setacea in chronicis humorum ad certas partes restrictionibus & decubitus locum habent.
- 10 In pertinacibus Hypochondriaco-Ischiadico Podagrico Hæmorrhoidalibus congestionibus, peculiaris efficaciæ sunt Hirudines, orificio ani applicatæ, vel spontaneus & sufficiens hæmorrhoidum fluxus.
- 11 Thermæ & acidulæ in congestionibus pertinacibus usurpatæ, plerumque malum adaugent.
- 12 Animi pathemata graviora, uti frequentius ebullitionum & congestionum sunt causæ, ita studiose fugienda sunt, partim quia congestionem præsentem exasperant, partim vero quia absentem facile revocant.
- 13 Amuletica, inter quæ Bufo exsiccatus eminet, non nisi in primo statim principio aut præmissis universalibus & quidem in subjectis sensibilibus locum habent.

## S E C T I O I.

## D E

## DOLORIBUS CONGESTORIIS.

## C A P U T P R I M U M.

## De Cephalalgia Sanguinea.

- I. *Definitio.* **C**ephalalgia Sanguinea est doloris capitis species, quæ a congestione sanguinis vasa cerebri distendentis, & meninges comprimantis ortum trahit.
- II. *Differentia:* Cephalalgia
  - 1 Alia est *idiopathica*, alia *symptomatica*, ratione sedis causæ morbificæ, illa scilicet est quando sanguis congestus in ipso hærens capite, dolorem producit: hæc vero vel aliis morbis jungitur, v. g. febribus, vel per consensum abdominis oritur.
  - 2 Alia est *periodica*, qualis interdum in sexu feminino, circa mensium tempus affligens observatur, alia *Vaga*.
  - 3 Alia respectu doloris ipsius est *tensiva* & *premens*, alia *pungens*, *lancinans*, *pulsatoria*.
  - 4 A Cephalæa & Hemicrania facile respectu signo-

rum propiorum inferius recensendorum distingui potest.

III. *Signa.*

- 1 Dolor vel lancinans, vel pungens, vel premens aliquando tantum caput, ordinarie vero synciput, aut frontem, tempora ac bregmata occupans, cum pulsibus Synchronus.
  - 2 In multis etiam dolor circa radicem nasi, ardor narium, pressionis sensus in osse Ethmoide, cui jungitur sæpius dolor in intimis oculorum bulbis premens, aut punctorius, & calor frontis ac temporum.
  - 3 Facies rubicunda, venæ turgidæ atque inflatæ, præcipue temporales & jugulares.
  - 4 Oculorum rubor & valorum inflatio, doloris in oculis, si objecta lucida offeruntur, augmentum, tinnitus quoque aurium & interdum in casu graviore vertigo.
  - 5 Strictura reliqui corporis, alvi que aliqualis remissio, cum urinæ paucitate.
- IV. *Subiectum.*
- 1 Homines temperamenti sanguinei vel sanguineo-Melancholici.
  - 2 Juniores, quibus consuetæ Narium Hæmorrhagiæ emanerunt.
  - 3 Fœminæ, emanentibus, suppressis vel cessantibus mensibus, aut eorundem fluxu debito modo & ordine non succedente, imprimis vero Hysterico malo obnoxie.
  - 4 Viri Hæmorrhoidibus alias obnoxii, aut ad easdem saltem, respectu moliminum ad eas tendentium, proni, post emanationem illarum aut cessationem moliminum.
  - 5 Senes Plethorici ad arthriticos affectus proni, post retrocessionem mali ad interiora & potissimum superiora.
  - 6 Homines diætæ vinosæ atque aromaticæ dediti, aut multis meditationibus & lucubrationibus occupati, ac nimis diu vigilantes.
  - 7 Venæ sectiones & scarificationes consuetas negligentes.
  - 8 Personæ caput nudum calori ignis aut Solis exponentes, aut inferiores partes nimium refrigerantes.
  - 9 Homines corpus motu subitaneo exercentes & plethoram nimium simul atque semel commoventes, aut iræ graviore indulgentes.
  - 10 Propter hæreditariam dispositionem ad Cephalalgiam proni.
  - 11 Febricitantes in paroxysmis & exacerbationibus.

V. *Prognosis.*

- 1 Cephalalgia sanguineæ ac congestiones sanguinis in capite per Hæmorrhagias narium sæpissime solvuntur.
- 2 Interdum sponte cessat sine evacuatione sanguinis, id quod promptius in junioribus & viris, tardius vero in fœminis & senibus contingit.
- 3 Cephalalgia facile degenerat in consuetudinem, & vel in Cephalæam transit, vel brevibus periodis revertitur.
- 4 Quæ in junioribus per Hæmorrhagiam Narium solvitur Cephalalgia, in adultioribus Coryzas graviores, Lippitudines, aut in malo graviore excretionibus e naribus & auribus purulentas facile post se trahit.
- 5 Cephalalgia vertiginosæ, in senibus plethoricis Narium Hæmorrhagias recrudescentes insequentes, prodromi sunt Apoplexiæ & Paralysis.
- 6 Quo major est constrictio inferiorum partium & congestio, post commotam plethoram, ad superiora, eo gravius quoque affligit Cephalalgia.
- 7 Ex Cephalalgiis pertinacibus & perversè tractatis, decubitus ad oculos & suffusiones facile fiunt.
- 8 Cephalalgias frequentes sæpius affectus arthritici partium superiorum sequuntur.
- 9 Cephalalgia in acutis admodum pertinaces cum cruditate in urina signis, Deliria & Phrenitidem portendunt.



10 Alvus adstricta semper exacerbatur Cephalalgiam, e contra vero alvi profluvium salutare est.

#### VI. Remedia.

- 1 Causam principalem imminuentia: scarificationis in corporibus succulentis, Venæsectionis & hirudinum usus in macilentioribus, venas majores habentibus, in locis remotioribus celebratus.
- 2 Congestionem in capite factam derivantia: pediluvia & laxationes extra morbos acutos in usum vocata, in iisdem vero & extra eosdem sinapismi, clysteres, frictiones pedum, & in malo pertinaciori fonticuli, setacea adhibita & locis convenientibus applicata.
- 3 Orgasmi sanguinis demulcentia & compescentia: Absorbentia, Nitrata, Salia neutra, gelatinosa, emulsiva, potus Thee sufficienter haustus.
- 4 Discussionem & æqualem circulationem promoventia; quod partim per modo dicta & diaphoretica fixa interne, partim vero per Spir. Vin. Camphor. Crocatum, & Epithemata ex Rad. Rhod. Herb. Verben. rutæ, Bacc. Juniper, Sem. Carvi, Sale communi, & Unguenta anodyno-discutientia externe adhibita, fieri potest.
- 5 Tonum fibrarum strictiorem relaxantia atque placentia: Cinnabarina & correctæ Anodyna v. g. Essent. Dulc. Hallenl. aut MPil. de Cynogl. rana aliquot pulveribus temperantibus mixta, vesperi exhibita. In casu pertinaciori inpr. Cephalalgia Vertiginosa Pulveres Solares D. D. Richter, usui Ess. dulc. & pulv. antispasmod. interpositi, præsentaneum edunt effectum, inpr. si aliquandiu continentur.
- 6 Roborationem partis læsæ seu debilitatem respicientia; Cephalica mitiora, succinata, Tinctura Tonico Nervina Stahl, Specifica: Pulvis de Gutta Riverii.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Pilulæ Cephalicæ.

Rx. MP. e succ. Crat. gr. xii. ana. gr. vii.  
Extract. Helleb. nigr. c. Elix. Propr. f. pilulæ.  
Merc. dulc. rit. par. pro una dosi.

##### 2 Pulvis diaphor. temperans.

Rx. Oc. 5. præparat Cinnab. 5ij ʒj.  
ʒ. diaph. M. div. in 6. aut 7. par.  
Nitr. depur. æq. singul. tribus hor. 1.  
Arcan. duplic. ana. ʒss. dosi.

##### 3 Pulvis Anodyno-roborens.

Rx. Pulv. modo dicti ʒj. M. f. pulv. div. in 4. part.  
Spec. de Hyac. ʒj. æq. dosi 1. cubitum cinn.  
MP. de Cynogl. gr. iv. do.

##### 4 Unguentum Anodyno-discutiens.

Rx. Ung. Aabastr. Opii in Acet. solut. ʒj.  
Popul. ana. ʒss. Camph. ʒss.  
Ol. hyosc. Croci gr. v. M. ad Ollul.  
Nucl. persic. ana. superlinteum fronti & temp.  
ʒss. ribus applicandum.

##### 5 Essent. Tonico Nervina Stahl.

Rx. Tinct. Antimonii vel recti ana. ʒss.  
Sal. Tartar. M. D. ad Vitr. dosi xxx.  
Spir. C. C. mediocriter gutt. bis aut ter de die.

##### 6 Alia.

Rx. Essent. succin. Dosis eadem.  
Alexiph. ʒ. ʒij. M.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 In ipso paroxysmo cum blando laxante, si nullum contraindicans obstat, Curæ initium fiat; imo si nullam moram esse circumstantiæ indicaverint, etiam evacuationes sanguinis in ipso paroxysmo celebrare convenit. In Cephalalgia tamen symptomatice, in febribus acutis occurrentibus, per remedia interna & forsan clysteris usum, si febris genius illud permiserit, res peragenda est.
- 2 Interne orgasmi sanguinis mitigetur per Nitrofa, absorbentia, diaphoretica fixa, versus noctem vero blandum anodynum, si necessitas illud exigat, exhibeatur.
- 3 Externe vero in ipso loco affecto Anodyno-discutientia adhibeantur, in remotioribus autem ad revulsionem humorum pediluvia (circa horam somni juxta Bag iv.) frictiones & sinapismi.

4 Post mitigatum & decrecentem paroxysmum conducunt roborantia & lenia nervina interne & externe in usum vocata; hoc quoque tempore specifica energiam suam demonstrant.

5 Extra paroxysmum evacuationibus sanguinis consuetis consulatur. Hæmorrhoidariis hæc excretiones promoveantur, aut suppleantur per hirudinum applicationem. Fæminino sexui fluxus menstruus in debito ordine servetur, aut suppressus revocetur; Hæmorrhagiæ narium suppressæ vices Venæsectio in pede suppleat. Optime quoque profunt laxantia per epicrasin, qualia sunt vina medicata Venæsectioni subjuncta.

6 Insuper diætæ calidiôr vinosa, & animi pathemata evitentur, alvus vero semper lubrica servetur: motus corporis sit laboriosus & potus sufficiens.

#### VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Opiata nisi circumspectissime exhibeantur, obstupefaciunt potius ægrotos, quam ut ullum emolumentum iisdem præstent; imo in febribus ut plurimum hoc in casu cum detrimento exhibentur.
- 2 In desperatis capitis doloribus Riverius, Sennertus, Paræus arteriotomiam commendant, imo Bagliv. eandem pro magno secreto habet, ast affectum plerumque imposterum pertinaciorum reddit.
- 3 Embrocationes Veterum nisi cum debita methodo & antecedentibus generalioribus evacuantibus in usum vocatæ fuerint, multum detrimenti causari possunt, alias tamen usum habent haud contemnendum.
- 4 Cucuphæ subjectis plethoricis præsertim sine evacuatione humorum ordinatæ, malum non tantum adaugere, sed & pessima inducere possunt consecutaria.
- 5 Pingua capiti applicata transpirationem impediendo malum sæpius exasperant, quare etiam Unguento Alabastrino semper præmittatur usus Spir. Vini Camph. quod si vero malum refractarium sit, Spiritui Camphorato substituitur Unguentum modo dictum.
- 6 Salinum Volatilium Oleosorum aut balsamorum usus externus, neglecta debita interna medicatione, plus quoque damni quam emolumenti parit, inpr. in sexu fæminino.
- 7 Fonticuli & setacea magis locum habent in Cephalalgia a causa serosa originem trahentibus; & hinc in Cephalalgia sanguinea non temere in usum trahantur.
- 8 Vesicatoria in pedibus applicata in Cephalalgia Symptomaticis, in febribus acutis cum deliriis sese exerentibus, officium quandoque faciunt.
- 9 In fæminino sexu semper ad menses & infimum ventrem respiciendum est, habent enim multum commercii cum capite.
- 10 Imo etiam in Viris Cephalalgia obnoxiiis primarum viarum ataxiæ multum incommodi capiti afferre quotidie conspiciuntur; unde in curatione ad utrumque malum respiciendum est.
- 11 Pilulæ Aloeticæ & inpr. Cephalicæ admodum decantatæ sæpius majores ebullitionis sanguinis & frequentiore Cephalalgia recursum producant.
- 12 Venæsectio in subjectis junioribus non nisi summe urgente necessitate instituat, sed potius humorum ebullitio per Nitrofa & Cinnabarina sæpius data mitigetur.
- 13 Venæsectiones præservatoriæ semper sint large, alias nullus sunt usus.
- 14 Quieta in lecto continentia semper est utilis, motum vero corporis major temper dolorum sequitur exacerbatio.
- 15 Martialia a quibusdam laudata magis nocent quam profunt & graviora mala facile post se trahunt, quatenus partes magis stringunt & congestiones ad caput augent, cum dolorum incremento & metu inflammatoriarum febrium.

#### CAPUT SECUNDUM.

##### De Cephalæa & Clavo Hysterico.

- I. *Definitio.* Cephalæa & Clavus sunt dolores capitis gravissimi & pertinacissimi, continuo fere affligentes, aut ob levissimas causas recurrentes, a



congestionibus ad caput habitualibus, aut ulceribus aliisque causis caput continuo affligentibus, originem trahentes.

## II. Differentia.

- 1 Cephalæa alia est *Chronica*, continua & curationi refractaria: alia adhuc est *recentior* & intermittens.
- 2 Alia est *periodica* certa anni tempora observans, aut, etiam si aliquo modo intermittat, statim tamen periodicis recurrens: alia est *vaga*, sæpius quidem affligens, absque tamen certis periodicis.
- 3 Alia est *sympathica*, uti Clavus Hystericus, sive Ileos Hæmatites Hippocratis, Colicam præcipue anotericam indigitans, & a vitis sanguinis menstrui originem habens, & Cephalæa Hypochondriacorum, alia vero *idiopathica*, uti Cephalæa Scorbatica, Venerea, & quæ ab ulceratione aut carie cranii &c. dependet, de quibus suo loco.

## III. Signa Generalia.

- 1 Dolor gravissimus vel premens, gravativus & tendens, vel lancinans, rodens & punctorius.
- 2 Doloris huius augmentum post promptiorem commotionem corporis & animi.
- 3 Dolor fixus, pertinax, continuus, vel insignem capitis plagam, vel parvum tantum ejusdem spatium occupans; qui licet interdum aliquo modo remittat, aut intermittat, frequentius tamen vel recurrit, vel gravius postmodum affligit.

## Signa Specialia

### a Cephalææ Sanguineæ in Viris:

- 1 Signorum modo recensitorum plurima.
- 2 Dolor adeo insignis, ut ægri neque ullum strepitum ferre, neque loqui, aut lucem sine doloris exacerbatione videre queant.
- 3 Evacuationes solennes in Viris suppressæ, aut artificiales consuetæ neglectæ.
- 4 Dolor gravissimus capitis fixus & continuus, varia paræniata hypochondriaca excipiens.
- 5 Vertiginosa quandoque concurrens capitis perturbatio, imò ejusdem quasi obstupescencia, in declinatione potissimum mali sese exerens.
- 6 Signa manifesta congestionum ad caput, pulsus arteriarum major, venæ turgentes, inflatio aliqua faciei & rubor, partium vero inferiorum & alvi strictura.

### b Clavi Hysterici sive Cephalææ Hysterice aut Iliaco-Hæmatice.

- 1 Signorum antea allegatorum multa.
- 2 Præcedunt magna præcordiorum angustia, & nauseabundæ adversitates ad Lypothymiam & suffocationem usque se extendentes.
- 3 Gravissimi dolores lancinantes dorsi, a lumbis ad os Coccygis tendentes, cum magnis doloribus flatulentis abdominis, Mensium fluxu inordinato, Palpitatione cordis & mœstitia insigni.
- 4 Hisce succedunt dolor capitis gravativus, distensivus, vellicans cum inflatione capitis exterioris quasi Erysipelatode & Vertigine erectionem capitis non ferente, tumor faciei cum vel sine rubore: Sensus frigoris, aut interdum aque frigide fluctuantis circa verticem: vel Clavi quasi temporibus infixis a quo symptomate nomen assumpsit affectus, tinnitus aurium & auditus gravitas: dolor interdum per longitudinem dorsi ad nucham & versus occiput ascendens, maxime exquisitus & spasticus, & in nucha nodos quandoque formans.
- 5 Appetitus & somnus hoc ipso tempore nullus, languor extremus, alvi adstrictio, horripilatio fere perpetua, cum intercurrente febricula.
- 6 Recurrit hæc plerumque mensuris periodicis versus solitum Mensium tempus.

### c Cephalææ venerea & ulcerosa.

- 1 Multa signorum antea enumeratorum.
- 2 Dolor fixus aut uni tantum loco infixus, rodens & terebrans sine ullis congestionis evidentibus signis.
- 3 Elevatio interdum loci affecti in tumorem minorem durum & sensim crescentem.
- 4 Exacerbatio doloris tempore nocturno, matutino vero tempore aliqualis ejusdem remissio.

- 5 Alia signa Luem veneream manifestantia, ulcera oris, bubones, gonorrhœa, pregressa salivatio &c.
- 6 Indicia scabiei malignæ, plicæ vel leprosæ.
- 7 Pregressa causæ violentæ, vulnera, plagæ, ulcera capitis.
- 8 Effluxus materiæ purulentæ ex naribus vel auribus.
- 9 Signa scorbuti manifesta, maculæ, cruentationes gingivarum, dolores capitis & artuum acuti &c.

## IV. Subjectum.

- 1 Plethorici Sanguinei aut potius Melancholico-Sanguinei præ cæteris.
- 2 Quibus consuetæ narium Hæmorrhagiæ emanse-runt, aut post longinquum tempus recrudescentes denuo cessant.
- 3 Adulti magis quam juniores.
- 4 Frequentius eam experiuntur feminæ quam Viri, imprimis eæ, quæ mensium ataxia laborant, otio, vitæ sedentariæ & passionibus animi deditæ sunt.
- 5 Non tamen immunes ab ea vivunt Viri, præsertim Hypochondriaci, aut Hæmorrhoidibus non rite succedentibus, aut earum plenaria suppressione laborantes.
- 6 Lue Venerea, Scorbuto, Psora aut Lepra affecti, ut & quibus cerebrum est ulcerosum.
- 7 Quibus caput a causis externis violentis, casu scilicet, plagis &c. læsum est.

## V. Prognosis.

- 1 Cephalæa quæcunque difficiliore semper est curationis, & curata facile ob leviores causas recrudescit.
- 2 Periodica tamen aut nondum adeo inveterata, facilius curatur, quam continua.
- 3 Quæ cum fluxibus sanguinis, Mensibus scil. Hæmorrhoidibus &c. turbatis connexionem habet, promotis illis fluxibus vel cessat, vel insigniter immittitur.
- 4 Clavus hystericus cum inflatione capitis, convenienti modo tractatus facilius mitigatur, quam reliquæ Cephalææ, imprimis si Vita & Diætâ mutantur.
- 5 Cephalæa diuturnior vertiginosa aut cum sopore conjuncta, & a sanguine potissimum originem habens, non raro Paralyseos & Apoplexiæ prodromus est.
- 6 Cephalæa a carie cranii dependens, difficulter admodum, quæ vero ab ulcerosa cerebri corruptione orta est, omnium rarissime, vel prorsus non curatur.
- 7 Cephalææ diuturniores interdum transeunt in Melancholiam.

## VI. Remedia.

- 1 Sanguinem congestum revellentia; Venæsectiones, Scarificationes, pediluvia, frictiones pedum, laxantia & Clysteres: Merc. dulc. Fol. Senn. Pil. Tartar. Pil. Stablii &c.
- 2 Eundem temperantia & resolventia: Diaphoretica fixa, Diuretica, Salina, Nitrosa, Tinctura Salina Richteri cujus paucæ doses sæpius sufficiunt, Cinnabarina, & inpr. Pulv. Solares cum Essentia dulci aliquandiu continuati.
- 3 Anodyna correctæ ut & Topica tam sopientia, quam discutientia & roborantia: Interne Mass. pil. e Cynogl. ad gr. j. tempore somni pulveribus temperantibus remiscenda. Externe Epithemata Camphorata, Emplastræ, Unguenta, Sacculi, Unguentum alabastrinum, Spir. Vini Camphorat. &c.
- 4 Discutientia & tonica: Essent. Pimp. alb. Succin. Tinct. Antimonii Tart. Spir. C.C.
- 5 Anticatarrhalia & Alexipharmaco diuretica fortiora in causa magis ferosa; rad. Vincetox. Helen Imperat. Anel. Herb. Capill. Qris Scord. Fumar. Lign. Cuajac. Sassafr. Cort. Chacar. Tinct. Q.ii. acrem Essent. Succin. non neglectis & hic Topicis externis,

### Formule Remediorum.

- 1 Bolus laxans.
  - 2 Pilulæ laxantes.
  - 3 Aliæ
- ℞. Conserv. flor. Persic. ʒj. Ref. jalapp. gr. iij.  
 Merc. dulc. rit. parat. Syr. Rosat. sol. q. f.  
 gr. xv. M. f. Bolus pro j. dosi.  
 ℞. MP. e Succ. Crat. M. f. pilule ad gr. j. dosi  
 Extr. Hell. nigr. resin. xv. ad xx. pro dosi.  
 ana. ʒj.



3. R. Pil. Tart.  $\mathfrak{D}$ j. ad gr. xxv.  
 4. R. Pil. de Ammonico  $\mathfrak{D}$ j. ad gr. xxv.  
 5. R. Pil. Stablii  $\mathfrak{D}$ j.
- 7 Essentia laxans.  
 R. Extract. Helleb. nigr.  $\mathfrak{Z}$ j.  
 8 Infusum laxans per Epicrasin.  
 R. Rad. Cichor. Ononid. Gentian. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij.  
 Herb. Capill.  $\mathfrak{Q}$ . Meliss. Summit. Cent. min.  $\mathfrak{z}$ . mfs. Fol. Senn. f. st.  $\mathfrak{Z}$ j.
- 9 Aliud.  
 R. Rad. Apii. Caryophyll. Enul. Pimp. alb.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{Z}$ ij. Zedoar.  $\mathfrak{Z}$ j. Herb. Card. Ben. Rorism. ana. mj.
- 10 Potio temperans diapnoico-diuretica.  
 R. Aq. Cheresol. fragor. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij. Pulv. Antispasm.  $\mathfrak{D}$ . iv.
- 11 Alia.  
 R. Aq. Millefol. Card. bened. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij. Nitr. depur. Lap. percar.
- 12 Tinctura temperans.  
 R. Tinct. Salin.  $\mathfrak{Z}$ ls.
- 13 Mixtura discutientes.  
 R. Ess. Pimp.  $\mathfrak{Z}$ ls. Succin. Tinct. Tart. ana.  $\mathfrak{Z}$ j. M.
- 14 R. Tinct.  $\mathfrak{Z}$ ii. Spir. C. C. ana.  $\mathfrak{Z}$ ls. M.
- 15 Tinct.  $\mathfrak{Z}$ ii.  $\mathfrak{Z}$ ij. Liq. C. C. Succin.  $\mathfrak{D}$ j. M.
- 16 R. Tinct.  $\mathfrak{Z}$ ii. Ess. Alexiph. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij. Succin.  $\mathfrak{Z}$ j. M.
- 19 Linimentum anodynum.  
 R. Ung. Alabastr.  $\mathfrak{Z}$ ij. Ol. expr. Nucl. Persic.
- 20 Aliud.  
 R. Ung. Alabastr.  $\mathfrak{Z}$ ij. Ol. papav. expr.  $\mathfrak{Z}$ ls.
- 21 Emulsiō externa anodyno-refrigerans.  
 R. Nucleor. Persic.  $\mathfrak{Z}$ ls. Sem. papav. alb.  $\mathfrak{Z}$ ij. Hyoscyam.  $\mathfrak{Z}$ j. Aq. Verben. flor. Nymph.
- 22 Alia.  
 R. Nucleor. Persic. Sem. Aneth. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij. papav. alb.  $\mathfrak{Z}$ j. Aq. Verben.
- 23 Epithema refrigerans & discutiens.  
 R. Aq. Rosar.  $\mathfrak{Z}$ ij. Spir. rosar.  $\mathfrak{Z}$ ij. Nitr.  $\mathfrak{Z}$ j.
- 24 Aliud.  
 R. Acet. rosar.  $\mathfrak{Z}$ ij. Aq. Reg. Hung.  $\mathfrak{Z}$ j. M.
- 25 Aliud.  
 R. Spir. Vin. Camphor.  $\mathfrak{Z}$ ij.
- 26 Emplastrum resolvens & discutiens.  
 R. Empl. de Beton. de Ran. Vig. c.  $\mathfrak{Q}$ . ana.  $\mathfrak{Z}$ j.
- 27 Sacculus discutiens.  
 R. Herb. Verben.
- Alia.  
 6 R. Pil. Polychr. Hall.  $\mathfrak{D}$ j. Dentur singule pro una vice & repetantur bis vel ter, sive tertio quovis die.
- Spir. Vin. Redif.  $\mathfrak{Z}$ ls. Msdosis 40. ad 60. gutt.  
 Rhab. elect. Fibr. Hell. nigr. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij. Cort. Citr. Tart. Solub. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij. Incis. infund. in vini & aquæ  $\mathfrak{B}$ . iv. vel v. bibantur singulis diebus mane  $\mathfrak{Z}$ vj. vel viij.
- Fol. Senn. f. st.  $\mathfrak{Z}$ vj. Fibr. Hell. nigr. Agar. in pet. lig. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij. Cort. Aurant. Sal. Tartar. ana.  $\mathfrak{Z}$ ij. Incis. infund. in Vin. & aquæ  $\mathfrak{B}$ . iv. dosis ut supra.
- Sacch. perlat.  $\mathfrak{Z}$ ij. M. Dosis 2. cochlear. sing. 2. bor.
- Arcan. dupl.  $\mathfrak{Z}$ . diaph. ana.  $\mathfrak{D}$ j. Cinnab.  $\mathfrak{Z}$ ii. gr. xij. Sacch. Canar.  $\mathfrak{Z}$ ij. M. dosis ut supra.
- dof. 40. gutt. ter quovis die.
- 17 R. Ess. Succin. Tinct. Tartar. ana.  $\mathfrak{Z}$ ls. Spir. C. C.  $\mathfrak{Z}$ j. M.
- 18 R. Tinct. Tartar.  $\mathfrak{Z}$ j. Ess. succin.  $\mathfrak{Z}$ j. Sal. Vol. C. C.  $\mathfrak{D}$ j. M. De his singulis capiantur 30. 40. 45. gutt. pro dosi bis vel ter de die.
- Hyoscyam.  $\mathfrak{D}$ j. M. usus ut supra.
- Plantag. ana. q. s. F. l. a. Emulsiō, applicetur cum linteaminibus regioni temporum aut fronti.
- Solan. beton. ana. q. s. M. f. l. a. Emulsiō ut antea.
- Campb.  $\mathfrak{Z}$ j. Ol. lign. Rhod.  $\mathfrak{D}$ ij. M. applica capiti tepide.
- Applic. c. linteam tepide.
- applicacum linteaminib.
- M. & malax. c. Ung. Alabastr. induc. alut. & applicetur capiti raso.
- Beton. ana. mj.

Flor. Chamom.

Sambuc. ana. p. ij.

Milii tosti mij.

Salis Commun. tost  $\mathfrak{Z}$ ij. M.

F. 2. sacculi interpassati altern. capiti calide applic.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Cæteris remediis omnibus præmittantur sufficientes laxationes frequentius repetitæ, ut alvus hoc modo semper aperta servetur, & eo major humorum partim revulsio, partim evacuatio contingere queat; aut eorum loco in usum vocentur clysteres emollientes & lubricantes absque stimulo Salino.
- 2 Hisce in assuetis subjungatur Venæsectio in brachio, aut majoris revulsionis gratia in pede. In subjectis humidioribus & scarificationi assuetis sanguinis missioni hæ substituantur.
- 3 Ubi vero malum est urgens & a subitanea sanguinis congestione, Mensium & Hæmorrhoidum suppressionem infecuta, ortum traxit, sanguinis per Venæsectionem emissio in pede instituta reliquis præmittatur.
- 4 Arteriotomia in Cephalæa graviore, testibus Practicis, omnibus aliis remediis irritis, sæpius malum fastulit.
- 5 Nec incongruum est hirudines utrisque temporibus aut regioni aurium applicare.
- 6 Præsentē orgasmo exhibeantur remedia temperantia, quibus subjungantur cetera discutientia & æqualem sanguinis motum producentia.
- 7 Quo peracto in usum trahantur correctæ anodyna, & topica externa: Epithemata, sacculi &c.
- 8 In malo graviore profunt interdum Vesicatoria nuchæ, aut toti capiti raso instar Cucuphæ applicata, ut & fonticuli, in serosis tamen Stasibus majorem quam in sanguineis utilitatem exerentes.
- 9 In Cephalæa a sanguinis suppressionibus orta potissimum respiciendum est ad revocationem illorum fluxuum, de qua re alibi jam dictum est.
- 10 Cephalæa Venerea, aut ab aliis graviore morbis ortum trahens, methodo, morbo primario conveniente, tractanda est, adhibendo nimirum in causa magis serosa anticatharrhalia remedia.
- 11 Trepanatio, in Cephalæa a puris collectione subcranio orta, a quibusdam cum fructu instituta fuit.
- 12 In omni Cephalæa alvus semper sit aperta, vitentur etiam animi pathemata, diætæ vinosa & aromatica.
- VIII. Cautela Practicæ.
- 1 Purgantia acria fortiora, imprimis vomitoria in Cephalæa plusdamni quam emolumenti afferunt.
- 2 Omnia Cephalica calida & volatilia & antiscobur-tica maximum damnum inferunt, imprimis si sine præmissis debitis evacuantibus & temperantibus usurpantur.
- 3 Nephritica, in dolore ossis sacri & lumborum, Clavum Hystericum præcedente, usurpata partim nihil efficiunt, partim Cephalæam sequentem longe graviorem reddunt.
- 4 Sensus ille frigoris in vertice hystericarum minime tractandus est per calidiora, sed temperatiora externa & interna.
- 5 Martialia quocunque etiam modo præparata, si convenientia remedia eorum usum non præcedunt, Cephalæam ex Hypochondriis ortam exasperant, idque tanto certius, quo magis adstrictoriam habent efficaciam.
- 6 Opiata pariter tantum post evacuationes temperantibus mixta profunt.
- 7 Venæsectio in Cephalæa hypochondriaca nisi in sat larga quantitate instituatur, nullum habet usum, imo interdum majora post se trahit mala.
- 8 Venæsectio in hoc affectu præservatoria sæpius magis prodest, quam curatoria.
- 9 Topica externa imprimis acria balsamica, nisi præmittantur convenientia remedia, dolorem augment, & calorem febrilem excitant.
- 10 Narcotica externa non raro stuporem & vertiginem post se trahunt.
- 11 Imo ipsa Camphorata, licet optima hoc loco discutientia, non nisi post evacuationes debitas applicanda sunt.



- 12 Fonticuli & Setacea nonnisi in ea Cephalæa profunt, quæ ab ulceribus inveteratis occlusis, aut perperam consolidatis originem habet.
- 13 Nisi maxime probabilia signa adsint puris sub calvaria latitantis, Trepanatio non instituitur.
- 14 Vescicatoria toti capiti applicita in ea tantum Cephalæa profunt, quæ a nimia congestione feri ad caput ortum trahit, in malo vero graviore a nimia sanguinis congestione dependente, aut ubi a suppressione sanguinis fluxum dependet, non temere in usum vocentur.

## CAPUT TERTIUM.

## De Otagia.

- I. *Definitio.* **O**tagia est dolor aurium exquisitus, totum non raro caput simul affligens, interdum a stagnatione sanguinis, interdum vero ab inflammatione internæ membranæ meatus auditorii dependens.
- II. *Differentia.*  
Ratione impetus distinguitur in *veram*, quæ cum inflammatione & febricula conjuncta est, & *notam* ubi hæ non concurrunt, doloresque etiam satis mitiores sunt.
- III. *Signa.*  
1 Si est a stagnatione sanguinis aliorumque humorum, dolor est pungens acutus & terebrans.  
2 Si vero ab inflammatione, adsunt  
a vehementissimorum dolorum pulsatoriorum & lancinantium cum sensu ardoris inconcavo auris sese exerentium perceptio.  
b Caloris, ruboris & interdum tumoris satis duri externi illius lateris, ad malas & tempora sese extendentis, conspectus.  
c Febriculæ concursus.  
d Pathematum quandoque delirorum & syncopiarum consequentiæ.
- IV. *Subiectum.* Expositi huic malo sunt.  
1 Plethorici juniores, congestiones frequentes ad caput passi.  
2 Quibus Hæmorrhagiæ narium antea consuetæ emanfere.  
3 Vulnerati, vel a concussionem externa læsi, aut in quorum aures infecta sese insinuarunt.  
4 Febricitantes malo regimine administrationum excretoriarum tractati.  
5 Feminae interdum post suppressionem vel cessationem mensium, ut & Viri Hæmorrhoidum suppressione laborantes.
- V. *Prognosis.*  
1 Aurium dolor exquisitiorem sensum conjunctum habet, quam oculorum dolor.  
2 Quando inflammatio admodum profunde contingit, & nervum auditorium simul affligit, facile sequuntur deliria & convulsiones, tragædiam cum morte terminantia.  
3 Juvenes periculosius decumbunt, quam Senes; sæpius enim ante septimum diem moriuntur.  
4 Rarius discutitur hæc congestio, sed plerumque ad suppurationem vergit, imprimis si retro aures tumor & nodus durus conspiciatur.  
5 Si septimum igitur diem superaverit ægri, abscessus sperandus est, quod ex febris & doloris remissione cognoscitur.  
6 Communiter rumpitur abscessus intrinsecus, gravior autem est status, si extrorsum rumpitur, quia facile ulterior contingit.  
7 Quandoque tamen etiam inflammatio absque suppuratione per discussionem solvitur.  
8 Post curatam Otagiam plerumque gravitas auditus remanet, idque tanto certius, quando suppuratio contigit.
- VI. *Remedia.*  
1 Revellentia & evacuantia: Pil. e succin. Crat. Merc. dulc. Extr. Helleb. nigr. Venæsectio, si necessitas exigat, aut hirudinum applicatio ad orificium ani in Hæmorrhoidariis, frictions & pediluvia.

## 2 Diapnoica &amp; discutientia

- a interna: Oc.  $\mathfrak{E}$ . præparat. Gum diaphor. Arcan. duplic. Tart. Vitriolat. Cinnab.  $\mathfrak{J}$ ij. cum tantillo Nitri; item Pulv. Bezoard. Hallens. Pulv. Solar. D. Richteri.
- b externa: Flor. Chamom. Serpill. Herb. Puleg. Menth. Origan. Rosmar. Lavend. Rad. Rhod. Aristol. rot. Irid. Camphor. Pulv. erysipelatodes Ludovici, sub epithematis forma applicitus, Spir. Vin. Camphorat. Emplastr. Diaphor. Myns. & Empl. e Melilot. camphoratum, aut Ess. dulc. concentr. guttæ aliquot cum Ol. amygd. amar. mixta & cum gossypio auri intrusa.
- 3 Anodyna: Cinnabarina, Pulvis Antispasmod. cum MP. de Cynogl.
- 4 Relaxantia & maturantia externe usurpata: Rad. Altheæ, Fol. Malv. Chamom. Melilot. Brancæ ursin. Sem. fœnugræc. Lini, Cepæ frixæ, mellita. medulla panis, vitelli ovor sub cataplasmatibus vel fofus forma ordinata.
- 5 Abstergentia & mundificantia externa: Tinct. mundificans D. Stablii ex Tinct. Myrrh Succin. & pauxillo Spir. Terebinth. Liquamen Myrrhæ, Spir. Sulphur. Terebinth. & Urina pueri destillata ab aliquibus celebrata, nec non Succ. Cyclamin. cum lacte muliebri.

## Formule Remediorum.

## 1 Pilulæ.

Rx. MP. e Succ. Crat. Resin. jalapp. gr. iij.  
panchym. Croll. cum Elix. prop. Par. f. pillul  
Merc. dulc. rit. par. ana. pro 1. dosi.  
gr. viij.

## 2 Potio diapnoico-temperans.

Rx. Aq. fl. samb. Nitr. depurat.  $\mathfrak{J}$ ss.  
Card. Mar.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{J}$ ss. Syr. acetos. citr. q. s.  
C. C. Citrat.  $\mathfrak{J}$ ss. M. per binas ad ternas ho-  
ræ diaph. ras cochleatim exhiben-  
do.  
Oc.  $\mathfrak{E}$ . præparat. a.  $\mathfrak{J}$ ss.

## 3 Pulvis anodyno-resolvens.

Rx. Conch. præparat. MP. e Cynogl. gr. viij.  
G. diaph. M. f. pulv. div. in 4. part.  
Sang. hirci præpar. æq. versus somni tempus  
Tart. Vitriolat. ana.  $\mathfrak{J}$ ss. 1. dosi.

## 4 Sacculus.

Rx. Rad. Irid. flor. Fl. Chamom.  
Valerian. Melilot. ana. Mfs.  
Arist. rotund. a. Sem. fœnic.  $\mathfrak{J}$ ij.  
 $\mathfrak{J}$ ss. Camph.  $\mathfrak{J}$ j.  
Herb. Puleg. Incis. contus. includ. sacculis  
Mel.  $\mathfrak{ss}$ . & applicentur calide.

## 5 Cataplasma.

Rx. Rad. alth. Coq. in s. q. aq. ad molitiem,  
Lil. alb. ana.  $\mathfrak{J}$ ss. trajectis per cribrum adde  
Herb. Malv. Farin. Sem. fœn. græc.  
Branc. ursin. lin. ana.  $\mathfrak{J}$ j.  
parietar. ana. Mj. Axung. capon.  
Fl. Chamom. Butyr. rec. ana.  $\mathfrak{Z}$ vj.  
Melilot. ana. Mfs. Ol. Oliv. q. s. f. Cataplas.

## 6 Aliud.

Rx. Cepar. contus. n. ij. Ol. Oliv. q. s.  
Butyr. rec.  $\mathfrak{Z}$ ij. Coq. lento igne ad consisten-  
Croc.  $\mathfrak{J}$ j. tiam Cataplasmatibus.

## 7 Essentia externa.

Rx. Essent. Succin.  $\mathfrak{Z}$ ij. Spir. Terebinth.  $\mathfrak{J}$ j.  
Myrrh.  $\mathfrak{Z}$ j. M. d. ad vitr. guttatim in  
Bals. de Copa. b. vel b. l. aures immittendo.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Si Medicus ab initio advocetur & necessitas urgeat, vena in pede, in junioribus vero, si ætas permittit in brachio secanda est.
- 2 Subjunguntur optime laxantia, nisi febricula & inflammatio gravior potius diaphoreticorum & temperantium usum suadeat; poterunt autem hoc in casu priorum vices clysteres supplere.
- 3 Hæc quamprimum ad congestoriam statim discutientiam interne sunt ordinanda; externe autem epithemata sicca, & intrusio frustuli camphoræ in aures, aut instilla-



instillatio quarundam guttarum Spir. Vin. Camph. Crocat. locum habent; abstinendo in principio ab humectantibus & emollientibus externis.

4 Quando dolores anodynum exposcunt, adhibeatur MP. e Cynogl. & Cinnabaris versus noctem cum absorbentibus & resolventibus sub pulveris forma ordinata.

5 Quod si vero dolor exquisitior & fortis pulsatio discussionem vanam esse indicaverint, ad emollientia & suppurantia procedere convenit, omissis discutientibus.

6 Ruptus abscessus mundificandus est, cui rei præprimis Balsamus mundificans nervinus, D. Stahlî usitatus, ex Ess. Succin. Myrrh. & Spir. Terebinth. inservit.

7 Si malum a suppressis Hæmorrhagiis ortum traxerit, extra paroxysmum revocatio horum fluxuum per convenientia remedia institui debet.

8 Præservationis gratia prosunt Venæsectiones æquinoctiales, scarificationes, per epicrasin laxantia aliæque revellentia, quibus subjungantur discutientia variis in locis jam laudata.

#### VIII. Cautelæ Practicæ.

1 Purgantia in gravioribus inflammationibus exhibitæ facile suppurationem expectandam impediunt, quod etiam repetiti clysteres faciunt.

2 Lubricantia & emollientia in principio externe applicata potius ad suppurationem disponunt, quam ut discussionem peragant, imo fibras emolliendo statim inflammatoriam augent.

3 Vice versa, discutientia versus suppurandi tempus ordinata, hanc actionem impediunt, & nil boni efficiunt.

4 Emplastrum e meliloto, singularem in hoc morbo habet efficaciam, discutiendi scopo applicitum. Quod si autem ex dolorum augmento usus ejusdem individuû certis nocuus observatur, removendum est.

5 Quando abscessus ruptus est, præter mundificantia etiam discutientia adhuc continuanda sunt, alias ulterior ulceratio, præprimis si externe ruptio contigit, expectanda est.

6 In vera Otagia ab oleis destillatis, externe applicandis omnino cessandum est, quia facile Phrenesin inducere possunt; in notha vero faciunt quandoque officium, si ad paucas gtt. Ess. Succin. commisceantur v. gr. Ol. chamom. fœnic. aneth. anif.

### CAPUT QUARTUM.

#### De Odontalgia.

I. *Definitio.* **O**dontalgia est dolor dentium præcipue molarium, vel potius membranae nervæ (periostium dictæ) dentium radices circumcingentis, interdum a nimia sanguinis copia dictam membranam præmente, interdum vero ab ejusdem inflammatione aut dentium carie ortum trahens.

#### II. Differentia.

1 Alia est *Idiopathica*, quæ ab erosione & cariosis dentibus originem ducit, alia *Symptomatica*, quæ congestioni humorum in gingivis factæ, ut plurimum cum cephalalgia conjunctæ, ortum debet.

2 Alia comitem habet dolorem perfecte inflammatorium, alia rodentem.

#### III. Signa.

1 Dolor partis afflictæ exquisitissimus cum manifestis signis congestionum ad caput, rubor scil. faciei cum vasorum inflatione.

2 Dolor interdum pulsatorius, inflammatorio similis, cum tumore quoque & inflammatione non gingivæ tantum, sed & partium vicinarum insigni.

3 Dolor ad aurium interdum interiorem cavitatem se extendens.

4 Sæpiissime dentis dolentis caries facile conspicienda.

#### IV. Subjectum.

2 Juniores Plethorici, quibus consuetæ narium Hæmorrhagiæ emanferunt.

2 Adulti, quibus Hæmorrhoides suppressæ fuerunt.

3 Fœminæ inordinato vel suppresso Mensium fluxu laborantes, aut gravidæ.

4 Rarius Viri, quorum uxores gravidæ sunt, quod aliquoties observavimus.

5 Fœminæ pariter ac mares, qui consuetas Venæsectiones & scarificationes neglexerunt.

6 Homines qui hæreditariam ad Odontalgiam, aut alios spasticos affectus habent dispositionem.

7 Qui dentifriciis acrioribus pro dealbandis & mundandis dentibus abutuntur.

8 Quibus dentes a carie sunt excavati, & vermiculi in cavitate illa generantur.

9 Quibus radices post evulsionem, aut cariem dentium in gingivis remanere.

#### V. Prognosis.

1 Odontalgia, ab erosione & carie dentium orta, non nisi palliativam curam admittit, nec etiam plenarie cessat, nisi dente evulso.

2 Odontalgia symptomatica vero facilius curatur.

3 Hæc tamen sæpius recurrens dentium erosioni anam præbet, ideoque idiopathicam parere potest.

4 In symptomatica interdum dimidia maxilla inflammatur, quæ nisi perite tractetur, facile exulcerationem ejusdemque cariem producere potest.

5 Si tumor in malis oboritur, Odontalgia solutionem indicat.

6 Symptomatica in febribus acutis & malignis cum stridore dentium contingens, mortem portendit.

7 Dentium dolor in fœminis quibusdam contingens, certum graviditatis signum præbet.

8 Qui hæreditariam ad Odontalgiam habent dispositionem, rarissime ab hoc malo penitus liberantur.

#### VI. Remedia.

1 *Generalia*: Venæsectio & Scarificatio in locis inferioribus, laxationes, pediluvia, frictiones, vesicatoria post aures, interna autem antispasmodica, Cinnabarina & lenia catarrhalia.

2 *Specialia* in

a. *Idiopathica* Odontalgia & quidem ex fonte pharmaceutico, Apophlegmatizantia: Rad. Pyrethri, Angelic. Lepath. acuti, Imperator. Ol. piper. Caryophyll. Buxi, Succini, Camphor. Tinct. Odontalgic. Mynsicht. Decoctum Nicotianæ, Nitrum denti immittenda, aut secundum quosdam Opiata: Rad. & Sem. Hyosc. Opium interne denti carioso inditum, vel quod securius gutt. aliquot Ess. dulc. gossypio exceptæ & denti applicatæ. Ex Chirurgico vero fonte, ipsa cariosi dentis cauterisatio igne vel actuali vel potentiali, aut ejusdem evulsio.

b. *Sympathica*.

1 Discutientia & resolventia: rad. irid. flor. Aristol. rotund. Chelid. maj. Herb. Verben. Agrimon. Perficar. Salv. Flor. Sambuci. Chamom. Camphor. sub epithematis forma malis imponenda, nec non paregorica ex Rad. Alth. lil. alb. Flor. Samb. Chamom. Meliloto, Summit. aneth. Sem. lini. Fœnugræc. Fic. ping. in lacte coquenda & instar fatus immediate dentibus applicanda, vel Decoctum hoc lactis calide in ore detinendum.

2 Sympathetica in utroque casu convenientia: Lignum fulmine tactum D. D. Stahlî usitatum pro dentiscalpio, nec non lignum fraxini in Solstitio collectum, Ossa bufonum rubicundorum eodem modo adhibita, bufones exsiccati malis impositi, dens ex maxilla mortui evulsus cum radice sua dentem dolentem tangens.

#### Formulæ Remediorum.

##### I. Pilulæ laxantes.

Rx. Extr. Hell. nigr. ℥ss. Ess. Absinth. q. s.  
Merc. dulc. gr. viij. M. f. pilul. pro 1. dosi.  
Resin. jalapp. gr. ij.







## I. Prognosis.

- 1 Cardialgia extra febres acutas contingens rarius periculosa est: in his vero sese sistens cum sudoribus frigidis & singultu, lethalis fere ominis est.
- 2 Gravius ea laborant, quibus orificium ventriculi superius maxime est sensibile, & qui ad convulsiones alias sunt proni.
- 3 A primarum viarum cruditatibus originem habens, seu Cardialgia Idiopathica per vomitum aut mitigatur, aut plane tollitur.
- 4 Quæ a lumbricis in stomacho habitantibus exoritur, pessima sæpe habet conjuncta symptomata, & periculosa confectaria.
- 5 Cardialgia Symptomatica, contumacior est Idiopathica, facile enim habitum assumit, & per intervalla redit, aliisque convulsivis affectibus, præsertim in sexu feminino, ansam dat.
- 6 Imminuitur autem aut solvitur per Hæmorrhoides vel Menfes, si ab horum vitiis originem traxit.

## II. Remedia.

- 1 Materiam crudam, viscidam & biliosam in primis viis stabulantem corrigunt atque incidunt absorbentia: Conch. præp. Oc.  $\overline{\text{ss}}$ . præp. Crystal. mont. præparat. Salina digestiva: Tart. Vitriolat. Arcandupl. Sal. Polychrest. Glas. digest. Sylvii. Vegetabilia item resolventia & aperientia: rad. Ari. Helen. Caryophyll. Pimpin. alb. Vincetox. Zedoar. Galang. Herbæ amaræ. Fumar. Cent. min. Card. ben. Absinth. Sem. Sinapi, Nasturt. Ex compositis Pulv. Stom. Birkm. Quercetan. Eff. Amara Hallens. Ess. Alexiph. Stahlii, Eff. Pimp. alb. Tinct. rubra Bontekoe &c.
- 2 Præparatam evacuant: Rhabarb. Senna, Pilul. Tart. Querc. e Gummi Ammon. Polychr. Hallens. Beccheri & Stahlii, Sal. mirabile Glauberi, Tart. Emeticus, Syr. Emet. Anz. Salæ, Clysteres &c.
- 3 Stasin sanguinis in vasis Venæportæ factam resolvunt, motumque partium inæqualem in ordinem redigunt Diaphoretica fixa, Cinnabarina, Nitrosa, Salia neutra, Absorbentia cum interpositis Tincturis Alexipharmacis secundum D. Stahlii mentem compositis, sufficiens potus, motus corporis continuatus, non neglectis modo commendatis per epicrasin laxantibus & clysteribus.
- 4 Sanguinem derivant & imminuunt hirudines ano applicitæ, Venæsectio in pede celebrata, pediluvia.
- 5 Partibus relaxatis Tonum & robur afferunt partim supra laudata stomachica, partim etiam martialia & inter hæc præcipue Tinct. Vitriol.  $\mathcal{J}$ is Ludovici rite parata cum Eff. Gentian. Cort. Aurant. Absinth. aut Adianthi albi combinata. Externe vero sacculi & epithemata ex herb. menth. puleg. matricar. sambuc. Origan. aneth. absinth. Sem. anis. fœnic. cum camphora loco dolenti imposita, utpote quæ simul dolori imminuendo inserviunt.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulv. Stomach. digestivus.

Rx. Pulv. Stom. Birkm.  $\mathcal{Z}$ ss. Sem. Sinapi ana.  $\mathcal{Z}$ j.  
Tart. Vitriolat. M. dos.  $\mathcal{D}$ j. ad  $\mathcal{Z}$ ss. bis vel  
Cort. Aurant. ter in die.

## 2 Pulvis emeticus.

Rx. Rhab. elect. gr. xv. Crystal. Tart. gr. vj.  
Tart. Emet. gr. ij. vel iij. M. pro 1. dosi.

## 3 Alius.

Rx. Pulv. rad. Ipecac.  $\mathcal{D}$ j. ad Sal. Absinth.  $\mathcal{D}$ ss.  
 $\mathcal{Z}$ ss. M. pro una dosi.

## 4 Pulvis temperans.

Rx. Oc.  $\overline{\text{ss}}$ . præparat. Tart. Vitriol. ana.  $\mathcal{D}$ j.  
 $\mathcal{D}$ ij diaph. Cinnab.  $\mathcal{D}$ ij.  $\mathcal{D}$ ss.  
Nitr. depur. M. dos.  $\mathcal{D}$ j. bis vel ter de die.

## 5 Essentia discutiens.

Rx. Essent. Alexiph. Stahlii. M. dos. 30. 40. gutt. bis de  
Pimp. alb. ana.  $\mathcal{Z}$ ss. die in jusculo vel Thee.

## 6 Alia roborans.

Rx. Tinct. Vit.  $\mathcal{J}$ is Lud.  $\mathcal{Z}$ ij. M. dos. gutt. 30. dimid. hor.  
Eff. Absint.  $\mathcal{Z}$ j. ante prandium & cœnam.

## 5 Alia.

Rx. Tinct. Vitr.  $\mathcal{J}$ is Ludov. M. dos. ut supra.  
Eff. Amar. Hall. ana.  $\mathcal{Z}$ j

## 8 Epithemia Anod-discut.

Rx. Theriac. Androm.  $\mathcal{Z}$ j. Dissolv. in Ag. Reg. Hung.  
Succin. præparat.  $\mathcal{Z}$ ss. & impone cum linteaminibus loco dolenti.  
Camph.  $\mathcal{D}$ ss.  
Croc. Or. gr. vj.

## 9 Aliud roborans.

Rx. Crust. pan. madefiat ryophyll. & calide impo-  
Vino rubro calefacto asperg. ne.  
pulv. Cinnam. piper. ca-  
VII. Methodus medendi.

- 1 Cum in Idiopathica Cardialgia vitium semper in primis viis hæreat; ideo materia peccans ante omnia incidenda, corrigenda atque præparanda est, quod partim secundum temperamentum constitutionem vel per stomachica temperatiora vel fortiora nimirum sincerum Piper, Zinzib. Galang. Zedoar. Sem. Sinapi &c. partim per absorbentia acrimoniam imbibentia atque incrassantia fieri potest.
- 2 Evacuatio post materiæ resolutionem atque præparationem in usum vocanda est; fit hoc in robustioribus & ubi actualis salubra in ventriculo hospitari cernitur, per securum Emeticum, in valetudinariis vero per laxantia incidentia per epicrasin agentia, nimirum vel nodulos laxativos, vel Pilulas Tartar. Quercet. e gummi. Ammoniac. Stahlii &c. subjunctis postea per tempus adhuc aliquot stomachicis incidentibus atque digestivis.
- 3 Ubi vero justa vermium suspicio adest, adhibeatur laxans mercuriale, aut colocynthiacum & subjungantur anthelmintica appropriata.
- 4 Sanguineo-Cholericis vel ipsis Cholericis, qui turbis Venæportæ, Hypochondriaco-Hystericis vexantur, succurritur interne optime per temperantia Nitrosa, absorbentia, Cinnabarina, Diaphoretica fixa, nec non unum atque alterum clysterem emollientem vel lenia laxantia.
- 5 His etiam semper consulendæ & promovendæ sunt evacuationes artificiales & spontaneæ, secundum loca per quæ ordinarie fieri consuevere, non neglectis quoque pediluviiis.
- 6 Externe tam pro discussione, quam mitigatione dolorum in utroque malo locum habent sacculi & epithemata nec non emplastra ex herbis & gummatibus stomachicis, discutientibus & resolventibus parata.
- 7 Post materiæ evacuationem & mali mitigationem in usum trahere convenit noborantia & martialia, Tinct. Vitr.  $\mathcal{J}$ is Lud. Essent. Millefol. Cort. Aurant. Absinth. Lign. & Aloes &c.
- 8 Diætetice commendanda alvi libertas, cibi atque potus laudabiliores, externus calor.

## VIII Cautela Practicæ.

- 1 Materia nisi prius mobilis reddita fuerit, insufficientes & incompletos vomitus post se trahit, quæ materiæ tantum commovendæ, non vero excernendæ inserviunt.
- 2 Minime autem conveniunt Vomitoria Hypochondriacis & Hystericis aut qui turbis Venæportæ expositi sunt; hi enim majores flatulentias, aut alia mala reportant.
- 3 Quod si calidiora remedia stomachica aut carminativa his præscripseris, anxietates præcordiales augentur & universum malum incrementa potius, quam detrimenta sumit.
- 4 Opiata in enormiori etiam dolore non semper tuta sunt, quod si tamen circumstantiæ eorum, usum suadeant, combinare eadem præstat cum Carminativis, Stomachicis & Aromatibus.



## CAPUT SEXTUM.

## De Colica.

I. *Definitio.* **C**olica est dolor sensibilissimus ab intestinorum relaxatorum & a flatibus expansis inflatorum spasmodica contractione originem trahens.

II. *Differentia.*

- 1 Ratione materiæ morbiæ est vel *flatulenta*, vel *pituitosa*, vel *biliosa*, vel *hæmorrhoidalis* sive sanguinea.
- 2 Ratione loci affecti  
a vel *Ilaca*, vel *Colica* stricte sic dicta;  
b vel *Idiopathica*, vel *Sympthica*, uti *Nephritica* & *Hysterica*, de quibus suo loco agetur.
- 3 Ratione gradus, alia est leniter tantum *spastica*, alia *convulsiva*.

III. *Signa Generalia.*

- 1 Dolores acerbissimi infimum ventrem, ejusque vel sinistram vel dextram, ut plurimum vero mediam partem supra umbilicum occupantes, modo terebrantem & rodentem, modo gravativum & distensivum, modo urentem & pungentem sensum inducentes, & quidem per paroxysmos quasi ægrum afflicientes.
- 2 Anxietas & angustia præcordiorum cum vagis caloribus quandoque etiam intercurrentibus horripilationibus conjunctæ.
- 3 Murmura flatulenta cum ructibus, quos sæpius etiam nausea & vomitus comitantur.
- 4 Alvus ut plurimum maxime constricta, quandoque tamen cum Diarrhœa torminosa soluta.
- 5 Urina ut plurimum tincta ac spumosa, rarius suppressa.
- 6 In graviore vero malo cardialgica & singultuosa confectaria.

*Signa Specialia.*

- 1 *Flatulente & pituitose*: turgida ventris inflatio, ructus, flatulentia, borborygmi, dolores tensivi & gravativi, arctissima ut plurimum alvi constrictio, ut sæpius ne quidem fœtulæ clysteris aditus pateat.
- 2 *Biliosa*: concursus majoris caloris cum sensu quasi urente in abdomine, torminum atque flatuum cruciatus insignes pungentes & scindentes, absque tamen tanta abdominis inflatione, imo potius cum ejusdem constrictione, umbilici vero admodum sensibili retractione: quo major autem biliosæ materiæ concursus adest, eo magis alvus ad Diarrhœam torminosam disposita est, ac eo major etiam æstu torquentur ært, fiti, vigiliis, inappetentia, conatibus vomendi, imo actualibus vomitibus biliosis, intercurrentibus sudoribus frigidis, anxietatibus præcordialibus, quos sæpius singultus excipit.
- 3 *Hæmorrhoidalis* sive *Sanguinea*: temperamentum ægri Sanguineo Cholericum: ætas juvenilis, antecedentia hypochondriaco-flatulento-arthritica pathemata, hæreditaria dispositio ad Hæmorrhoides a parentibus contracta, concurrens, cum torminibus ad modum exquisitis, ventris constrictio & coarctatio quasi circa mesenterium & Venæ portæ cum conatu renescens, imo actuali excretionem paucæ materiæ mucidæ sanguine sæpius tinctæ.

IV. *Subjectum.*

- 1 Colicam *flatulentam* facile incurrunt diætâ minus observantes, nimirum abdomen & pedes liberiori aeri & refrigerationi exponentes, post assumptos cibos pingues potum frigidiorum avidè ingurgitantes, cibis flatulentis, viscidis, facile fermentescensibus assueti.
- 2 *Biliosa* vero facile exponuntur personæ Cholericæ, iracundæ, post susceptam iracundiam statim cibum & potum assumptes, & quidem crudiorum, viscidiorum facile fermentescens.
- 3 *Hæmorrhoidalem* tandem frequentius experiuntur viri juvenes Sanguineo-Cholericæ, Hæmorrhoidum in-

completa molimina habentes, vel fluentium suppressione laborantes, hypochondriaci, arthritici, calculosi, aut alii quæque Plethorici Venæsectionem in pede negligentes ut & fœminæ Mensium defectum vel suppressionem patientes hysterica, quæ tamen colica magis hysterica audit.

4 Deinde etiam doloribus colicis facile affliguntur puerperæ a neglecta ligatura abdominis post editum partum intumescens ventris reportantes.

5 Ac tandem Herniosi, repositionem herniæ negligentes.

V. *Pronosis.*

- 1 Quo frequentius aliquis Colicis corripitur doloribus, eo citius a leviori causa revocatur, & in consuetudinum quasi & habitum degenerant.
- 2 Colica flatulenta semper minoris est periculi, quam biliosa & convulsiva.
- 3 Si colica invadat cum actuali horrore & subsequente æstu, inflammatorium quid vel minatur, vel jam indicat.
- 4 Vomitus biliosus, aut alii continui nisi ortum ab ingestis traxerint, alvo pertinaciter obstructa, facile Iliacum affectum producant.
- 5 In sexu fœminino conatus vomendi fortiores, aut etiam actuales vomitus simplices, sequitur quandoque Vomitus cruentus.
- 6 Quo magis dolor ingens petit inferiora abdominis sive regionem hypogastricam, eo facilius metueda est Passio Iliaca.
- 7 Colicam biliosam, nisi evacuetur aut temperetur materia acris, facile excipit vera Cholera, aut Causodes ventriculi & intestinorum inflammatio.
- 8 Colicam biliosam sæpe tollit vomitus vel diarrhœa biliosa statim ab initio accedens, quatenus causam morificam removet; inflammationi vero jam factæ superveniens conatus vomendi actualis ejectio materiæ nigricantis, mali est omnis.
- 9 Colicam biliosam interdum excipit Icterus.
- 10 Nihil facilius Colicæ supervenit quam Paralysis, imprimis post abusum Opiatorum.
- 11 In colica pertinaci si sudor copiosus & universalis superveniat, labefactatis & resolutis viribus, brevi Paralyin expectato. *Bagliv.*
- 12 In Colica biliosa succedit frequenter Aphonia & vox rauca, & per totum fere morbi decursum durat. *Idem.*
- 13 Incrementa non retineri dolorem locum mutare, nec non intermittere, salutem brevi promittunt. *Idem.*
- 14 Dolor colicus quandoque transit in abscessum, quandoque in Hydropem. *Idem.*
- 15 Singultus Colicæ citra consuetudinem superveniens, grave periculum indicat.
- 16 Colica Hæmorrhoidalis salutariter solvitur per fluxum Hæmorrhoidum aut excretionem materiæ mucosæ viscidæ.
- 17 Si vero materia regurgitat ad viscera hypochondriorum, facile sequuntur Hædici & Ascitici affectus.
- 18 Colica ab Arthritide retrograda aut imprudenter suppressa ortum trahens, mali semper est omnis, quia intestinorum inflammationi facile occasionem præbet.
- 19 Colica Herniosorum facile transit in Ileum, nec nisi repositis mature intestinis cessat.
- 20 Omni Colicæ supervenientes convulsiones malæ sunt.

VI. *Remedia Generalia.*

- 1 Spasticam intestinorum tensionem & tractionem demulcent, materiamque morificam, si quæ adest, educunt clysteres carminativi, emollientes, & pro re nata acriores stimulant, nec non laxantia exilio dulci, Senna, Rhabarb. Sale mirabili Glaub. Cathart. amar. &c.
- 2 Materialem causam discutiunt & corrigunt *Interne* vel Carminativa stricte sic dicta: Essent. Carminat. Wedelii, Tinct. Cort. Orum, Liq. C. C. Succin. Spir. Anis. Fœnic. Salis Ammon. anisat. vel temperantia: Oc. 36. præp. Crystall. mont. Conch. præp. 3. diaph. Cinnab. 3ij, Arcan. duplic. Tart. Vitriol. Pulv. Be-



Bezoard. Hallenf. Tinct. Salin. D. Richt. Spir. Nitri. dulc. interpositis, si necessitas exigat, gelatinosis. *Externe* nervina, sacculi carminativi ex speciebus odoratis: Rad. Ireos, Cyper. rotund. Angelic. Herb. Menth. Matriac. &c. Flor. Chamom. Sambuc. &c. Sem. Anis. Aneth. Fœnic. Linimenta item ex Oleo coctis: Irino, Castor. Chamom. Laurin. Oleis destillatis Fœnic. Menth. Carv. Aneth. Absinth. Chamom. vel Balsamis ex his cum Ol. Nuc. Moschat. expr. Zibeth. Axung. Castor. Emplastrum Stomachalia, calor & fœtus abdominis.

3. Laxatum partium tonum roborant: Salia volatilia, Eff. Vitriol. & is Ludov. Cort. Ont. aliaque Carminativa & Stomachica temperatiora interne adhibita, externe vero modo dicta nervina & roborantia.

*Specialia in Colica flatulenta & pituitosa.*

1. Emollientia, Carminativa & si necessitas exigat, acriora stimulantia, sub Clysterum forma ordinata.

2. Laxantia interna: Senna, Rhabarb. Sal. Cathart. amar. vel mirabile Glauberi.

3. Discutientia & Carminativa calidiora, si nihil sanguinei subest: Rad. Ari, Helen. Irid. Florent. Gentian. rubr. Pimpin. alb. Imper. Zedoar. Galang. Calam. arom. Acori, Absinth. Cent. min. Cort. Winteran. Sem. Carv. Anis. Fœnic. Sinap. Erucae, sincerum Piper, Tinct. Cort. Ont. Spir. Fœnic. Anis. Liq. C. C. Succin. Spir. Tart. Essen. Dulcis Hallenf. Ordin. & Concentr. Eff. Carmin. Wedellii, vel circumstantiis suadentibus temperatiora absorbentia, diaphoretica fixa, Cinnabarina cum momento Nitri, si æstus adest, jungenda Salia neutra, Spir. Nitri dulc. Mixtur. simplex, Tinct. Salin. D. Richt.

*In Colica biliosa.*

1. Lenientia, lubricantia, mucilaginoso pingua, sub Clysterum forma præscripta, Decocta caputim vervecum aut pedum vituli, vel olea expressa tali modo usurpata.

2. Laxantia ex Manna cum Ol. amygd. dulc. in jusculo exhibita, Senna, Rhabarb. Liq. Terr. fol. Tart. Crystall. Tartari &c.

3. Temperantia & absorbentia ex Nitro, Crystall. mont. Matr. perlar. Conch. præp. Oc. & g. diaph. Cinnab. nativ. & g. ij, Spir. Nitr. dulc. in portione Carminativa temperatiori ordinata.

4. Discutientia & roborantia leniora: Interne Tinct. Alexiph. Stahlî in jusculo, Mixt. Simpl. Aq. fœnic. chamom. ad flat. sine vino, Syr. Cort. Ont. g. diaph. Tinct. Salin. Richterî, quæ temperat. & discutit. *Externe* fœtus & in tegumenta abdominis, Epithemata sicca ex avena tosta, flor. Sambuc. Chamom. Matricar. Sem. Carv. bacc. Lauri &c.

*In Colica Hemorrhoidali sive Sanguinea.*

1. Clysteres paregorici ex flor. Chamom. Verbasco. Melilot. Ol. Lini, Olivar. Verbasco. Lacte & Nitro sæpius repetiti, & ubi necessitas requirit, per fortio-rem Salis Gemmæ dosin exstimulati.

2. Affluxum sanguinis inhibentia & imminuentia; Hirudines ano applicatæ, Venæsectio in pede efficacius & securius in primo principio celebrata.

3. Demulcentia atque temperantia: Ol. Amygd. dulc. in jusculo adhibitum, pulveres Diaphoretico-absorbentes, Cinnabarini, Nitrati.

4. Discutientia: Diaphoretica fixa, Effent. Alexiph. Mixt. Simpl. *Externe* fœtus calidi, abdomini applicati v.g. Vesica lacte vel aqua calida repleta, catulus vivens, lateres calefacti, Spir. Vin. Camph. Epithemata item & linimenta ex Ol. supra dictis speciatim Laurino & Nuc. Mosch. Fœtus intestini recti ex Ol. Verbasco. Cataplasmata ex Verbasco. & Meliloto, cui insideant, necesse est.

5. Lenia Anodyna in malo vehementiori: Mass. Pil. e Cynogl. Theriac. Cœl. cum temperantibus pulveribus versus somni tempus exhibita; & imprimis Eff. Dulc. Hallenf. sæpius data.

6. Tonica post remissionem mali exhibenda: Tinct. Vitriol. & is Ludov. Effent. Millefol. Mixt. tonica Stahlî, &c.

# Formula Remediorum.

## 1 Clyster, acrior.

Rx. Spec. Emoll. & Carm. Ol. Chamom. ʒvj.  
Fol. Nicot. ana. mls. Vitell. ov. num. j.  
Coq. in f. q. Aq. font. Tart. Emet. gr. ij.  
Colat. Rx. ʒj. dissolv. M. calide applicandus.  
Elect. Lenitiv. ʒj.

## 2 Alius Paregoricus.

Rx. Rad. Alth. Rx. ʒj. adde  
Lil. alb. ana. ʒj. Ol. Olivar. ʒj.  
flor. Chamom. Verbasco. Mel. Rosat. ʒjss.  
Melilot. ana mls. Vitell. Ov. n. j.  
Coque in f. q. lactis, Colat. M. d. ad Lagenam.

## 3 Potio Laxans.

Rx. Passul. minor. ʒss. Colat. Rx. ʒijj. dissolv  
Rhab. elect. ʒjss. Mann. Calabr. ʒj.  
Cinnam. acut. ʒj. Clarificetur pro j. dosi.  
Infunde in f. q. Aq. font.

## 4 Alia.

Rx. Mann. Calabr. ʒjss. & sperm. Cet. rec. ʒss.  
c. Ol. Amygd. dulc. ʒij. in jusculo assumend.

## 5 Essent. Carmin. temper.

Rx. Tinct. Salin. Richterî horis.  
ʒjss. dosi 40. gutt. sing. 6.

## 6 Essent. Carminat. fortior.

Rx. Tinct. Cort. Ont. vel Tartari ʒjss. M.  
Eff. Carmin. Wedell. ʒj. bis vel ter de die ad gutt.  
Spir. Sal. Ammon. anis. 30.

## 7 Alia roborans.

Rx. Spir. Anis. M. usus & dosi ut supra  
Nitr. dulc. ana. ʒjss.

## 8 Alia anodyno-roborans.

Rx. Eff. Alexiph. Stahlî. M. singul. 4. vel 6. horis  
Dulc. Hallenf. ana. ʒj. gutt. 20.

## 9 Potio Carminat. temperata.

Rx. Aq. Fœnic. Extr. Cort. Chacar. ʒss.  
Chamom. ana. ʒjss. Syr. Cor. Ont. ʒijj.  
ad flat. f. v. ʒjss. M. sing. 3. horis cochlear.  
Spir. Nitr. dulc. duo.  
Anis. ana. ʒjss.

## 10 Sacculus.

Rx. Herb. Chamom. Aven. tost. ʒjss.  
Menth. crisp. Sem. Carv. ʒjss.  
Absinth. Incis. & contus. include saccu-  
flor. Sambuc. ana. mj. lis calide ventri imponendis.

## 11 Balsamus Anticolicus.

Rx. Ol. N. M. expr. ʒjss. Citri gutt. ij.  
destill. Tacamah. ʒss. M. Scorbic. Cordis, illinen-  
Menth. dus.  
Absinth. ana. gutt. vj.

## 12 Linimentum.

Rx. Ol. Chamom. Menth. ʒj. M.  
Aneth. ana. ʒjss. inungatur adomini circa  
destill. Anis. umbilicum.  
Fœnic.

## VII. Methodus medendi.

1 In omni Colica præstat alvum habere apertam, id-  
eoque per Clysteres primo emollientes & carmina-  
tivos, postea, si hi nil juverint, per fortiores sti-  
mulantes res tentanda est.

2 Natura etiam semper deorsum ducenda est, ne mo-  
tus peristalticus invertatur, aut inflammatio intesti-  
norum eo facilius contingat, cui rei inserviunt Pur-  
gantia leniora: Mann. Rhabarb. & dulc. Cryst. Tart.  
Liq. Terr. fol. Tart. & Emollientia, Ol. Amygd. dulc.  
Olivar. recens; quæ si retineri nequeant, Pil. Cochleæ  
a Sydenh. commendatæ, aut Pil. Stahlî in aquis car-  
minativis solutæ exhibeantur.

3 Si pituitosa materia subit, materia incidenda, di-  
scutienda & corrigenda est per Rad. Ari, Helen. Irid.  
Flor. Zedoar. &c. Tart. Vitriolat. Arcan. dupl. Terr.  
fol. Dart. & absorbentia Conch. Cryst. mon. Oc. &  
præp. Eff. Cort. Ont. Carminat. Wed. Spir. Anis. Ce-  
ras. nigr. Tartari, Liq. C. C. Succin. vinum Malva-  
ticum, Hispan. Extract. Pimpin. alb. Cort. Chaca-  
rill. nec non Topica externa. Herb. Menth. Ab-  
sinth. Chamom. &c. Sem. Carv. fœnic. &c. Spir.  
Vin.



Vin. Camph. Linimenta, Balfama, Emplastra.

4 Ubi vero biliosa materia malum fovet, præcipitania, diluentia & lubricantia locum habent: Conch. Cryst. mont. præp. Gummi Arab Tragac. Gelatina C.C. Nitrofa &c. non neglectis internis & externis temperantibus carminativis.

5 Motus febriles, si qui concurrunt, imminuendi & demulcendi sunt per salina, & diaph. Bez. mineral. Tinct. Salin. Richteri, Nitrum, gelatinosa, emulsiva, & interposita Alexipharmaca leniora.

6 Dolorum vehementia imminuatur per Laud. liquid. Sydenh. Diafcord. Fracastor. M. Pil. e Cynogl. Pilul. Starckej caute in usum vocata, impr. vero Effent. Dulc. Hallens.

7 Tonns partium relaxatarum post evacuatam materiam iterum restituatur per Rad. Gentian. Herb. Chamom. Rutæ, fol. Bet. interne assumpta, nec non usum Tinct. Vitrioli & cum carminativis lenioribus conjunctæ, aliaque Stomachica temperatio- ra in usum vocata.

8 Quo magis sanguinei quid concurrat, eo minus tam curative in principio curationis, quam præservative extra paroxysmum Venæsectio in pede negligenda est, utpote quæ sensibilissimum ut plurimum edit effectum, si malum a Mensibus vel Hæmorrhoidibus locum habuerit.

9 Inæqualis intestinorum motus a refrigeratione externa originem habens, in ordinem reducat per internum haustulum Vini Hispanici, aut Spir. Fœnic. vel Anisi: externam vero calidorum laterum applicationem ad plantas pedum & Epithematis sicci calefacti impositionem ventri.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1 Purgantia imprimis fortiora, alvo per clysteres nondum aperta, vel nihil operantur, vel per os iterum ejiciuntur, eo minus autem talia præscribenda sunt, quo magis jam concurrunt vomitus & febris.

2 Carminativa nunquam commenduntur antequam viæ per clysteres vel laxantia sint referatæ; tunc autem locum habere possunt in Colica flatulenta & pituitosa, non item in aliis speciebus.

3 Cave ne Opiata copiosius in Colica exhibeas, solet enim post Opiata magnus sudor supervenire & exind. Paralysis. Bagliv.

4 Ante usum Opiatorum semper enema injiciendum est. Diaphoretica etiam cum opiatis mixta felicissima sunt in Colicis. Idem.

5 Pectori & ventri omnia frigida sunt inimica: caveas igitur ab iis in talium partium affectionibus. Idem.

6 In Colica biliosa & sanguinea quam maxime evitanda sunt Carminativa calidiora, facillime enim inflammatio intestinorum exinde originem sumere potest. Lenissima igitur methodus hic tutissima est.

7 Quo magis autem subjecta sunt frigida & malum vel a refrigeratione externa, vel pituitosa & cruda Diæta ortum habet, eo minus talia nocent, sed potius usum habent non spernendum.

8 In Colica Sanguinea & Hæmorrhoidali magis ad sanguinem, quam actualement materiam pituitosam in intestinis hærentem, respiciendum est; ideoque magis temperantibus quam calidioribus insistere decet.

9 In hac, irritis sæpe aliis, eximium usum præstiterunt Venæsectio in pede, Hirudinum applicatio ad vasa hæmorrhoidalia, Clysteres autem aliquoties antea repetendi sunt & 3. vel 4. intra 8 vel 12. horas injiciendi; tanto magis, si primis vicibus feces crassiores solum eductæ fuerunt. Priores autem sint magis abstersivi, acriusculi, salini, posteriores magis emollientes.

10 In fœminino quoque sexu si malum a sanguine dependeat, Venæsectio in pede haud omittenda est, conjunctis Nitrosis & specificis ex Millefolio.

11 Castoreum vero interne assumptum angustias creat & nauseam, magis ergo in Hysteris convenit, sed externe.

12 Regimen diaphoreticum, sine alvi solutione in Colica biliosa, bilem in artus ducit, in cæteris anxietates auget, lenis vero diaphoresis juvat.

13 In biliosa quoque & sanguinea a cibis siccioribus assatis, aromatizatis, potu vinoso abstinendum est, quæ tamen flatulentæ & pituitosæ sæpius auxilium præstant.

#### CAPUT SEPTIMUM.

##### De Malo Hypochondriaco-Hysterico.

I. *Definitio.* **M**alum Hypochondriaco-Hystericum est dolor tensivus atque compressorius satis acerbus, sub hypochondriis præcipue occurrens, variis etiam aliis consensualibus symptomatibus stipatus, a congestionem sanguinis abundantis & spissioris, ejusque inæquali per Venamportæ motu, ortum trahens.

II. *Differentia* ratione sexus:

a Hypochondriacum malum audit, quando viros aggreditur & Natura ad Hæmorrhoides respicit.

b Hystericum vero, quando feminæ, quæ pluribus & acerbioribus symptomatibus sunt obnoxia, eodem vexantur, & Mensium ataxia subest.

c Scorbutus non confundendus cum malo hypochondriaco-hysterico, utpote qui & causis & Symptomatibus suo loco recensendis, ab eodem differt.

III. *Signa* (a) mali Hypochondriaci sunt,

1 Frequentes tensiones & pressiones, imo interdum acerbiores dolores sub costis, sæpius tamen in latere sinistro, cum inflatione quandoque Lienis, quam dextro hypochondrio, aut certe in hoc magis transitorie, & cum volutico æstu, imprimis capitis, & rubore faciei stipati, ast

2 Sine formali febre, aut alio constanti typo, sæpe tamen & multum per intervalla infestantes, ac præcipue post errores diæteticos atque pathemata animi recrudescentes.

3 Appetitus vagus, communiter tamen auctior, & satis avidus, ad frigida magis quam calida inclinans, cum potu pauciori.

4 Alvus mox fluidior, mox pertinaciter adstricta, communiter tamen strictior.

5 Urina in paroxysmis gravioribus emissa fere limpida, extra hoc tempus vero crystallos Salinas tartareas lateribus vitri affigens:

6 Ructus, borborygmi, flatus sub pastu & post eundem, cum palpitatione cordis familiares.

7 Frequentia, suspiria & angustia præcordiales, imo ipsius animi angores & non raro deliria anxia.

8 Raro cum exquisito dolore capitis, sed potius vertiginosa & gravativa ejusdem perturbatione, atque conitandi, reminiscendique veluti impotentia conjuncta.

9 Somnus laboriosus & profundus, cum insomniis anxiiis stipatus.

10 Lassitudo membrorum & fastidium, imo fere ineptitudo ad consueta negotia.

11 Molestia circa scrobiculum cordis & sensus satis acerbus compressorius in ipso ventriculo post pastum,

12 Frequens in quibusdam exspitio pituitæ, præcipue jejuno ventriculo, quandoque tamen & eodem repleto.

13 Non raro etiam pertinacissimi colici & iliaci, præprimis sub calidorum carminantium usu, cruciatus.

14 Solitudinis amor, tristitia, suspicio sæpius absque notabili causa intercurrentes.

b *Hysterici*: sunt pathemata modo recensita tantum non omnia, sed fere acerbiora, &

cum sensibili, & sæpe tactu externo perceptibili, volutatione globi in abdomine inferiore, hujusque ad præcordia & fauces ascensiones, ac si nucleus, vel



vel res dura œsophago inclusa esset, præcedentibus ut plurimum pandiculationibus & oscitationibus ac respirationis temporaria interceptione aut strangulatione, ac si laqueus collo injectus esset, quem sensum non raro insignis suffocatio sequitur, ita ut notabile aliquando tempus sine pulsu & respiratione instar mortuorum jaceant.

2 Appetitus vagus quandoque ad absurda inclinans, plerumque tamen prostratus, cum intercurrentibus vomitibus, (aut certe vomendi conatibus) materiæ viridis, flavæ, seu biliosæ, sæpius acidæ, interdum peregrini saporis.

3 Gravissimæ anxietates Cardialgicæ, cum spasticis motus Tonici exacerbationibus veras convulsiones quandoque repræsentantibus, quas vulgo Epilepsiam uterinam vocant, quandoque conjunctæ.

4 Concurrentes dolores capitis vertiginosi, tendentes ac contusorii in infimo præcipue occipite, aut fere hemisphericis in vertice, aut temporibus, ac si clavus infixus esset, aut potissimum frigoris exquisiti, exiguum circumferentiam obfidentis, sensum inferentes.

5 Evidentioribus Mensium ataxiis, aliisque uteri vitiis stipati.

#### IV. Subjectum.

Facilius & frequentius huic malo obnoxii sunt

1 Personæ temperamenti Melancholici, aut Sanguineo-Melancholici.

2 Status corporis plethorici.

3 Vitæ desidii, speculationibus indulgentes.

4 Potui pariori assuetæ, satis tamen edaces.

5 Juvenes intra annum 18. & 25. constituti, moliminibus hæmorrhoidalibus incompletis obnoxii, aut fluentium suppressione laborantes.

6 Fœminæ Mensium aut lochiorum varias perturbationes passæ aut cessationes expertæ, mœrori, aut iracundiæ multum deditæ.

7 Ab agili vitæ genere in otiosum transeuntes.

8 Hæreditariam dispositionem a parentibus possidentes.

9 Diætæ crassa, flatulenta, viscida usi.

10 Animi pathematibus obnoxii v. g. concupiscentiæ variorum ciborum, terrori &c. nec non summa sensibilitate præditi; unde fœminæ hystericæ ab ardore suaviorum, Moschi, Zibethi, Ambræ, rosarum facile in paroxysmum incidunt.

#### V. Prognosis.

1 Pathemata hypochondriaca plerumque plus formidinis, quam periculi afferunt.

2 Majoris vero periculi est malum Hypochondriacum in senioribus, quam junioribus: quippe ineunte jam virili ætate, præsertim vero mutata infimul diætæ & vita sedentaria, sponte eodem liberari solent.

3 Fluxum hæmorrhoidalem passionibus hypochondriacis supervenire bonum est; ast passiones hypochondriacas hæmorrhoidibus subsistentibus, vel suppressis, succedere, malum.

4 Malo Hypochondriaco facile conjunguntur, vel succedunt infarctus viscerum & scirrhi.

5 Non raro etiam e malo hypochondriaco oritur Scorbutus satis diuturnus & rebellis, remediis non facile cedens, nisi mutetur vitæ genus sedentarium.

6 Hystericum malum non solum longe gravius affligit, sed & longe difficilius curatur, quam hypochondriacum.

7 Utrumque malum facile sequitur Melancholia Hypochondriaca, ut plurimum cum lienis infarctu conjuncta.

8 Sicuti Hæmorrhoidum fluxus Hypochondriacos insigniter sublevat, ita Mensium fluxus ordinatus ad Hystericum malum imminuendum, multum contribuit.

9 Quo magis in fœminino sexu circa lienis confinia pathemata urgent, eo major de Vomitus cruenti eruptione suspicio habenda est.

10 Quando vero in inferiore abdomine incommoda magis sentiuntur, res pro sexus diversitate vel ad hæmorrhoides, vel menses tendit.

11 Quo frequentiores occurrunt vomendi conatus, absque actualibus vomitibus, eo magis de Vomitione cruenta timendum est.

#### VI. Remedia.

1 Generalem sanguinis imminutionem præstat Venæsectio in brachio; speciali magis ejusdem derivationi inservit Venæsectio in pede: apertio hæmorrhoidum per hirudines: fluxus menstrui in feminis promotio.

2 Sanguinis spissioris dilutionem & attenuationem promovent potus largior, & motus proportionatus, sibi invicem prudenter subordinati. Porro remedia aperientia, resolventia & antiscorbutica: Rad. Helen. Caryoph. Tarax. Pimpin. alb. Dictamn. Herb. Fumar. Capill. Qis. Card. Bened. Epithym. Cuscut. Scopolendr. Summit. Cent. min. Absinth. Cochlear. Nasturt. &c. Succ. horum & extracta, Guinmata temperatoria: Hederæ, Junip. Ammoniac. Galban. Salia item digestiva Tart. Vitriolat. Tart. Tartarisat. Arcan. duplic. Sal Polychr. Glaferi, Lid. Terr. fol. Tart. Tinct. Tart. acrior, Resolvens nostra.

3 Spasticas partium affectarum stricturas demulcent Nitrosa cum Cinnabarinis, nec non gelatinosis & emulsivis; porro blanda laxantia, & imprimis Eff. Antihyp. Hallens. & enemata emollientia oleosa.

4 Rustibus præoccupandis & stasibus discutiendis inserviunt, tum modo laudata Salia digestiva & laxantia, in specie vero Pilul. Stahl. Polychr. Hallens. Beccherianæ & Balsam. Viscerales nostræ; tum ita dicta Carminativa, v. g. Flor. Chamom. in substantia, vel infuso aut decocto usurpati, Eff. Cort. aurant. rad. Pimp. alb. Gentianæ, Spir. Anisi, vel alia spiritiosa & aromatica post pastum modice sumpta.

5 Legitimum alvi succum promovent potus sufficiens, Tart. Tartarisatus, Terra fol. Tartar. vel Salia digestiva versus pastum exhibita, Eff. Helleb. nigr. saturatio ad gutt. 40 interdum assumenda, cibi lubricantes, v. gr. pruna Damascena, rapæ exsiccatæ &c. ad molliem coctæ, cremor hordei &c. radix Altheæ subinde masticata; porro lenia laxantia v. g. Noduli laxativi, Sal. Cathar. Amar. sive Epsom. Effent. Antihyp. Hallens. Pil. Balsam. Visceral. Argentini. e Gum. Ammon. Tart. Quercet. &c.

6 Tonum fibrarum & vasorum, per sanguinem restagnantem nimis distentorum restituunt, ac roborant Martialia, v. g. limat. ♂ is tenerior cum paucis Cinnamon & saccharo, occultandi gratia, exhibita, crocus ♂ is apertiv. ♂ iatus, Croc. ♂. Sulphuratus Ludovici, crocus ♂. cum Salibus Michaelis, Tinct. ♂. cydoniata cum succo pomor. Borsdorff. parata, Tinct. ♂. Helleb. wedelii, Tinct. Vitriol. ♂. Ludov. cujus in hoc affectu encomia vid. in Histor. morb. Uratislav. pag. 27. porro acidulæ, & pleraque vulgo splenetica dicta, imprimis Effent. Adianth. alb. & Millefol. denique Salia volatilia cum Tincturis alcalicodiueticis mixta.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Nodul. aperitivo-laxans.

R. Rad. Cichor.	Fol. Senn. f. st. ʒj.
Apii	Rhab. elect. ʒij.
Polypod. qv. an. ʒss.	Agar. mund.
Herb. Capill. Qis.	Fibr. helleb. nigr. an. ʒiss
Cuscut.	Crystall. Tart. ʒij.
Fumar. ana. mss.	Lacis. contus. cum vino
Cort. Cappar.	aqua preparandus dos. ʒvi
Tamarisc. ana. ʒij.	ad ʒviij.

##### 2 Pulvis temperans.

R. Tart. Vitriol.	M. f. Pulv.
Nitr. depurat. ana. ʒj.	Dos. ʒj. bis vel ter in die.
ʒij ʒj.	

##### 3 Alius diaphnoico-temperans.

R. Arcan. dupl.	Cinnab. nativ. ʒss.
Nitr. depur.	M. f. pulv.
ʒij diaph.	Dos. & usus ut præcedentis.
Conch. preparat. an. ʒij	



- 4 Essentia Carminativo discutiens.  
*R. Tinct. cort. Orum ʒij. M. dos. gutt. 25. ad 30.*  
*Nitr. dulc. ʒls.*
- 5 Spiritus Carminativo-discutiens.  
*R. Spir. Anis. vel fœnic. ʒij. M. Dos. ut antea.*  
*Nitr. dulc. ʒls.*
- 6 Electuar. resolv. & aperiens.  
*R. Conserv. borrag. Spec. diarrh. Abb. an. ʒj.*  
*bugloss. Syr. cort. citr. q. s. M.*  
*beton. ana. ʒj. Dosis magnit. Nucis ju-*  
*Diaphoret. ʒial. gland. bis vel ter de die.*  
*Tart. Vitriolat.*
- 7 Aliud.  
*R. Conserv. rosar. ʒls. Pulv. Rad. Ariana. ʒj.*  
*visceral. ʒls. Syr. capill. q. s. q. s. M.*  
*Bezoard. Jovial. Dosis & usus ut supra.*  
*Arcan. dupl.*
- 8 Tinct. Tonico-aperiens.  
*R. Ess. ʒis Hellebor. Wed. M. dosis 25. 30. gutt. bis*  
*ʒij. per diem.*  
*Cort. Aurant. ʒj.*
- 9 Alia Hysterico-tonica.  
*R. Ess. Pimpin. alb. ʒij. Spir. Sal. Ammon. anis. ʒls.*  
*Millefol. ʒj. M. dosis sicut prioris.*

## VII. Methodus medendi.

- 1 In gravioribus pathematibus horum exacerbationibus, præsertim cum anxietate præcordiali enormiori, respirandi difficultate, palpitatione cordis, conjunctis & a siccitate, aut potius astrictione alvi, ut fere fit, exordium nactus, ante omnia alvus aperiatur, id quod commodissime per enema obtinetur.
- 2 Ipsæ vero spasticæ tensiones & flatulenta pathemata efficaciter & fere certius subjugantur atque sedantur per pulveres Nitrosos & Cinnabarinos, quam Opiata & Carminativa calidiora & acriora.
- 3 Extra paroxysmos vero ventilatio sanguinis est instituenda per Venæsectiones, circa Equinoctia repetendas; & tum dilutio & attenuatio ejusdem tentari potest, magis tamen per subsidia diætetica, potum & motum auctiorem, quam per remedia pharmaceutica.
- 4 Imprimis etiam in utroque sexu ad consuetas excretiones sanguinis respiciendum est, ut quantum possibile est, promoveantur; multum enim hoc ad malum non tantum imminuendum, sed quandoque etiam plenarie tollendum, confert.
- 5 His præmissis, denique locum habent Martialia & salia volatilia, conjuncto semper & subjuncto potu sufficiente & motu proportionato.
- 6 Inter varia motus corporis genera præprimis ille hic primatum obtinet, qui per equitationem fit: hoc enim vasa & viscera infimi ventris egregie commoventur, ut sanguis spissescens & stagnans eo citius ad æqualem circulum redire possit.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Plus valet in hoc affectu curando, aut ad minimum mitigando, Diæteta, quam Pharmacia.
- 2 Diæteta tamen nimis anxiosa & scrupulosa nullo modo est suadenda.
- 3 Ventilationes sanguinis in hoc morbo adeo sunt necessariae, ut, nisi illæ debito tempore, & sufficiente quantitate adornentur, reliqua consilia, regimina & medicationes plane sint irrita; tanto magis, si excretiones spontaneæ aut evacuationes artificiales præcesserint.
- 4 Si pathemata magis circa sinistrum latus, sub costis ejus lateris affligant, cum angustis & anxietatibus, tam physicis, quam moralibus, mœrore timido &c. præstat in pede venam secare, sin vero in dextro magis latere, aut abdomine molestæ illæ tensiones & pressiones sentiantur, tum potest etiam in brachio Venæsectio celebrari, nisi forte peculiaris dispositio vertiginis circa caput, aut sensibilibus vitiorum in pectore subsit: tunc enim Venæsectio in pede tutior.
- 5 Quando affectus jam eo devolutus est, ut excretionibus hæmorrhagicis per vomitum, aut mistum

cruentum, imò etiam hæmorrhoides, respiciat abusus Myrrhatorum & Aloeticorum sollicitè vitandus est.

- 6 Emetica tam hypochondriacis, quam hystericismale ordinantur, in his etiam facile Vomitu cruento viam parare possunt.
- 7 Sicuti lenes laxationes usum habent eximium, si fortiora purgantia maxime nocent: commovent enim humores, antequam sint præparati, & pertinaçiori infarctui ansam præbent.
- 8 Martialia non dentur, nisi
  - 1 præmissa ventilatione debita & dilutione atque attenuatione sanguinis,
  - 2 dosibus minoribus, sed per aliquod tempus continuandis,
  - 3 subjuncto, & conjuncto motu proportionato,
  - 4 neque etiam, ubi calor præternaturalis, aut profundioris labis in viscere aliquo iusta suspicio adest.
- 9 Eadem quoque monita circa acidularum usum tenenda, utpote quæ non, nisi largiori quantitate haulte, desideratum effectum præstare solent; Phthysicis vero, imò in genere omnibus, qui teneriore & aridiore corporis habitu sunt præditi, certissime nocent.
- 10 Limatura Martis cruda si quis uti consultum duxerit, attendat, num post ejus usum ructus nidorosi & veluti alliacei surgant, ac spontanea laxatio alvi cum egestionem fecum nigricantium sequatur: hæc enim signa felicitis operationis sunt, atque ulteriorem continuationem permittunt.
- 11 Pessimus quorundam Glia exhibendi & salivationem excitandi mos omnino rejiciendus, ob mala pejora exinde metuenda.
- 12 Hypochondriacis vertiginosis, aut de memoriæ debilitate conquerentibus, Cucuphæ ille, aromaticis & nervinis calidis suffarctæ, raro conferunt, sepius vero nocent; magis necessarium est eos mone-re, ut præcordia, & partes inferiores, imprimis vero pedes a frigore premuniant.
- 13 Malum Hystericum in fœminis eadem fere ratione tractari debet, ac malum Hypochondriacum in viris: nisi quod illic primaria ratio Menstrui & aliarum Uteri expurgationum per Lochia, secundinarum &c. excretionum habenda est.
- 14 Dolores capitis, præsertim cum frigoris cujusdam sensu affligentes, nihil eque efficaciter subleventur quam Spir. Vin. Camph. imprimis post præmissam debitam ventilationem sanguinis, alvo prius expedita & internum organum temperantibus, & pediluvii conjunctis.
- 15 Graviore mali Hypochondriaco-Hysterici exacerbationes satis prompte quidem per Opiata sedantur; at non sine duplici incommodo,
  - 1 ut in posterum tanto citius & vehementius recrudescant, &
  - 2 non solum alias efficaces medicationes, sed & has ipsas per Opiata consopitiones, postmodum aspernentur.
- 16 Castoreum famosum quidem, sed fumosum nimis medicamentum est, & facile caput obnubilat, atque præcordiorum anxietates augeat. Præstat itaque in nauseabundis, vomibundis, & sursum vergentibus anxietatibus, ab eodem abstinuisse.
- 17 Antiscorbutica facile humores commovent, unde priusquam Venæsectio administrata fuerit, haud sunt propinanda.
- 18 Salia volatilia hoc non tantum faciunt, sed & invias agunt adstringendo; unde non nisi Colophonis loco adhibenda sunt.
- 19 Millefolium specifica quidem, in turbis circa Venamportem moderandis, efficacia pollet; attamen in hæmorrhoidariis ejus usus contulius omittitur, & rectius in fœminis, ad laboriosorem Mensium successum promovendum & expediendum, adhibetur.
- 20 Flatulenta Hypochondriacorum pathemata non per calidiora carminantia tractanda sunt, sed per Salina remedia, nimirum Nitrum cum Sale digestivo & absorbente conjunctum, vel etiam Tinct. Salinam



Richteri, alias incrementa sumunt.

- 21 Dens Hippopotami & Lapis Manati plerumque etiam plus damni, quam emolumenti præstiterunt.
- 22 In suffocatione spastica Uterina, externa fœtida: ungulæ, cornua, verrucæ aliaque insufficiens ut plurimum ferunt auxilium.
- 23 Inter laxantia præstant Noduli & Pilulæ temperatæ: Mannatæ siquidem flatulentiam adaugent.
- 24 Aloëtica, Myrrhata, Camphorata, & quæcunque sanguinem spissorem eximie comovent angue pejus fugienda sunt.

## CAPUT OCTAVUM.

## De Hæmorrhoidibus cæcis.

I. *Definitio.* **H**æmorrhoides cæcæ sunt venæ hæmorrhoidales externæ circa anum sitæ, a Sanguinis stagnantis copia vel tumentes vel turgentes, cum acerbissimo dolore, non raro etiam vera inflammatione stipatæ.

II. *Differentia.*

Hæmorrhoides cæcæ solent distinguî in *turgentes* & *tumentes*:

a *Turgentes* non solum vasculorum sanguiferorum infarctum, sed præsertim etiam ipsius cuticulæ extensionem inferunt, ita ut vesiculæ ejusmodi pellucidæ, a sanguine transparente lividæ, tactu molles, non adeo exquisitè dolorificæ, sed solo ferme ardore molestæ, faciem exhibeant.

b *Tumentes*, quæ etiam κατ' ἐξοχλὴν cæcæ & dolentes audiunt, verum sistunt tumorem inflammatorium, a stasi sanguinis in vase aliquo hæmorrhoidali conceptum, vehementem non solum ardentem, sed etiam vellicantem, pulsatilem dolorem inferentem, & nihil aliud sunt, quam verus furunculus insensibilis illa, non modo nervea, sed & musculo-fa tunica intestini recti, circa sphincterem ani collectus, inflammatoria stasi exquisitissimum dolorem afferens.

c Trahunt nonnulli huc alias quoque protuberantias, quin excrescentias ulcerascentes circa anum; sed hæc plerumque contagio, & quidem venereo, natales suos debent.

d Distinguuntur etiam ratione figuræ, quam sub varia protuberantia sæpius exhibent, vel in *morales*, quando fructus mori similitudinem repræsentant. Vel *uvales*, si racemosam quasi congeriem constituunt. Vel *vesicales*, quando extremitates vasculorum insigniter dilatatas habent. Vel *verrucosas*, quando vesicalibus ulceratis ficescens durities & verrucosa asperitas, cum venerea tamen non confundenda, succedit; hæc crustam, illa verò foramina constituit.

e Ab hæmorrhoidalibus internis.

1 Differunt ratione vasorum, internæ quippe a Venâ portæ, externæ autem a Venâ cava originem sumunt;

2 Ratione recursus: internæ menstruas magis servare solent periodos, externæ vero ut plurimum vernaes vel autumnales.

3 Ratione quantitatis sanguinis excreti, quæ in internis semper major esse solet, quam externis,

III. *Signa.*

1 Antecedunt varii spasmodici, vibratorii, tractorii, compressorii motus, vel superius circa longitudinem dorsi & lumbos, vel inferius circa femur, genua & pedes.

2 Præcipue autem rheumatata illa, circa os sacrum contingentia, specialiter motum hæmorrhoidalem respiciunt.

3 Stupores etiam pedum, arthritica, ischiadica, nephritica & podagrica pathemata sæpiissime ob hunc finem fiunt.

4 Cognoscuntur autem hæmorrhoides cæcæ jam præfentes, per turgescientiam vel tumorem venularum hæmorrhoidalium externarum circa anum sitarum,

tactu facile explorandum.

5 Turgentes formant sensum quasi urentem, vel pressorium, præcipue sub alvi excretionem, quasi nucleus aut faba ibi delitesceret, absque fere sensibili dolore; tumentes verò exquisitissimum dolorem, inflammationem, & tenesmoden conatum conjunctum habent.

IV. *Subjectum.*

1 Hæmorrhoides cæcæ rarius in alia corporis dispositione, nisi in temperamento phlegmatico, aut de phlegmatico participante, sed simul Plethorico, occurrunt.

2 Eveniunt etiam turgentes non raro feminis ex partu laboriosiori, vel ultimo gestationis tempore, præcipue si multum desideant, ex compressione intestini recti, a fœtu grandiore incumbente.

3 Frequentius quoque obtingunt personis Hæmorrhoidalem fluxum patientibus, quam jam diu eidem assuetis.

4 Alvi quoque constipationi obnoxiiis, magno conatu feces alvinas egerentibus.

5 Equitationi multum assuetis, qui sæpius etiam ab eadem per inquinamentum ephippii infecti mariscos venereos reportant.

6 Imprimis autem in ætate virili constitutis, & hæreditariam dispositionem a Parentibus habentibus.

7 Non raro etiam aromaticis & aloëticis, præprimis Elix. propr. Paracelsi abutentibus.

8 Ventilationes quoque sanguinis in pedibus negligentes interdum Hæmorrhoides cæcas experiuntur.

V. *Prognosis.*

1 Hæmorrhoides turgentes scalpendo vel alia ratione apertæ, fundunt sanguinem non solum, quem continebant, sed etiam plus ejusdem successive suppetant, ita, ut non raro ipsius fluxus hæmorrhoidalis initium præbeant.

2 Post apertionem vero collabuntur & corrugantur, atque veluti papulas quasdam formant, quæ dein sub fortioribus pressionibus alvi egerendæ, sanguinem denuo fundunt, idque sine certo typo, sive ordine, imo fere assiduo.

3 Aut si hoc facere desistant, degenerant non raro in ulcuscula pruriginosa admodum molesta, quæ ipsa Serpiginem sic dictam hæmorrhoidalem constituunt.

4 Hæc Serpigo, per artificia externa male tractata, facile affectus arthriticos aut rheumaticos post se ducit.

5 Hæmorrhoidum cæcarum tumores dolores immanes, quidem pariunt, vix tamen vitæ periculum inferunt.

6 Quod si tamen ultra tertium vel quartum diem dolor & inflammatio persistit, vix amplius discussionis spes superest, sed succedit suppuratio: qua facta, si apertio & mundificatio negligatur, aut protrahatur, facile fistula ani hinc enascitur.

7 Hæmorrhoides cæcæ ad apertionem non pervenientes, varia inducere solent mala, puta dorsi & lumborum dolores, nephritidem, calculum, pedum stupores, ischiatica, gonagrica & podagrica pathemata.

8 Sicuti autem hæc earum obstructionem sequuntur, in legitimus earundem successus modo dicta mala imminuit, aut tollit. conf. Aphor. Hipp. 2. Sect. 6.

9 Turgentes vesicales diutius subsistentes facile ulcerantur, quod tamen absque insigni dolore fieri solet.

10 Ex his ulceratis & iterum exsiccatis originem sumunt verrucosæ benignæ per intervalla sæpius manantes.

11 Hæmorrhoides ulcerosæ Græcæ sæpiissime contagio sese propagant.

12 Hæmorrhoides non nimium turgentes, per largissimum sudorem circa anum & inguina solutas fuisset, aliquoties observavimus.

VI. *Remedia.*

1 Discussioni Hæmorrhoidum cæcarum dolentium, specifica virtute inservire dicuntur infusum Millefolii, flor. Sulphur. usus modestus, anticatarrhalia: Ess.



Alexiph. Stahlii, Tinct. Tartari, Tinct. Zij, tar-  
taris. Essent Succini &c. Suffimigium ex murib. mari-  
nis, radix Telephii, aut Scrophulariæ, amuleti in-  
star gestata & secundum weisbachium folia recentia  
Sambuci conquassata loco dolenti aliquoties imposita.

2 Dolores mitigant.

a Interne nitrosa, emulsiva, & in casu necessitatis,  
anodyna; item blandiora laxantia, mannata &  
fennata, præsertim cum Auro fulminante.

b Externe emollientia, & simul leniter resolventia,  
v. g. flor. Verbasci, Linariæ (quibus vis specifica  
solet tribui) item mucilag. Sem. cydon, psyll.  
rad. Sigill. Salom. & sputum jejunum &c.

3 Ulcusculum si quod suppurationi succedit mundifi-  
cant: Bals. mundif. D. D. Stahlii ex Ess. Myrrh. Suc-  
cin. Spir. Tereb. parat. item Balsam. Sulph. Terebin-  
th. & similia penetrantia balsamica, interne autem  
dyscrasiam sanguinis corrigunt lenia laxantia, ale-  
xipharmaca & anticatarrhalia, interpositis absor-  
bentibus & diaphoreticis fixis.

4 Præservationi favent Venæsectio in pedibus, appli-  
catio hirudinum ad anum.

Formula Remediorum.

1 Pilulæ laxantes.

R. Pilul. Stahlii. vel Polyc. Merc. dul. rit. par. gr. viij.

Hall. vel Bals. Visceral. Elix. prop. P. R. f. fiant

Argent. ðss. Pilul. ad pond. gr. j. pro

Extract. Hell. nigr. gr. vj. j. dosi.

2 Pulvis diapnoico-discutiens.

R. Oc. Tr. preparat. Flor. Sulphur.

ð. Diaph. Cinnab. Zij. ana. ðss.

Tart. Vitriol. M. f. pulvis dosi. gr. xx.

Nutr. depur. ana. Zij. bis per diem.

Linimentum.

R. Sem. Psyll. Zij. adde album ovor. n. j.

Rad. Sigill. Sal. ðss. Camph. ðss.

f. cum Aq. Ros. mucilago Tinct. Opii ðss. M.

4 Aliud.

R. Sem. Psyll. cilago adde

Cydon. ana. Zij. Vitell. ov. num. j.

Rad. Sigill. Sal. Zij. Camph. gr. v.

fiat cum Aq. rosarum mu- Opii gr. ij. M.

5 Aliud.

R. Cancr. fluo. rec. n. xij. rec. q. f.

Contus. coq. in butyr. Colat. add. Ol. Verbasc. Zij.

6 Essentia Anticatharralis.

R. Essent. Alexiph. Stahlii. dos. 25. ad 30. gutt. bis per

Tinct. Zij. Tart. a. ðss. diem in jusclo vel potu or-

Essent. Succini Zij. M. dinar.

VII. Methodus medendi.

1 Turgentes Hæmorrhoides specialem fere curam  
hæud exposcunt, nisi quod post ruptam vesiculam  
mundificationis vulneris ratio sit habenda, succe-  
dentia autem ulcuscula vulgari modo tractanda sint.

2 In Tumentibus vero ante omnia tentanda est di-  
scussio, tum per supradicta specifica, tam inter-  
na, quam externa.

3 Hac vero minus ex voto succedente, maturatio &  
tandem apertio est promovenda, per cataplasma-  
ta emollientia ex cepis assatis, fol. Malvæ, Ol. Li-  
ni, Medulla crur. vitulin. &c. Imo tandem apertio  
chirurgica ope lanceolæ est tentanda. Hac enim  
peracta, omnis dolor in momento cessat. conf. Hist.  
Morb. Uratist. pag. 195.

4 Denique mundificatio & consolidatio omni studio  
est promovenda; tam per externa balsamica, v. g.  
Ess. Myrrh. Succin. Zij. Ol. laterin. ðj. Misc. quam in-  
terna (præsertim si diutius protrahatur cura) La-  
xantia scil. & depurationi lymphæ ac sanguinis alias  
dicata, v. gr. Ess. Amara Hall. Ess. Succin. cum Tinct.  
Zij Tartaris. sociata.

5 Verrucosæ benignæ sæpius manantes cum pruritu  
vehementiori ægrum divexantes, optime tractantur  
per lenientia & demulcentia; Ol. Ovor. Ol. Verbasc.  
Liq. flor. Verbasc. cum butyro insulso in linimentum  
reductus, Ol. flor. calend. &c. non neglectis internis  
laxantibus & præprimis anticatarrhalibus.

6 Fungosæ & Verrucosæ excrescentiæ venereæ manu  
chirurgica opus habent, quamvis non facile cedant,  
nisi per interna remedia corpus rite purgatum &  
præparatum fuerit. Alias in talibus excrescentiis,  
quando partes ambientes nondum excoriatæ sunt,  
bene se gerit nudum Sal Ammoniacum.

VII. Cautela Practicæ.

1 Hirudines non conveniunt in Hæmorrhoidibus cæ-  
cis tumentibus, neque etiam facile sugunt, ad tur-  
gentes vero commode adhibentur, quas etiam prom-  
pte arripiunt; pro præservatione tamen hæmorrhoi-  
dum tumentium non plane rejiciendæ sunt.

2 Millefolium optime sub infusi forma, recipiendo ad  
℥. j. aquæ manip. j. herbæ, ordinatur; illa tamen me-  
thodus, qua per integrum mensem, secundum Rive-  
rium & Villanovanum, continuatur; haud laudanda  
est, ob vim, qua prædita est, subadstringente.

3 Turgeates, sanguinem coagulatum in se continen-  
tes, aperire lanceola & sanguinem evacuare satius  
est, quam suppurationem cum metu fistulæ expe-  
ctare.

4 Unguentum de Linaria, ipsa linaria & chelidonium  
ab Authoribus passim eximie laudata, promissis  
ut plurimum non respondent, imprimis quando jam  
actualis inflammatio adest.

5 Radices Scrophulariæ & Telephii in principio &  
declinatione mali magis effectum aliquem edunt,  
quam in statu.

6 Mundificatio Hæmorrhoidum suppurarum non de-  
bet fieri per emplastica, sed subtiliter penetrantia  
balsamica liquoris tenuis instar sese insinuantia.

7 In Hæmorrhoidibus verrucosis per intervalla ma-  
nantibus abstinendum est ab externo Sulphuris, Ter-  
rarum Bolarium, Lithargyrii, Sacch. Saturni usu,  
facile enim repellitur materia cum insigni patien-  
tis damno.

S E C T I O II.

D E

DOLORIBUS ARTHRITICO-  
SPASTICIS.

C A P U T P R I M U M.

De Doloribus Arthriticis in genere.

I. Definitio. **D**olores Arthritici sunt motus tonici par-  
tium solidarum contractorii siye auctio-  
res, propter humores hinc & illic stagnantes, aut  
impeditius procedentes a Natura excitati, ut hi me-  
diantibus illis ad has vel illas corporis partes dirigan-  
tur, & propellantur, intentione primaria superfluum  
a corpore eliminandi, facile vero per errorem Na-  
turæ in consuetudinem abeuntes.

II. Differentia.

a A Congestionibus & commotioribus sanguinis hæ-  
morrhagicis simplicioribus.

1 Hæ propius adhuc, illæ vero minus magis excre-  
tiones sanguinis respiciunt & intendunt.

2 Hæ magis ad interiores, illæ vero ad exteriores  
musculosas partes vergunt.

3 Hæ breviori, illæ vero longiori duratione ut plu-  
rimum circumscribuntur.

4 Hæ magis poros partis, vel vasa sanguifera ipsa,  
illæ vero fibras potius musculares sigillatim tende-  
re & affligere videntur.

5 Hæ magis inflammationes vel ulcerationes; illæ  
potius in rigores, contracturas, vel tabidas exte-  
nuationes partium, pronæ sunt.

b A Spasms vulgo sic dictis & Convulsionibus.

1 Hæ, scil. Convulsiones, universum corpus, vel plu-  
res musculos simul occupant, eosdemque vel re-  
pente contrahunt, vel rigidos & tenfos in eadem  
posi-



positura & situ tenent, ac ut plurimum sunt vehementes, latius vagantur, & instabiles sunt. Illi vero, scil. spasmī, & magis lente contingunt, statarie vel totum muscū afficiunt, vel portionem tantum illius, nimirum paucas fibras. Unde vel musculares vel fibrillares audiunt, hi constituunt dolores lancinantes & terebrantes, illi dolores tensivos & gravativos contracturæ productrices.

2 Hæ periculosi ut plurimum ominis sunt, illi vero minus periculi involvunt.

c *A Rheumatismo.*

1 Respectu loci, Rheumatismus enim partes musculosas potissimum occupat, sive interstitia inter articulos, arthritis vero ipsos articulos.

2 Respectu ordinis, quatenus Rheumatismus utpl. præcedit, Arthritis vero exinde nascitur.

d *Ab Arthritide vaga*, quæ subito hanc vel illam partem occupat & vage per varios articulos oberat, v. gr. dum pedes afflixit, paucis elapsis momentis hinc relictis genu alterutrum scapulas, brachia &c. adoritur: Arthritis vero stricte dicta fixa in certis partibus hæret, & licet interdum alias quoque partes occupet, antea tamen afflicta non deserit.

Ratione impetus.

1 Alii affectus sunt leviores adeoque Arthritidis nomen nondum promereri vulgo crediti, sed sola Rheumatismum compellatione larvari soliti.

2 Alii sunt graviores, vel generalem arthritidis denominationem jam apertius profitentes, vel pro locorum affectuum diversitate, diversis quoque nominibus insigniti. Sic in capite audiunt dolores Odonalgico hemicranici: in thorace Pleuritis spuria; in lumbis Nephritis spuria; in coxis Ischiadicum malum; in pedibus Podagra; in manibus Chiragra &c. Nonnunquam tamen stricte Arthritis pro affectibus spasticis juniores tantum & in superioribus partibus affligentibus sumitur: Podagræ vero nomen senum affectibus spasticis inferiora occupantibus tribuitur.

III. Signa.

1 Dolor quandoque tensivus, liberis artus istius, quem occupat, motibus impedimentum solummodo afferens, & non nisi sub conatu movendi evidentius emicans.

2 Quandoque conatus magis lancinans & vibratilis, sub levi etiam motitatione membri, velut rupturæ periculum afferens.

3 Non tamen jugiter æqualis, sed per vices remittens, quin interdum intermittens.

4 Sæpe sine rubore & timore notabili.

5 Qui, si accedat, dolorum sensibilem mitigationem plerumque affert.

6 Urina rubra sedimentum Tartareum post refrigerationem in fundo deponens; & lateribus valis affigens; quod proinde a sabulo calculorum probe discernendum, quippe quod statim cum urina emittitur, mox in fundo colligitur, nec lateribus adhærescit.

IV. Subjectum.

Affectus hi familiares sunt personis.

1 Habitus spongiosioris, sive de temperamento Sanguineo multum participantibus.

2 Evacuaciones sanguinis naturales, vel artificiales expertis, aut certe ob Plethoram promeritis.

3 Indolis animi iracundæ, diætæ lautæ vinosæ, Veneri deditis.

4 Etatis non plane juvenilis, sed consistentis, quin jam ad senium tendentis.

5 Parentibus arthriticis, nephriticis, calculosis, podagricis, hæmorrhoidariis prognatis.

6 Macilentis non, nisi vel externa causa vel hereditaria dispositio, vel febres male curatæ occasionem dederint.

V. Prognosis.

1 Leniores etiam horum affectuum species, si sæpius recurrunt, non minus in consuetudinem abeunt, quam graviores, imo successu temporis facile in graviores & fixiores arthriticos dolores degenerant.

2 Si tamen arthritici affectus qui in junioribus superiores occupant partes, non tam pertinaces sunt, & facilius etiam curationem admittunt quam affectus arthritici senum in inferioribus partibus occurrentes.

3 Quo magis spasmī sunt particulares & in exiguis partibus contingunt, eo minus utilitatis habent, & ad scopum Naturæ, nimirum excretionem humorum perveniunt.

4 Qui junioribus annis frequentius & pertinacius spasmos simplices experiuntur, augescēte ætate variis arthriticis affectibus expositi sunt.

5 Quo magis sunt tendinales spasmī, eo minus dolorosi.

6 Arthritico spastici affectus admodum proclives sunt ad internas inflammationes, præprimis si imperite tractati repellantur.

7 Subjecta juniora, si spastico-Arthritici, inferiorum partium doloribus mature affliguntur, longe gravius iisdem decumbunt quam senes, imo raro ad senium perveniunt, sed antequam illud attingant, a doloribus istis vel nimis ferocientibus & in convulsiones degenerantibus, vel ab iisdem retrocedentibus, jugulantur.

VI. Remedia:

1 Causæ antecedenti, scil. sanguinis abundantie prospiciunt ventilationes sanguinis, partim per promotionem excretionum naturalium, Mensium & Hæmorrhoidum; partim per vicarias evacuationes artificiales, Venæsectiones & scarificationes, quin & hirudines.

2 Lentorem atque mucum, aut etiam biliosas cruditates incidunt, atque evacuant digestiva & laxationes per epicrasin, nec non in evemetis lenia vomitoria.

3 Alvum leniter expediunt & spasmos demulcent clysteres carminativi atque emollientes.

4 Orgasum & tenuitatem sanguinis salino-sulphurei, corrigunt absorbentia, Nitrosa, emulsiva.

5 Spasticam fibrarum tensionem leniunt Cinnabarina.

6 Equalem humorum distributionem promouent Diapnoica sive Diaphoretica temperata.

7 Motus exacerbationem leniunt.

a Anodyna & specifica.

b Revellunt externe Diuretica, v. g. Salia Volatilia cum Salis Tart. Tinct.

c Externe dissolvunt eandem Discutientia, v. g. Spir. Vin. Camph. Crocatus, Spir. Formicar. Emplastrum Saponat. Barbette: In phlegmaticis Ceratum de Galbano, Sacculi ex fursuribus triticeis & Sale tosto, suffusus ex flor. Stœchados citrin. Herb. Sabine, Thure, Mastiche, &c. frictiones cum pannis mollioribus calentibus; vel excutia molliore: Motus voluntarii exercitium studio intensum, & quæcunque sensum vel in parte affecta, vel conjugata fortius aut constantius alterant, v. g. Acupunctura Japonensium, Moxa Chinesisum, Veficatoria, scarificationes profundiores in parte immediate affecta.

Formula Remediorum.

1 Potio laxans.

Rx. Fol. Sen. S. S. Zij. vel viij. Stent in digestionem  
Rhab. Elect. per noctem, Colat. adde  
Tart. Solub. ana. Zj. Syr. de pom. laxat. ʒss. M.  
infund. in Aq. Cichor. ʒvj. pro una dosi.

2 Pulvis laxans.

Rx. Sal. cathart. amar. ʒvj. sumatur in s. q. Infusi Thee

3 Pulvis Antispasticus leniter diureticus.

Rx. Oc. ʒss. preparat. Pulv. lumbr. Terr.  
ʒij diaph. Cinnab. ʒij ana. ʒss.  
Nitr. depur. M. dosi. ʒj. bis vel ter  
Arcan. duplic. ana. ʒj. per diem.



## 4 Alius Spasmodico-Anodynus.

Rx. *Conch. preparat.* MPil. de Cynogl. gr. v.  
*℞ij diaph.* Dosis ℞j. in declinatione  
*Tart. Vitriol.* mali versus somni tempus  
*Nitri depur. ana. ℞j.* porrigenda.  
*Cinnab. ℞ij. ℞ss.*

## 5 Porio diuretico-discutiens.

Rx. *Ess. Alexiph. Stablii* Ziss. M. dosis gutt. 30. mane  
*Tinct. ℞ij Tartaris ā.* in jussculo exhibenda.

## 6 Alia diuretico-nervina.

Rx. *Tinct. ℞ij. acris.* in declinatione mali per  
*Spir. C. C. rectif. ana. Ziss.* diem exhibenda.  
*M. dos. gutt. 30. bis vel ter*

## 7 Spiritus discutiens.

Rx. *Spir. Vin. Camph. ℞j.* Essent. castor. Ziss. M.  
*Formic. ℞vj.* quo illinantur partes affectæ.  
*Lumbr. terrestr. ℞ij.*

## VII. Methodus medendi.

## 1 Extra Paroxysmum.

- a Venæsectiones præservatoriæ circa Æquinoctia ,  
sacrificationes profundiores circa Novilunia in par-  
te affecta, vel ejusdem confinis: item blandæ  
primarum viarum per leniora cathartica , aut  
mitiora quoque emetica, evacuationes.
- b Motus corporis successivus ad incalescentiam &  
lenem sudationem usque continuatus.
- c Diæta dilutior, haud aromatica & vinosa fortior,  
moderamen animi pathematum.

## 2 In Paroxysmo.

- a Interne temperantia, & æqualem humorum di-  
stributionem promoventia, h. e. pulvis antispas-  
modicus ter vel quater de die exhibitus, cui, si  
dolorum ferocia id exigat, versus tempus somni  
lene anodynum addi potest. Præmissis temperan-  
tibus subungi & interponi possunt temperata A-  
lexipharmaca.
- b Externe Spir. Vin. Camphor. vel solus, median-  
tibus linteis multiplicatis, parti dolenti imposi-  
tis, ac singulis binis, vel ternis horis renovandis,  
vel etiam cum Emplastr. Sapon. Barbette alterna-  
tim applicitus.

## 3 In declinatione.

- a Interne Mixtura tonico-nervina ex Tinct. Salis  
Tart. & Spir. C. C. succinat.
- b Externe Spir. Formicarum.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 In ipso Paroxysmo præstat a sanguinis ventilatio-  
ne, si fieri possit, abstinere, ipsius enim valet præ-  
servatoria præoccupatio.
- 2 Sanguinis evacuationes in ipso paroxysmo institu-  
tæ, imprimis per Venæsectionem, plerumque au-  
gent pertinaciam affectus, ut imposterum non so-  
lum tanto promptius recurrat, & tanto obstinatius  
recrudescat; sed & tanto obstinatius aliis remediis  
non cedat, verum potius idem subsidii genus de-  
nuo efflagiter.
- 3 Neque etiam illæ ipsæ in paroxysmo administra-  
tæ semper debitum effectum assequuntur, nisi vel  
circa prima initia, vel circa declinationem demum  
adornentur.
- 4 Plus fere semper utilitatis habere videntur, incor-  
poribus non nimium plethoricis, sanguinis eva-  
cuationes ex parte immediate affecta, aut conjugata  
per scarificationem, profundiore incisionem, hi-  
rundinum applicationem.
- 5 Alvo sua semper constet libertas, fortioribus ta-  
men purgantibus in ipso paroxysmo eandem irri-  
tare minime expedit: his ipsis enim facile motus  
spastici ab exterioribus ad interiora revocantur,  
non sine vitæ discrimine.
- 6 Vomitoria lenia in ipsis quandoque paroxysmi  
initii, ubi materia cruda in primis viis hæret,  
nec adfuit magni dolores, locum habent.
- 7 Repellentia fortiora simili ratione malum ab exte-  
rioribus ad interiora retroagunt, & gravissimas re-  
spirandi angustias, quin febres inflammatorias ut-  
plurimum funestas inducunt.
- 8 Narcotica & refrigerantia externe adhibita, stupo-

rem, tophos & nodos, quin contracturam parti  
dolenti plerumque conciliant.

- 9 Olea destillata v. c. Succini, Juniperi, Petroleum  
&c. spiritus quoque Oleosi, Balsamo Peruviano, a-  
liisque sic dictis nervinis, largius imbuti, sensum  
ardoris, rosionis, totiusque mali ferociam exaspe-  
rant, siquidem partes affectæ non tam debilitate  
aliqua, quam potius nimia activitate laborare vi-  
dentur.
- 10 Spiritus Urinosi pariter stupidum rigorem parti la-  
boranti affricant.
- 11 In doloribus arthriticis magis obfirmatis & invete-  
rascentibus, imo in spasticum rigorem & contra-  
cturas jam vergentibus, commodum sæpe auxilium  
& levamen affert Spir. Formicarum.
- 12 In malo vero recentiore, ubi sensus urens & lan-  
cinans vehementius adhuc affligit, dolores potius  
exacerbare videtur.
- 13 Præsentaneum vero effectum quandoque habet Ce-  
ratum de Galbano vel Matricale; imprimis quan-  
do Venæsect. usus præcessit. Quod si autem ejus im-  
positionem intra 6. vel 8. horas nullum levamen se-  
cutum fuerit, sed potius partis inflammatio sese  
conspiciendam præbet, convenit illud remove &  
aliis medels rem peragere.
- 14 Qui spasmodicis motibus & doloribus afficiuntur,  
his conducunt quidem Alexipharmaca, sive Bezoar-  
dica vel sudorifica, abesse tamen debet regimen  
sudorificum, alias dolores facile in omnes artus se  
diffundunt. Post usum sudoriferorum per tres vel  
quatuor dies continuatum, usurpari possunt lenia  
anodyna, ut MPil. de Cynogl. ad gr. j. vel ij Opti-  
me quoque conferunt vina laxantia, imprimis ex  
Helleb. nigro, qui in consumptione sanguinis singu-  
lares effectus præstare dicitur.
- 15 Anodyna interne adhibita in vigore paroxysmi vel  
subitanæ mortem, vel febres lentas, heclicas,  
vel in sanguinolentis dolores colicos post se ducunt,  
cum alvinis semper ataxiis, id est obstipationibus.
- 16 Imo præservative, vel versus paroxysmos usurpa-  
ta, impetu quidem advenientem longius forte du-  
raturum reprimunt, sed citiori recursum ansam præ-  
bent, & tandem ad Paralytin disponunt.
- 17 In refractori dosi hunc in modum usurpata, varia  
inordinata, pertinacia pathemata causantur.

## CAPUT SECUNDUM.

## De Hemicrania.

- I. *Definitio.* **H**emicrania est dolor capitis valde a-  
cerbus, plerumque dimidiam saltem  
partem occupans, a sanguine versus superiora con-  
gesto, & eminens per nares exitum quærente, ori-  
ginem habens.
- II. *Differentia.*
  - 1 Est vel *fixa*, & continuo quasi ægrum affligens,  
vel *Periodica* per paroxysmos nunc & tunc saltem  
recurrentes eundem exercens.
  - 2 Distinguitur etiam in *Idiopathicam*, ipsi immédia-  
te sanguini abundantiori originem debentem, & *Sym-  
ptomaticam* a vitiis aliarum rerum, nimirum Ven-  
triculi, Mensium & Hæmorrhoidum ortum ducen-  
tem
- III. *Signa.*
  - 1 Occupat fere ordinarie unam vel alteram tantum,  
plerumque tamen sinistram capitis partem, & sæ-  
pius ad dentes, maxillas, imo humeros ejusdem  
lateris sese extendit.
  - 2 Doloris genus est vibrativum & lancinans & ordi-  
narie fere tam enorme, ut ægri sibi caput quasi di-  
strahi & divelli autument.
  - 3 Non autem semper in uno loco hæret dolor, sed mox  
a superioribus ad inferiora nimirum dentes & maxil-  
las tendit, modo ab his ad superiora redit, plerum-  
que tamen temporum alterutrum fixe quasi tenet.
  - 4 Imo sentiunt quidam dolores in parva tamen cal-  
variarum



variæ parte, eosque maxime acutos & pungentes, ac si telum infixum membranas dissecaret.

- 5 Præ vehementia doloris sæpius neque levissimum sonitum, neque clariore lucis radios ferre possunt.
- 6 Dolor interdum sat gravis, etiam in ipso interiore oculi, sive circa ejusdem radicem sentitur.
- 7 Dum vero in loco sic affecto rubor & inflatio venarum; sic in locis remotis pallor & constrictio observatur, alvi quoque inertiam post se ducens.
- 8 Urina hoc tempore cruda est, in declinatione vero paroxysmi assumit colorem saturatum, paulo post copiosum deponens sedimentum.

#### IV. Subjunctum.

- 1 Obnoxia huic affectui præcipue sunt fœminæ Mensium ataxiis, nec non quandoque viri hæmorrhoidum infausito successu laborantes.
- 2 Scarificationibus alterutrius saltem lateris assueti, easque dein negligentes.
- 3 Iracundiæ dediti.
- 4 Vitæ sedentariæ, diætæ vinosæ & aromaticæ delicias quærentes.
- 5 Post corporis incalescentiam nimiam incaute sese refrigerantes; imprimis pedes tempore humidiori & frigidiori ab aeris injuriis non bene munientes.
- 6 Lucubrationibus & nimis vigiliis caput defatigantes.
- 7 Hæreditariam dispositionem a parentibus habentes.
- 8 Arthritici per repellentia imperite tractati.

#### V. Prognosis.

- 1 Hemicrania nisi perite tractetur facile varia oculorum pathemata, nimirum inflammationes, visus hebetudines, lussiones post se trahit.
- 2 Proclivis quoque est ad alios spastico-arthriticos affectus graviores: nam & ipsa jam ex eorum familia est. Contingit autem hoc eo certius, quo magis incongrua adhibita fuit medela.
- 3 Periodica & paroxyzans interdum adeo rebellis est, ut fere omnem medelam respuat.
- 4 In feminis, a subitanea Mensium fluentium suppressione orta Hemicrania, per Mensium fluxum ordinario tempore redeuntem, interdum sponte solvitur, id quod etiam contingit in Viris Hæmorrhoidibus obnoxiiis.
- 5 In annosioribus autem, ubi Mensium negotium jam cessavit, vix amplius spontanee solvitur, nec plenariam admittit curationem.
- 6 Per refrigerantia externa incaute tractata hemicrania, inflammatorios internos affectus interdum format, præcipue in junioribus sanguinem orgasticum possidentibus.
- 7 Pertinacis autem & refractarii hujus affectus eventus infeliciores quandoque solet esse hemiplecticus.
- 8 Signum hujus rei præbet aliquando dolor admodum pertinax ad brachium usque sese extendens illiusque quasi stuporem post se trahens.

#### VI. Remedia.

- 1 Libertati alvi prospiciunt lenia laxantia: Magnes. alba, Manna, Senna, Tamarindi, Rhabarbarum; specialiter Pil. Stahliani, Polychr. e Succ. Crat. Tart. Quercet. Extract. Hell. nigr.
- 2 Sanguinem superfluum educunt Venæsectio revulsoria in pedes celebrata, scarificationes, & in hæmorrhoidariis hirudine ano applicitæ.
- 3 Ebullitionem temperant & spasmos solidarum partium mitigant Pulveres Nitroso-absorbentes diaphnoico-Cinnabarini ex. gr. Oc.  $\mathfrak{z}$ . præparat. Antimonium diaph. Nitr. depur. Arcen. duplic. Cinnab. Antimonii vel nativa, Tinct. item Salina Richterii.
- 4 Nimia dolorum ferociæ consulunt interne MPil. de Cynogl. Pil. e Styraçe versus somnum cum temperantibus exhibitæ: Externe Ungt. Alabastrin. Camphorat. Ol. Nucleor. Persic. Spir. Vini Camph. Empl. de Betonic. Vacamah. Mastich. Epithemata ex herbis cephalicis temperatioribus cum sale & mica panis parata.
- 5 Humores revellunt partim supra laudata laxantia & evacuationes sanguinis in infernis partibus institutæ, partim clysteres, partim etiam pediluvia, & in refractaria malo vesicatoria furis applicitæ.
- 6 Tono partis affectæ roborando & simul sanguini

discutiendo specialissime inservit Tint. Tartari, Antimonii acris, Spir. C.C. anaticæ mixta.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis laxans.

Rx. Magnes. alb.  $\mathfrak{z}$ j. M. pro una vice.  
Specif. Jalapp. gr. xv.

##### 2 Pilulæ laxantes.

Rx. MP. e Succ. Crat. Mercur. dulc. ana. gr. vj.  
gr. xv. Elix. Prop. Par. f. pil. num.  
Extract. Hell. nigr. 29. dentur pro una dosi.

##### 3 Pulvis emetico-laxans.

Rx. Rhabarb. elect. gr. xv. Sal. Absinth. gr. iv.  
Tart. emet. gr. iiss. M. f. Pulv. pro j. dosi.

##### 4 Pulvis temperans.

Rx. Conach. præparat. Arcan. dupl. ana.  $\mathfrak{z}$ j.  
Antimonii diaph. Cinn. b. Antimonii  $\mathfrak{z}$ ss.  
Nitr. depur. M. dosi  $\mathfrak{z}$ j. bis vel ter per diem.

##### 5 Pulvis anodyno-temperans.

Rx. Pulv. Præscript.  $\mathfrak{z}$ ij M. div. in 6. part. æq. versus  
MPil. e Cynogl. gr. vi. somni tempus dosi una.

##### 6 Unguentum anodyno-temperans.

Rx. Ungt. Alabastr.  $\mathfrak{z}$ ss. Croc. Orient. gr. v.  
Ol. nucl. Persic.  $\mathfrak{z}$ ij. M. fronti & temporib. illi-  
Opil. in Acet. sol.  $\mathfrak{z}$ j. nendum.  
Camph.  $\mathfrak{z}$ ss.

##### 7 Epithema discutiens.

Rx. Rad. Rhod. Ror. mar. ana. p. j.  
Valerian. ana.  $\mathfrak{z}$ ss. Camph.  $\mathfrak{z}$ j.  
Herb. Verben. M. f. pulv. grossus include  
Origan. ana. mss. Sacculis aceto rosaceo vel  
Flor. Lavend. Spir. Vin. Camph. irrorandis.

##### 8 Essentia Tonico-Nervina in declinatione mali usurpanda.

Rx. Tinct.  $\mathfrak{z}$ ij a rio is. M. dos. gutt. 30. bis vel 30.  
Spir. C.C. ana.  $\mathfrak{z}$ ss. per diem.

#### VII. Methodus medendi.

##### a In Paroxysmo.

- 1 Primarum viarum saburra eliminanda est per lenia laxantia, imo si iracundia huic affectui ansam dedit, nec lene vomitorium reformidandum.
- 2 Sanguinis orgasmus temperandus & solidæ partes demulcendæ sunt per Nitroso-absorbentia & cinnabarina, nec non in casu necessitatis anodyna interne adhibita, non neglectis appropriatis externis.
- 3 Revulsione causa adhiberi possunt clysteres aliquoties repetendi, pediluvia & in malo vehementiori vesicatoria.
- 4 Pro partibus solidis loci affecti mitigandis, præscribatur decantata Tinct. Tonico-Nervina Dr. Stahliani, egregii, circa declinationem morbi, effectus.

##### b Extra Paroxysmum.

- 1 Ad consuetas evacuationes sanguinis respiciatur, ut præprimis spontaneæ expediantur, artificiales autem assuefactæ tempore vernali & autumnali continentur, quod quidem optime revulsione gratia in pedibus fit, aut in hæmorrhoidariis hirudinum applicationem ad anum.
- 2 Alvino successui prospiciatur vel per laxationes epicraticas, quæ simul causam aliquo modo eliminat, vel liquorem Ferr. fol. Tart. ad 30. vel 40. guttas exhibitum, vel etiam sufficientem potum moderato semper motu interposito & subjuncto: multum etiam in imminuendo & mitigando hocce malo potest alvi libertas.
- 3 In fœminino sexu præprimis Mensiu ratio habeatur per remedia secura: Pil. Dr. Stahliani, polychr. Hall. vel tonico-visceral. Argent.
- 4 Diætæ tenuis atque parca observanda est, fugiendo animi pathemata, vini & aromaticorum abusus, omnes fortiores commotiones corporis, & translationes sanguinis ad superiora præcaveantur.

#### VIII. Cautela Prædictæ.

- 1 Evacuationes sanguinis melius extra paroxysmum instituuntur quam in paroxysmo: quia natura eadem facile assuefit, ita ut malo recurrente, nullis fere



- fere aliis remediis, nisi hæc iterum celebretur, auscultet.
- 2 Quando tamen insignis adest plethora cum doloribus admodum vehementibus & pertinacibus, tunc & in ipso paroxysmo venam secare consultum est.
  - 3 Imo in malo, ab hæmorrhoidibus suppressis originem trahente, quandoque cum maximo levamine in ipso paroxysmo in usum trahuntur hirudines, locis hæmorrhoidalibus applicitæ.
  - 4 Hirudines ordinarie fere ano & partibus infernis applicantur; Acta autem Nat. Cur. & temporibus applicatas felices effectus præstitisse recensent.
  - 5 Arteriotomia a multis Auctoribus commendata, momentaneum interdum auxilium præstat, plerumque autem affectum pejorem & pertinaciorum imposterum reddit.
  - 6 Vomitoria non facile exhibeantur, nisi summa necessitas eorum usum suadeat; potius Salia neutra cum Sale Cathart. amar. bilem admodum infringentia & evacuantia iisdem substituantur, vel saltem cum illis combinantur; in statu autem insigniter plethorico plane omitantur.
  - 7 Opiata quamvis dolorem aliquo modo interdum sopiant, nunquam tamen tuta sunt, nisi temperantia vel præmittantur, vel jungantur, alias enim facile malum gravius reddunt & exasperant.
  - 8 Mixtura tonico-nervina in augmento mali non est exhibenda, ebullitionem enim sanguinis adauget, sed in declinatione mali egregie se gerit: Potest etiam interdum pro præservando malo in usum trahi.
  - 9 Externe formulæ aquosæ vitentur, præstat easdem vel in sicca, vel spiritiosa forma adhibuisse.

## CAPUT TERTIUM.

## De Pleuritide Spuria.

- I. *Definitio.* **P**leuritis spuria est affectus rheumatico-spasticus, a sanguine versus pectus translato & in partibus exterioribus musculosis stagnante, ortum trahens.
- II. *Differentia.*
  - 1 Ratione symptomatum.
    - a A vera Pleuritide & Peripnevmonia: quæ cum gravi horrore & subsequente intenso calore incipiunt, ac præterea duritiem pulsus, earum pathognomonicum fere signum, nec non dolorem exquisitissimum etiam in interiori pectoris paulo infra mamillam præcipue notabilem, cum pulsu synchronum, aliaque acerbiora symptomata conjuncta habent.
  - 2 Ratione loci; Pleuritis vera & peripnevmonia, plevram & pulmones pro sede mali agnoscunt, spuria vero musculosas externas pectoris partes.
- III. *Signa.*
  - 1 Incipit ut plurimum cum horrore levi & subsequente mitiori calore, nulla tamen febre certum typum servante, stipata est.
  - 2 Occupat dolor vel scapulas vel claviculas, vel costas, ut plurimum vero latus dextrum, præcipue in respiratione sese exacerbans.
  - 3 Respiratio præterea est difficilis & pectus interdum quasi compressum, non nisi cum summa difficultate & insigni dolore in respiratione dilatatur; appetitus prostratus, somnus inquietus, vires languescentes.
  - 4 Concurrit quoque tussicula, dolores plus minus exquisiti punctorios, non tamen cum pulsu ut in vera Pleuritide, sed cum respiratione coincidentes, nec etiam sputa colorata & sanguinea conjuncta habens.
  - 5 Nulla hic febris exquisita ut in Pleuritide vera.
  - 6 Pulsus non durus & tensus est ut in vera Pleuritide, sed mollis ut in partibus carnosis inflammatis contingere solet.
  - 7 Urina ruffa simile sedimentum tartareum deponens.

- 8 Ægri similiter ac in vera Pleuritide difficulter & non nisi cum molestia in partem sanam decumbere possunt.
- 9 Sanguis Venæsectione emissus, similiter uti in Pleuritide vera, exhibet in superficie crustam albam tenacem.

IV. *Subiectum.*

- 1 Sanguineo-Cholerici & Sanguineo-Melancholici, nec non Melancholico-phlegmatici Plethorici in Juvenili ætate præprimis constituti, evacuationibus sanguinis vel spontaneis vel artificialibus assueti, easque semel introductas negligentes, iracundiæ obnoxii, post usurpatam diætam aromaticam & vinosam aeri frigidiori & humidiori sese exponentes, externas fortuitas concussiones incurrentes.
- 2 Congestionibus, Rheumatibus & arthriticis affectibus obnoxii.
- 3 Personæ quibus scabies aliaque exanthemata in corporis habitu occurrentia, retropulsa fuerunt.

V. *Prognosis.*

- 1 Iusta methodo facile curatur & nullum fere periculum post se trahit.
- 2 Quod si tamen vel per regimina sudorifica æstuosa vel externa refrigerantia imperite tractatur, facile imprimis in junioribus transit in scirrhostates hepatis vel lienis, ad quas formandas admodum proclivis est.
- 3 Pleuritis spuria male tractata, facile degenerat in Pleuritidem veram, frequentius vero in Hepatitidem.

VI. *Remedia.*

- 1 Sanguinem abundantem in assuetis evacuant Venæsectiones.
- 2 Primarum viarum saburram evacuant & alvum expediunt vel vomitoria, vel laxantia: Manna, Cassia, Tamarind. Senna, Rhæbarb. Pil. Beccher. Balsam. Viscer. clysteres.
- 3 Sanguinem ad stasim primum resolvunt, discutunt & diluunt Nitrosa, absorbentia: Oc.  $\mathfrak{ss}$ . præp. matr. perl. præp. Conch. præparat. &c. Diaphoretica fixa:  $\mathfrak{z}$ . diaph. Bez. miner. &c. Alexipharmaca leniora: Ess. Alex. Stahlî, Pimpin. Scordii &c. Diluentia & lubricantia, nec non Emulsiones cum Sem. Card. mar. Herbæ pectorales Veronic. Tussilag. heder. Terr. Scabios. Sperm. Ceti, sang. Hirci &c. Externe vero Cataplasmata & Epithemata discutientiâ, camphorata: Spir. Vin. Camph. nec non emplastr. de Tacamah. Saponat. Barbette, vel Galban. cum empl. e Sperm. Ceti Myns. combinata & large camphorata.
- 4 Dolorum ferocium mitigant cinnabarina & in summo necessitatis casu Anodyna correctæ.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis Emeticus.
 

R. Rhæbarb. elect. $\mathfrak{ij}$ .	Sal. Polychr. gr. iv.
Tart. emet. gr. $\mathfrak{ij}$ .	M. pro una dosi.
- 2 Potio Laxans.
 

R. Rhæb. elect. $\mathfrak{z}$ ss.	Infunde inf. q. Aq. in Col.
Passul. min.	lat. $\mathfrak{z}$ ij. dissolve
Tamarind. ana. $\mathfrak{z}$ ss.	Man. Calabr. $\mathfrak{z}$ j.
Crystall. Tart. $\mathfrak{ij}$ .	pro una vice.
- 3 Pulvis Laxant.
 

R. Tart. Vitriolat.	Resin. Jalap. gr. vj.
$\mathfrak{ij}$ .	M. pro j. dosi.
- 4 Alius.
 

R. Sal. Cathart. amar. $\mathfrak{z}$ vj.	detur pro j. dosi.
---	--------------------
- 5 Pilulæ Laxant.
 

R. Pil. Balsam. Visceral.	sumantur 15. pro dosi mane
$\mathfrak{z}$ ij.	vel vespere.
- 6 Liquor Laxans.
 

R. Liq. aperit. miner. $\mathfrak{z}$ ij.	pro una vice.
	vel iv.
- 7 Pulvis diaphnoico-temperans.
 

R. Mand. luc. pisc. præ-	Tart. Vitriol. ana. $\mathfrak{z}$ ss.
par.	Cinnab. Antimonii $\mathfrak{ij}$ .
Dent. apr. præp. ana. $\mathfrak{z}$ j.	M. dosi 2. cusp. cultri bis
Antimonii diaph.	per diem versus vespeream &
Nitr. depur.	noctem.



8 Essent. Alexipharmaco-diuretica.

- R. *Ess. Alex. Stablii* ʒj. *tar. ana.* ʒj.  
*Scordii.* *M. mane, & circa meridiem*  
*Tinct. Antimonii Tar-* 30. gutt. *propinando.*  
 9 Species pectoral. pro Infuso.  
 R. *Rad. Pimpin.* ʒss. *pap. rh. ana. p. j.*  
*Herb. Veron.* *Incisa coque in Aq. font.*  
*Tussil.* *mane & circa meridiem tan-*  
*Scabios. ana. mfs.* *quam vehiculum pro præscri-*  
*Flor. bellid.* *pta Essentia usurpando.*

10 Mixture resolvens.

- R. *Ol. Amygd. dulc.* ʒj. *Capill. Vener.* ʒss.  
*Sperm. Cet. rec.* ʒj. *M. bis per diem ad Coch. j.*  
*Syr. Violar. vel* *calide propinando.*

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Sanguini turgescenti & ad stases prono exitus concedendus est per evacuationem sanguinis artificialem, præprimis in iis, qui vel spontaneis vel artificialibus ejusdem excretionibus sunt assueti.
- 2 Evacuatio emetica imprimis locum habet, quando iracundia affectui occasionem dedit; quod si vero nil tale occurrerit, laxantia & clysteres laxitati alvi satis prospiciunt.
- 3 Corpus in continua diapnoe servandum, ut congestoria stasis eo melius discuti & sanguis in priorem circulum æqualem eo citius redire possit, quod præter diaphoretica fixa, per potum tenuiorem & calide propinatum, Emulsiones, absorbentia, solventia, & discutientia tam externe, quam interne in usum vocata, ac tranquillam corporis continentiam optime obtinetur.
- 4 Dolores raro anodynum exposcunt, sed cinnabarinis ut plurimum facile cedunt, quod si tamen atrociores fuerint, pulveribus diapnoico-absorbentibus versus noctem gr. j. Mᵀ. e Cynogl. mitigari possunt.
- 5 Tussicula levior concurrens, levamen capit ab herbis pectoralibus, sub infusi forma, nec non spermate Ceti & Ol. Amygd. dulc. calide usurpatis.

#### VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Si necessitas non urget, præstat Venæsectionem intermittere, magis enim prodest præservatorie, quam curatorie.
- 2 Si vero necessitas eandem urgeat, statim subjungantur remedia supra præscripta fixa.
- 3 Externa calidiora acria, nec non volatilia absint, ne affectus externam regionem deferat, & viscera interna petat, ad quod valde proclivis est.
- 4 Multo minus conducunt externa refrigerantia & repellentia, a quorum usu simile quid metuendum.
- 5 Nil magis juvat, quam quieta corporis continentia; e contra animi pathemata facile novos insultus excitant.
- 6 Quando a præpostera medicatione jam febricula lenta successit, tum affectus methodum exposcit sibi congruum i. e. aperientem, solventem & discutientem.
- 7 Opiata non conveniunt, nisi sedato jam aliquo modo impetu.

### CAPUT QUARTUM.

#### De Nephritide Spuria.

I. **Definitio.** Nephritis est dolor dorsi & lumborum plus minus acerbus, a motu sanguinis, ad excretionem Hæmorrhoidalem destinati, originem habens.

#### II. Differentia.

A vera Nephritide, quæ dolores sistit intimiores in ipsa Renum regione sese exerentes, cum concurrente febricula, conatibus vomendi, gravioribusque Symptomatibus, suo loco recitatis: Nephritis Spuria vero ab his Symptomatibus est immunis, folis doloribus tensivis & lancinantibus magis externe perceptibilibus stipata.

#### III. Signa.

- 1 Dolores lumbares tensivi & contractorii circa par-

tes musculosas externas sese exerentis, ita ut corpus præ dolore movere nequeant.

- 2 A motu corporis fortiori, equitatione, vectura, diætâ calidiori, insigne augmentum capientes.
- 3 Alvum strictiorem connexum habentes.

#### IV. Subjectum.

Juvenes proveciores & Viri sanguinei, Sanguineo-Cholericæ, vel Sanguineo-Melancholici, hæmorrhoidum fluxum vel jam experti, vel ad eundem proclives, a vita agili ad otiosam transeuntes, diætæ vinosæ & aromaticæ dediti, castra venerea admodum frequentantes, motus fortiores per vecturam aut equitationem instituentes, ac evacuationes sanguinis artificiales negligentes.

#### V. Prognosis.

- 1 Nephritis hæc spuria si cum nephritide vera confunditur, & insuper per medicamenta diuretica acriora tractatur, facillime copiosiores congestiones & restrictionem sanguinis ad renes post se ducit, adeoque in vera nephritica mala transit.
- 2 Sicuti vera Nephritis insigne ab Hæmorrhoidibus fluentibus emolumentum capit, ita & hæc non contemnenda ab iisdem utilitatem habet expectandam.
- 3 Alvus adstricta dolores semper exacerbat.
- 4 In senibus dolor hic fixus inveteratus, non raro marasimum post se trahit.

#### VI. Remedia.

- 1 Sanguinem superfluum evacuant Venæsectio in pede & scarificationes in locis inferioribus celebratæ. specialissime vero hirudines locis hæmorrhoidalibus applicitæ.
- 2 Alvus strictior dolores augens solvitur vel per lenia laxantia: Mannam, Tamarindos, Rhabarbarum, Magnesiam albam &c. vel per clysteres.
- 3 Commotiones sanguinis temperant Nitrosa, absorbentia, diapnoica, digestiva & cinnabarina cum interpositis diluentibus, emulsivis & gelatinosis.
- 4 Externe stasin discutiunt, & partem affectam roborant Spir. Vini Camph. Serpilli abstractitius, Spir. formicarum, lenes frictiones, & in graviore & vehementiori sensu Embrocationes; Emplastrum item Saponat. *Barbette* loco affecto imponendum.
- 5 Revellunt & ad alia loca invitant supra commendatæ evacuationes sanguinis & alvinæ relaxationes, nec non motus corporis successive ad defatigationem & sudorem usque continuatus, cum interposito pediluviorum usu.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Pulvis laxans.

R. *Magnes. alb.* ʒij. *d. ad Ch. pro j. vice.*

##### 2 Alius.

R. *Pulv. Lax. Hallens.* *vel ad gr. xxv.*  
*ʒj.* *pro una dosi.*

##### 3 Potio laxans.

R. *Tamarind.* *Coque in f. q. aq. Colat.*  
*Passul. min. ana.* ʒss. *R. ʒij. vel ʒiv. dissolve*  
*Rhabarb. el.* ʒiss. *Manna Calabr.* ʒj.  
*Crystall. Tart.* ʒj. *Pro una dosi.*

##### 4 Pulvis diapnoico-absorbens.

R. *Conch. preparat.* *Nitr. depur. ana.* ʒj.  
*ʒii. diaph.* *Cinnab.* ʒii. ʒss.  
*Tart. Vitriolat.* *M. dosi ʒj. 3. vel 4. per diem.*

##### 5 Alius Nitroso-temperans.

R. *Arcan. duplic.* *Cinnab. Nativ.* ʒss.  
*Nitr. depur. ana.* ʒij. *Dosis & usus ut antea.*

##### 6 Decoctum Antispasmodicum.

R. *Rad. Altheæ* ʒj. *Card. Mar. ana.* ʒjss.  
*Liquir.* ʒss. *Incis. & contus. pro aliquot*  
*Flor. Samb. m. fs.* *dosis in sero lactis deco-*  
*Bellid. min. p. j.* *quenda & singulis mane*  
*Sem. Lini.* *haustus loco Thee.*

##### 7 Emulsio resolv. & discut.

R. *Amygd. dulc. exc.* *f. l. a. Emulsio edulc. cum*  
*Sem. Card. mar.* *Syr. dialth. Fern.* ʒvj. *adde*  
*Alib. ana.* ʒij. *Oc. ʒ. preparat.*  
*eum Aq. Chæresol.* *ʒii diaph. ana.* ʒss.  
*Card. mar. ʒ. ʒvj.* *Cochleatim propinanda.*



## 8 Spiritus Externus discutiens.

R. Spir. Vin. Camphor. ʒj. Formic. ana. ʒss.  
Serpilli. M. calide illinendus.

## 9 Alius.

R. Spir. Vin. Camph. ʒj. Formic. ana. ʒss.  
Lumbr. Terr. M. usus ut supra.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Ante omnia ad evacuationes sanguinis vel spontaneas vel artificiales est respiciendum, ut illæ promoveantur & expediantur, & quidem talibus in locis ubi mali maximum emolumentum sperandum est, quod vel in pedibus per administratas Venæsectiones & scarificationes, vel per applicationem hirudinum circa anum efficacissime contingit.
- 2 Quia adstrictio alvi spasmos in vicinia coortos adhuc magis fovet, ideo quamprimum ejusdem lubricitas est restituenda, quod partim lenia laxantia, partim clysteres efficiunt.
- 3 Sanguis vero spissescens & ad statim pronus diluatur per sufficientem potum, diætā tenuiorem, gelatinosa & emulsiva.
- 4 Ipsi sanguinis & partium solidarum commotionibus consulunt, præter jam dicta, pulveres Nitroso-absorbentes, diapnoici, cinnabarini & feri lactis usus.
- 5 Ad æqualem circulationem nulla re melius sanguis disponitur, quam motu corporis voluntario successive instituto & ad lenem uique sudationem aucto.
- 6 Revulsionem decubitus in lumbis facti post evacuationes sanguinis & alvi supra commendatas peragunt etiam pediluvia.
- 7 Externe parti affectæ per discutientia & nervina temperatiora succurrendum est, nec non lenes, frictiones & in vehementiori malo per stillicidia, imo lapsus calidarum aquarum.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Olea acriora & aromatica nec non volatilia externe usurpata non conveniunt, partem enim affectam vel admodum sensibilem reddunt, vel ad stuporem disponunt.
- 2 Neque etiam adstringentia aliquid boni præstant, siquidem tensiones magis augescunt, & spasmos inducunt.
- 3 Interne omnia calidiora & volatilia locum haud inveniunt, ob orgasmum majorem quem excitant.
- 4 Ipsa vero diuretica acriora in hoc affectu quam maxime vitanda, dum facillime veram Nephritidem post se trahere solent.

## CAPUT QUINTUM.

## De Malo Ischiadico.

I. *Definitio.* **M**alum Ischiadicum est dolor admodum exquisitus & vehemens regionem coxendicum occupans, a motibus & contentionibus Naturæ auctioribus ad excretionem sanguinis per vasa hæmorrhoidalialia tendentibus, ortum habens.

II. *Differentia.*

- 1 Ab *arthritide*, hæ juniores magis affligit, & superiores corporis partes occupat, illud annosioribus familiare est, & in coxis sedem habet.
- 2 A *Chiragra*, *Gonagra* & *Podagra* primo ratione loci affecti, secundo & ordinis: nam hæ posteriores sunt, illud prius.
- 3 A *Simplicibus moliminibus* ad hæmorrhoides tendentibus vehementiæ & pertinaciæ gradu, qui in ischiadico malo insignis est.

III. *Signa.*

- 1 Præcedit aliquando dolor fixus in osse sacro, vel subito vel sensim coxendices occupans.
- 2 Dolor vehemens & pertinax coxendices obsidet, in tendinibus circa juncturas desinentibus maxime sæviens.
- 3 Musculi totius lateris eximie stringuntur, ut præ rigoribus ægrotantes corpus neque flectere & in-

curvare possint absque ingentibus doloribus, neque incurvatum absque tali sensu erigere.

4 Dolor interdum ad genu, interdum vero ad pollicem pedis se extendit.

5 Nonnunquam jungitur etiam vasorum per crura inflatio.

IV. *Subjctum.*

- 1 Sanguinei, Sanguineo-Cholerici, Sanguineo-Melancholici, plethorici, succulenti, passionibus animi & diætæ calidiori dediti, otiosi, præprimis hæmorrhoidum infauis successibus laborantes.
- 2 Veneri nimis dediti.
- 3 Venæsectiones & scarificationes assuetas negligentes.
- 4 Rhevmaticis affectibus antea obnoxii.
- 5 Frequentes Narium hæmorrhagias & congestiones ad varias partes passi.
- 6 Hæreditariam dispositionem possidentes.
- 7 Fœminæ hysterici affectibus obnoxie, post cessationem Mensium.
- 8 Quibus sudores pedum consueti suppressi fuerunt.
- 9 Externas injurias & violentias passi.

V. *Prognosis.*

- 1 Hæmorrhoidum, Ischiadis, Nephritidis atque calculi renum inter se mutuo & cum podagra, non simpliciter perpetuæ, tamen multiplices utique & plane communes sunt societates, communicationes & conspirationes. D. Stahl.
- 2 Dolor ischiadicus insolentior non solum certissime, sed omnino etiam mature in Gonagram & Podagram extenditur. Idem.
- 3 Hæmorrhoidum fluxus, vel vicaria in locis vicinis sanguinis evacuatio non tantum mitigat, sed quandoque præsentissime tollit hocce malum.
- 4 Dolor ischiadicus circa os sacrum longe citius mitigatur, & tollitur, quam ille, qui in junctura femoris innidulatur.
- 5 Quo magis inveteratum est hoc malum, eo difficilius medelam admittit.
- 6 Quibus longo coxendicis dolore vexatis coxa excidit, & rursum incidit; iis mucres insunt *Hipp. Aph. 59. S. VI.*
- 7 Quibus a diuturno coxendicis malo vexatis crus excidit, iis crus contabescit, & claudicant si non uisti fuerunt. Idem *Aph. 60. S. VI.*
- 8 Quo magis movetur pars affecta, eo major exacerbatio metuenda.
- 9 Dolores locum affectum sensim deferere & ad inferiora magis migrare bonum est.

VI. *Remedia.*

- 1 Abundantiam sanguinis generaliter evacuant Venæsectiones in pede celebratæ, specialiter hirudines ano applicatæ, ut hæmorrhoides, si subfuerint, vel promoveantur vel revocentur.
- 2 Sanguinem temperant & dolores mitigant pulveres Nitroso-absorbentes ex Oc. ʒ. vel Conch. præparat. Nitro depur. Sale digestivo, lumbric. terrestr. & Cinnab. Antimonii; in dolore enormiori versus somnum. gr. j. Mass. Pil. e Cynogl. vel Pil. wildegans. addendo: potus sufficiens atque tenuis, Decoctum C. C. Thee, vel aliis herbis discutientibus alteratum.
- 3 Stasin sanguinis dissolvunt interne diaphoretica fixa, & lenia alexipharmaca; externe Spir. Vini Camph. Saponatus, Serpilli abstractitius, lumbricor terrestr. formicar. Empl. e Galban. Saponat. Barbette, largiter camphorata: Sacculi, suffitus, epithemata & suffimigia vaporosa, ex discutientibus & roborantibus parata, cum subjuncto successivo & sensim continuato motu.
- 4 Humores revellunt & ad alia loca invitant lenia laxantia, clysteres, pediluvia.
- 5 Tono robur addunt diuretico-nervina Tinct. Antimonii Tartarif. Tartari & Spir. C. C.

## Formula Remediorum.

## 1 Nodulus Laxativus.

R. Rad. Cichor.  
Vincetox.

Polypod. Qu. ana.  
ʒss.  
Herb.



*Herb. Chamædr.* *Rhabarb. el. ℥iij.*  
*Chamæpyt.* *Hermoad. ℥ij.*  
*Capill. & is ana. m℥.* *Fibr. Helleb. nigr. ℥j.*  
*Flor. Bellid. min. p. j.* *Cryſtall. Tart. ℥iſs.*  
*Cort. Aurant. ℥ij.* *Incif. contuſ. cum ℔. j. Aqua*  
*Fol. Senn. Or. ℥vj.* *& ℔iij. vini generoſ. infund.*

## 2 Pulvis temperans.

*R. Arcan. dupl.* *M. div. in 30. p. æq. 3. vel 4.*  
*Nitr. depur. ana. ℥iſs.* *dofes per diem propinan-*  
*Cinnab. ℥iij. ℥ſs.* *do.*

## 3 Pulvis diaphnoico-temperans.

*R. Pulv. Præcedens.* *M. div. in 6. p. æq.*  
*℥j.* *verſus noctem doſin j. por-*  
*℥ diaph. ℥ſs.* *rigendo.*

## 4 Alius anodyno-temperans.

*R. Conch. præparat.* *Maſſ. pil. e Cynogl.*  
*Lumb. terreſtr.* *gr. j.*  
*Nitr. depurat.* *M. Div. in 4. part. æq. Doſis.*  
*Tart. Vitriol. ana. ℥j.* *& uſus præcedentis.*

## 5 Epithema.

*R. Rad. Angelic.* *Calend. ana. p. j.*  
*Sigill. Salom. ā. ℥ſs.* *Sem. Dauc. Cret.*  
*Herb. Chamædr.* *Fenic. ana. ℥iſs.*  
*Origan.* *Incif. contuſa include ſaccu-*  
*Serpilli ana. mſs.* *lis vino calefacto imbuendis.*  
*Flor. Chamom.* *& applic.*

## 6 Suffimigium.

*R. Maſtick.* *Violar.*  
*Oliban. ana. ℥ij.* *Stechad. Citrin.*  
*Styrac. Calam. ℥j.* *Lavend. ana. p. j.*  
*Flor. roſar.* *Incifa & contuſa D. ad Ch.*

## 7 Spir. externus diſcutiens.

*R. Spir. Vin. Camph.* *Serpilli abſtraht. ℥ſs.*  
*℥j.* *M. calide illinendo.*

## 8 Eli. Tonico-diuret. interna.

*R. Tinct. Antimonii vel* *Spir. C. C. ana. ℥iſs.*  
*Tart. acris.* *30. gutt. bis vel ter per diem.*

## VII. Methodus medendi.

## a In Paroxyſmo.

1 Per temperantia humoribus atque motibus auxilium præſtandum eſt, ordinando pulveres nitroſo digeſtivos ad ℥j. 3. vel 4. per diem, & injuncto ſufficiente potu, nec neglecta alvi liberate per clyſteres obtinenda.

2 Pro equalitate circuli ſanguinis obtinenda addantur his pulveribus verſus noctem aliquot grana Antimonii diaph. ad diaphoreſin per noctem eo melius excitandam, vel in doloribus inſignioribus granulum j. Maſſ. pil. e Cynogl. ſubjunctis etiam poſt aliquot dierum decurſum lenioribus alexipharmacis.

3 Externe diſcutiendi & leniendi ſcopo applicetur Spir. vini Camphor. Crocatus, & Serpilli, vel adhibeatur Empl. Sapon. Barb. aut e Galban. Camphor. vel etiam epithemata, ſacculi & ſuffimigia.

4 In declinatione mali, pro parte affecta roboranda, laudata Tinct. diuretico-nervina in uſum trahatur.

## b Extra Paroxyſmum.

1 Proſpiciatur evacuationibus ſanguinis & ſpontaneis & artificialibus juſto ſemper tempore promovendis & celebrandis.

2 Alvus ſemper aperta ſervetur, quandoque etiam ventriculus & inteſtina repurgentur per nodolum cum epicraſi laxantem.

3 Motus imprimis corporis ſucceſſive in uſum trahendus haud negligatur: eximium enim præſtat levamen.

4 Pars etiam læſa ſemper a frigore muniatur, ne novi decubitus eo denuo fieri poſſint.

## VIII. Cautelæ Præctica.

1 Melius ſemper evacuationes ſanguinis extra paroxyſmum in uſum trahuntur, quod ſi tamen vehementia mali contrarium indicat, in paroxyſmo eadem celebrare conveniet, quod ſæpius non abſque ſenſibili mali levamine contingit.

2 Hirudinum applicationem ad anum, quandoque etiam Venæſectionem in pede celebratam, in hoc affectu ſepiſſime aliquid ſingulare præſtitiffe, teſtan-

tur innumeræ Authorum Obſervationes.

3 Uti lenia remedia laxantia ſumme proficua ſunt, ita acria & fortiora malum exaſperant.

4 Regimen diaphoreticum actuale huic affectui haud conducit; ſufficit ſub eruptione madoris matutino tempore lene alexipharmacum exhibuiſſe.

5 Motus corporis voluntarius, ſi aliquid ſenſibile præſtare debet, ſit laborioſior & diuturnior præmiſſa tamen ventilatione ſanguinis, & extra paroxyſmum inſtituendus.

6 Omnia remedia calefacientia, acria nervina, damnum afferunt, & tanto magis interne exhibita.

7 Emplaſtrum Saponatum Barbette, quando dolores non admodum fixi ſunt, egregiam edit efficaciam, in confirmato vero non item.

8 Idem quoque a Cerato matricali expectandum, ſi dolores non nimis ſunt acuti.

9 Balnea nil boni præſtant; ſuffimigia tamen vaporofa præmiſſis præmittendis, haud abſq; notabili quandoque effectu in uſum trahuntur.

## CAPUT SEXTUM.

## De Podagra.

I. Deſinitio. **P**odagra eſt dolor tenſivus, vel rigoris & preſſionis, ſenſum continuum & uniformem, vel diſcretum vibratilem & tractorium in paucis fibrillis exprimens, ut plurimum cum febrilibus alterationibus conjunctus & a congeſtione ſanguinis hæmorrhoidali, externa originem trahens.

## II. Differentia.

## 1 Ab Arthritide.

a Ratione loci: hæc magis ſcapulas, juncturas humeri vel axillas, capita offis femoris, illa pedes ſtrictæ ſic dictos occupat.

b Ratione ætatis & ordinis: hæc juniores aggreditur & podagram antecedit, illa annioſiores corripit, & arthritidem demum excipit.

c Ratione pertinaciæ vel durationis: hæc citius periodum abſolvit, & ſæpius ab uno loco ad alterum vagatur, ubi ſpecialiter vaga audit, illa diutius perſiſtit & fixe quaſi unum locum tenet.

2 A Chiragra, malo Iſchiadico & Gonagra fere non niſi ratione loci: Chiragra manus fixe obſidet, malum Iſchiadicum os ſacrum & coxas, Gonagra vero genua.

3 Alia eſt regularis & ſtata obſervans tempora, alia vero eſt irregularis.

## III. Signa Podagræ regularis.

1 Podagra regulariter circa ſolſtitia & æquinoclia homines diſpoſitos invadit.

2 Paroxyſmum generalem fere ſemper præcedit apæſia, cruditas ventriculi, gravitas corporis & intumefcentia ejusdem quaſi ventofa, quæ omnia quotidie ſenſim augentur, donec tandem erumpat paroxyſmus. Bagliv.

3 Antecedit gravativa corporis laſſitudo cum horripilationibus, quandoque vero manifeſto horrore & ſubſequentæ æſtu vel continuo vel vago.

4 Invadit circa vespæram aut noctem, & ſummum gradum adipiſcitur poſt mediam noctem, verſus meridiem vero paroxyſmus pauliſper remittere obſervatur. Quodſi autem gravius animi pathema occaſionem ſubmiſtravit uno quaſi impetu erumpere ſolet.

5 Dolor vel vibratorius, tractorius & vellicatorius, vel obtuſus magis & contuſorius in magis phlegmaticis eſt, occupans vel genu vel longitudinem tibię, vel infimum pedem, ejusque præcipue maximi digiti ſeu pollicis juncturam.

6 Quandoque adeo eſt acutus, ut nec levium ſineorum pondus, neque ullum fortiorem ſtrepitum ſine doloris augmento ferre queant: micat, vibrat, palpitat & inſtar peſcinis carpit.

7 Quo acrior autem eſt hic dolor, eo minus ulla alteratio externa coloris ſcil. caloris, & tumoris apparent;



- ret; in phlegmaticis autem satis manifesta inflatio & tumor partis affectæ conspicitur.
- 8 Somnus vix est ullus & qui forte post remissionem paroxysmi obrepit, anxiiis pavoribus stipatus est; quod quidem præcipue in vigore mali contingere solet.
  - 9 In quibusdam vero ad sudorem dispositis, in malo præcipue mitiori, observatur lenis quidam mador, quem aliqualis doloris mitigatio & somnus utcumque placidus sequitur.
  - 10 Paroxysmus hic singulis revertitur diebus circa vesperam, tempore vero matutino iterum remittit.
  - 11 Ultimi tamen prioribus mitiores sunt respectu durationis & vehementiæ doloris, ac tandem sensim sensimque imminuti, plane cessant.
  - 12 In sanguineis notabilis quoque conspicitur tumor & robur erysipelas referens, paroxysmo & dolore jam aliquomodo remittente.
  - 13 Appetitus in principio morbi vel omnino prostratus est cum vomendi conatibus & actualibus vomitibus, vel sic satis adhuc viget.
  - 14 Concurrant in priori casu sæpissime hypochondriaco-colica flatulenta; in posteriori vero lumbaria & calculosa pathemata.
  - 15 Conspicua etiam circa principium Paroxysmorum vaforum per crura excurrentium turgescencia, juncta cum gravatione seu potius tensione aliqua partis affectæ & aspectu musculosarum partium compresso pallido, per totum morbi decursum & imprimis circa exitum, observanda.
  - 16 In principio rarissime sudoris, (madoris tamen interdum) eruptio observatur, in morbi vero decremento aliqui experiuntur madorem, aliqui vero largiorem sudorem & præcipue in parte affecta, idque sub finem singulorum paroxysmorum.
  - 17 Urina fere toto morbi tempore pauca est, ita ut æger tertiam tantum potulentorum assumptorum partem per urinam emittat: alvus pariter adstricta est; cessante vero morbi impetu & absoluto generali ambitu alvus lubrica redditur & urina in majori copia excernitur.
  - 18 In vigore mali est rubicunda, valde crassa, paulisper obscura cum sedimento paucissimo levi albicante: in decremento vero deponit sedimentum crassius, submucidum roseum; affigit præterea tam parietibus vitri, quam ipsi fundo copiosa granula colore aurum æmulantia.
  - 19 Quando dolores sensim remittunt, succedit tandem stupor & rigor partis affectæ, quem sæpius tumor, in quibusdam in vigore statim mali erumpens, excipit.
  - 20 Aliquando vero secessio materiæ furfuraceæ paroxylmo finem imponit.
  - 21 Secundum Sydenhamii observationem una Podagrica periodus e pluribus constat: quotidie circa mediam noctem incipientibus paroxysmis & fere intra 2. 3. vel 4. septimanas absolvitur, nisi perveria methodo, aut inveterata, mali pertinacia diutius adhuc protrahatur.

*Podagra irregularis.*

- 1 Podagra irregulariter procedens, non fixum in pede affecto servat dolorem, sed modo hunc, modo illum corripit.
- 2 Grassatur quoque in alias partes & jam genu, alia vice manus, scapulas, cervicem, caput &c. occupat.
- 3 Digni manuum incurvantur, & circa articulos apparent nodi tophacei.
- 4 In flexura cubiti interdum conspicitur tumor subalbus magnitudine ovum gallinaceum æquans, qui frequenter inflammatur cum insigni rubedine.
- 5 Tumores in pedibus tandem constanter permanent cum insigni membrorum pondere & gravitate & impotentia ad motum, quem non nisi cum summis cruciatibus exercere possunt.
- 6 Nec etiam regularia observat tempora, sed fere quovis tempore homines aggreditur.
- 7 Minime vero constantes servat periodos, quæ statim temporibus absolvuntur, sed sæpius per longum satis tempus ægros miserrime excruciat.

- 8 Interiores quoque partes aggreditur, & modo colicas gravissimas, dolores nephriticos, ac veram Nephritidem calculosam producit.
- 9 Somnus est admodum inquietus & per frequentes dolores punctorios turbatus, imo sæpius ob dolorum ferociam nullus.
- 10 Appetitus est prostratus & cruditates cum ructibus nidorosis ægrotos vexant.
- 11 Molestus pruritus & dolor dorsum & reliquas corporis partes circa somni tempus occupat.
- 12 Urina in reliqua Podagra pauca & rubicunda, hic decolor est & copiosa, illi quæ in Diabete excernitur, similis.
- 13 Dolores aliquo modo sedatos animi affectus facillime revocant.

IV. *Subjectum.*

- 1 Præcipue viri consistentis vel senilis ætatis, plethorici succulenti, spongiosi, temperamenti sanguinei, Sanguineo-Cholerici, Sanguineo-Melancholici, Phlegmatico-Melancholici, diætæ lautæ, aromaticæ, vinosæ dediti, veneris exercitio abusi, animi & præcipue iracundiæ passionibus laborantes, maxime etiam evacuationibus vel spontaneis, vel artificialibus assueti, in provectione deinde ætate eadem negligentes, & vitam laboriosam cum otiosa commutantes.
- 2 Rarius graciles, nisi vel ante spongiosi fuerint, vel malum hæreditario modo a parentibus contraxerint.
- 3 Rarius etiam ætas junior, nisi vel hæreditaria dispositio, vel hæmorrhoides prægressæ, vel vini, iræ & veneris præmaturus abusus occasionem dederint.
- 4 Rarissime femina, magis hypochondriaco-hysterici & arthritici vagis pathematibus vel varicibus crurum obnoxia, quibus tamen hoc malum contingit, iis vel Mensium fluxus cessavit, vel sunt hæmorrhoidariæ, a quorum fluxuum infaussto successu fiunt primo Ischiadicæ, tandem Podagricæ.
- 5 Infantes nunquam Podagra laborant, sed qui ipsis forte acciderint æmuli dolores, magis pro rheumaticis habendi sunt, a scabie, sudore repulsis, febribus male curatis &c. ortum habentes.

V. *Prognosis.*

- 1 Fixi spasmodici dolores quo magis a loco excretionis sanguineæ-hæmorrhoidalis ad quam collineant, remoti sunt, eo pertinacius insistant & Medico minus auscultant.
- 2 Quo recentior adhuc est affectus, eo magis tam diæticam, quam Pharmaceuticam medelam admittit.
- 3 In juvenibus & viris universalis morbi ambitus interdum spatio 14. dierum finitur, in senibus autem sæpius ad aliquot menses extenditur.
- 4 Inveterata Podagra mitigari, rarissime radicitus extirpari potest.
- 5 Qui admodum juniores Podagra corripuntur ad insignem ætatem haud perveniunt, & hoc vel ob complicata hypochondriaco-colica & primarum viarum, nimirum vomitus cruenti, lienteria, fluxus cæliaci, singultus, pathemata, vel ob facile consequentes inflammatorios internos affectus, nec non hectica, paralytica, apoplectica schemata.
- 6 Qui vero serius Podagrici fiunt, ad senam usque senectutem communiter vitam protrahunt.
- 7 Hi magis marasmode vel hydropico-hectico vel paralytico apoplectico, vegetiores etiam acuto affectu vitam terminare observantur.
- 8 Omnes fere Podagrici nephriticis vel lumbaribus pathematibus cum calculosis urinæ vitiis simul sunt expositi, aut ad minimum eadem metuere debent.
- 9 Quicumque hæmorrhoidalibus fluxibus vel motibus obnoxii sunt, post horum ataxia in Podagram facile incidunt.
- 10 Restitutæ autem hæmorrhoides, vel Naturæ, vel Medici auxilio, Podagram si non tollunt plenarie, eximie tamen mitigant.
- 11 Inveteratis chiragrico podagricis passionibus succedunt tandem diuturnæ & stabiles rigores & contracturæ partium affectarum, cui rei præcipue animi pathemata, & diætæ & medicaminum vitia inserviunt.



- 12 Contingunt quoque his circa articulationes digitorum, aut etiam in extremitate ossis cubiti, seu Olecrano nodi quandoque fatis insignes, a perverso emollientium & maturantium usu, in tophaceo-corrosum corruptelam transeuntes.
- 13 Alias affectus recentior sibi relictus rarius ejusmodi modos atque tophos, ortum plerumque refrigerantium & coagulantium abufui, concurrente temperamento phlegmatico, debentes, generat.
- 14 Squamarum quoque atque furfurum secessio admodum rara est, nisi patientes notabiliter fuerint choleric.
- 15 Quamdiu pavores sub somno adhuc continuant, periodi podagricæ finis haud expectandus est.
- 16 Qui tumores in affecta parte post superatum morbum reportant, si diutius persistit & tardius evanuerint, longius a novo insultu immunes vivunt.
- 17 Choleric-Sanguinei non tam tumoribus, quam extenuationi partis affectæ expofiti sunt, Sanguinei vero reportant ejusmodi tumores rubicundos, du-ros, phlegmatici autem magis œdematosos.
- 18 Podagram ab artubus ad interiora retropulsam vel sequuntur inflammatorii affectus hepatis, lienis, aut ventriculi, & hoc in junioribus, vegetioribus, iracundis, calidiori diætæ assuetis; vel hypochondriaco-colica pathemata cum primarum viarum ataxiis, appetitu dejecto, vomendi conatibus, actuali vomitu cruento, nec non agrypnia, febricula lenta & hæctica, & hoc in annosioribus, phlegmaticis, potui haud vinoso, sed aqueo & cibus parum conditis, assuetis.
- 19 Quo vehementior dolor in paroxysmo fuit, eo brevius quidem terminatur Podagra, sed eo diutius novos paroxysmos protrahit, ac tandem eo certius definit in partis affectæ stuporem, vel stabilem rigidam tensionem.
- 20 Quo magis Bacchi, iræ & Veneris exercitio delectantur Podagrici, eo frequentioribus Podagræ recursibus sunt obnoxii.
- 21 Frequentius redeuntes Podagrici insultus, tandem admodum contumaces fiunt, & vehementiam ad jugulum usque protendunt, ubi ægroto parum boni prænunciant.
- VI. Remedia.
- 1 Causam antecedentem scilicet Plethoram imminuunt generaliter Venæsectio in pede, speciatim hirudinum applicatio ad anum, ut hæmorrhoides promoveantur, vel revocentur; scarificatio in partibus inferioribus, in subjectis habitu spongiosiori præditis.
- 2 Cruditates primarum viarum & præcipue bilem, motusque spasticos insigniter exasperantem, abstergunt & educunt lenia laxantia: Rhabarbarina, Sennata cum passulis minoribus, specificè Hermodactyli, Salina: Tartarus solubilis, Crysell. Tart. Sal. mirab. Glauberi, Liq. Terr. fol. Tart. Magnes. alba &c.
- 3 Crasin sanguinis commoti & exæstuantis temperant, & partium solidarum strictionem demulcent Nitrofa, absorbentia, gelatinosa, emulsiva, acidiuscula, clysteres emollientes & carminativi.
- 4 Equalem humorum circulationem adjuvant potus sufficiens & tenuis ex ras. C. C. Ebor. Hord. Infusa ex herbis discutientibus Chamædr. Dulcamara, Hyssop. Verben. Veronic. Alexipharmaca temperiora: Ess. Alexiph. Stahl. Antimonii Tart. & in magis phlegmaticis, Succini; Decocta lignorum ex radicibus resolventibus: Sarsapar. Chinæ, Saponar. Pimpinell. Bardan. lign. Guajac. Sassafras &c.
- 5 Dolorum spasticorum vehementiam mitigant antispasmodica cinnabarina, correctæ anodyna MPil. e Cynogl. Theriac. cœl. Pil. wildegan. genuinæ & imprimis Essent. Dulc. Hallen. concentrata, ordinat. vel extenuata in- & externe usurpata.
- 6 Stasin in loco immediate affecto resolvunt & discutunt, partim modo dicta diapnoica alexipharmaca & resolventia, partim lumbrici Terr. Antimonium diaphor. Bedoard. miner. Externe vero Spir. Vin. Camphor. Saponatus, Empl. e Galban. Saponat. Barbette,

Sacculi calidi ex herbis Chamædr. Chamæpyt. Origan. Serpilli, Puleg. Rad. Angelic. Sigill. Salom. Pimpin. albæ, flor. Verbasc. Calend. Samb. Sem. Anisi, fœnic. Dauci, farin. aven. Croc. in vino cocti vel Spir. Vini aspersi; Spir. acidus formicar. lumbric. serpilli abstractitius, Sapo Venetus in Spir. Vini solutus. Essent. Castor. &c. cum aliis parce mixtus, caseus recens cum pelle leporina, vel panni calentes suffitibus imbuti, frictiones cum excutia molli.

## Formula Remediorum.

## 1 Nodulus Laxativus.

Rx. Rad. Sarsap. Verbas. ana. p. j.  
 Chinæ. Fol. Sennæ s. st. ʒj.  
 Pityp. qu. ā. ʒss. Rhab. elect. ʒij.  
 Herb. Chamædr. Hermodact. ʒss.  
 Chamæpyt. Crysell. Tart. ʒij.  
 Capill. ʒis āā. cum ʒ. j. aq. fervent. ʒ.  
 mls. ʒ. iij. Vin. generos. Infusa 3.  
 vicibus assumendo.

## 2 Pulvis diapnoico-resolvens atque temperans.

Rx. Antimonii diaphor. Pulv. lumbric. Terr. ā. ʒj.  
 Nitr. depur. Cinnab. Antimonii ʒij.  
 Arcan. dupl. M. dosi ʒj. 2. vel 3. per diem.

## 3 Pulvis anodyno-discutiens.

Rx. Oc. ʒ. preparat. Arcan. dupl. ana. ʒj.  
 Lumbr. terrestr. Mass. pil. e Cynogl. gr. vj.  
 preparat. ana. ʒss. M. f. Pulv. div. in vj. p. aq.  
 Antimonii diaph. Quotidie versus somni tempus  
 Nitr. depurat. desin j. propinando.

## 4 Essentia diuretico-Nervina.

Rx. Ess. Alexiph. Stahl. Ess. Succini ʒss.  
 Tinct. Antimonii Tart. M. dosi gutt. 30. mane in  
 taris. ana. ʒss. juscule exhibenda.

## 5 Alia.

Rx. Tinct. Tartar. acr. M. Dos. gutt. 40. bis vel ter  
 Spir. C. C. rectif. ana. ʒss. per diem in fine paroxysmi.

## 6 Spiritus Arthriticus pro usu externo.

Rx. Spir. Vini Camphorat. Formicar. ana. ʒss.  
 ʒj. M. cum linteaminibus appli-  
 Lumbr. Terr. candus.

## 7 Linimentum pro usu externo.

Rx. Sapon. Venet. ʒij. Adde Spir. Salis Ammo-  
 Camphor. ʒij. niac. ʒss.  
 Affunde Spir. Vin. q. f. M. calide illinendum.  
 ʒ. solve.

## 8 Sacculi discutient.

Rx. Rad. Sigill. Salom. Fl. Sambuc.  
 Pimpin. alb. ana. Chamom. ana. mls.  
 ʒj. Farin. aven. Mj.  
 Herb. Chamædr. Incis. Cont. D. ad ch.  
 Chamæpyt. Includ. Saccul. calide appli-  
 Serpill. ana. Mj. candus.

## VII. Methodus medendi.

## In Paroxysmo.

- 1 Post meridiem & versus noctem pulveres diapnoici, temperantes & cinnabarini bis, ter, vel quater sunt exhibendi, interpositis gelatinosis, diluentibus & emulsivis, nec neglectis externe fotibus & linimentis calidis discutientibus.
- 2 Mane vero, sudoribus erumpentibus, lene Alexipharmacum in juscule, vel infusum diaphoreticum ex radicibus & herbis resolventibus est commendandum.
- 3 Alvus ut respondeat clyster emolliens cum pauxillo nitro injiciendus est, subjunctis deinde ad perpetuam alvi libertatem laxantibus congruis, vel sub nodulorum vel pulverum salinorum forma.
- 4 Post 14. forte dierum decursum versus vespem aliquid anodynii correcti pulveribus addi, mane vero Tinctura diuretico-nervina in usum trahi potest.
- 5 Post superatum paroxysmum ad reliquias morbi profligandas alexipharmaco-diuretica per aliquod tempus adhuc continuare convenit, absque tamen regimine diaphoretico.

## Extra Paroxysmum.

- 1 Pro causa materiali tollenda conducunt Venæsectiones æquinoctiales in pede instituendæ, imprimis  
 N  
 etiam



etiam scarificationes menstruæ instante novilunio in parte affecta profundius faciendæ, nec non hirudines iisdem locis vel ano applicandæ.

- 2 Præmittantur aut postponantur laxationes per epicrasin, si necessitas requirat, singulis anni quadrantibus repetendæ.
- 3 Interponantur ad sanguinis stasin impediendam motus corporis, successivus & continuatus, sufficiens potus calidus diluens, non inebrians & decoctum lignorum, Alexipharmaco-tonica tempore humidioris usurpanda, nec non pediluvia.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Omnes excretiones in Podagra leniori modo sunt expediendæ, omnia quippe fortiora & volatilia adhibita paroxysmos & dolorum vehementiam exacerbant.
- 2 Neglectus alvi successus & diaphnoica madoris excretio repulsa, pericula pariunt non contemnenda.
- 3 Ventilationes Sanguinis in paroxysmo locum haud habent, nisi in primo statim principio celebrentur: magis vero profunt hirudines locis hæmorrhoidalibus appositæ, nec non scarificationes profundius factæ, magno satis cum fructu adhibentur.
- 4 Omnia calidiora, resinosa, Sulphurea interdata, sanguinis orgasmum adhuc magis adaugent.
- 5 Opiata largius data, absque perita corporis laxatione subjuncta, facillime periculosa mala excitant, imo contracturarum frequeres sunt auctores.
- 6 Specifica vera admodum rara sunt in hoc affectu, & quæ pro talibus venditantur, sæpius vel nullius sunt utilitatis, vel dolorem mitigando interdum alia gravia mala post se trahunt. Specificum tamen Hundertmarckii a quibusdam laudatur.
- 7 Martialia, Bolaria, Salia volatilia intempestive & largius data, viscera constringunt, & hæc ultima simul humores exagitant.
- 8 Remediorum externorum, spirituum scilicet urinosorum, volatiliū, fumantium, remediorum saturninorum, raninorum &c. applicationes, vel momentaneum tantum levamen (quod tamen facile nodi, tophi & contracturæ sequuntur,) afferunt, vel retrocessionem mali & hanc subsequenter viscerum inflammationem producant.
- 9 Acria nervina, calida olea destillata, Balsamus Indicus ardorem intolerabilem efficiunt, & inflammationem partis adaugent.
- 10 Spir. Vini Camphoratus & sacculi sicci optima sunt remedia discutientia in subjectis Phlegmatico-Sanguineis, magis tamen profunt, si Venæsectio fuerit præmissa.
- 11 Unctuosa pingua poros oblinendo & diaphoresin impediendo leniunt quidem aliquo modo, sed ordinarie contumaces contracturas producant.
- 12 Emplastrum e Galban. Camphorat. præmissa Venæsectione in Phlegmatico Sanguineis præsentissimum levamen præstat maxime sub initio; ubi tamen intra 2. vel 3. horas nil efficit, iterum aufereendum est.
- 13 Spiritus acidus formicarum iu paroxysmo applicitus, dolores adauget, sub exitu vero morbi prorogibus artuum emolliendis & contractura præoccupandis, efficax est.
- 14 Pediluvia emollientia in principio & sub ipso insultu paroxysmi minime conveniunt, quoniam dolores augent, quare non nisi paroxysmo plenarie cessante ad tumorem tollendum, aut contracturam præcavendam in usum trahantur.
- 15 Acidularum usus cum leni & continuo corporis motu sociatus, spongiosis & robustis quandoque levamen præstat; teneri vero & graciles facile exinde in obstructions viscerum incidunt.
- 16 Diæta lauta vinosa, ira, venus, motus graviores, uti ad productionem mali multum conferunt, ita studiose sunt vitanda, ne sedato jam paroxysmo, novi & graviores nimis cito denuo provocentur.
- 17 Malum retropulsum per interna diaphnoica, temperantia, largiora discutientia & clysteres; externe vero per impositionem Empl. e Galban. seu matrical. e tantillo Euphorbii revellendi scopo, tractandum est.

18 Tinctura Antarthritica nobis familiaris, in malotiori maxime quidem confert, in casu vero graviore insufficientis est.

19 In tumore podagrico extra paroxysmum profunt specialiter Pilulæ Stahlî, vel nostræ Balsamico-Viscerales, præparata e Scylla. Salmirab. Glauberi, Purgantia leniora, omiſſis opiatîs, martialibus, & aliis adstringentibus, quippe quæ verum œdema hydropicum generant.

20 Moxa Sinenſium a quibusdam quidem laudatur; plerumque tamen inefficax est.

#### CAPUT SEPTIMUM.

##### De Rheumatismo & Arthritide Vagæ.

#### I. Definitio Prioris five Rheumatismi:

Est decubitus humorum in variis partibus musculosis contingens, seu potius congestio sanguinis incompleta generaliter ad hæmorrhagiam aliquam excitandam a Natura facta, speciali vero restagnatione dolorem, calorem & interdum ruborem latius quandoque sese diffundentem excitans.

#### Posteriores five Arthritidis Vagæ.

Est dolor tensorius, tractorius & vellicatorius cum ardore & pruritu conjunctus, articulationes corporis nostri præcipue occupans, & modo ad hunc, modo ad illum locum transiens atque recurrens.

#### II. Differentia.

- 1 Ambo affectus distinguuntur ratione temporis & locorum: Rheumatismus prior est arthritide & musculosas partes occupat, arthritis vero corporis articulationes.
- 2 Ipse vero Rheumatismus ratione loci & ætatis, subjectorum, vel caput, vel pectus, vel hypochondria, ubi Lumbago rheumatica quorundam notabilis, vel magis inferiora occupat.
- 3 Arthritis vaga ratione locorum, pertinaciæ & temporis, differt a Podagra, Gonagra, & Malo Ischiadico: hæc quippe locum semel occupatum fixe retinent, nisi vi quadam repellantur, illa sponte modo ad hunc, modo ad alium locum evagatur: Arthritis vaga plerumque prior, illi vero affectus posteriores sunt.

#### III. Signa.

##### a Rheumatismi.

- 1 Evenit plerumque post contentiorem corporis motum aut subitaneas aeris alterationes cum partis præcipue musculosæ aliqua inflatione, gravativo & tensivo dolore, ardore & leniori inflammatorio rubore, motusque illius partis impeditio.
- 2 Rarius incipit cum vero rigore atque horrore, nisi fortior fuerit impetus & major sanguinis affluxus & restagnatio, ubi dolor, rubor, calor, omnia fortiora sunt.
- 3 Contingit autem hoc posterius præcipue in Rheumatismis internas corporis partes occupantibus.
- 4 Concurrunt præter hæc majora interdum incommoda, nimirum universi corporis languores, inquietudines, agrypnia, inappetentia, præcordiorum angustia, in Rheumatismis scil. diffusioribus, membris, vel per vim externam, vel febriles apostases debilitatis & receptui humorum magis aptis.
- 5 Inflammatio vero, si quæ contingit, est vel Phlegmonodes, quod quidem rarius, vel Erysipelatodes, nunquam Apostematodes.

##### b Arthritidis Vagæ.

- 1 Conjunctum habet dolorem vellicatorium, vibratorium, tensorium, quandoque etiam compunctorium & subtiliter reptilem, quasi formicæ interiorem partem occuparent.
- 2 Articulationibus præcipue insidet, nimirum vel scapulis, vel ossi humeri seu axillæ, vel femori, coxis, manibus, genibus aut pedibus.



3 Non fixe in uno semel loco occupato hæret, sed recurrit & evagatur modo ad superiora, modo ad inferiora, donec tumores in variis articulis post se relinquat.

#### V. Subjectum.

a Rheumatismis obnoxii sunt Plethorici, Sanguineo-Cholerici, Venæsectionibus & Scarificationibus assueti, vitæ otiosæ, diætæ aromaticæ & vinosæ dediti, aeris mutationes negligentes, a vi externa horum vel illorum membrorum debilitates reportantes, post febres in apostases artuum & horum languores incurrentes.

b Arthritidi Vagæ fere iidem, juniores nempe Plethorici, succulenti, iracundi, venerei, vitæ otiosæ dediti, delectamentum diætæ calidioris quærentes, & ob hæreditariam dispositionem ad eandem proni.

#### VI. Prognosis.

1 Rheumatismi in exterioribus partibus contingentes, minus semper periculi portendunt, quam qui in interioribus fiunt.

2 Latiores quoque qui occupant ambitus, accuratorem tractationem & observationem merentur, quam contrarii.

3 Rheumatismi intra spatium aliquot dierum vel dissolvuntur & discutuntur, vel veram inflammationem post se trahunt.

4 Inflammatio Phlegmonodes, sive in Rheumatismo sive in Arthritide contingat, periculosior est Erysipelatode.

5 Qui contingunt in partibus externis, a vi externa, vel apostasibus febrilibus, debilitatis, frequentibus & diffusis recursibus facile assuescunt.

6 Tam hi quam Arthritides vagæ per inconditum regimen male tractatæ, ad recursus internos proclives sunt.

7 Fiunt hi recursus fere secundum ætates ad caput, diaphragma, præcordia, Venam-portæ, & ibi vel inflammatorios febriles, vel suffocativo-apoplecticos, vel spastico-convulsivos effectus exerunt.

8 Ab Arthritide vaga facile fixa, nimirum Malum Ischiadicum, vel Podagra initium capit.

9 Econtra Podagra male tractata per fortiora sudorifica quandoque fit vaga, mali plerunque moris.

10 Arthritidis vaga quæ sponte evenit, per congruam sæpius diætam a recursibus liberari potest.

11 Evacuaciones sanguinis vel spontaneæ, vel artificiales neglectæ, facile & Rheumatismos & Arthritides vagas post se trahere possunt.

12 Rheumatismi sæpiissime cum Arthritide vaga complicantur, aut eandem post se ducunt.

#### VII. Remedia.

2 Sanguinem abundantem generaliter evacuant Venæsectio, Scarificatio, Hirudines, secundum certa & appropriata loca celebratæ & applicatæ.

2 Discussionem & resolutionem stagnantis sanguinis peragunt Diapnoica fixa: ꝑ. diaph Bezoard. miner. Lumbr. Terrestr. præparat. Tart. Vitriolat. Arcan. duplic. Tinct. Salin. Richt. & Cinnabarina; item Aquæ Diapnoicæ, lenia Alexipharmaca: Ess. Alexiph. Stahlî, Mixt. Simpl. Tinct. Bez. Mich. Ess. Scordii. Externe Herb. Chamom. Pulleg. Matricar Flor. Samb. Melilot. Bacc. Junip. Sem. Carvi. Camphora, Spir. Vin. Camphor. Emplastr. Sapon. Barbette, Spir. Lumbr. Terr. Formicarum &c.

3 Motum humorum cohibent & partium stricturam demulcent, Emulsiva, Gelatinosa, Absorbentia: Oc. ꝑ. præparat. Conchæ, Unic. fossil. C.C. Philol. præparat. Potus sufficiens diluens, calide propinatus, Clysteres.

4 Primarum viarum saburram & sanguinis superfluitates serosas evacuant lenia laxantia, Rhabarbarina, Sennata, Tamarindinata, Magnesia alba, Sal Cathart. amar.

5 Nimium æstum refrenant & dolorum ferociam mitigant Nitrosa, Cinnabarina, acidiuscula, opiata correctæ.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis Laxans.

Rx. Specif. jalapp. gr. xv. Magnes. alb. ꝑj.  
vel ꝑj. M. pro una vice.

##### 2 Potio Laxans.

Rx. Tamarind. ꝑss. Colat.  
Rhabarb. el. ꝑss. Rx. ꝑij. dissolve.  
Crystall. Tart. ꝑss. Mann. Calabr. ꝑj.  
Infund. in f. q. Aq. pro una dosi.

##### 3 Pulvis diapnoico-temperans.

Rx. Arcan. duplic. Oc. ꝑ. præparat. ana. ꝑj.  
Antimonii diaph. Cinnab. ꝑij vel nativ. ꝑss.  
Nitr. depur. M. ꝑj. bis vel ter per diem.

##### 4 Pulvis diapnoico-Anodynus.

Rx. Oc. ꝑ. præparat. Cinnab. ꝑij ꝑss.  
Bez. miner. MPil. de Cynogl. gr. iv.  
Nitr. depur. M. div. in 4. part. æq. dosi j.  
Tartar. Vitriolat. ana. versus noctem in doloribus  
ꝑj. enormioribus.

##### 5 Essent. discutiens.

Rx. Ess. Alexiph. Stahlî. M. dosi gutt. 30. mane in  
Scordii. jusculo cum regimine dia-  
Tinct. Bez. Mich. æ. ꝑj. pnoico.

##### 6 Alia diuretico-Nervina.

Rx. Tinct. ꝑij Tartar. Croci ꝑss.  
Tartari ana. M. dosi gutt. 30. bis per diem  
ꝑss. in declinatione mali.

##### 7 Epithema discutiens.

Rx. Herb. Chamom. Bacc. Junip. ꝑss.  
Origan. Sem. Carvi ꝑj.  
Matric. Camph. ꝑj.  
Flor. Samb. ana. mss. Incis. contus. include sacculis.

##### 8 Spiritus Resolvens.

Rx. Spir. Vin. Camph. ꝑj. S rpill. ana. ꝑss.  
Lil. Convall. M. pro usu externo.

##### 9 Alius.

Rx. Spir. Vin. Camph. ꝑj. M. pro usu externo in de-  
Lumbr. Terr. clinatione mali.  
Formic. ana. ꝑss.

#### VII. Methodus medendi.

1 In Paroxysmo discussio & resolutio restagnantium humorum tam externe quam interne peragenda est.

2 Alvi libertas vel per clysteres, vel si malum permittit, per lenia laxantia concilianda est.

3 Ad humorum stagnantium meliorem dissolutionem & æqualem circulationem potus sufficiens, tenuis subcalidus in usum trahendus.

4 Orgasmus, si quis adest, compescatur per Emulsiones, Nitrata, absorbentia & gelatinosa.

5 Rarius Opiatis ad dolores mitigandos opus est, sed plerumque præter nominata, cinnabarina sufficiunt; si quid tamen desiderabitur Ess. Dulc. Hallens. per se vel granum j. vel alterum MPil. de Cynogl. versus noctem pulveribus diapnoico-cinnabarinis additum intentioni satisfaciet.

6 Extra Paroxysmos, imprimis ad evacuationes sanguinis tam spontaneas quam artificiales assuetas respiciatur, ut illæ expediantur, hæ vero tempore æquinoctiali bis per annum celebrentur, quod quidem etiam in locis convenientibus fiat.

7 Ob meliorem etiam effectum impetrandum conducet præmissio laxationis epicriticæ.

8 Imprimis autem motus corporis sufficiens, successivus & continuatus commendatus sit, nec non diætæ dilutior animi quoque pathematum moderamen.

#### VIII. Cautelæ Practicæ.

1 Medicationes omnes fortiores suspectæ sunt, facile enim ataxiam morbi post se ducunt.

2 Ideoque neque purgantia fortiora, neque diaphoretica, multo minus emetica in usum trahere convenit.

3 Ipsæ quoque evacuationes sanguinis in Paroxysmo, nisi necessitas exigat, haud celebrandæ sunt; quia facile malum exinde fit rebelle, & in subsequenteribus recursibus nulli nisi huic medicationi amplius auscultat: major autem earum est efficacia, si extra paroxysmos præservationis gratia in usum trahuntur.



- 4 Omnia insuper aquea absint; ideoque neque ipse Spir. Vini, nisi admodum sit dephlegmatus convenit.
- 5 Ex eadem ratione Topica melius in sicca semper forma imponuntur.
- 6 Salia volatilia externe moderata dosi ordinentur, facile enim subtiliores partes materiæ morbificæ repellunt, & crassioribus relictis, tumores stuporesque inducunt.
- 7 Rheumatismi quo magis calidiori regimine & medicatione tractantur, eo facilius in affectus arthriticos migrant.

## S E C T I O III.

## D E

INFLAMMATIONIBUS ET FEBRIBUS  
INFLAMMATORIIS.

## C A P U T P R I M U M.

## De Inflammationibus in genere.

- I. *Definitio.* INflammatiō est motus partialis sanguinis auctioris, quo Natura sanguinem in parte aliqua subsistentem, sive motu progressivo privatum & coagulatum, indeque in corruptionem putredinosam primum vel mature discutere, & rursus fluidum reddere, vel agilioribus fermentativis particulis subtractis, in consistentiam materiæ pulpofæ innoxie, quam pus appellamus, redigere conatur. Motus hic particularis auctior facillime quoque in universam massam sanguineam diffunditur, & tunc febris inflammatoria appellatur.
- II. *Differentia.*
  - 1 Aliæ Inflammationes sunt
    - a *Apostematodes*, quæ partes carnosas, vel glandulosas obsident, ac magis in profundum penetrant, & ad suppurationem ut plurimum tendunt. Comites hæ habent quandoque, si res minus feliciter procedit, Gangrænam & Sphacelum.
    - b *Erysipelaceæ*, quæ partes exsanguæ & membranaceas afficiunt, & magis in latum superficietenus diffunduntur, ad suppurationem raro pronæ.
    - c *Phlegmonodes*, quæ in latum & profundum diffunduntur, & licet insignem ambitum comprehendant, ad suppurationem tamen minus sunt idoneæ.
    - d *Mixtæ*, quæ ex stasi sanguinea & seroso-lymphatica simul originem ducunt, & magis ad ulcerosas, quam suppuratorias corruptelas pronæ sunt.
  - 2 Aliæ sunt
    - 1 *Externæ*, ut Tumores inflammatorii Parotidum, Mammarum, Testium &c. Furunculi in variis partibus carnosæ emergentes, Erysipelas faciei, brachiorum, manuum, genuum, tibiarum, pedum, Ophthalmia, seu inflammatio tunice adnate oculorum, imo interdum palpebrarum.
    - 2 *Internæ*, ut Phrenitis, sive Inflammatio meningum cerebri, Angina, sive inflammatio musculorum & glandularum Laryngis, Pleuritis, sive inflammatio Pleuræ, Peripneumonia, sive inflammatio Pulmonum, Paraphrenitis, sive inflammatio Diaphragmatis, Hepatitis, sive inflammatio Hepatis, Nephritis, sive inflammatio Renum &c.
    - 3 Aliæ oriuntur a causis
      - 1 *Externis*; contusione, lapsu, nisu fortiori, refrigerio repentino.
      - 2 *Intrinsicis*; quæ motu quasi critico certam partem invadunt, ut Phrenitis vel Angina, febribus acutis male cedentibus superveniens, tumor inflammatorius mammarum a terrore incusso, Erysipelas ab ira vel terrore graviore, tumor inflammatorius testium vel glandularum inguina-

lium a Gonorrhœa intempestive suppressa, Furunculi hominibus Plethoricis & ventilationibus sanguineis assuetis, evenientes.

III. *Signa, & quidem*

## 1 Inflammationis externæ sunt:

- a *Tumor*, partis alicujus mollis & porosæ haud ita pridem enatus, durus & renitens, rubens etiam, si cutis una affecta sit.
- b *Ardor*, sive calor, naturali major, etiam externo tactu perceptibilis, longe magis tamen ipsi patienti sensibilis, imo
- c *Dolor* punctorius, pulsus micationibus respondens, exquisitior in partibus carnosæ, obtusior in locis glandulosis.
- d *Succedens* intra aliquot horas vel dies, pro ratione profunditatis vel amplitudinis ipsius inflammationis varians, vel mitigatio & discussio, vel ipsius tandem staseos corruptio, pro diversitate locorum vel purulentam, vel ulcerosam materiam producens.

## 2 Inflammationum internarum signa diagnostica ut plurimum paulo intricatiora sunt, &amp; minus evidētia, præsertim circa initia, possunt tamen attendi sequentia:

- a *Color ardens*, lancinans in aliqua regione sub qua viscus aliquod delitescit, pro diversa tamen viscerum sensibilitate varians; in pulmonibus enim Pleura, Renibus, ventriculo maxime sensibilis, atque illic cum tussi, isthic cum Ischuria vel Dysuria, hic cum Cardialgia conjunctus, in Hepate vero Liene, Pancreate obtusior.
- b *Febris acuta* cum horrore insigni invadens, æstu vehementissimo interiora præcipue affligens, ac propterea sitim inextinguibilem & magnam faucium siccitatem, potui mox iterum succedentem, excitans.
- c *Perpetua* habitus externi corporis *horripilatio* facillime recurrens, si ægri leviter saltem corpus ventilent.
- d *Urina rutilans*, per moram deponens sedimentum rosei coloris, primis diebus tenerius, circa declinationem vero tenacius & submucidum; quod proinde nonnulli pro pure habuerunt.
- e *Prægressæ vehementes* corporis *motiones* cursibus, saltationibus, ponderum graviorum, cum fortinisu, tractationibus, item partu difficiliore factæ, repentinæ, commoto & expanso vehementer sanguine, habitus externi refrigerationes, aut internæ quoque a potu frigido, mox & intemperanter superingesto, sanguinis commotionibus febrilibus repente appositæ medicationes adstrictoriæ, dolorum Arthriticorum aut inflammationum erysipelacearum inconsultæ retropulsiones.

IV. *Subiectum*

- 1 Inflammationibus facilius obnoxii fiunt personæ status plethorici, habitus laxioris, porosioris.
- 2 Rheumatismi divexati & imperite per medicamenta refrigerantia & repellentia tractati.
- 3 Excretiones diaphnoicas & evacuationes sanguinis assuetas non bene observantes.
- 4 Iracundiæ & diætæ vinosæ dediti.
- 5 A vi quadam externa percussi, aut vulnerati.

V. *Prognosis.*

- 1 Eventus inflammationis est quadruplex, nam vel
  - 1 Resolvitur iterum per discussionem successivam, qui modus omnium optimus est: vel
  - 2 Suppuratur, quod in externis inflammationibus, præterquam in erysipelaceis, etiam tolerabiles: vel
  - 3 Desiccatur in Scirrhum, quod ad minimum in futurum periculosum est: vel
  - 4 Denique abit in gangrænam & sphacelum, quod præsentissimum periculum infert.
- 2 In inflammatione externa proinde, si tumor, durties, ardor & dolor punctorius ultra quartum diem perennet, imo jugiter inolescat; non amplius discussio speranda, sed suppuratio expectanda erit.
- 3 Contingit autem hæc suppuratoria corruptela eo facilius, quo major concursus sanguinis in parte inflammata adest.



- 4 Quo minor autem sanguinis quantitas, feri vero major proportio ad loca inflammata vehitur, eo certius ulcerosa vel cancrofa corruptela metuenda est.
- 5 Abscessuum suppuratorum mundificatio & consolidatio in partibus glandulosis longe laboriosior est, quam in carnosis; imo sine subsidio artis & manuali repurgatione vix perpetranda; imo in visceribus internis & Naturæ & Arti propemodum impossibilis.
- 6 Si stasis valde sit magna, fibræ flaccidæ & enervatæ, aut plane laceratæ & contusæ; nec discussio, nec iusta maturatio commode fieri potest; adeoque facile Gangræna & Sphacelus supervenit.
- 7 Si rubor partis affectæ in colorem ex fusco atrum aut lividiorem degeneret, cum striis circum circa ex rubro nigrantibus, quas Vibices appellant, & cuticula a cute recedat; aut contra si cutis decolore evadat, & pustulæ hinc inde emergant, ichorem subcruentum stillantes, Gangræna præsto est: cui si frigus, partis insensibilitas, fœtor superveniat, Sphacelus non tam imminet, quam invalescit.
- 8 Inflammationes internæ omnes periculo sunt plenissimæ.
- 9 Quæ non perniciousè sunt, lentas tamen hæcticas consumptiones post se trahunt.
- 10 Perniciosissimæ sunt inflammationes Hepatis, post has stomachi, Intestini duodeni, Pancreatis, Uteri; proximæ ab his Splenicæ; postremæ ad perniciem Nephriticæ sunt; Pleuriticæ & Peripnevmonicæ in junioribus non adeo perniciosæ, magis tamen in aenioribus.
- 11 Eximii itidem periculi sunt inflammationes internæ, externis congestionibus Arthriticis, vel Erysipelaceis retropulsis supervenientes.
- 12 Exitus hujusmodi Februm inflammatoriarum est, ut successive dissolvantur, communiter tamen diebus criticis, ut vel per Hæmorrhagias narium, per sudores copiosos spontaneos, sive per alvi dejectiones alteratio quædam suscipiatur & sequatur. Si hoc non fiat, ut criticis diebus, & imprimis primo septenario solutio sequatur, tunc suppurationis, vel sphaceli metus est, quorum utrumque ferme æque funestum est.
- 13 Urina, si circa dies indicatorios, hoc est quartum, vel quintum turbetur, & sedimentum deponat, bonum omen præbet; contra, si clara maneat & limpida, aut licet turbetur, nullum tamen sedimentum demittat, sed parietes vitri alba, lactea & subcærulea cuticula obducatur, æstu & anxietate interim valde augescente, impendens circa dies criticos periculum imo exitium portendit.
- 14 Supervenit quoque communiter Febris his inflammatoriis, præsertim circa indicatorios, perpetua veluti sudatio, ut licet copiosam aquositatem non exsudent, leni tamen madore cutis jugiter affecta sit. Tolerabilius hoc ad minimum, quam ubi perpetua ficitate cutis aret, & sine ulla transpiratione largiori decumbunt ægri, longe enim magis sensibilem & anxium reddit patientibus æstum.
- 15 Summa anxietas cum ingente ardore interno, multa perfrigeratio extremorum, syncope anxia, singultus contumax statui morbi superveniens, non vero ab externa refrigeratione coortus, sudationes enormes, non modo non immutato morbo, sed crescente insuper debilitate, infausta sunt præfagia.
- 16 Vomitus nigræ, aut fusco-nigræ materiæ instar Rob Sambuci circa criticos, in talibus febribus propinquæ mortis signum; in Chronicis morbis non adeo periculosus est talis vomitus.
- 17 Imo talis dejectio, aut colorum quoque aliorum insolitorum excrementa, per alvi fluxum isto tempore perumpentia, nullius boni præfagii sunt.
- 18 Si dolores admodum urgeant, & indies veluti augescant, magna quoque febris & summa inquietudo perennet, & postmodum simul & semel omnis dolor evanescat, pulsus & vires cadant, febris tamen pergat; signum est, aut sphacelum jam invaluisse, aut suppuratum, aut ruptum esse abscessum.

## VI. Remedia &amp; quidem

## A In externis Inflammationibus.

- 1 Nimis copiosum affluxum intercipiunt & averunt Venæsectio revulsoria, repellentia & subadstringentia, item refrigerantia, v. g. Acetum rosaceum, Vinum rubrum stypticum, Saturnina, Bolaria & inde parata Epithemata cum albumine ovorum, aut Emplastra defensiva. Facit etiam huc actualis compressio, imprimis ferro frigido facta.
- 2 Sanguinem stagnantem & coagulascntem discutunt ea, quæ penetrantem acrimoniam citra viciditatem possident: v. g. Rad. Irid. Florent. Sibill. Salom. Bryon. Herb. Hyssop. Abrotani, Sabin. Sem. Anisi, Fœnic. Carv. Cumin. Flor. Chamom. Sambuc. Anethi, Melil. Summit. Origani, quæ sacculis insui, Vinocalido imbui, atque ita leniter rursus expressa applicari possunt. Inter hæc omnia tamen principatum fere obtinet Camphora, præsertim in Spir. Vini tenuissimo dissoluta, aut aliis formulis superadspersa. Ex compositis celebra sunt Emplastrum Diaphoreticum Myns. item de Sperm. Ceti, nec non Spir. Vin. Camph. crocatus.
- 3 Tensionem dolorificam leniunt, emolliunt atque ita suppurationem promovent mucilaginosæ & pinguiæ, e. g. Sem. Lini, Cydon. Psyll. Rad. Lil. alb. Alth. Herb. Branc. Ursin. Parietaria, Flor. Verbasci, Linar. cum cremore avenæ, aut pane similagineo in lacte vel aqua cocta, atque in formam Cataplasmatis redacta; quibus & addi possunt ficus, item Pinguedo Anseris, Anatis, Gallinæ, ut & Olea per infusionem parata. Lil. alb. Chamom. Verbasc.
- 4 Rruptionem promovent ea, quæ præsentius & penitus emolliunt, ut Cepæ affæ, Pinguedo Leporis, Mel cum farina scalina subactum, panis mellagineus, Fermentum recens.
- 5 Ipsam apertionem abscessus suppurati præstant Cauteria potentialia, v. g. Magnes Arsenicalis Cauticum indolens Zwingeri ex Calce viva, Minio & Sapone nigro, vel actualis incisio manu chirurgica peracta.
- 6 Mundificationem & consolidationem juvant acriuscula Nervina & Balsamica: Myrrha, Sagapem. Sarcocoll. Decoct. Herb. Vulner. item Essent. Balsamica infra in formulis num. 9. descripta, & ad gutt. 20. vel 30. instillanda.

## B In inflammationibus internis:

- 1 Stasin sanguinis resolvere & discutere traduntur Flor. Bellid. Chærefol. rec. in substantia usurpata. Herb. Arnicæ in cerevisia decocta, Sperma Ceti, Mumia, sanguis Hirci exiccatus, Rad. Rub. Tinct. Pimpinella alba. Pulv. Solar. D. Richt.
- 2 Febri complicatæ prospiciunt Diluentia, præsertim calide hausta, v. g. Decoct. Rad. Cichor. Schorzon. C. C. Eboris, item Absorbentia cum acidis saturata, v. g. lap.  $\Sigma$ . & Ostracodermata in succo Citri exhibita; porro Diaphoretica fixa, inter quæ reliquis præstat  $\S$ . Diaphor. Tandem Alexipharmaca temperata, v. g. Mixtura simplex parcius camphorata, Ess. Alexiph. cui Ess. Scordii largius admixta, aut sola Ess. Pimpin. cum æquali portione Essent. Scordii remixta.
- 3 Sitim & ardorem internum mitigat, successum quoque alvi promovet Nitrum, primis tamen diebus frequentius, post quartum parcius exhibendum.
- 4 Dolorum atrociam leniunt Anodyna v. g. Ess. Laudan. fermentata Langelotticum Ess. Mumia; aut Ess. Anodyn. cum Tinct. Corall. & Liq. C. C. succinato, & præ ceteris omnibus, Ess. dulc. Hall. cum Pulv. Solar. sæpius alternatim exhibita. item emulsionem ex Sem. Papav. alb. Card. Mariæ, Aquileg. Amygd. dulc.



## Formula Remediumum.

## 1 Potio Resolvens.

Rx. Aq. Scabios. Dent. Apr. prap. ana. ℥ij.  
 Cheref. Sang. Hirci. ℥j.  
 Fl. Samb. ana. ℥j. Pulv. Solar. Dos. iij.  
 e typh. Cerv. ℥ss. Syr. Card. Bened. ℥ij.  
 Mandib. luc. pisc. prapar. M. cochleatim exhibenda.

## 2 Alia Diaphoretico-Temperans.

Rx. Aq. Scordii. Antimonii Diaph. ana.  
 Galeg. ℥ij.  
 Ulmar. ana. ℥j. Spir. Nitr. dulc. ℥j.  
 C. C. Citr. ℥vj. Tab. M. X. Simp. ℥ss.  
 Oc. ℥ss. prapar. M. cochleatim porrigenda.

## 3 Alia.

Rx. Aq. flor. acac. Antimonii Diaph. ana.  
 Scabios. ℥ij.  
 Card. Ben. a. ℥ss. Nitr. depur. ℥j.  
 Succ. Citr. rec. ℥ij. Syr. acetos. Citr. ℥ss.  
 Conch. prapar. M. cochleatim propinanda.

## 4 Mixt. Diapn. discutiens.

Rx. Ess. Alexiph. Spir. Nitr. dulc. ℥ij.  
 Scordii ana. ℥j. M. dos. 25. ad 30. gutt.

## 5 Alia.

Rx. Ess. Pimpin. M. Dosis ut antea.  
 Scord. ana. ℥j.

## 6 Emulsio resolvens Anodyna &amp; diaphoretica.

Rx. Sem. Card. Mar. F. l. a. Emulso.  
 Aquileg. ana. ℥ij. Colat. ℥v. adde  
 Pap. alb. ℥j. Antimonii diaph.  
 Aq. Scabios. Matr. perl. ana. ℥ss.  
 Cheref. ana. q. s. Sacch. fin. q. s. ad gratiam.

## 7 Sacculus discutiens.

Rx. Rad. Ireos Flor. Flor. Samb. ana. mls.  
 Sigill. Salom. Sem. Anis.  
 Pimpin. ana. ℥ss. Fenic. ana. ℥j.  
 Herb. Chamom. Applicetur vel siccus, vel in  
 Cheref. vino coctus & expressus.

## 8 Pulvis discutiens.

Rx. Farin. Fabar. ℥j. Camph. ℥j. M.  
 Pulv. rad. Ir. flor. ℥ss. pro usu externo in inflamma-  
 Ceruss. ℥ij. tione erysipelacea.

## 9 Essentia consolidans.

Rx. Ess. Myrrb. ℥j. vel iv.  
 Succin. ℥j. M. gutt. 20. ad 30. instil-  
 Ol. Tereb. gutt. iij. landa.

## 10 Cataplasma emolliens.

Rx. Rad. Alth. Fanagr. ana. ℥ss.  
 Lil. alb. ana. ℥j. Coque in s. q. lactis ad consi-  
 Herb. Malv. stent. pulvis, trajice, adde Pulp.  
 Branc. Ursin. Caric. ping.  
 Parietar. ana. mj. Pingued. Anser. ana. ℥ss.  
 Flor. Verbasc. M. D. ad fctile: S. ext. rne  
 Linar. ana. mls. imponendum pro suppuratione  
 Sem. Lini. ne promovenda.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In Stasibus inflammatoriis externis ante omnia tenta-  
tunda est discussio.
- 2 Si affluxus sit vehemens & subjectum plethoricum,  
Venæsectio revulsoria insuper ex usu est.
- 3 Quodsi tamen ultra quantum diem Stasis, Tumor,  
& Dolor perseveret, quin augeat maturatio, tan-  
dem apertio & mundificatoria absterio est necessaria,  
quibus rite peractis, sponte sequetur consolidatio.
- 4 In stasibus inflammatoriis internis, unice tentanda  
est Discussio, placide tamen & successive, non cum  
impetu & vehementia.
- 5 Febris conjuncta, cum ipsa quoque hanc discussio-  
nem intendat, nullo modo turbetur, aut supprima-  
tur, sed quantum fieri potest per tranquillam con-  
tinentiam, per temperatum & lecti & conclavis ca-  
lorem; item per diluentia, Nitrofa, absorbentia  
cum acidis maritata, & alia diaphoretico-diuretica  
sublevetur.
- 6 Ubi dolores admodum inolefcunt, & revera ur-  
gent, habent usum Anodyna, sed moderatum, ad  
mitigandum, non vero ad tollendum sensum, in  
incremento potius, quam circa statum.

7 Alvus fervetur aperta, non tamen positive stimu-  
letur.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 In omni Inflammatione nocet actuale refrigerium,  
quia sanguinem coagulat: nocet nimia humecta-  
tio, quoniam fibras laxat & copiosiori irruptioni  
locum præbet: nocet intempestiva adstrictio, quia  
aditum & transitum reliqui sanguinis fluidi, por-  
tionem coagulatum resoluturi, intercipit, & scir-  
rhosam indurationem inducit: nocent nimis cale-  
facientia & siccantia, quia ardorem inutiliter au-  
gent, & scirrhosam indurationem promovent: no-  
cet præmatura incisio, quoniam suppurationem de-  
bitam interturbat.
- 2 In collectione sanguinis & hinc metuenda Stasi in-  
flammatoria a contusione, dum adhuc fluxilis,  
imo in fluxu constitutus est sanguis, juvat actua-  
lis compressio ferro frigido facta, tamdiu conti-  
nuanda, donec omnis dolor cessaverit.
- 3 Si collectio sanguinis per contusionem extravasati  
nimis sit magna, ita ut tumor non durus, sed ta-  
ctu mollis occurrat, matura incisione & sanguinis  
congruati educatione opus est, antequam accedat  
Inflammatiō: nulla enim justa maturatio, neque  
etiam discussio tum est speranda.
- 4 In initio inflammationum conferunt lenia adstrin-  
gentia saturnina, ubi scilicet materia adhuc fluxilis  
est; contra vero in inflammationibus obfirmatis co-  
piously adhibita, ulcera inducunt mali moris.
- 5 Si Stasis profundius hæret, atque Inflammatiō cu-  
tim non simul affecit, neque albedo cutis, tan-  
quam signum sufficientis maturationis, neque spon-  
tanea apertio est expectanda; sed si aliqualis mol-  
lities tactui occurrit, Incisio manu chirurgica est  
instituenta.
- 6 Quando Abscessus multum puris continet; non  
una vice omne est evacuandum, quia fibræ alias  
nimis flaccescunt.
- 7 Venæsectio utilis est Inflammatione adhuc fiene,  
si status sit plethoricus, si copiosior affluxus me-  
tuendus, item in Inflammatione interna habet pa-  
riter locum, ubi corpus plethoricum, ubi graves  
commotiones sanguinis per fortiolem motum, æ-  
stuosiore potum, abusum remediorum calidiorum  
&c. præcesserunt; item ubi in ipso principio statim  
valde magnus, vehemens & anxius est morbus,  
cum summo ardore & interlancinationibus impri-  
mis dextræ partis abdominis, præsertim si alvus non  
sit clausa, vel clysteri prompte responderit, sine  
sensibili levamine anxietatis & doloris.
- 8 Anceps, imo noxia est, si non circa prima initia  
administratur; id quod ob signa diagnostica ab ini-  
tio obscuriora in plerisque casibus fieri vix potest.  
Item ubi febris conjuncta typum aliquem, hoc est  
statas exacerbationes & remissiones observat.
- 9 Si malum in abdomine hæere suspicio sit, Venæ-  
sectioni clyster commode præmittitur.
- 10 Alvum in omnibus febribus inflammatoriis aut qui-  
buslibet acutis fortius irritare non licet, expedire  
vero convenit. Abstinentum itaque a fortioribus  
purgantibus, imo & clysteribus acrioribus. Me-  
lius officium faciunt lenissima humectantia & Ni-  
trofa.
- 11 Sub metu suppurationis, aut ubi motus inflam-  
matorius copiosior necessarius videtur, anodyna  
minus provide, aut intemperantius adhibita spha-  
celationem inducunt.
- 12 Camphorata uti externo usu laudabilem operam  
navant resolvendo & discutiendo; ita interne ad-  
hibita, sanguinem nimis exagitant, æstum & ar-  
dorem augent, neque tamen ad ipsam stasim discuti-  
endam & resolvendam multum faciunt.
- 13 Idem de Myrrhatis & aliis Gummi-Resinis, acro-  
ribus monendum.
- 14 Camphora etiam maturantibus, & suppurationem  
promoventibus non inconsulte additur, ne inter  
suppurandum affluxus humorum nimius dolorem  
exasperet.
- 15 Inflammatiō phlegmonodes & erysipelatodes non  
con-



confundenda est cum apostematode, quod si enim vel maturantibus vel acerbis discutientibus tractaveris illas, gravioribus malis anam præbebis.

- 16 Inflammationes Erysipelaceæ turgidiores non solis camphoratis, sanguinem discutientibus sunt tractandæ; sed simul serum fundentia, & tonum partis restituentia adhibenda; alias cito quidem dolor & rubor evanescit, remanet tamen tumor veluti œdematosus discussioni valde refractarius. Præstat itaque Spir. Vin. Camphoratus crocatus, aut pulv. ex rad. Irid. Flor. Farina fecalina, vel Fabarum, cum aliqua portione Cerussæ & momento Camphoræ.

## CAPUT SECUNDUM.

## De Phrenitide &amp; Paraphrenitide.

I. *Definitio.* **P**hrenitis & Paraphrenitis sunt inflammationes internæ, illa propter statim sanguinis in Meningibus, hæc vero in diaphragmate factam, exortæ & cum delirio conjunctæ.

II. *Differentia.*

- 1 Utraque est vel Idiopathica, tanquam morbus primarius Meninges vel Diaphragma occupans, vel Symptomatica, aliis morbis v.g. febribus acutis superveniens.
- 2 Distinguuntur quoque ratione loci: In Phrenitide Meninges sunt inflammata, in Paraphrenitide vero diaphragma, quod ob consensum nervorum paris vagi deliria conjuncta habet.

III. *Signa utriusque affectui communia, partim vero Phrenitidi propria*

- 1 Febris 2 Molestia agrypnia. 3 Somnus paucus & inquietus, multis phantasias perturbatus.
- 4 Capitis, imprimis occipitis & cervicis dolor acutus perennis.
- 5 In iram pronitas, dentium stridor, oculorum rigor & nonnunquam totius corporis concussionem, cum frigore extremorum.
- 6 Lingua arida, aspera, nigra, citrina, tremiscens, nullus tamen siccus sensus.
- 7 Respiratio modo rara, modo magna ex imo quasi pectore deprompta.
- 8 Oculi torvi involuntarie sæpius lachrymas fundentes, cum venularum turgescencia, ac interdum totius faciei rubore.
- 9 Pulsus parvus, durus, celer & frequens.
- 10 Sitis auctior cum oris & linguæ siccitate conjuncta.
- 11 Urina pauca, alba, tenuis atque pellucida.
- 12 Mentis abalienatio, deliria cum furibunda quandoque audacia stipata, in plurimis continuo, in paucis per intervalla sese exerentia.
- 13 Manuum præterea tremores, quibus aliquid colligere velle videntur, & revera colligunt linteamina, floccos &c.
- 14 Alvus vel adstricta, vel aperta cum dejectionibus albis.

*Paraphrenitidi propria*

- 1 Exquisitissima Cardialgia, neque minimum contactum externum absque exacerbatione admittens, externumque præcordiorum tumorem interdum conjunctum habens.
- 2 Consensualia ventriculi pathemata, ructus, vomitus nigri.
- 3 Deliria mitiora præ Phreniticis.
- 4 Impedita respiratio modo parva & frequens, modo rara & cum magno conatu sese exerens, modo inæqualis.
- 5 Faucium ariditas, similem linguæ faciem connexam habens.
- 6 Tussis sicca, cum dolore & palpitatione hypochondriorum.

IV. *Subjectum.*

- 1 Plethorici hæmorrhagiis narium expositi, aut evacuationibus sanguinis artificialibus assueti, illarum suppressionibus laborantes, has vero negligentes, im-

perito calido regimine in febribus acutis tractati, vim externam ictus aut contusionis passi.

- 2 Quibus in morbis acutis imprimis superato trigesimo anno inconsulto sanguine venis mittitur, hi enim circa dies criticos sive in statu morbi facile in Phrenitidem incidunt.
- 3 Quibus incompletæ in acutis fiunt criticæ narium Hæmorrhagiæ, aut etiam qui symptomatice corripiuntur hæmorrhagiis.
- 4 Homines Sanguineo-Cholerici, hæmorrhoidum consuetarum aut mensium suppressione laborantes, aut quibus consuetæ tantum ad hæmorrhoides molimina subito cessant, quod in studioso observavimus.
- 5 Qui diu vigilant, lucubrationibus indulgent, aut caput aeri post crapulam frigidiori repente exponunt.
- 6 Qui vim externam per contusionem, ictum, vulnera passi sunt.
- 7 Quibus salia volatilia aut spirituosæ in acutis imprudenter cum regimine exhibentur.
- 8 Paraphrenitidi etiam specialiter illi obnoxii esse leguntur, qui morbo Hungarico laborant, vel quibus Angina retropulsa est.

V. *Prognosis.*

- 1 Phrenitis affectus periculosissimus est, præcipue si ægrum idiopathice aggressus fuerit, tertio enim, vel ad summum septimo die jugulare solet.
- 2 Paraphrenitis vero tanto periculo non exponit ægros, interim tamen non raro & hæc lethalis est.
- 3 Urinæ albæ & perspicuæ, continuæ vigiliæ, deliria permanentia, pessima sunt signa.
- 4 Pejor adhuc erit status, si oscitationes frequentes, stridores dentium, tremores & involuntariæ urinæ & sæcum alvinarum excretionem concurrant.
- 5 Econtra spem indicant deliria per intervalla tantum & cum risu sese exerentia, signa coctionis in urina circa dies criticos, & sudoris eruptiones, aut etiam hæmorrhagiæ narium, vel parotides circa hoc tempus contingentes.
- 6 Deliria quæ cum multo conatu eluctatorio, & vociferationibus conjuncta sunt, melioris spei sunt, quam quæ soporoso affectu sunt stipata.
- 7 Pessimum indicium præbent convulsiones, vox clangosa, lingua tremula & extremorum frigus.
- 8 Malum, si Phrenitis mutatur in Lethargum, non ita si Lethargus in phrenitidem. *Ragliv.*
- 9 Sudor universi corporis calidus & copiosus, licet non semper optimæ sit indolis, magis tamen proficius est quam frigidus, imprimis quando signa coctionis in urina apparent.
- 10 Si superveniat delirio alvi fluxus, præsertim morbo ad coctionem tendente, bonum. *Ragliv.*
- 11 Subitanea cessatio doloris cum tranquillitate apparente conjuncta, Meningum sphacelum & mortem instantem indicat.
- 12 Si Paraphrenitidi succedat singultus, cum externo horroris atque frigoris, interno vero summo ardoris sensu, lethale.
- 13 Paraphrenitidi parotides ad aures, vel apostasæ ad artus supervenire, bonum est.
- 14 Quod si vero non discutitur inflammatio, sed in corruptionem abit, æger 7. vel 14. die moritur.

IV. *Remedia.*

- 1 Affluxum humorum revellunt & imminuunt Venæsectio in brachio & sub lingua, aut loco hujus scarificatio narium, malo a suppressa hæmorrhagia narium pendente, hirudinum applicatio, pone aures & ad tempora, aut ad anum in hæmorrhoidariis, clysteres acriores, strictiones pedum, sinapismi, vesicatoria in pedibus applicata.
- 2 Stasin sanguinis resolvunt & febrilem materiam discutunt Cinnabarina, Giata fixa Antim. diaphor. Bez. miner. Pulv. Bezoard. Hall. in specie Pulv. Solar. Richter. Aquæ diaphoreticæ, Sem. Card. Mar. in emulsionibus, Sperm. Ceti, Sang. Hirci, Mandib. Luc. pisc. Dent. Apr. præparat. Alexipharmaca temperatiora: Mixtur. simpl. Ess. Alexiph. Stahl. Externe Spir. Vin. Camph. Epithema & Cucuphæ ex herb. Verben.



ben. Meliss. Flor. Anagallid. Bacc. Junip. Sem. Carvi, Camph. cum aceto madefacta, animalia viva v. g. Anates & columbæ in medio dissectæ & loco dolenti applicatæ, Unguentum alabastrinum camphoratum, Bufones vertici impositi, Emplastrum miraculosum scrobiculo cordis in paraphrenitide applicatum.

- 3 Effervescentiam compescunt & moderantur, potus sufficiens, & tenuis, gelatinosa, Nitrata, absorbentia, Emulsiones, acidulata sibi invicem subordinata & perite interposita.
- 4 Specificam efficaciam attribuunt in Phrenitide Authores: Herb. Angall. Flor. phœnic.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Potio diaphnoico-resolvens.

*R. Aq. Card. Bened.* *Sang. Hirci ℥j.*  
*Maris.* *Tab. M. X. S. ℥ss.*  
*Scorzon. ana. ℥j.* *M. ad ternas horas cochlearim propinanda.*  
*C. C. Citr. ℥ss.*  
*Pulv. Bez. Hall. ℥j.*

##### 2 Alia simul Confortans.

*R. Aq. Card. Mar.* *Pulv. Car. num. iij.*  
*Rub. idæi.* *Tinct. Rosar. ℥ss.*  
*Ceras. nigr. ana. ℥j.* *Syr. Acetos. Citr. ℥ss.*  
*C. C. Citr. ℥ss.* *M. sapius ad aliquot Cochlearia ordinanda.*  
*Mandib. luc. pisc.*  
*Bez. min. ana. ℥j.*

##### 3 Essentia discutiens.

*R. Mixt. Simpl. ℥ij.* *Dos. 25. ad 30. gutt.*

##### 4 Alia.

*R. Ess. Alexiph. ℥ij.* *M. Dos. 25. ad 30. gutt.*  
*Spir. Vitriol. ℥ss.*

##### 5 Epithema discutiens.

*R. Herb. Meliss.* *Bacc. Junip. ℥ss.*  
*Verben.* *Sem. Carvi ℥ij.*  
*Anagall. cum flor.* *Camph. ℥j.*  
*Phœn. ana. mls.* *Incis. & contus. D. ad Ch.*

##### 6 Unguentum discutiens.

*R. Ungt. Alabastr. ℥ss.* *Camph. ℥ss.*  
*Ol. Nucl. Pers. ℥ij.* *M. fronti & temporibus applicandum.*  
*Opii in Aq. sol. ℥j.*

##### 7 Cataplasma rubetaciens.

*R. Rad. pyrethr.* *cum aceto & fermento acerrimo*  
*Sem. Sinap.*  
*Nasturt. ana. ℥j.* *F. Cataplasma.*  
*Herb. Rut.* *Plantis pedum aliquot vicibus applicandum.*  
*Lupul. recent.*  
*ana. Mj.*

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Congestoria stasis imminuenda est, cui rei Venæsectio in brachio celebranda satisfacit, subjungendo deinde in Phrenitide sectionem venarum raninarum, imo si Paraphrenitis ortum forte duxerit ab hæmorrhoidibus suppressis, Venæsectio in pede, aut ipsa hirudinum applicatio ad anum locum habet. In utroque vero malo, symptomatice febres acutas concomitante, hæ evacuationes omittendæ sunt, quia communiter circa dies Criticos demum ejusmodi metastases, methodum magis diaphnoicam & temperantem, quam positive evacuationem expectantes, fiunt.
- 2 Si materia peccans in primis viis Paraphrenitidi forte ansam dederit, removenda eadem est per exhibita digestiva & subjunctum emeticum.
- 3 Affluxus humorum derivandus est ad loca inferiora, quod quidem per clysteres nunc & tunc repetitos partim, partim etiam per frictiones & sinapismos partium extremarum, & in malo pertinaciori per Vesicatoriorum usum impetratur.
- 4 Ipsius staseos resolutio & discussio tentanda est, cui rei inserviunt potiones diaphoretico-discutientes, aut similes pulveres modeste usurpati. Externe vero Epithemata, litus, topica ex solventibus & discutientibus parata.
- 5 Egroti in aliquali tranquillitate constituto exhibeatur Mixtura simplex aut Essent. Alexiph. sed parvis & repetitis dosibus a gutt. 12. ad 20. 25.


- 6 Orgasmus sanguinis ejusque nimius motus contemperetur per Pulveres Nitrosos, Gelatinam C. C. Emulsiones dilutiores, sufficientem potum, Potiones acidulatas, Tinct. rosar. Clyst. ℥ij. Spir. Sulph. Vitriol. Syr. acet. Citr. juxta sibi invicem subjuncta & interposita.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Sectioni raninarum præstat semper aut præmisisse aut postposuisse Venæsectionem in brachio, quia nisi larga sit, facile majorem congestionem ad superiora post se duxit.
- 2 Quod si autem admodum profunde secantur, hæ venæ, vix amplius compesci poterit hæmorrhagia.
- 3 Si Paraphrenitis idiopathica ortum habuit ab iracundia graviore, effectum quandoque edidit vomitorium in principio exhibitum, alias magis noxia observata sunt emetica, quam utilia.
- 4 Deliria symptomata nullis positivis evacuationibus tractanda sunt, sed saltem per internam & externam methodum diaphnoicam & discutientem, nec non derivatoriam per sinapismos, frictiones, & ubi necessitas requisiverit, Vesicatoria.
- 5 Hæc tamen pluribus mulieribus quam viris utilia fuisse observavit. Bagliv.
- 6 Cucuphæ & epithemata calidiora magis nocent, quam profunt, eximium etiam damnum afferunt refrigerantia externe applicata.
- 7 Quidam Authorum interne ad æstum, motumque sanguinis refrænandum commendant Opiata, plerumque tamen materiam altius hoc modo insigunt & immobiliorem reddunt, cum sensibili morbi exacerbatione.
- 8 Omnia volatilia quocunque tempore exhibita, maxime sunt noxia & hinc vitanda.
- 9 Potus sufficiens non denegetur, sed ægri ad largius bibendum potius adigantur.
- 10 Uti refrigeratio partium inferiorum & jestigationes corporis, lenem diaphoresin impediunt, calidius vero regimen humores exagitat, sic quietia continentia & lenis diaphnoe summum habet usum.
- 11 Quando fauces & lingua nimia ariditate torquentur, præter gelatinosa & sufficientem potum, gargarismata Nitrata conducunt.
- 12 Quidam Auctorum in Paraphrenitide specificè electuarium de Ovo alexipharmaco scopo commendant.
- 13 In eodem malo nunquam frigide, sed calide & dosibus repetitis magis, quam simultaneis bibendum est, alias egregiæ noxiæ sequuntur.

#### CAPUT TERTIUM.

##### De Ophthalmia.

I. *Definitio.*  Phtharmia est inflammatio tunice adnatæ oculorum, a congestionem sanguinis in vasculis oculorum stagnantis, orta.

##### II. *Differentia.*

- 1 Alia est *vera*, ubi oculi insigniter inflammantur, quæ proprie sanguinea vocatur: alia vero *notha*, ubi non tam inflammatio, quam insignis feri concursus conspicitur; unde etiam serosa alias appellatur, cujus levior gradus *Taraxis*, gravior vero cum prurigne oculorum & palpebrarum conjuncta, *Chemosis* vocatur.
- 2 Est etiam vel *periodica*, certis temporibus iterum recurrens, vel *stataria* & fixa magis.
- 3 Alia est profundior, alia superficialia, & tandem
- 4 Alia unicum tantum, alia utrumque affligit oculum.

##### III. *Signa.*

- 1 Rubedo oculorum.
- 2 Lachrymarum, & in statu graviore materiæ serosopurulentæ acris effluxus.
- 3 Dolor urens & pungens.
- 4 Vasorum turgescencia cum oculorum tumore.
- 5 Fuga lucis, aut objectorum lucidorum.



IV. *Subjectum.*

- 1 Homines Plethorici, Sanguineo-Cholerici, aut Sanguineo-Melancholici, Diætæ aromaticæ & vinosæ dediti, oculis multis lucubrationibus abutentes, Hæmorrhagiarum narium consuetarum suppressione laborantes, scarificationes etiam consuetas negligentes,
- 2 Oculos aeri frigidiori aut etiam nimio calori exponentes.
- 3 Infantes quibus Crusta lactea aliæque capitis exulcerationes retropulsæ sunt.
- 4 Quibus exhalationes acres corrosivæ oculos enormiter læserunt.
- 5 Hæmorrhoidarii interdum, quibus post subito suppressas consuetas Hæmorrhoides sanguinis ad caput translatio facta est,
- 6 Tandem qui Bacchi & Veneris abusu huic stagnationi ansam præbuere.

V. *Prognosis.*

- 1 Ophthalmia vera sæpissime & fere ut plurimum post se trahit Hypopium, Pterygio seu Ungui occasionem præbens.
- 2 Quæ ab hæreditaria dispositione, vel suppressione Hæmorrhagiarum narium ortum habet, facile recurrere, vel in habitum degenerare solet.
- 3 Ophthalmia notha facile producit lippitudoines.
- 4 Hæc vero quandoque Corneæ erosioni uveique humoris effluxui ansam dant, cui cæcitas succedit.
- 5 Quando Cornea læsa iterum cicatrifatur, Clavus oculi emergit.
- 6 A serosis quoque Ophthalmiis fistulæ lacrymales ut plurimum initium habent.
- 7 Ophthalmia diuturna ut plurimum post se trahit visus hebetudinem.
- 8 Si in Ophthalmia neque derivatio, neque discussio, neque suppuratio locum invenit, sæpius perit oculus.
- 9 Ophthalmia gravis sæpius recurrens, cæcitatis periculum minatur.
- 10 Alvi profluvium, aut Hæmorrhoidum suppressarum spontanea apertio, sæpius Ophthalmiam tollit aut imminuit.
- 11 Graviorem suppurationem vel cæcitas, vel totius oculi corruptio sequitur.
- 12 Ophthalmia graviores capitis contusiones excipiens, periculosa & non raro funesta est.

VI. *Remedia.*

- 1 Sanguinem & feri affluxum derivantia & evacuantia: e fonte Chirurgico quidem, Venæsectio & præcipue scarificatio, Vesicatoria, fonticuli & Setacea: e fonte autem Pharmaceutico, lenia laxantia cephalica & Mercurialia v. g. Pilul. e Succin. Crat. Aloe-phangin. Extract. Hell. nigr. cum Resin. Jalapp. stimulo & Rhabarb. præsertim in subjectis biliosis Mercur. dulc. ex Diætetico pediluvia.
- 2 Sanguinem stagnantem & feri concursum resolutiva & discutientia, & quidem interne Giata fixa, Absorbentia & Cinnabarina cum Nitratibus mixta, Essent. Alex. Stahlî, Succini, Tinctura Antimon. Tartar. Essent. lignor. aut ipsa ligna sub infusi forma usurpata. Specifica virtute prædita Essent. dulc. Hallens. & Pulv. Solar. Richterî. Externe autem Collyrium ex Aq. flor. Cyan. & Camph. cum amygd. in emulsionis formam redactum, & epithemata sicca ex Rad. Rhod. Valerian. Herb. Verben. Euphras. flor. Cyan. Calcatripp. Samb. Rosar. Sem. Anis. Fœnic. Appensio etiam de collo Camph. Rad. Imperat. Levist. præcipue in infantibus. Lac cum paussillo croci tinctum, tepide instillatum.
- 3 Tonum Oculi restituentia & influxum nimium reprimentia externa applicita: Essent. dulc. ad oculos, Sacch. Saturni, Vitriolum album, Nitrum in aquis ophthalmicis solutum & guttatim applicatum. Ossa Sepiæ præparat. Tutia, Pompholyx, Nihil, Spod. Mater perlar. præparat. sub Collyrii varia forma ordinata.
- 4 Heterogenea oculis exterius sese adherentia, absumunt cum modo dicta exsiccantia & Vitriol. album tum etiam Vitrum Gi. & Croc. Metallor. nec non

Collyria, ex Myrrha, Aloe, & medicamenta e felibus animalium desumpta; porro axungia Viperarum, Anguillæ, Alciæ piscis, D. weisbachii Collyrium.

*Formule Remediorum.*

## 1 Pilulæ Cephalicæ.

Rx. MP. e Succ. Crat. gr. xv. Elix. P.P. q. s.  
 Merc. dulc. ℥ss. F. pil. num. xv.  
 Resin. jalapp. gr. iv. M. pro 1. dosi.  
 2 Pulv. Temper. & discutiens.  
 Rx. Conch. præp. ℥. diaph. Cinnab. ℥ij. ℥j.  
 Arcan. duplic. M. ℥j. bis vel ter de die  
 Nitr. depur. ana. ℥ss. sumenda.  
 Pulv. Rad. Valerian. ℥j.

## 3 Epithema discutiens.

Rx. Rab. Rhod. Calcatrip. ana p. j.  
 Valerian. ana. ℥ij. Sem. Anis.  
 Herb. Euphras. Fœnic. ana ℥j.  
 Verben. M. f. pulv. grossus  
 Flor. Cyan. includendus.

## 4 Collyrium D. weisbach. reprimens &amp; exsiccans.

Rx. Tut. præparat. ℥j. illoti ℥iv.  
 Corall. r. præparat. Ante quietem nocturnam  
 Camph. oculis magnitudine pisi im-  
 Sacch. Saturn. ana. ℥ss. mittitur. In omnibus oculo-  
 Nihil. alb. ℥ij. rum afflictiis, imo ipsa in-  
 Virid. æris gr. xij. cipiente cæcitate, utiliter ad-  
 M. cum butyr. Majali hibetur.

## 5 Aliud probatum fluidius.

Rx. Aq. flor. Cyan. Vitriol. alb. ana.  
 Calcatripp. gr. v.  
 Chelidoni. maj. Filtretur & bis vel ter de  
 ana. ℥ij. die guttatim oculis immit-  
 Dissolv. Sacch. Saturni. tatur.

## 6 Emulsio discutiens externa.

Rx. Camph. cum amygd. ex- Calcatrip. a. ℥ss. M.  
 cort. trit. gr. vj. Guttatim oculis instillanda.  
 Aq. rosar.

## 7 Collyrium reprimens.

Rx. Aq. Cyan. guttatim tepide instillan-  
 Rosar. ana. ℥ss. dum.  
 Dissolv. Nitr. depur. ℥ss. M.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Affluxus humorum deducendus & evacuandus est: Cura itaque merito a leni laxatione per appropriata remedia instituatur: cui subungi potest, si causa sanguinea præsto sit, Venæsectio aut scarificatio, quamvis alias hæc evacuationes melius præservative, ne affectus exinde pertinacior reddatur, aut in declinatione inflammationis, in usum trahantur. Pediluvia vero semper optimum pro hoc scopo habent usum. Fonticuli autem & Setacea non nisi in malo admodum rebeli adhibeantur.
- 2 Stasis sanguinis vel feri discutienda est. Faciunt prius optime Absorbentia & Giata fixa & pro meliori contemperatione, additio Nitri; posterius vero remedia Anticatarthalia, Succinata & Alexipharmaca.
- 3 Specificam hoc in passu adscribunt virtutem Auctores Rad. Valerian. cum interne, tum externe adhibita; singularis etiam laus attribuitur Essent. Dulc. Hallens. quæ plane specificè ad morbos oculorum ab Auctoribus hujus remedii commendatur.
- 4 Externe discussionem peragunt Herbæ Cephalicæ temperatæ cum camphora exterius oculis impositæ, insufflationes etiam halituosæ Sem. Anis. Fœnic. quod præprimis in infantibus locum habet. Spir. Vini quoque Camphoratus palpebris illitus, vel cum linteis eodem madefactis & iterum exsiccatis applicatus aliquid emolumenti præstat.
- 5 Tonus restituendus & affluxus ulterior inhibendus est per Saturnina & Vitriolacea subadstringente vi prædita. In causa serosa utiliter quandoque adhibentur exsiccantia; Mater perlar. præparat. Spod. Os. Sep. præparat. Pomphol. quæ serum affluens absumunt. Acrimoniam vero ejusdem temperant nu.



mucilagines Sem. Psyll. Cydon. cum aquis Ophthalmicis mixtæ.

- 6 Quando post discussam inflammationem vel Unguis vel Albugo visum intercipiens remanet, modo dicta exsiccantia & vitriolacea, quæ lenem vim septicam possident, usum etiam habent haud spernendum; ut taceamus supra laudata medicamenta huic scopo convenientia.

*Extra Paroxysmos.*

- 7 Eo etiam respiciendum est, ut affectus in posterum præcaveatur, quod optime per reiteratas laxationes & Venæsectionis imprimis vero scarificationis diligentem usum impetratur, illam bis vel ter per annum, hanc vero 4. vel 6. celebrando, non neglecto quoque pediluviorum usu.
- 8 Interne vero adhibeantur anticatarrhalia, vel temperantia crasin humorum corrigentia; quodsi vero hæc omnia nil constanter juverint, & causa fuerit serosa, utilitatem poterunt præstare fonticuli vel setacea.

*VIII. Cautelæ Practicæ.*

- 1 Nisi universalia præmittantur specificis, plerumque voti haud sumus compotes.
- 2 Scarificationes ut plurimum in oculorum affectibus meliorem edunt effectum, quam Venæsectiones.
- 3 Acrimoniam tam septicorum incaute adhibitorum, quam ipsius feri, optime temperant Saturnina & Nitrata.
- 4 Emollientia in Ophthalmiis parum utilitatis habent, affluxui enim humorum magis ansam præbent.
- 5 Pinguedines Viperarum, ascia pitcis, anguilla quando recentes adhuc sunt, emolliunt, quod si vero vetustæ fuerint, acriores redduntur, & absumunt teste wedelio; unde in Pterygio utiliter adhibentur.
- 6 Spir. Vini Camphor. cautissime applicandus est, si enim aliquid ipsos oculos tetigerit, instar carbonis candentis urit.
- 7 Vesicatoria pene aures applicita sæpe malum adaugent, ideoque melius pro revellendis humoribus remotis corporis locis imponuntur.
- 8 Fonticuli per tempus fluentes, si iterum consolidantur, Ophthalmias cicuratas plerumque pejores quam antea fuerant, reddunt, quod etiam de setaceis intelligendum est.
- 9 Quoad Diætam, Venus, Diætæ aromatica, abusus vini, lucubrationes, vapores acres, aer frigidus pariter ac calidus nimis, vitanda sunt.

CAPUT QUARTUM.

*De Angina.*

- I. *Definitio* **A** Angina est inflammatio circa Laryngis aut Pharyngis musculos, cum febre acuta, suffocationis metu & deglutitione impedita, ut plurimum ab incompleto molimine hæmorrhagico & inde pendente sanguinis stasi & corruptione, ortum trahens.

II. *Differentia.*

- 1 Ratione gradus & impetus est vel *vera* quando inflammatio internas magis partes obsidet, vel *notha*, ubi externe circa tonsillas absque notabili febre tumor conspicitur.
- 2 Ratione loci affecti, vel contingit in Laryngis, vel Pharyngis musculis.
  - a Laryngis musculi interni inflammati constituunt Cynanchen, nullum tumorem neque externe, neque interne, exquisitissimam tamen febrem habentem, externi vero Paracynanchen, tumorem inflammatorium externe formantem.
  - b Pharyngis vero interni musculi inflammati producunt Synanchen, cum magna deglutiendi, minori vero respirandi difficultate conjunctam, externi autem Parasyanchem; adeoque brevissime vel est interna magis, vel externa.
- 3 Ratione invasionis alia est Epidemica, alia Sporadica.
- 4 Alia est Idiopathica, quæ sine ullo morbo præce-

dente a sanguinis stagnatione oritur, alia vero sympathica, quæ febribus acutis aliisque morbis supervenit.

III. *Signa.*

a *Angina vera:*

- 1 Rigor atque horror.
- 2 Succedens ingens æstus cum siti.
- 3 Inflammatio faucium externe vel interne, quandoque vero prorsus non conspicienda.
- 4 Impedita deglutitio, ita ut sæpius deglutita per nares reddant, imprimis potulenta.
- 5 Respirationis difficultas modo major, ita ut ore hiant, canum instar, respirent, modo minor.
- 6 Dolor faucium exquisitissimus, nimirum pulsatorius & punctorius, modo in alterutro latere, modo in utroque ad cervicem usque se extendens.
- 7 Linguae tumor & rubor, aut livor, nec non tonsillarum intumescencia.
- 8 Venarum colli & raninarum turgescencia.
- 9 Universi capitis & interdum colli exterius conspicienda rubicunda inflatio.
- 10 Tandem malo ulterius procedente decumbendi difficultas, suffocationis periculum & orthopnæa.
- 11 Vox clangosa & rauca, cum loquendi difficultate.
- 12 Oculorum, ut in strangulatis prominentia & rubor, ac torvus aspectus.
- 13 Pulsus ut plurimum frequens, durus, & inæqualis.
- 14 Urina saturatissime rubra.

b *Angina nothæ.*

- 1 Invasio sine horrore, frigore atque æstu.
- 2 Dolor, rubedo faucium, respirandi difficultas multo mitiora.
- 3 Deglutitio quoque minus impedita.
- 4 Nullum præterea suffocationis periculum.
- 5 Absentia febris.
- 6 Magnus salivæ viscidæ & tenacis in oris cavitationem fluxus.

IV. *Subiectum.*

- 1 Sanguinei, Sanguineo-Melancholici, juvenes hæmorrhagiis aut congestionibus ad caput assueti.
- 2 Diætæ vinosa & aromatica utentes, externas etiam injurias imprimis ab aere frigido post nimiam corporis incalescentiam passi.
- 3 Clamoribus & vociferationibus dediti.
- 4 Dysenterici male tractati, aut quibus fluxus talis nimis cito suppressus fuit.
- 5 Feminæ & Viri Hæmorrhoidarii, quibus fluxustales sanguinis consueti suppressi sunt.
- 6 Acute febricitantes, quibus vena imprudenter secta fuit, hi enim non raro circa dies criticos Angina corripuntur.
- 7 Homines qui consuetas scarificationes & venæsectiones neglexerunt.
- 8 Personæ, quibus vertebra colli introrsum luxata est.
- 9 Proni ad Hæmoptysin.

V. *Prognosis.*

- 1 Cynanche omnium periculosissima est, ob nimiam enim inflammationem, aperto plerumque ore aërem petunt sicut canes. *Vid. Hipp. Sect. 4. Aphor. 34. 35.*
- 2 Qui sic moriuntur, plerumque convulsi magis, quam suffocati intereunt.
- 3 Quo majori horrore, rigore & subsequente æstu invasio incipit, eo gravior morbus metuendus est.
- 4 Spuma ante os cum insigni respirationis angustia, signum fere lethale.
- 5 Si nullus tumor & rubor externe conspiciatur, interne inflammationem, & quidem eo periculosiorem esse, portendit.
- 6 Econtra Angina correpto, si tumor appareat in collo, bonum; foras enim morbus vertitur. *Hippocr. 6. Aphor. 37.*
- 7 Quæ neque in faucibus, neque exterius tumorem exhibent Anginæ perniciosissimæ sunt, imprimis si Orthopnæa accedit, hæ enim sæpius eodem, vel secundo, aut tertio die ægrotos suffocant.



- 8 Quibus ex Angina liberatis ad pulmonem fit conversio, ii intra dies septem moriuntur; si vero hos evaserint, purulenti evadunt. Hipp. 5. Aph. 10.
- 9 Quando tumor & rubor, si qui adsunt, subito evanescent, recursum ad interiora denotat.
- 10 Angina luxationem vertebrarum colli secuta lethalis. Hipp. 4. Aph. 35.
- 11 Anginæ in febribus acutis circa dies Criticos contingentes, perniciose.
- 12 Si Laryngis muscoli laborant, difficilior est respiratio, sin vero Pharyngis, deglutitio.
- 13 Inter omnes species Paracynanche mitissima est.
- 14 Anginam interdum per narium Hæmorrhagiam, interdum vero per Mensium fluxum solvi, observationum Scriptores testantur.
- 15 Anginam die quarto Pleuritide superveniente & hanc eodem die accedente alvi fluxu & Febre miliaris solutam fuisse observavimus.
- 16 Quando Angina non discutitur, sed in suppurationem abit, eventus morbi admodum anceps est.

## I. Remedia.

- 1 Turgescentiam sanguinis, imminuentia atque temperantia: Venæsectiones, Clysteres, Laxationes Diaphoretica fixa, Cinnabarina, Absorbentia, Gelatinosa, Nitrosa & Diaph. Bez. min. Nitrum depuratum, & iatum, perlatum, Cinnab. & ij Oc. & præparat. Onchæ præparat. Gelatina C. C. &c.
- 2 Sanguinem stagnantem resolventia atque discutientia. Pulv. Solar. & Ital. Hallens. Mandib. luc. pisc. Dens. apri præparat. Sperm. Ceti, Sang. Hirci, Sem. Card. Mar. Externe Empl. e Sperm. Ceti, e Melilot. Camphor. Dia. hyl. simpl. cum Gummat. Cataplasim. ex nido hirund. Spir. Vin. Camph. Crocat.
- 3 Influxum nimium humorum discutientia & reprimentia: Gargarismata ex subadstringentibus & discutientibus parata, v. g. Rad. Bistortæ, Sigill. Salom. Aristol. utriusque Vincetox. Tormentill. Herb. Prunell. Salv. Agrimon. Hyssop. Prol. Auric. mur. Heder. Terr. Flor. Ligust. Sambuc. Melilot. Alumine, additis temperantibus & lenientibus Nitro, Mel rosat. Rob. Diamor. nec neglecta additione Alpi græc. imprimis ubi inflammatio fortior adest.
- 4 Maturantia, suppurantia, & mundificantia. Rad. Alth. Herb. Branc. Ursin. Flor. Chamom. Sambuc. Melilot. Fic. in aqua vel lacte cocta, Vinum calidum cum melle, Decoct. Hordei cum melle, Decoct. Veronic. aut Heder. Terr. cum melle pro gargarisatione.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis diaponico-temperans.

- R. Mandib. luc. pisc. Cinnab. & ij. Dj.  
 & ij diaph. M. div. in 7. part. æq. ad Dj  
 Tart. Vitriol. dosi singulis 3. vel 4. horis.  
 Nitr. depur. ana. ʒss.

## 2 Emulsio resolvers.

- R. Amygd. dulc. excort. Syr. Dialt. Fernel. ʒss.  
 Sem. Card. Mar. & ā. ʒij adde Dent. apr. præpar.  
 f. c. Decoct. C. C. ʒvj. & ij. diaph. ana. Dj  
 Emulsio edulcor. cum Sapius cochleatim exhibenda

## 3 Gargarisma discutiens &amp; reprimens.

- R. Rad. bistort. Coq. in f. q. Aq.  
 Sigill. Salom. & ʒss. Colat. R. & j.  
 Herb. Hyssop. Dissolv. Nitr. depur. ʒij.  
 Prunell. ana. Mss. Alum. ʒj.  
 Fl. ligustr. Mel. ros. ʒss. M.  
 Rosar. ana. p. j. pro gargarismate.

## 4 Aliud in majori Inflammatione.

- R. Rad. Bryon. Alb. græc. ʒij.  
 Sigill. Sal. ana. ʒss. Coq. in f. q. & in Colat. & j.  
 Herb. Malv. Dissolv. Rob. diamor. ʒss.  
 Salv. ana. Mss. Nitr. depur. ʒij.  
 Flor. bellid. Alum. ʒj.  
 Melilot. ana. p. j. M. pro Gargarif.  
 Fic. N. ij.

## 5 Emplastrum discutiens &amp; resolvers.

- R. Empl. Melilot. Extend. super alut. & calide  
 e Sperm. Ceti. & ʒss. imponatur.  
 Camph. Dj.

## VII. Methodus medendi.

## In Angina vera.

- 1 Ante omnia sanguinis turgescentia atque ebullitio est diminuenda, quod per Venæsectionem largam in brachio tentari potest, hac vero non sufficiente, vena ranina pertundenda est. Multum etiam pro adimplendo hoc scopo facit repetita clysterum imprimis acriorum injectio, quod etiam ante Venæsectionem fieri potest. Interne vero remedia temperantia, Nitrata nimirum Cinnabarina atque absorbentia, optime cum diaphoreticis fixis & aquis diaphnoicis exhibentur.
- 2 Ipsa Staseos resolutio præter hæc interna discutientia & temperantia tentetur per Gargarismata resolventia & externam colli obfectionem, nec non Emplastrorum & Cataplasmatum resolventium applicationem.
- 3 Ut vero affluxus nimius sanguinis reprimatur & inflammatio ulterior faucium inhibeatur, subjungenda vel interponenda, aut commiscenda etiam sunt alteris illis Gargarismata subadstringentia, sensim in usum vocanda, & pro circumstantiarum ratione magis magisque quoad vim augenda.
- 4 Si quarto aut quinto die ex dolore pulsatorio supurationem imminere cognoscitur, ab adstringentibus & discutientibus cessandum, eorumque in locum emollientia & suppurantia Gargarismata ordinanda sunt, apertus vero deinceps abscessus per mundificantia tractandus est.
- 5 Suffocationis periculum quidam Auctores per Laryngotomiam evitare docent, alii vero per institutum vomitum.
- 6 Angina ntha rarissime opus habet Venæsectione & clysteribus. Sufficiunt plerumque Gargarismata & lenis laxatio, nec non usus alicujus pulveris Diaphoretico temperantis.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Nisi in Angina vera vena secetur & larga sanguinis evacuatio fiat, omnia interna & externa medicamenta fere incassum exhibentur & applicantur.
- 2 Nisi Raninarum sectioni Venæsectio in brachio præmittatur, illa nullum habet usum, sed potius majorem ad fauces affluxum sanguinis promovet.
- 3 Largissima tamen evacuatio, qualem Sydenham & Lindanus aliique celebrare, non semper proficua est.
- 4 Venæsectionem in pede majoris utilitatis esse, quam in brachio, experientia & ratio dicitur.
- 5 Album græcum nunquam absque fructu gargarismatibus additur.
- 6 Rob. diamor. in Angina vera, rob. vero dianuci in notha utilius.
- 7 Emollientia ab initio parum emolumenti externe afferunt, præstat potius rem peragere per discutientia, aut ad minimum cum his illa combinare.
- 8 Reprimentia in minori primum dosi sunt adhibenda, deinde, si ægrotus bene eadem fert, in majori reliquis discutientibus addenda sunt.
- 9 Gargarismata non uno impetu injicienda sunt, sed sensim sensimque, ut eo melius penetrent, & minus pruriant.
- 10 In casu necessitatis, loco Vegetabilium adstringentium saltem sumi potest terra Catechu & in aqua solvi, quæ Gargarismatis vices optime implet.
- 11 Nitrum & album Græcum præ omnibus aliis medicamentis in Gargarismatibus optime se gerunt, unde in casu ancipiti nunquam omittenda.
- 12 Peculiarem etiam adscribunt Auctores Rad. Bistort. virtutem discutientem in Gargarismatibus adhibere.
- 13 Quando abest inflammatio conducit Emplast. Diachyl. Simpl. collo. imponendum.
- 14 Quod si vero inflammatio cum ardore magis observatur, prodest Empl. diachyl. cum Gummat.
- 15 Ubi vero ardor & inflammatio admodum urget, applicari potest Sp. Vin. Camph. crocatus.



- 16 Pulverulenta interne exhibita, nisi admodum tenuia sint, titillationem admodum ingrati in faucibus excitant.
- 17 In suffocationis metu & Vomitoria & Laryngotomia ancipitia remedia sunt, imprimis tamen prius.
- 18 Vomitoria, quæ Agricola, Riverius aliique in principio morbi suadent, nec non fortiora purgantia, pericula potius quam emolumenta parere possunt. Nec locum habent ipso suppurationis tempore, melius enim Naturæ totum negotium committitur.
- 19 In Angina symptomatice, quæ febribus acutis supervenire solet, neque Venæsectio, neque laxationes conducunt, unice huic rei per interna lubricantia, gelatinosa, antispasmodica & gargarisimata discutientia resistendum est. Bufo etiam in Spir. Vini maceratus & calide vertici impositus, singulare quid præstare dicitur.

## CAPUT QUINTUM.

## De Pleuritide &amp; Peripneumonia.

- I. *Definitio.* **P**leuritis & Peripneumonia sunt inflammationes a stagnante sanguine, illic intra pleuram & venam azygos, hic vero intra membranam pulmonum substantiam cingentem, factæ.
- II. *Differentia.*
  - 1 Utraque est vel vera, quæ febrem acutam & inflammatoriam conjunctam habet, vel *notha*, ubi neque febris, neque pulsus durities, vel saltem dolor vel in scapulis, vel regione pectoris superioris sese exerens, æstusque satis mitis observatur. Illa dolores format æquales cum pulsu correspondentes, hæc inæquales, nullam connexionem cum pulsu habentes.
  - 2 Alia est *occulta* magis, sensum doloris obscurum satis conjunctum habens, alia *manifesta* & contrario modo se habens.
  - 3 Alia respectu loci affecti *ascendens*, alia *descendens*,
  - 4 Ratione indolis alia est benigna, alia maligna.
  - 5 Alia est simplex, uti Pleuritis vel Peripneumonia simplex, alia composita, uti Pleuropneumonia.
  - 6 Ratione invasionis alia est *vaga*, alia *periodica*, quæ scilicet certis anni temporibus idem subjectum affligit.
- III. *Signa Communia.*
  - 1 Horror atque rigor insignis, conatus vomendi, æstuales quandoque vomitus post se ducens.
  - 2 Subsequens æstus acutus atque continuus.
  - 3 Difficilis respiratio anhelosa frequens, parva, quæ tamen major in peripneumonia est.
  - 4 Tussis.
  - 5 Dolores lancinantes sive punctorii in pectore continuo quidem affligentes, sed inter tussendum præcipue sensibiles.
  - 6 Rubor genarum, inflatio faciei cum aliquali oculorum prominentia & dolore capitis.
  - 7 Linguae ficitas atque ariditas.
  - 8 Sitis intensa.
  - 9 Vigiliæ.
  - 10 Pulsus durus.
  - 11 Alvi adstrictio.
  - 12 Urina admodum rubicunda, & versus dies criticos copiosum sedimentum roseum præbens.
- Specialia Pleuritidis.*
  - 1 Tussis in principio quidem morbi sicca, postmodum vero humida, cum ejectione materiæ ferosæ tenuis & spumosæ.
  - 2 Dolor magis in dextro latere sub mammis.
  - 3 Pulsus parvus, celer, frequens, durus & interdum intermittens.
  - 4 Signa generalia antea recensita.
- Specialia Peripneumoniæ.*
  - 1 Excretio sanguineo purulentæ materiæ circa tertium vel quartum diem.
  - 2 Dolor per totum fere pectus extensus, gravativus,

- profundus, ad spinam dorsii usque se extendens.
  - 3 Æstus magis anxius.
  - 4 Respiratio admodum laboriosa cum stertore, & suffocationem minitans, adeo ut ægroti erecto corpore respirare cogantur.
  - 5 Linguae tumor & faciei major, quam in Pleuritide.
  - 6 Aliquando dolor nullus, quam quando tussis adest.
- IV. *Subjectum.*
- 1 Homines præsertim in ætate juvenili constituti, hæmorrhagarum spontanearum vel artificialium successum negligentes.
  - 2 Iracundiæ dediti.
  - 3 Externa repellentia & saturnina, in morbis arthriticis vel scabiosis præpostere usurpantes.
  - 4 Personæ quæ post motum graviolem & Plethoræ commotionem corpus subito aeri frigido exponunt, aut potum nimis frigidum hauriunt.
  - 5 Potu item vinoso aut spirituosio abutentes.
  - 6 Qui diu in aere & vento frigidiori adverso versantur.
  - 7 Quibus Dysenteria imprudenter suppressa fuit.
  - 8 Qui per externas pectoris concussionem restagnationibus humorum occasionem præbuere.
- V. *Prognosis.*
- 1 Pleuritidis varius est exitus, vel enim solvitur salutariter per sudores criticos & narium hæmorrhagias, vel suppuratur & transit in Empyema, vel degenerat in Sphacelum.
  - 2 Juniores, infra tricesimum annum adhuc constituti, facilius has inflammationes superant, quam an-nosi.
  - 3 Urina circa diem quartam turbida, & sedimentum deponens, morbum die 7. vel 11. sudore solum iri indicat.
  - 7 Quando die 7. vel 11. nulla critica sudoris eruptio contingit, sed febris uno quasi tenore continuat, eventus anceps esse solet.
  - 5 In Pleuritide vera non est expectandum sputum cruentum, nisi pulmones sint simul affecti; materia enim in membrana satis densa hæret.
  - 6 Quo magis ascendit Pleuritis versus superiores Thoracis partes, eo majori periculo exponit ægrotantes, & contra.
  - 7 A Peripneumonia Phrenitis, malum. Hipp. 7. Aph. 12.
  - 8 Quo major est stagnatio sanguinis in pulmonibus, & quo profundior est inflammatio pulmonum, eo gravior & periculosior est Peripneumonia, & contra.
  - 9 Sputum cruentum, coloratum, non nimis viscidum, tertio & quarto die contingens præsentibus coctionis signis in urina, optimum signum.
  - 10 Econtra in pulmonis inflammatione, quibus circa initium urinæ crassæ sunt, deinde ante quartum tenues evadunt, mors impendet. Hipp. in Coacis.
  - 11 Sputi cruenti præmatura suppressio non periculosa tantum, sed etiam sæpius funesta est.
  - 12 Dolor punctorius in Pleuritide pristinum locum deferens & contrarium occupans, majorem inflammationem factam, majusque periculum indicat.
  - 13 Male cum ægris agitur, ubi nihil exspunt, aut enim circa criticos dies moriuntur, aut morbum hunc superantes in phthisin incidunt.
  - 14 Bona respiratio in pleuritide & peripneumonia semper bonum indicat, difficilior vero semper timenda.
  - 15 Erectum sedere velle in morbis acutis pulmonum perniciosum atque ferme lethale, præ ceteris si adsit sibilus in alpera arteria & difficultas excreandi sputi. Bagliv.
  - 16 Pleuriticis, quibus in interiores aures dolor & exinde abcessus & pus superveniebat, omnes sanatos vidit Bagliv.
  - 17 Quo gravior & quo magis acuta est febris Pleuritidi & Peripneumoniæ juncta, eo periculosius etiam decumbunt ægrotantes.
  - 18 Si dolore inflammatarum partium cessante febris adhuc perseveret vel augeatur, cum pulsu parvo intermittenti, frequenti, sudore frigido &c. malum; ar-



arguitur enim inflammationem jam terminasse in Gangrænam *Bagliv.*

9 Sanata Pleuritide, si remanet tussicula quædam & circa vesperam blandus calor per universum corpus excitetur, aut pleuritidis recrudescentiam aut suppuracionem prognosticato adstantibus *Bagl. ex Aretæo.*

10 Qui semel Pleuritide aut Peripneumonia fuerunt correpti, ii facile eandem denuo ob leviores etiam causas incurrunt.

11 Ut Pleuritis bene solvatur, debet prius cessare febris & postea dolor affecti lateris, quod si vero cessante dolore febris adhuc persistat, vel augeatur cum aliis Symptomatis, grave malum imminet egrotanti *Bagliv.*

12 Pleuritide recidivantes omnes fere sunt lethales *Hipp.*

13 Alvi fluxus in Pleuritide sunt perniciosi.

#### I. Remedia.

- 1 Nimum affluxum imminuentia & avertentia; Venæsectio & Clysteres.
- 2 Ebullitionem sanguinis temperantia & diluentia Nitrata, Absorbentia, gelatinosa, potus sufficiens. Pertinent huc Nitr. depur. Giatum. Oc. ꝑ. præparat. Conch. præparat. cum acidis saturata, Gelatina C. C. Decoct. hord. C. C. Eboris, Scorzonera.
- 3 Stasin resolventia & discutientia: *Sperm. Ceti, Mandib. luc. pisc. Densapri, Mumia, Sang. Hirci, Rad. Pimpin. Helen. Cort. Schacar. Herb. Chæref. Geran. maj. Scordii, Flor. Bellid. Sem. Card. Mar. ꝑ. diaph. Cinnab. ꝑ. ij, Aqua Scord. Scabios. Samb. Card. Ben. Ess. Alexiph. Stahlii. Externe Spir. Vin. Camphor. cum linteis applicatus.*
- 4 Spasticam stricturam demulcentia & relaxantia, Gelatinosa, Emulsiones, Ol. Amygd. dulc. Juscula vel Decocta ex Scabiosa, tussilag. rapis, flor. Papav. rh. Violar. frequenter exhibita, Externe Ol. Lini Ungt. dialth. illita.
- 5 Abscessum, si quis sequitur, abstergentia & mundificantia: Decocta ex herb. Veron. Heder. terr. Chæref. Virg. Aur. Scabios. flor. Bellidis.

#### Formulæ Remediorum.

##### 1 Potio diapnoico resolvens.

*Rx. Aq. Flor. Samb. Sang. Hirci ꝑj.*  
*Card. Mar. ꝑ. ij. ꝑ. iij. Syr. tussilag. ꝑ. iij.*  
*etyp. Cerv. ꝑ. iij. M. dosi 2. cochlearia per 3.*  
*Mandib. luc. pisc. aut 4. horas.*  
*ꝑ. diaph. ana. ꝑ. iij.*

##### 2 Pulvis diapnoico-temperans.

*Rx. Oc. ꝑ. præparat. Arcan. dupl. ana. ꝑ. iij.*  
*Dent. Apr. præparat. Cinnab. ꝑ. ij. ꝑ. j.*  
*ꝑ. Diaph. M. div. in 10. part. æq. per*  
*Nitr. depur. 3. aut 4. horas dosi j.*

##### 3 Emulsio resolv. & discut.

*Rx. Sem. Card. Mar. Mandib. luc. pisc.*  
*Pinear. mund. ana. ꝑ. iij. ꝑ. diaph. ana. ꝑ. j.*  
*cum Aq. Card. Mar. pro dolorum punctoriorum*  
*Chæref. an. ꝑ. iij. mitigatione sæpius cochlea-*  
*F. l. a. Emulsio edulcor. tim propinando.*  
*Syr. Tussil. adde*

##### 4 Essentia discutiens.

*Rx. Essent. Alexiph. St. ante meridiem in juscule*  
*Scord. ana. ꝑ. iij. propinanda.*  
*M. Dos. gutt. 25. ad 30. bis*

##### 5 Alia.

*Rx. Mistur. simpl. M. Dos. & usus ut præce-*  
*Essent. Cort. Schacar. dentis.*  
*ana. ꝑ. iij.*

##### 6 Species emollientes atque Anodynæ pro decocto.

*Rx. Rad. Alth. Pap. rhæad. ana. ꝑ. j*  
*Liquir. ana. ꝑ. iij. Incis. D. versus suppura-*  
*Herb. Tussil. tionis tempus 2. vel 3. de die.*  
*Scabios. ana. mfs Aqua simpl. vel juscule de-*  
*Flor. Violar. cocta.*

##### 7 Aliud Anodyno-resolv.

*Rx. Ol. Amygd. d. rec. expr. ꝑ. ij. Syr. Viol. ꝑ. vj.*  
*Sperm. Ceti ꝑ. iij. M. 2. vel 3. per diem cochl. j.*

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Affluxui nimio resistendum est per Venæsectionem in principio statim ante tertium large, vel bisetiam, ubi necessitas suaserit, usurpatam. Alvi quoque solutio per Clysteres non tamen admodum frequenter repetitos, huic scopo eximiam affert utilitatem.
- 2 Si gravis iracundia, quod quandoque fit, affectui ansam præbuit, præstat materiam biliosam in primis viis stagnantem, ante vel post celebratam Venæsectionem, per exhibitum vomitorium evacuare.
- 3 Deinde resolutioni atque discussioni opera præstanda est, quod optime per pulveres aut diapnoico-resolventes potiones peragitur, non neglecto ad diem usque tertium vel quartum, si temperamentum admodum Cholicum fuerit, Nitro.
- 4 Pro doloribus atque respirandi difficultate mitigandis nihil præstantius est Semine Card. Mar. sub quacunque forma usurpato.
- 5 Quod si die tertio vel quarto sputum purulento-sanguineum appareat, a discutientibus & diaphoreticis paulisper cessandum est, & magis insistendum relaxantibus, emollientibus, mitigantibus, cui scopo partim decocta ex Alth. scabios. rapis, tussilagine, flor. Pap. rh. Violar. partim Ol. Lini, Amygd. dulc. Spermate Ceti ordinata inservire possunt, non neglectis tamen diapnoicis, subjungendi vel interponendis.
- 6 Post morbum solum præscribantur mundificantia vegetabilia, bis de die sub infusi forma usurpanda.
- 7 Quod si autem ex Pleuritide formatum empyema ejus apertionem suadeat, ex Chirurgia pro eodem auxilium petendum.
- 8 Pleuritide nothæ post celebratam Venæsectionem aut scarificationem compescuntur per lenia laxantia, Nitroso-absorbentia & diaphoretica, nec non temperata discutientia & Alexipharmaca.

#### VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Venæsectio per se necessaria haud est, in statu tamen Plethorico & temperamento calidiori non negligenda.
- 2 Si in sanguine e vena secta extracto non appareat in superficie crusta alba, pro pessimo signo a Practicis habetur.
- 3 Qui versus dies criticos demum Venæsectionem celebrant, sputum facillime suppressere & in lethalem possunt projicere statum ægotantem.
- 4 Idem quoque malum emergit ex purgantibus præpostere usurpatis.
- 5 E contrario diaphoretica fortiora exhibita, deliria aliaque capitis gravissima mala producant.
- 6 Salia volatilia minus bene in larga dosi ordinantur; meliorem effectum edunt diaphoretica fixa cum lenibus solventibus exhibita.
- 7 Nitrum etiam pro æstu imminuendo ad diem usque tertium vel quartum potest concedi.
- 8 Versus suppurationis autem tempus tam ab hujus, quam frequenti diapnoicorum & discutientium usu aliquatenus cessandum, & potius insistendum relaxantibus, emollientibus atque lenissimis vulnerariis.
- 9 Externe Camphorata ad diem usque quartum discussionis scopo optime applicantur, ubi vero ad suppurationem affectus inclinare appareat, eorum loco emollientia in usum vocanda sunt.
- 10 Opiata admodum ancipitia sunt in his morbis, nam facillime sputum suppressunt.
- 11 Corticem Chacarillæ ad irritationem pectoris leniendam & materiam discutiendam egregium esse, Experientia docuit.
- 12 Papaveris erratici vis specifica consistit in leni anodyna & demulcendi efficacia.



## CAPUT SEXTUM.

## De Hepatide &amp; Splenitide.

I. *Definitio.* **H**epatitis & Splenitis sunt inflammationes, illa a Stasi sanguinis in hepate, hæc vero in liene facta, ortum habentes.

II. *Differentia.* Differunt Hepatitis & Splenitis inter se

- 1 Ratione loci affecti.
- 2 Ratione Symptomatum mitiorum vel graviorum, quæ quidem in Hepatide nunquam non sunt enormiora.
- 3 Ipsa Hepatitis vel occupat partem convexam, vel concavam Hepatis.
- 4 Splenitis vero, vel externam membranaceam, vel ipsam parenchymaticam substantiam infestat.
- 5 A Pleuritide uterque affectus differt febre remissiori, respiratione & dolore infra diaphragma.
- 6 Splenitis a Nephritide renis sinistri, partim ratione loci affecti, dum dolor in Splenitide magis anteriorem, in Nephritide posteriorem magis partem occupat partim vero respectu doloris, qui in Nephritide major est, quam in Splenitide.

III. *Signa.*

a *Communia.*

- 1 Invasio cum horrore insigni & diurno.
- 2 Succedens æstus, maxime intensus.
- 3 Sitis gravissima.
- 4 Prostratio virium.
- 5 Agrypnia.
- 6 Pulsus celer & frequens.
- 7 Angustia præcordiorum cum spirandi difficultate conjuncta.
- 8 Dolor gravativus in hypochondriis ad jugulum sese extendens.

b *Propria Hepatidi.*

- 1 Paroxysmi nulla notabilis remissio, nisi malum levius fuerit.
- 2 Intercurrens tamen frigoris sensus, quoties levissimus aer admittitur.
- 3 Mador etiam qui erumpit facile refrigerescens.
- 4 Interdum autem æstus insignis absque ullo mado, magna vero anxietate cardialgica stipatus.
- 5 Dolor circa scrobiculum cordis sub costis spuriiis dextris lateris magis gravans, quam pungens, cum tumore sæpius ejusdem regionis conjunctus.
- 6 Decubitus in latus dextrum difficilior, cum doloris augmento.
- 7 Urina subrutilla circa quartum diem pallido-rubellum deponens sedimentum, consistentiam quasi mucidam & purulentam referens.
- 8 Tussis pauca & arida, respiratio difficilis, aliaque signa quasi pleuritica, quæ quidem observantur si gibba aut convexa hepatis pars diaphragma respiciens est inflammata.
- 9 Si vero simam vel concavam Hepatis partem occupat inflammatio, præter signa generalia observatur.
- 10 Cardialgia gravis, anorexia, nausea &c.
- 11 Conatus vomendi & ut plurimum actualis vomitus materiæ biliosæ.
- 12 Singultus gravis vel continuo, vel frequenter affligens.
- 13 Diarrhœa interdum biliosa.
- 14 Sæpius etiam color corporis mutatur in subflavum, qui in oculis præcipuè notabilis est.
- 15 Quando inflammatio abit in abscessum, omnia symptomata exacerbantur cum intercurrentibus rigoribus.
- 16 Hunc vero; si rumpatur, subsequitur dolorum quidem remissio, sed succedit virium prostratio cum Febre Hæctica, abdominis quandoque inflatione ab effuso pure, & intercurrente lipothymia.

c *Propria Splenitidi.*

- 1 Dolor in hypochondrio sinistro sub costis spuriiis

gravativus & pulsatorius, cum tumore ut plurimum lienis satis perceptibili conjunctus.

- 2 Febris in exacerbatione sua typum quasi quartanarium servans.
- 3 Urinæ crassæ & subnigræ.
- 4 Linguae succedens nigredo.
- 5 In hypochondrio sinistro concurrentes borborygmi.
- 6 Si forte narium Hæmorrhagia contingit, stillidium e parte sinistra fit.
- 7 Extremorum frigiditas, quoties aeri liberiori corpus exponitur.

IV. *Subjectum.*

- 1 His morbis exposti sunt personæ evacuationum sanguinis spontanearum successum, per præposteram adstringentium usum impediens, vel febricitantes Naturæ motus prius, quam par est, cohiberi concedentes.
- 2 Potum nimis frigidum post magnum motum & Plethoræ commotionem in larga quantitate assumens, aut corpus sudore madidum aeri frigidiori exponentes.
- 3 Iracundi & potu spirituofo abutentes.
- 4 Externas violentias, contusiones, plagas, casus ab alto &c. passi.
- 5 Quibus Scabies Erysipelas &c. suppressa fuerunt.
- 6 Topica frigida externe regioni hepatis vel lienis applicantes.
- 7 Qui fortioribus corporis motibus, cursibus, saltationibus &c. stasi sanguinis ansam præbuerunt.

V. *Prognosis.*

- 1 Hepatis quam maxime est periculosa; nisi enim stasis congestoria discutiatur, plerumque moriuntur ægri.
- 2 Si concava Hepatis pars inflammata est, in majori periculo versantur ægrotantes, quam inflammatio est in gibba ejus parte.
- 3 Et quo magis profunda est inflammatio, eo minus discussioni obedit & eo certius lethalis est.
- 4 Hepatis & lienis inflammationes non raro abeunt in scirrhus.
- 5 Pessima signa in hepatis inflammatione sunt febris ardens, sitis ingens, lingua scabra, refrigeratio extremorum, internorum vero ardor summus.
- 6 Quæ ab internis causis excitata est, matutino tempore invadit, & præter febrem ardentem magno ut plurimum periculo stipata est.
- 7 Ventris intumescencia cum sensu ardoris & gravitatis, sudor frigidus, præcipue circa collum & faciem, & lipothymia mortem instantem indicant.
- 8 Vomitus nigri circa dies criticos contingentes, pessimi sunt præ sagii, & eo magis, quando urinæ crudæ concurrent.
- 9 Si succedat singultus, actum de ægro est.
- 10 Diebus vero Criticis, sudorem copiosum, vel Diarrhœam, vel Hæmorrhagiam e nare dextra succedere, salutare.
- 11 Quando morbus in suppurationem abit, quod ex dolore & æstu majori, difficiliore respiratione & succedente imminutione doloris, debilitate patientis, pulsu languido & duriori cognoscitur, ut plurimum lethale, nisi suppuratio contingat in gibba Hepatis parte, ubi ultio aut sectio quandoque officium præstare posset. Conf. Hipp. Aphor. 45. Sect. 7.
- 12 Etiam si vero post factam suppurationem morbus superetur, ut plurimum tamen succedit hæctica.
- 13 In Hepatis inflammatione, si sub morbi cursu post usum nitroforum sequitur largum urinæ profluvium, bonum est.
- 14 Urinam circa dies criticos sedimentum deponere copiosum subrubicundi coloris, bonum.
- 15 Cruda verò limpida, vel etiam turbida absque sedimento, cuticulam tenuem lacteam parietibus vitri adhærens, mali præ sagii.
- 16 Sudores admodum copiosi, extra dies Criticos contingentes, non adeo utiles.
- 17 Dolores cito remittere, Febrem tamen adhuc cum magna virium jactura continuare, necrosin partis affectæ indicant.



18 Lienis inflammatio rarius contingit, nunquam tamen absque periculo.

19 Facilius abit in scirrhum, quam suppurationem.

20 Vomitus nigri in Splenitide circa criticos dies sentes magis salutare, quam noxii.

21 Dejectiones ex atro rubentes in Febre petechiali cum lienis inflammatione conjuncta, die decimo quarto salutare observavimus.

22 Hæmorrhoidum fluxus in assuetis circa eadem tempora sese manifestans, optimum quoque signum.

23 Eundem quoque usum habet Hæmorrhagia narium e nare sinistra, imprimis si die critico cum signis coctionis contingit.

24 Si inflammatio superficiem lienis tantum occupat, citius dissolvitur; quod si vero in interna magis substantia sedem habet, in apostema vel scirrhum abit.

#### VI. Remedia.

1 Sanguinem congestum derivantia & evacuantia: Venæsectiones, Clysteres, suppedanea.

2 Stasin factam resolventia: Radices & Herbarum attenuantes, discutientes & solventes; Radix Cichor. quæ specificè in Hepatitide laudatur; Pimpinell. alb. Vincetox. Helen. Dictamn. albi, Taraxac. Herb. Scord. Geran. maj. Capill. Qris, Heder. Terr. cum Flor. Bellid. arvens. Sem. Card. Mar. nec non Sperm. Ceti, Mumia. Dens apr. præparat. ossa capitis lucii piscis, Externe Empl. de Sperm. Ceti, Diaphoret. Mynf. e Cicuta, singula bene camphorata; ipse Spir. Camphoratus, Sacculi calidi siccii ex Herbis solventibus, Rad. Bryon. Sigill. Salomon. Irid. Flor. Herb. Hyssop. Samb. Chamom. Farina Secalina, Fabarum parati.

3 Febriles motus mitigantia & discutientia: Oc.  $\mathfrak{z}$ . præparat. Conch. præparat. aciditate Citri vel Spiritu nitri saturata;  $\mathfrak{z}$ . diaph. Bezoard. Min. Cinnab.  $\mathfrak{z}$ ij, Nitr. depur. Sal. Prunell. Gelatinosa, Emulsionem e Sem. Card. Mar. Aquileg. Pineis, Amygdal. addito in progressu mali Sem. Pap. alb. paratæ, portiones diaphoreticæ acidulatæ, sufficiens potus ex Rad. Scorz. Gramin. Passul. min. interpositæ Essentiæ alexipharmacæ temperatæ, Stahlî, Pimpinellæ albæ Scord. Mistur. simpl.

4 Auxilia Chirurgica per uisionem aut sectionem in Hepatitide.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Potio diaphnetico-resolvens.

Rx. Aq. Scord.	Dent. apr. præparat.
Flor. Samb.	$\mathfrak{z}$ ij diaph. ana. $\mathfrak{z}$ j.
Geran. ana. $\mathfrak{z}$ j.	Syr. Bellid. $\mathfrak{z}$ ss.
C.C. Citr. $\mathfrak{z}$ ss.	M. duo cochlearia 3. vel 4.
Mand. luc. pisc. præpar.	horis.

##### 2 Species solventes.

Rx. Rad. Cichor.	Flor. Bellid. ana. mss.
Vincetox ana. $\mathfrak{z}$ ss.	Incis. Coq. in aq. simpl. vel
Herb. Scord.	sero lactis, mane & vesp.
Geran.	sub infusi forma usurpand.

##### 3 Emulsio anodyno-discutiens.

Rx. Sem. Card. Mar.	Syr. Flor. Bellid. $\mathfrak{z}$ ss.
Aquileg.	adde Mand. luc. pisc.
Amygd. dulc. exc. ana. $\mathfrak{z}$ ij.	$\mathfrak{z}$ ij d. aph. ana. $\mathfrak{z}$ ss.
cum Aq. Geran.	Sæpius ad aliquot cochlearia
Card. mar. $\mathfrak{z}$ ij.	propinanda.
F. l. a. Emulsio edulcor.	

##### 4 Pulvis diaphneticus.

Rx. Oc. $\mathfrak{z}$ . præparat.	Cinnab. Antimon. $\mathfrak{z}$ ij.
Tartar. Vitriol.	M. f. Pulv. Dos. $\mathfrak{z}$ j. ter de
Nitr. depur.	die.
Antimon. diaph. ana. $\mathfrak{z}$ j.	

##### 5 Essentia discutiens.

Rx. Essent. Alexiph. Stahl.	mane in infuso vel juscule
Scord. ana $\mathfrak{z}$ ss.	propinanda.
M. dos. gutt. 25.	

##### 5 Fetus externus discutiens.

Rx. Rad. bryon.	Fenic. Secul. Mss
Sigill. Salom. $\mathfrak{z}$ ij.	Incis. d. ad ch. Saccul. inclu-
Herb. Chamom.	dend. calide applicand.
Fl. Samb. ana. Mj.	

#### VII. Methodus medendi.

1 Inflammatio nimia inhibenda est per Venæsectionem in primo statim principio celebratam, imo si circumstantiæ suaerint, repetitam, quod absque mora in pedibus fieri posset. In hæmorrhoidariis quoque applicatio hirudinum ad anum locum haberet.

2 Pro nimio affluxu humorum derivando & æstu aliquantisper imminuendo utiles sunt clysteres emollientes & humectantes, nunc & tunc, si alvus adstricta est, repetendi.

3 Interne ad stasin resolvendam & æstum febrilem discutiendum præscribenda sunt temperata resolventia alexipharmaca & diaphnetica, ordinando illa mane, hæc vero versus & post meridiem.

4 Externe quoque discutientia & resolventia haud negligi debent, vel sub Epithematum vel Emplastrorum bene Camphoratorum forma loco affecto imponenda.

5 Emulsionem etiam ex semine Card. Mar. versus noctem in usum vocare convenit: habet enim hoc semen in omnibus inflammationibus internis specificam efficaciam.

6 Quod si æstus intensior foret, portiones diaphoreticæ debent esse subacidæ; cavendo tamen deinde, ne statim emulsionibus, aut hæc illis subjungantur.

7 In doloribus enormioribus pulveribus diaphneticis leni anodynum vel Emulsionibus Sem. Pap. alb. addi potest, quod saltem in incremento, non vero in statu morbi fiat.

8 Ubi Suppuratio in gibba Hepatis parte contingit tutissimum, inter reliqua, auxilium est sectio & evacuatio puris, quanquam neque hæc ægrum semper a morte liberet.

#### VIII. Cautele Practicæ.

1 Venæsectio ut plurimum utilis magis, quam noxia est; in Splenitide vero si Hæmorrhoidum obstructio subest, majorem habent utilitatem hirudines ano applicitæ.

2 Vomitoria locum non habent, nisi gravis iracundia affectui ansam dederit, quo in casu statim ab initio illa exhibere convenit.

3 Purgantia quoque, imprimis fortiora, nullam habent utilitatem, quia potius sanguinem magis in orgasmum projiciunt, discussionemque impediunt.

4 Idem etiam de positive diaphoreticis, id est, fortioribus intelligendum est, quippe quæ enormes æstus, deliria, convulsionem, ut plurimum parturiunt.

5 Lenis autem diaphnetice apprimè suadenda, quia æqualis per eandem circulatio sanguinis & expressio materiæ noxiæ obtinetur.

6 Clysteres toties injiciendi sunt, quoties necessitas eisdem exigit, & quidem emollientes & carminativi potius quam acres, ne ad Diarrhœas symptomáticas disponant.

7 Chærefolium, Sambuc. Fl. Bellid. tanta elogia non merentur, qualia iisdem in inflammationibus internis vulgo attribuuntur.

8 Neque etiam a dentibus apri vel maxillis lucii piscis miracula expectanda sunt.

9 Spir. Vini Camphoratus ab initio magis, quam in statu locum habet. Conveniunt tunc fetus siccii.



## CAPUT SEPTIMUM.

## De Inflammatione Ventriculi, &amp; Intestinorum.

## I. Definitio.

Est inflammatio admodum dolorifica & periculosa, a stagnante sanguine, vel in venulis ventriculi, vel intestinorum, variis causis ortum debente, excitata.

## II Differentia.

## a Ventriculi.

- 1 a *Cardialgia*: hæc nullam febrem comitem habet, nec tam exquisitum, certum ventriculi locum fixe tenentem, dolorem, mitioribus præterea stipata est symptomatibus.
- 2 *Ratione ipsius loci*: Quandoque totus ventriculus inflammatur, quandoque vero vel fundus, vel dextra vel sinistra saltem ejusdem pars.
- 3 *Ratione causæ*: est vel idiopathica, quæ primario a ventriculo originem habet, vel symptomatica, quæ febribus acutis, podagræ, retropulsæ, aliisque morbis supervenit.

## b Intestinorum.

- 1 *Ratione loci*, vel tenuia intestina inflammantur, quod quidem fere ordinarie fit, vel crassa, quod admodum rarum, nisi vis externa occasionem dederit.
- 2 *Ratione causæ* itidem vel idiopathica, vel symptomatica,

## III. Signa

## a Ventriculi inflammationis

- 1 Adest febris cum siti magna & clamorosa quasi, vigiliis, pulsu primo duro & frequenti, postea inæquali.
- 2 Concurrent dolores & ardores acerbissimi circa præcordia & specialiter scrobiculum cordis præcipue notabiles.
- 3 Jungit sese ut plurimum maxima anxietas & inquietudo.
- 4 Assumpta, sive liquida, sive solida, nunquam non insignem pariunt molestiam, cum dolorificis, quanquam vacuis, vomendi conatibus conjunctam.
- 5 Accedit siccitas oris & faucium molestissima, quæ a liquidorum assumptione momentaneam quandoque refocillationem accipit, aut plerumque si paululum largior fuerit, cardialgico-lipothymica, imo quandoque syncopatica pathemata post se trahit.
- 6 Alvus ut plurimum est adstricta, urina vel flammea, vel subrufa, pauca & crassa, diuturna mora turbidior evadens.
- 7 Subsequuntur facillime horripilationes & refrigerationes externæ cum intenso æstu interno atque deliriis, ut plurimum lipothymico-syncopicos vel semiconvulsivos, nec non singultuosos effectus comites habentibus.

## Intestinorum.

- 1 Tormina acutissima & contractiones dolorificæ circa umbilicum, cum acuta febre conjunctæ.
- 2 Vomendi conatus & actuales ut plurimum vomitus, præcipue in repletioribus.
- 3 Constrictio alvi firmissima, rarius ejusdem lubricitas, nisi in symptomatica dysentericæ superveniente.
- 4 Pulsus non adeo durus, sed frequens.
- 5 Agrypnia cum succedentibus deliriis, extremorum frigore, interno vero ardore.

## IV. Subjectum.

## a Inflammationi Ventriculi expositi sunt

- 1 Iracundi; immediate post graviores iracundiam cibos in larga quantitate & quidem fermentescen- te efficacia instructos, assumentes.
- 2 Frigida avide ingurgitantes, corpore adhuc intense calente,

3 Venenis corrosivis, emeticis & purgantibus fortioribus usi.

4 Podagrici, Rheumatici, Arthritici male per externa refrigerantia & repellentia tractati.

5 Febribus acutis & malignis laborantes, & ab iisdem in faucium affectus prunellodes incidentes.

6 Ventriculi vim externam passi.

## b Intestinorum inflammatione facile laborant.

1 Herniosi.

2 Hæmorrhoidarii.

3 Biliosi.

4 Colicæ sanguinæ & biliosæ frequenter obnoxii.

5 In externas injurias violentas infelicititer incidentes.

## V. Prognosis.

1 Uterque affectus periculosissimus est & brevi tempore ægrum jugulare potest.

2 Ventriculi quidem orificium si occupat inflammatio, periculosissima est, & teste *Foresto*, Jovis filii dicendi sunt, qui evaserint.

3 Tetræ atque fœdæ dejectiones quinto & sexto die supervenientes, raro levamen, sed plerumque majorem virium prostrationem afferunt.

4 Assumpta liquida si mox regurgitent ad os, pessimum signum, denotat enim vel œsophagi & ventriculi impotentiam paralyticam, vel nimiam harum partium ab inflammatione pendentem stricturam.

5 Frequentes Lipothymicæ admodum sunt suspectæ, subsequens vero singultus lethalis fere ominis.

6 Imprimis autem in utroque affectu externæ refrigerationes cum sudoribus frigidis, æstu interno per pulsum notabili, admodum sunt funestæ.

7 Inflammatio Ventriculi curata quandoque in febrem lentam & hecticam in siccoribus, in humidioribus vero in Oedemata & Asciticis tumores, præcipue si incongrua medicamenta adhibita fuerint, migrat.

8 Inflammationes intestinorum cum excretionem fæcum alvinarum anoterica conjunctæ, pessimi sunt indicii.

9 Si exterius in abdomine, ubi sedes dolorum erat, maculæ & vesiculæ livido-rubræ conspicuæ sunt, lethale signum.

10 Dolores subito evanescentes, qui antea admodum exquisiti erant, partis affectæ necrosin indicant.

## VI. Remedia.

1 Sanguinem abundantem in Plethoricis evacuat Venæsectio in pedibus celebrata.

2 Stasin resolvunt & discutiunt diaphoretica fixa ꝑ. diaph. Bezoard. Miner. Cinnab ꝑ. ij & nativa; Aquæ Diapnoicæ Flor. Samb. Card. Mar. &c Sem. Card. Mar. in emulsionibus, vel etiam in substantia usurpatum, Lenia Alexipharmaca: Ess. Alex. Stahlii temperatior, Scordii, Mixt. Simpl. Cortex Chacarill. ejusque Extractum in moderatiori dosi, Salia incidentia: Arcan. duplic. Tart. Vitriolat. &c. Externe Camphorata, Sacculi ex herbis aromaticis, nervinis & discutientibus: Puleg. Matricar. Origan. Rutæ, Absinth. &c. Sem. Carv. Fœnic. Camphora.

3 Sanguinem diluunt & stricturam solidarum partium inflammatoriam demulcent, potius tenuis, gelatinosus, lubricans calide sumtus, Gelatina. C.C. eboris, cremor hordei, decoct. hord. avenæ; Emulsiones, Nitrosa cum commendatis Cinnabarinis, clysteres emollientes & in alvo strictiori magis stimulant.

4 Motum nimium sanguinis remorantur & crasin humorum vitiatam acriorem corrigunt absorbentia: Oc. ꝑ. præparat. Unic. Fossil. & imprimis Crystall. Mont. præparat Acidiuscula: Acetol. Citri ejusque Syrupus, Tinct. Rosar. & Violar. &c.

5 Materiam correctam evacuant lenia laxantia Tamarindi, Rhabarbarum, Manna.

6 Corrosivam & drasticam venenorum indole demulcent & corrigunt partim oleosa: butyrum recens, Ol. Amygd. dulc. Olivar. in sufficiente quantitate assumpta, partim acida vegetabilia cum anodynis correctis in sicca vel liquida forma usurpata, partim etiam diluentia & lubricantia: laccalidum cum Ol. Amygd. dulc. copiose sumtum, Gelatinæ calidæ, cremor



mor. hordei, Mucilag. Sem. Cydon. Psyllii, Tragacantha, Gummi Arab. Omnia & singula secundum causarum circumstantias & diversitates exhibita.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis temperans.

Rx. Crystall. mont. præp. ʒj. Cinnab. ʒij ʒj.  
 ʒij diaph. M. dosis est. ʒj. 3. vel 4. per  
 Nitr. depur. diem.  
 Arc. duplic. ana. ʒss.

## 2 Alius.

Rx. Mandib. luc. pisc. præp. Nitr. depur. ana. ʒss.  
 Crystall. mont. præp. ʒj. Cinnab. Nativ. ʒj.  
 Tart. Vitriolat. M. dosis ut supra.

## 3 Emulsiō temperans &amp; discutiens.

Rx. Sem. Card. Mar. Syr. Flor. Bellid. ʒss.  
 Amygd. dulc. ex. ana. ʒij. adde Mand. luc. pisc.  
 cum Aq. Flor. Samb. ʒij. diaphor. ana. ʒss.  
 Card. Mar. ʒ. ʒij. M. Cochleatim propinan-  
 da.

## 4 Potio temperans &amp; discutiens.

Rx. Aq. Flor. Samb. Nitr. depur. ana. ʒss.  
 Scord. Extract. cort. Chatar.  
 Card. mar. ana. ʒj. gr. ʒij.  
 Acetos. Citri. ʒss. Syr. acetos. Citri ʒss. M.  
 Crystall. mont. præp. ʒss. Ternis vel quaternis horis  
 ʒ. diaph. cochleatim exhibenda.

## 5 Essentia discutiens.

Rx. Ess. Alexiph. Stablii. M. dosis gutt. 30. mane in  
 Scordii ana. ʒss. jusculo propinanda.

## 6 Alia.

Rx. Mixtur. Simpl. M. dosis ut antea.  
 Tinct. Bez. Mich. ʒ. ʒss.

## 7 Potio Laxans.

Rx. Tamarind. ʒj. Rx. ʒij. dissol.  
 Rhab. elect. ʒss. Mann. Calabr. ʒj.  
 Crystall. Tart. ʒj. pro una vice.  
 Coque in f. q. Aq. Colat.

## 8 Sacculus.

Rx. Herb. Chamom. Ror. mar. ana. p. j.  
 Matric. Ruta. Campb. ʒss.  
 Flor. Samb. ana. mss. Incisa Sacculis includen-  
 da.  
 Lavend.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Turgescentia sanguinis ejusque ebullitio, si quæ ad-  
est, imminuitur per Venæsectionem in pede in mor-  
bi statim principio celebrandam.
- 2 Saburra biliosa, si hæc originem dederit inflamma-  
tioni ventriculi, evacuatur quandoque optime per  
securum emeticum, in primis statim initiis ordi-  
natum.
- 3 Inflammatio tam ventriculi, quam intestinorum for-  
tior impedienda est tum per diluentia, lubricantia,  
gelatinosa, Nitrosa, subacida, tum lenia laxantia cly-  
steres, alvum apertam conservantia.
- 4 Stasis vero inflammatoria jam facta temperatur at-  
que discutitur tum per hæc, tum per diaphoretica  
fixa, Aquas diapnoicas, emulsiones, digestiva, lenia  
Alexipharmaca & Cinnabarina, externe vero per li-  
nimenta & epithemata discutientia.
- 5 Addatur si acrimonia biliosa subest, ad eandem cor-  
rigendam crystallus montana, non neglectis & a-  
liis absorbentibus e. g. Oc. ʒ. præparat. matr.  
perl. &c.
- 6 Hæc vero ita sunt ordinanda, ut in augmento &  
statu morbi Nitrosa, aquæ diapnoicæ, absorbentia  
cum diluentibus & lubricantibus usurpentur, in  
ipsius vero decremento, si ad lentam quasi remissio-  
nem vergit, magis diuretico-Alexipharmacorum usui  
insistatur; hæc quidem mane & circa meridiem, illa  
vero versus & per noctem ordinando.
- 7 Quod si malum a fortiori forte emesi vel catharsi  
ortum habeat, tunc usum præstare poterunt Anody-  
na correctæ, cum Alexipharmacis & diapnoicis con-  
juncta.
- 8 Arsenici vero vel Mercurii sublimati aut similium  
assumtorum vis corrosiva & deleteria optime dilui-  
tur & infringitur lacte, cum oleis expressis conjun-

cto, & large epoto, donec nimirum vomitus huic  
rei solennes cessant.

- 9 In Inflammatione intestinorum, ab hernia incarce-  
rata originem habente, chirurgicum simul auxilium  
implorandum, & prolapsus intestinorum reponen-  
dus est.
- 10 Quæ Dysentericæ succedit, in speciali capite hujus  
libri tractationem & curationem invenit.
- 11 Inflammationes ventriculi symptomaticæ, febribus  
malignis quandoque supervenientibus, solis tractantur  
diapnoicis, gelatinosis, lubricantibus, subacidis, di-  
luentibus.
- 12 A Podagra verò retropulsa originem habentes, de-  
siderant cum hæc, tum evacuationem sanguinis, nec  
non lenia laxantia & Clysteres.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Venæsectio non conducit, nisi in primo statim prin-  
cipio celebretur.
- 2 Vitanda quoque sunt omnia fortiora purgantia, vo-  
mitoria acriora inflammationem exacerbantia; ubi  
tamen biliosa saburra in ventriculo præsto est & ma-  
lum fovet, tunc in principio exhibitum vomitorium  
usum habere potest.
- 3 Opiata nisi admodum prudenter & justo tempo-  
re exhibeantur, facillime sphacelum inducere pos-  
sunt.
- 4 Lenia laxantia non sunt reformidanda, intestina  
enim eluunt, & stricturam inflammatoriam demul-  
cent, adde quod per alvi apertionem eandem im-  
minuant.
- 5 Quod etiam de clysteribus tenendum, quibus in  
principio quando alvus pertinaciter constricta est,  
sufficiente stimulo Salis prospiciendum est, subjun-  
ctis deinde tantum mollientibus & leniter carmina-  
tivis, acres tamen clysteres nocent.
- 6 Omnia calidiora interna cum injuncto regimine  
sudorifico locum haud habent; inflammatio enim  
exinde augmenta capit: sufficit regimen diapnoicum.
- 7 Externe oleosa acria fugienda sunt: quia dolorum  
ferociam exacerbant.
- 8 Cum sensus in utraque inflammatione sit exquisiti-  
simus & assumpta facile rejiciantur, vel magnam sal-  
tem molestiam pariant, ideoque præstat medicamen-  
ta in minori dosi, sed eo frequentius exhibere.
- 9 Omnia frigida hisce inflammationibus sunt inimica,  
ideoque potus calide & in parca quantitate assuma-  
tur, sed eo frequentius repetatur.

## CAPUT OCTAVUM.

## De Passione Iliaca sive Volvulo.

- I. **Definitio:** Passio Iliaca est dolor acerbissimus, præ-  
cipue intestini Ilei, utpl. cum inflam-  
matione sæcumque alvinarum per os excretionē con-  
junctus.
- II. **Differentia.**
  - 1 A Colica vel ratione loci, cum hæc magis epigastri-  
cam regionem occupet; Iliaca verò passio Hypo-  
gastricam; vel ratione symptomatum, in Iliaco  
enim affectu multo vehementiora tam respectu ru-  
ctuum, flatuum, torminum & febriculæ, quam  
ipsorum vomitum occurrunt symptomata, quæ  
quidem & in Colica simplici sunt observanda, sed  
non in tanto gradu, nec cum vomitibus sæculentis  
conjuncta.
  - 2 A se ipsa ratione differentiarum causarum: Alia enim  
ab intrusione intestinorum, quam convolutionem  
alii vocant, originem habet, alia herniæ carcera-  
tæ, alia denique obstructioni alvi diuturniori or-  
tum debet.
- III. **Signa.**
  - 1 Pertinax alvi adstrictio per plures dies, neque con-  
tinuans, neque ordinariis clysteribus emollientibus  
& carminativis obediens.
  - 2 Dolores exquisitissimi punctorii atque lancinan-  
tes, præcipue infra umbilicum se exerentes, ægram-  
que



que sæpius ita exercentes, ut quorsum se vertat, nesciat.

- 3 Irequentes ructus, murmura intestinorum flatulenta cum intercurrentibus & concurrentibus Cardialgiis, præcordiorum anxietatibus.
- 4 Abdominis præterea aliqualis distensio, fastidium ciborum, febricula, sitis, vigiliæ &c.
- 5 Succedentes conatus vomendi & actuales vomitus, primo contentorum ventriculi, postea malo ulterius procedente, intercurrentia animi deliquia, sudores frigidi, tenuium intestinorum chymosæ materiæ, tandem ipsarum alvinarum fæcum per os ejectiones, quæ demum ipsum Miserere mei constituunt.

#### IV. Subjectum.

- 1 Hæmorrhoidum incompleto molimine, magis vero consuetarum suppressione laborantes.
- 2 Herniosi, intestinorum prolapsorum repositionem negligentes.
- 3 Alvinis obstructionibus ex variis causis expositi.
- 4 Vulnerati.
- 5 Feminae post cessionem mensium aut suppressionem subitanæ.
- 6 Puerperæ lochiorum suppressione laborantes.

#### V. Prognosis.

- 1 Passio Iliaca, quæ cum fæcum alvinarum excretionis anoterica conjuncta est, nunquam fere non lethalis, quosdam tamen ad septimum usque diem vomitu stercoreo laborantes evasisse observavimus.
- 2 Mutuus intestinorum ingressus per ascensum curabilis est, per descensum vero incurabilis. *Etmuller.*
- 3 Passio Iliaca ab Hernia incarcerata originem trahens, admodum periculosa est.
- 4 Iliacam passionem ob herniam incarceratam per sectionem & restitutionem intestinorum restitutam fuisse, novimus.
- 5 Licet hernia interdum restituatur, nihilominus tamen Passio Iliaca continuante vomitu lethalis evadit, quod in lotrice observavimus, quæ licet Hernia restituta esset, omnia tamen assumpta, imo ipsos quoque injectos clysteres vomitu ad mortem usque, rejiciebat.
- 6 Quo magis inversus est motus peristalticus, eo periculosior est Passio Iliaca.
- 7 Quo magis acuti ac punctorii sunt dolores cum frequentibus horroribus, eo facilius inflammatio intestinorum lethalis metuenda est, quod aliquoties observavimus.
- 8 Frigus extremorum pulsusque exigua vel nulla perceptio in Passione Iliaca, funestum est.
- 9 Parotidem Passioni Iliacæ cum vomitu stercoreo supervenisse observavimus, sed cum altera die, licet alvi libertas restituta esset, subito retrocederet, sequeretur inflammatio faucium & mors.
- 10 Passionem Iliacam gravissimam, finem tamen vomitu stercoreo per Diarrhœam purulentam & cruentam per plures dies continuantem, cum euphoria solutam fuisse, aliquoties in feminis vidimus.
- 11 Iliaca Passio, quæ contingit saltem ex alvi obstructione simplici, meliorem spem præbet, quam quæ ex aliis causis ortum habet.
- 12 Dolor acutissimus subito evanescens, necroseos indicium est.
- 13 Ab Ileio vomitus aut singultus, aut convulsio, aut desipientia, malum. *Hipp. 7. Aph. 10.*
- 14 Quo major est adstrictio alvi, minusque hæc clysteribus auscultat, eo periculosior est status.
- 15 Si frigidi sequuntur sudores dolorum remissionem, lethale est.

#### VI. Remedia.

- 1 Materiam indurata[m] emolliunt, & tonum fibrarum demulcent absorbentia, Diaphoretica fixa, Cinnabarina, Nitrata, Gelatinosa, emulsiva; clysteres primo emollientes & carminativi, deinde magis stimulantese Fol. Tabaci, Sapone Veneto &c. Externe autem Olea & Unguenta emollientia ventri illinenda.
- 2 Emollitam & præparatam educunt: Purgantia sub solida potius quam liquida forma exhibenda, quo

pertinent Pilul. Coch. ad imitationem Sydenham. ordinatæ, nec non laudati clysteres, qui si nihil effecerint, addatur Colocynth. aut fol. Nicot. Senn. vel Tart. emet.

- 3 Æstum febrilem mitigant & discutiunt: Diaphoretica fixa, Nitrata & absorbentia cum paucis semper vehiculo exhibenda. Venæsectio in pede administrata, præcipue si malum ab Hæmorrhoidum malo successu originem traxerit. Externe autem Spir. Vini Camph. Crocati cum linteis calefactis, aut Epithematum discutientium applicatio.
- 4 Involuta sibi invicem intestina, si malum exinde dependeat, in naturalem ordinem restitui creduntur a globulis plumbeis vel aureis deglutitis, aut vivo in larga quantitate cum Ol. Amygd. dulc. assumpto, a folle orificio ani applicato.
- 5 Prolapsa intestina in herniosis restituant & reponunt post clysteres emollientes & carminativos, Epithemata & fortius ex speciebus emollientibus & carminativis in lacte coquendis parati, nec non in absentia inflammatorii tumoris Cataplasmata emollientia sæpius calide applicata, supinus corporis situs, cum auxiliatrice manuum ministerio.
- 6 Herniæ inveteratæ, medicamentis non auscultanti, succurrit operatio Chirurgica.

#### Formule Remediorum.

##### I Purgans Sydenhamii in Passione Iliaca post febres acutas ab obstructione alvi nimia contingente.

℞. Pil. Coch. ℥j.      quentem ∇ Menth. usum  
Dissolv. in ∇. Ment. q. s.      externam vero catuli viventis ventri imponendi applicationem.

2 Clyster emoll. & Carmin.  
℞. Dec. emoll. & Carmin.      Vitell. Ov. num. j.  
pro Clyster. ℥ix.      Sal Gemmæ ℥j.  
Elect. diacath. ℥j.      M. f. clyster calide applicandus.  
Ol. Chamom. ℥vj.

##### 3 Alius acrior.

℞. Spec. emoll.      Elect. lenit. ℥j.  
Fol. Nicot. ana Mj.      Ol. Sambuc. ℥vj.  
Coq. in s. q. ∇ & lact. an.      Sal Gemm. ℥j. M.  
Collat. ℞. ℥ix. dissolv.      calide applicandus.

##### 4 Pulvis diaphnoico-temperans.

℞. Conch. præparat.      Cinnab. ℥ij. ℥ss.  
℥ij diaph.      M. f. pulv. dosi ℥j. bis vel  
Tart. Vitriolati,      3. per diem propin.  
Nitr. depur. ana. ℥j.

##### 5 Pulvis Joelis.

℞. Flor. Chamom. lut.      M. f. pulv. in tepido decoct.  
Sem. Malv. ana. ℥j.      Flor. Anethi exhibendus.

##### Modus exhibendi welschianus.

℞. Ol. Amygd. dulc. ℥ss.      Bis terve dosi ægro tuto  
℥ij crud. purgat. ℥ij.      propinari potest.  
Sacchar. cand. alb. ℥j. M.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 In fæcum alvinarum induratione vehementiori successus alvi est promovendus per emollientes clysteres, qui, si nil juverint, reiterandi addito stimulo per Colocynth. Senn. aut Tart. emet. imprimis vero Fol. Nicot. Pertinent etiam huc laxantia in solida potius, quam liquida forma assumenda. Externe ad promotionem hanc alvinam facit etiam aliquid illinitio ventris per Unguent. aut linimentum emollientis.

- 2 Febrilis commotio & stasis sanguinis in intestinorum venulis discutienda, temperanda & resolvenda est per pulveres diaphnoico-absorbentes, Gelat. C. C. Nitrata &, si circumstantiæ illud permittunt, emulsiva. Melius autem semper sicciore ordinantur formulæ, quam liquidiores, facile enim hæc rejiciuntur. Imo ipsius potus assumptio ob hanc causam magis successive quam simul & largioribus dosibus fieri debet. Externe vero discussioni inserviunt epithemata carminativa, Spir. Vin. Camphor. cum linteaminibus applicatus. Imprimis pro hac intentione eo melius exequenda, quandoque Venæsectio



sectio in pede in primis diebus celebrata eximium usum habet, præcipue in iis, qui ab hæmorrhoidum vel mensium vitio in hunc affectum incidere.

3 Spastica fibrarum strictura demulcenda, doloresque exinde exorti mitigandi sunt per Cinnabarina, Effent. Dulc. Hallens. & lubricantia interna. Externe vero emollientia, fots, cataplasmata, stercus suillum, vaccinum recens cum Ol. Olivarum subactum & calide ventri impositum, Omentum vervecinum calide applicitum, catulos viventes ventri impositos &c.

4 Intestina, si sibi invicem intrusa sint, ita ut inferius in superius sese insinuaverit, Auctores globulos plumbeos vel aureos, aut etiam Hydrargyri usum commendant, ut gravitate sua intestina in pristinum ordinem redire cogantur; quod quidem in involutione *ævo* versus factum, aliquando processisse observationes testantur, imprimis si juxta Autorum commendationem fortior desuper institutus fuerit motus. Quando autem superius in inferius sese insinuavit, & magna adest inflammatio, tunc minus hæc methodus votis respondebit.

5 Iliacus affectus ab intestinorum prolapsu originem trahens, expetit ante omnia intestinorum prolapsorum repositionem; ut autem hoc eo melius fieri possit, præparatio per clysteres, fots, cataplasmata, linimenta emollientia præmittenda est, tunc mediante iusto, id est supino corporis situ, natibus paulisper elevatis, capite vero declinato repositio manuum opera administranda est. Interne vero ad inflammationem arcendam, & si quæ jam adest, discutendam, propinentur diaphonico absorbentia Cinnabarina, Nitrata, lubricantia & gelatinosa & præ cæteris Pulv. Solar. D. Richt.

6 Quod si autem inveterata hernia per omentum aut Mesenterii portionem processibus peritonæi adhæreat, ita ut repositio supra recensito modo haud obtineri possit, imminens affectui Iliaco periculum haud alia ratione præcaveri poterit, quem actuali Chirurgica operatione.

#### VIII. Cautela Practica.

1 Vomitoria in hoc affectu angue pejus fugienda sunt: Vomitus enim dolorem & inflammationem certissime augent.

2 Purgantia etiam, imprimis fortiora, plerumque malum exasperant, nisi ventriculus prius roboratus fuerit.

3 Laxantia his præferenda sunt: debent autem ita comparata esse, ne ob nimiam molem a ventriculo iterum rejiciantur.

4 Opiata, ob dolorum mitigationem ordinata, inflammationem exacerbant, & ad gangrænam viam parant.

5 Mercurius non debet exhiberi, nisi per emollientia prius præparatum fuerit corpus, cui rei inservit Oleum Amygd. dulc. vel Olivar. ad aliquot uncias assumptum. Post deglutitionem Mercurii opus est motione corporis, ut hic vias intestinorum eo melius penetrare possit.

6 Hernia inveterata nulla vi debet reponi, alias, si alicubi adnata est, facile convolutio intestinorum & exinde secutura inflammatio metuenda est.

7 Quodsi in incarcerationata hernia externe tumor jam inflammatorius appareat, ab operatione Chirurgica cessandum est.

8 Quando sæculentæ materiæ excretio *ævo* jam contingunt, a clysteribus præcipue fortioribus, cessandum est, alias & hi per eandem viam excludentur.

#### CAPUT NONUM.

##### De Nephritide.

1. *Definitio.* **N**ephritis est inflammatio a stasi sanguinis in renibus, ut plurimum propter hæmorrhoides externas minus bene succedentes facta, originem trahens.

#### II. Differentia.

Nephritis simplex distinguenda

1 a *Calculosa*: hæc enim

a In urina, sabulum non adeo rubicundi coloris statim postquam emissa est, vel post breviorē saltem moram ad fundum demittit; cum e contrario Nephritis in urina Crystallōs teneras, pellucidas, rubicundas, demum postquam refriguit lateribus vitri sese adhærentes, sicut alii quoque arthritici affectus, exhibeat.

b. *Calculosa* sub quieto corporis statu mitescit, Nephritis vero exinde exacerbatur, & potius a leniori motu emolumentum capit.

c Porro dolor in *Calculosa* acutissimos cruciatus refert, in Nephritide vero est magis premens & tendens.

d Illa denique vix unquam sui curationem admittit, cum hæc, si ipsi iusta & matura methodo succurratur, percurari iterum possit.

2 Ab *Ischiadicis doloribus* externas magis musculosas partes afficientibus, qui in Nephritide magis sunt profundi, quamvis interdum dictu difficile sit, utrum dolores occurrentes sint Nephritici, an vero Rheumatico-Ischiadici.

#### III. Signa.

1 Dolores primo tendentes & prementes, & subleniori motu contusionis quasi sensum exhibentes, circa lumborum maxime regionem, vel in utroque latere, vel sæpissime in sinistro tantum latere, & quidem frequentius, sese exerentes.

2 Deinde subsequentes magis acuti, ardoris, inflammationis & lincinationis exquisitum sensum inferentes, cum anxia inquietudine.

3 Concurrentia primarum viarum vitia: appetitus prostratio, nausea, & quandoque actuales vomitus, cum torminibus ventris gravissimis.

4 Concomitantes febriles, ut plurimum motus, nimirum vel veri horrores, vel vagæ saltem horridulæ percussiones, cum succedente non tam æstu actuali, quam calore molestissimo acrem quandam ardorem conjunctum habentem.

5 Juncta præterea Agrypnia, Cephalalgia obtusa quasi, aut aliquantisper vertiginosa, siticulofitas, prostratio virium.

6 Alvus ut plurimum sicca, urina etiam parciore, tenuis, communiter cum frequenti mingendi desiderio, vel si obtusi magis sunt dolores circa renes, admodum crassa, filamentis quasi mucidis imbuta.

7 In nonnullis quoque vasorum spermaticorum ad testes procedentium consensuales dolores & tumores, vel etiam rigores & stupores femoris, cujuslatus affectum est.

#### IV. Subiectum.

1 Ætas juvenilis & virilis, habitus laxi, spongiosi, succulenti, temperamenti sanguinei sinceri vel prædominantis, hæmorrhoidum moliminibus, vel earundem suppressionibus, obnoxia.

2 Frequentius sexus virilis ob Hæmorrhoidum vitia, rarius sexus fœmininus, nisi Mensium ataxiis manifeste laboret.

3 Personæ in incondito rerum non-naturalium usu versantes, nimirum vini generosioris, Veneris libidinibus, morui fortiori per equitationem aut veteram insolitam addictæ, nec non

4 Diureticis & balsamicis fortioribus utentes.

5 Porro quæ Podagricis, Ischiadicis incommodis aut hæreditariam dispositionem e parentibus habent, in quo casu etiam infantes ab hoc malo divexari observantur, aut

6 Quæcunque ætas, vim externam in regione lumbari patiens.

#### V. Prognosis.

1 Inter omnes inflammationes internas Nephritis ferre pro levissima habenda est: cum, quia perfluens urina corruptionem inhibet & renes perpetuo abstergit, tum, quia rarissime uterque Ren, sed plerumque unus saltem, isque sinister inflammatione corripitur.

2 Quo frequentius tamen & acrius paroxysmi redeunt, eo plus



eo plus periculi minantur, & vel calculum renalem, vel ex ulcerationem renum, vel mictum cruentum, imprimis sub incongrua methodo, post se trahunt.

3 Quod si autem mature Nephritidi medicamentis congruis succurratur, non ita difficulter tollitur, imprimis, si nondum calculosa sit, utpote quæ difficillime curam admittit.

4 Sicuti Nephritides pro eventu quasi Arthritico-Ischiatico-Hæmorrhoidalium motuum & moliminum habendæ sunt, ita insigne emolumentum ex Hæmorrhoidum eruptionibus capiunt, secundum Hipp. Aphor. 11. Sec. 6. Nephriticis Hæmorrhoides supervenire bonum.

5 Juniores semper vehementius quam senes hoc affectu corripuntur, majoribus etiam præ his periculis sunt expositi, ob sanguinis turgescientiam, qua adhuc gaudent.

6 Quo copiosius calidiora diuretica in usum trahuntur, eo pertinacius affectus persistit, & eo tertius Calculus renalis, Hæctica, eundem comitari solent.

7 Motus sanguinis versus renes facile sequuntur Congestiones, Stagnationes, Stases inflammatoriæ, Apostemata, Ulcera, Calculi & Hæctica.

#### VI. Remedia.

1 Orgasum humorum ad Renes congestorum temperant atque demulcent Nitrosa in potu, potus item tepidus dilutus, leviter acidulatus, serum lactis, decoctum ex Scorzonera, hordeo C. C. Eboro, Gelatina C. C. Emulsionem, Ol. Amygd. dulc. cum Sperm. Ceti vel Manna exhibitum, decoctum Nephrit. Foresti, quod in omni Nephritide plus quam ulla alia præstat remedia. Externe vero Ungt. Dialth. Cerruss. refrig. Galeni &c.

2 Stasin inflammatoriam discutiunt & febriles motus efficaciter sublevant interne: Pulvis Antispasmod. bis vel ter per diem exhibitus, cum interposito 3 ii diaph. usu, Essent. quoque Alexiph. Stahlî aut Bezoard. Michael, vel Mixtura simplex mane in jusculo exhibenda; potiones Diapnoicæ, Sem. Card. Mariæ, vel in substantia, vel subemulsionis forma ordinandum. Externe sacculi sicci ex herba Chamom. Flor. Sambuc. Melilot. Sem. Anethi, Fœnu græc. Lini &c. Emplastr. Saponat. Barbette, Spir. Serpilli abstractitius & formicarum.

3 Congestionem inflammatoriam divertunt & spasticam fibrarum stricturam quodammodo leniunt clysteres oleosi, specificæ ex Veronica, Ol. Olivar. vel Chamom. & paucis Nitro. E longiquo, quamvis non tanta efficacia, subveniunt ligaturæ & frictiones extremarum partium, efficacissime autem hoc faciunt hirudines locis Hæmorrhoidalibus applicatæ, vel Venæsectio in pede celebrata, quæ tunc imprimis locum habent, quando malum admodum increbescit, & Ischuria jam præsto est, alias magis præservative in usum vocandæ sunt.

4 Tonum partis affectæ relaxatum restituunt in pristinum robur, Salia volatilia cum Tincturis alcalinis combinata, Liq. C. C. succinatus in magis Phlegmaticis.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis Antispasmodicus.

Rx. Nitr. depur. Cinnab. 3 ii 3 iij. M.  
Tart. Vitriol. 2. Cusp. culter. 2. vel 3. de  
S. C. ana. 3 j. die.

##### 2 Potio diapnoico-discutiens.

Rx. Aq. Scabios. Antimonii diaph. ana.  
Fl. Samb. 3 j.  
Cheref. ana. 3 j. Sang. Hirc. 3 ss.  
e Typh. Cerv. 3 ss. Syr. Fl. Bellid. 3 ss.  
Oc. 3. preparat. M. cochleatim exhibenda.

##### 3 Emulsio temperans.

Rx. Sem. Card. Mar. F. l. a. Emulsioedul.  
Mili Solis. Syr. dialth. Fern. 3vj.  
Amygd. dulc. exc. 3 ii. adde Mand. luc. pisc.  
cum Aq. Cheref. 3. diaph. ana. 3 ss.  
Card. Mar. 3 ii. 3vj. M. cochleatim assumenda.

##### 4 Decoctum Foresti.

Rx. Sem. Alb. Sebesten. num. vij.  
Malv. ana. 3 ij. 3 iij. Rad. liquorit. ras. 3vj.  
Cicer. rubr. 3 iij. Coque in Aq. simpl. lb. iij.  
4. frig. maj. ana. 3 ij. ad dimidiæ partis consumptionem,  
Hod. mund. 3 ij. Colat. det. sæpius calide.  
Caric. ping. num. viij.

##### 5 Unguentum mitigans.

Rx. Ungt. de Alb. Applicetur regioni renum  
Anodyn. ana. 3vj. calide, quod tamen magis  
Ol. Scorpion. in Nephritide calculosa prodest.  
Petro. ana. 3 j. M.

##### 6 Sacculus discutiens.

Rx. Herb. Chamom. Sem. Lin.  
Matricar. 3. Mj. Aneth. ana. 3 j.  
Fl. Melilot. Incis. contus. includ. Saccul.  
Sambuc. ana. Mss. applic. calide.

#### VII. Methodus medendi.

1 Turgescentia sanguinis & spastica solidarum partium strictura temperanda atque delinienda est interne per antispasmodica, diapnoica, diluentia, lubricantia perite sibi invicem subordinata, clysteres ano immixtas & aliquoties repetitas. Externe vero in casu necessitatis per applicatas hirudines, aut vicarias ventilationes sanguinis in pede celebratas.

2 Stagnatio in renibus facta, resolvenda atque discutienda est, ne calculus renalis vel ulceratio contingat, quod quidem partim per solventia, Mand. luc. pisc. Sperm. Ceti, Sang. Hirci, Sem. Card. Mar. Ess. Alexipharm. Stahlî, partim per Diaphoretica fixa obtinetur, non neglectis externis discutientibus.

3 Affluxus humorum impediatur per externam applicationem Emplastr. Saponat. Barbette, & Ungt. Comitissæ, nec non frictiones & ligaturas.

4 Tandem post paroxysmum mitigatum conveniunt tonica, Moderatis dosibus & in vehiculis convenientibus assumta.

5 Subjungendum deinde colophonis loco laxans Rhabbarbarinum, vel Mannatum, ut renes ab omnibus corruptelis forsan relictis repurgentur.

6 Imo præstat renum ulceri & calculorum proventui, Nephriticis recursibus admodum familiari, occurrere per vulneraria & consolidantia leniora, Heder. Terr. Lanium Plinii, Veron. Virg. aur. Gesneri, Scabios. singulis mane in forma Thee usurpanda.

7 Præservative vero Venæsectio in pede vel scarificationes, aut adhuc efficacius hirudines uum habent eximium, singulis Æquinoctiis in usum vocatæ.

8 Alvi præterea successus semper est observandus, & ab equitatione, nimia vectura & Veneris abusu, nec non cibis aromaticis & vino generosiori cessandum.

#### VIII. Cautela Practica.

1 Sanguinis ventilationes præservative semper majorem exorunt utilitatem, quam curative celebratæ; quod si tamen necessitas prius indicare videbitur, eandem omittere haud conveniet.

2 Nimirum, ubi insignis adest turgescentia & consuetudo evacuationum artificialium, ibi commode in paroxysmo, & quidem in pede, poterit institui.

3 Omnes acres & calidæ medicationes sanguinem nimium commoventes incommoda, quin pericula pariunt; pejora vero sunt hodie usitata diuretica, maxime oleosa, Ol. destill. Terebinth. Pini, Junip. Succin. Spir. Tartari empyreumaticus, Spir. Nitri simplex & Clyssiformis, imo etiam dulcificatus sub largiori usu, Millepedes, raphanus rusticus, baccæ juniperi, alkekengi, arill. Cynosb. Amygd. amar. in sensibilibus etiam Aq. fragor. petroselin. &c.

4 Salia volatilia & imprimis oleosa sanguinem insigniter turgesciunt, & inflammationum dolores adaugent; unde in augmento & statu morbi eadem vitare oportet; in declinatione autem mali priora ad tonum roborandum haud sunt spernenda.

5 Refrigerantia atque adstringentia externe imposita, stasin Inflammatoriam sæpiissime magis adaugent, unde eorum loco lenia discutientia & paregorica in saccu-



- sacculis vel sicca, vel in vino coquenda, applicari possunt.
- 6 Emplastica etiam non semper tuta sunt, quia poros obstruunt, & discussionem remorantur; emplastrum tamen saponatum Barbette præsentis est effectus, cum hac cautela, ne ultra 12. horas in lumbis relinquantur; alias tumor testium succedit.
- 7 Camphora in omnibus quidem aliis inflammationibus externe usum habet haud contemnendum; ast in Nephritide obstimulantem diureticum effectum præstat illius usui superfedere, nisi forsan cum refrigerantibus velimus combinare.
- 8 Purgantia fortiora pro referenda alvo in usum vocata, malum exasperant: unde res potius per clysteres, lubricantia, diluentia & nitrosa est peragenda.
- 9 Primarum viarum oneratio, ob singularem harum cum renibus consensum, Nephritidi admodum noxia est; omnia igitur dyspepta, flatulenta, legumino-fa, casei usus nimius, carnes induratae, pisces duriores exulent; concedi vero potest vini & aromatum usus Medicus, i. e. parvus, pro meliori ciborum digestionem.
- 10 Diuretica quoque culinaria, nimium petroselinum, asparagus, apium, ciceres rubri, Cepæ, allium, raphanaceum, ob effectum stimulantem evitentur.
- 11 Lamium Plinii in forma Thee usurpatum, eximium quibusdam præstitisse usum, scimus.
- 12 Alias fere omnia, quæ in pectoris vitiis profunt, & in Nephritide habere usum, constat.
- 13 Excipiendus tamen hic est motus corporis, imprimis per vecturam aut equitatem, utpote qui Nephriticis haud adeo salutaris esse quotidie observatur.

## CAPUT DECIMUM.

## De Inflammatione Uteri.

**Definitio.** Uteri inflammatio est febris inflammatoria gravissima, vel a stasi sanguinis in venis Uterinis retenti, vel a graviore Uteris vulnere ortum habens.

## I. Differentia.

- 1 *Ratione loci* inflammati: vel enim inflammatio *col- lum* tantum Uteri occupat, ubi dolor & ardor in lumborum regione magis percipitur. Vel totum Uteri *fundum* tenet, ubi dolor & ardor paulo infra umbilicum urget cum tumore ipsius Uteri, contactum non bene ferente; Symptomata etiam graviora concurrunt, nimirum respiratio difficilis, dolores acerbiores ad superiora etiam sese extendentes, febris admodum acuta, cum communibus eandem comitantibus symptomatibus.
- 2 Distinguenda etiam inflammatio Uteri est a *doloribus post partum* acerbioribus; hi enim inferunt sensum lancinantem & distendentem absque ulla febre, vel saltem leviori concurrente: Illa vero conjunctos habet dolores ardentes & pulsatiles & febrem satis sensibilem.

## Signa.

- 1 Febris acuta cum exquisitissimo dolore urente & pulsatorio in regione pubis, lumborum & locorum muliebrium sese exerente.
- 2 Os Uteri clausum, atque digitis contactum, ardoris sensum imprimens.
- 3 Tumor & distensio circa Uteri regionem quandoque apparens, cum gravitate quadam locorum muliebrium conjuncta.
- 4 Tumor & extensio abdominis sensim crescens, cui interdum jungitur inflatio mammarum earumque dolor.
- 5 Pulsus frequens & parvus, cum cephalalgia, siti, siccitate oris.
- 6 Respiratio quandoque difficilis cum exacerbato dolore, ad dorsum & scapulas usque sese extendente, imprimis quando totus Uteri fundus inflammatus est.

- 7 Non raro etiam urinæ & sæcum alvinarum immutationes & suppressiones.
- 8 Lochiorum suppressio & effluxus feri corrupti ex Uteri vagina.
- 9 Suffocatio interdum imminens.
- 10 Hisce accedit nonnunquam febris Lipyria.

## IV. Subjectum.

- 1 Plethoricæ puerperæ in suppressionem lochiorum incidentes.
- 2 Puerperæ aeri frigidiori se exponentes & animi affectibus gravioribus indulgentes.
- 3 Quibus dolores post partum per opiata & narcotica tam externa, quam interna sopiuntur.
- 4 Quibus lochia nimia credita, per adstringentia suppressa fuerunt.
- 5 Vulnerationem Uteri ex laboriosiori partu, aut ab aliis causis violentis, reportantes.

## V. Prognosis.

- 1 Inflammatio totum Uterum occupans, periculosissima est, facileque exanthematicum quid format, sive purpuram post se trahit.
- 2 Minoris periculi censetur, quæ in collo uteri tantum fit.
- 3 Discussio hujus inflammationis semper præferenda est suppurationi.
- 4 Suppuratio Uteri facile in ulcera sordida ac chronica, Hæticam vel Hydropem invitantia degenerat.
- 5 Inflammatio interdum in scirrhum abit, quem Hydrops sequitur. Scirrhus talis dignoscitur, si remittente dolore, ardore, aliisque ordinariis symptomatibus remittentibus, tumor & inflatio abdominis tactui renitens, cum gravitate hypogastrii ac crurum impotentia remanet.
- 6 Effluxus ichoris ex flavo viridiscentis & fetidi, remanentibus reliquis febris inflammatoriae symptomatibus, imo per momenta incrementa capientibus, ut plurimum funestus est.
- 7 Quo magis Lochiorum excretio est impedita, eo magis & inflammatio & periculum incrementa sumunt.
- 8 Urinæ tenues & albæ perniciem minantur.
- 9 Quo major respirationis angustia, sitis, cephalalgia concurret, eo magis de ægrota remedium est.
- 10 Succedentes rigores cum intensissimo interno æstu, animi deliquiis, sudoribus frigidis, necrosin affectæ partis indicant.

## VI. Remedia.

- 1 Sanguinis affluxum derivantia & imminuentia: Venæsectio in pede, clysteres lenientes.
- 2 Expurgationem uteri respicientia: Pil. Balsam. Stahliani, Polychr. Hall. Beccheri, Balf. Viscer. Argentinens.
- 3 Stasin discutientia & resolventia: Aquæ diapnoicæ, diaphoretica fixa. Oc.  $\mathfrak{z}$  præparat. Mandib. luc. pisc. Sang. Hirci, Sperm. Ceti, Tart. Vitriolat. Arcan. duplic. & imprimis Pulv. Solar. Hallens. Externe Epithemata discutientia ex Rad. ir. Flor. Sigill. Salom. Herb. Chamom. Matricar. Flor. Sambuc. Melilot. Sem. Lini, Anethi, Fœnic. Camph. Spir. Vin. Camphor.
- 4 Æstum sanguinis temperantia, tum dicta abforbentia, tum Nitrosa cum sufficiente potu diluente, Emulsiva.
- 5 Motum partium solidarum moderantia, & dolores mitigantia: Cinnabarina & correctæ anodyna e.g. Essent. Dulc. Hallens.

## Formula Remediorum.

## 1 Potio diapnoico-resolvens.

Rx. Aq. Chares. *Ammonii diaph. ana.*  
Fl. Samb. *℥ij.*  
Card. Mar. ana.  $\mathfrak{z}$ j. *Sang. Hirci ℥j.*  
C. C. Citr.  $\mathfrak{z}$ ss. *Tab. M. X. simpl.  $\mathfrak{z}$ ij.*  
Oc.  $\mathfrak{z}$ ss. præparat. *Cochleatim propinanda.*

## 2 Mixtura resolvens.

Rx. Ol. Amygd. dulc. rec. *Tribus vicibus calide assu-*  
 $\mathfrak{z}$ j. *menda.*  
Sperm. Cet. rec.  $\mathfrak{z}$ j. M.

## 3 Emul-



3 Emulſio cardiaco reſolvens.

℞. Amygd. dalc. exc.	Syr. dialth. Fern. ꝯss. adde
Sem. Card. Mar. ana.	Aq. Cinamom. ʒvj.
℥iij.	Mandib. luc. pisc. præp.
C. decoct. C. C. ʒvj.	Antimon. Diaph. ana. ʒj.
F. l. a. Emuls. edulcor.	M. coctileatim assumenda.

4 Pulvis Anodyno-temperans.

R. Oc. 50. preparat.  
Antimon. diaph.  
Tart. Vitriolat.  
Nitr. depur. ana. ℥j.

Cinnab. Antimon. gr. xv.  
Mass. Pil. de Cynogl. gr. v.  
M. exacte div. in 5. p. aequal.  
versus noctem dosis una.

5 *Epithema discutiens*.

*R. Fl. Chamom.*      *Fœnic. ana.* ℥ss.  
*Sambuc.*      *Camph.* ℥ss.  
*Melilot. ana. mj.*      *Inci s. contus. regioni Uteri*  
*Sem. anethi.*      *in sacculis applicandum.*

VII. *Methodus medendi.*

1. Quando ex retentione Lochiorum malum originem habuit, optime curæ initium, si res adhuc sit in principio, fit per Venæsectionem in pede, ut sic restagnatio sanguinis imminuatur; in illo tamen casu locum haud habet, quando in prægressa vulneratione graviore Uteri jam multum sanguinis est effusum.
2. Pro impediendo inflammationis augmento, injiciendus est unus atque alter clyster leniens, toties repetendus, quoties circumstantiæ suaserint.
3. Imprimis ad Lochiorum etiam successum respiciendum est, ut, si possibile, suppressa ad excretionem iterum instigentur: quod quidem securius nil præstat quam Pilul. Stahlian, Becher. Balsam. Visceral. Argent. quæ per aliquot dies mane aut vesperi ad gr. xv. exhiberi possunt.
4. Eodem tamen tempore & restagnatio sanguinis & febris concurrens, resolvenda & moderanda est, partim per res solventes, partim per absorbentes, Diaphoretica & Nitrosa, quæ vel combinari, vel sibi invicem dextre subjungi possunt, interposito semper & Emulsionum & sufficientis potus diluentis & refrigerantis usu.
5. Dolorum ferocia per granum unum vel alterum MPil. e Cynogl. vel Theriac. Cœl. pulveribus diaphoretico-absorbentibus additum, versus noctem ordinatum mitigatur, quam quidem mitigationem & Cinnabaris Antimonii vel nativa idque securius, quamvis non tam sensibiliter præstat.
6. Viribus quoque, imprimis si malum a vulneratione ortum habuerit, est prospiciendum per analeptica, imprimis Essent. Dulc. Concentrat. Hallens. & juscula Vitulina & Gallinacea tenuiora.

VIII. *Cautelæ Practicæ.*

- 1 Venæsectio locum non habet, quando inflammatio jam ultra 3. vel 4 dies subsistit.
- 2 Imprimis vero in illo casu est evitanda, quando aliquid Exanthematici concurrit.
- 3 Si acida præscribuntur, cavendum ne emulsiones statim subordinentur, alias facile in stomacho coagulantur, & molestiam eidem creant.
- 4 Ad promovenda lochia calidiora medicamenta imprimis Myrrhata, Aloetica, Castorina, Succinata, Salia Volatilia, Elixiria Uterina, &c. haud sunt præscribenda; inflammatio enim exinde augmenta capit.
- 5 Clysteres ordinati non sint acriores aut stimulantiores, neque plus quam opus est injiciantur, nediarrhœa puerperis plerumque admodum periculosa, exinde originem habeat.

S E C T I O IV.

## D E

INFARCTIBUS, SCIRRHIS & EXUL-  
CERATIONIBUS VISCERUM.

C A P U T. P R I M U M.

*De Infartibus, Scirrhis & Exulcerationibus  
Viscerum in genere.*

I. *Definitio.*

- 1 *Infarctus* sunt inflationes viscerum a sanguine , ab hujus nimio impulsu congestorio originem trahentes .
- 2 *Scirrhi* sunt indurationes viscerum , a nimio sanguinis infarctu & diuturna stagnatione dependentes .
- 3 *Exulcerationes* vero sunt viscerum corruptiones vel partiales, vel totales quoque, Inflammationes graves vel Scirrhus excipientes .

## II. *Differentia.*

- 1 Respectu *loci affecti*, alii horum affectuum occurrunt in hepate, alii in liene, alii in pulmonibus, alii in renibus &c.
- 2 Respectu *causae morbosae*, alii a sanguine puro, alii ab humoribus aliis sanguini admixtis, plus vel minus ad motum progressivum ineptus originem trahunt.
- 3 Respectu *durationis*, alii sunt recentes, alii inveterati.
- 4 Respectu *affectuum progressorum*, alii a simplici, aut diuturna congestione originem habent, alii vero affectus chronicos sequuntur.

### III. *Signa.*

a Infarctum.

- 1 Opletiones viscerum, ægrotis & Medicis sensibiles.
- 2 Tensiones & pressiones, plus vel minus pro diversitate locorum affectorum dolorificæ.
- 3 Languor universalis corporis major vel minor.
- 4 Actionum vitalium sensibilis remissio, appetitus prostratus, sitis vel nulla vel aucta.
- 5 Pulsus a naturali statu deflectens, inæqualis palpitatorius &c.
- 6 Respirandi difficultas, imprimis post motum corporis, aut ascensum per acclivia.
- 7 Excretiones alvi, sudoris, urinæ &c. turbatæ.
- 8 Somnus frequenter interruptus & insomniis anxius turbatus.
- 9 Congestiones frequentiores ad certas partes progressæ.

*b Scirrborum.*

- 1 Signa jam recensita præcedentia conjuncta , se  
in majori gradu.
- 2 Notabilis durities tactui renitens in certis par  
tibus.
- 3 Tumor oculis & tactui sensibilis.
- 4 Dolor obtusus pressorius in parte affecta.
- 5 Respirandi difficultas cum tussi vehementi sicca  
chronica.
- 6 Calor hæcticus, cum consumptione corporis.
- 7 Anxietates & angustia præcordiorum.
- 8 Interdum habitus corporis cachecticus, œdema  
ta pedum.

c Exulcerationum.

- 1 Dolor plus vel minus sensibilis in parte affecta.
- 2 Febris hectica ab initio mitis satis, postmodum vero sensim increbescens.
- 3 Excretiones purulentæ.
- 4 Pulsus inæqualis.
- 5 Interdum respirandi difficultates.
- 6 Insigne tædium omnium rerum & ad iram propensivitas.



- 7 Succedentes sudores & diarrhœæ colliquativæ.  
8 Signorum antecedentium multa & alia inferius in tractatione speciali recensenda.

## IV. Subjectum.

- 1 Homines ut plurimum adulti sanguinei, aut sanguineo-Melancholici; Plethorici, Hæmorrhagiarum spontanearum suppressiones experti.
- 2 Personæ consuetas sanguinis artificiales evacuationes negligentes.
- 3 Otio, iracundiæ & intemperantiæ dediti.
- 4 Veneri nimium indulgentes.
- 5 Corpus calidum aeri frigido exponentes.
- 6 Frigidum potum corpore exæstuante in nimia quantitate assumentes.
- 7 Hypochondriaci & feminæ Histericæ.
- 8 Homines febres quartanas chronicas experti.
- 9 Hæreditariam dispositionem ad hosce affectus habentes.
- 10 Injurias externas & viscerum læsiones passi.

## V. Prognosis.

## a Infarctuum.

- 1 Infarctus recentiores longe felicius curantur, quam inveterati & chronicos morbos secuti.
- 2 Longe quoque difficilius curantur scirrhi, ab adstringentium utu in febribus chronicis orti, quam qui a simplici sanguinis congestione originem trahunt.
- 3 Infarctus facile transeunt vel in inflammationes, vel in scirrhos, si in principio negligantur.
- 4 Infarctus in Melancholicis difficilioris sunt curationis, quam in sanguineis.

## b Scirrhorum.

- 1 Omnes Scirrhi difficulter curantur, imprimis vero inveterati.
- 2 Scirrhi licet in principio nullum ingens periculum inferant, facile tamen in posterum Exulcerationes & Hæcticas febres post se trahunt.
- 3 Scirrhi Pulmonum & Hepatis majus periculum minantur, quam quidem Scirrhi Lienis.
- 4 Scirrhos sæpius excipit Icterus niger incurabilis.
- 5 Si Scirrhos Hæctica non sequitur, Cachexiam tamen & Hydropem producant.

## c Exulcerationum.

- 1 Quo graviores & profundiores viscerum sunt exulcerationes, eo magis etiam de restitutione desperandum.
- 2 Graviores tales exulcerationes neque Natura, neque ars refarcire potest.
- 3 Quo magis invalescunt febres Hæcticæ exulcerationibus junctæ, eo citius etiam ad mortem properant ægroti.
- 4 Sudores & diarrhœæ colliquativæ morbis hisce supervenientes, mortem præ foribus esse indicant.
- 5 Renum exulcerationes facilius ferunt ægrotantes, quam reliquorum viscerum labem.

## I. Remedia.

## a Contra infarctus viscerum.

- 1 Sanguinem abundantem evacuantia & a visceribus infarctis revellentia, Venæsectio in pede, scarificationes partium inferiorum, hirudines.
- 2 Viscera obstructa referentia, aperientia & sanguinem stagnantem resolventia & discutientia: Rad. Gentian. Ari, Cichorii, Tarax. Pimpin. albæ, Helenii, Vincetox. Bardan. &c. Herb. Cent. min. Card. Bened. Fumar. Absinth. Marrub. Hyssop. Chæref. Cochlear. &c. Gumm. Sagapen. Ammoniac. Pil. Beccher. Stahl. Balsam. Viscer. nobis familiares, Tartar. Bontii, Schrœd. &c. Essentiæ ex antedictis amaris paratæ & Tinct. Antimonii acri aut Tart. junctæ. Salia neutra: Tart. Vitriol. Arcan. dupl. Tart. Solubil. Pulveres Solares Richt. Externe Emplastr. Splenet. de Cicut. Hyoscyam. Sperm. Ceti, Diaphor. Myns. de Ammoniac. &c.
- 3 Sordes primarum viarum ac materiam correctam evacuantia scil. clysteres, Infusa laxantia ex Helleb. nigr. Pilulæ ex gummatibus paratæ &c.
- 4 Viscera debilitata roborantia & infarctus recidivam præcaventia, præter scil. antea recensita

amara, Rad. Caryoph. fragar. Rub. Tinct. Herb. Agrimon. Scolopendr. Flor. Spic. Rosar. rubr. Tinct. Vitriol. & is Tartaris. Ludovici &c.

## b Contra Scirrhus Viscerum.

- 1 Sanguinem in statu Plethorico imminuentia, Venæsectio, scarificatio & hirudinum applicatio.
- 2 Antea recensita remedia resolventia & sanguinem cacoehymicum corrigentia.
- 3 Humores superfluos evacuantia: Infusa laxantia, Pilulæ &c.
- 4 Externa emollientia & resolventia: Emplastr. de Melilot. de Ammoniac. de Cicut. &c.
- 5 Ac tandem discussa & resoluta materia morbifica, Remedia tonica, Martialia &c.

## c Contra Exulcerationes Viscerum.

- 1 Lenia laxantia & sordes primarum viarum abstergentia, Manna, Folia Sennæ, Tamarindi, Rhabarbarum; Merc. dulcis rite usurpatus.
- 2 Viscera ulcerata abstergentia & mundificantia, ac simul massam sanguineam depurantia: Herb. Hyssop. Bellid. Marrub. albi, Virg. Aur. Scabios. Rad. Pimpin. alb. Vincetox. Bryon. Ari, Aristol. Gumm. Ammoniac. &c.
- 3 Consolidationem promoventia Balsamica & Adstringentia: Balf. Peruv. de Copaiba, Gumm. Sarcocoll. Oliban. Terebinth. cocta Herb. Sanic. Pyrol. Veron. Heder. Terr. Hyperic. Millefol. Costæ, Extract. Hyperic. &c.

## Formula Remediorum ad Infarctus

## Scirrhus.

## 1 Infusum incidens &amp; resolvens.

Rx. Rad. Gentian. Bellid. ana. p. ij.  
Cichor. Cort. Aurant.  
Pimp. alb. Citr.  
Bardan. ana. Zij. Tart. Solub. ana. Zij.  
Herb. Cent. min. Incis. infunde in Vin. alb.  
Marrub. ana. mj. Mj. seu ℥. iv. dosi haur.  
Flor. Stæch. Arab. sus.

## 2 Infusum incidens &amp; laxans.

Rx. Rad. Brion. Rhab. elect.  
Gentian. Fibr. Helleb. nigr. ana. Zij.  
Enula. Corr. Citr. Zij.  
Taraxac. ana. Zij. Winteran. Zifs.  
Ari. Zij. Tart. Solub. Zij.  
Herb. fumar. Sal. Absinth. Zij.  
Card. Ben. aa. mls. Incis. inf. in Vin. alb. ℥. iv.  
Fol. Senn. O. s. st. Zij. sumantur quotidie 3vj. mane.

## 3 Pilulæ aperientes &amp; laxantes.

Rx. Pilul. Tartar. Bontii Zij. Rx. Pil. Bals. Viscer. Zij.  
Pilul. de Ammoniac. Dosis de hisce 15. vel 20.  
Querc. Zij. singulis diebus mane vel vesp.  
Rx. Pil. Beccheri Zij.

## 4 Essentia roborans &amp; Tonica.

Rx. Tinct. Antimonii Ess. Pimpin. alb.  
acr. Spir. C.C. ana. Zij.

## 5 Alia.

℥. Tinct. & is Ludov. Zifs. M. gutt. 30. 40. bis vel ter  
Ess. amar. Hall. Zij. per diem.

## Formula contra Exulcerationes.

## 6 Potio laxans.

Rx. Decoct. Fl. & fr. Crystall. Tart. Zifs.  
Zij. mane in eo dissolve  
in quo fervente infunde Mann. elect. Zifs. D.  
Rhab. elect. Zij. Colat. calide pro una vice.

## 7 Alia.

Rx. Tamarind. Zifs. in colat. dissolve  
Coq. in s. q. Aq. Mann. el. Zifs.  
simpl. Colat. detur calide.

## 8 Infusum Absterg. &amp; consolidans.

Rx. Herb. Hyssop. Rad. Vincetox.  
Marrub. Pimp. alb.  
Scabios. Bryon. ana. Zifs.  
Virg. Aur. ana. mj. Incis. ad Chartam.



- 9 Aliud.
- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| R. Herb. Sanic.         | Rad. Bistort.                  |
| Pyrol.                  | Torment. ana. Zij.             |
| Millefol.               | Incis. d. ad Ch. specierum ha- |
| Veron.                  | rum man. ij. infunde in a-     |
| Hed. Terrest.           | qua fervent. ℥. ij. bulliant   |
| Sumit. Hyperici ā. mls. | leniter.                       |
- 10 Tinctura Abstergens.
- R. Tinct. Antimonii Zij. Eff. succin. Zij. M.
- 11 Tinctura mundific. & consolidans.
- R. Tinct. Antimonii acris Bals. Peruv. ana. Dij. M.
- Zij. Dosis utriusque est a guttis
20. ad 25.
- Eff. Succin.

# VII. Methodus medendi.

## a In Infarctu Viscerum.

- 1 Venæsectio in hoc casu optimum semper est remedium, præsertim in subjectis Plethoricis, Hæmorrhagiis, Venæsectionibus & Scarificationibus assuetis, & hinc hæcce reliquis præmitti potest remediis, postea vero Scarificationes, ubi necessitas eas requirit, subjungantur in partibus inferioribus; aut in Hæmorrhoidariis hirudines ano applicentur.
- 2 Facta sufficienti revulsione & Plethoræ imminutione, opera danda est, ut spissius & stagnans sanguis resolvatur, & discutiatur convenientibus remediis, infusis scil. radicum & herbarum cum vino, Pilulis ex Gummatibus paratis ac Essentiis incidentibus.
- 3 Quoniam vero in præcedente sanguis stagnatione multæ partes ineptæ & inutiles redditæ fuerunt, hisce incidentibus vel jungantur, vel subjungantur remedia per epicrasin laxantia.
- 4 Tandem visceribus, antea infarctis & hinc debilitatis, prospiciatur per remedia roborantia & tonica.

## b In Scirrhis Viscerum.

- 1 Profunt eadem sanguinis imminutiones in subjectis dispositis.
- 2 Quibus subungi debent resolventia & per epicrasin evacuantia.
- 3 Ut Scirrhi eo melius resolvantur, externe imponantur emplastra v. g. de Cicuta, Hyoscyam. Melilot. &c. cum ol. Chærefol. malaxata.
- 4 Tonus partium debilitatarum restituatur quantum fieri potest per remedia tonica, virtutem simul incidentem & abstergentem possidentia, inter quæ potissimum eminet Mixtura tonica Stahlii &c.

## c In Exulcerationibus Viscerum.

- 1 Laxantia ceteris remediis præmittantur, ut hoc modo non solum fordes primarum viarum abstergantur, sed etiam uberius humorum vitiosorum ad partem affectam affluxus intercipiatur.
- 1 Postea exhibeantur abstergentia & mundificantia, eaque diu continuentur.
- 3 Ac tandem progressus fiat ad consolidantia, pariter diu usurpanda.

# VIII. Cautelæ Practicæ.

## a In Infarctu Viscerum.

- 1 Nisi evacuationes sanguinis in satis larga quantitate instituantur, nunquam sufficiens fit revulsio, & hinc etiam parum profunt.
- 2 Hirudines nunquam applicentur, nisi præmissa sit Venæsectio revulsoria.
- 3 Omnia remedia incidentia semper diu continuanda sunt, alias nullus inde sperandus est laudabilis effectus.
- 4 Purgantia fortiora actu semper hic nocent, & quamvis vomitoria interdum sensibile levamen afferant, malum tamen facile recurrit, quoniam per tales fortiores motus viscera magis debilitantur.
- 5 Tonica remedia nunquam exhibeantur, nisi sufficiens præcesserit evacuatio & discussio, ac tumor visceris disparuerit cum symptomatibus ab eo provenientibus.

## b In Scirrhis Viscerum.

- 1 Eadem cautelæ locum habent, remedia tamen

omnia diutius hic continuari debent, quam in Infarctibus.

- 2 Nisi in utroque casu diætæ exacte observetur, & motus sufficiens continuatus remediis jungatur, vix sperandus est laudabilis effectus. Ceteris motuum speciebus merito præfertur equitatio & ventura.

## c In Exulcerationibus Viscerum.

- 1 Omnia drastica purgantia & acria in hoc casu cane & angue pejus sunt fugienda.
- 2 Abstergentia & mundificantia fortiora, ut & balsamica acriora, myrrhata, aloetica, camphorata &c. nimiam ebullitionem humorum excitant, & hinc positive nocent.
- 3 Nunquam adstringentia & traumatica usurpentur, nisi diuturnus mitiorum abstergentium usus præcesserit.
- 4 Motus fortior, animi pathemata graviora, diætæ calida aromatica, vini & Veneris abusus, in hoc casu venena sunt.

# CAPUT SECUNDUM.

## De Infarctu Pulmonum.

- I. **Definitio.** Infarctus Pulmonum est nimia eorum oppletio, a sanguinis congestione ejusque spissitudine ortum trahens, cum insigni spirandi difficultate conjuncta.

## II. Differentia

### 1 Ab Asthmate.

- 1 In quo respiratio fit cum sibilo ac tussis simul jungitur, quæ utraque in hoc affectu desunt, imo respiratio in hoc longe est difficilior quam in Asthmate.
- 2 Respectu reliquorum Symptomatum huic affectui familiarium, quæ in Asthmate non reperiuntur.
- 3 A Congestione, quæ ad paucum tantum tempus extenditur, & sine insigni sanguinis spissitudine est, cum e contra Infarctus diutius duret, & sanguinem spissorem conjunctum habeat.

## III. Signa.

- 1 Respiratio admodum difficilis, laboriosa & frequens cum suffocationis metu, sine tussi.
- 2 Palpitationes cordis frequentes, respirandi difficultati junctæ, sub motu corporis incrementum capientes.
- 3 Facies rubicunda, inflata, vasa turgida in collo præcipue & lacrymæ interdum involuntariæ.
- 4 Stupor capitis cum vertigine.
- 5 Partium inferiorum strictura cum vasorum detumescencia & frequentibus horroribus.
- 6 Spasticæ stricturæ in hypochondriis & cardialgicis pathematibus frequentibus.
- 7 Alvi siccitas & urina tenuis ac pauca.
- 8 Insignis lassitudo totius corporis & impotentia ad motum.

## IV. Subjectum.

- 1 Homines sanguinei, Sanguineo-Cholericis Plethorici, Juvenes & Viri Hæmorrhagias alias passi.
- 2 Feminae mensium ataxiis laborantes.
- 3 Hæmorrhoidarii post suppressionem Hæmorrhoidum, aut quibus molimina ad Hæmorrhoides subito cessarunt.
- 4 Qui frequentes congestiones ad pectus passi sunt.
- 5 Qui Venæsectiones & Scarificationes consuetas neglexerunt.
- 6 Vitæ sedentariæ dediti, & sanguinis spissitudine laborantes.
- 7 Homines sudoribus spontaneis matutinis assueti, post eorum vel suppressionem, vel cessationem.

## V. Prognosis.

- 1 Infarctus pulmonum invalescens, suffocationem facile post se trahit.
- 2 Huncce infarctum sequuntur etiam tubercula, sive nodi Scirrhi pulmonum, Phthisin minitantes.
- 3 Si sanguis in pulmonibus stagnans corrumpitur, vel gra-



graves Peripneumoniæ, vel pulmonum exulcerationes exinde oriuntur.

Nascuntur quoque exinde Asthmata variis generis, tam convulsiva, quam humida.

### Remedia.

1. Causam antecedentem sive Plethoram removentia, Venæsectio in pede & urgente necessitate in brachio, scarificationes repetitæ in partibus inferioribus, hirudinum applicatio.
2. Sanguinem spissum resolventia, incidentia & discutientia: Rad. Pimp. alb. Vincetox. Helen. Irid. Flor. Ari. Herb. Chæref. Hyssop. Marrub. Gummata & Pilul. ex illis paratæ.
3. Evacuantia, derivantia, æqualem motum sanguinis producentia & affluxum humorum ad pectus intercipientia, Purgantia scil. incidentibus juncta, diaphoretica, diuretica, pediluvia, vesicatoria furis applicata, clysteres emollientes & acres &c.
4. Partem affectam roborantia, Mixtura tonico-nervina, Infusa ex herbis pectoralibus, discutientibus & leniter adstringentibus: Herb. Hyssop. Marrub. Virg. Aur. Veron. Scabios. Heder. Terrestr. Pyrol. Sanic. Rad. Pimpin. &c. parata.

### Formule Remediorum.

#### 1 Infusum incidens & discutiens.

R. Rad. Pimpin. alb. Bellid. c. flor. ana. mfs.  
Vincetox. Enul. Sem. Anis.  
Irid. Flor. ana. ʒss. Fœnic. ana. ʒiij.  
Herb. Hyssop. Incis. & contus. Infunde in  
Scabios. Ag. ferventis lb. ij. specier.  
Pulmon. macul. m. ij. bulliant leniter & Colatura  
Costæ. rura sæpius bibatur calide.

#### 2 Tinctura incidens & resolvens.

R. Tinct. ʒii acris ʒij. ana. ʒj.  
Ess. Alexiph. M. dosi 30. gutt. 2. vel 3. per  
Adianth. alb. diem.

#### 3 Alia.

R. Tinct. Tart. Succin. ʒj.  
Ess. Pimpin. alb. ana. ʒij. M. dosi ut supra.

#### 4 Vinum Medicatum.

R. Rad. Pimpin. alb. Fol. Senn. s. st. ʒj.  
Vincetox. Fibr. Rad. Hell. nigr. ʒiij.  
Cichor. Sem. Anis.  
Gentian. ana. ʒij. Fœnic.  
Herb. Marrub. Tart. Solub. ana. ʒij.  
Hyssop. ana. mfs. Incisa & contusa infunde  
Flor. Bellid. Vin. alb. lb. iv. vel vj. &  
Cichor. bibantur singul. dieb. mane  
Stech. Arab. ʒā. p. ij. ʒvj. vel ʒvii.

#### 5 Aliud.

R. Rad. Enul. Rhab. elect. ʒij.  
Taraxac. ana. ʒiij. Cort. Aurant. ʒiij.  
Zedoar. winteran.  
Ari. ana. ʒj. Cinnam. acut. ana. ʒj.  
Summit. cent. min. Tart. Solub. ʒss.  
Herb. Bellid. c. flor. ʒ. mj. M. d. ad Ch. Infusio & dosi  
Fol. Senn. s. stip. ʒvj. ut antea.  
Fibr. Helleb. nigr. ʒss.

#### 6 Bolus laxans.

R. Cons. flor. Persic. Resin. Jalapp. gr. iv.  
ʒij. Syr. Rosar. solut. q. s.  
Mercur. dulc. gr. xv. M. fiat Bolus.

#### 6 Pilulæ incidentes & laxantes.

R. MP. Balsam. Visceral. Ess. Alexiph. q. s.  
ʒj. M. f. Pil. ad gr. j. dosi num.  
Extract. Hell. nigr. ʒss. 15. vel 20.

#### 8 Potio diaphnetico-diuretica.

R. Ag. Chæref. Sal. Genist.  
Scabios. ana. ʒij. Matr. perl. præp. ana. ʒj.  
ʒ. diaph. ʒss. Syr. flor. Bellid. ʒss.  
Tart. Vitriolat. M. cochleat. sæpius sumenda.

#### 9 Alia.

R. Ag. Hyssop. Arcan. duplic. ana. ʒj.  
Card. Bened. ʒā. ʒij. Cinnab. ʒii ʒss.  
Lap. perlat. præparat. Sacch. perlat. ʒij.  
Bezoard. miner. M. ut supra.  
Sal. Absinth.

10 Tinctura discutiens & roborans.

R. Tinct. Antimonii Spir. C. C. ana. ʒiss.  
acris. Dosis 25. vel 30. gutt.

#### 11 Alia.

R. Ess. Millefol. M. dosi sicut antea.  
Tinct. Antimon. ana. ʒij.

#### 12 Infusum roborans & Pectorale.

R. Rad. Bistort. Veron.  
Tormet. Virg. Aur. ana. mj.  
Pimpin. ana. ʒss. Incis. infunde specierum ma-  
Herb. Sanic. nip. ij. in Ag. fervent. lb. ij.  
Pyrol. & colatura bibatur calide.

### VII. Methodus medendi.

1. Cæteris omnibus remediis facile palmam præripit Venæsectio larga in pede revulsionis gratia, aut urgente suffocatione in brachio instituta.
2. In viris Hæmorrhoidum suppressione laborantibus, hirudines post sanguinis missionem ano applicentur.
3. In malo mitiori, Venæsectioni statim subjungantur potiones diaphoretico-diuretice supra descriptæ, ut massa humorum æqualiter distribuatur.
4. Ubi vero malum inveteratum est, in usum trahantur remedia sanguinem incidentia & resolventia, quibus interponantur Pilulæ ex gummatis paratæ, aut Pil. Becch. Stahlian. Balsamico-Viscer. mane vel noctu sumendæ.
5. Quodsi vero horum usum sufficiens evacuatio & resolutio non sequatur, exhibeantur ægrotis infusa incidentia & laxantia, ac diu continentur.
6. Hisce subjungantur remedia tonica diu satis usurpanda, ut pars affecta eo magis roboretur, & novus infarctus præcaveatur.
7. Extra Paroxysmum Venæsectiones præservatorie instituantur, laxantia sumantur, & Mensium ac Hæmorrhoidum fluxus ubi deficit, promoveatur.

### VIII. Cautela Practicæ.

1. Evacuationes sanguinis in minori quantitate institutæ nil conferunt ad infringendum paroxysmum & malum imminuendum, quare larga sit, oportet.
2. Nisi Venæsectioni statim subjungantur remedia incidentia & diaphoretica, variis anomali motus & turbæ in œconomia animali ob sanguinis spissitudinem sequuntur.
3. Purgantia fortiora, quia nimios motus excitant, nonnisi cum summa prudentia usurpentur.
4. Volatilia remedia in principiodata, malum exasperant, declinante vero paroxysmo admodum sunt proficua.
5. Adstringentia remedia, non nisi in declinatione morbi conveniunt, in principio vero, aut nondum sufficienter resoluta & discussa sanguine data tubercula pulmonum scirrhusa producant.
6. Vita sedentaria & otiosa maxime est noxia, quare motus sufficiens & continuatus semper est suadendus.
7. Aer frigidus & humidus pariter noxius est, dum inspiratus humores resolutione indigentes magis condensat, & humorum recursus, habitum corporis stringendo, ab exterioribus ad interiora promovet.

### CAPUT TERTIUM.

#### De Infarctu Lienis.

- I. Definitio. Infarctus Lienis est nimia ejusdem op-pletio & intumescencia, a congestione insigni sanguinis Venæportæ hujusque spissitudine, dependens.



II. *Differentia.*

- 1 *A Congestione*, quæ tamdiu non durat, sive citius solvitur, quam infarctus; adde quod Congestio sit causa, infarctus vero effectus sive productum.
- 2 *A Scirrho*, tam respectu reliquorum symptomatum, quam potissimum respectu duritiei.
- 3 *A doloribus Nephriticis* lateris sinistri, quatenus hi sunt profundiores & ad lumbos se extendentes, dolores vero ex infarctu Lienis magis anteriora petunt.

III. *Signa.*

- 1 Dolor premens obtusus hypochondrii sinistri, sive sub costis spurii.
- 2 Respiratio sat difficilis & laboriosa, sub motu corporis incrementum capiens.
- 3 Tumor & inflatio interdum valde sensibilis in Hypochondrio sinistro.
- 4 Insignis virium lassitudo & torpor ad actiones quasque, animi mœror, morositas.
- 5 Appetitus ut plurimum prostratus.
- 6 Ventriculi quoque interdum inflatio, quam frequentes ructus solvunt.
- 7 Palpitationes cordis & sæpius etiam motus palpitatorius insignis in ipso Liene, cum præcordiorum angustia.
- 8 Interdum jungitur etiam tussis sicca periodica.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines Plethorici Melancholici, aut Melancholico Sanguinei consistentis ætatis, frequentes in juniore ætate narium Hæmorrhagias passi.
- 2 Viri Hæmorrhoidarii, quibus minus bene per Hæmorrhoides successit sanguinis fluxus, Hypochondriaci.
- 3 Fœminæ, Mensium stillicidio, aut earundem suppressione laborantes, Hystericæ.
- 4 Artificiales sanguinis evacuationes negligentes.
- 5 Tristitiæ & mœrori obnoxii.
- 6 Vitæ sedentiæ frequentibus meditationibus dediti.
- 7 Diætâ crassiori utentes, sufficientem vero potum negligentes & otio insuper indulgentes.
- 8 Remediis Adstringentibus, imprimis vero China-Chinæ, sine præmissa sufficiente præparatione & evacuatione in febribus intermittentibus, nimis vero refrigerantibus aut volatilibus in acutis tractati.

V. *Prognosis.*

- 1 Infarctus Lienis recens facile quidem per sanguinis missionem & remedia convenientia curatur; inveteratus vero sæpius diu fatigat ægrotantes.
- 2 Infarctus Lienis neglectus, aut perversè tractatus, facile degenerat in Scirrhum.
- 3 Infarctui Lienis facile etiam succedit vel jungitur infarctus Hepatis.
- 4 In feminis non raro talis infarctus per vomitum cruentum solvitur, quod etiam in Viris Hæmorrhoidariis observavimus.
- 5 Si diu hæserit sanguis spissus in Liene, tandem exinde oritur vomitus nigrorum, sive morbus niger Hippocratis.
- 6 Infarctui tali febrem Petechialem gravissimam supervenisse, hanc vero una cum infarctu, excretionem sanguinis coagulati nigri & fœtenti per alvum solutum fuisse, vidimus.
- 7 Non raro etiam hujusmodi infarctum Hectici & Hydropici affectus sequuntur.

VI. *Remedia.*

- 1 Venæsectio revulsoria in pede, ut & Scarificationes repetitæ, ac Hirudinum applicatio, Plethoram imminuentes & causam antecedentem removens.
- 2 Sanguinem spissum & ad motum ineptum incidentia & resolventia: Rad. Ari, Pimpin. alb. Vincetox. Caryophyllat. Appii, Graminis, Bardan. Herb. Cent. min. Chærefol. Fumar. Card. Bened. Absinth. Nasturt. Cochlear. Hyssop. Capill. Vener. Tartar. Vitriol. Arcan. dupl. Gumm. Ammon. Sagapen Bdell. Externe Emplastra resolventia, de Ammoniaco, Splenet. Saponat. Barbett. de Cicuta, Ol. Cappar. Chamom. Unguent. de Althæa.

- 3 Evacuantia lenia, Resolventibus & Incidentibus prioribus vel conjuncta, vel subjuncta, Fol. Senn. Rhabarb. Fibr. Rad. Helleb. nigr. Pil. Polychr. Hall. cum stimulo quodam, ꝑ. dulc. Extract. Panchym. Croll. Sal. Cathart. amar. Magnes. alb. &c. Diaphoretica, Diuretica &c.
- 4 Tonica, impr. ꝑ. lia, Tinct. ꝑ. is Ludovici, Zwelff. Croc. ꝑ. is Stahl. Mixt. Tonico Nerv. Stahl. infusa ex Cort. Cappar. Tamarisc. Fraxin. Rad. Caryoph. Rub. Tinct. Herb. Millefol. Adiant. alb. Cuscut. Epithymi, Scolopender. Ceterach.

*Formula Remediorum.*

## 1 Infusum incidens.

<i>Rx. Rad. Gentian.</i>	<i>Cent. min. āā.</i>
<i>Taraxac.</i>	<i>M. ss.</i>
<i>Cichor. ana. Zij.</i>	<i>Cort. Tamarisc.</i>
<i>Ari.</i>	<i>Aurant.</i>
<i>Zedoar. ana. ʒj.</i>	<i>Winteran. ana. ʒiss.</i>
<i>Herb. Card. Ben.</i>	<i>Incisa infunde in ℞. iv. Vin.</i>
<i>Fumar.</i>	<i>alb.</i>

## 2 Infusum laxans &amp; resolvens.

<i>Rx. Rad. Bardan.</i>	<i>Fol. Senn. f. ʒj.</i>
<i>Gramin.</i>	<i>Fibr. Hell. nigr. ʒss.</i>
<i>Helen.</i>	<i>Cort. Tamarisc.</i>
<i>Vincetox. ana.</i>	<i>Fraxin.</i>
<i>ʒij.</i>	<i>Tart. Solub. ana. ʒiij.</i>
<i>Herb. Cent. min.</i>	<i>Incis. Include nodulo, Vin.</i>
<i>Chæref. ana. m. ss.</i>	<i>alb. ℞. iv. vel v. infundendo.</i>

## 3 Pilulæ incidentes &amp; laxantes.

<i>Rx. MP. de Ammon.</i>	<i>Colocynth. gr. iv.</i>
<i>Querc.</i>	<i>Tinct. Tart. q. s.</i>
<i>Extract. Hell. nigr.</i>	<i>M. fiant Pilul. pro 2.</i>
<i>ana. ʒj.</i>	<i>dof.</i>

## 4 Aliæ.

<i>Rx. Extract. Panchym.</i>	<i>Resin. Scammon. gr. iv.</i>
<i>Croll.</i>	<i>Tinct. ʒii q. s.</i>
<i>ꝑ. dulc. rit. par. ana. ʒj.</i>	<i>M. f. Pilul. pro 2. dof. ib.</i>

## 5 Aliæ.

<i>Rx. MP. Polychr.</i>	<i>Resin. Jalapp. gr. vj.</i>
<i>Extract. Hell. nigr.</i>	<i>Elix. Prop. Par. q. s.</i>
<i>ana. ʒss.</i>	<i>M. f. Pil. ad gr. j. pro 3. dof.</i>

## 6 Pilulæ aliæ.

<i>Rx. Gum. Ammon. in</i>	<i>Aloes gummos. ā.</i>
<i>Aq. sol.</i>	<i>ʒss.</i>
<i>ꝑ. inspiss. ʒij.</i>	<i>Colocynth. gr. xv.</i>
<i>Extr. Helleb. nigr.</i>	<i>Ess. Absinth. q. s. M.</i>
<i>Absinth.</i>	<i>Fiant Pilul. ad gr. j. Dof. 20.</i>
<i>Fumar.</i>	<i>quavis hebdomada.</i>

## 7 Mixtura incidens &amp; laxans.

<i>Rx. Mixt. simpl. ʒiij.</i>	<i>M. dof. 40. 60. gutt. cum mul-</i>
<i>Extr. Panch. Croll. ʒj.</i>	<i>to vehiculo.</i>

## 8 Mixtura incidens, diaphoretico-diuretica.

<i>Rx. Tinct. ʒii acris.</i>	<i>Succin. ʒj. M.</i>
<i>Tartar.</i>	<i>Dofis gutt. 30. 40. mane &amp;</i>
<i>Ess. Alexiph. Stahl. ā. ʒij.</i>	<i>vesp.</i>

## 9 Mixtura Tonica &amp; incidens.

<i>Rx. Tinct. Tart.</i>	<i>Dof. 30. 40. gutt. mane &amp;</i>
<i>ʒii.</i>	<i>vesperi.</i>
<i>Spir. C. C. ana. ʒj. M.</i>	

## 10 Aliæ.

<i>Rx. Ess. Adiant. alb.</i>	<i>āā. ʒij.</i>
<i>Tinct. ꝑ. is Ludov.</i>	<i>M. dofis eadem.</i>

## 11 Aliæ.

<i>Rx. Ess. Millefol.</i>	<i>ana. ʒij.</i>
<i>Adiant. alb.</i>	<i>M. dofis ut supra.</i>

## 12 Emplastrum resolvens.

<i>Rx. Empl. de Hyosc.</i>	<i>Malax. cum Ol. Cappar.</i>
<i>Ammoniac. ana. ʒss.</i>	<i>ꝑ. Chærefol. ana.</i>

## 13 Aliud.

<i>Rx. Empl. de Galban.</i>	<i>M. malaxetur ut supra.</i>
<i>Ammoniac. ana. ʒiij.</i>	



II. *Methodus medendi.*

- 1 In subjectis Plethoricis, aut ubi Infarctus hic a Mensium vel Hæmorrhoidum suppressione originem trahit, Venæsectio & Scarificatio in pedibus reliquis remediis præmittantur, & in Hæmorrhoidariis hirudines insuper ano applicentur.
- 2 Ubi vero a febribus male curatis originem ducit obstructio Lienis, aut Plethora non urget, commode statim ab initio præscribuntur Infusa incidentia & laxantia, utpote quæ non solum leniter revelunt, sed etiam febres male curatas revocant. Aut hisce substitui possunt Pilulæ antea præscriptæ. Vices etiam laxantium optime quandoque suppleant Clysteres, aliquoties repetendi.
- 3 Subjectis calidioribus summo cum fructu ordinentur succi ex Rad. Cichor. Tarax. Herb. Heder. Terr. Flor. Bellid. &c. cum juscule calido sumendi: quibus usus Pilularum ex Gummatib. paratarum interponi potest.
- 4 Hisce ad meliorem resolutionem & discussionem subjungantur Essentiæ supra notatæ incidentes & resolventes, earumque usui interponatur Essent. Antihypochondr. Hallens. aut Mixtura ex Mixt. Simpl. & Extr. Panchym. Croll. Ceteris tamen resolventibus remediis facile palmam præripiunt Pulveres Solares D. Richter, præmitti tamen debent, ubi opus est, universalia.
- 5 Tandem Ælia & tonum roborantia in usum trahantur, quæ ipsa quoque, ubi humores jam aliquo modo resoluti sunt, ceteris interponi possunt.
- 6 Toto curationis tempore Emplastra resolutiva Lienis regioni imponantur, ut resolutio Infarctus eo melius procedat.

VIII. *Cautele Præctica.*

- 1 In Infarctu Lienis, nisi remedia diu aut ad minimum spatio aliquot hebdomadum continuantur, irrita sunt omnia, etiamsi optima fuerint remedia.
- 2 Martialia in principio usurpata majorem producant infarctum, & ad faciliorem Scirrhi generationem disponunt; unde prius non comedenda sunt, quam signa sufficientis resolutionis in Urina appareant.
- 3 Qui tamen Martialia cum resolventibus & laxantibus perite combinare aut iisdem interponere sciverit, nulla damna exinde metuenda habebit.
- 4 Opiata sedandorum dolorum causa exhibita, magis relaxant fibras, majoremque ipsis conciliant torporem & hinc infarctum augent.
- 5 Fortiora resolutiva & discutientia v. g. Rad. Bryon. in principio mali usurpata, simul atque semel sanguinem spissum, Lienis impactum, commovent, ac hinc eo facilius Lienis exulcerationem producant.
- 6 Omnia evacuantia fortiora impr. resinosa malum magis exasperant, omnium vero maxime nocent vomitoria.
- 7 E contra methodus lenta, per plures septimanas continuanda, in hoc morbo optimum habet usum.
- 8 Acidulæ virtute adstrictoria Infarctum magis promovent. Thermæ vero nisi Venæsectio, resolutiva & evacuantia præmissa fuerint, ad faciliorem Lienis exulcerationem disponunt.
- 9 Quando in exulcerationem, quæ se per alvum aut urinam aut Vomitum manifestat, ab affectus, consolidantia simul in usum trahenda sunt.
- 10 Cibi moderate aromatizati, & vinum modice sumptum, sunt quidem remedia, sed eorum immodicus usus instar veneni est, impr. in subjectis calidioribus, quibus cibi leniter aromatizati & capparibus largiter conditi optime conveniunt.
- 11 Motus nimius humores infarctos nimium commovet, & omnia symptomata exasperat, lenis vero, continuatus, usui remediorum junctus, sæpius plus præstat, quam multa remedia.
- 12 Ira uti hinc nimium commovendo nocet, ita tristitia & terror obstructionem augent.
- 13 In feminino sexu semper ad Mensium negotium respiciendum est, ut suppressi per convenientia remedia revocentur.

## CAPUT QUARTUM.

## De Infarctu Hepatis.

I. *Definitio.* Infarctus Hepatis est oppletio ejusdem aut obstructio a sanguine, nimia copia e vasis Venæ-Portæ meseraicis reliquisque ingesto & congesto, aut etiam Hepatis præternaturali constrictione, sanguinem congestum ibidem detinente, ortum trahens.

II. *Differentia.*

- 1 Alius Infarctus Hepatis cum insigni & palpabili tumore ac inflatione conjunctus est, uti id contingit in junioribus, alius vero hacce inflatione destitutus constrictionem Hepatis comitem habet.
- 2 A Scirrho, ratione tensionis & gravitatis majoris, ac respectu duritiei aliorumque infra recensendorum symptomatum.

III. *Signa.*

- 1 Dolor gravativus & obtusus sub costis spuris in Hypochondrio dextro, interdum pulsans cum calore.
- 2 Angustia præcordiorum cum appetitus prostratione.
- 3 Tumor Hypochondrii dextri impr. in junioribus adhuc, visu & tactu discernendus.
- 4 Augmentum doloris post Hypochondrium digitis attactum.
- 5 Lassitudo insignis & gravitas totius corporis & artuum, cum flacciditate & consumptione corporis.
- 6 Somnus admodum inquietus & anxius variis insomniis & doloribus turbatus.
- 7 Sitis, siccitas oris ejusdemque amarities, Tussis sicca.
- 8 Phlogosès, impr. post pastum cum rubore faciei & calore insigni in volis manuum.
- 9 Urina tenuis & pauca, postea vero rubra & turbida.
- 10 Alvus ut plurimum sicca, reliquarumque actionum tardior successus.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines Plethorici in ætate consistente constituti, Hæmorrhoidum & Mensium suppressione laborantes, evacuationes artificiales negligentes.
- 2 Iracundia gravi post pastum affecti, post iram pallidi fientes.
- 3 Hypochondriaci & Hystericæ; congestionem sanguinis in Vena-Portæ laborantes.
- 4 Potum frigidum in majori copia post magnum corporis motum & incalcescentiam assumentes.
- 5 Remediis adstringentibus in intermittentibus; volatilibus vero in acutis abusi.
- 6 Quibus remedia topica, frigida, adstringentia in Hæmorrhagiis gravioribus Hepatis regioni applicata fuere.
- 7 Piscibus, carnibus salitis & fumo exsiccatis, aliisque crassioribus nutriti.

V. *Prognosis.*

- 1 Infarctus Hepatis majus portendit periculum, quam Infarctus Lienis, & majori etiam cum difficultate curatur.
- 2 Ex Infarctu Hepatis facile prodit ejusdem Scirrhus.
- 3 Non raro etiam sequitur Infarctum Cachexia icterica.
- 4 Quo magis inveteratus est Infarctus, eo facilius eum excipiunt Scirrhi ac Hæctici & Hydropici affectus.
- 5 Infarctus Hepatis cum inflatione visceris conjunctus, facilius curatur, quam qui a nimia Hepatis constrictione originem trahit, quem etiam Hæctica familiariter sequitur.
- 6 Hæmorrhoides, Infarctui Hepatis, a sanguine congesto oriundo, supervenientes, sæpius malum solvunt.
- 7 Quo magis ægroti iræ indulgent, eo gravior fit affectus & eo diutius etiam protrahitur cura.

VI. *Remedia.*

- 1 Causam antecedentem, abundantiam scil. sanguinis tollent.



tollentia ac revellentia, Venæsectio & Scarificatio in pedibus in utroque sexu, in Hæmorrhoidibus vero suppressis Hirudinum ad anum applicatio.

2 Spasticam Hepatis stricturam relaxantia, Pulv. Antispasm. Hallens. aut simili modo ex Nitro depur. Tart. Vitriolat. Arcan. duplic. Conchis, Cinnab. &c. parati pulveres, aliaque interne relaxantia, emollientia & lubricantia.

3 Incidentia & Resolventia mitiora, ac simul alvi laxitatem procurantia, Rad. Cichor. Gramin. Taraxac. Ononid. Apii, Polypod. Herb. Capill. ♀ is, Bellid. Acetof. Acetofell. Flor. Bellid. Borrag. Bugloss. Hepat. nobil. Fol. Sennæ, Rhab. elect. Manna, Tamarindi, Pil. de Ammoniac. Querc. Tartareæ, Schred. Bontii, Balsam. Visceral. Polychrest. &c. Clysteres emollientes & leniter laxantes. Resolventia externa sive Topica, Empl. de Melilot. Diachyl. cum & sine Gummat. Diaphoret. Myns. de Sperm. Ceti ejusdem, de Ammoniac. de Cicut. de Hyosciam. &c.

4 Crasin sanguinis corrigentia, Rad. Bardan. Pimpin. alb. Vincetox. Enul. Sarsapar. Chinæ, Lign. Sanct. Sassafr. Herb. Hyssop. Veron. Capill. ♀ is, Cent. min. Marrub. &c. Salia neutra, Gummata & ex his paratæ Pilulæ variæ, Tincturæ resolventes & diureticiæ &c.

5 Tonum visceris relaxati restituentia: Rad. Caryoph. Rub. Tinct. Herb. Scolopendr. Agrimon. Flor. Schœnanth. Spic. Rosar. &c. Tinct. ♂ is, Mixt. Tonico-Nervina Stahlî.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis Antispasmodicus.

Rx. Nitr. depur. M. div. in 6. part. æq. sumatur singulis 3. vel 4. horis  
Tart. Vitriolat. ana. ℥j. dos. j.  
Cinnab. ℥i gr. xvij.

##### 2 Alius.

Rx. Nitr. depur. Cinnab. ℥i gr. xvij.  
Arcan. duplic. M. div. in 6. part. æq. dosis  
Solut. Conch. ana. ℥ij. & usus ut supra.

##### 3 Nodulus incidens & laxans.

Rx. Rad. Cichor. Fol. Senn. s. st. ℥j.  
Gramin. Rhab. elect. ℥ij.  
Taraxac. a. ℥ij. Tart. solub. ℥ij.  
Herb. Capill. ♀ is. Incisa include nodulo ℥. iv.  
Bellid. ana. mfs. vini albi affund.

##### 4 Infusum laxans & M. S. purificans.

Rx. Rad. Bardan. Fol. Senn. s. st. ℥vj.  
Pimp. alb. Fibr. Helleb. nigr.  
Taraxac. Rhab. elect. ana. ℥ij.  
Enul. ana. ℥ij. Cort. Aurant.  
Herb. Scord. Lign. Sassafr. ana. ℥ij.  
Hyssop. Sal. Tart. ℥j.  
Marrub. Incis. Infund. in Vin. albi ℥.  
Bellid. ana. p. ij. iv. vel v.

##### 5 Potio Laxans.

Rx. Tamarind. Fol. Senn. s. st. ℥ij.  
Passul. min. ana. ℥vj. Rhab. el. ℥ij.  
Coque in s. q. aq. simpl. in Cryst. Tart. ℥ss.  
colat. fervente ℥v. infund. Colat. bibatur calide.

##### 6 Pilulæ laxantes & crasin sanguinis corrigentes.

Rx. Pil. Bals. Viscer. vel Querc. ℥j.  
R. Pilul. de Ammoniac. Sumant. 15. vel 20. pro dosi.

##### 7 Infusum roborans.

Rx. Rad. Caryoph. Schœnanth.  
Rub. Tinct. ana. ℥ss. Rosar. ana. p. ij.  
Herb. Scolopendr. Incis. infund. in Vini albi ℥.  
Agrim. ana. mj. iij. vel iv. dosis ℥ij. ter vel  
Flor. Spic. 4. per diem.

##### 8 Mixtura roborans.

Rx. Tinct. ♂ is Ludov. ℥ss. Alia.  
Rx. Essent. Adianth. alb. Tinct. ♂ is Lud. ana. ℥ij.

##### 9 Alia.

Rx. Tinct. Tart. M. dosis 30. 40. gutt. bis vel  
Ess. Succin. ter singul. diebus.  
Spir. C. C. rectif. aa. ℥ss.

#### VII. Methodus medendi.

1 In corporibus Plethoricis, aut ubi malum a suppressis Hæmorrhagiis originem traxit, evacuationes sanguinis summe necessariæ sunt, semper tamen instituantur in partibus inferioribus, majoris revulsiois gratia.

2 Hisce interdum commode præmittuntur laxantia per epicrasin, quando Cacochymia simul peccat, aut quando febres prægressæ, male curatæ fuerunt, hæc enim pariter ac Pilulæ ex Gummatibus paratæ febres revocando, morbum simul imminuunt.

3 Si malum est a nimia constrictione Hepatis, evacuationibus statim subjungantur Antispasmodica & relaxantia. Externe vero imponatur regioni Hepatis Emplastr. Diachyl. de Melilot. de Ammoniac. Foresti &c.

4 Sin vero sanguis nimium congestus Hepar tumidum reddiderit, post laxans lene & Venæsectionem, si ea opus fuerit, Incidentia, Discutientia & Diuretica cum laxantibus mixta & diu usurpata, conveniunt.

5 Tandem ad roborandum Hepar remedia Tonica, tam sub Infusi, quam Mixturarum forma in ulum trahantur, externe vero applicetur Emplastrum Santalinum.

#### VIII. Cautela Practica.

1 Venæsectiones in partibus superioribus rarissime aliquem habent usum, sed potius damnum inferunt.

2 Purgantia acriora pariter hic ac in Lienis Infarctu noxia sunt.

3 Nisi alvus semper sit aperta, parum profunt reliqua remedia, imo malum sub adstrictione alvi augetur.

4 Discutientia acriora & volatilia Hepatis stricturam & infarctum augent.

5 Cichorium sicuti in omnibus hepatis affectibus, sic etiam in hoc eximiam habet efficaciam.

6 Nisi in Infarctu Hepatis, ab ejusdem relaxatione orta, revellentia præmittantur, Discutientia parum profunt.

7 Opiata & Adstringentia tam interna, quam externa, imprimis fortiora, Infarctum augent & Scirrhum alliciunt.

8 Diæta crassa noxia est, e contra vero cibi lubricantes, emollientes, gelatinosi & potus sufficiens, cum motu corporis, admodum conveniunt Infarctu Hepatis laborantibus.

#### CAPUT QUINTUM.

##### De Infarctu Glandularum Mesenterii & inde dependente Atrophia.

I. Definitio. **A** Trophia est successiva partium & habitus corporis contabescencia, ab Infarctu glandularum Mesenterii & denegato hinc chyli per eandem transitu, originem trahens.

##### II. Differentia.

1 Ab Hætica, quoniam in hacce plerumque viscerum, Hepatis, Lienis &c. exulceratio cum febre aliisque symptomatibus, suo loco recensendis, subest, in Atrophia autem infarctus saltem aut Scirrhus glandularum deprehenditur. Ut taceam quod Hætica vera ut plur. pubertatem supergressos, Atrophia autem juniores magis affligat.

2 A Phthysi, respectu partis affectæ & respectu causæ, Pulmonis scil. & exulcerationis ejusdem: cum e contra in Atrophia infarctus tantum in glandulis meseraicis deprehendatur.

3 Ab Infarctu & Scirrhu Hepatis & Lienis, qui partim respectu loci affecti, partim symptomatum paulo ante enarratorum intuitu ab Atrophia sive infarctu glandularum differunt.

4 A Rhachitide: in qua quidem partes quædam contabescunt, sed simul tumores hinc inde partes deformantes & incurvantes enascuntur: cum e contra tale quid in Atrophia non occurrat: cui adde quod Rhachitis sit productum Atrophiciæ.



- 5 Ab *aridura partium*, quæ in quodam tantum membro se manifestat: Atrophia autem totum corpus occupat.
- 6 A *Macie*, ubi pinguedo tantum consumitur: in Atrophia vero ipsæ quoque partes musculosæ contabescunt.

III. *Signa.*

- 1 Lassitudo insignis & flacciditas totius corporis in dies invalescens.
- 2 Languor animi, fastidium omnium rerum, ac ad iram proclivitas.
- 3 Coloris faciei floridi in pallidum mutatio, cum a liquali faciei in quibusdam inflatione, & labiorum pallore.
- 4 Oculi nitore pristino destituti, cum palpebris interdum post somnum inpr. matutino tempore tumidis.
- 5 Corporis & inpr. partium externarum contabescencia.
- 6 Tumor abdominis insignis, interdum fatis durus, interdum vero aliquo modo mollis, ita ut glandulæ mesenterii tumidæ tactu deprehendi queant.
- 7 Respiratio laboriosa cum anxietate.
- 8 Appetitus vagus & inconstans, & frigidorum major appetentia.
- 9 Si vero a vermibus nutrimentum confumentibus originem trahit Atrophia, appetitus solito est major, imo admodum voraces sunt infantes, ac ventriculo cibus repleto melius se habent, quam eodem vacuo.
- 10 Nulla post cibos refocillatio, sed respirandi difficultas, cum tensione in hypochondriis ac inflatione ventriculi.
- 11 Sitis multa, calor internus, phlogoses, siccitas oris.
- 12 Digestio fere nulla, ita ut cibi sæpius tantum semidigesti per alvum excernantur.
- 13 Alvus inconstans modo lubrica, modo sicca & obstructa.
- 14 Febris lenta cum pulsu celeri, noctu potissimum affligens, postmodum vero incrementa capiens & ad hecticum calorem tendens, cum augmento reliquorum symptomatum.
- 15 Somnus brevis & sæpius turbatus.
- 16 Urina utpl. crassa imo chylosa est, successu vero temporis, ubi ad Hecticam fit transitus, magistincta & rubra apparet.

IV. *Subjectum.*

- 1 Infantes, præcipue ablactati aut huic ætati propiores.
- 2 Infantes qui statim post somnum corpore a sudore madido aeri frigido expositi fuerunt.
- 3 Quibus excretionibus consuetæ per caput suppressæ fuerunt, ita ut exinde glandularum infarctus circa collum reportarint, qui præ ceteris ob lymphæ & feri mucositatem denegatamque depurationem in glandulis facile in Atrophiam, facta ad glandulas inferioris ventris humorum depositione, incidunt.
- 4 Potui nocturno frigido, transpirationem in somno impediendi, dediti.
- 5 Quibus labes post morbos vel acutos, vel chronicos prægressos in visceribus relicta fuit.
- 6 Cibus viscidus & malæ digestionis, ut & frigidis nutriti, ac hinc glandularum mesaraicarum infarctus reportantes.
- 7 Voraces nimium, sive adiphagia laborantes.
- 8 Quibus diarrhœæ per adstringentia aliaque inconvenientia remedia suppressæ fuerunt.
- 9 Vermibus, materiam nutritiam absumentibus & conspurcantibus, afflicti.
- 10 Pueri Hæmorrhagiis narium nimis & frequenter repetentibus exhausti, & collapsu viscerum laborantes.
- 11 Infantes & pueri per fascinationem, aut veneficia ad Atrophiam dispositi.
- 12 Pueri, quibus Febres per Chinam Chinæ aliaque adstringentia, suppressæ fuerunt.

V. *Prognosis.*

- 1 Atrophia recens a glandularum infarctu orta, brevi & facile curatur, inveterata autem non nisi magna difficultate.
- 2 Ab Atrophia, nisi mature convenientibus reme-

dis tractetur, facilis est ad Hecticam transitus, quando nimirum infarctus glandularum in Scirrhum & exulcerationem degenerat.

- 3 Quo magis sunt adulti Atrophia correpti, eo facilius jungitur Hectica.
- 4 Adulti Atrophia laborantes, facile etiam Hydropem corripiuntur.
- 5 Atrophia morbos Hæmorrhagias scil. & Febres male curatas excipiens, peioris semper est consequentiæ, quam quæ a diætæ vitio originem trahit.
- 6 Atrophia a vermibus orta, nunquam feliciter cessat, nisi vermes per convenientia remedia remoti fuerint.
- 7 Pessima omnium ea est Atrophia, quæ ab incantationibus ortum traxit.
- 8 Quo magis urget diarrhœa in Atrophia, eo citius pereunt egrotantes.
- 9 Urina antea crassa & pallida, postea vero rubicunda ac flammea reddita, ac frequentes æstus ac phlogoses post pastum, præsentiam Hecticæ indicant.
- 10 Atrophiam per Febres intermittentes feliciter sublata fuisse, aliquoties observavimus.
- 11 Atrophiam inveteratam interdum excipit Rhachitis morbus curationem utpl. omnem respuens.
- 12 Tumorem & inflationem abdominis per vomitus cum ejectione copiosæ materiæ admodum tenacis, spatio aliquot horarum sublata fuisse observavimus, sed Febris acuta ac elapsis aliquot diebus accedentes convulsiones nihilominus ægrotum jugulabant.

VI. *Remedia.*

- 1 Lenia laxantia & primas vias abstergentia: Metc. dulc. Tart. Vitriol. Sal. Cathart. amar. Arcan. duplic. Nitr. Antimoniat. Sal. Polychrest. Syr. de Cichor. cum Rhabarb. Syr. Domest. sive de Spina Cervina, Manna, Magnes. alba &c.
- 2 Incidentia & Resolventia uti sunt antea laudata salia neutra, Sal Absinth. Cent. minor. aliaque fixa Rad. Pimpin. alb. Ari. Caryophyllat. Zedoar. Galang. Vincetox. Petasit. Imperator. Levist. Squilla, cujus succus adultioribus cum convenienti vehiculo, infantibus vero cum oxymelle exhiberi potest. Gumm. Ammon. &c. Tinct. Jii acris, Tartari. Liq. Ter. Fol. Tart. Bas. Samech. Paracelsi & Tinct. aperit. nobis familiaris, Ess. Succin. Alexipharm. D. Stahl. Tinct. Resolv. nobis usualis &c. Pil. Stahl. Polychr. &c.
- 3 Tonica, qualia sunt Tinct. Vitriol. Jt. Tartarificata Ludovici Salia neutra, Crocus Jtis Antimoniat. Tinct. Tonic. Stahl.
- 4 Specifica: Succus Hederæ Terrestr. Heder. arbor. contactus manus tabe mortui, quem quidam tanquam specificum in Scrophulis & Infarctu glandularum laudant.
- 5 Topica: Emplastr. Sapon. Barbett. de G. Ammon. Ungt. de Alth. Ol. Laur. Lumbr. Terrestr. Cappar. Ceræ &c. Pulmentum illud quod vertex ferreus rotæ molaris inter movendum colligit, extra illitum.
- 6 Nutrientia, Juscula hordeacea, Lacticinia, Emulsiones, Gelatinæ cum Amygdalis &c.

## Formula Remediorum.

- 1 Bolus laxans.
 

Rx. Conserv. rosar. Jj.	Syr. Ros. sol. q. s.
Merc. dulc.	M. F. Bolus pro infante 3. vel 4. annor.
P. Jalap. a gr. v.	
- 2 Pulvis laxans.
 

Rx. Magnes. alb. ʒss.	D. infanti 6. vel 8. annor.
Alius.	
Rx. Sal. Cathart. amar.	pro 1. dos. infanti 7. vel 8. annor.
ʒiss.	
- 3 Potio laxans.
 

Rx. Aq. Chæresol. ʒiij.	D. singulis duabus horis cochl j. ij.
Magnes. alb. Jij.	
Sacchar. Canar. ʒij. M.	
- 4 Alia.
 

Rx. Aq. Scorzon. ʒij.	Syr. de Cich. c. Rhab. ʒss.
Diacyd. luc. Jalap. ʒij.	M. pro una vice.
- 5 Infusum incidens & laxans.
 

Rx. Rad. Cichor.	Aprii. ana. ʒij.
	P 3 Ari



*Ari. 3j.* *Cort. Citr.*  
*Herb. Absinth.* *Tart. solub. ana. 3iss.*  
*Cent. min. ʒā. p. ij.* *Incis. affund. Aq. fervent.*  
*Fol. Senn. f. st. 3iss.* *15ss.*  
*Rhab. elect. 3j.* *postea adde Vini alb. 15. iss.*

## 6 Aliud.

*R. Rad. Pimp. alb.* *Rhab. elect.*  
*Vincetox. ana. 3ij.* *Fibr. Hell. nigr. ana. 3j.*  
*Ari 3j.* *Cort. Cant.*  
*Summit. Cent. min.* *Winteran.*  
*Origan.* *Sal. Anglic. ana. 3iss.*  
*Fl. Stachad. Ar. ʒā. p. ij.* *F. Infus. ut antea.*  
*Fol. Senn. f. st. 3vj.*

## 7 Pulvis abstergens &amp; resolvens.

*R. Arcan. dupl.* *div. in 3. 4. 6. dos. pro ratio-*  
*3j.* *ne ætatis.*

## 8 Alius.

*R. Pulv. Stomach. Ber-* *Dos. 1. 2. cusp. cultr. bis vel*  
*ckm. 3iss.* *ter quovis die.*

## 9 Pulvis resolvens &amp; tonicus.

*R. Arcan. duplic. ʒij.* *ana. ʒj. M.*  
*Matr. perl. preparat.* *Div. in 4. 6. 8. part. æq. pro*  
*Antimon. ʒle. Lud.* *ratione ætatis.*

## 10 Alius.

*R. Tart. Vitriolat. ʒij.* *ʒ. ʒl. Lud. gr. xv.*  
*Conch. preparat.* *Croc. ʒ. ʒiat. gr. iv. M.*  
*Nitr. depur. ana. ʒj.* *Div. ut antea.*

## 11 Tinctura Tonico-resolvens.

*R. Tinct. ʒl. Lud. 3ij.* *pro ratione ætatis bis per*  
*Dos. 15. 20. 25. gutt.* *diem.*

## 12 Alia.

*R. Tinct. ʒt. Lud.* *ana. 3iss.*  
*Ess. Adiantb. alb.* *M. D. ut antea.*

## 13 Alia.

*R. Mixt. Tart. Stablii 3ij.* *D. ut antea.*

## 14 Unguentum emolliens &amp; resolvens.

*R. G. Ammon. in Aq. sol.* *Servi Cerv.*  
*3ij.* *Butyr. rec. ana. q. s. M.*  
*Tereb.* *F. Unguent. externe abdomi-*  
*Alex. ana. 3j.* *ni calide applicandum.*

## VII. Methodus medendi.

- 1 Curatio hujus affectus, si multum materiæ viscidæ hæret in primis viis, instituatur per lenia evacuantia, quo in casu optime se gerit Merc. dulc. quippe qui & incidit sive resolvit, ac simul evacuat. Eisdem fini etiam inserviunt antea præscripta Infusa laxantia & incidentia; junioribus autem infantibus exhibeantur Syrupi laxantes de Manna, de Cichor. cum Rhabarb. &c.
- 2 Quibus subjungantur, aut etiam iisdem præmittantur Pulveres vel Potiunculæ incidentes & abstergentes, ut hoc modo infarctus glandularum sensim sensimque tollatur.
- 3 Si curæ initium sit per Incidentia & Abstergentia, hisce repetitis vicibus interponantur blandalaxantia, ut hoc modo illud quod resolutum fuit, sensim evacuetur.
- 4 Reliquis incidentibus remediis jungantur Tincturæ Antimoniales acres cum Essentiis ex radicibus incidentibus paratæ, uti sunt Essent. Pimpin. alb. Alexiph. Stablii, Scordii, Succini.
- 5 Affectus hic sæpius felicissime solo Arcano duplicato & Tinct. ʒtis Ludov. tollitur, si nimirum vesperi aliquot grana Arcani dupl. mane vero moderata dosis Tinct. ʒt. pro ætatum ratione exhibentur, & aliquandiu continuantur.
- 6 Si calor febrilis Atrophix jungitur, exhibeantur Pulveres supra præscripti cum Nitro.
- 7 Topica emollientia & resolventia. Balnea, statim quando interna exhibentur, applicentur, ut resolutio eo citius & felicius succedat.
- 8 Quando Unguentum supra descriptum in usum trahendum est, ante inunctionem semper irroretur Oldest. Anisi.
- 9 Facta sufficiente resolutione & evacuatione, in usum trahantur tonica sive robur partium restituentia, inter quæ eminet Mixture Tonica Stablii, quæ simul insignem discutiendi virtutem possidet.
- 10 Ac tandem agmen claudant nutrientia sive alimen-

ta multum laudabilis chyli largientia.

- 11 Si a vermibus originem trahit Atropia, præter Merc. dulcem exhibeantur quoque alia Anthelminthica.
- 12 In Atropia ab Hæmorrhagii nimis orta, præ ceteris profunt nutrientia & gelatinosa.
- 13 Si Febres intermittentes male curatæ prodixerunt Atrophiam, præscribantur præter laxantia, Salia neutra aut in adulteribus Pilulæ Stahlianæ, quæ Febrem revocare solent quo facto, eo facilius postmodum Atropia curari potest.
- 14 In Atropia ab incantamentis orta, quidam laudant Balnea cum Hyperico, Antirrhino, Formicis &c. parata.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Purgantia fortiora affectum huncce magis exasperant & ad Hecticam facile disponunt, inpr. si subiecta fuerint sensibilibiora.
- 2 Mercurius dulcis majori dosi aut sæpius exhibitus, facile vomitus excitat, & dum per vomitus fortiores materia nondum resoluta nimium commoveatur, facile majora mala sequuntur.
- 3 Arcanum duplicatum, nisi optime sit præparatum, infarctum glandularum auget, ac præterea anxietates præcordiorum ac vomitum excitat.
- 4 Martialia, a plerisque aperitiva credita, sine præmissis Incidentibus & Resolventibus exhibita, infarctum glandularum minime tollunt, sed potius augent, ac hinc Hecticam eo magis invitant.
- 5 Doses omnium remediorum minores in hoc affectu summe proficue sunt, majores vero insignem operationem statim edentes, noxiæ.
- 6 Volatilia remedia sine præmissa sufficiente resolutione & evacuatione exhibita, materiam profundius in glandulas impellunt, ac Febrem augent, ita ut facile in Hecticam degeneret.
- 7 Nutrientia in principio mali male præscribuntur, quoniam obstructionem augent: idem judicium esto de lacticiis, corpore nondum præparato, exhibitis.
- 8 Frigus externum humores magis ad interiora pellit, & infarctum promovet.
- 9 Potus frigidus humores condensat, & hinc summe noxius est.
- 10 Omnes cibi difficilius digestionis, acidi, potus seculentus; panis calidus &c. insigniter nocent in hoc affectu.

## CAPUT SEXTUM.

## De Tuberculis sive Nodis Scirrhis Pulmonum.

I. *Definitio.* **T**ubercula pulmonum sunt concretiones Scirrhusæ, e congestione sanguinis aut infarctu pulmonum originem trahentes.

II. *Differentia.*

- 1 Alia sunt *cruda*, quæ ex materia ad suppurationem inepta scil. muco generantur, & sine febre comitante ægros ob solam magnitudinem suffocant.
- 2 Alia sunt *suppurata*, quæ ex sanguine generata, successu temporis suppurationem subeunt.
- 3 Alia hærent in *superficie* pulmonum, alia in *eius substantia* interiori, alia vero in *ipsa aspera arteria* reperiuntur.

III. *Signa.*

- 1 Minora talia tubercula sæpius admodum latent, & vix ulla signa manifesta diagnostica præbent, si vero majora & ad vomitam prona, sequentia observantur.
- 1 Tussis sicca & levis ab initio, postea vero sensim majora capiens incrementa.
- 2 Spirandi difficultas in principio minoris momenti, tandem tamen major, ita ut erecta cervice respirare cogantur ægroti.
- 3 Pectoris oppressio & gravitas Hypochondriorum.
- 4 Vox interdum rauca & clangosa.
- 5 Sub motu corporis aut situs mutatione major respirationis difficultas, cum sensu doloris.
- 6 Progressu temporis doloris augmentum, sive transitus a leviori in acutum, pectus & latera occupantem.
- 7 Inappetentia sitis, & insolita ad iram pronitas.
- 8 In quibusdam post motum aut tussim fortio-



globulorum lividorum, cœruleorum &c. pus vel materiam viscidam continentium, per asperam arteriam ejectio.

9 Accedit tandem Febris, quo ipso tempore omnia symptomata, inpr. Tussis, spirandi difficultas ac dolor augentur.

10 Excretio per tussim purulenta, factæ suppurationis index.

11 Capitis in quibusdam dolor anteriore in parte circa palpebras potissimum affligens.

12 Interdum aliqualis visus læsio.

13 Subfulvus faciei & habitus corporis color.

14 Lingua vel arida, vel lentore obducta.

15 Urina progressu morbi magis magisque tincta.

16 Macies insignis totum corpus occupans.

17 Somnus turbulentus & a tussi sæpius interruptus.

#### IV Subjectum.

1 Homines, inpr. vero Adolescentes & Juvenes macilenti sive Temperamenti Cholericæ Melancholici.

2 Congestiones sanguinis ad pectus passæ, nulla subsecuta cruoris excretionem, aut ejusdem plenaria discussione.

3 Tussis laboriosa humida, cum materiæ tenacis ejectione, antea affecti, & quibus pars hujus materiæ in pulmonibus remansit.

4 Hypochondriaci, Hystericæ alique sanguinis spissitudine laborantes.

5 Scorbutici, quorum sanguis ad grumosa concretiones & corruptiones pronus est.

#### V. Prognosis.

1 Tubercula e sanguine nata in suppurationem facile abeunt, & Vomica Pulmonum exinde oritur.

2 Ex tuberculi intusruptione, exolutio, vomitus (sive ejectio per superiora) & animi deliquium fit. 7. Aph. 8.

3 Tuberculum si quam citissime maturuerit, & eruperit, & pus sursum vertatur, ac totum expuatur, & ventriculus (cavitas) in quo fuerat pus, contrahatur ac resiccet, penitus sanus evadet. Hipp. Lib. I. de Morbis XIV. 5. 6.

4 Si vero ruptum fuerit quam celerrime, & maturatum ac repurgatum, verum penitus resiccati non poterit, sed ipsum tuberculum a se ipso pus produxerit, & a capite sane tunc itemque reliquo corpore pituita, ad tuberculum defluens putrescit & pus fit, ac expuitur, per quod homo perimitur. Perimitur autem a ventre fluente, ab hisquæ antea relata sunt. ibid. 7. 8. 9. 10.

5 Quod si multo tempore rumpi non possit neque sua sponte, neque a medicamentis, consumitur debilitatus a doloribus vehementibus, & inedia, & tussi, & febribus, & utpl. perimitur. ibid. Ubi adhuc plura huc pertinentia occurrunt. Vid. infra de Vomica Pulmonum & Empyemate.

6 Tubercula talia suppurata utpl. Phthisin post se trahunt.

7 Tubercula in pulmonum substantia & ex sanguine nata, peioris semper sunt consequentiæ, quam quæ in aspera arteria & ex pituita generantur.

8 Si una cum vomitu pus sequatur, siquidem pus fuerit album & fibræ in ipso subcruentæ fuerint, effugit: si vero lividum & cum virore pallidum ac graveolens, moritur. Hipp. Lib. II. de Morb. LV. 20. 21. 22.

#### VI. Remedia.

1 Venæsectio revulsoria sanguinis effluxum uberio-rem ad pectus impediens, inpr. præservationis gratia circa æquinoctia in pede instituta.

2 Blanda evacuantia: Manna, Tamarindi, Magnesia alba, Sal Catharticum amarum, Fol. Senn. Rhabbarbarum.

3 Tussim mitigantia & temperantia: Aborbentia, Lap. 5. Conch. præparat. Mat. Perl. Nitrosa, exiguus dosibus exhibita.

4 Lenia discutientia & abstergentia: Rad. Pimpin. alb. Caryop. Ari, Herb. Scabios. Veron. Hyssop. Chærefol. Hepat. nob. Virg. aur. Flor. Tussilag. Anth. Stœch. Arab. & in robustis fumus Antimonii puri. Flor. Sulph.

5 Anticatarthalia nimium seri fluxum ad pectus interceptant, uti sunt præter antea recensita Lign. Sassafr. Eff. Alexiph. Scord. Succin. Tinct. 5 ij.

6 Tonica pectus debilitatum roborantia, ubi inprimis convenit Mixtura Tonica Stahlî.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Potio laxans.

R. Decoct. Tamarind. ʒv. Colat. D. ad Vit. pro una vice.  
in quo dissolve.  
Mann. elect. ʒiss.

##### 2 Alia.

R. Aq. Cichor. ʒvj. Scent in digest. per noct.  
Fol. Senn. f. f. ʒij. Colat. adde  
Rhab. elect. ʒj. Mann. elect. ʒj. M.  
Tart. solub. ʒij. pro una vice.

##### 3 Pulvis laxans.

R. Magnes. alb. ʒss. ʒ vesperti dosis.  
div. in 6. p. aq. D. mane

##### 4 Alius.

R. Sal cathart. amar. ʒss Inf. Thee ʒ sumatur.  
solvatur in ʒvj. vel viij.

##### 5 Pulvis absorbens & temperans.

R. Lap. 5. Nitr. depur. gr. xv. M.  
Matr. perl. pro 4. vel 5. dos.  
5. diaph. ana. ʒss.

##### 6 Alius.

R. Conch. præparat. ʒj. Nitr. depur. ana. ʒss. M.  
Tart. Vitriolat. pro dos. 4.

##### 7 Infusum pectorale resolvens & abstergens.

R. Rad. Pimp. alb. Veron.  
Vincetox. ana. ʒij. Virg. ʒar. ʒā. mj.  
Liquirit. Incis. D. ad Gh.  
Tussilag. ana. ʒvj. Usurpetur ut infus. Thee.  
Herb. Scabios.

##### 8 Aliud resolvens & expectorationem promovens.

R. Rad. Vincetox. Fœnic. ana. ʒiss.  
Pimp. alb. Raf. L. Sassafr. ʒss.  
Caroph. ana. ʒij. Passul. min. ʒiss.  
Ari. ʒj. Hurd. excort. ʒij.  
Liquirit. ʒj. Incis. Cont. g. m. Coq. in Aq.  
Herb. Veron. simpl. ʒ. iv. vel v. et biban-  
Chærefol. tur bis vel ter per diem ʒiv.  
Hep. nob. ana. mfs. vel vj. calide.  
Sem. Anis.

#### VII. Methodus medendi.

1 Si tubercula sunt minora & sui aliquod indicium præbent, ac suspicio sit, ea ex congestione sanguinis, vel post Hæmoptysin in pulmonibus generata fuisse, Venæsectio locum habet in pedibus, ut hoc modo sanguis revellatur, magis tamen prodest præservationis, quam durationis gratia.

2 Maxime quoque conducunt lenia laxantia, quæ non solum humorum affluxum ad pectus interceptant, sed etiam sanguinis depurationi, dum partes ferossæ multæ per inferiora evacuantur, intersunt: & talia etiam laxantia cum prudentia exhibita, eo magis profunt, si corpora fuerint phlegmatica & catarrhalibus affectibus obnoxia.

3 Cum vero potissimum labe in pulmonibus hæreat, exhibeantur infusa supra præscripta pectoralia ex incidentibus & solventibus vegetabilibus parata, quæ sæpius insigne levamen afferunt in eo quoque casu, ubi tubercula jam exulcerata & aperta sunt, inprimis si Pulveres solares D. Richter ipsi junguntur quorum usum continuatum in Scirrhis & læsionibus, viscerum salutarem deprehendimus.

4 Si tussis urget, vel continentur modo dicta infusa, vel iisdem interponantur Pulveres absorbentes & Nitrosi.

5 Si subjecta sunt pituitosa, anticatarthalia remedia supra laudatis infusis addita vel interposita, insignem sæpius habent usum & ulteriorem pulmonum læsionem satis diu impediunt.

6 Si præmissis hisce omnibus signa consolidationis pulmonum apparent, quando scil. supra recensita symptomata molesta sensim sensimque imminuuntur, exhi-



exhibeantur tandem remedia tonica . Reliqua vide infra de *Vomica Pulmonum* .

### VIII. *Cautela Practicæ* .

- 1 Quamvis lenia Purgantia in hoc affectu admodum proficua sint, fortiora tamen & acriora, resinosa, summe noxia sunt, quoniam humores nimis commovent & æstum in corpore augent.
- 2 Præstat hoc in affectu lenibus remediis, & excretionibus placide promoventibus curam aggredi, quam multis remediis ægrotos obruere.
- 3 Prudens tamen remediorum abstergentium & resolventium continuatio maxime commendanda est.
- 4 Expectorantia remedia hoc in casu parum profunt, sed potius humorum affluxum augent, & corruptionem inceptam promovent: si tamen cum prudentia abstergentibus interponuntur, usum habent non contemnendum.
- 5 Balsamica & travmatica acriora nocent in hoc affectu, ut & adstringentia.
- 6 Frigus externum morbo hocce affectis minime prodest, quatenus aer frigidus inspiratus, labem pulmonum auget.
- 7 Omnia diætetica calida, acria, aromatica, hic summe quoque sunt noxia, pariter ac motus immoderatus & Venus.

## CAPUT SEPTIMUM.

### *De Scirrho Lienis.*

I. *Definitio*. **S**cirrhus Lienis est induratio ejusdem vel totalis, vel partialis, a sanguinis in eo hærentis nimia spissitudine, infarctu & successiva exsiccatione fibrarumque Lienis nimia vel debilitate & relaxatione, vel earundem constrictione originem trahens.

### II. *Differentia*.

- 1 Alius Scirrhus *totum viscus*, alius vero *partem tantum* ejusdem occupat.
- 2 Alius *conjunctus* est cum insigni *inflatione*, ut tactu deprehendi possit, in alio vero hæc abest, *durities* vero major observatur.
- 3 Alius est *recens*, alius *inveteratus*.
- 4 Alius a *causis externis*, alius vero ab *internis* ortum trahit.

### III. *Signa*.

- 1 Sensus pressionis aut ponderis in hypochondrio sinistro sub costis spuriis.
- 2 Sensibilis tumor aut durities oblonga in eodem loco-versus latus & lumbos se extendens.
- 3 Angustia præcordiorum constans, cum insigni respirandi difficultate, imprimis sub motu corporis & ascensu per acclivia.
- 4 Tussis sicca, vehemens & pertinax nunquam non, maxime vero noctu affligens, in malo scilicet graviore.
- 5 Exacerbatio difficultatis respirandi & tussis, quando ægroti in latus dextrum decumbunt.
- 6 Appetitus vel nullus aut nauseabundus, vel interdum satis bonus & avidus.
- 7 Repletio aut potius inflatio Ventriculi post sumptos cibos & sensus pressionis.
- 8 Alvi vel pertinax segnitie, vel inconstans excretio.
- 9 Urinæ paucitas, livor, viror ad nigredinem aliqualem tendens.
- 10 Pallor faciei & reliqui corporis cum flavedine ad fuscum vergente & aliquo modo nigricante, oculorum altior recessio, cum circulo livente eisdem ambiente.
- 11 Languor corporis insignis, torpor animi, morositas, taciturnitas & anxietas sine manifesta causa.
- 12 Intumescencia pedum per diem, noctu iterum dissipans, postea vero Oedema pedum & impr. sinistri constans.
- 13 In aliis Hydropicus corporis tumor, in aliis vero insignis macies.

### IV. *Subjctum*.

- 1 Melancholici aut alii ad hocce temperamentum

proni, in ætate virili aut consistente constituti.

- 2 Præ ceteris vero Hypochondriaca & Hysterica inveterata passione laborantes, & Hæmorrhoidum ac Mensium ataxias experti.
- 3 Diætæ crassiori, vitæ sedentariæ ac mœrori nimium indulgentes.
- 4 In febribus intermittentibus, impr. vero quartana perversæ per Adstringentia tractati.
- 5 Congestionibus aut Infarctu Lienis antea affecti.
- 6 Potum nimis frigidum majori copia in acutis assummentes.

### V. *Prognosis*.

- 1 Scirrhum Lienis, facile etiam Hepatis, Pancreatis & glandularum Melaicarum induratio, sequitur.
- 2 Scirrhus Lienis recentior rite tractatus, curationem admittit, inveteratus nunquam.
- 3 Lienis induratio sæpius sine periculo per plures annos durat, per emollientia vero applicata, fonticum facile fit malum.
- 4 Scirrho Lienis inveterato sæpius sinistri femoris, & pedis intumescencia dura lividi coloris, cum dolore interdum urente contusorio jungitur.
- 5 Scirrhus recentior, interdum in feminis per vomitum cruentum solvitur.
- 6 Si Hæctica aut Cachectico-Ascitica symptomata Scirrhum Lienis sequuntur, desperatum est malum:

### VI. *Remedia*.

- 1 Plethoram ceu causam antecedentem & foventem removementia: Venæsectio in pede, Scarificationes & Hirudinum in Hæmorrhoidariis ad anum applicatio.
- 2 Cacochymiam tollentia, evacuantia per alvum, sæpius continuanda, ex Fol. Sennæ, Rhabarb. Fibr. Rad. Helleb. nigr. Pil. ex Extract. amar. & gummatib. paratæ, Beccberianæ, Stahlianæ & Balsam. Viscerales nobis usuales, Clysteres.
- 3 Sanguinem spissum ceu causam Scirrhi continentem resolventia, potus sufficiens, motus corporis, inpr. equitatio, diætæ humida, Rad. Apii, Chin. Helen. Sarsapar. Pimp. albæ, Eryng. Polypod. Vincetox. Tarax. Caryoph. Cichor. Herb. Abrotan. Bellid. min. Cochlear. Fumar. Capill. Qis, Matrisylvæ, Beccabung. Marrub. Origan. Flor. Anth. Calendul. Stæch. Arab. Cent. min. Genist. Ononid. Semina Petrosel. Fœnic. Gum. Ammoniac. Galban. Sagapen. Salia fixa & neutra, δ. dulc. Emulsiva, Tincturæ & Essentiæ resolventes &c. Externe Unguenta & Emplastræ emollientia, Ungt. de Alth. Ol. Cappar. Lil. alb. Rutac. Empl. de Ammoniaco, de Galbano, Saponat. Barbette, de Cicuta, de Hyoscyam. &c. Cataplasmata.

### *Formula Remediorum.*

#### 1 Infusum laxans & resolvens.

Rx. Rad. Apii.	Aneth. ana. p. j.
Cichor.	Fol. Senn. f. st. ʒj.
Caryoph.	Fibr. Hell. nigr. ʒij.
Gent. rubr. āā. ʒij.	Sem. Petrosel.
Herb. Abrot.	Tart. Solub. ana. ʒiss.
Scolopendr.	Incisa infund. in Vin. alb.
Cap. Qis. ana. mss.	℞. v. sumantur quotidie mane jejunio stomacho ʒvj.
Flor. Calend.	

#### 2 Aliud.

Rx. Rad. Bardan.	Fol. Senn. f. st. ʒvj.
Vincet.	Rhab. elect.
Tarax.	Fibr. Hell. nigr. ana. ʒij.
Helen. ana. ʒij.	Cort. Aurant.
Summit. Cent. min.	Tart. Solub.
Origan.	Sal. Genist. ana. ʒiss.
Cuscut.	Incis. infund. in Vin. ℞. v.
Cochlear.	dosis ut antea.
Flor. Stæch. Arab. ana. p. ij.	

#### 3 Pilulæ refoleventes & laxantes.

Rx. Gumm. Ammon. in Aq.	Card. Ben.
to. solut. & inspiss. ʒij.	Cochlear.
Sagapen.	Hell. nigr. ana. ʒj.
Galban.	Aloes gummos.
Extr. Cent. min.	ʒss.
	Tinct.



*Tinct. Tart. q. f.* ad 20. *singulis hebdomadi-*  
*F. Pilul. ad gr. j. dosi xv.* *bus bis vel ter.*

4 *Alia.*

*R. Gumm. Ammon. Ac. sol.* *Tinct. §ij. q. f.*  
*§ij.* *M. f. Pil. ad gr. j. dosi ut*  
*Pil. Polychr. Hall.* *antea.*  
*Extr. Hell. nigr. ana. §j.*

5 *Alia.*

*R. MP. de Ammon. Querc.* *Eff. Succin. q. f.*  
*Pil. Polych. ana. §j.* *M. f. Pil. dosi ut supra.*

6 *Essentia resolvens & laxans.*

*R. Eff. Antihyp. Hall. §ss.* *multo vehiculo.*  
*Dos. 40. 60. 80. gut. cum*

7 *Essentia resolvens.*

*R. Eff. Alexiph.* *§ij. §j.*  
*Tinct. Tart.* *M. dosi 30. 40. gutt.*

8 *Alia.*

*R. Tinct. Tart.* *§ij.*  
*Liq. Tart. Tartaris. æ.* *M. dosi ut præcedentis.*

9 *Liquor resolvens & diureticus.*

*R. Liq. Tart. Tartaris.* *Dosi 40. 50. gutt. bis de*  
*§ss.* *die*

10 *Balsamum.*

*R. Bals. Samec. Parac. §ss.* *dosi eadem.*

11 *Emulio resolvens.*

*R. Amygd. dulc.* *Colat. §vj. vel viij. adde*  
*Sem. Card. Mar. aa. §ss.* *Matr. Perl. præparat. §j.*  
*Aq. Chares. q. f.*

12 *Linimentum emolliens & resolvens.*

*R. Ol. Lil. alb. §j.* *Destill. Fœnic. a. §ss.*  
*Cappar. §ij.* *Camphor. §j. Misce.*  
*Laur.*

13 *Unguentum emolliens.*

*R. Ungt. de Alth. §j.* *Rutac.*  
*Ol. Cappar. §ss.* *Laur. ana. §ij. M.*

14 *Cataplasma resolvens.*

*R. Farin. O furs. hord. a.* *Chamom. a. mfs. cum s. q.*  
*§ij.* *Lixivii & Sapa F. Catapl.*  
*Sterc. Caprill. §ij.* *adde Ol. Aneth. §ij. M. O*  
*Melilot.* *applicetur Scirrho.*

15 *Emplastrum emolliens & resolvens.*

*R. Empl. Diach.* *Succ. Cicut. ana. §ss.*  
*Gumm. Ammon. Aq. sol.* *M. f. Emplastrum.*  
*& inspiss. Galban.*

16 *Aliud.*

*R. Empl. de Ammon.* *Chares. q. f.*  
*Cicut. ana. §j.* *ad malaxandum.*  
*Ol. Cappar.*

VII. *Methodus medendi.*

1 Venæsectiones aliæque evacuationes sanguinis, tam præservatoriæ quam curatoria sollicitè, ubi opus est instituantur.

2 Ubi malum hocce originem traxit a Mensum vel Hæmorrhoidum suppressione, quantum fieri potest, fluxus hi per convenientia superius, ubi de hisce affectibus actum fuit, laudata remedia in ordinem redigantur.

3 Quodsi vero Febres intermittentes male curatas secutus fuerit Scirrhus, infusa incidentia & Laxantia, ut & Pilulæ ex Gummatibus amaris paratæ, diu continentur, ut Febri, si quidem possibile est, revocetur, & hoc modo concurrente Natura, Scirrhus resolvatur.

4 Si ex tumoris mollitie & imminutione successiva Scirrhum mitigatum aliquo modo esse apparet, tandem in usum trahantur Tonica, non sepositis tamen internis & externis solventibus & laxantibus.

VIII. *Cautele Practicæ.*

1 Nisi Medicus sollicitè respiciat ad causas Scirrhi, jisque cum summa prudentia remedia opponet, frustraneæ sunt omnes medicationes.

2 Omnes fortiores evacuationes, fluida nimium detrahentes, actu hic noxia sunt.

3 Sanguinis evacuationes in Scirrho Lienis a febribus male curatis oriundo, non solum nil profunt, sed Naturam magis debilitando eo facilius ad affectus, a Scirrho originem trahentes, disponunt.

4 Omnia commoventia, quæcumque demum illa sint,

in Scirrho Lienis plus damni, quam emolumentum afferunt.

5 Martialia remedia, ut & Acidulæ, nisi convenientia remedia præmissa fuerint, malum augent.

6 Gummi Ammoniacum sub forma pilulari, nec non Rad. Cichorii speciale quid in hoc morbo peragunt.

7 Nimia vero emollientia remedia externa, sine præmissa convenienti medicatione interna, Scirrhum ad exulcerationem disponunt.

8 Stomachica etiam calida remedia, ut & carminativa, nunquam sine periculo exhibentur.

9 Absorbentium abusus Scirrhum magis contumacem reddit.

10 Diætæ crassa malum auget, & Venus magis exsiccatur, prodest e contra motus corporis ac diætæ emolliens.

11 In Febribus intermittentibus ab adstringentibus imprimis fortioribus sedulo cavendum sibi est: sæpissime enim ejusmodi Scirrhi præposteræ febrium mendendi methodo, originem debent.

## CAPUT OCTAVUM.

### De Scirrho Hepatis.

#### I. *Definitio.*

Scirrhus Hepatis est induratio ejusdem, a sanguinis infarctu, aut nimia ac subitanea Hepatis constrictione, originem habens.

#### II. *Differentia.*

1 Scirrhus Hepatis alius est *totalis*, alius vero *partialis*.

2 Alius a *congestionem* & infarctu sanguinis, in Hypochondriacis præcipue, alius a *causis externis* magis oritur.

3 Differt a *Scirrho Lienis* ratione loci & symptomatum, quæ acerbiora & periculosiora sunt in Scirrho Hepatis.

#### III. *Signa.*

1 Tumor Hypochondrii dextri interdum satis conspicuus, cum majore vel minore tactu non raro perceptibili duritie, conjunctus.

2 Gravitas, tensio & dolor obtusus in eodem Hypochondrio, quem decubitus in latus sinistrum augeat.

3 Respirandi difficultas insignis, cum tussi aut Asthmate sicco, noctu & interdiu, sub motu corporis magis urgentibus.

4 Appetitus admodum prostratus, & post sumtos in minore quantitate cibos subitanea satietas, cum insigni sensu pressionis circa Ventriculum, & respirandi difficultate majore.

5 Febri lenta, imprimis malo augefcente, insigni corporis superioris contabescentiæ, juncta.

6 Tumor pedum Oedematosus & ascitica corporis inflatio.

7 Facies cachectica, pallida, ictérica, subfusca.

8 Alvi segnities, urina pauca, pallida, turbida, postea vero rubra & crassa.

#### IV. *Subiectum.*

1 Homines Plethorici, Melancholico-Cholericici aut Melancholico-Sanguinei, Hæmorrhoidum suppressioni obnoxii, aut consuetas sanguinis evacuationes negligentes.

2 Infarctu Lienis & Hepatis laborantes & in Febribus quartanis chronicis perverse tractati.

3 Quibus in Hæmorrhagiis nimia adstringentia remedia exhibita fuere.

4 Aut quibus externe topica refrigerantia in Hepatis regionem frequentius sunt imposita.

5 Qui corpore æstuante potum frigidum in nimia quantitate assumerunt.

6 Personæ Plethoricæ acidulis adstringentibus, aut etiam remediis volatilibus abusus.

7 Vehementioribus animi pathematibus commotæ.

V. *Pro-*



V. *Prognosis.*

- 1 Scirrhus Hepatis inveteratus omnem curationem respuit, recens vero ab infarctu natus, eam adhuc, quamvis difficulter, admittit.
- 2 Si Lienis Scirrhum Hepatis induratio secuta est, malum utpl. incurabile, imo funestum est.
- 3 Pedum Oedemata & Asciticus abdominis tumor Scirrhum incurabilem indicant.
- 4 Alvus lubrica, aut frequentes etiam Diarrhœæ, morbos alios, Scirrho ordinarie supervenientes, diu sæpius præcavent.
- 5 Quo magis successive generatur Scirrhus, eo magis constanter omnem medicationem recusat.
- 6 Indurationem Hepatis in subjectis Cholericis aut siccis Hæctica magis, in humidioribus vero Hydropes utpl. sequuntur.
- 7 Non raro quoque Scirrhus Hepatis exulcerationem incurabilem post se trahit.
- 8 Icterus interdum antecedit Scirrhum, interdum vero eandem sequitur, imprimis niger.
- 9 Hepatis Scirrhum interdum sequuntur febres acutæ periodicæ. (Observavimus id superiori anno in puella octo annorum, prima hujus febris periodus absoluebatur die septimo cum insigni euphoria: die octavo recrudebat febris, cui jungebatur aphonia: die decimo quarto cessabat altera periodus itidem cum euphoria, sed aphonia continuabat: die decimo quinto tertia periodus incipiebat, & ad vigesimum usque cum aphonia durabat: die vigesimo primo, Diarrhœa cum materiæ nigricantis ejectione morbum leviores reddebat: cum vero hæc die vigesimo secundo subito cessaret, sequebatur inflatio pedum & abdominis, fudor colliquativus, & sequenti die mors.

VI. *Remedia.*

- 1 Hic pariter ac in Scirrho Lienis causam antecedentem sive Plethoram in subjectis dispositis remouent evacuationes sanguinis artificiales, per Venæsectionem, Scarificationem & Hirudines.
- 2 Primas vias & sordes Scirrhum foventes evacuantia: Folia Sennæ, Rhabarbarum, Fibrillæ Rad. Helleb. nigri, Sal Catharticum amarum Epsomense, Tartarus Vitriolat. Arcan. duplic. Sal Polychrestum, Nitrum fixatum, Tart. Tartarificatus, Magnesia alba, Decoctum Tamarindorum, Passularum, Manna, Pilulæ Becherianæ veræ &c. Clysteres.
- 3 Incidentia & Resolventia varia, supra sub Infarctibus viscerum & Scirrho Hepatis laudata, imprimis vero pulveres Solares Richteri.
- 4 Antispastica & temperantia reliquis interposita, Nitrosa, Cinnabarina &c.
- 5 Tonica remedia & simul Discutientia: Mixt. Tonica Stahlî, Tinct. St. Ludov. Tinct. St. Helleb. elaborata.

*Formula Remediorum.*1. *Decoctum Laxans.*

R. Decoct. Tamarind. ℥iv. Tartarificat. ℥j. M.  
Mann. elect. ℥ij. Colat. d. pro j. dosi.

2. *Aliud.*

R. Decoct. passular. ℥iv. Rhab. el. ℥ss.  
Colat. fervent. inf. Tart. Tartar. ℥ij. bulliat.  
Sol. Sennæ s. st. ℥ij. leniter Colat. d. pro j. dosi.

3. *Infusum laxans & incidens.*

R. Rad. Apii. Fol. Senn. s. st. ℥vi.  
Petrofel. Rhab. elect. ℥ij.  
Cichor. Sem. Dauci.  
Bardan. ana. ℥ij. Fœnic.  
Herb. Abrotan. Tart. solubil. an. ℥ij.  
Capill. St. Incisa infunde in Vin. alb.  
Bellid. ℥. iv. vel v.

Flor. Stæch. Arab. a. p. ij.

4. *Aliud magis incidens resolvens & laxans.*

R. Rad. Caryoph. Cent. min. ana. mss.  
Vincetox. Flor. Bellid.  
Gentian. ana. ℥ij. Calend. ana. p. ij.  
Herb. Scord. Fol. Senn. s. st. ℥j.  
Cochlear. Fibr. Rad. Hel. nig. ℥ij.

Sem. Petrofel.

Siler. mont.

Cort. Ont.

Sal. Tart. ana. ℥ij.

Infunde ut antea.

5. *Pulvis abstergens.*

R. Tart. Vitriolat. Div. in 6. part. æq. detur  
Nitr. fixat. ana. ℥j. singul. 4. horis dos. j.

6. *Alius.*

R. Sal. Cathart. amar. Div. in 4. part. æq. mane &  
Arcan. duplic. ana. ℥j. vesperi.

7. *Decoctum Resolvens.*

R. Rad. Cichor. rec. Cancr. fluviat.  
Taraxac. ana. ℥ij. contus. num. iv.  
Herb. Bellid. rec. bulliant in jussculo carnis,  
Chærefol. colatura detur calide.  
Cochlear. ana. mss.

8. *Aliud.*

R. Rad. Apii. Trifol. Fibr. a. mss.  
Tarax. Sem. Carvi. Siler. mont.  
Cichor. ana. ℥ss. Crem. Tartari. aa. ℥ss.  
Herb. Veron. Harum specierum mss.  
Hed. Terrestr. Coque in Aq. simpl. ℥. j. co-  
Chærefol. lat. bibatur calide.

9. *Pulvis resolvens.*

R. Pulv. Car. Richt. dos. D. singul. diebus. 2. vel 3.  
xii.

10. *Pulvis Antispasmodicus.*

R. Nitr. depur. Cinnab. St. gr. xvij.  
Arcan. duplic. M. div. in 6. part. æq.  
Conch. citrat. a. ℥ij.

11. *Alius.*

R. Tart. Vitriolat. Cinnab. nativ. gr. xxiv.  
Nitr. regenerat. ana. ℥j. M. div. in 6. part. æq.

12. *Tinctura Tonica & resolvens.*

R. Tinct. St. Helleb. ℥ss. & vesperi.  
Dosi. 40. 50. gutt. mane

13. *Alia.*

R. Tinct. St. Ludov. M. dosi cadem.  
Liq. Terr. fol. Tart. a. ℥ss.

Reliquæ formulæ vid. capit. præcedentibus.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Sanguinis missiones imprimis præservatoriæ absolute necessariæ sunt, eæ tamen, quæ in pedibus instituuntur, magis profunt, quam Venæsectiones partium superiorum.
- 2 Hirudinum quoque ad anum applicatio, impr. in subjectis Hæmorrhoidariis, multum prodest ad removendam causam antecedentem.
- 3 Evacuationibus sanguinis vel præmittatur, vel subjungatur lenis laxatio; imo repetatur etiam, præsertim quando ægroti ad alvi adstrictionem admodum proni sunt.
- 4 Majorem adhuc usum præstant laxantia, si remedia incidentia & resolutentia ipsis junguntur.
- 5 Ad relaxandam nimiam Hepatis stricturem, remediis resolutentibus semper interponantur Antispasmodica, quæ præterquam quod stricturem tollant, alvum etiam lubricam servant.
- 6 Facta resolutione Scirrhî, remediis resolutentibus subjungantur Tonica roborantia, cum Resolventibus mixta.

VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 Venæsectio in pede semper præmitti debet Hirudinum applicationi.
- 2 Venæsectio præservatoria circa Æquinoctia semper præferenda est ei, quæ intermediis temporibus instituitur.
- 3 Evacuantia & Resolventia nisi diu usurpentur, parum juvant.
- 4 Vitentur tamen omnia acria Resolventia & Purgantia, quippe quæ ad faciliorem exulcerationem subjecta sanguinea & calidiora disponunt.
- 5 Martialia, sine præmissis Resolventibus & Laxantibus data, malum exasperant, sive Scirrhum graviores reddunt.
- 6 Idem etiam Opiata præpostere ad dolores sedandos exhibita, præstant.



- 7 Parem noxam Acidulæ & Thermæ adstringentes pariunt.
- 8 Diæta crassa nullius in hoc malo est utilitatis, e contra vero cibi lubricantes cum sufficiente potu profunt.
- 9 Ira, terror & tristitia studiose fugienda sunt, quia Scirrhum augent, aut medicationem jam inceptam turbant.
- 10 Motus nimius symptomata omnia graviora reddit, moderatus vero & continuatus ad Scirrhi resolutionem aliquid confert, huic tamen postea successive alii motus fortiores, impr. equitatio, subungi possunt.
- 11 Topica externa parum plerumque faciunt, ut tamen nihil intentatum relinquatur, resolventia emollientibus commixta usurpari possunt.

## CAPUT NONUM.

## De Vomica Pulmonum.

**Definitio.** **V**omica Pulmonum est abscessus, materiam purulentam continens, quod tandem rupto, illa per pulmones cum insigni periculo effunditur, vel in thoracis cavitatem infunditur.

**II. Differentia.**

- 1 A *Tuberculis pulmonum* solius magnitudinis respectu.
- 2 A *Phtisi*, quæ est ulcus pulmonum apertum, vomica vero clausum.
- 3 Ab *Empyemate*, quod extravasationem sive effusionem materiæ purulentæ in cavitatem pectoris denotat: vomica vero materiam purulentam in pulmone inclusam, significat.

**III. Signa.**

- 1 Tussis ab initio sicca, minime tamen gravis, quæ postmodum humida fit.
- 2 Cui vel statim, vel successu temporis jungitur spirandi difficultas.
- 3 Nonnulli sentiunt quoque hoc ipso tempore dolorem in pectoris quadam parte obtusum.
- 4 Insignis hisce jungitur simul corporis lassitudo.
- 5 Corpus etiam sensibilibus marcescit, ac facies modo rubet, modo pallet.
- 6 In nonnullis etiam observantur insignes anxietates.
- 7 In non paucis frequentes occurrunt lipothymia cum contractione habitus corporis, frigore extremorum, ac sudore frigido.
- 8 Alii sudoribus copiosis corripiuntur.
- 9 Febris lenta ordinarie hisce juncta est, qua corpus magisque extenuatur.
- 10 Tandem vel tacite & subito, vel ob causas externas risum, clamorem, tussim, sternutationem, motum corporis fortiolem, rumpitur abscessus & materia purulenta ejicitur, vel in thoracis cavitatem infunditur.

**V. Subjectum.**

- 1 Homines quibus congestio ad pectus facta non plenarie discussa fuit.
- 2 Plethorici, qui motu fortiori Plethoram nimis commoverunt, ac postmodum corpus, præcipue vero pectus, subito aeri frigido exposuerunt.
- 3 Personæ quibus tuberculum in pulmonibus natum est, ex quo aucto & suppurato, abscessus pulmonum successive originem traxit.
- 4 Homines quibus Hæmorrhagiæ narium, aut Hæmoptyles per adstringentia imprudenter suppressæ fuerunt, aut qui consuetas sanguinis evacuationes neglexerunt.
- 5 Homines vitæ sedentariæ dediti & sanguinis spissitudine laborantes.
- 6 Qui translationem sanguinis Hæmorrhoidalis, ob fluxum ejus suppressum, ad pectus passi sunt.
- 7 Injurias externas, vulnera pectoris, plagas aliasque læsiones passi.

8 Tussi graviore antea afflicti.

9 Qui defluxionibus catarrhalibus habitualibus diu laborarunt.

**V. Prognosis.**

- 1 Vomica minor ex tuberculo orta, sæpius diu sine multis & magnis incommodis in pectore latet, major vero & a subitanea sanguinis ad pectus congestionem producta, gravius statim affligit, & majori etiam periculo, dum brevi tempore rumpitur, ægrotantes exponit.
- 2 Quo magis profunde vomica in pulmonibus hæret, eo facilius dum rumpitur, ægrotos suffocat, aut eo graviolem post rupturam pulmonum minatur corruptionem.
- 3 Quæ in exteriore pulmonum substantia hærent vomica, minoris quidem periculi, dum minora ipsis junguntur symptomata, videntur esse, sed respectu empyematis, quod facile earundem rupturam sequitur, nihilominus summe periculosæ sunt, quatenus empyema, nisi materia purulenta mature per paracentesin e pectoris cavitatem educatur, ægrotos brevi tempore jugulat.
- 4 Si vomica majores rumpuntur, ægroti sæpius sub ipsa puris excretionem suffocantur.
- 5 Abscessus ad aures & pedes boni in Vomica pulmonum. *Bagliv. ex Hippocr.*
- 6 Si rupto abscessu nihilominus respiratio insigniter est laboriosa, quamvis insignis quantitas materiæ purulentæ ejecta fuerit, indicat pulmonum insignem exulcerationem brevi mortem inferentem, quod aliquoties in Vomica post Pleuritidem observavimus.
- 7 Si Vomica diutius persistit in pectore ac non rumpitur, accedente sudore frigido, frigore extremorum ac lipothymiis, lethalis est.
- 8 Quo minus cocta est materia purulenta per superiora ejecta & quo magis fætet, eo certius pulmonum corruptio, brevi mortem inferens, expectanda est.
- 9 In corporibus cacoehymicis, ob affluxum materiæ falso serosæ, consolidatio ulceris post rupturam vix speranda est.
- 10 Major vero spes affulget, si corpus alias fuerit sanum & si sanguinis aditus ad partem affectam est liber, quoniam hoc modo partes ulcrosæ facilius eluuntur, & ulcus sensim sensimque exsiccat & consolidatur.
- 11 Si post ruptum abscessum febris cum respirandi difficultate continuat, ac corpus magis magisque extenuetur, cum insigni & quotidie invalescente virium lapsu, funestum utpl. est.

**VI. Remedia.**

- 1 Blanda laxantia & alvum apertam servantia, Manna, Magnesia alba, Tamarind &c. ut & Clysteres emollientes, carminativi & leniter simul alvum aperiantur.
- 2 Venæsectio revulsoria in pedibus aut etiam scarificationes ibidem institutæ.
- 3 Abstergentia, discutientia & simul expectorationem promoventia uti sunt Rad. Ari. Bardan. Pimp. alb. Vincetox. Tussilag. Herb. Hyssop. Scabios. Bellid. Chærefol. Sem. Carmin. Liquir. Passul. Ficus &c.
- 4 Mundificantia & Balsamica; Terebint. inpr. cocta, Bals. Ind. alb. & Peruv. Thus, Mastix &c.
- 5 Traumatica. Rad. Symphyt. Plantag. Tormentill. Herb. Veron. Virg. Aur. Hed. Terr. Pilosell. Sanic. Pyrol. Plantag. Fl. Hyper. Ros. rubr. &c.
- 6 Febrem & Tussim mitigantia: Lap.  $\omega$ . Conch. præparat. Mat. Perl.  $\zeta$ . diaph. Nitrum, Ess. Alexiph. Scordii saturata, MP. de Cynoglossa Pulveribus absorbentibus & nitrosis admixta & vesperi exhibita.
- 7 Sitim mitigantia: præter Nitrosa antedicta, Succus aciduli, inprimis vero succus Citri præ ceteris pectori amicus, Emulsionem &c.
- 8 Tonico-discutientia, uti Mixt. Tonica Stahlî ex Tinct.  $\zeta$ ij. acri & Spir. C.C. parata.
- 9 Nutrientia & vires corporis restaurantia & maciei occur-



occurrentia : juscula , mucilago hordei, Emulsiones, Gelatinæ &c.

*Formulae Remediorum.*

1. Potio laxans.

R. *Aq. Veron.* Mann. elect. ℥ij. M.  
Tussilag. ana. ℥ij. pro una vice.

2. Alia.

R. Decoct. Passul. ℥iv. Syr. violar. ana. ℥j M.  
Mann. elect. pro una vice.

3. Pulvis laxans.

R. Magnes. alb. ℥ij. D. singulis diebus mane  
Div. in 3. p. æq. dos. j.

4. Infusum pectorale abstergens.

R. Rad. Liquirit. ℥vj. Sem. Anis.  
Vincetox. Fœnic.  
Pimpin. alb. & ℥ss. Card. Mar. ana. ℥ij  
Ari. ℥ij. Inc. Cont. usurpentur ut Infus.  
Herb. Capill. ♂. Thæe, bulliant tamen ali-  
Hyssop. quandiu.  
Scabios. ana. m̃j.

5 Infusum Traumaticum & discutiens.

R. Rad. Vincetox. Sem. Hyperic.  
Pimp. alb. & ℥ss. Card. Mar. a. ℥ij.  
Ari ℥ss. Coq. in ∇ simpl. ℔. iij. ad re-  
Herb. Veron manent. ℔. ij. Colat. adde  
Virg. ♂. Syr. Viol.  
Scabios. de Alth. a. ℥vj. biba-  
Sanic. tur vitrum ter vel quater  
Hed. Terr. aa. m̃ss. per diem.

6 Aliud

R. Rad. Cichor. Raf. Sant. r.  
Vincetox. ana. ℥ss. Sem. An. ana. ℥j.  
Ari. Liquir. ℥ss. Incis.  
Helen. Coq. in ℔. iij. ∇ ad consumpt.  
Petasit ana. ℥ij. tert. partis.  
Herb. Veron Colat. adde  
Hed. Terr. aa. m̃ss. Syr. de Alth.  
Sumit. Hyper. m̃j. Symp. a. ℥vj. M.  
Cent. min. D. ut antea  
Millesfol. ana. m̃j. Blazer. ex Stablio.

7 Potio abstergens & temperans.

R. Aq. scabios. Tart. Vitriolat. ana. ℥j.  
Chærefol. Sacch. perlat. ℥ij M.  
Veron. ana. ℥ss. dos. Coch. ij. singulis 6. vel 8.  
Conch. citrat. horis.

8 Potio diapnoico-temperans.

R. Aq. Scord. Tart. Vitriolat. ana. ℥j.  
Hyssop. Nitr. depur. ℥ss.  
Chærefol ana. ℥ij Tab. M. Chr. f. ℥ss. M.  
Lap. ♂. citr. D. ut antea.  
♂ diaph.

9 Emulsio diapnoico-temperans.

R. Sem. Card. Mar. adde Dent. apr. præparat.  
Hyper. Mandib. luc. pisc.  
Soph. Chirurg. & ℥ss. ♂ diaph. ana. ℥ss.  
Aq. Chærefol. Scabios. Sacch. Canar. ℥vj. M.  
Card. Ben. ana. ℥ij. D. sæpius cochlearia ali-  
F. l. a. Emulsio. quot.

10 Emulsio consolidans balsamica.

R. G. Junip. Scabios. Veron.  
Mastich. ana. ℥j. Hyssop. & ℥ij. l. a.  
Tereb. coct. Emulsio. Colat. adde  
Bals. Peruv. ana gr. xv. Sacch. perlat. ℥j. M.  
Terantur cum Amygd. dulc. Dos. coch. j. vel ij. sing. 2.  
excort. ℥j. ac F. c. vel 4. horis.  
Aq. Chærefol.

11 Bolus mundificans & consolidans.

R. Conf. ros. antiq. ℥j. Bals. Peruv. gutt. iv.  
G. Junip. Syrup. de Alth q. f.  
Mallich. ana gr. xv. M. F. Bo us pro una vice.

VII Methodus medendi.

1 Primaria intentio in hoc affectu semper esse debet matura absterio apostematis aperti, & evacuatio materiæ purulentæ in Pulmonibus hærentis; cum vero humorum affluxus sæpius tantus sit, ut licet absterio sufficiens fiat, nihilominus semper nova materia corrupta generetur, ac biliosæ partes in corpo-

re remanentes Febrem augeant, exhibenda sunt remedia lenia evacuantia; quæ etiam toto curationis tempore ad alvum apertam servandam reliquis interponenda sunt.

2 Fortius adhuc revellit & præsentius etiam auxilium affert Venesectione in pede instituta, si subjecti conditio eam permittit: quatenus per hancce non affluxus tantum imminuitur, sed etiam ingravescentis Febris sensibilibiter imminuitur.

3 Quo vero eo magis affluxus impediatur, post Venesectionem statim exhibeatur Essent. Alexipharmaca ex Radic. & larga quantitate Scordii parata, quæ & egregie discutit, & respectu Scordii putredini & ulteriori exulcerationi resistit, ut taceam quod diaphoresin & diuresin promoveat.

4 Cui jungantur vel postponantur supra laudata Infusa abstergentia & discutientia, sæpius calide sumenda.

5 Egregium quoque abstergendi usum habent mellita, uti mel despumat. rosac. quæ modo dictis Infusis admisceri possunt. Talia mellita adhuc majorem abstergendi vim obtinent, si Terebinthina cocta, Mastiche aliaque Gummata mitiora ipsis adduntur.

6 Infusis antea laudatis semper addatur Rad. Ari, quippe quæ insigni incidendi, resolvendi & abstergendi vi pollet, & hujus respectu fere omnibus aliis præferri meretur.

7 Si ulcus sufficienter mundificatum est, tam per Infusa calida, quam per Emulsiones supra præscriptas quæ in ulceribus internis & mitiganda quoque Febre egregie se gerunt, iisdem infusis addantur lenia traumatica, ita quidem ut abstergentia dosi superent; ut hoc modo ulcus mundificatum sensim consolidetur. Consultum tamen est ab usu abstergentium hisce interponendorum non desistere.

8 Hoc in casu etiam maxime laudatur Conserva Rosarum imprimis antiqua diu usurpata, quæ abstergit & consolidat, inpr. si ex ea cum supra laudatis temperatis balsamicis parati Boli exhibentur ægrotantibus.

9 Ad mitigandum æstum febrilem fiant Julepi ex Aquis pectoralibus & abstergentibus, cum succo Citri & sufficienti quantitate sacchari. Nitrum eandem efficaciam habet, sed moderatis & repetitis dosibus exhibitum.

10 Febrem mitigant, & affluxum ad pectus impediunt Potiunculæ diapnoicæ cum Nitro, imprimis si in ultimo casu parum MP. de Cynogl. ipsis additur, hoc enim modo tussis maxime affligens, simul mitior redditur.

11 Tandem egregium habet usum Mixtura Tonica Stahliani, quæ facta consolidatione Pulmones roborat, & novum affluxum ad pectus discutiendo impedit.

VIII. Cautela Practicæ.

1 Si ullibi, in Vomica sane Pulmonum caute procedendum est, ne perversa methodo ægroti summo in periculo versantes, in majus præcipitentur.

2 Quare abstinendum est partim a fortioribus Purgantibus, partim ab aliis quoque commoventibus & imprimis volatilibus, quæ & vires frangunt & Febrem augent, ac sæpius expectorationem summe necessariam supprimunt.

3 Nisi reliquæ Excretiones corporis in sua integritate conserventur, propter remanentes in corporeordes & affluxum ad pectus, curatio hujus affectus ut plurimum est frustranea, vel multis difficultatibus subjecta.

4 Si Venesectionis usum status Pletoricus, consuetudo & Febris non urgent, ea consultius intermittitur, magis enim præservatorie quam curatorie prodest.

5 Expectorantium dulcium & emollientium abusus quam maxime vitandus est, quoniam affluxum humorum ad pectus & corruptionem augeat.

6 Adstringentia & traumatica fortiora caute sunt usurpanda, quoniam non raro expectorationem supprimunt.

7 Opiata nisi caute usurpentur, eandem efficaciam habent, ac vires simul insigniter frangunt.



- 8 Nitrum quamvis æstum Febrilem optime temperet, cum prudentia tamen, varius & parvis dosibus exhibendum est, quatenus tussim auget.
- 9 Balsamica & abstergentia acriora, nisi refracta dosi exhibeantur, facile Febrem intensiorem reddunt; inprimis vero Myrrhæ cautus sit usus, quia non solum Febrem auget, sed etiam graviter humores commovendo sanguinis eruptionem per Pulmones excitat.
- 10 In Diætâ vitentur animi Pathemata graviora, Vinum, motus nimius &c.

## CAPUT DECIMUM.

## De Empyemate.

I. *Definitio.* **E**mpyema est collectio puris in pectore, sive ejusdem effusio in cavitatem pectoris a Vomica rupta, inflammatione, sanguine extravasato &c. originem trahens, respirationem & cordis motum insigniter & non sine vitæ periculo turbans.

II. *Differentia.*

- 1 A Vomica, quæ est puris in viscere quodam collectio, empyema vero est ejusdem in cavitatem quandam & inprimis thoracem effusio.
- 2 Ab ulcere pulmonum, quod vel materiam in asperam arteriam infundit, vel si orificium ejus in cavitatem pectoris hiat, Empyema producit, adeoque ordine prius est, sive ulcus interdum est causa, Empyema vero productum.
- 3 Ab Hydrope pectoris, cujus materia est serum, Empyematis vero materia purulenta. Reliquas differentias vide infra de Hydrope Pectoris.
- 4 Ipsum etiam Empyema differt ratione causarum.
  - a Aliud enim oritur a vomica pulmonum, superficiem obfidente, rupta.
  - b Aliud inflammationem Pleuræ & pulmonum, & abscessum exinde natum ac disruptum sequitur.
  - c Aliud Anginam in pectus se extendentem excipit.
  - d Aliud extravasationem sanguinis a causis violentis, vulneribus, plagis &c. ortam tanquam causam agnoscit.

III. *Signa.*

- 1 In Pleuritide, Peripnevmonia, Angina, Vomica subitanea doloris, vel acuti, vel obtusi cessatio.
- 2 Et hanc excipiens insignis respirandi difficultas, cum tussi sicca continuo affligente.
- 3 Augetur hæc difficilis respiratio, si ægroti in latus sanum decumbunt.
- 4 Nonnunquam, quando ægroti corpus profundius declinant, suffocationis periculum imminet, quod erecto corpore, aut quando ægroti decumbunt, cessat.
- 5 Sensus gravitatis ac ponderis in diaphragmate circa costas nothas.
- 6 Sensus materiæ in cavitatem pectoris fluctuantis, inprimis quando situs corporis mutatur, cujus materiæ fluctuatio non raro etiam sonum excitat; ita ut ab adstantibus audiri possit.
- 7 Cessatio Febris acutæ in Pleuritide & huic succedens Hæctica, Febris interdiu mitior, noctu vero gravior.
- 8 Successiva imo maxime invalescens corporis & inprimis faciei extenuatio, ac virium prostratio.
- 9 Sputum aliquando etiam purulentum observatur.
- 10 Accedunt hisce frequentes anxietates, palpitationes cordis & lipothymia.
- 11 Interdum sentiunt ægrotantes vaporem calidum e pectoris cavitatem ad os ascendentem.
- 12 Alii in malo graviore percipiunt saporem putridum in ore.
- 13 Sudores nocturni multi sunt, sed inutiles, & corpus magis fatigantes & extenuantes.
- 14 Facies rubet inpr. eo in latere, in quo abscessus ru-

- ptus fuit, nonnunquam vero phlogoses tantum adfunt.
- 15 Tandem facies magis magisque contabescit, oculi fiunt concavi.
- 16 Pulsus, inpr. in latere affecto est celer, sed sæpius intermittens.
- 17 Nonnunquam ungues curvi & pustulæ in thorace observantur.
- 18 Sæpius quoque pedes fiunt tumidi & in pectoris latere affecto observatur cutis inflatio ac tumor. vid. Hippocr. Prognost. XVI. 12. & seq.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines qui Pleuritide, Peripnevmonia, Angina & exinde enato abscessu, aut qui Vomica ex aliis causis laborarunt.
- 2 Quibus pectus vulneratum & sanguis in ejusdem cavitatem effusus, ac suppuratus fuit.
- 3 Aut etiam quibus chylus ob læsum ductum thoracicum in thoracis cavitatem effusus fuit.

V. *Prognosis.*

- 1 Empyema gravis affectus est, & maxime periculosus, quatenus materia purulenta viscera corrodendo ulterius corrumpit, nisi vel a Natura, vel manu chirurgica, sive per Paracentesin evacuetur.
- 2 Empyici superstites manent, si febris eisdem eodem post eruptionem die dimiserit: & qui cibos cito apperiverint & a siti liberati fuerint: & si venter parva & compacta egerit, & pus album & læve & ejusdem coloris fuerit, & a pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem repurgetur. Hippocr. Prognost. XVII. 9. & seq.
- 3 Intereunt vero hi, quos febris non dimiserit, aut ubi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalcens apparuerit: & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetiverint, & si venter liquidus fuerit, & pus pallidum sive viride & lividum expuerint, aut pituitosum aut spumosum. Si hæc omnia contigerint, pereunt. *ibid.*
- 4 Quibus vero ex his quædam acceperint, quædam non, horum aliqui intereunt, aliqui in multo tempore superstites evadunt. *ibid.*
- 5 Quicumque ex Pleuritide suppurati fiunt, si in quadraginta diebus repurgati fuerint, ab ea die qua ruptio facta fuerit, liberantur. Si vero non, ad tabem transeunt. Hippocr. 5. Aphor. 15.
- 6 Non pauci Authores, materiam purulentam interdum per vias urinarias cum euphoria evacuari, testantur, qua de re vid. Sennert. Prax. Lib. II. Part. II. Cap. XVII. Quest. 5. quomodo autem hoc fieri possit, obscurum est.
- 7 Quicumque suppurati uruntur aut secantur, si quidem pus purum fluat & album, evadunt. Si vero subcruentum & cænosum ac graveolens, pereunt. Hippocr. 7. Aph. 44.
- 8 Quicumque suppurati secantur aut uruntur, hi pure acervata effluente, omnino moriuntur. Hippocr. 6. Aphor. 27.
- 9 Quo magis invalescit Febris Hæctica cum extenuatione corporis & virium jactura, eo magis metendus est funestus exitus.
- 10 Suppuratio, quæ utramque thoracis partem occupat, periculosior est, quam quæ unicam. *Etmull.*
- 11 Purulentos moderatius habentes, si sputa graveolentia consequuntur, recidiva interimit. Sennert. ex Hippocr. Coac.
- 12 Quibus specillum a pure velut ab igne coloratur, ii fere moriuntur. *ibid.*
- 13 Ex suppurationibus, quas Pulmonum morbi excitarunt, fere senes moriuntur, ex ceteris vero juvenes. *ibid.*
- 14 Quibus in magna puris copia, intra thoracem & pulmonem collecta, totus thorax in respiratione attollitur, celerrime suffocantur. *ibid.* ex Galeno 4. de Loc. affect. Cap. 7.

VI. *Remedia.*

- 1 Paracentesis, sive matura materiæ purulentæ e Pectoris cavitatem evacuatio.



- 2 Impedimenta Paracenteseos remouventia: & quidem  
 a Blanda laxantia: Manna, Tamarindi, Magnesia, Clysteres &c.  
 b Nimum affluxum humorum impredientia, discutientia scil. superioribus casibus laudata, Venæsectio &c.  
 c Febrem mitigantia; Absorbentia, Diaphoretica fixa, Salia neutra, Nitrosa blanda acida &c.  
 d Vires deperditas restaurantia: Analeptica, Confortantia, Emulsiones, juscula, &c.  
 e Sanguinem congruatum vel resolventia, vel ejusdem supputationem promoventia: Rad. rub. tinct. Caryophyll. Pimpin. alb. Herb. Scabios. Chæresfol. Hyperic. Bellid. min. Hyssop. Arnic. cum toto, in aqua vel cerevisia cocta, Sem. Anis. Fœnic. Card. Mar. Hyper. &c.  
 3 Abstergentia & Mundificantia, inpr. vero decocta ex iisdem parata, partim hausta, partim vero per Syringam injecta.  
 4 Consolidantia, Traumatica pariter in Decoctis in & externe usurpata.

*Formula Remediorum.*

1 Potio laxans.

Rx. Tamarind. ℥ss. Mann. Calabr. ℥ij.  
 Coq. in f. q. Aq. Colat. D. calide prouna  
 in Colat. ℥v. dissolv. vice.

Alia.

Rx. Fol. Senn. f. f. ℥ij. Aq. scabios. q. f.  
 Rhab. elect. ℥j. Colat. ℥vj. adde  
 Sal. Tart. ℥ss. Syr. rosar. solut. ℥vj. M.  
 infund. per noct. in

2 Emulsio analeptica & discutiens.

Rx. Aq. Scabios. Colat. ℥viij. adde  
 Scord. Aq. Cinnam. Bugloss. ℥j.  
 Chæresfol. ana. q. f. & diaph. ℥ij.  
 Amygd. dulc. ℥ij. Tab. M. X. f. ℥ss. M.  
 Sem. Card. mar. ℥ss. D. sæpius cochleatim.  
 Fl. l. a. Emulsio.

3 Pulvis confortans & abstergens.

Rx. Pulv. Car. Richt. dos. D. singulis 3. vel 4. horis  
 vj. dos. j.

4 Potiuncula diaphnoico-confortans.

Rx. Aq. Scabios. ℥iv. Pulv. Car. dos. iij.  
 Cinnam. cydon. ℥vj. Tab. M. X. perl. ℥ij.  
 & diaph. D. singulis 4. vel 5. horis  
 Matr. Perl. ana. ℥ss. cochleatim.  
 Nitr. perlat. gr. xv.

Alia confortans.

Rx. Aq. Borrag. Ess. dulc. Hall. ℥j.  
 Bugloss. ana. ℥ij. Conf. alk. inc. ℥ss. M.  
 Cinnam. cyd. ℥j. D. sæpius cochleatim.  
 Succ. citr. rec. ℥ij.

5 Essentia diaphnoico discutiens.

Rx. Ess. Alexiph. ℥ij. Dos. 25. gutt. semel vel bis  
 Scord. ℥j. M. per diem.

Alia simul confortans.

Rx. Ess. Alexiph. Dos. 20. gutt. bis vel ter  
 Dulc. ana. ℥j. M. per diem.

Alia.

Rx. Ess. Dulc. concentr. ℥j. 2. 4. 6. horis in summa vi  
 Dos. 5. vel 6. gutt. singulis rium debilitate.

6 Decoctum mundificans internum.

Rx. Rad. Pimp. alb. Scord. ana. mfs.  
 Bardan. Caric. Pingu.  
 Vincetox. Pass. maj. exacina. ℥ss.  
 Chin. Hord. mund. ℥ij.  
 Aristol. rot. aa. ℥ij. Coq. in Aq. simpl. ℥v. iij. ad  
 Liquirit. remanent. ℥ij.  
 Herb. Veron. Colat. adde  
 Virg. Or. Syr. de symph. ℥ij. M.  
 Capill. ♀. D. sæpius calide.

7 Decoctum mundificans & consolidans exter-  
 num.

Rx. Rad. Symph. Tyrol.  
 Aristol. rot. Plantag. ana. mfs.  
 Bardan. Coq. in Aq. ℥v. iij.  
 Bistort. Colat. adde  
 Herb. Agrimon. Solat. Myrrh. ℥ss.  
 Hed. Terrest. M. injiciatur sæpius cum  
 Scord. Syringa calide.  
 Sanic.

VII. Methodus medendi.

- 1 Si purulentam materiam in pectore contentam esse omnes circumstantiæ indicant, non datur tutius remedium, quam Paracentesis, sive matura ipsius materiæ evacuatio: per quam ulterior Pulmonum corruptio præcavetur. De Empyematis Chirurgica tractatione agemus prolixè in Chirurgia.
- 2 Præstat tamen, nisi aliæ circumstantiæ urgeant, eisdem præmittere blandam laxationem, ac Venæsectionem.
- 3 Commode etiam post laxationem exhiberi possunt lenia Diaphoretica & Discutientia, partim ad Febrem mitigandam, partim ad majorem affluxum ad Pectus præcavendum.
- 4 Facta evacuatione, locum habent injectiones per Syringam ex Herbis abstergentibus, traumaticis & pectoralibus, cui balsamica addantur, ad mundificandum atque abstergendum ulcus.
- 5 Eidem fini etiam inserviunt abstergentia & Balsamica, sub forma decoctorum sumpta, quæ mundificationem & consolidationem ulceris optime promovent.
- 6 Cum vero affluxus humorum ad locum affectum abstersionem & consolidationem maxime impediatur, affluxus ille intercipiatur partim per Laxantia, partim per Diaphoretica & Discutientia, ut & per lenia Diuretica.
- 7 Si Febris adhuc urget, mitiganda est per Diaphoretica fixa, Absorbentia, Nitrosa, Emulsiones &c.
- 8 Viribus prospiciunt supra præscripta Analeptica & Confortantia, inpr. vero Pulveres Solares, quæ præter insignem, quam possident, confortandi vim, simul ulcus Pulmonum abstergunt, & consolidant.

VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Nisi materia mature e Pectore evacuetur, frustra postmodum instituitur Paracentesis, imo curatio quoque post nimis tardam evacuationem, utpl. frustranea est.
- 2 Materia purulenta non simul atque semel, sed potius repetitis vicibus sive successive evacuetur. juxta præceptum Hippocratis & solertissimorum Chirurgorum.
- 3 Si ægroti vires nimum fractæ sunt, frustra instituitur Paracentesis & ægroti eo facilius moriuntur.
- 4 Si Pulmones aliaque respirationis organa ita corrupta sunt, ut nulla reconvalescentiæ spes supersit, frustra æger cruciatur sectione vel ustione, veteribus usuali.
- 5 Nitrosa aliaque Salina, ad imminuendam Febrem alias satis proficua remedia, nisi parva manu exhibeantur, & tussim & exulcerationem augment.
- 6 Opiata minus proficua sunt in hujus affectus curatione, quoniam exulcerationem promovent, imo sphacelo viam sternunt.
- 7 Aer frigidus in hoc affectu semper noxius est, sive per asperam arteriam in Pulmones, sive per apertum Pectus in ejus cavitatem ingrediatur, quare summo studio vitandus est.
- 8 Fugienda quoque sunt in Diætâ omnia calida, & animi pathemata graviora, Febrem aliaque symptomata exasperantia.



## CAPUT UNDECIMUM.

## De Exulceratione Pulmonum sive Phthisi.

**Definitio:** Phthisis, stricte dicta, est ulcus Pulmonum, a vomica, vel alia stasi corruptoria, ortum trahens, insigni corporis contabescencia, Tussi, Febre, Hæctica aliisque symptomatibus stipata.

**Differentia.**

Alia est recens sive incipiens, ubi scil. dispositio, sive nodi scirrhusi, vel ex sanguine, vel ex mucida tenaci materia orti, rursim Phthysicam excitant; alia vero inveterata, sive confirmata, ubi actualis exulceratio Pulmonum Phthysicos est causa, quando scil. antedicti nodi scirrhusi actualement conceperunt putredinem, & Pulmonum substantiam simul corruerunt.

Alia est sine Febre Hæctica, aut levis tantum huiusmodi Febris eidem jungitur, ut incipiens, alia eandem comitem individuum habet, uti confirmata.

Alia brevi tempore ægrotos jugulat, v.g. Phthisis juniorum, alia vero non nisi longo elapso tempore funesta fit, ut Phthisis senum.

Alia a causis internis, congestionem scil. sanguinis & stasi corruptoria dependet: alia vero a causis externis, vulneribus, lapsu, potu frigido post insignem corporis incalescentiam &c. originem trahit: illa frequentior est, hæc vero rarior.

Phthisis differt a Vomica Pulmonum.

a Respectu essentiae, Vomica enim est abscessus in Pulmonibus latens, Phthisis vero est ulcus sordidum, Pulmones sensim depascens.

b Respectu partis affectæ: quamvis enim uterque affectus Pulmones affligat, Vomica tamen vaia, Phthisis vero substantiam magis Pulmonum occupat.

c Respectu durationis & periculi: Vomica enim citius, Phthisis vero tardius ægrotos jugulat.

d Respectu ordinis, quoniam Vomica sæpius præcedit, Phthisis vero ab eadem sæpius originem trahit.

Ab Hæctica, varias viscerum abdominis læsiones comitante, partim ratione subjecti, partim respectu signorum suo loco recensendorum: præcipue vero differentia in eo consistit, quod in Phthysi Pulmonali post profundiores inspirationem, tussis & respiratio difficilis maxime intendatur, quod in reliquis Hæcticæ speciebus non observatur: cui adde, quod Febris in vera Phthysi nonnunquam absit, quæ tamen viscerum abdominis læsiones ordinarie comitatur.

Ab Atrophia, partim respectu ætatis, Atrophia enim junioribus magis est familiaris, Phthisis vero adultis: partim ratione partis affectæ.

**Signa.****a Incipientis.**

1 Tussis sicca sive arida, in quibusdam per intervalla repetens, in aliis vero continua fere, quæ a levioribus causis, respiratione scil. profundiore, aere frigido &c. facile exacerbatur, ac noctu gravius affligit: cum materiæ vel paucæ, aut nullius vel multæ excretionem.

2 Respiratio difficilis, frequens & insignis angustia cum sensu rei cuiusdam pectus comprimentis.

3 Siccitas oris & glutinositas salivæ, sitis cum inappetentia, aut saltem appetitu frigidorum.

4 Tussis post pastum major & continua cum rejectione ciborum per vomitum, post quem tussis mitior redditur.

5 Vox rauca & clausa & respiratio anhelosa, sub motu corporis citatiore.

6 Sensibilis consumptio corporis, cum increcente indies majori virium lapsu.

7 Calor hæcticus post prandium magis affligens, cum pulsu celeriore, in partibus exterioribus, inprimis vero in manuum volis se exerens.

8 Somnus a tussi sæpius interruptus, aut ob eandem causam continuæ vigiliæ: aut etiam si dormiant interdum ægrotantes, nullam tamen exinde sentiunt refectionem, sed potius majorem lassitudinem.

9 Urina sæpius sanorum urinæ similis, in aliis vero ad rubedinem vergens, & spumam diu durantem in superficie exhibens.

10 Facies rubicunda & turgida, præcipue crescente hæctico calore.

**b Confirmata.**

1 Febris aucta, aut juxta alios nova Peripneumonica, putrida, intermittens.

2 Tussis incrementum, cum ejectione materiæ modo crudæ, modo coctæ, purulentum, striis sanguineis distinctum, sæpius putridum, ac carbonibus injectum foetorem insignem spargens, coloris non raro cineritii & subnigri.

3 Pulsus celer, durus, fortis & interdum serratus ac inæqualis.

4 Agrypnia pertinax, sudores nocturni, indies augmentum capientes, ac tandem colliquativi.

5 Major virium defectio, cum præcipiti non solum totius corporis, sed etiam faciei consumptione.

6 Urina interdum intense rubra, interdum vero colorem urinæ Februm intermittentium æmulans, contentis plena & frigori exposita sedimentum farinaceum album, aliquando etiam subrubrum deponens.

7 Diarrhœa colliquativa, Aphthæ in quibusdam, defluvium capillorum, facies Hippocratica.

**IV. Subjectum.**

1 Homines juniores ab anno decimo octavo ad trigésimum quintum circiter, sanguinei Plethorici, post Hæmorrhagiarum narium consuetarum cessationem.

2 Feminae facilius & frequentius quam viri, ob mensum quam sæpius experiuntur, suppressionem.

3 Viri Hæmorrhoidibus laborantes, quibus post earum cessationem vel suppressionem sanguinis ad pectus fiunt translationes.

4 Homines gracilioris texturæ in diætâ lauta viventes, otiosi.

5 Homines iracundi, Venere abutentes, ut & meditationibus ac lucubrationibus nimium indulgentes.

6 Quibus pectus est contractum, collum longum & humeri alati, aut quibus pectus alias est male conformatum.

7 Personæ a parentibus Phthysicis natæ.

8 Congestiones sanguinis frequentiores ad pectus, aut ut Hæmoptysin quoque experti, inprimis si sanguinis grumosi vel extravasati pars in pulmonibus remansit.

9 Personæ quoque Phlegmaticæ, quibus multum seri ad pectus translatus & ibidem corruptum fuit.

10 Qui coryza acriori cum defluxione ad pectus, aut etiam Tussi chronica laborarunt.

11 Quibus Pulmones a Pleuritide, Peripneumonia, Tuberculis, Vomica, aut etiam a miasmate post Variolas vel Morbillos relicto, exulcerati fuerunt.

12 Quibus Hæmorrhagiæ consuetæ aut etiam Febres per adstringentia suppressæ fuerunt.

13 Homines, quibus scabies retropulsa, aut ulcera antiqua manantia imprudenter consolidata, aut sudores consueti, per remedia adstringentia, vel aerem frigidum suppressi fuerunt.

14 Personæ, quæ corpore insigniter æstuante, potum nimis frigidum in majori copia assumerunt.

15 Quibus Pulmones per exhalationes corrosivas corrupti fuerunt, ut &

16 Qui externas injurias, lapsus scil. & ictus violentos in pectore passi sunt.

17 Qui aeri autumnali, præsentem jam ad Phthysin dispositionem, corpus sæpius exposuerunt.



V. *Prognoſis.*

- 1 Omnis Phthiſis difficilis eſt curationis, recens tamen adhuc aliqualem medelam, eamque vel veram, vel palliativam admittit. Et hinc quæcunque de Phthiſeos veræ curatione proferuntur, uni fere ex ſequentibus innituntur fundamentis.
  - a Vel enim ſola fuit tuſſis & fluxio catharrhalis in aliquem habitum deducta, & inpr. craſſum illum, pulpoſum atque viridem veluti mucum, præcipue ſub increaſſantium uſu, proferens.
  - b Vel Febris potius lenta ſimplicior, cum repentina contabeſcentia & nimis ſudoribus tali Febri familiaribus.
  - c Vel e lenta tali pullulans adhuc recentior Heſtica.
  - d Vel aſthmatica ſolum pectoris affectio.
  - e Vel ſuperveniente, minori alicui ſcirrho vegeta aliqua ſuppuratione, cum ancipiti periculo evaſit æger.
  - f Vel ſimplicior adhuc Hæmoptiſis pro Phthiſi vendicata.
  - g Vel denique non ſolum plane peculiare, ſed & pro ejus temporis peculiaribus circumſtantiis adhuc ſpecialius auctum, robur Naturæ, vir inter mille alia exempla pari conſtitutione expectandum. Vid. *D. D. Stahl's Diſſert. de Phthiſi Cap. V. p. 26.*
- 2 Phthiſis imminens difficulter cognoscitur, ſed facile curatur: incipiens aliquo modo facilius in ſenſus incurrit, ſed curationem non facile admittit: confirmata a plebejis etiam dignoſcitur, ſed omnem medelam reſpuit.
- 3 Quo ſicciora & calidiora ſunt ſubjecta, eo facilius a Phthiſi & Febre Heſtica jugulantur, quo humidiora vero, eo tardius & interdum poſt aliquot annorum decurſum moriuntur.
- 4 Adoleſcentes & Juvenes ab anno decimo octavo ad trigefimum quintum circiter citius, quam Senes Phthiſi pereunt.
- 5 Feminae facilius quidem propter ſuppreſſionem menſium incidunt in Phthiſin, quam Viri, ſed quoque facilius redeuntibus menſibus reſtituuntur, quod ſi vero pertinaciter durat illa menſium ſuppreſſio, minime evadunt.
- 6 Phthiſis mariti facile communicatur uxori, non autem illa uxoris facile marito communicatur. *Cheſneau.*
- 7 Phthiſis ab Hæmorrhoidibus ſuppreſſis orta, utpl. extialis eſt, niſi mature per redeuntem earum fluxum imminuatur.
- 8 Phthiſis hæreditaria & a mala pectoris conformatione ortum trahens, incurabilis & funeſta eſt.
- 9 Phthiſis vernalis in ſubjectis vegetioribus facilius quam autumnalis curatur.
- 10 Autumnus tabidis malus. *Hipp. 3. Aph. 10.*
- 11 Si exigua tantum pulmonum portio exulcerata eſt, & pus vel benignum, vel peculiari folliculo incluſum eſt, vita, accurata obſervata diæta & prudenti medicamentorum appropriatorum uſu, diu protrahi poteſt: valetudinarii tamen ſunt, & facile in febrem putridam incidunt tales ægrotantes.
- 12 Quo magis invaleſcit Febris Heſtica, exulcerationi Pulmonum juncta, eo certius & citius etiam pereunt ægrotantes.
- 13 Tuſſis cum Febre pertinax, non cedens remediis, tabem aſfert: etiamſi non ſpuatur ſanguis.
- 14 Quo majorem materiæ putridæ copiam ejiciunt cum tuſſi Phthiſici, eo citius moriuntur.
- 15 A ſanguinis ſputo, ſi puris ſputum ſequatur, ulceratus eſt pulmo & tabes ſequitur.
- 16 A Phthiſi liberati facile iterum ab eadem ob leviffimas etiam cauſas corripiuntur.
- 17 Si expectoratio ſive ejectionis purulentæ materiæ ſubito ſupprimitur, ægroti ſuffocantur.
- 18 Qui tabe infeſtantur, ſi ſputum quodcunque tuſſiendo rejecerint, grave olet, dum prunis injicitur ac capilli de capite deſluunt, lethale eſt. *Hippocr. 5. Aph. 11.*
- 19 Quibuſcunque tabe laborantibus capilli de capite

deſluxerint, hi alvi profluviſio accedente, moriuntur. *ibid.*

- 20 A tabe occupato, alvi profluviſium accedens, lethale eſt. *ibid.*
- 21 Sudores colliquativi, & facies Hippocratica mortem instantem indicat.
- 22 In tabidis in tumorem elevata præcordia, peſſima ſunt. *Hipp. Coac. Prænot. III. 264.*
- 23 Tumor pedum œdematoſus Phthiſi ſuperveniens, lethale ſignum eſt.

VI. *Remedia.*

- 1 Revellentia, derivantia & affluſum humorum uberiorem ad pectus intercipientia, V. S. revulſoria in pede, Scarificationes, Pediluvia, Laxantia lenia, Magnesia alba, Sal. cathart. amar. Rhabarb. Tamarind. Manna, Fol. Senn. &c.
- 2 Temperantia & organiſmum ſanguinis ſiſtentia Tart. Vitriolat. Arcan. duplic. Abſorbentia Lap.  $\varpi$ . Mat. Perl. &c.
- 3 Diſcutientia & Reſolventia, Rad. Ari, Enul. Irid. Florent, Ariſtol. Ari, Bryoniae, Pimp. alb. Vincetox &c. Herb. Veron. Marrub. alb. Hyſſop. Heder. Terreſtr. Bellid. Cuſcut. Epithym. Capill.  $\varphi$ , Gumm. Ammon. Galban. Sagapen. Junip. &c.
- 4 Abſtergentia & Mundificantia: uti ſunt ante laudata Salia neutra, Nitrum, Abſorbentia cum acidis ſaturata, v. g. Solut. Conchar. Conch. citrat &c. Herb. Hyſſop. Chærefol. Scabioſ. Veron. Virg. aur. Gefner. Matrifylv. Pulmon. earumque Aquæ deſtill. & ex his cum ſeminibus reſolventibus & temperantibus, Amygd. dulc. v. g. Sem. Card. Mar. &c. paratæ Emulſiones, Liquor Veronicæ in vino maceratæ & deſtillatæ. Vid. *Stahl's Diſſert. de Affect. Pect. p. 47. §. 53.* ubi eum admodum commendat.
- 5 Conſolidantia: Herb. Veron. Hed. Terreſtr. Sanic. Pyrol. Pilofell. Summit. Hyper. ejuſque Eſſentia ſaturata ac Extractum, Baſſ. Peruv. Terebinth. Maſtiche, Rubin. Sulph. Beghuini Pulv. Sympathet. Conſerv. Roſar. &c.
- 6 Nutrientia & Analeptica: Cremor hordæi, juſcula avenacea, Gelatinæ cum Amygdalis, Emulſiones ex iſdem.
- 7 Roborantia: Mixt. Tonica Stahl's.
- 8 Tuſſim mitigantia: Succ. Liquirit. cum MPh. de Cynogloſſa.

*Formula Remediorum.*

- 1 Pulvis laxans.
 

Rx. Magnes. alb. $\mathfrak{z}$ ſs.	D. mane & vesperti doſ. una.
Div. in 8. p. aq.	
2. Alius.
 

Rx. Rhab. elect. $\mathfrak{z}$ ij.	D. pro j. doſi.
-------------------------------------	-----------------
3. Alius.
 

Rx. Sal. cathart. am. $\mathfrak{z}$ ſs.	vel Infuſo Thee.
D. pro una vice in juſculo	
4. Potio laxans.
 

Rx. Decoct. Tamarind. $\mathfrak{z}$ iv.	pro j. doſi.
Mann. elect. $\mathfrak{z}$ ſſs. M.	
- 5 Infuſum laxans.
 

Rx. Decoct. ſcabioſ. ferv. $\mathfrak{z}$ iv.	Sal cathart. $\mathfrak{z}$ j. Col. adde
in quo infund. per noct.	Mann. elect. $\mathfrak{z}$ j. M.
Rhab. elect. $\mathfrak{z}$ ſſs.	D. pro una vice.
6. Potio temperans.
 

Rx. Aq. Scabioſ.	Nitr. depur. $\mathfrak{z}$ j.
Hyſſop. ana. $\mathfrak{z}$ ij.	Sacch. perlat. $\mathfrak{z}$ j. M.
Lap. $\varpi$ . $\mathfrak{z}$ ij	D. ſingulis 3. vel 4. horis
Tart. Vitriol. $\mathfrak{z}$ ſſs.	cochlearia aliquot.
- 7 Emulſio temperans & diſcutiens.
 

Rx. Amygd. dulc. $\mathfrak{z}$ vi.	Plantag. ana. $\mathfrak{z}$ ij.
Sem. Card. Mar. $\mathfrak{z}$ ſſs.	F. l. a. Emulſio adde
Aq. Chærefol.	Matr. perl. præpar. $\mathfrak{z}$ j.
Scord.	Sacch. perlat. q. ſ. M.
Scabioſ.	D. ſepius cochlearia aliquot.
- 8 Decoctum reſolvens.
 

Rx. Rad. Vincetox.	Liquir. $\mathfrak{z}$ j.
Pimpin. alb. an. $\mathfrak{z}$ ſſs.	Herb. Hyſſop.
Ari. $\mathfrak{z}$ ij.	Marrub.



*Charesol.* simpl. lb. xv. bibatur sæpius  
*Scabios. ana. mfs.* calide & edulcoretur mel-  
*Inc. bulliant. leniter in Aq. le.*

## 9 Pulvis abstergens.

*R. Conch. citrat. ʒj.* Tart. Vitriol. an. ʒss. M.  
*ʒ. diaph.* Dosis ʒss. mane & vespere.

## 10 Sirupus abstergens.

*R. Sir. Scabios. ʒij.* Dosis dimidium cochleare.  
*de Nicot. ʒss. M.*

## 11 Decoctum abstergens &amp; consolidans.

*R. Herb. Scabios.* Pulmon. ana. mj.  
*Veron.* Inc. infund. in Aq. fervent.  
*Virg. aur.* & infusum ter vel quater  
*Bellin. min.* quotidie calide sumatur.

## 12 Aliud consolidans.

*R. Herb. Sanic.* Alchimill.  
*Pyrol.* Vinc. per Vinc. ā. mj.  
*Virg. ʒ.* Inc. usurpentur ut antea.

## 13 Electuarium mundificans &amp; consolidans.

*R. Rad. Helen.* Succin.  
*Bardan.* Thuris.  
*Vincetox. āā. ʒij.* Tereb. coct. ana. ʒss.  
*Ari. ʒj.* Pulveris. adde Mellis q. s.  
*Herb. Vinc. per Vinc.* M.F. Electuarium.  
*Sanic.* Dosis ʒj. vel ij. bis vel ter  
*Pyrol.* quovis die.  
*Fl. Hyper. ana. ʒij.*

## 14 Aliud.

*R. Conf. ros. antiq. ʒj.* Bals. Peruv. ana. ʒss.  
*Lap. ʒ. preparat. ʒj.* Sir. Hed. Terrestr. q. s.  
*Succin. preparat.* M.F. Elect. Dosis ʒj.

## 15 Sequentem emulsionem usu confirmatam commendat Blaz. p. 91.

*R. Rubin. Sulph. gr. vj.* Scord. ana. ʒj. M.  
*Bals. Peruv. gr. xv.* Edulcorentur vel Saccharo  
*Amygd. excort. N. xx.* vel cum Sir. de Symp. Fer-  
*Aq. Hyssop.* nel. q. s. ad gratiam.  
*Scabios. Tussilag.* Dosis sing. duab. hor. cochl. j.

## 16 Mixtura tonica.

*R. Tinct. ʒij. ac. ʒj.* Dosis 25. 30. gutt. mane &  
*Spir. C. C. ʒj. M.* vespere.

## 17 Pilulæ anodynæ.

*R. Succ. Liquirit. ʒj.* M.F. Pil. ex ʒj. x.  
*MP. de Cynogl. gr. vj.* Dosis ʒ. 6. vespere.  
*Ess. Myrrh. q. s.*

## 18 Gelatina nutriens.

*R. Ras. C. C. ʒiv.* contundantur in mortario,  
*Coq. in Aq. symph. lb. ij. us-* ac linteis imponantur: dein-  
*que ad remanentia dimi-* de trahantur Decoctum C.  
*dia partis, postea.* C. cum forti expressione. D.  
*R. Amygd. dulc. excort. ʒiv.* calide ad uncias aliquot.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Si Plethoricus ægroti status postulat Venæsectionem, revulsionis gratia ea instituitur in pede, aut si temperamenti conditio magis scarificationis usum suadet, hæc Venæsectioni substituatur.
- 2 Quod si vero ægri debilitas aut sanguinis defectus ejusdem missionem dissuadeant, statim præscribantur lenia laxantia superius laudata, & pro circumstantiarum conditione repetantur.
- 3 Quo facto exhibeantur per aliquod tempus supra præscripta resolventia, discutientia & abstergentia.
- 4 Si vero calor febrilis urget, hisce vel præmittantur, vel interponantur temperantia Salina & Nitrosa, quippe quæ insignem simul abstergendi vim possident.
- 5 Eidem fini etiam inserviunt Emulsiones, imprimis quando inter alia semen Cardui Maris ipsas ingreditur, quod in inflammationibus & exulcerationibus egregie discutit, & simul abstergit.
- 6 Insignem quoque opem præstant Gummata, Ammoniacum; Galbanum &c. vel in Pilulas redacta, vel in Aquis aliisque liquoribus convenientibus soluta.
- 7 Hisce remediis semper jungantur nutrientia, qualia sunt juscula consummata, Gelatinæ &c. partim ut vires vel conserventur, vel restaurentur partim ut

calor hæcticus aliquando temperetur.

- 8 Si remedia hæc diu continuata fuerint, ipsis substituantur Consolidantia & Traxmatica, ut hoc modo ulcus abstersum, quantum possibile, consolidetur.
- 9 Quo facto & si mitior ægroti status apparet tandem in usum trahantur Tonica, quæ simul discutienti vim possident, uti supra præscripta Mixtura tonica D.D. Stahl, ut hoc modo pulmones debilitati partim roborentur, partim vero humores a pulmonibus removeantur, ac id quod noxium est, per convenientia loca evacuetur.
- 10 In hoc morbo insignem quoque laudem merentur Pulveres Solares D. Richter, quippe qui, præmissis prius universalibus, resolvendo, abstergendo & roborando laudabilem edunt affectum, uti id aliquoties in Phthisi pariter ac Hæctica observavimus, quare, ut reliquis quoque interponantur remediis, suademus.
- 11 Novimus quoque Balsamum mineralem cum fructu Phthifico cuidam ab amico exhibitum fuisse.
- 12 Si Tussis admodum urget, lenia anodyna versus noctem exhibeantur, aut detur una vel altera dosis Essentiæ dulcis concentratæ, quam in tali casu admodum efficacem deprehendimus. Singularem quoque in compescenda tussi efficaciam habere Extractum Tabaci legitime paratum, Authores nonnulli testantur, quocumque etiam tempore exhibeatur.
- 13 Cum vero Phthisis hoc modo mitigata facile de novo redeat, præservationis gratia vena pedis circa æquinoctia aperiatur, ac largior sanguinis quantitas evacuetur: hoc enim modo affluxus sanguinis ad pectus optime præcavetur.
- 14 Eidem fini inserviunt in subjectis succulentis scarificationes partium inferiorum repetitæ, aut si malum ab Hæmorrhoidibus suppressis fovetur, Hirudinum ad anum circa æquinoctia applicatio.
- 15 Pediluvia quoque post peractas sanguinis evacuationes repetitis vicibus usurpata, suo non carent usu.
- 16 Si malum a suppressis evacuationibus sanguinis, Mensium scilicet & Hæmorrhoidum ortum traxit, omni ope eo allaborandum est, ut revocentur & in ordinem redigantur.
- 17 Præservationis gratia usurpari quoque possunt lenia laxantia, quæ alvum aperiendo revellunt, & materias vitiosas alias ad pectus debilitatum ruituras, evacuant.
- 18 Et ut talis affluxus humorum ad pectus præcaveatur, convenit subinde aliquot doses Mixturæ tonicæ in infuso Thee, aut ex Herbis discutientibus parato, sumere. Cui fini etiam inservire poterit Mixtura ex Essentia Alexipharmaca D. Stahl, Essentia Succini & Tinctura Antimonii parata.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Venæsectio debito tempore instituta, tam curatorie quam præservatorie quidem prodest, at si præsentem jam Febre instituitur, non solum nihil juvat, sed potius nocet.
- 2 Omnia Purgantia acia & fortiora in Phthisi actu noxia sunt: nec etiam Mercurio dulci, licet mitius operetur, ob metum majoris exulcerationis, fidendum est.
- 3 Traxmatica fortiora nullum in hoc morbo usum habent, sed potius nocent, quatenus non solum materiæ purulentæ absterionem & discussionem impediunt, sed & respirationem difficiliorem reddunt, ut taceam, quod efficaciam suam adstrictoriam ad alia viscera extendendo, secretiones & excretiones reliquas, ad quas tamen in hoc morbo quam maxime respiciendum est, impediunt & sic majorem humorum ad pectus affluxum producant.
- 4 Et ex hoc ipso fundamento etiam Tinctura antiphthifica Gramanni teste experientia magis nocet, quam prodest.
- 5 In antihectico Poterii vulgari nunquam deprehendere potuimus, quod vulgo ipsi adscribitur, & hinc



potius eorum accedimus sententiæ, qui ejus usum in Phthisi rejiciunt.

- 6 Balsamica acriora & inpr. Myrrha, quatenus sanguinem commovendo Febrem vel invitant, vel augent, non nisi summa cum prudentia exhibenda, imo potius fugienda sunt.
- 7 Nitrum, etsi humorum æstum optime temperet, non tamen largioribus & repetitis, sed potius minoribus dosibus reliquis interponatur remediis.
- 8 Emulsiones ex seminibus frigidis & amygdalis dulcibus paratæ, quamvis ad temperandum æstum convenire possint, vitentur, quoniam ventriculum nimis refrigerando, flatu, tormina, aliaque incommoda in inferiore ventre producere solent.
- 9 Epiata, quantum quidem possibile est, fugiantur, nisi enormis tussis illorum usum postulet, alias enim tussim sedando & hoc modo excretionem necessariam impediendo, gravia damna producere solent.
- 10 Tonica ante sufficientem discussionem, abstersionem, consolidationem, & caloris febrilis mitigationem exhibita, noxia sunt.
- 11 Nisi remedia absorbentia & consolidantia diu usurpentur, frustraneus in malo, alias medelam vix vel prorsus non admittente, utpl. est labor.
- 12 Multitudo tamen remediorum eorumque continuus usus minime suadendus est.
- 13 Quæ vulgo de specificis quibusdam, ac si eorum ope Pulmones consumpti iterum regenerari possint, circumferuntur, ad aniles pertinent fabulas.
- 14 Pulvis Haly contra Phthisin recens obtundit aliquo modo acrimoniam salis, sed ad reliquam curationem nomine magis quam re ipsa confert.
- 15 Pulvis Sympatheticus sputo purulento admixtus, teste experientia, interdum quidem profuit; sæpius vero nullum edit effectum.
- 16 Extractum Tabaci, nisi legitime præparatum fuerit, vomitus excitat, & hinc malum gravius reddit.
- 17 Expectorantia dulcia & emollientia, expectorationem quidem promovent, sed simul affluxum humorum ad pectus augent, quare vel cautissime usurpanda, vel resolventia, & discutientia ipsis admiscenda sunt.
- 18 Acida omnia, excepta acetositate citri, inprimis mineralia & præcipue ex horum censu spiritus Sallis, etsi ad temperandum æstum febrilem alias admodum proficua sint, pectori quam maxime inimica sunt, ac tussim insigniter augendo, malum pejus reddunt.
- 19 Martialia & Acidulæ ob vim adstrictoriam, qua mediante expectorationem supprimunt, pariter noxia sunt.
- 20 Nec etiam Thermae, nisi admodum temperatas, facile quis suaserit, semper tamen eorum usum universalia, Venæsectiones scil. & Laxantia sive lenia Purgantia præcedere debent.
- 21 Quoad Diætam, omnia salsa & acida tussim vel augentia, vel expectorationem supprimunt, fugienda sunt.
- 22 Aromata febrem præsentem augent, nondum vero præsentem invitant.
- 23 Venus in tali casu summe quoque noxia est & febrem auget, ac simul insigniter debilitat.
- 24 Equitatio, quam Sydenham & Stahlus commendant, teste experientia, utilis est, pariter ac motus moderatus: nimius tamen calorem augens, fugiatur.
- 25 Cura lactis magis præservative, quam curative convenit.
- 26 Animi affectus graviores & inpr. ira, malum semper exasperant,

## CAPUT DUODECIMUM.

## De Exulceratione Hepatis &amp; Lienis.

- I. *Definitio.* **E**xulcerationes horum viscerum sunt corruptiones substantiæ eorum, a sanguinis in iisdem stagnationibus, corruptionibus ac inflammationibus originem trahentes & Febrem Hæcticam comitem habentes.
- II. *Differentia.*
  - 1 Respectu *originis*, aliæ a Scirrhis, aliæ ab inflammationibus, aliæ a læsionibus externis originem trahunt.
  - 2 Respectu *magnitudinis* aliæ sunt majores, aliæ minores.
  - 3 Respectu *loci affecti*, aliæ hepar, &c. & hujus partem modo gibbam, modo cavam occupant, aliæ vero in liene reperiuntur.
- III. *Signa.*
  - 1 Prægressæ inflammationes harum partium, Infartus & Scirrhi.
  - 2 Dolor ulcerosus in hypochondrio vel sinistro vel dextro magis vel minus sensibilis.
  - 3 Tussis arida modo continue, modo per intervalla affligens.
  - 4 Respiratio difficilis.
  - 5 Decubitus tam in latus affectum, quam oppositum difficilis.
  - 6 Consumptio corporis quotidie invalescens.
  - 7 Si hepar est inflammatum color faciei est icteritius & interdum quoque pustulæ parvæ in eadem efflorescunt.
  - 8 Jungitur hisce Febris Hæctica sensim sensimque incrementa capiens.
  - 9 Accedunt interdum dejectiones alvi purulentæ, interdum cruentæ, nonnumquam etiam carunculæ excernuntur.
  - 10 Interdum materia quoque purulenta testibus Auribus cum urina evacuatur.
  - 11 Urina ordinarie est pinguis & graveolens.
  - 12 Appetitus est postratus, adest nausea, inpr. carnis, & frigida magis appetunt ægroti, quam calida.
  - 13 Sitis adest continua cum siccitate oris.
  - 14 Halitus utpl. est fœtidus.
  - 15 A somno nullam ægrotantes sentiunt restaurationem, sed potius fatigationem.
  - 16 Hisce accedunt interdum sudores & Diarrhææ colliquativæ.
  - 17 Ultimo tempore pedes intumescunt.
  - 18 Deliquia frequentia in morbo graviore observantur.
  - 19 Tandem accedit defluvium capillorum & facies Hippocratica.
- IV. *Subjectum.*
  - 1 Homines Plethorici, sanguinis evacuationibus tam spontaneis, quam artificialibus assueti, post earum vel suppressiones, vel emanationes, vel malas medicationes.
  - 2 Feminae præ viris, propter inordinatum aut suppressum mensium fluxum.
  - 3 Viri Hæmorrhoidum suppressione laborantes.
  - 4 Infartibus aut Scirrhis viscerum antea laborantes.
  - 5 Qui viscerum inflammatione antea laborabant, quam postmodum excepit abscessus.
  - 6 Viscerum atonia, vel propter enormes Hæmorrhagias, vel Hypercatharses, laborantes.
  - 7 Injurias externas, plagas, vulnera &c. horum viscerum passi.
  - 8 Nimiis meditationibus, & mœroribus animi dediti. Reliqua vid. de *Infartu* & *Scirrhis* horum viscerum.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Omnia ulcera Hepatis, nisi admodum exigua & superficialia sint, ac statim in principio curentur, lethalia sunt.



- 2 Exulcerationes hepatis, quæ ejusdem inflammationes sequuntur, semper citius jugulant, quam eæ, quæ successive contingunt.
- 3 Quo magis in interiore hepatis substantia est ulcus, eo periculosior est status.
- 4 Color faciei ictericus, febris continua, inappetentia & nausea, in exulceratione hepatis lethalia sunt signa.
- 5 Si inflammatio & hanc excipiens abscessus est in gibba hepatis parte, Pleuritica symptomata magis urgent, sin vero in cava, stomachica: ultimus tamen status periculosior est priori.
- 6 Materia purulenta ex rupto abscessu fluens frequentissime per alvum, aliquando per urinam, rarius per vomitum, rarius adhuc per sputum & tussim ejicitur, omnium vero rarissime per metastasin transfertur ad furas.
- 7 Si statim a ruptione abscessus Febris discedit, vel mitescit, appetitus redit, pus est album, parum olens, alvus naturaliter secedit, brevi sanatur. Contra si contraria eveniat. *Bagliv.*
- 8 Si rupto abscessu venter intumescit, ac sudor frigidus circa collum & faciem observatur, ac lipothymia ægrotos affligunt, mors in propinquo est.
- 9 Pessimum quoque est, si summe emaciato corpore pedes intumescunt.
- 10 Quicumque hepar suppuratum uruntur, si quidem pus purum fluat & album, evadunt. In tunica enim his pus inest. Si vero velut amurca fluat, pereunt. 7. *Aphor.* 45.
- 11 Lienis exulceratio non adeo periculosa est, ac hepatis.
- 12 Materia purulenta per vasa brevia vel deponitur ad ventriculum & vomitu rejicitur, vel in intestinorum cavitatem injicitur, & per alvum evacuat: interdum etiam cum urina excernitur.
- 13 Exulceratio recens curationem interdum admittit: inveterata vero utpl. incurabilis est, & lento gradu ad mortem certissimam properat.

## VI. Remedia.

- 1 Abscessus rupturam promoventia, cataplasmata emollientia hepatis vel lienis regioni imposita, tussis, jactationes corporis, apertio artificialis per incisionem aut ustionem.
- 2 Puris excretionem promoventia, clysteres, lenia Laxantia, Diuretica, Expectorantia.
- 3 Abscessum apertum mundificantia & abstergentia, qualia superioribus Tabulis de Vomica & Phthisi allegata fuere.
- 4 Ulcus consolidantia, lenia adstringentia superius l. a. laudata.
- 5 Nutrientia, Emulsiones, Gelatinæ, juscula avenacea, hordeacea &c.
- 6 Viscerum tonum roborantia & vires restaurantia, Ess. dulc. Hall. ordinaria & concentrata, Pulveres Solares D. Richteri, Mixtura Tonica D. Stahl.

## Formula Remediorum.

## 1 Decoctum abstergens.

Rx. *Herb. Scabios.* Hepat. nob. ana. mj.  
*Cherofol.* Incis. infund. in Aq. fervent.  
*Veron.* & usurpentur instar Infus.  
*Pulmon. mac.* Thee.

## 2 Decoctum laxans.

Rx. *Decoct. Tamarind.* Mann. Calabr. ʒiss. M.  
 ʒiij. Colat. D. calide.

## 3 Potio diuretica.

Rx. *Aq. Cherofol.* Oxymell. ʒj. M.  
*Petrosel. ana.* ʒij. D. singulis duabus horis cochlearia aliquot.  
*Tart. Vitriolat.* ʒj.

## 4 Decoctum Diureticum, quod tanquam optimum laudat Ettmull

Rx. *Ras. L. Junip.* ʒij. Ras. C. C. ʒvj.  
*Sassafr.* ʒj. Cog. invicem ad casum tertie partis vel medietatis.  
*Macerentur per noctem in* Colat. adde.  
*lib. iv. v. comm. mane adde* Sir. de Sympb. Fern.  
*Herb. Veron.* Hyssop. ana. q. f.  
*Hed. terr.* pro gratia saporis M.  
*Alchimill. ana. mj.*

## 5 Decoctum consolidans.

Rx. *Rad. Aristol. rot.* ʒj. Cog. in lib. iij. Aq. simpl. ad  
*Herb. Agrimon.* consump. lib. ij. Colat. educ.  
*Scabios.* Sir. e ros. sicc. q. f. & D.  
*Summit. Hyper. ana. mj.* calide.

## 6 Pulvis abstergens, consolidans &amp; roborans.

Rx. *Pulv. Solar. dos.* xii. D. singulis diebus doses tres.

## 7 Essentia confortans.

Rx. *Ess. dulc. concentr.* Dosis gutt. vj. vel viij. ter  
 ʒj. vel quater singulis diebus.

## 8 Emulsio temperans &amp; diuretica.

Rx. *Sem. Violar.* ʒss. adde Sacch. q. f.  
*Aq. fragor.* Dos. cochlearia aliquot sin-  
*Cherofol. ana.* ʒij. gulis duabus horis.  
*F. l. a. Emulsio.*

## VII. Methodus medendi.

- 1 Si abscessus sponte aut propter tussim non rumpitur, hepatis vel lienis regioni imponatur cataplasma emolliens, ex Rad. Alth. Lil. alb. Cepis, Herb. Malv. Flor. Verbasc. &c. paratum: aut Hypochondria illinantur Oleis emollientibus, aut Unguentis ex illis paratis.
- 2 Si ex signis Pleuriticis abscessum in gibba hepatis parte hæreret, ac simul tumor apparet, quidam suadent ejus incisionem, vel cauterii potentialis applicationem, aut juxta Veteres ustionem, ut hoc modo aperto ulcere pus educi queat.
- 3 Quando materia purulenta fluxit in intestinorum cavitatem, conducunt blanda laxantia & inpr. Rhabbarum; Clysteres quoque blande emollientes & abstergentes hic suam quoque habent utilitatem, pariter ac Salia neutra & inpr. Nitrosa.
- 4 Quo facto postmodum usurpentur decocta abstergentia & mundificantia, partim hoc in casu, partim superius commendata.
- 5 Quibus deinde subjungantur consolidantia, ut, quantum possibile est, ulcus curetur.
- 6 In tali casu optime quoque conveniunt Pulveres Solares, quæ in internis exulcerationibus jam sæpius cum fructu exhibiti fuere: & quamvis non semper malum funditus extirpaverint, magnum tamen solatium attulere, inpr. si Essentiæ dulcis usus ipsis junctus fuit.
- 7 Ad roboranda viscera optime confert Mixtura tonica D. Stahl, majorem autem adhuc habent efficaciam Pulveres Solares tonici D. Richteri, si diu usurpantur, uti partim observationes communicatæ, partim propria experientia in similibus casibus nos docuerunt.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 Purgantia aciora hic cane & angue pejus fugienda sunt, quoniam omnia symptomata exasperant, & in præsens vitæ periculum conjiciunt ægrotantes.
- 2 Incisio horum abscessuum non nisi summa urgente necessitate instituatur, ne si res male cedat in casu jam satis desperato malus eventus postmodum operationi magis, quam ipsi morbo adscribatur.
- 3 Nisi omnia remedia abstergentia & consolidantia diu usurpentur, frustraneus est labor.
- 4 Reliquis remediis semper interponi debent remedia confortantia & nutrientia, ut vires, & conservantur, & restituantur, alias irrita sunt omnia.

## CAPUT DECIMUMTERTIUM.

## De Exulceratione Renum &amp; Vesicæ.

- I. **Definitio.** Exulcerationes renum & vesicæ sunt erosiones & corruptiones harum partium, cum substantiæ earum deperditione ac effluxu materiæ purulentæ, ab inflammatione, calculis asperis, corrosivis &c. originem trahentes.
- II. **Differentia.**
  - 1 Alia unicum tantum renem, & testibus observationum scriptoribus, frequentius finistrum, alia utrumque occupat.
  - 2 Alia est major, alia vero minor.
  - 3 Alia



3 *Alia inflammationes, alia calculum asperiores, alia assumpta corrosiva, Cantharides v. g. alia læsiones externas sequitur.*

4 *Alia est recens, alia inveterata.*

### III. Signa.

#### a Exulcerationis renum.

- 1 Prægressa inflammatio renum, dolores nephritici, mictus cruentus & calculus renum.
- 2 Dolor rodens in alterutro lumborum vel in utrisque, plus vel minus gravans.
- 3 Excretio materiæ purulentæ in vase urinario fundum statim petentis.
- 4 Carunculæ & veluti pili cum urina exeuntes, juxta Hipp. 4. Aph. 76. Quibus in urina crassa existente, carunculæ parvæ, aut veluti pili simul exeunt, his de renibus excernuntur.

#### b Exulcerationis Vesicæ.

- 1 Tensio, durities, ardor, tumor ac dolor gravis in pectine sive regione pubis, tactum sine exacerbatione non ferens & quoties ægri mingunt, gravior.
- 2 Urinæ modo suppressio, modo eandem excernendi difficultas, quæ duo signa Vesicam simul adhuc inflammata esse indicant.
- 3 Jungitur hisce tenesmus & interdum membri virilis erectio.
- 4 Cum urina prodit sanies subcruenta.
- 5 Urine deponit sedimentum furfuraceum, juxta Hippocr. 4. Aphor. 77. Quibus in urina crassa existente, furfuracea quedam minguntur, his vesica scabie affecta est.
- 6 Si ulcus est sordidum, urina foetida mingitur.
- 7 Si materia purulenta præcedit urinam, urethra ulcere affecta est.
- 8 Si dolor in pectine sentitur, signum est fundi exulcerati, si prope sphincterem aut in urethra, dolor semper major est inter mingendum.

### IV. Subjectum,

- 1 Senes Plethorici mictum cruentum antea passi.
- 2 Qui Nephritide sive renum inflammatione laborarunt.
- 3 Hæmorrhoidarii sive Hæmorrhoidum suppressione laborantes.
- 4 Femina mensium imminuto fluxu, aut eorundem plenaria suppressione afflictæ.
- 5 Homines qui corrosiva assumerunt, aut injurias externas, plagas, ictus &c. passi sunt.
- 6 Quibus liquores corrosivi ad confringendum calculum in vesicam injecti fuerunt.
- 7 Quibus a calculo asperiori renes vel vesica læsi sunt.

### V. Prognosis.

- 1 Exulceratio renum periculo non vacat, ac ordinarie omnem medelam respuit, inprimis si inveterata est.
- 2 Si exulceratio dependet a rebus erodentibus, semper periculosior est ea, quæ ab aliis causis originem trahit, ac lente sive successive fit.
- 3 Quo gravior & major est exulceratio renum, eo citius ad mortem disponit.
- 4 Si exulceratio utrumque occupat renem, eo gravior & periculosior est malum.
- 5 Recentior renum exulceratio, curationem interdum admittit.
- 6 Ulcera vesicæ graviora sunt, quam ulcera renum & longe etiam difficilius, vel prorsus non curantur.
- 7 Uti vesicæ & renum ulcera in senibus difficilius curantur, ita inflammationes harum partium, ob majorem sanguinis turgescientiam, in junioribus periculosiores sunt.
- 8 Exulceratio vesicæ quæ a calculo asperiori dependet, non, nisi remoto prius calculo, curari potest.
- 9 Quo magis invalescunt renum & vesicæ ulcera, eo citius hecticam corporis consumptionem post se trahunt.
- 10 Quo magis dolor in tali casu urget, eo peior est status, & eo certius & citius etiam mors sequitur.
- 11 Exulceratio vesicæ a corrosivis orta, peior est ea quæ ab aliis causis dependet.
- 12 Exulcerationem renum ut plur. sequitur calculus renalis, qui etsi excernatur, semper tamen ob renum ulcus regeneratur.

### VI. Remedia.

- 1 Sordes primarum viarum evacuancia, Manna, Tamarindi, Magnesia alba, Sal catharticum amarum, Folia Senæ, Rhabarbarum &c. clysteres.
- 2 Acrimoniam corrigentia, eorundemque orgasmum temperantia Absorbentia, Matr. Perl. Lap. Cancr. citrat. Lap. Percar. Nitrosa, Cinnabarina &c.
- 3 Affluxum humorum ad renes & vesicam intercipientia & revellentia, Venæsectio in brachio. Diaphoretica &c.
- 4 Ulcus renum & Vesicæ abstergentia, Herb. Agrimon. Scabios. Chæresfol. Fragar. Heder. terr. Hyssop. Capill. Vener. Rad. Liquirit. Fragar. Summit. Hyperic. Decoct. Hord. Cicer. serum lactis, Sem. Hyperic. Terebinth. Pulv. Solar. Tinctura Resolvens nobis usualis &c.
- 5 Ulcus consolidantia: Rad. Consolid. maj. Tormentill. Bistort. Herb. Sanic. Pyrol. Polygon. &c.
- 6 Tonum renum & vesicæ restituentia, Mixtura Tonica aliaque superioribus Tabulis laudata.

### Formule Remediorum.

#### 1. Potio laxans.

R. Magnes. alb. ℥ss. aq. D. mane & vespere.  
div. in 4. vel 6. part. ri.

#### 2. Alius.

R. Sal. cathart. amar. Sumatur in infuso Thee vel  
℥ss. alio sufficiente vehiculo.

#### 3 Potio laxans.

R. Decoct. Passul. Mann. elect. ℥ss. M.  
Tamarind. ā. ℥ij. Colatura sumatur calide.

#### 4 Pulvis temperans & abstergens.

R. Lap. ℥. citrat. Dos. 1. cuspid. cult. singulis  
Percar. ana. ℥j. quatuor horis.  
Nitr. depur. ℥ss. M.

#### 5 Alius.

R. Conch. citrat. Nitr. depur. ana. ℥ss. M.  
Tart. Vitriolat. D. ut antea.

#### 6 Potio temperans & diaphoretica.

R. Aq. scabios. Tart. Vitriolat. ana. ℥ss.  
Chæresfol. ana. ℥ij. Sacch. perl. ℥ij. M.  
Lap. ℥. citrat. D. singulis duabus vel tribus  
℥. diaph. horis cochlearia aliquot.

#### 7 Decoctum mundificans.

R. Herb. Agrim. ℔. ij.  
Scabios. Colat. adde.  
Fragar. ana. mj. Sir. de Alb. ℥iv. M.  
Summ. Hyper. mss. D. quotidie 3. vel 4. ad ℥iv.  
Coq. in Decoct. Cicer. vel vj. calide.

#### 8 Essentia abstergens.

R. Tinct. resolv. ℥ss. 40. ad 50. gutt. in decocto  
D. bis vel ter per diem abstergente.

#### 9 Alia.

R. Tinct. Resolv. ℥ss. Dos. 40. gutt. mane & vespere.  
Bals. de Capayb. ℥j. M.

#### 10 Emulsio abstergens & mundificans.

R. Terebinth. ℥ij. Aq. Chæresfol. q. s. M.  
Vit. Ov. N. j. D. singulis duabus vel tribus  
Mell. ℥ij. horis cochlearia aliquot.

#### 11 Pilulæ.

R. Succ. Liquir. depur. Terebinth. Cypr. q. s. M.  
Succin. F. Pil.  
Thuris ana q. v. Dos. ℥ss. mane & vespere.

#### 12 Aliud Emul consolidans.

R. Herb. Agrim. Incis. Contus. g. m. infund. in  
Fl. Hyper. ana. mj. Vini q. s. svs ℔. ii. iij.  
Lign. Mastich. ℥ss. Dos. ℥iv. vj. 2. vel 3. quod  
Sem. Hyper. ℥ij. tidie.

#### 13 Injunctio consolidans.

R. Ramul. Equiset. Coq. in Aq. ferrar. ℔. j. in  
Fol. Plantag. Colat. dissolv.  
Sem. Hyper. ana. mj. Trochisc. alb. Rhas. s. opio  
Rad. Consolid. maj. ℥ss.  
Bistort. Bol. Armen. ℥j. M. inji-  
Torment. ana. ℥j. ciatur calide.  
Cort. G anat. ℥ij.



## 14 Electuarium abstergens &amp; consolidans.

R. *Conserv. rosar.* ℥j. *M. F. Electuarium.*  
*Sen. Hyper.* ℥ss. *Dosis* ℥j. *ter vel quater per diem.*  
*Sir. de symph. q. s.*

## 15 Injunctio abstergens.

R. *Rad. Liquirit.* ℥j. *Colat.* ℔. j. *dissolve*  
*Fabar.* *Terebinth. in melle dissolut.*  
*Sem. Cicer. rub. ana.* ℥ss. ℥vj.  
*Fol. Plantag. mj.* *Ungt. Ægypt. q. s. injiciatur cum Syringa in vesicam,*  
*Coq. e. Aq. f. q. s. addendo*  
*parum lixivii in*

## 16 Aliud.

R. *Herb. Alchimill.* *Liquirit. ras.* ℥ss.  
*Hed. terrest.* *Inc. Contus. Coq. in f. q.*  
*Vinc. per vinc. ā.* *Aq. simpl. Colat.* ℔. ij. *adde*  
*mj.* *Sir. de Symp. Fernel.*  
*Summit. Hyper. mss.* ℥iv. M.  
*Rad. Consol. Sarrac. cum* *D. quotidie* ℥iv. *bis vel ter*  
*toto M. ij.*

## 17 Mixtura Tonica.

R. *Tinct. ℥ii acr.* ℥ss. *Dos.* 30. *gutt. bis quovis die,*  
*Spir. C. C. ℥ij. M.*

## VII. Methodus medendi.

- 1 In hoc affectu curationis initium fiat cum Purgante leni, ut hoc modo non solum primarum viarum fordes removeantur, sed & affluxus sanguinis ad partes affectas aliquo modo intercipiatur: cui fini etiam inserviunt clysteres lenientes & carminativi.
- 2 Si orgasmus humorum præsens est, exhibeantur temperantia superius præscripta & inpr. absorbentia cum acido citri saturata, quæ non solum egregie temperant, sed simul abstergunt.
- 3 Hisce etiam commode vel interponuntur, vel junguntur Nitrosa, inpr. si orgasmus febrilis urget.
- 4 Venæsectio insignem quoque usum habet in subiectis Plethoricis, quatenus hoc modo affluxus uberius ad partes affectas impeditur.
- 5 Venæsectioni subungi possunt lenia diaphoretica temperantibus mixta, ut sanguis a partibus interioribus ad peripheriam corporis pellatur.
- 6 Quo magis vero ulcera urgent, quod ex materiæ copiosiori fluxu & doloribus gravioribus colligi potest, eo citius exhiberi debent abstergentia, & per puris absterfionem ulterior partium corruptio præcaveatur.
- 7 Ad ulcerum absterfionem optime conferunt Terebinthinata, item Pulveres Solares D. Richteri diu usurpati, & inpr. Tinctura Resolvens nobis usualis, quam in variis ulceribus & præcipuè vaginæ uterinæ & urethræ sæpius admodum salutarem deprehendimus, præsertim quando sub finem curationis Terebinthinam aut Bals. Indicum addidimus.
- 8 Præmissis ita abstergentibus subjungantur consolidantia, ut horum opè, dum pori constringuntur, ulcera sensim exsiccentur & consolidentur.
- 9 Quem in finem & ut consolidatio eo citius succedere queat, fiant injectiones per Syringam in vesicam, si enim remedia ipsam statim aggrediuntur partem affectam, eo major de bono eventu spes est.
- 10 Tandem exhibeantur remedia tonica quæ simul discutiendi & abstergendi vim possident, ut hoc modo affluxus humorum ad partes impediatur & si quid adhuc ipsis inest puris, abstergatur, quem in finem optime proderit Mixtura supra præscripta.
- 11 Præservationis gratia convenit Venæsectiones tempore æquinoctiali in pedibus instituere & alvum semper apertam servare.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Omnia drastica remedia, Vomitoria, Purgantia acrida, volatilia, &c. in hoc affectu nullum habent usum, sed potius, affectum exasperando & humores nimium commovendo, actu nocent.
- 2 Omnia diuretica fortiora, licet abstergant, humores nimium ad renes pellendo noxia sunt.
- 3 Venæsectio curatorie & revulsionis gratia melius instituitur in brachio, quam in pede, ast præservationis gratia posterior magis prodest.

- 4 Diaphoretica fortiora minus profunt in hoc affectu quoniam orgasmum humorum excitant, & ita Hæticam vel invitant, vel præsentem augent.
- 5 Marrubium album etsi in aliis internis exulcerationibus prodest, hic tamen nullum habet usum, quoniam teste experientia malum exasperat.
- 6 Terebinthinata & succinata, quamvis sint optima mundificantia, non nisi cum summa prudentia & minori dosi, aut repetitis vicibus exhibeantur, abusus enim eorum facile damna sequuntur.
- 7 Myrrhata pariter hoc in affectu noxia sunt, quoniam nimiam humorum ebullitionem excitant.
- 8 Abstergentia & mundificantia remedia, nisi diu usurpentur, nullum edunt effectum, quare usus continuatus est suadendus.
- 9 Adstringentia remedia præpostere usurpata supprimunt quidem aliquo modo materiæ purulentæ effluxum, sed hoc ipso exulcerationem augent.
- 10 Omnes cibi difficilius digestionis, falsi, acidi, &c. uti & vinum generosum fugiantur.
- 11 Motus vehemens dorsum concutiens & inpr. equitatio vitentur, quoniam malum gravius reddunt.
- 12 Venus cane & angue pejus fugiatur, quoniam vires imminuit & humorum affluxum ad renes & vesicam auget.

## CAPUT DECIMUMQUARTUM.

## De Calculo Renum &amp; Vesicæ.

I. *Definitio.* **C**alculi sunt concretiones modo duræ modo friabiles, ex materia mucosa, falsa & terrestri in renibus & vesica generata, varias molestias comites habentes.

II. *Differentia.*

- 1 Alius calculus est *Renum*, qui ordinarie est minor, friabilis, senibus familiaris & continuo regeneratur, licet plures jam excreti fuerint & ulcus renum conjunctum habet & præsupponit.
- 2 Alius est *Vesicæ*, qui magnitudine renalem maxime superat, admodum compactus est, & ex multis lamellis, instar ceparum, materiam fabulosam continentibus constat, Ordinarie porro unicus tantum est, & dispositionem hæreditariam, nisi forsan ex renali majore, in vesica retento, ortum trahat, præsupponit: junioribus etiam magis, quam senibus familiaris est. Ut plurimum quoque lævis est, interdum tamen insignes in eo occurrunt asperitates, maximos dolores excitantes.
- 3 Interdum tota vesica interius materia calculosa obducta est, quæ remota per injectiones, statim alia regeneratur, cujus rei exemplum hic habemus in viro quodam, cui per Chirurgum jam ter vel quater talis materia remota fuit, ast nihilominus de novo eodem malo laborat.
- 4 Nonnunquam materia crassa mucosa cum urina excernitur, quæ brevi tempore aeri exposita lapideam acquirit duritiem.
- 5 Dolorem lumborum rheumaticum a nephritico per hoc certissimum signum distinguere poteris: Pete ab ægro, an dum in terram incurvatur & exinde erigitur, cum difficultate erigatur, adeo ut per medium quasi scindi videatur; si hæc adsint, pro certo habeto, dolorem illum non esse nephriticum, sed rheumaticum. *Bagliv.*

III. *Signa.*a *Calculi renum.*

- 1 Dolor insignis in lumbis, fixus, ac si paulus infusus esset gravans, tendens, profundus, vel in uno, vel in utroque, frequentius tamen in sinistro latere.
- 2 Qui tamen in sanguineis magis, quam in Phlegmaticis, propter horum laxiorem fibrarum structuram & ad motus spasticos ineptitudinem, urget.
- 3 Paroxysmum sæpius tormina colica gravissima, in multis etiam vomitus graves & diu continuantes præcedunt.



- 4 Ordinarie etiam tempore Paroxyfmi fubjecta Plethorica fanguinea variis motus tonici alterationibus & inde dependentibus horroribus & phlogofibus corripuntur.
- 5 In nonnullis etiam ubi calculus in alterutro tantum rene hæret, ftupor femoris & retractione vel reftictio tefticuli ejufdem lateris concurret.
- 6 Quando calculus e renibus exit, & ureteres ingreditur, dolor interdum infigit in quibufdam augetur, inprimis fi calculus eft major, & ad regionem offis ilii & ad veficam ufque fe extendit.
- 7 Urina ante paroxyfmo & in paroxyfmo eft pauca & tenuis, infigit tamen acris.
- 8 Ordinarie cum infigit doloribus in pauca quantitate emittitur aut guttatim faltem, interdum quoque plane fupprimitur.
- 9 Nonnunquam etiam plus vel minus cruenta, interdum admodum rubicunda & perfpicua eft, interdum vero materiam mucofam & fabulum in fe continet.
- 10 In paroxyfmo erecti efle nequeunt ægrotantes fed incurvati incedere coguntur.
- 11 Interdum etiam tenefmus in paroxyfmo valde urget.
- 12 Nonnunquam etiam ægrotantes dolorem titillantem in glande penis fentiunt.
- 13 Accedit in nonnullis gravis naufea, anxietas præcordiorum, appetitus proftitutus, difficilis refpiratio ac fensus conftictionis coftarum fputarum.
- 14 Pulfus fæpius obfervatur durus.
- 15 Convulfiones quoque patientes in Paroxyfmo afflixiffe obfervavimus.
- 16 Motus corporis femper exafperat dolores, quies vero eofdem mitiores reddit.
- 17 Nonnunquam calculi in renibus diu abfque ullo dolore latent, ac non nifi poft mortem diffectis renibus apparet, homines renum calculo laboraffe.

#### b Calculi Veficæ.

- 1 Continuus ad mingendum ftimulus cum tenefmo.
- 2 Inter mingendum fubitanea urinae fuppreffio, aut ftillidium, aut mingendi difficultas.
- 3 Pondus & dolor obtufus, aut, pro ratione calculi afperioris, infigit in perinæo, qui fub finem mictionis exafperatur.
- 4 Quo major vero eft calculus, eo magis pondus illud fentitur una cum dolore.
- 5 Dolor & punctura in anteriore parte veficæ circa regionem pubis, dum ægroti fe inclinant, aut humo aliquid attollere volunt.
- 6 Dolor & pruritus in glande penis, ita ut ægri interdum putent, calculum hæere in urethra.
- 7 Accedit huic interdum continua erectio & tenfio membri virilis.
- 8 Sub fortiori motu corporis perceptio motus calculi in vefica & major dolor.
- 9 Cum urina interdum, copiofus mucus excernitur, aut fedimentum mucofum fuffuraceum cum fabulo.
- 10 Sub ipsis doloribus corporis inquietudo varia adeft, qua ægroti præprimis crura exagitant, & tranfverfum complicant, coxas & pubem comprimunt, abdomen ad humum flectunt, imo fi calculus major fuerit, vix recti ftare, equitare, aut per falebrofa loca ambulare poffunt. *Etmull.*
- 11 Signum omnium certiffimum calculi in vefica latentis, eft ejufdem contactus a cathetere factus, reliqua fallunt etiam peritiffimos. *Bagliv.*

#### IV. Subjeclum.

##### a Calculis renalis.

- 1 Viri & Senes Plethorici Temperamenti fanguinei, habitus corporis laxioris five porofi.
- 2 Rarius feminae & quidem poft ceffationem menfium, interdum tamen propter difpofitionem hereditariam fluentibus adhuc menfibus calculo corripuntur.
- 3 Viri Hæmorrhoidum confuetarum fuppreffione

laborantes, & quando fanguis alias excerni folitus ad renes deponitur.

- 4 Frequentes congestiones fanguinis ad renes & mictum cruentum paffi.
  - 5 In mictu cruento perverfe & meris adstringentibus & opiatif, miffis fanguinis ventilationibus tractati.
  - 6 Arthritici & Podagrici, aut diuturno Malo Iſchiatico laborantes.
  - 7 In Nephritide fimplici Terebinthinatis, fuccinatis, Juniperinis aliifque calidioribus remediis tractati.
  - 8 Vino & Venere abutentes, ac iræ dediti.
  - 9 Inurias externas, lapfus, plagas, contufiones &c. in lumbis paffi.
  - 10 Confuetas fanguinis ventilationes negligentes.
  - 11 Frequentes fuccuffiones corporis aut veftiones curru, aut equis patientes, prefente inprimis Plethora.
  - 12 Difpofitionem hæreditariam habentes.
  - 13 Renum exulcerationem paffi.
- b Calculi Veficæ.
- 1 Infantes & pueri magis quam adulti & fenes.
  - 2 Inprimis, fi hereditaria fubeft difpofitio; maxime tamen etiam confert in tantum voracitas, & diæta falſa nutricum.
  - 3 Si adulti veficæ calculo laborant, hic originem traxit a calculo renum majori, in vefica retento & fenfim aucto.

#### V. Prognofis.

##### a Calculi renum.

- 1 Calculus renum rariffime plenarie curatur, fed, licet malum aliquo modo mitigatur, facile iterum recrudescit.
- 2 Calculus renum major & acutus facile ulcera fignaofa five fistuloſa incurabilia & Hæcticam aut Febres acutas poft fe trahentia, excitat.
- 3 Quo magis afperi funt calculi, eo graviores motus fpafmici fumme dolorifici, imo convulfiones ipſæ producuntur.
- 4 Calculus renum amplitudinem, five capacitatem ureterum fuperans, nunquam curatur.
- 5 Renum calculus, hæreditariam difpofitionem præſupponens, prorsus curari nequit.
- 6 Eo difficilior autem eft cura, fi calculus fenes aut maxime jam debilitatos affligit: *Conf. 6. Aphor. 6.*
- 7 Dolor Nephriticus, quem nulla mitigant remedia, plerumque funeſtus eft, & quidem eo magis, quando extrema frigent, & fudor frigidus in facie erumpit.
- 8 Dolor Nephriticus maximus fubito ceffans, fine excretionem calculi, aut fine fenfu motus ejus ad veficam, ſphacelum renum & mortem indicat.
- 9 Urina in dolore Nephritico clara, turbida & craffa evadens ac fimul fabulum deponens, paroxyfmi finem & calculi refolutionem indicat.
- 10 Feminae calculo renum frequenter laborantes, fi gravidæ reddantur, facile moriuntur, aut abortum patiuntur. *Etmull. ex Panarollo.*
- 11 Uti in Phthiſi pulmonali, non obſtante Pulmonum ulcere, ita quoque in exulceratione renum calculoſa homines diu fuperftites manent.

##### b Calculi veficæ.

- 1 Calculus veficæ malum eft curatu difficile & ordinarie omnia remedia Pharmaceutica refpuit, quare non nifi per ſectionem tolli poteft.
- 2 Calculus veficæ per ſectionem remotus, facile renafcitur.
- 3 Calculi veficæ in mulieribus facilius excernuntur, quam in viris.
- 4 Calculus propriæ tunicæ inclufus, & veficæ adhærens, per ſectionem tolli nequit.
- 5 Sectionem calculi ordinariam facile fequuntur fiſtulæ.
- 6 Quo grandiores funt calculi veficæ, eo difficilior, imo interdum prorsus impoſſibilis eft calculi extractio.

#### VI. Remedia.

- 1 Calculi commoti excretionem promoventia, clyſteres



- steres emollientes & oleosi, Unguenta, emollientia, Balnea: Emollientia & lubricantia interne sumpta, Oleum Amygd. dulc. Emulsiones, Juscula hordei, Decoct. Alth. Diluentia, potus Thee, Decoct. Nephrit. Forest. Lithontriptica blanda, Fraga, Nuclei. Perfic. Fructus Cynosb. Emuls. ex Nuc. Avell. Bacc. Heder. Semen Milii folis, Violarum, Urticæ, Bardan. Decoct. Cicer. rubr. Succus Raphani, Salia neutra, Arcan. dupl. Tart. Vitriolat. Nitr. &c. Rad. & Herb. Chærefol.
- 2 Dolores & motus spasticos mitigantia, Opiata legitime correctâ, Tinct. Anodyna Langelotti, Ther. cœlest. Massa Pil. de Cynogl. Cinnabarina, Nitrofa.
- 3 Motus febriles temperantia, salia neutra, Nitrofa, Lap.  $\Sigma$ . Percar.  $\mathcal{J}$ . diaph. Eff. Alexiph. D. Stahliani, Emulsiones &c.
- 4 Calculi regenerationem impediencia, Herbæ traumaticæ, Veron. Hed. terr. Sanic. Pyrol. Vir.  $\odot$ . aliaque superius de Exulcerationibus commendata.

## Formula Remediorum.

## 1 Clyster emolliens.

Rx. Decoct. emoll.  $\mathcal{Z}$ ix. Elect. lenit. ana.  $\mathcal{Z}$ ss.  
adde Ol. Lil. alb. Vitell. Ov. N. j. M.

## 2 Alius.

Rx. Herb. Malv. Coq. in s. q. Aq. simpl.  
Pariet. adde Ol. Chamom.  
Veron. ana. mj. Terebinth. ana.  $\mathcal{Z}$ ss.  
Flor. Chamom. mss. Vitell. Ov. N. j. M.

## 3 Decoctum Nephriticum Foresti.

Rx. Sem. Malv. Sebest. N. vij.  
Alth.  $\mathcal{Z}$ ij. ad  $\mathcal{Z}$ ijj. Rad. Liquirit.  $\mathcal{Z}$ vj.  
Cicer. rubr.  $\mathcal{Z}$ ijj. Coq. in Aq. simpl.  $\mathcal{B}$ . iij. ad  
4. frig. maj.  $\mathcal{Z}$ ij. dimidiæ partis consumpti-  
Hord. mund.  $\mathcal{Z}$ ij. nem Dosis  $\mathcal{Z}$ ijj. iv. singulis  
Caric. pingu. N. viij. 2. vel 3. horis.

## 4 Aliud.

Rx. Rad. Alb. Dactyl. ana. N. v.  
Liquir. ana.  $\mathcal{Z}$ vj. Sem. Viol.  $\mathcal{Z}$ j.  
Herb. Malv. mj. Coq. in s. q. Aq. Hord. Colat.  
Caric. pingu. D. calide sæpius.

## 5 Linctus emolliens.

Rx. Ol. Amygd. dulc.  $\mathcal{Z}$ ss. Sperm. cet.  $\mathcal{Z}$ ij. M.  
Sir. violar.  $\mathcal{Z}$ vj. D. testia pars quavis hora.

## 6 Species pro Balneo emolliente.

Rx. Herb. Malv. Includ. duobus. sacculis  $\odot$ .  
Parietar. coquantur in s. q. Aq. pro  
Chamom. c. flor. Balneo.  
Flor. Sambuc. ana. miiij.

## 7 Unguentum emolliens.

Rx. Ungt. Dialth.  $\mathcal{Z}$ j. applicetur calide regioni lum-  
Ol. Scorp. borum.  
Petrol. ana.  $\mathcal{Z}$ ij. M.

## 8 Aliud.

Rx. Unguent. Dialth.  $\mathcal{Z}$ j. applicetur ut antea.  
Anod.  $\mathcal{Z}$ ss. M.

## 9 Pulvis temperans.

Rx. Pulv. Antispam.  $\mathcal{Z}$ ij. D. singulis duabus vel tri-  
Div. in 6. part. æq. bus horis dos. j.

## Alius.

Rx. Lap. Percar. Cinnabar.  $\mathcal{J}$ ij gr. xij. M.  
Arcan. dupl. Div. in 6. part. æq. D. ut an-  
Nitr. depur. ana.  $\mathcal{Z}$ ij. tea.

## 10 Pulvis temperans &amp; anodynus.

Rx. Pulv. Antispam.  $\mathcal{Z}$ ij. Div. in 6. part. æq.  
Spec. de Hyac. gr. xvij. D. singulis tribus vel qua-  
MP. de Cynogl. gr. iij. M. tuor horis.

## 11 Potio temperans &amp; leniter pellens.

Rx. Aq. Chærefol. Malvat. Junip.  $\mathcal{Z}$ vj. M.  
Veron. ana.  $\mathcal{Z}$ ij. D. singulis 3. vel 4. horis co-  
Pulv. Antisp.  $\mathcal{Z}$ ij. chl. ij.

## 12 Potio temperans &amp; anodyna.

Rx. Aq. Frigor. Test. Ovor. calc. ana.  $\mathcal{Z}$ j.  
Chærefol. ana.  $\mathcal{Z}$ ij. Ther. cœl. gr. iij.  
Lap. Percar. Sacch. Perl.  $\mathcal{Z}$ ij. M.  
Tart. Vitriolat. D. ut antea.  
Nitr. depur.

## 13 Emulsio Lithontriptica.

Rx. Sem. Viol.  $\mathcal{Z}$ ss. Colat.  $\mathcal{Z}$ v. adde  
Mil.  $\odot$ ir. Lap. Percar.  
Pap. alb. ana. Test. Ov. calcin. ana.  $\mathcal{Z}$ ss.  
 $\mathcal{Z}$ ss. Sacch. q. s. ad grat. M.  
Aq. Frigor. q. s. D. sæpius cochlearia ali-  
F. l. a. Emulsio. quot.

## 14 Alia.

Rx. Amygd. dulc.  $\mathcal{Z}$ ss. Colat.  $\mathcal{Z}$ vj. adde  
Sem. Mil.  $\odot$ . Lap.  $\Sigma$ . preparat.  $\mathcal{Z}$ j.  
Violar. ana.  $\mathcal{Z}$ ij. Sacch. perlat. q. s. M.  
Aq. Veron. q. s. D. ut antea.  
F. l. a. Emulsio.

## 15 Decoctum abstergens.

Rx. Herb. Veron. Pimp. alb.  
Virg.  $\odot$ ir. Vincetox. ana.  $\mathcal{Z}$ ss.  
Hed. Terrestr. Incis. Contus. Coq. in Aq.  
Sanic. simpl.  $\mathcal{B}$ . iv.  
Pyrol. ana. mj. Dosis  $\mathcal{Z}$ vj. ter vel 4. quo-  
Rad. Liquirit.  $\mathcal{Z}$ j. tidie.

## 16 Tinctura abstergens.

Rx. Tinct.  $\mathcal{J}$ ij acr.  $\mathcal{Z}$ ij. Dos. 30. 40. gutt. mane &  
Eff. Succ.  $\mathcal{Z}$ ss. M. vesperi.

## 17 Alia.

Rx. Tinct. resolv.  $\mathcal{Z}$ ss. ficienti vehiculo.  
Dos. 40. 50. gutt. in suf-

## 18 Alia.

Rx. Tinct. Tart.  $\mathcal{Z}$ ijj. D. ut antea.  
Eff. succin.  $\mathcal{Z}$ j.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Cum calculus sit res toto genere p. n. ante omnia in Paroxysmo eo respiciendum est, ut calculus quantocyus e corpore expellatur, & dolores maximi hoc ipso tollantur. Huic fini potissimum inserviunt Clysteres emollientes, quoniam horum ope partes interiores emolliuntur, & relaxantur, ut hoc modo calculus non solum eo commodius egredi queat, sed etiam spasmus mitigentur.
- 2 Eidem fini inserviunt quoque Unguenta emollientia & anodyna regioni lumborum & abdomini parti inferiori secundum tractum ureterum calide, & sæpius applicata.
- 3 Insignem quoque opem præstant Balnea emollientia artificialia, siue semicupia, si iisdem ægroti ad umbilicum aut ad stomachum usque insident, & quidem inpr. si Herbæ emollientes duobus sacculis includuntur, & horum alter regioni lumborum, alter vero abdomini in balneo applicatur. Qui sacculi quoque, si balneum quis respuit, in aqua vellæte cocti dictis partibus imponi possunt.
- 4 Interne conveniunt quoque emollientia & lubricantia & inpr. Oleum Amygdalarum dulcium cum spermate Ceti sæpius calide sumptum.
- 5 Emolliendi & leniter pellendi fine ceteris remediis facile palmam præripit Decoctum Nephriticum Foresti, inpr. si Pulvis Antispasmodicus ipsius usui interponitur, quod sæpius observavimus.
- 6 Pellendi fine his quoque commendari meretur fucus Raphani, qui sine promotione æstus egregie pellit, inpr. si cum Decocto Nephritico Foresti patientibus exhibetur.
- 7 Quoniam autem æstus febriles utpl. concurrunt, supra præsumpta temperantia summo cum fructu reliquis remediis interponuntur.
- 8 Si vero dolores simul nimium urgent, commode talibus temperantibus admiscantur opia temperata, aut iisdem in senibus substituuntur Emulsiones præscriptæ, aut ad earum imitationem paratæ.
- 9 Excreto calculo, eo potissimum respiciendum est, ut renes abstergantur, atque uberior calculorum regeneratio impediatur: quo in casu omnia conveniunt remedia illa, quæ superius sub Abstergentium nomine in Tabulis de Exulcerationibus commendata fuerunt, inprimis vero Decocta illa traumatica.



ca & abstergentia, ut & Tincturæ alcalinæ abstergentes & Diureticæ.

- 10 Quibus tandem subjungantur talia remedia, quæ nervorum tonum restituere solent, inter quæ potissimum eminet Mixtura Tonica Stahlî, quæ simul Ventriculo, per vomitus labefactato, prospicit.
- 11 Et cum ipsa alvi adstrictio malum hoc sæpius insigniter augeat, eo potissimum respiciendum est, ut alvus præservationis gratia continuo aperta servetur per lubricantia atque lenia laxantia, inpr. talia, quæ humorum motum aliquo modo temperare valent.
- 12 Tandem etiam præservationis gratia insignem habet usum Venæsectio in pede, inprimis æquinoctiali tempore instituta, ut & scarificationes in subiectis succulentis repetitæ, quatenus hoc modo humores, alias ad partem affectam ruentes & calculi regenerationem promoventes, revelluntur, & non solum dolores a congestionibus oriundi præcaventur, sed etiam ulterior læs, (quoniam fere ordinarie partium, inpr. renum exulceratio conjuncta est) impeditur.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Quamvis alvus aperta tam curative, quam præservative optima sit, nunquam tamen ad aciora purgantia progrediendum est, quatenus calculum jam commotum ulterius movent, & hoc modo omnia symptomata una cum motibus febrilibus graviora reddunt.
- 2 Irritis omnibus aliis, Venæsectionem in pede institutam optimo cum successu fuisse, aliquoties observavimus, quod tamen ulteriori experientiæ commendamus.
- 3 Lithonriptica remedia summa cum cautela semper sunt præscribenda; si enim calculus est major, majora semper ab hisce remediis, commoto jam calculo, metuenda sunt mala.
- 4 Omnia volatilia remedia, Succinata, Terebintinata, Juniperina, non nisi cum summa cautela, præscribantur, quoniam non solum humorum affluxum ad renes, sed motus febriles augent, ac dolores longe acerbiores reddunt, imo sæpius mictum cruentum excitant.
- 5 Specifica Lithonriptica calculum frangentia & comminuentia laudabilem raro edunt effectum, nisi calculus admodum friabilis fuerit.
- 6 Interim tamen negari nequit, dari posse remedia calculum revera comminuentia: sive ea per os assumantur, sive per syringam in vesicam injiciantur, si enim dantur menstrua minime corrosiva metalla varia, gemmas, perlas &c. solventia facile concludi potest, non impossibilem esse talem calculorum dissolutionem.
- 7 Quoniam vero talia menstrua paucissimis sunt cognita, nostris temporibus magis usualis est Lithotomia, in qua tamen instituenda magnis cautelis opus est, de quibus in Chirurgia agemus.
- 8 Opiata in sistendis doloribus Nephriticis minus proficua sunt, quare non nisi refracta dosi exhibeantur.

### LIBER III.

## DE

# VITIIS SERI ET LYMPHÆ

## A C

### VARIIS INDE DEPENDENTIBUS AFFECTIBUS IN GENERE.

#### I. Definitio.

1 *Seri.* **S**erum est humor excrementitius per varia co-latoria a reliquis humoribus laudabilibus separari & excerni solitus, quantitate & qualitate multis morbis ansam præbens.

#### 2 *Lympha.*

Lympha vero est humor laudabilis nutritioni corporis inserviens, rarius quantitate, frequentius vero qualitate varios affectus produciens.

#### II. Differentia.

- 1 *Respectu materiæ*, serum constat ex partibus aquofohalituosis, biliosis, terreo-salinis & mucosis: lympha vero ex aqueo-gelatinosis & pinguibus.
- 2 *Respectu morborum* ab iis dependentium, alii a feri & lymphæ quantitate, alii vero ab eorum qualitate dependent.

#### III. Signa

- 1 *Affluxus feri* copiosus per consueta feri excernicula cum variis molestiis conjunctus: ut in *Coryza*, *Lip-pitudine*, *Salivatione*, *Tussi* & *Asthmate humido*, *Vomitu*, *Diarrhœa*, *Cholea*, *Lienteria*, *Fluxu cœliaco* & *Hepatico*, *Dysenteria benigna*, *Incontinencia Urinæ* & *Diabete*, *Pollutione nocturna*, *Gonorrhœa* & *Fluore albo simplici ac Sudore nimio*.
- 2 *Suppressiones* consuetorum feri fluxuum, variis symptomatibus stipatæ, uti in *Gravedine* & huic sæpius juncta *Cephalalgia catarrhali*, *Salivæ defectu* ac *Oris siccitate*, *Rucedine*, *Tussi sicca*, *Sudore suppresso*, *Ictero*, *Obstructione alvi*, *Flatibus*, *Dysuria*, *Ischuria* & *Stranguria*.
- 3 *Stagnationes & Stases feri* in variis partibus v. g. in *Oedemate*, *Cachexia* & *Chlorosi*, *Leuco-phlegmatia*, *Anasarca*, *Ascite*, *Tympanite*, *Hydrocephalo*, *Hydrope Pectoris*, *Uteri*, *Hydrocele* & *Hydromphalo*.
- 4 *Variæ Corruptiones & Exulcerationes*, uti in *Scabie* variis speciebus, *Scorbuto*, *Gonorrhœa virulenta*, *Lue Venerea*, *Factore Oris* & *Sudoris*. Reliqua sub affectibus specialibus occurrent.

#### IV. Subjectum.

- 1 *Ratione ætatis* Pueri & Senes magis quam reliquorum ætatum homines.
- 2 *Ratione Sexus*, feminæ præ viris.
- 3 *Ratione Temperamentorum* Phlegmatici & Sanguinei magis, quam Cholericici ac Melancholici.
- 4 *Laute viventes & otio dediti*.
- 5 *Potui nimium indulgentes*.
- 6 *Variis aeris alterationibus obnoxii*.
- 7 *Necessarias Secretiones & Excretiones negligentes*.
- 8 *Quibus serum vel per causas internas, vel per miasmata externa inquinatur*. Ut alia de quibus in affectibus specialibus sermo erit, silentio prætereamus.

#### V. Prognosis.

- 1 *Quo magis invalescunt fluxus feri & lymphæ*, eo difficilius postmodum curantur.
- 2 *Fluxus feri semper meliores sunt*, quam stagnationes & corruptiones.
- 3 *Uti Hæmorrhagiæ*, ita & feri ac lymphæ fluxus in consuetudinem facile abeunt, atque certa & periodica observant tempora.
- 4 *Fluxus feri imprudenter tractatos aut subito suppress-*



pressos gravissima sequuntur mala.

5 Quo magis acre est serum, eo facilius partium, per quas excernitur, excoaratio jungitur vel sequitur.  
6 Serum admodum mucosum, aut pituitosum facile partium obstructions & corruptiones producit.

Remedia.

- 1 Serum nimis fluxile incrassantia & corrigentia: Mucilago hordei, Gelatina; Radix Althææ, Liquiritiæ, Nitrosa, Absorbentia &c.
- 2 Serum nimis spissum solventia & attenuantia, uti sunt Radices Ari, Angelicæ, Pimpinellæ albæ umbelliferæ, Vincetoxici, Gentianæ, Enulæ, Galangæ, Zedoariæ, Ulmarie, Imperatoriæ, Levistici, Tinct. Tart. Antimon. Tartarifat. Ess. Pimpin. alb. Ess. succ. Ess. alexiph. Salia fixa & Neutra, Tart. Vitriolat. Nitr. Antimoniat. Tart. solub. Sal. Onon. Genist. Gumm. Ammon. Heder. Junip. Extr. Cochlear. Fumar. centaur. min. &c.
- 3 Serum correctum evacuantia, uti sunt Purgantia, Diaphoretica, Diuretica, Salivantia, Expectoantia.
- 4 Particulas feri corruptas corrigentia & evacuantia, uti sunt, præter antea recensitas Radices alexipharmacodiureticas, omnia anti-catarrhalia, Decocta Lignorum, Mercurialia &c.
- 5 Partibus læsis sive exulceratis prospicientia, easque mundificantia, uti sunt remedia varia Balsamica, abstergentia, exsiccantia, consolidantia. Ungu. Mercurialia, Ungu. alb. & rubr. camphorat. Balnea abstergentia &c.
- 6 Partes interne roborantia: Tinct. ♂ is Ludovici, Crocus ♂ tils Stahlii, Pulvis cachect. Ludovici, Mixtura Tonica.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Decoctum incrassans.

℞. Hord. mund. Daſyl. ā. N. iv.  
Rad. Alb. Passul. min. ʒvj.  
Liquirit. Inc. cog. in Aq. f. q. f.  
Polyp. a. ʒj. Colat. D. sæpius calide.  
Fic. pingv.

##### 2 Oleum incrassans.

℞. Oleum Amygd. dulc. Sperm. cet. ʒij. M.  
ʒj. pro 3. vel 4. dof.

##### 3 Emulsio incrassans.

℞. Amygd. dulc. ʒiss. Colat. adde  
Decoct. hord. mund. q. f. Sacch. canar. q. f. M.  
F. l. a. Emulsio. D. sæpius.

##### 4 Infusum resolvens.

℞. Rad. Pimp. alb. Cent. minor. a. mss.  
Vincetox. a. ʒss. Cort. Ont.  
Ari. Citr. a. ʒij.  
Zedoar. a. ʒj. Cinnam. ac.

Herb. Meliss. Sal. Absinth. a. ʒj.  
Mentb. Incis. infund. in Vin. alb.  
Rosmar. B. vi.

##### 5 Infusum resolvens & laxans.

Adde prædictis speciebus. Fibr. bell. nigr.  
Fol. fenn. f. f. ʒj. Rhab. elect. a. ʒj.  
infund. in Vin. q. f.

##### 6 Decoctum mundificans externum.

℞. Decoct. Calc. viv. ʒiv. ʒ. dulc. ʒj. M.  
Aq. Plantag. ʒij. applicetur calide cum lintea.  
Sacch. Saturni ʒij. minibus locis exulceratis.

##### 7 Unguentum mundificans.

℞. Ungt. rubr. camph. ʒss. ʒ. præcip. rubr. ʒj. M.

#### II. Methodus medendi.

- 1 Serum nimis fluxile falsum & acre ante omnia est incrassandum, ne acrimonia sua falsa partes, quas præterlabitur, erodat, uti id sæpius contingit in Coryza & Tussi.
- 2 Si vero serum est nimis mucosum & spissum per incipientia & solventia ad excretionem faciliorem præparari debet.
- 3 Postea vero excretio feri ad partes congesti, quantum quidem fieri potest, promoveri debet, ne sub diuturniori stagnatione noxam partibus inferat.
- 4 Cum vero sæpius affluxus feri ab aliis partibus nimius sit, hic interceptendus & serum per alia convenientia

loca evacuandum est, quod pro diversitate affectuum præstant Laxantia selecta, Diaphoretica, Diuretica, quæ reliquis incrassantibus & solventibus commode interponuntur.

5 Partibus internis per diuturnum affluxum debilitatis per remedia tonico-discutientia prospiciatur, partium ut fibrarum partium tonus restituatur, partim ut feri ad hæc partes nova regurgitatio præcaveatur.

6 Si in partibus externis læsio quædam a feri corruptione nata est, applicentur pro diversitate affectuum varia unguenta, pulveres &c. de quibus hinc inde variis Tabulis sermo erit.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 In incrassandis humoribus semper eo respiciendum est, ne per abusum eorum fibræ partium nimis relaxentur & hoc modo humorum propter dilatatos poros affluxus augeatur.
- 2 In nimia feri fluxilitate & acrimonia usus Alexipharmacorum, inpr. calidiorum, pariter noxius est, quare temperantia lenia & incrassantia provide hinc interponenda sunt.
- 3 In feri nimia mucositate fortiora solventia nocent, quare initium semper fiat a mitioribus.
- 4 Abstinentum quoque est a Purgantibus acris & drasticis in feri affectibus, si vero morbi vel subjecti conditio eadem admittit vel postulat, cum debitis cautelis exhibeantur.
- 5 Discutientibus & tonicis in affectibus serosis nullus est locus, nisi præparantia & evacuantia præmissa fuerint. Reliquas cautelas vide hinc inde in variis affectibus.

#### SECTIO I.

##### DE

### FLUXIBUS SERI & LYMPHÆ PRÆTERNATURALIBUS.

#### CAPUT PRIMUM.

##### De Coryza humida.

I. *Definitio.* **C**oryza est feri plus vel minus mucidi & falsi, per nares & sæpius etiam per fauces, ut plurimum cum sternutatione, conjuncta excretio, a feri cum sanguine versus caput congestione orta.

##### II. Differentia.

- 1 Coryza humida differt a sicca, quod in hac, etsi facta ad caput congestione, nihil excernatur, cum e contra in ea, de qua hic sermo est, insignis feri mucosi copia excernatur.
- 2 Alia est recens, alia habitualis.
- 3 Alia est vaga, alia periodica, certi anni tempora observans.

##### III. Signa.

- 1 Effluxus feri primo limpidi & aliquo modo mucidi per nares & fauces.
- 2 Frequentes sternutationes & hæc præcedentes narium titillationes molestæ.
- 3 Narium, si serum est nimis acre & falsum, erosiones superficialiæ.
- 4 Fluxus feri ex canthis oculorum & inpr. internis, cum visus aliquali hebetudine ac oculorum dolore, inpr. si lumini vel soli exponuntur.
- 5 Stupor capitis & sensus gravativus inpr. supra oculos & circa radicem nasi.
- 6 Tussis interdum cum rauedine conjuncta, inpr. si materia serosa acris copiosius ad fauces fluit.
- 7 Frequentes horrores & toni habitus corporis alterationes sive horripilationes, cum aliquali calore sæpius alternantes.
- 8 Aurium tinnitus pro subjectorum conditione frequenter repetentes.



- 9 Effluxus postea mucī admodum spissi & tenacis, qui non nisi fortiori emunctioe e naribus prodit.
- 10 Olfactus ut plurimum nullus, interdum vero sensus insignis fætoris.
- 11 Sapor vel depravatus, vel nullus, cum appetitu prostrato.
- 12 Sitis in quibusdam satis quidem gravis, utpl. tamen cum potulentorum aversatione conjuncta, in quibusdam quoque ejusdem defectus.
- 13 Somnolentia, somnus vero turbulentus vires non restaurans, sed potius corpus fatigans.
- 14 Lassitudo insignis totius corporis & torpor in actionibus animalibus.
- 15 Alvus utpl. segnis, urina pauca cum sudoris emanatione aut suppressione.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines temperamenti Phlegmatici aut Phlegmatico-sanguinei, Plethorici.
- 2 Juniores præ adultis, post suppressam transpirationem per refrigerationem corporis.
- 3 Feminae præ Viris.
- 4 Adulti etiam & Viri quibus adhuc congestiones ad caput sine succedente Hæmorrhagia fiunt.
- 5 Senes catarrhalibus affectibus antea sæpius obnoxii.
- 6 Homines quibus consuetæ feri evacuationes, sudores scil. & Diarrhœæ spontaneæ supprimuntur aut emanant.
- 7 Qui purgationes, venæ sectiones & scarificationes consuetas circa æquinoctia negligunt.
- 8 Qui pulveribus sternutatoriis abutuntur, aut ab horum pulverum ac fumi tabaci consueto uso subito desistunt.
- 9 Qui nimio Qris exercitio vigore sanguinis spoliati sunt.
- 10 Qui in aere frigido humido, aut humido calido versantur.
- 11 Homines torpidi & somno nimium indulgentes.

V. *Prognosis.*

- 1 Coryza humida per se periculo caret, imo statim temporibus inpr. circa æquinoctia repetens salutaris est, & a multis affectibus serosis capitis præservat, quatenus non solum multæ partes mucosæ salinæ acres excernuntur, sed etiam per frequentiores sternutationes, totum corpus omnesque partes insigniter commoventes, reliqui mucosi humores magis resolvuntur, & e partibus ubi stagnationes & exco-riationes moluntur, excutiuntur, ac per convenientia loca expelluntur.
- 2 Nimis diu tamen durans facili habitualis fit, & nimius humorum serosorum decubitus ad caput facile variis malis a sero oriundis viam sternit.
- 3 Coryza chronica facile tollit olfactum.
- 4 Colluvies illa serosa acris, si non sufficienti copia per nares excernitur, facile deponitur ad fauces & pectus cum metu erosionis aut exulcerationis Pulmonum Phthisicæ.
- 5 In senibus frequentes coryzæ, si effluxus mucī non rite procedunt, sæpius prodromi Apoplexiæ serosæ & Paralysis sunt.
- 6 Sin vero relicta consueta via in hisce aut alias debilitatis, humorum serosa mucidorum ad pectus descensus fit, non tantum asthmata chronica, sed etiam interdum catarrhi suffocativi sequuntur.
- 7 Coryzæ humidæ facile jungitur febris catarrhalis, infantibus non raro funesta.
- 8 Quo magis acris est materia, eo facilius metuenda est membranæ narium interioris erosio.
- 9 Erosionem hanc interdum sequuntur ulcera narium & Ozænæ, inpr. si corpus antea fuit insigniter cacochymicum.

VI. *Remedia.*

- 1 Materiam acrem tenuem incrassantia, Absorbentia: Lap.  $\sigma$ . Mat. perl.  $\zeta$ . diaph. Nitrosa, salia digestiva, neutra, Anodyna: M. P. de Cynoglossa.
- 2 Spissam solventia, uti sunt anticatarrhalia: Radix Angelicæ, Pimpinellæ albæ, Ari, Vincetoxici, Bardanæ, Petasitidis &c. Essentiæ ex his paratæ, v. g. Essentia alexipharmaca, Scordii, Pimpinellæ albæ, ut & Essentia succini, Lignorum, Tinctura Tartari,

Antimonii acris. Liquor. C. C. succin. &c. externe odor spir. Salis Ammon.

- 3 Nimium feri affluxum ad caput intercipientia & ad alia loca derivantia, uti sunt Diaphoretica & Diuretica, anticatarrhalibus, ubi hisce opus est, vel juncta, vel interposita, Laxantia ex Mercur. dulc. Extract Panchymag. Crollii, Eff helleb. nigr. Pilulæ Stahlianæ, Becherianæ, Balsamicæ viscerales, antirhevmaticæ, pediluvia.
- 4 Externa reslventia & discutientia capiti & temporibus applicata, cucuphæ, &c. inprimis vero camphorata.
- 5 Tonica sive caput roborantia, quorsum potissimum pertinet Mixtura Tonica D. Stahlī.
- 6 Præservantia: Venæsectiones, scarificationes & purgationes tempore æquinoctiali institutæ.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pulvis temperans &amp; diapnoicus.

Rx. Matr. perl. M. P. de Cynogl. gr. iiss. M.  
 $\zeta$ . diaph. div. in 3. p. æq.  
 Nitr. depur. a.  $\mathcal{D}$ j. D. singulis 3. vel 4. horis.

## 2 Alius.

Rx. Lap.  $\sigma$ . Spec. de hyacinth. a  $\mathcal{D}$ ss.  
 Tart. Vitriolat. M. P. de Cynogl. gr. ij. M.  
 Nitr. depur. a.  $\mathcal{D}$ j. div. in 4. p. æq.  
 Bez. min. D. ut antea.

## 3 Mixtura resolvens.

Rx. Eff. alexiph.  $\mathcal{Z}$ j. Dos. 25. 30. gt. bis vel ter  
 succin.  $\mathcal{Z}$ j. M. per diem.

## 4 Alia.

Rx. Eff. pimpin. alb.  $\mathcal{Z}$ j. Tinct.  $\zeta$  ii. acr. a.  $\mathcal{Z}$ j. M.  
 succ. dos. eadem.

## 5 Epithema.

Rx. Aq. Reg. Hung. a.  $\mathcal{Z}$ vi. M.  
 Spir. Vin. campb. pro usu externo.

## 6 Pilulæ.

Rx. Pil. balsam. visc.  $\mathcal{Z}$ j. dos. 15. 20. mane aut vesperi.

## 7 Alia.

Rx. Pil. antirhevmat. dos. 3. vel 5. vesperi in  
 N. xv. quocunque vehiculo.

## 8 Bolus laxans.

Rx. Conserv. rosar.  $\mathcal{D}$ ij. Res. Jal. gr. iij.  
 $\zeta$ . dulc. gr. xii. Sir. ros. sol. q. s. M.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Materia nimis tenui existente exhibeantur remedia, absorbentia, Nitrosa &c. eam incrassantia & corrigentia, ad præcavendam narium & faucium exco-riationem.
- 2 Ubi vero plus justo spissior est materia excernenda, remediis incidentibus, quantum quidem possibile, resolvatur: cui fini vel Mixturæ præscriptæ, vel decoctum lignorum, quod majoris hic, quam essentia ex lignis paratæ, est efficacis, vel infusa herbarum & radicum anticatarrhalium temperatarum, infer-vire poterunt.
- 3 Hisce pro circumstantiarum conditione vel præmit-ti vel interponi possunt remedialaxantia ex Mercurio dulci, Massa Pil. de Succino &c. inpr. quando affluxus materiæ catarrhalis nimius est ad caput, hoc enim modo materia ad partes inferiores derivatur & per alvum evacuatur, ac incommoda in capite & pectore metuenda præcaventur. Huc pertinent quoque Pilulæ veræ Becherianæ, quæ aliis incidendo robo-rando & evacuando palmam facile præripiunt. Nec minoris sunt efficacis Pilulæ nostræ antirhevmaticæ, quæ omnem mucositatem spatio paucorum die-rum incidunt, & per alvum educunt.
- 4 Tempore vespertino reliquis remediis jungantur pedi-luvia, ut hoc modo relaxatis partibus inferioribus caput eo magis a nimio affluxu feri mucidi liberetur.
- 5 Reliquis remediis interponantur diapnoica lenia re-media, hæc enim remediis incidentibus juncta cory-zam brevi quoque tollunt.
- 6 Si coryzæ acriori insignis accedit capitis dolor, eum, præparata prius materia, Nitrosa, cinnabarina cum momento MP. de Cynogl. optime leniunt, inpr. si tempore vespertino exhibentur.



- 7 Materia sufficienter incisa & resoluta, aut legitime præparata, in usum trahantur quoque externa, & imprimis camphorata, quæ in hoc casu præ ceteris sunt proficua.
- 8 Præservationis gratia, in subjectis ad coryzam maxime dispositis instituantur Venæ sectiones circa æquinoctia, quibus incidentia, laxantia & diapnoica mucositatem feri tollentia, quantitatem ejusdem imminuentia atque hoc ipso feri mucidi ad caput affluxum intercipientia, jungantur: imo ipsa venæ sectio mature in Plethoricis subjectis instituta, curationem coryzæ maxime promovet, inpr. si incidentia & reliqua remedia statim subjunguntur.
- 9 Cibi, si largiter aromatibus condiuntur, phlegmaticis maxime conveniunt.

#### VI. Cautela Practicæ.

- 1 Si materia nimis calida & acris fuerit, vitentur remedia anticathartica calida, quæ materiam magis acrem reddendo ac malum exasperando, non solum majori affluxui ad caput, sed etiam depositioni materiæ ad fauces & pectus cum metu exulcerationis harum partium anam præbent.
- 2 Eundem sæpius effectum edunt pilulæ cephalicæ, quas purgantia acra ingrediuntur.
- 3 Aer frigidus & humidus uti coryzam sæpissime, humores condensando & transpirationem impediendo, producit, ita etiam eam jam factam non solum diutius fovet, sed longe graviores reddit, quare talis aer summo studio fugiendus & temperate calidus potius eligendus est.
- 4 Externa discutientia numquam, nisi præmissis materiæ viti osam qualitatem corrigentibus, applicentur: hoc enim neglecto, materia, vel ad alias partes diffunditur, vel in majorem motum concitata affectum una cum reliquis symptomatibus exasperat: hoc in passu præ cæteris male audiunt vapor aceti calidi, suffumigia ex saccharo, ut & ex Mastiche, Thure &c. naribus excepta. Ipsa quoque salia volatilia urinosa, utut in coryza, a materia mucosa crassiore dependente, quoad usum externum proficua sint, in acriore tamen & a tenui materia originem trahente malum gravius reddunt & narium excoarctationem promovent.
- 5 Omnia calida externe applicata, uti sunt cucuphæ ex herbis & radicibus aromaticis paratæ, ac Balsama cephalica in sanguineis cholericis, & Plethoricis cephalalgiam vel augent, vel producant, quare non nisi Phlegmaticis, si præparantia præmissa fuerint, præscribantur.
- 6 Pulveres errhini & ptarmici, quibus quidam ad profligandam coryzam utuntur, sæpius malum gravius reddunt & ad coryzam habitualementem disponunt.
- 7 In coryza habituali Fonticuli & Setacea raro laudabilem edunt effectum, frequentius vero, imprimis si iterum clauduntur, graviora mala post se trahunt, quare iisdem interna methodica curatio per frequentiores Laxationes, lenes Diaphoreses, aut Diureses longe est præferenda.

### CAPUT QUARTUM.

#### DE

#### Lippitudine sive Ophthalmia serosa.

- I. **Definitio.** Lippitudo est feri plus vel minus acris & fluxilis ex glandulis oculorum cum vel sine dolore continuus effluxus, a congestione humorum serosorum ad oculos & glandularum relaxatione originem trahens.
- II. **Differentia.** Differt Lippitudo
- 1 Ab *Ophthalmia vera*, quæ signis vere inflammatoriis se manifestat, rubore scil. ardore & dolore satis insigni, quæ tamen signa in Lippitudine, de qua nobis sermo est, ut plurimum non reperiuntur.
- 2 Ab *Ophthalmia sicca* respectu fluxus lacrymarum in hac deficientis, in nostra vero excedentis.

- 3 Differt etiam gradibus Lippitudo.

- a Quando lymphæ tantum serosa & insipida e glandulis effluit.
- b Quando materia illa est falsa, acris.
- c Quando oculi rubedine inflammatoria cum dolore mordicante afficiuntur.
- d Quando erosio succedit cum consumptione glandulæ lacrymalis & succedente fistula lacrymalis.
- 4 Alia brevi tantum tempore affligit, quando scil. humorum catarrhalium ad oculos subitanea fit congestio: alia vero est chronica & habitualis, quæ præter continuum humorum serosorum affluxum insignem quoque glandularum laxitatem conjunctam habet.

#### III. Signa.

- 1 Effluxus feri ex glandulis lacrymalibus involuntarius.
- 2 Rubedo interdum oculorum inflammatoria.
- 3 Visus aliqualis hebetudo, cum dolore oculorum magis vel minus mordicante, præsentibus imprimis objectis lucidis.
- 4 Erosio nonnumquam glandulum lacrymalium levior in sensus incurrens.
- 5 Serum effluens modo fluidum, modo spissum palpebras conglutinans, inpr. tempore nocturno.
- 6 Lympha falsa per ipsas quoque nares interdum vel cum, vel sine sternutatione effluens.
- 7 Materia purulenta in quibusdam canthum oculi interiorem obsidens, effluens & vicinas partes ardens.

#### IV. Subjectum.

- 1 Homines respectu ætatis juniores, quibus congestiones fiunt ad caput: non exclusis tamen senibus, catarrhalibus capitis defluxionibus obnoxiiis.
- 2 Phlegmatici aut Phlegmatico-Sanguinei præ Cholericis & Melancholicis, quorum corpora magis sunt sicca & hinc ad feri fluxum minus prona.
- 3 Qui frequentius coryza humida laborarunt aut quibus coryza tam habitualis, quam periodica per imprudentem medicationem suppressa fuit.
- 4 Quibus crusta lactea aliæque capitis exulcerationes per remedia inconvenientia ad interiora repulsa fuerunt.
- 5 Quibus consuetæ narium Hæmorrhagiæ emanse- runt, aut per adstringentia suppressæ fuerunt, præsentibus tamen adhuc moliminibus ad eas instituendas.
- 6 Quibus fonticuli & setacea propter capitis & oculorum affectus excitata, neglecta interna sufficienti medicatione exsiccata fuerunt.
- 7 Qui aeri nimis frigido, aut etiam nimis calido, aut vaporibus corrosivis oculos exposuerunt.
- 8 Feminae & viri post Hæmorrhoidum & mensium suppressionem varias ad caput congestiones experti, aut consuetas sanguinis ventilationes negligentes.

#### V. Prognosis.

- 1 Lippitudo infantum tanti momenti non est, & sæpius succedentibus annis sponte cessat.
- 2 Inveterata tamen facile fistulam lacrymalem post se trahit, inpr. si serum effluens est maxime acre & salsum.
- 3 Quo magis inveterata est Lippitudo, eo magis rebellis est & difficulter admodum curationem admittit.
- 4 Lippitudo cum lacrymali fistula conjuncta non nisi hac curata cessat.
- 5 Lippitudo semel curata facile præsentibus causis internis & concurrentibus externis recurrit.
- 6 Lippitudo in acutis occurrens ordinarie malum est signum.
- 7 Lippitudo nimis subito per adstringentia externa suppressa vel visus debilitatem, vel decubitus feri ad partes vicinas, vel inflammationem post se trahit, aut denuo recrudescens longe gravius affligit.

#### VI. Remedia.

- 1 Laxantia, sordes primarum viarum & superfluum serum evacantia, ac simul nimium feri ad caput fluxum invertentia, quorsum spectant inpr. Mercur. dulc. Jalappa, Pilulæ Becherianæ, Balsamica viscerales,







hisce ancipitibus remediis suadendis Medicus admodum cautus sit necesse est.

7 Idem fere iudicium de fonticulis, in malo gravi chronico & jam habituali excitatis, est ferendum, quamvis enim interdum aliqualem habeant usum, quando scil. diutius fluunt & materia acris ad illos derivatur atque evacuatur, raro tamen constans hæc est curatio: quam primum enim, si ægri eorum pertæsi sunt, clauduntur, non solum pristinum malum recrudescit, sed & graviora incommoda post se trahit: quare interna continuata medicatio, nisi summa necessitas horum usum aliquo modo permittat, iis semper præferenda est. Et si propter varia incommoda, præcipue vero quonia subjecta juniora maxime debilia reddunt, fonticulos claudere animus est, iisdem clausis evacuantia & discutientia Diaphoretico-Diuretica subjungantur.

8 Alliacea, porracea, raphanacea, salita, largiter aromatisata aliaque acria acrimoniam humorum augmentia aut oculos interne & externe lædentia fugiantur.

9 Aer frigidus humores condensando fibrasque glandularum constringendo ac hoc ipso humores acres in oculis incarcerando, ob metuendam exinde inflammationem & exulcerationem vitetur.

10 Aer nimis lucidus objectaque lucida pariter oculos offendunt, & hinc ab iisdem lippi sibi caveant.

11 Ægroti quoque omnia, quæ quocunque modo humorum commotioni & exinde dependente majori ad caput congestionem ansam præbere solent, fugiant, uti sunt Balnea, Vina, Venus, motus graviores, lucubrationes &c.

12 Cauterisatio aut septicorum applicatio in fistula lacrymali provida manu fiat, ne oculus lædatur, & visus vel depravatio, vel abolitio sequatur.

13 Sternutatoria a quibusdam commendata, etsi aliqualem humorum faciant ad nares derivationem & evacuationem, non nisi summa cum prudentia exhibeantur, quatenus utpl. majoribus congestionibus ansam præbent.

## CAPUT TERTIUM.

## DE

## Salivatione ac Ptyalismo.

I. *Definitio.* S Alivatio est lymphæ salivalis ordinariæ alias per ductus salivales ad os fluentis præternaturalis & nimia excretio, vel a viarum laxitate, vel ab humorum circa caput congestorum quantitate, quam Natura expellere nititur, dependens.

II. *Differentia.*

1 Salivatio differt a Ptyalismo, non quidem ratione materiæ, quæ ejicitur, sed respectu modi: Ptyalismus enim indicat frequentem sputationem, sive abundans adsit materia, sive non, & sæpius soli consuetudini innititur: Salivatio autem nimiam salivæ & quidem præternaturalem in oris effusionem denotat, quæ vel sponte ex ore effluit, vel exspuitur, vel deglutitur.

2 Deinde etiam ipsa Salivatio gradibus differt:

a Alia enim est levior, qualis infantibus dentitionis tempore familiaris est.

b Alia hacce aliquo modo gravior, observatur interdum in adultis, & a causis internis, ac quidem præcipue vitio hypochondriorum dependet: talem observavimus ante aliquot annos in studio 19 annorum ex familia hæmorrhoidaria orto, qui post graves in hypochondriis incipientes dolores & cum maxima angustia & anxietate præcordiorum lipothymiis ac respirandi difficultate, suffocationem sæpius minitante, conjunctos) quotidie usque ad duas libras salivæ viscidæ ejiciebat & licet restitueretur, duobus tamen insequentibus annis in eundem affectum circa æquinoctium vernalis inciderebat.

c Alia gravissima est & a causis externis, Mercurio

scil. excitatur, qualem observamus in curatione Luis Venereæ.

III. *Signa.*

1 Continuus & præternaturalis oris mador ac salivæ plus vel minus viscidæ effusio.

2 Tumor in infantibus ut plurimum gingivarum, eandemque ac partium interiorum oris interdum excoriationes superficialiæ.

3 In hypochondriacis varia symptomata circa præcordia, constrictiones spasticæ, anorexia, ructus insipidi, murmura abdominis, alvi adstrictio &c. præcedunt, quibus postea jungitur capitis dolor ac Ptyalismus.

4 In salivatione mercuriali, præter jugem & frequentem salivæ excretionem, tumor colli, gingivarum & linguæ eandem præcedentia signa, ulcera interna oris, vacillatio dentium, dolor insignis ac fetor materiæ excretæ, concomitantia signa. Plura de hacce vid. infr. de Luis Venerea.

IV. *Subjectum.*

1 Infantes, quandiu expositi sunt dentitioni, frequentius salivationem, quam adulti experiuntur, quoniam gingivæ, ut dentes eo melius erumpere queant emolitione opus habent.

2 Respectu temperamenti humidioribus præ siccioribus magis familiaris est, utpote quorum corpora fero cum lymphâ abundant, ac poris quoque majoribus exitum faciliorem humoribus concedentibus prædita sunt: ut silentio præteream, quod ob laxiorem talium corporum constitutionem fibræ ad laxitatem præternaturalem magis pronæ sint.

3 Hypochondriaci aut Lienosi, observante id jam Hippocrate, juxta quem hi sunt sputatores, quoniam in hisce subjectis propter hypochondriorum constrictionem sanguinis motus ad superiora semper est major, ac sanguis simul spissior, unde etiam in partibus superioribus eo facilius feri a sanguine fit secessio.

4 Luis Venerea affecti post usum remediorum Mercurialium, tam internorum, quam externorum, aut alii quoque, quibus in morbis gravioribus curandis Mercurialia exhibentur, aut per remedia lenia masticatoria & salivantia lenis excitatur salivatio.

V. *Prognosis.*

1 Salivatio infantum, nisi sit enormis, raro periculosa est, quoniam uti paulo ante monitum fuit, ad dentitionem necessaria est.

2 Non raro tamen, ubi saliva acrior est, & ab infantibus deglutitur, Diarrhæarum fit causa.

3 Majorem meretur attentionem, si excoriationes partium oris internarum ipsi junguntur, nimiam enim salivæ acrimoniam, a qua varia metuenda sunt mala, indicat.

4 Salivatione tali imprudenter suppressa & facta humorum acriorum ad pectus translatione, funesta non raro symptomata, tussis gravior, febres catarrhales, respiratio difficilis, asthmata & inflammationes internæ metuendæ sunt.

5 Majoris momenti est Ptyalismus adultorum & Hypochondriacorum, non quidem respectu excretionis salivalis, sed potissimum ratione congestionum ad caput, facies & pectus & inde metuendorum affectuum.

6 Quo magis enormis est salivatio, eo magis etiam ob continuam feri & lymphæ excretionem reliquum corpus, cum metu subsecuturæ tabis exsiccatur.

7 Sputatio critica in morbis chronicis interdum admodum salutaris est. vid. *Histor. Morb. Uratislav.* Tom. I. p. 224.

8 Salivatio Mercurialis, quocunque etiam instituitur modo, teste experientia, nunquam periculo vacat, & sæpissime est remedium gravius ipso morbo.

VI. *Remedia.*

1 Lenia laxantia sernm a partibus superioribus reludentia, Magnesia alba, Mercurius dulcis cum stimulo jalapino, Pilulæ Becheri vel per se, vel in Aqua quadam destillata appropriata solutæ, Diacydon. lucid. jalap. Sirupi laxantes, de Cichor. cum Rhabarb. de Pomis laxativ. &c.



- 2 Præcipitantia sive absorbentia, Diaphoretica fixa cum Diureticis, Lap.  $\Sigma$ . Percar. Conch. ppt.  $\S$ . diaph. Magister. & flor. Sulphuris Nitr. deput.  $\S$  iat. Arcan. duplic. Tart. Vitriolat. &c.
- 3 Discutientia & Balsamica Ess. alexiph. succin. Myrrh. Tinct.  $\S$  ii, Tart. Spir. c. c.
- 4 Partes interiores referantia & obstructions tollentia: Tinct.  $\S$  ii acris, Tart. Tinct. resolvens, Pilulæ Becheri, Stahl's, Balsamicæ viscerales, antirheumaticæ &c.
- 5 Partes nimis laxas in ore & ductus salivales constringentia, Gargarismata, collutiones oris ex adstringentibus paratæ.

*Formula Remediorum.*

1 Pulvis laxans.

R. Specif. Jalap. gr. XXV. D. pro 1. dosi.

2 Alius.

R. Tart. Vitriolat.  $\S$  ss. D. ut antea.  
R. sp. Jalap. gr. vj. M.

3 Alius.

R. Magnes. alb.  $\S$  ss. D. mane & vespere.  
div. in 6. p. æq.

4 Potio laxans.

R. Aq. rub. id.  $\S$  ss. Sir. rosar. sol.  $\mathcal{Z}$  ij. M.  
cinnam.  $\mathcal{Z}$  j. D. mane  
Diacyd. luc. Jalap.  $\mathcal{Z}$  ij.

5 Alia.

R. Aq. meliss.  $\mathcal{Z}$  ij. Sir. Cort. Ont.  $\mathcal{Z}$  ss. M.  
Pil. polychrest. gr. XV. D. ut antea.

6 Sirupus laxans.

R. Sir. rosar. sol.  $\mathcal{Z}$  ij. D. ut antea.  
Ess. Jalap.  $\mathcal{Z}$  j.  $\mathcal{L}$  ij. M.

7 Bolus laxans.

R. Conf. gratiol.  $\mathcal{Z}$  ij. Sir. fl. persic. q. s.  
 $\S$  dulc. gr. XII. M. F. Bolus.  
Ref. Jalap. gr. IV.

8 Pilulæ laxantes & resolventes.

R. Pil. Becher.  $\mathcal{Z}$  j. dos. 15. 20.

9 Alia.

R. Pil. antirheumat.  $\mathcal{Z}$  ss. D. vespere N. V.

10 Pulvis diureticus.

R. Arcan. duplic. div. in 6. p. æq.  
Sal genist. D. singulis 3. vel 4. horis.  
Lap.  $\Sigma$ . an.  $\mathcal{Z}$  ij. M.

11 Potio Diapnoico-Diuretica.

R. Aq. Cheresol. Conch. ppt. a.  $\mathcal{Z}$  ss.  
cerasor. nigr. a.  $\mathcal{Z}$  ij. Sacch. perlat.  $\mathcal{Z}$  ij. M.  
 $\S$  diaph. D. singulis 2. horis cochl. ij.  
Tart. Vitriol.

12 Mixtura resolvens.

R. Ess. alexiph. dosi variat pro ratione æ-  
succin. tatis adultis 30. 40. gt. ju-  
Tinct.  $\S$  ii an.  $\mathcal{Z}$  j. M. nioribus 6. 12. 15. 20.

13 Mixtura resolvens & discutiens.

R. Tinct. Tart. Spir. C. C. an.  $\mathcal{Z}$  j. M.  
 $\S$  ii an.  $\mathcal{Z}$  ss. D. ut antea.  
Ess. succ.

14 Gargarisma adstringens.

R. Rad. bistort. Coq. in f. q. Aq. f.  
Plantag. an.  $\mathcal{Z}$  ss. in Colat.  $\mathcal{L}$  j.  
Herb. prunell. Dissolv. Mel. despumat.  
agrimon. Nitr. crud. an.  $\mathcal{Z}$  ij.  
Fl. ligustr.  $\mathcal{M}$  ss. Alum.  $\mathcal{Z}$  j.

VII. Methodus medendi.

- 1 Laxantia Mercurialia aut etiam fortiora purgantia, si necessitas horum usum suadet, reliquis semper præmittantur, ut hoc modo nimius feri ad superiora fluxus aliquo modo intercipiatur & superfluum per inferiora evacuetur,
- 2 Quibus pro rei necessitate etiam repetitis præcipitantia & diaphoretica fixa cum diureticis jungantur, ut hoc modo, materia serosa ad alia colatoria promota, salivatio eo facilius cessare queat. Hoc in casu insigniter etiam profunt pulveres Solares D. Richteri bis vel ter quotidie exhibiti, qui confortando æqualem humorum distributionem producant, & modo per alvum, modo per renes, modo per cutim serum evacuant, & a glandulis oris revellunt: imo in sali-

vatione etiam Mercuriali & post eandem Mercurium in corpore restituentem vel sensibilibus per varia emuntoria, vel insensibilibus expellunt.

- 3 Postea in usum trahantur Essentiæ Diapnoico-Diureticæ & discutientes, ut hoc modo & partes roborantur & facilis mali recursus præcaveatur.

- 4 Discussa & revulsa materia Gargarismata, leniter adstringentia & glandulas salivales cum ductibus excretoriis roborantia, insignem habent usum.

- 5 In adultis hypochondriacis pro temperamenti conditione sanguinis missiones per Venæ sectionem, scarificationes & Hirudinum applicationes, Purgantibus vel præmitti, vel postponi possunt.

- 6 Si talis Ptyalismus a vitio hypochondriorum dependit, Pilulæ Becherianæ optimæ quidem sunt, si aliquando continentur, majoris tamen sunt efficaciæ Pilulæ antirheumaticæ, ut pote quæ omnes obstructions brevi referant, & viscerum infarctum tollunt: imo in scirrhis etiam nondum inveteratis optimum quoque edunt effectum, eosque sensim sensimque emolliunt & resolvunt.

- 7 Resolutis obstructionibus ad roborandum & discutendum usurpentur Mixturæ tonico discutientes, inpr. vero Mixtura tonica Stahl's.

- 8 De moderatione salivationis Mercurialis vid. infra de Lue Venerea.

VIII. Cautela Practica.

- 1 Quamvis Laxantia & Purgantia insignem in hoc affectu habeant usum, Vomitoria tamen, translationem humorum ad superiora augentia, vitanda sunt.

- 2 Gargarismata adstringentia in principio mali vitentur, quoniam ductus salivales constringendo facile translationem humorum ad alias partes & inpr. ad pectus causantur.

- 3 Cinnabarina, licet optima sint anodyna & antispastica, in Ptyalismo Hypochondriaco, non nisi dosibus minoribus cum aliis exhibeantur, ne salivationem ob Mercurium contentum augeant.

- 4 Nisi alvus in eodem Ptyalismo continuo sit aperta, frustra reliqua exhibentur remedia.

- 5 Volatilia remedia, nisi præmittantur sufficientia evacuantia, insignes in corpore excitant turbas, & Salivationem sæpius augent.

- 6 Martialia in Ptyalismo Hypochondriaco, propter vim adstrictoriam quam in Hypochondriis exerunt, minime conducunt, post alia vero convenientia remedia prudenter exhibita, roborando & tonum partium restituendo, suo non carent usu.

CAPUT QUARTUM.

*De Tussi Humida.*

- I. *Definitio.* **T**ussis humida est motus pectoris excussorius fortior, sub expiratione contingens, quo mediante Natura materiam quandam plus vel minus mucosam & tenacem in bronchiis hærentem & respirationem insigniter intercipientem, pluribus & repetitis vicibus expellere nititur.

II. *Differentia.*

- 1 *Respectu loci affecti*, tussis hæc est
  - a *Pectoralis*, quando multa vel pauca materia, plus vel minus acris, aut etiam insipida in bronchiis hærens respirationem impedit.
  - b *Stomachalis*, quando multa materia mucosa in stomachum sensim deponitur, vel ibidem colligitur, quam Natura utpl. post pastum, quia digestionem turbat, per motum talem excussorium eliminare nititur, unde etiam cibi assumpti sæpius simul ejiciuntur.
- 2 *Ratione temporis aut durationis.*
  - a Alia est *recens*, quæ a mucosâ, a quacunque causa in bronchia recenter deposito, originem trahit.
  - b Alia est *chronica* aut *habitualis*, quando scil. materia sero-



feroso-mucosa per malam consuetudinem in bronchia & pectus deponitur.

3 Respectu quantitatis materie quæ excernitur.

a Majorem copiam ejusdem ejiciunt subjecta humidiora, juniora ac senes.

b Minorem vero subjecta sicca.

4 Respectu aliorum affectionum conjunctorum.

a Alia est complicata, quando vel coryza, vel rauco vel etiam phthisicum quid ipsi junctum est, aut quando tussis pectoralis & stomachalis simul idem subjectum corripunt.

b Alia est simplex, quæ solum ab humoribus in bronchiis hærentibus originem trahit.

5 Respectu causarum.

a Alia a causis internis congestione scil. humorum ad pulmones ortum ducit.

b Alia a causis externis aere frigido, fumo Sulphuris, potu frigido &c. originem trahit.

6 Respectu temporum anni.

a Alia est vernalis, quæ utpl. levior est.

b Alia est autumnalis, quæ & gravius affligitur & diutius etiam durat.

II. Signa Tussis

1 Pectoralis.

a Titillatio modo major, modo minor, vel in faucibus, vel in superiore asperæ arteriæ, vel in ejusdem inferiore parte.

b Inspirationis vel levior, vel gravior interceptio.

c Motus excussorius quasi convulsivus totius pectoris cum majori vel minori excretionem muci plus vel minus viscidum & interdum aliquo modo spumosi.

d Qui motus etsi aliquandiu cesset, frequentius tamen ob inspirationis impedimenta recurrit.

e Jungitur etiam sonitus interdum in summo, interdum vero etiam in infimo pectore.

f Non raro quoque accedit rauco ac dolor insignis in aspera arteria, qui continuante excretionem a superiore asperæ arteriæ parte interdum magis magisque descendit, ita quidem, ut interiora quasi exulcerata esse appareat.

2 Catarrhalis.

a Si talis tussis humida simul est catarrhalis, eam sæpius præcedit coryza & hinc frequentes junguntur sternutationes cum stupore & sæpius dolore insigni capitis, inprimis circa radicem nasi, aut supra oculos & quidem eo in loco, ubi sinus frontales sunt.

b Accedunt interdum leviores inflammationes, aut saltem tumidæ inflationes circa fauces.

c Sentiant etiam ægroti descensum materie cujusdam per infundibulum in fauces, quem statim tussis excipit.

d Materia quæ excernitur sæpius aut potius ordinarie est saporis salis, & ab initio tenuis magis, postea vero spissior evadit.

e Tussis hæc ut plurimum magis affligit quam simplex humida, inpr. vero tempore nocturno, ubi somnum, dum materia acris per infundibulum in fauces deponitur, maxime turbat.

f Ipse quoque somnus variis insomniis gravioribus interpellatur, unde etiam, inpr. si tussis & catarrhus est gravior, nulla post somnum corporis sequitur refocillatio, sed eo exacto caput magis stupidum est, membraque sunt lassæ & fatigata.

g Appetitus ordinarie est prostratus & gustus depravatus, ac licet sitis sæpius jungatur, potulenta tamen tanquam insipida aut tetri saporis respiciunt ægrotantes.

h Frequentes quoque interdum in hac tussi observantur horripilationes & phlogoses, imo non raro circa vesperam febris catarrhalis ei jungitur.

3 Stomachalis.

a Pertinacior, fortior ac diuturnior thoracis motus excussorius post pastum potissimum affligens.

b Major vel minor dolor in scrobiculo cordis, aut saltem titillatio molesta in eo occurrens.

c Appetitus ut plurimum prostratus, aut si aliquo

modo viget, nulla tamen ciborum digestio contingit.

d Inflatio interdum Ventriculi, aut sensus rei cuiusdam eundem gravantis.

e Sputum multum viscidum post pastum in faucibus hærens.

f Vomitus sive rejectio ciborum cum mucoviscido post pastum tussim graviores excipiens, quo facto aliquo modo mitior evadit tussis.

4 Habitualis.

a Tussis continuo affligens & spatio plurium septimanarum imo mensium durans.

b Copiosa materie mucidæ plus vel minus viscidæ, utpl. coloris albicantis, interdum vero flavescens & viridescens ejectio.

c Lassitudo utpl. insignis & torpor omnium partium, sine tamen insigni contabescencia earum.

d Quibus sæpius multa antea recensitorum symptomatum junguntur.

IV. Subjectum.

1 Respectu ætatis, juniores & senes frequentius laborant tussi humida, quam reliquarum ætatum homines.

2 Respectu temperamenti Phlegmatici & sanguinei ob humidiores corporis constitutionem præ ceteris ad eam sunt dispositi.

3 Nec etiam immunes sunt ab hac tussi Adolescentes & Juvenes, qui frequentibus sanguinis congestionibus ad pectus corripuntur, quatenus sub hac aliquali humorum stagnatione in pectore & circa illud copiosa interdum feri fit secessio & in pulmones depositio, quam Natura postea per tussim eliminare nititur.

4 Homines etiam sensibilibus Naturæ, inprim. si humida concurrat constitutio facile, quoque tussim humidam incurrunt, si corpus aeri frigidiori & humido exponunt.

5 Ob eandem quoque aeris constitutionem multi hominum, præcipue senes, ad muci generationem & affectus catarrhales præ ceteris jam proni & dispositi, tussi humida ac præcipue catarrhali corripuntur.

6 Qui coryza sæpius laborant, facilius quoque in tussim humidam incidunt.

7 Qui potum frigidum æstuante corpore ingurgitant, aut illud sudore madidum, præcipue pectus, collum & caput aeri frigido exponunt, aut etiam congestionibus ad pectus obnoxii, pedes subito refrigerant.

8 Qui sudoribus spontaneis dediti eosdem vel negligunt, vel per imprudentem medicationem supprimunt.

9 Qui consuetas sanguinis evacuationes, per venæ sectionem & scarificationes, aut etiam assuetas laxationes intermittunt.

10 Quibus sanguinis fluxus vel emanerunt, vel suppressi fuerunt.

11 Infantes præ aliis tussi stomachali sunt obnoxii.

V. Prognosis.

1 Tussis humida pectoralis recens prorsus nihil periculi involvit, sed sæpissime excussa materia sponte cessat.

2 Imo in quibusdam subjectis, quæ eam temporibus æquinoctialibus experiuntur, interdum beneficium Naturæ est, quæ corpus per hanc excretionem a multis partibus mucosis liberat, vernalis tamen semper magis salutaris est, quam autumnalis.

3 Si talis tussis consuetæ ordinariis temporibus a Natura non excitatur, nec materia per alia loca evacuat, varia alia mala sequuntur.

4 Si autem corpora impura sunt, ac mucoviscido multum salis acris admixtum est, pulmonum erosio metuenda est, præsertim si tussis talis diu continuat.

5 Quo magis est viscida materia excernenda in pectore hærens, eo diutius durat tussis.

6 Quo magis vero tenuis & acris ea est, ac rauco cum dolore faucium & asperæ arteriæ jungitur, eo facilius phthisicum quid accedit.

7 Hoc eo facilius metuendum est in tussi catarrhali, quan-



quando humores acres frequentius & in majori copia ad fauces & pectus deponuntur, ibidemque acrimonia sua tumidas inflammationes, aut etiam exulcerationes superficiarias producant.

- 8 Periculo quoque non vacat tussis catarrhalis, si febris circa vesperam ipsi jungitur, nisi enim hæc perite tractetur, facile graviora symptomata sequuntur.
- 9 Tussis a causis externis orta non adeo reformidanda est ac ea, quæ ab internis originem trahit.
- 10 Tussis stomachalis, etsi respectu loci affecti tantum periculi non involvat, semper tamen gravior est, & diutius etiam durat, ac non raro infantes ad Atrophiam disponit.
- 11 Uti tussis pectoralis infantem, quando scilicet materiam e pulmonibus excussam deglutiunt, facile in stomachalem transit, ita etiam stomachali, si aliquandiu duravit, postea accedit pectoralis, ita ut composita evadat.
- 12 Quando in tussi habituali tandem materia purulenta cum muco ejicitur, aut hic sanguine tinctus est, ac viribus insigniter decrefcentibus totum corpus quoque contabescit, pessimum est signum, quia tussim phthysicam esse indicat.
- 13 Tussis humida, subito in siccam degenerans, ob denegatam partium excrementitiarum excretionem facile pulmonum exulcerationem aut Phthisin & non raro etiam suffocationem post se trahit.
- 14 Tussis humida expectorantibus & emollientibus perverse tractata, majoribus congestionibus ad pectus ausam præbet & facile in habituales, ex hac vero in phthysicam transit.

#### VI. Remedia Tussis

##### 1 Pectoralis.

- a Affluxum humorum ad pectus intercipientia, & ad alia loca commoda excretoria, præcipue vero ad alvum derivantia: Mercurius dulcis, Pulvis & Resina Jalappæ, Mechoacanna, Specif. jalap. Pilulæ ex Gummatibus & Purgantibus paratæ, Pilulæ Bucheri aut Stahlî cum stimulo quodam, Pilulæ antirheumaticæ, Extract. Helleb. nigri, Extr. Colocynth.
- b Materiam in pulmonibus hærentem ad faciliorem excretionem disponentia, quod fit
  - a Materiam nimis tenuem & acrem demulcendo: id quod præstant (1) *Ostracodermata*, Mater Perlarum, Lap.  $\Sigma$ . Conch. ppt. &c. (2) *Emulsiva* Emulsio amygd. dulc. Nucl. Pini, aliæque ex seminibus paratæ. (3) *Mucilaginosæ*, uti sunt Decoct. Hord. Decoct. Rad. alth. Liquirit. Mucilag. Cydon sem. Pysylli &c. (4) *Gelatinosæ*, Gelat. C.C. cum Amygd. dulc. Gelat. pedum vitul. (5) *Oleosa & pinguis*, Ol. Lini, Oliv. Amygd. dulc. Sperm. Ceti. (6) *Glutinosa*, Mastiche, G. Arab. Tragac.
- 3 Nimis mucidam resolvendo & incidendo, quod fit per *Radices*. Ari, Angelic. Pimpinell. alb. Helen. Irid. Flor. Zedoar. Vincetox. Galang. Herb. Scabios. Veronic. Bellid. Tussilag. Hyssop. Marrub. alb. Sem. Anis. Fœnic. Gummi. Ammon. Galb. Tinct.  $\mathcal{G}$ ii acrem, Pectoralem nobis familiarem, Eff. alexiph. Stahlî, Succini, Sirup. de Nicot. Capill. Veneris, de Erysim. Lobelii, Oxy-mel simpl. & scyllit.
- $\beta$  Tenacem vero & viscidam & resolutioni refractariam volubilem reddendo: quod peragunt Fructus dulces, Ficus, Passulæ, Dactyli, Sebesten, Siliqua, Radix Liquiritiæ ejusdemque Succus, Mucilagine, Emulsiones &c. antea allegatæ.
- c Motus nimios excussorios sopientia, uti sunt Cortex chacarillæ & opiata legitime correctæ, M. Pil. de Cynoglossa &c.
- d Pulmones debilitatos roborantia & ulteriorem affluxum prohibentia, inter quæ primas tenet Mixtura tonico discutienti Stahlî, Tinctura  $\mathcal{G}$ ii acris, Eff. Succini & Aqua Veronicæ Vinosa, quam ceu specificum laudat D. Stahlîus *Dissert. de Affect. Pectoris* pag. 47.

##### 2 Stomachalis.

- a Materiam mucosam incidentia & abstergentia: uti sunt supra recensitæ Radices anticatarrhales, ut & Essentiæ ex iisdem paratæ, Essent. scilicet alexipharm. Pimp. alb. it. Eff. Succini.
- b Eandem materiam blande evacuantia:  $\mathcal{G}$ . dulc. Pil. ex Gummatibus & Extractis amaris paratæ, aliaque de quibus sub Tussi Pectorali dictum fuit.
- c Roborantia & Discutientia antea recensita.

##### 3 Habitualis.

Jam laudata remedia incidentia, derivantia, evacuantia & roborantia.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis purgans.

$\mathcal{R}$ . Specif. Jalap. gr. XXV. D. pro 1. dosi.

##### 2 Aliud.

$\mathcal{R}$ . Magnes. alb.  $\mathcal{Z}$ ss. Tart. Vitriol. gr. viij. M.  
Res. jalap. gr. iv. D. ut antea.

##### 3 Bolus purgans.

$\mathcal{R}$ . Conf. fl. bellid.  $\mathcal{G}$ ij. Sir. ros. sol. q. s.  
 $\mathcal{G}$ . dulc. gr. xii. M. F. Bolus.  
Res. jal. gr. v.

##### 4 Pilulæ purgantes.

$\mathcal{R}$ . Extr. Panchym. gr. xii. Arcan. dupl. gr. iv.  
 $\mathcal{G}$ . dulc. gr. viij. Tinct.  $\mathcal{G}$ ii. q. s.  
Res. jalap. gr. ij. M. F. Pil. pro 1. dosi.

##### 3 Aliæ.

$\mathcal{R}$ . M. P. Becher.  $\mathcal{G}$ j. Elix. P. P. q. s.  
Extr. coloc. gr. ij. M. F. Pil. D. ut antea.

##### 6 Aliæ.

$\mathcal{R}$ . Pil. antirheumat.  $\mathcal{Z}$ ss. D. 5. pro dosi noctu.

##### 7 Aliæ.

$\mathcal{R}$ . M. P. de Ammon. gr. xii. Elix. pectoral. q. s. M.  
Extr. agar. gr. viij. F. Pilulæ pro 1. dosi.  
Res. jal. gr. iij.

##### 8 Aliæ.

$\mathcal{R}$ . G. Ammon. in Aq. sol.  $\mathcal{G}$  Extr. Troch. Alb. gr. ij.  
inspiss. Elix. P. P. q. s. M.  
Extr. Panchymag. a  $\mathcal{Z}$ ss. F. Pilulæ D. ut antea.

##### 9 Pulvis incrassans.

$\mathcal{R}$ . Matr. perl. dos. 2. cusp. cultr. sing. 4. horis.  
Lap.  $\Sigma$ .  
Mastich. el. a  $\mathcal{Z}$ ss. M.

##### 10 Alius.

$\mathcal{R}$ . Conch. ppt.  $\mathcal{Z}$ ss. Sperm. cet. a  $\mathcal{Z}$ ss. M.  
G. Arab. D. ut antea.

##### 11 Linctus incrassans.

$\mathcal{R}$ . Ol. amygd. dulc. Sperm. Cet. rec.  $\mathcal{Z}$ ij. M.  
Sacch. cant. alb.  $\mathcal{Z}$ ss. D. Sapius calide.

##### 12 Rotulæ incrassantes.

$\mathcal{R}$ . Succ. liquirit. Sacch. in  $\nabla$ . Papav. rh.  
Spec. diatrag. frig.  $\mathcal{Z}$ j. Sol. q. s. M. F. Rotulæ.

##### 13 Emulsio incrassans.

$\mathcal{R}$ . Amygd. dulc. F. l. a Emulsio.  
Nucl. Pini. Colat.  $\mathcal{Z}$ vj. adde.  
Pistac. a  $\mathcal{Z}$ ij. Conch. ppt.  $\mathcal{Z}$ j.  
Aq. Nymph. Sacch. q. s. M.  
Scabios. q. s. D. Cochleatim.

##### 14 Decoctum incidens.

$\mathcal{R}$ . Rad. Pimp. alb. Bellid.  
Vincetox.  $\mathcal{Z}$ ss. Virg.  $\mathcal{G}$ r.  $\mathcal{Z}$ . mj.  
Ari.  $\mathcal{Z}$ ij. Inc. D. ad Chart.  
Herb. Hyssop. Decoct. vel Infus.  
Scabios. bibatur calide.

##### 15 Aliud.

$\mathcal{R}$ . Rad. Helen. Cherefol.  $\mathcal{Z}$ . mj.  
Angel. Sem. Anis.  
Imperat. a  $\mathcal{Z}$ ij. Fœnic. a  $\mathcal{Z}$ ij.  
Herb. Capill.  $\mathcal{G}$ . Inc. cont. g. m. D. ad Cb.  
Marrub. usurpetur ut antea.

##### 16 Pulvis incidens.

$\mathcal{R}$ . Rad. Pimp. alb. Flor. Sulph.  $\mathcal{Z}$ j.  
Ari. Sacch. ad pond. omn.  
Ir. Flor. M. Dos. 2. cusp. cultr.  
Sem. Anis. sing. 3. vel 4. horis.  
Fœnic. a  $\mathcal{Z}$ ij.

##### 17 Alius



17 *Alius.*

Rx. *Lap. ō.* *Sacch. can.* ℥ss.  
*Rad. Ari.* *Ol. dest. Anis. gr. vj.* M.  
*Flor. Sulph.* *M. ut antea.*  
*Cinnam. acut. a.* ℥j.

18 *Potiuncula incidens.*

Rx. *Aq. Hyssop.* *Sir. nicot.* ℥ss. M.  
*Scabios. a.* ℥ij. *D. singulis 3. vel 4. horis*  
*Astmat.* *cochl. aliquot.*

*Oxym. Squillit. a.* ℥j.19 *Alia.*

Rx. *Aq. Fœnic.* *Nicot.*  
*Veron.* *de Erysim. Lob. a.*  
*Tussilag. a.* ℥jss. *℥ij. M.*  
*Sir. violar.* *D. ut antea.*  
*Hyssop.*

20 *Alia.*

Rx. *Aq. Scabios.* *fol. ℥iss.*  
*Veron.* *Sir. Nicot.*  
*Astmat. a.* ℥jss. *Hyssop. a.* ℥ss. M.  
*G. Ammon. in Aq. Squil.* *D. ut antea.*

21 *Alia.*

Rx. *Aq. astmat.* ℥ij. *M.*  
*Tinct. Resolv. ℥j.* *Dof. cochl. 1. sing. 4. 6.*  
*Sir. de Erysim. Lab. ℥ss.* *horis.*

22 *Tinctura resolvens.*

Rx. *Tinct. Pector. ℥ss.* *vesperi in decocto in-*  
*D. 25. 30. gt. mane & cidente.*

23 *Alia.*

Rx. *Tinct. Resolv.* *D. ut antea.*  
*Pector v. ℥ij. M.*

24 *Alia.*

Rx. *Eff. Alexiph.* *Tinct. ℥ii acris a. ℥j. M.*  
*Succin.* *D. ut antea.*

25 *Decoctum expectorationem pro-*  
*movens.*

Rx. *Decoct. pector. ℔. ij.* *rit ℥iv. calide.*  
*D. singulis 4. vel 6. ho.*

26 *Aliud.*

Rx. *Decoct. flor. & fruct. ℔.* *D. ut antea.*

27 *Pilulæ anodynæ.*

Rx. *Succ. Liquirit. ℥j.* *M. F. Pil. adpond. gr. ii.*  
*M. P. de Cynogl. gr. vj.* *D. 5. vel 6. vesperi.*  
*Sir. pap. simpl. q. s.*

VII. *Methodus medendi.*1 *Tussis pectoralis.*

a In omni tussi humida in principio statim optime, conveniunt Purgantia non tantum lenia, sed etiam aliquo modo fortiora, quæ scilicet simul in humores quoque agunt, eosque colliquant & evacuant: hoc enim ipso humores mucosi ad intestina derivantur atque nimius ad pectus eorum affluxus optime intercipitur. Mercurius dulcis hoc in casu optimus est, & aliquoties exhibitus tussim leviolem sæpius solus tollit.

b Venæ sectiones & scarificationes in principio institutæ, præsentæ Plethora, aut quando Tussis a congestionibus, suppressas Hæmorrhoides & menses, aut neglectas sanguinis missiones insecutis, ortum traxit. insignem habent usum, quando scilicet revulsione gratia in partibus inferioribus instituuntur, quoniam congestionem sanguinis ad pectus & hoc ipso Tussim propter talem congestionem excitatam insigniter imminuunt.

c Postea respiciatur ad materiam tussis, an scilicet incrassatione, an vero incisione opus habeat? Si nimis tenuis est, & acris exhibeantur incrassantia superius indigitata, hæc enim materiam illam acrem quasi involvunt, ita ut tantam irritationem excitare nequeat. Præ ceteris autem commendari meretur sperna ceti recens, quod in omni serosa acrimonia egregios edit effectus, inprimis quando juscula hordeacea aut Emulsionem ejus usui interponuntur.

d Si vero mucosa est materia, supra præscripta solventia & anticatarrhalia ægrotis dentur, e quorum numero laudem merentur Gummi-resinæ, utpote quæ non solum insignem incidendi, sed etiam laxandi vim possident, inprimis quando aliqua-

lis ipsis additur stimulus.

e Si nimia tenacitate & visciditate peccat mucus excernendus, volubilis reddendus est, ut eo commodius excerni queat, id quod præstant sub Lit. γ) allegata remedia: quibus etiam flores Sulphuris accendi merentur, qui egregium hoc in casu edunt effectum.

f Evacuata sufficienter materia, Diaphoretica insignem quoque habent usum, quatenus æqualem humorum motum producant, ac hoc ipso illapsum feri novum in pulmones præcavent, si tamen sufficientia discutientia antea incidentibus mixta fuerint remediis, talibus diaphoreticis sæpius carere possumus.

g Si nihil amplius materiæ mucosæ restat in Pulmonibus, ac nihilominus Tussis adhuc urget, remedia motus hosce sopientia dentur: quo in casu optimum est remedium cortex chacarillæ, utpote qui non solum egregie discutit, sed etiam motus tales tuto sopit. Eundem effectum edunt opiata legitime correctæ, uti Massa Pilularum de Cynoglossa, si pauca ejusdem grana aliis convenientibus admiscantur remediis.

h Cum vero per tales frequentes motus excussorios pulmones ut plurimum magnopere debilitentur, tandem etiam, præmissis hactenus dictis remediis, tonica sive tonum Pulmonum restituentia exhibeantur, quod inprimis præstant Aqua Veronicæ Vinosa juxta mentem D. Stahlii parata, quæ ad unam aut alteram unciam mane & vesperi sumpta, & per plures dies continuata, in tussi etiam chronica specificam habet efficaciam: insignem quoque tonico discutientem effectum habet Mixtura tonica D. Stahlii, de quo sæpius jam dictum fuit.

2 *Catarrhalis.*

a In hac tussi potissimum eo respiciatur, ut materia quæ partim in bronchiis generata, partim per infundibulum decidens & asperam arteriam afficiens, ut plurimum nimis acris & tenuis est, mitigetur & præparetur, uti supra jam dictum fuit.

b Si vero aliqualis occurrit spissitudo, incidentia & solventia uti in reliqua tussi usurpentur.

c Hisce remediis vel interponantur vel jungantur laxantia supra præscripta, partim ut affluxus humorum intercipiatur, partim ut mucositas imminuatur.

d Insignem quoque in hac tussi edunt efficaciam Tincturæ alcalinæ solventes & discutientes ac simul Diuresin cum Diaphoresi promoventes.

e Quibus omnibus peractis exhibeantur motus sopientiam ac tonum restituentia.

3 *Stomachalis.*

a Cum causa hujus tussis ordinarie in Ventriculo hæreat & pectus in consensum trahat, hæc mature removenda est per laxantia repetita, Mercurialia aliaque supra præscripta, inprimis vero per Pilulas Becherianas, quæ incidunt, abstergunt, evacuant & roborant, atque hoc modo sæpius solæ sufficiunt: ubi vero hæc non reperiuntur, substituantur aliæ ex Gummatibus & Extractis amaris paratæ, aut Mercurialia in usum trahantur & præcipue Aqua dulcis.

b Laxantibus talibus interponantur incidentia & discutientia, non præsentem tantum mucum tollentia, sed etiam ulteriorum ejusdem generationem impediunt, quo in casu optime sunt Tincturæ alcalinæ vel solæ, vel cum Essentia Alexipharmaca Stahlii, Pimpin. alb. Helen. mixtæ. Egregium quoque habet usum Pulvis stomachicus Birckmanni aliaque, quorum compositionem Radix ari in paulo largiori quantitate ingreditur.

c Eidem scopo inserviunt cibi bene aromatibus conditi, & vinum generosum, quæ digestionem promovent & cruditarum viscidarum generationem præcavent. Conducunt etiam Liqueores Gallorum spirituosos post cœnam sumti, Spiritus anisatus, &c.

d Tandem supra præscriptis Tincturis addatur Spiritus.



ritus C. C. vel Mixtura Tonica Stahlī ad restituendum Ventriculi tonum aliquandiu usurpetur.

#### 4 Habitualis.

- a In hac tussi laxationes frequentius quam in reliqua repeti debent, ut hoc modo humores sensim ad alia loca deriventur & evacuentur.
- b Ipsa quoque incidentia & discutientia diutius continuanda sunt, ut mala illa consuetudo, juxta quam humores in nimia copia ad pectus ruunt, successive tollatur: præ ceteris hic se commendat Succus Squillæ a Zi. ad ij. cum Spiritu Vini sumptus, Oxymel Squilliticum, Radix Ari, Tinctura pectoralis nobis usualis, quotidie bis vel ter etiam ad 25. guttas sumpta, & Aqua Veronicæ Vinosa Stahlī.
- c Tandem etiam sopientia, quando scil. convenientia præmissa fuerunt remedia, ac postea tonica exhibeantur.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Purgantia drastica in cura tussis cujuscunque vitentur, quatenus nimium humores commovendo sæpius magis nocent, quam profunt.
- 2 Vomitoria, quæ a quibusdam ad promovendam expectorationem laudantur, non nisi cum summa prudentia exhibeantur, & semper refracta dosi aliis addantur remediis, ac quidem magis in stomachali quam pectorali tussi. Ex talium vomitoriorum numero precipuum fere est Oxysaccharum emeticum Ludovici, quod sæpius in tussi infantum stomachali cum fructu aliis Sirupis incidentibus addidimus.
- 3 A purgantibus, nisi reliquis remediis, præsertim ubi humorum copia & consuetus jam eorum affluxus ad pectus pressus est, frequentius interponantur, nihil solidi sperandum est.
- 4 Mercurialia caute semper usurpentur, iisque, nimirum mitioribus, uti est ꝑ dulcis, sufficiens semper stimulus addatur, ne humores nimium colligantur quando majori ad superiora affluxui ansam præbeant.
- 5 Si tussis humida originem a fluxibus sanguinis suppressis originem traxit, semper ad eorum revocationem respiciendum est: id quod etiam in artificialibus sanguinis evacuationibus observandum est, hoc enim neglecto, Medicus sæpiissime Tussis curationem frustra suscipit.
- 6 Quando vero sudores matutini spontanei neglecti congestionem ad pectus ansam dederunt, eo ante omnia respiciendum est, ut sudor revocetur, quod per diaphoretica discutientibus mixta facile obtineri potest: si autem humorum status est nimis mucosus, incidentia & evacuantia diaphoreticis semper sunt præmittenda.
- 7 Nunquam tamen regimini sudorifero coacto, fortioribusque diaphoreticis locus concedendus est, quoniam humores commovent: cum vero nimiam hanc commotionem non semper statim sequatur evacuatio per sudorem, varii humorum seroso salinomucidarum translationibus ad alia loca, variisque inde dependentibus affectibus ansam præbent.
- 8 Multo minus id suadendum est, si tussis fuerit catarrhalis, hæc enim remedia fortiora facile motus febriles excitant, sive febrem catarrhalem producant, duæ etsi, si benigna est, periculo careat, facile tamen, si talia remedia continuantur, in pejorem degenerat statum.
- 9 Expectorantia in quavis tussi non nisi summa cum prudentia exhibeantur: cum enim talia pulmones insigniter relaxent, ad majorem humorum affluxum, Tussim habitualement & hinc metuendam pulmonum exulcerationem viam sternunt, quare laxantia & discutientia iisdem semper interponantur.
- 10 Nec etiam facile vulgo sic dicta pectoralia traumatica præscribantur, nisi enim sufficiens præmissa fuerit humorum evacuatio & præparatio, humores in copia adhuc præsentem incrassantur, qui postea facile labem pulmonum producant, si vero cum discutientibus, & solventibus & quidem in moderata dosi miscentur, suo non carent usu.

- 11 Si Febris quædam catarrhalis accedit, vitetur abusus Nitroforum & Salium, ne ob humorum acrium incarcerationem & majorem pulmonum irritationem phthisicum quid sequatur. Magis hoc in casu profunt absorbentia acido citrifaturata, quæ blande abstergunt & æstum febrilem temperant. Nitri tamen moderatus usus promovendæ expectorationis gratia minime est reformidandus.
- 12 Absorbentia quoque, quoniam humorum incrassationem & majorem mucī copiam producant, caute præcipue in Tussi chronica usurpentur.
- 13 Opiata, nisi prudenter exhibeantur, ut plurimum noxia sunt, quamvis enim motus sistant, simul tamen materiam mucosam incrassant & ad tussim habitualement disponunt: adeoque non nisi evacuata materia usurpentur.
- 14 Sulphur non in quavis Tussi humidæ specie, sed in catarrhali & ea quæ a scabie retropulsa originem trahit, convenit, quando scil. cum aliis in forma pulveris miscetur, fumus tamen sulphuris non semper tutus est. Majorem efficaciam fumo ꝑ in crucibulo fusi & halitu attracto adscribit D. Stahlus.
- 15 Semen anisi in decoctis magis prodest in Tussi humida, si scil. aliis speciebus pectoralibus admiscetur, quam ejus oleum, quod nimis calidum & acre est, ac propterea facilem calorem febrilem excitat.
- 16 Omnia acria, salsa, acida, frigida &c. tussim partim augent, partim materiam incrassant, quare summo studio vitentur.
- 17 Unguenta pectoralia in subjectis porosiss & junioribus disponunt quidem materiam ad exitum, sive expectorationem promovent: quoniam vero pulmones simul relaxant, majori affluxui humorum ad pectus viam sternunt & pulmonum infarctum augent: ut taceam, quod, si febrile quid complicatum fuerit, materie repercussionem & non raro inflammationes faucium & pulmonum producant: imo interdum Lipothymia tale inunctiones statim sequuntur, quod plus simplici vice observavimus.

#### CAPUT QUINTUM.

##### D E

##### Asthmate Humido.

- I. *Definitio.* **A**sthma humidum est species respirationis difficilis, a nimia humorum viscidorum in pulmonibus & imprimis bronchiis hærentium copia originem habens, cum sibilo aut sonitu conjunctum.
- II. *Differentia.*
  - 1 Respectu *durationis*.
    - a Aliud est *recens*, quod vel a causis externis, vel a causis internis, humorum scil. mucosorum congestionem natum est, & nondum adeo graviter affligit.
    - b Aliud est *chronicum* aut *habitualement*, quod per plures sæpius menses durat & gravius ægotantes affligit.
  - 2 Respectu *gradus*.
    - a Aliud est *mitius*, quod *Dyspnoeam* vocant.
    - b Aliud est *gravius* uti *Asthma* stricte sic dictum, cum sibilo & sonitu se manifestat.
    - c Aliud est *gravissimum*, quando ægoti non nisi erecto collo respirare possunt, quod *Orthopnoea* audit.
  - 3 Respectu *motuum*.
    - a Aliud ab actualibus humorum congestionibus ad pectus originem trahit, quale interdum etiam in junioribus observatur.
    - b Aliud ab actualibus humorum congestionibus ad pectus originem trahit, quale interdum etiam in junioribus observatur.
    - c Aliud vero a pulmonum & pectoris debilitate dependet, unde humores mucosi eo facilius in pulmones deponuntur, uti in *Asthmate senum humido*.



- 4 Respectu *partis affectæ*.  
 a Aliud est *pectorale*, quando causa morbifica hæret in pulmonibus.  
 b Aliud est *stomachale*, aliud *hypochondriacum*, quando causa latet in ventriculo aut hypochondriis.  
 c aliud est *compositum* sive *stomachico-pectorale*.  
 5 Respectu *periodi*.  
 a Aliud est *periodicum*, quod certa tempora anni, v.g. æquinoctia observat.  
 b Aliud vero est *vagum*, quod incertis temporibus homines affligit.  
 c Aliud est *diurnum*, aliud *nocturnum*, aliud *continuum*.  
 6 Differt porro a  
 a *Tussi humida*, quod hæc ordinarie sit absque sonitu & sibilo, ac respirandi difficultas tanta non sit ac in Asthmate: adde quod plusetiam materiæ ejiciatur in tussi, quam hoc affectu.  
 b Ab *Asthmate sicco* respectu muci, qui in hac ordinarie deficit, in humido vero abundat.

## III. Signa Asthmatis

- 1 *Pectoralis*.  
 a Respiratio frequens & difficilis.  
 b Sonitus sive sibilus perpetuus tam in inspiratione, quam expiratione se manifestans.  
 c Anxietas præcordiorum, ita ut, quo se vertant, sæpius nesciant.  
 d Conjungitur ordinarie tussis, a qua tamen, licet aliquid muci excutiat, plane non sublevantur, nisi forsan Asthma magis ad tussim humidam tendat, aut ab hac originem traxerit.  
 e Raucedo insignis, aut saltem notabilis vocis asperitas fere perpetuus ejus est comes.  
 f Præterea symptomata hæc continuo sine notabili remissione perennant.  
 g Tempore pluvioso & frigido omnia symptomata, inpr. respirandi difficultas, sunt graviora.  
 h Tandem in malo graviore erecto collo respirare coguntur ægrotantes.  
 2 *Stomachalis*.  
 a Signa antea recensita pleraque.  
 b Major anxietas circa præcordia, quam in Asthmate pectorali.  
 c Respiratio difficilis, quæ, uti in præcedente, tempore nocturno magis augetur.  
 d Exacerbatio symptomatum post motum corporis fere semper observatur.  
 e Eadem quoque accidentia molesta post pastum magis augentur.

## V. Subjectum.

- 1 Phlegmatici vitam sedentariam agentes & obesi facile hocce malum incurrunt.  
 2 Senes, alias catarrhalibus & mucosis affectibus obnoxii, facilius quoque hoc affectu corripuntur.  
 3 Juniores quoque succulenti, quibus scabies aut capitis exanthemata, per externa inpr. unguinea retropulsa fuerunt.  
 4 Juvenes, ob causas externas, vapores, pulveres corrosivos, aerem frigidum, humidum &c. interdum hoc malo corripuntur.  
 5 Idem & viri quibus Hæmorrhoides suppressæ fuerunt, aut qui consuetas sanguinis ventilationes neglexerunt.  
 6 Nonnunquam etiam ob hereditariam labem Asthma juniores corripit.  
 7 Venerei male curati, frequenter quoque non solum dolore pectoris fixo, sed etiam Asthmate cum multæ materiæ ejectione corripuntur: ita vir quidam ante viginti & quod excurrit annos in Lue venerea male tractatus, singulis annis eo circa æquinoctium autumnale corripiebatur, donec tandem hoc ipso anno ope Tincturæ resolventis & Tincturæ pectoralis ab eo liberaretur.  
 8 Hypochondriaci & Hysterice, aut alii humidioris constitutionis, qui frequentes ad pectus & hypochondria humorum congestiones passi sunt.

## VI. Prognosis.

- 1 Asthma humidum tam pectorale, quam stomachale

est malum admodum pertinax ac diuturnum, ita ut non raro ad plures annos se extendat.

- 2 Si materia in bronchiis hærens acrimoniam concipit, pulmonum exulcerationem sive Phthisin post se trahit.  
 3 Asthma interdum in Peripnevmoniam, sive pulmonum inflammationem transit.  
 4 In subjectis humidioribus, quorum corpora copioso repleta sunt muco, facile in Cachexiam aut Hydropem degenerat.  
 5 Asthmata juniorum, a scabie retropulsa originem nacta, suffocationem minantur & actu etiam eandem producant, quod aliquoties observavimus.  
 6 Quo magis tenax & viscida est materia morbifica, eo facilius graviora metuenda sunt mala, & eo difficilius etiam curatur affectus.  
 7 Quo magis inveteratum est Asthma, eo minus speranda est curatio.  
 8 Asthma mitigatum vel etiam curatum facile ob Diætæ errores recrudescit.  
 9 Quo major Asthmati jungitur tussis cum excretionem materiæ mucosæ, eo citior speranda est curatio, & contra.  
 10 Asthma stomachale, cum vitio Hypochondriorum junctum sæpius difficilioris est curationis, quam pectorale.  
 11 Hæmorrhoides Asthmati supervenientes malum sæpius maxime mitigant: id quod eo certius contingit, si affectus ab earum suppressione ortum traxit.  
 12 Orthopnoea Asthma excipiens ut plurimum brevi tempore funesta fit.  
 13 Asthnia hæreditarium nunquam curatur.  
 14 Asthma Venereum nonnisi sublato morbo primario curationem admittit.  
 15 Asthma quodcumque in febribus acutis periculosum est.  
 16 Qui gibbi ex Asthmate aut Tussi fiunt tante pubertatem, pereunt.  
 17 Quo magis debiles sunt Asthmatici, eo certius metuendum est periculum.  
 18 Quo magis attollitur pectus cum scapulis in Asthmate, eo periculosior est status.

## VI. Remedia.

- 1 Materiam tenacem resolventia: Rad. Angelic. Ari. Apii, Aristol. Pimpinell. Helen. Imperat. Vincetox. Zedoar. Bardan. Petasit. &c. Herb. Marrub. Capill. Ven. Hyssop. Chærefol. Fumar. Nasturt. Trifol. Fibr. Erysim. Sem. Anis. Fœnic. Dauci. Lign. Sassafr. Guajac. Junip. G. Ammon. Galb. Elem. Carann. Tinct. Jii acris, Ess. Alexiph. Succin. Conf. Tab. præcedens.  
 2 Materiam resolutam evacuantia: qualia sunt laxantia & purgantia præcedente Tabula præscripta: quorum etiam pertinent pulveres nitrosi tempore vespertino exhibiti.  
 3 Tonica discutientibus mixta, vid. caput. antecedens.

## Formula Remediorum.

## 1. Pilulæ incidentes &amp; laxantes.

Rx. M.P. de Ammon. gr. xv. Tinct. Tart. q. s.  
 Aq. dulc. ℥ss. M. F. Pil. ad pond. gr. j.  
 Extr. coloc. gr. ij. D. pro 1. dosi.

## 2. Infusum laxans, &amp; incidens.

Rx. Rad. Angelic. Fibr. bell. nigr.  
 Bardan. Rhab. elect. a ℥ij.  
 Pimp. alb. a ℥iij. Cort. Ont.  
 Ari. Sem. anis.  
 Zedoar. a ℥j. fœnic. a ℥iss.  
 Herb. Hyssop. Inc. infund. in Vin. alb. M.  
 Capill. q. j. sive ℔. iv. D. ℥iv. vel vj.  
 Marrub. a mls. pro dosi tempore matutino.  
 Fol. senn. s. s. ℥j.

## 3. Infusum incidens.

Rx. Rad. Aristol. O. Hebd. Scord.  
 Imperat. Veron.  
 Irid. Flor. Rosmar. a mj.  
 Vincetox. a. ℥ss. Flor. Lavend.  
 Ani. ℥ij. Scabios. a. p. ij.  
 Sem



Sem. Fœnic.

Dauci.

Cinnam. ac. a. ʒiſs.

4 Potiuncula incidens Brunneri.

R. G. Ammon. ʒj. ad ʒij. solv.

in Vin. Rhenan. ʒij. adde

5 Alia.

R. G. Ammon. ʒiſs. solv. in

Acet. Squillit. ʒvj. adde

Aq. Hyſſop.

6 Alia.

R. Aqu. flor. rapar. ʒij.

Aſthmat. ʒj.

Spir. Zedoar. ʒiſs.

7 Alia.

R. Aq. Hyſſop.

Veron.

Aſthmat. a. ʒiſs.

G. Ammon. in Aq. sol. ʒj.

8 Extractum incidens

R. G. Ammon. ʒj.

Galban.

Sagapen. a. ʒij.

Myrrh.

Elemi.

Carann. a. ʒiſs.

Rad. Helen.

Pimp. alb.

Angel. a. ʒj.

## VII. Methodus medendi.

## Aſthmatis

## 1 Pectoralis.

a Cum materia Aſthmatis morbifica fit admodum tenax viſcida hinc ſtatim probe incidenda & reſolvenda eſt per remedia ante præſcripta, e quorum numero poſſimum commendari meretur Radix Ari in majori etiam doſi & repetitis vicibus exhibita. Singularem quoque habent efficaciam Gummata & inprimis Ammoniacum, quippe quod non ſolum potenter reſolvit, ſed etiam alvum liberam ſervat. Nec etiam ſine fructu uſurpari poteſt *Extractum liquidum Stablii* antea ex *Blazero* p. 285. allegatum, quod ex meris fere Gummatibus conſtat. Eandem ſi non majorem habet vim Tinctura Pectoralis nobis familiaris, cujus continuato uſu aliquot curavimus aſthmaticos; eo facilius autem ſperatum edit effectum, ſi Tinctura reſolvens ipſi jungitur aut ejusdem uſui interponitur.

b Si malum a ſuppreſſione ſanguinis fluxuum originem traxit; ceteris remediis mature interponatur Venæſectio in pede, aut etiam reliquis præmittatur, ac poſtmodum cura ad revocationem Hæmorrhoidum dirigatur, quem in finem hiru-dines venis anicum fructu applicari poſſunt. Hoc in caſu optimum edunt effectum Pilulæ veræ Becherianæ ut & Baſſamicæ viſcerales nobis familiares, inpr. vero Pilulæ antirheymaticæ, quarum ope ſæpius Menſes & Hæmorrhoides ſubſiſtentes revocavimus.

c Si materia ſufficienter incifa atque præparata fuerit, ſubjungantur evacuantia, ut hoc modo materia mucoſa, quæ per malam conſuetudinem ad pectus continuo fertur per inferiora evacuetur & uberior fluxus verſus ſuperiora intercipiatur: addantur autem ſemper incidentia & reſolventia, quo materia evacuanda ad excretionem faciliorem eo magis diſponatur. Huic fini inſerviunt partim Infuſa, partim Pilulæ antea laudatæ, quæ reſolvunt, diſcutiunt & evacuant.

d In Aſthmate ſtomachali præmiſſis prius incidentibus & reſolventibus vomitoria interdum inſignem habent uſum, imo teſte experientia, talia Aſthmata irritis omnibus alijs per ſola vomitoria curata fuere. vid. Ettmull. Tom. II. p. m. 235.

e In Aſthmate humido a nimia pulmonum debilitate & flacciditate reliquis remedijs incidentibus & diſcutientibus confortantia vel jungenda vel inter-

ponenda ſunt: in tali caſu inſigni cum fructu dedimus Mixturam ex Tinct. Reſolv. ʒiſs. & Eſſ. dulc. ʒij. cui interpoſuimus Pulveres ſolares D. Richteri aut etiam Pulveres vitales. Egregium quoque uſum in tali caſu habet Aqua veronicæ vinoſa D. *Stablii*, Eſſentia Helenii, aut ejus Infuſum cum vino generoſo paratum.

f In Aſthmate a ſcabie retropulſa orto, Mercurius dulcis cum aliquo ſtimulo exhibitus optimum edit effectum, quatenus humores viſcidos diſſolvit, atque pel alvum evacuat. Huic ſubjungantur incidentia & diſcutientia, Decocta ſcil. Lignorum & Radicum alexipharm. aut Tincturæ & Eſſentia ex his paratæ & cum Tincturis alcalinis Diaphoretico-Diureticis maritatæ.

g Si vero Aſthma a male curata Lue venerea dependet, modo allegata remedia uſurpentur, iſſique Mercurius dulcis in bolo aut Pilulis frequenter interponatur. ut hoc modo latens virus, reſoluta materia viſcida, ſenſim ſenſimque e corpore expellatur.

h Si materia reſoluta in pulmonibus hæret, a Natura vero per tuſſim, obvirium ſufficientium deſectum expelli nequit, circa veſperam detur pulvis Nitroſus, qui tuſſim validam excitat & materiæ excretionem promovet.

i Reſoluta tandem & evacuata materia tonica & roborantia in uſum trahantur, ut hoc modo, conſtrictis partibus & coarctatis poris, novus materiæ illapſus novum Aſthma præcaveantur: commode hoc præſtant Volatilia. Mixtura Tonico nervina *Stablii* jam ſæpius laudata, Aqua Veronicæ Vinoſa, diu uſurpata &c.

k Diæta aromatica & vinum generoſum in Aſthmate humido inſignem habent utilitatem.

## VIII. Cautela Præctica.

1 In omni Aſthmate humido remedia incidentia & evacuantia diu uſurpentur, cum enim malum ſit chronicum, continuatus etiam remediorum requiritur uſus, quo neglecto, fruſtra laborat Medicus in hoc morbo.

2 In Aſthmate humido uſurpentur ab initio lenia reſolventia, poſtmodum vero potentiora: cum enim hæc ultima ut plurimum ſimul ſint vel Diuretica vel Diaphoretica, metuendum eſt, ne ſublata portione ſeri ſubtiliori, reliquæ craſſiores & mucidæ curationem difficiliorem reddant, *Conſ. Septalii Animadv. de Difficili reſpiratione*.

3 Vomitoria Aſthmaticis interdum quidem proſunt, ubi tamen reſpiratio nimis eſt difficilis & materia copioſa & adhuc viſcida in pulmonibus hæret, ob metuendam ſuffocationem ab eorum uſu abſtinendum eſt: multo autem minus in ipſo conveniunt paroxyſmo, in quo ægroſos ſæpius in præſens vitæ periculum conſiciunt.

4 Mercurialium quoque remediorum abuſus vitetur, quoniam humores nimium colliquando & ad ſuperiora commovendo, majorem affluxum ad pectus producere ſolent, quare ſemper ſufficiens ipſis ſtimulus addatur, & eorum uſui diſcutientia interponantur.

5 Remedia nimis calida fugiantur, ne Aſthma humidum in ſiccum mutetur, (quod poſtea gravius affligit, & longe etiam difficilius curatur) aut prorſus in inflammationem degeneret.

6 Remedia expectorantia diu continuata pulmones nimium emolliunt, & majorem decubitus ad pectus faciunt cum metu ſuffocationis aut exulcerationis pulmonum.

7 Eadem mala producant unguenta emollientia exterius pectori nimium applicata.

8 Expectorantia tamen reſolventibus mixta excretionem materiæ promovent, & hinc etiam in uſum abſque metu trahi poſſunt.

9 In Paroxyſmo cavendum eſt a Diaphoreticis inprimis aliquando fortioribus, quoniam humores nimium commovendo reſpirandi difficultatem augent & ſuffocationem facile provocant.

10 In Paroxyſmo ſatius eſt interdum abſtinere a remedijs



mediis quam iisdem morbum graviores reddere : optima medicatio est, quæ extra Paroxysmos instituitur : si autem suffocationis periculum urget, blanda incidentia & expectorantia inpr. vero sperma ceti in iusculo calido ægrotis exhiberi possunt.

- 11 Sirupus & Extractum Tabaci optima quidem sunt remedia resolventia tam in Tussi quam in Asthmate humido, semper tamen ipsis jungantur discutientia, ut major ad pectus affluxus præcaveatur : caute etiam danda sunt remedia ex Nicotiana, ubi nimius pulmonum a copiosis humoribus est infarctus, quoniam enim materiam illam nimis cito resolvunt & aliqualem hoc modo ipsi conciliant turgescientiam, facile, nisi matura sequatur excretio, in suffocationis periculum ægrotantes conjiciunt, præsertim cum minus bene præparata vomitum ordinarie excitent.
- 12 Cum motus corporis fortior respirationem difficilem in asthmaticis semper augeat, vitetur : moderatus tamen & continuatus, quatenus resolutionem humorum promovet, maxime iis convenit : & hinc etiam sublevationem & mitigationem symptomatum in Asthmate, quam *Baghivus Prax. Med. p. m. 107.* sperare jubet, magis motui corporis continuo & aeri liberiori, quam effluviis terræ nitrosis adscribendam esse, probabile videtur.
- 13 Aer frigidus & humidus, uti Tussim & Asthma producere solet, ita etiam actu asthmaticis, quatenus materiam spissiore reddat, dissuaderi debet.
- 14 In quocumque Asthmate cibi glutinosi, frigidi, malæ digestionis &c. noxii sunt.
- 15 Omnia falsa tum medicinalia, quam culinaria, asthmaticis parum conveniunt.
- 16 An Fonticuli & Vescicatoria suris applicata aliquod solamen in asthmaticis afferat, ulteriori experientia relinquimus.

## CAPUT SEXTUM.

## DE

## Vomitu.

- Definitio.* **V**omitum est rerum heterogenearum in Ventriculo contentarum & Naturæ insensarum, per motum Ventriculi & vicinorum intestinorum inversum, ejectio.
- I. Differentia.* Vomitum variæ dantur differentiæ.
- 1 Respectu materię alius est *biliosus*, alius *pituitosus*, alius *cruentus* (de quo supra) alius *stercoreus* &c.
  - 2 Respectu temporis alius est *periodicus*, statim & inpr. æquinotialia observans tempora, alius *vagus*.
  - 3 Respectu loci affecti, sive sedis causæ morbificæ, alius est *idiopathicus*, de quo potissimum hic est sermo, quando scil. materia hæret in Ventriculo : alius est *Sympathicus*, uti vomitus *Nephriticorum*, *Hypochondriacorum*, *Hystericarum*, *Vulneratorum* & *Gravidarum*.
  - 4 Respectu causæ vomitum excitantis alius est *spontaneus*, quam Natura sine externarum causarum concursu instituit, v. g. vomitus in tertiana, criticus in acutis aut etiam alii vomitus spontanei in subjectis facile vomentibus : alius est *coactus*, per assumptam scil. emetica aut faucium irritationem.
- II. Signa.*
- 1 *Imminentis.*
    - a Nausea insignis cum cardialgia & anxietate præcordiorum.
    - b Salivæ in oressusio cum frequentibus horroribus.
    - c Tremor labii inferioris & vertigo cum tinnitu aurium.
    - d Lassitudo & in quibusdam tremor corporis.
  - 2 *Præsentis.*
    - a Ejectio variarum rerum heterogenearum, sanguinis, bilis, pituitæ &c.
    - b Repetitio interdum eorundem motuum spasticorum admodum sensibilem cum nova materię ejectione.

3 *Idiopathici.*

- a Actualis excretio alimentorum, aut aliarum rerum Ventriculum onerantium.
  - b Cessatio vomitus remota materia gravante.
- 4 *Sympathici.*
- a Excretio nulla vel pauca materię contentæ, Ventriculo inpr. a cibis vacuo.
  - b Aut si hic cibus repletus est, ejectio primo eorum, postmodum vero continuatio motuum excussoriorum.
  - c Signa alium morbum præsentem & vomitum foventem manifestantia, Calculum scil. Malum hystericum, Passionem Iliacam, Læsiones capitis &c. aut etiam Graviditatem, de quibus suo loco.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines sensibilibus Naturæ, ad iram & nauseam alias proni : quorsum pertinent potissimum Cholericus, qui tamen ad vomitum biliosum magis inclinant.
- 2 Personæ temperamenti Sanguineo-Phlegmatici, quorum corpus multis humoribus mucidis repletum est.
- 3 Infantes præ adultis ob muci copiam & nimiam sensibilitatem.
- 4 Femine ob eandem causam, scil. sensibilitatem, magis quam viri, præcipue tempore graviditatis.
- 5 Hypochondriaci, Hystericus, Nephritici, ad Colicam proni, Tertianarii &c.
- 6 Qui multis alimentis Ventriculum oneraverunt.
- 7 Qui cibos cum nausea assumerunt.
- 8 Qui multas in Ventriculo cruditates, tam biliosas, quam mucosas habent.
- 9 Qui nec navi, nec curru vehi consueverunt.
- 10 Hernia incarcerata & volvulus sive ileo laborantes.
- 11 Capite læsi.

V. *Prognosis.*

- 1 Vomitus spontaneus post assumptam nauseosam, aut nimiam quantitatem ciborum, Ventriculum onerantium, salutaris est.
- 2 Pariter salutaris est Vomitus spontaneus, per quem cruditates biliosæ & mucosæ a Ventriculo remonentur.
- 3 Quo maturius & facilius Vomitus in Tertianariis succedit, eo facilius quoque universa Febris vel imminuitur, vel cessat.
- 4 Idem quoque de Vomitu critico, in acutis legitimo tempore contingente & non excedente, censendum est.
- 5 E contra vomitus talis in acutis continuans cum ejectione materię variegatæ & graveolentis mali semper est ominis.
- 6 Vomitus matutinus materię viscidæ pituitosæ facile in consuetudinem abit, cujus rei memorabile exemplum habet *Hildanus Cent. IV. Ob. 32.* de quadam Religiosa, quæ per 31. annos singulis diebus pituitam viscidam bile intermixtam, evomit.
- 7 Ex Volvulo Vomitus, aut singultus, aut convulsio, malum. 7 Aphor. 10.
- 8 Ex Vomitu Singultus & oculi rubicundi, malum. 5. Aphor. 3.
- 9 Vomitus & Surditas volvulosis, malum, *Coac. Prænot. II. 303.*
- 10 Vomitus stercureus in volvulosis pessimus est.
- 11 Vomitus paucus & laboriosus in acuta Febre, malus. *Riverius.*

VI. *Remedia.*

- 1 Materiam viscidam & tenacem incidentia & resolventia, uti sunt Salia digestiva neutra vel sola, vel cum fixis remixta : Arcan. duplic. Tart. Vitriolat. Sal polychrest. Digestiv. Absinth Cent. min. &c.
- 2 Lenia Vomitoria, inpr. Rad. Ipecac. minoridosi cum salibus exhibita.
- 3 Materiam biliosam corrigentia, sive nimirum ejus impetum infringentia, Cryst. mont. Nitrosa, Salia neutra Absorbentia &c.
- 4 Lenia Adstringentia & Acida : Corallia rubra, Cort. Chacarill. C. C. ust. Succ. Cydon. Citr. &c.
- 5 Anodyna & Alexipharmaca : Theriac. Androm. Cælest.



- left. cum Adstringentibus lenibus exhibita: Essent. Alexipharm. Helen. Pimpin. alb. Tinct. Bezoard. Mixt. simpl. Essent. Cinnam. &c.
- 6 Amara aliaque Stomachia, earumque tam Essentia quam Extracta: Herb. Absinth. Cent. min. Rad. Gentian. Galang. Zedoar. Cort. Ont. &c. & inpr. Pil. Stahlianæ, aut Balsam. v. ceral. nobis familiaris &c.
- 7 Topica, Discutientia, Roborantia: Spir. Vin. Camph. aliaque ex aromaticis radicibus & herbis parati; Balsama ex Oleo Nucistæ expresso cum oleis destill. aromaticis parata: Empl. Stomach. Crat. de CruSta panis: Theriaca externe applicata, CruSta panis vino & aromatibus imprægnata & calide Ventriculo imposita: Sacculi &c.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis abstergens.

Rx. Sal cathart. amar. ℥j. D. singulis duabus horis  
div. in 3. p. æq. dosi.

## 2 Alius.

Rx. Tart. Vitriolat. ℥j. Div. & D. ut antea.

## 3 Alius.

Rx. Arcan. dupl. div. & D. ut antea.  
Sal absinth. a. ℥ss. M.

## 4 Pulvis temperans.

Rx. Lap. ☉. Tart. Vitriolat. a. ℥j. M.  
Cryst. mont. div. in 4. p. æq.  
Nitr. depur. D. ut antea.

## 5 Alius.

Rx. Conch. citrat. Tart. Vitriol. a. ℥j. M.  
Nitr. depur. div. in 3. p. æq.

## 6 Pulvis emeticus.

Rx. Rad. ipecac. gr. xv. ℥j. D. pro una vice.  
Sal absinth. ℥ss. M.

## 7 Pulvis adstringens.

Rx. Cerall. r. ppt. div. in 3. p. æq.  
Pulv. chacarill. D. singulis 3. vel 4. horis.  
C. Co ust. a. ℥j. M.

## 8 Pulvis adstringens &amp; anodynus.

Rx. Corall. r. ppt. M. Pil. de Cynogl. gr. iij. M.  
Pulv. Chacarill. a. ℥ss. div. & D. ut antea.  
Spec. de Hyac. gr. xxv.

## 9 Potiuncula adstringens.

Rx. Aq. Menth. ℥iv. Sir. Corall. ℥ss. M.  
Corall. rubr. ppt. D. singulis duabus horis  
Pulv. chacarill. a. ℥ss. cochlearia aliquot.  
Terr. Sigill. ℥j.

## 10 Alia.

Rx. Aq. Meliss. Spir. Nitr. dulc. ℥j.  
Rub. id. a. ℥ss. Sir. Corall. ℥ss. M.  
Cinnam. D. ut antea.  
Succ. Cydon. a. ℥vi.

## 11 Alia anodyna.

Rx. Aq. Menth. Ther. Androm. ℥ij.  
Meliss. Sir. Papav. rh. ℥iij. M.  
Mastich. a. ℥j.

## 12 Mixtura roborans &amp; discutiens.

Rx. Ess. Alexiph. ℥ij. D. 30. gutt.  
Cinnam. ℥j. M.

## 13 Alia.

Rx. Ess. Myrrh. ℥j. M. D. ut antea.

## 14 Alia.

Rx. Ess. Absinth. ℥ss. Cinnam. ℥ss. M.  
Cent. min. ℥j. D. ut antea.

## 15 Alia.

Rx. Ess. amar. Hall. ℥ss. D. ut antea.

## 16 Alia.

Rx. Ess. Pimp. alb. ℥ij. D. ut antea.  
Myrrh. ℥ij.

## 17 Alia.

Rx. Mixt. simpl. ℥ij. D. ut antea.

## 18 Alia.

Rx. Ess. Absinth. comp. Succin. ℥ss. M.  
Gentian. a. ℥ij. D. ut antea.

## 19 Pilulæ anodynæ.

Rx. Ther. cæl. gr. xv. D. pro una dosi.  
F. Pil. n. xv. deaur.

## 20 Pilulæ adstringentes &amp; anodynæ.

Rx. Extr. Torment. gr. xii. F. Pil. n. xv.  
Ther. cæl. gr. iij. M. D. ut antea.

## 21 Balsamum roborans.

Rx. Ol. N. M. express. ℥ss. Caryoph. a. gt. iv. M.  
dest. Menth. F. Balsam.  
Fœnic. a. gt. xv. applicetur scrobiculo cor-  
Cinnam. dis.

## 12 Aliud.

Rx. Ol. N. M. express. ℥ij. Succin. a. gt. viij.  
dest. Menth. Cinnam.  
Macis. Caryop. a. gt. iv. M.  
Major. a. ℥ss. F. Balsam.  
Ruta. Applicetur ut antea.

## 23 Emplastrum roborans.

Rx. Empl. de Crust. pan. ℥j. Ol. Cinnam.  
Tacamah. ℥ss. Caryoph. an. gt. v.  
Bals. Peruv. q. s. M. Applicetur aluta inductum  
F. Emplastr. irroretur. regioni stomachali.

## 24 Aliud.

Rx. Empl. stomac. Crat. ℥vj. Ol. An-th. q. s. adde.  
Tacamah. Camph. ℥ss. M.  
Carann. F. Scutum stomachale.

## VII. Methodus medendi.

- Si materia in vomitu est admodum tenax & viscida ita ut vix ac ne vix quidem ejici queat, uti id sæpius contingit, exhibeantur ad hanc materiam incidendam & excretionem ejusdem promovendam Pulveres Salini abstergentes & incidentes, quibus etiam Radix Ari addi potest, utpote quæ non solum potenter incidit, sed etiam roborat. Egregium quoque tali in casu habent usum Gummata eorumque præparata incidendo & abstergendo materiam tenacem.
- Nonnunquam etiam lene vomitorium exhibeatur, quando materia mobili motus & conatus vomendi ad excussionem sive expulsionem materiæ non sunt sufficientes, aut quando etiam cruditates copiosæ, aut cibi malæ digestionis in ventriculo hærent. Tali in casu Radicem Ipecacuanhæ minori dosi cum Sale Absinthii sæpius cum fructu dedimus, Salenim modo dictum optime incidit & excretionem materiæ, virtutem radice exaltando, promovet: ipsa autem Ipecacuanha propter lenem vim adstrictioriam Ventriculum simul roborat.
- In Vomitu bilioso, ubi non raro bilis admodum acris nimiam irritationem nimiumque vomitum producere solet, pulveribus illis Salinis addi possunt Absorbentia, Nitrosa, & inprimis Crystall. mont. quæ nimiam acrimoniam bilis ejusque motum compescunt.
- Si materia excernenda acida est aut nidorosa, eadem Absorbentia, aciditatem tollentia, profunt pariter ac Martialia dictis remediis admixta: nec etiam sine fructu exhibentur Gummata inprimis Arabicum & Tragacantha.
- Continua te vomitu Adstringentia cum Theriacalibus aliisque Anodynis mixta, ut & acida, aut præ ceteris Pilulæ Stahlianæ vel Becherianæ, in Aqua Melissæ & Cinnamomi solutæ in usum trahantur, quæ etiam insignem habent usum, quando materia copiosa & viscida in Ventriculo hæret optime enim abstergunt, incidunt & excretionem materiæ promovent.
- Hiscæ subjungantur ad roborandum Ventriculum Stomachica varia, amara, aromatica & Martialia rite parata, Essent. amara Hall. cum vel sine additione Essentiæ dulcis, Mixtura Tonica Stahlî, Essent. Cort. Citr. Aurant. Aqua Cinnamomi aut hujus Essentia: Essent. Absinth. simpl. & compos. Tinct. ♂. Lud. quæ legitime præparata, si aliquid remansit, abstergit, & Ventriculi flacciditatem tollit.
- Hiscæ jungi possunt externa superius laudata, quæ etiam pro vomitus conditione, statim ab initio applicari possunt, quoniam Ventriculum roborando cruditatum expulsionem adjuvant.
- In Vomitu Sympathico (1) Nephriticorum respiciendum est ad alvi libertatem, quam præter lubricantia assumpta temperant clysteres emollientes & oleosi, aut etiam mucilaginosi: quibus jungantur Salia neutra, Nitrosa aliaque lenia diuretica pro usu interno.



(2) In Hypochondriaco præservationis gratia Venæ-  
sectio mature instituta convenit: curative vero pro-  
sunt modo dicta Salia & tot in locis a D. Stahlio lauda-  
ta Eff. Millefolii, aut ejusdem infusum ad sedandos  
motus in venâ portæ & circa eandem ortos. (3) De  
Vomitu Gravidarum vid. de *Morbis Gravidarum*.

### III. Cautela Practica.

- 1 Adstringentia fortiora in principio vomitus cujus-  
cunque fugiantur, quatenus materiam incrassando  
ejusque excretionem impediendo graves anxietates &  
cardialgias producant.
- 2 Si subjecta ad vomitum cruentum aut ad congestio-  
nes sanguinis in Hypochondriis prona sunt, Vomito-  
ria nullo modo præscribenda sunt, quoniam Vomi-  
tum cruentum facile provocant.
- 3 Nec etiam tuta sunt Vomitoria in Vomitu Hypo-  
chondriacorum & Hystericorum, quatenus non so-  
lum Vomitum augent, ejusque citiorem recursum  
producant, sed etiam majores circa Venam-portæ  
edunt turbas.
- 4 Ubi Ventriculus jam satis est debilis, Vomitoria  
ejus debilitatem magis augent.
- 5 Vitetur quoque Vomitorium usus, si subjecta ad  
Hæmoptysin prona sunt, aut aliis affectibus pectoris  
laborant.
- 6 Volatilia & Carminativa in Vomitu pituitoso inter-  
dum, si legitimo tempore exhibentur, suo quidem  
non carent usu, in Vomitu vero bilioso, quatenus  
materiam acriorem reddunt ac motus augent, noxia  
sunt & malum gravius reddunt: post vomitum autem  
ad roborandum Ventriculum conveniunt.
- 7 In eodem vomitu bilioso Topica, Balsamica, acria  
& spirituosâ scrobiculo cordis applicata vomitum &  
anxietates cardialgicas augent, quare non, nisi feda-  
to aliquo modo Vomitus impetu, applicentur.
- 8 Opiatorum usus in Vomitu cautus esse debet, ne re-  
laxato Ventriculi tono motus nimis subito sopiantur  
& materia noxia excernenda cum corporis damno in  
Ventriculo remaneat.
- 9 Nisi quieta continentia corporis atque aer tempe-  
ratus jungantur remediis, sæpius omnia quamvis opti-  
ma remedia, irrita sunt: nihil enim vomitum magis  
quam jectigatio corporis promovet.

## CAPUT SEPTIMUM.

### D E

#### Diarrhæa.

I. *Definitio.* **D**iarrhæa est frequens alvi depositio a  
motu peristaltico auctiori originem  
trahens, eum in finem a Natura instituta, ut beneficio  
hujus motus materiæ crudæ mucosæ & biliosæ chylifi-  
cationem turbantes e Ventriculo removeantur.

### II. Differentia.

- 1 Respectu materiæ, quæ repetitis vicibus excernitur.
  - a Alia est *mucosa*, quando partes mucosæ, tam in in-  
testinis, quam in humoribus hærentes per alvum  
evacuuntur.
  - b Alia est *biliosa*, in qua partes acres biliosæ in inte-  
stinis habitantes frequentiore motu peristaltico ex-  
pelluntur.
  - c Alia est *cruenta*, uti in *Dysenteria* & *Fluxu Hepa-  
tico*, de quibus postea.
  - d Alia est *alimentosa* & *chylosa*, quando assumpta  
vel prorsus non, vel parum tantum alterata &  
digesta excernuntur, uti id contingit in *Lienteria*  
& *Fluxu Cæliaco* de quibus pariter paulo infra  
agemus.
  - e Alia est *alba*, quam etiam *Jeticam* vocant, quan-  
do excrementa fluida, propter hepatis obstructio-  
nem & denegatum bilis ad intestina fluxum, nullo  
colore tincta sunt flavo.
- 2 Respectu status hominis.
  - a Alia contingit in *statu sano*, scil. spontanea, qua  
interdum homines quoad cetera sani circa æquino-

dia corripuntur, & quæ utpl. euphoriam post se  
relinquit: hæc si stata æquinoctiorum observat  
tempora, vocatur etiam periodica.

b Alia observatur in *statu morbo* & hæc est

a Vel *Critica*, quando Natura materiam præpara-  
tam & digestam die critico per alvum cum mor-  
bi vel imminutione, vel plenaria sublatione eva-  
cuat.

β Vel *Symptomatica*, quæ vel in morbis exanthema-  
ticis, vel diebus non criticis contingit, ita ut  
morbus in pejus ruat. Huc etiam *Diarrhæa Phthi-  
ficorum* & *Hæcticorum colliquativa* pertinet.

### 3 Respectu causarum

a Alia dependet a *causis externis*, assumptis scil. fru-  
ctibus horræis aliisque fermentescentibus, refrigē-  
ratione pedum, suppressione sudoris, scabiei, con-  
solidatione ulcerum antiquorum &c.

b Alia originem trahit a *causis externis*: uti sunt  
variæ antea recensitæ species *Diarrhæarum* spon-  
tanearum, criticarum, symptomaticarum &c.  
quorum etiam spectat *Diarrhæa* infantum ver-  
minosa.

### III. Signa.

- 1 Murmura abdominis, vel borborygmi excretionem  
sæpius antecedunt.
- 2 Quibus non raro junguntur tormina potissimum  
circa umbilicum.
- 3 Quæ postea sequuntur excretionem liquidæ diversa-  
rum materialium.
- 4 Appetitus sub hac ipsa frequenti dejectione proster-  
nitur, excepta *Diarrhæa*, spontanea, ubi utpl. in in-  
tegro permanet statu.
- 5 Sitis vero notabiliter augetur, quo magis scil. *Diarrhæa*  
urget.
- 6 Vires ob continuam excretionem insigniter proster-  
nuntur.
- 7 Accedit etiam ordinarie capitis gravitas & debili-  
tas.
- 8 Calor internus indies augetur cum reliquis sympto-  
matibus.
- 9 Tenesmus, inpr. ubi excretio materiæ acris diu con-  
tinuat, tandem accedit.
- 10 Majo auctiori jungitur præcordiorum anxietas insi-  
gnis.
- 11 Tandem partes extremæ frigent, calore interno in-  
terim magis aucto.
- 12 Quibus præsentibus facile superveniunt *Lipothymia*  
cum sudore frigido inpr. circa frontem.
- 13 Quæ ultimo loco mors excipit, nisi mature conve-  
nientia exhibeantur remedia.

### IV. Subj. dum.

- 1 Homines temperamenti humidi, Phlegmatici scil.  
& Sanguinei, qui præceteris ad *Diarrhæam* mucosam  
sunt proni.
- 2 Cholericis, qui biliosam frequentius experiuntur  
*Diarrhæam*.
- 3 Juniores, ob teneram constitutionem & humorum  
mucositatem.
- 4 Qui alimenta fermentescentia mustum, cerevisiam  
recentem, fructus horræos &c. Assumerunt.
- 5 Qui sudores spontaneos neglexerunt & corpus aeri  
frigido statim exposuerunt.
- 6 Quibus scabies aliæque efflorescentiæ cutis retro-  
pulsæ fuerunt.
- 7 Qui pedes nimium refrigerarunt.
- 8 Hæmorrhoidarii ob impeditiorem Hæmorrhoidum  
fluxum.
- 9 Febribus laborantes & ad alvi libertatem alias pro-  
ni, uti præceteris sunt sanguinei.

### V. Prognosis.

- 1 *Diarrhæa* periodica, circa æquinoctia inprimis affli-  
gens utpl. periculo vacat & sæpius corpus a morbis  
multis præservat.
- 2 Si tamen septimum transcendit diem, vires proster-  
nit, sitim graviorem comitem habet, noctes diesque  
affligit, ac tandem tormina cum motibus febrilibus  
accedunt, vel nimium humorum vitiosorum appa-  
ratum, vel visceris cujusdam malum statum indicat, &  
ad Febrem lentam ac Atrophiam disponit.



- 3 Si Diarrhœa ulcera antiqua consolidata aut Scabiem retropulsam sequitur, etiam si interdum ad multos dies extendatur, nihil periculi, si simul vires constant, portendit.
- 4 Diarrhœa a rebus fermentescentibus orta facile transit in Dyfenteriam.
- 5 Si in Diarrhœa bilis crocea, rubigini ferri dissoluta, aut lateris rubri non absimilis, cum virium & pulsus debilitate excernitur, sæpius indicium est Diarrhœæ malignæ. *Vid. Chesneau Observ. p. 290.*
- 6 Si materia, quæ in Diarrhœa excernitur, nimium est biliosa & acris, facile jungitur excoarctatio ani.
- 7 In Diarrhœa, si appetitus viget, bonum est: quo magis vero hic prostermitur, eo peior est status.
- 8 In Diarrhœis sudor copiosus & largum urinæ profluvium superveniens solvit morbum.
- 9 Omnes Diarrhœæ per Adstringentia & Opiata imprudenter suppressæ majoribus malis exponunt ægrotautes, quam si sibi relinquuntur: translationes enim fiunt ad alias partes internas tam vicinas, quam remotiores & exinde diversi etiam pro ratione partium oriuntur affectus.
- 10 Diarrhœas biliosas suppressas facile sequuntur Febres biliosæ cum inflammatione intestinorum.
- 11 Si Diarrhœæ criticæ in acutis per imprudentem medicationem supprimuntur, funestus utpl. sequitur eventus.
- 12 Omnis Diarrhœa in principio acutarum & exanthematicarum Februm accedens mala est, quoniam materiæ præparationem & evacuationem per Diaphoresin impedit. In Morbillis tamen ante aliquot annos grassantibus Diarrhœam & narium Hæmorrhagiam adeo salutarem observavimus, ut, qui excretionibus talibus non affligerentur, & diutius decumberent & respirandi difficultate aut scabiosis etiam affectibus diu, superatis Morbillis, laborarent.
- 13 Quamvis juxta Hippocr. 5. Aphor. 34. Mulier in utero gerenti, si alvus multum fluxerit, periculum sit, ne abo tiat: interdum tamen quædam reperiuntur, quæ eam diu sine fætus detrimento patiuntur: imo in quibusdam Diarrhœam menstruam, eo scil. tempore, quo alias mensibus laborare solebant, sine noxa contingentem observavimus.
- 14 A Pleuritide aut Peripneumonia detento alvi profluvium superveniens bonum. *Hippocr. 6. Aphor. 16.*
- 15 Ex morbo diuturno alvi defluxus malum. 8. Aphor. 5.
- 16 A diuturno alvi profluvio detento, sponte superveniens vomitus, alvi profluvium solvit. 6. Aphor. 15.
- 17 Ophthalmia laborantem ab alvi profluvio corripit, bonum. 6. Aphor. 17.
- 18 Si a Leucophlegmatia detento vehemens Diarrhœa superveniat, morbum solvit. 7. Aphor. 29.
- 19 Ab Hydrope detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio fit. 6. Aphor. 14. Si autem non juvat, pessima est: pravam enim in visceribus dispositionem ostendit. *Chesneau, Ob. c. v. p. 283.*
- 20 In diuturnis alvi profluviiis, crepitus sine materia erumpens, bonum. *Idem.*
- 21 Omnium periculosissima est Diarrhœa colliquativa, Hæcticæ confirmatæ superveniens, mortem enim instantem indicat. *Vid. Hippocr. 5. Aphor. 12. 14.*
- 22 Quo magis a naturali statu recedunt excrementa, eo periculosior est Diarrhœa. Plura *Vid. in Sæmiotica de signis ex fecibus alvinis. p. 212.*

## VI. Remedia.

- 1 Materiam mucosam ad excretionem præparantia: qualia sunt Salia tam fixa v. g. Sal. Tartari, Absinthij, Centaurii minoris, Genistæ &c. quam neutra Tart. Vitriol. Arcan. duplic. Sal polychrest. Tart. solub. sive Tartarifat. Liq. Terr. fol. Tart. Nitr. & iat. absorbentia cum acidis mixta, uti Conch. citrat. Lap. cancror. cum acido Tartari saturata. Huc pertinent vegetabilia incidentia & resolventia, Radix Pimpinell. alb. Vinetox. Ari. Gentian. Enulæ Galang. Zedoar &c. Herb. Cent. min. Card. Benedict. Absinth. Sem. Anis. Fœnic. reliquæque carminativa. Cort. Aurant. Citr. winteran. Gummi Ammon Junip. Heder. Extracta amara varia & ex hisce parata, Pilule, uti Becherianæ, Stahlianæ &c.

- 2 Materiam præparatam blande evacuantia: Magnesia alba, Rhabarbarum, Sirupus de Cichor. cum Rhabarb. Pilulæ Becherianæ, Stahlianæ, Polychrestæ Hallensium, Balsamicæ viscerales nobis usuales, Clysteres carminativi aut abstergentes ex furfuribus triticeis cum Terebinthina parati.
- 3 Motum nimium humorum ad intestina impediens & spasticos motus sistens: uti sunt Opiata, Theriaca Andromachi, Cœlestis, Diacord. Fracast. M. P. de Cynogloss. Essent. Opii. Ess. dulc. Hallens. Adstringentia, Absorbentia & Gemmata: Corall. rubr. spec. de Hyacinth. &c.
- 4 Intestina debilitata roborantia: Mixtura Tonica Stahlî, Tinctura & tis Ludovici vel per se, vel cum Essent. Lign. aloes remixta. Essentia & tis Balsamica wedelii, ex eadem Essent. L. aloes & liquore & tiali parata. Huc pertinent etiam Elixiria varia aromatica & amara item Essentiæ Cinnam. Cort. Ont. Alexiph. Stahlî &c.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis incidens.  
R. Pulv. stomach. Birckm. D. singulis 4. horis 2.  
Zss. cusp. cultr.
- 2 Alius.  
R. Conch. citrat. Div. in 6. p. æq.  
Tart. Vitriolat. D. singulis 4. horis.  
Sal absinth. a. & iij. M.
- 3 Pulvis temperans.  
R. Conch. citrat. Div. in 6. p. æq.  
Crystall. mont. ppt. D. singulis tribus vel quatuor horis.  
Tart. Vitriol. a. & iij. M.  
Nitr. depur. gr. xxiv. M.
- 4 Pulvis evacuans.  
R. Rhab. elect. Zss. & iij. D. pro una dosi.
- 5 Alius.  
R. Magnes. alb. & iij. D. mane & sequente die.  
Div. in 2. p. æq.
- 6 Pilulæ evacuantes.  
R. Pil. Becher. Zj. vel 20.  
D. mane aut vespere 15.
- 7 Clyster carminativus & abstergens.  
R. Decoct. Carmin. Vitell. Ov. non j. M.  
Furf. tritic. a. Zv. F. Clyster.  
Terebinth. Zss.
- 8 Pulvis sistens.  
R. Lap. & ppt. Div. in 4. p. æq.  
Corall. rubr. ppt. a. Zij. D. singulis 4. vel 6. horis.  
Ther. cœlest. gr. i v. M.
- 9 Potiuncula anodyna.  
R. Aq. Meliss. Sir. Pap. rhœad. Zss. M.  
Menth. a. Zss. D. singulis 3. vel 4. horis.  
Mastich. Zvj. cochl. ij.  
Theriac. Androm. Zss.
- 10 Pilulæ adstringentes & anodynæ.  
R. Extr. torment. & iij. M. F. Pil. no. xxv.  
Ther. cœlest. gr. v. D. vespere 5. pro dosi
- 11 Mixtura incidens & confortans.  
R. Ess. Alexiph. Stahlî Zij. dos. 25. 30. gt. bis vel ter per diem.  
Cinnam. Zj. M.
- 12 Alia.  
R. Essent. Cinnam. D. ut antea.  
Cort. Ont. Zij. M.
- 13 Alia.  
R. Essent. amar. Hall. Zij. D. ut antea.  
dulc. Zj. M.
- 14 Mixtura Tonica.  
R. Tinct. & tis acris Zij. D. ut antea.  
Spir. C. C. Zj. M.
- 15 Alia.  
R. Tinct. & tis Ludov. D. ut antea.  
Ess. L. Aloes a. Zij.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In omni Diarrhœa eo respiciendum est, ut materia excernenda ad excretionem ita disponatur, ut sine magnis incommodis excerni queat. Si E. Diarrhœa est mucosa, incidentia in principio exhibeantur, ut huc modo materia magis mobilis reddita eo melius par-



partim a Natura, partim per laxantia evacuari queat. Præstant autem talem resolutionem pro subjectorum diversitate modo Salia tam fixa, quam neutra, modo reliqua superius recensita vegetabilia acria & amara.

2 Si Diarrhœa est biliosa, præparantium loco interire possunt Nitrofa, inpr. vero Nitrum depuratum & regeneratum, Crystallus montana cum absorbentibus & salibus neutris mixta, hæc enim bilis acrimoniam optime corrigunt, ac inde metuendas læsiones præcavent.

3 Præmissis hisce laxantia & abstergentia lenia, materiam resolutam sine insigni commotione evacuantia, exhibeantur: quo nomine potissimum se commendat Rhabarbarum in substantia datum, quod facta evacuatione leniter adstringit, atque hoc ipso nimium humorum ad intestina affluxum impedit. Melius adhuc se gerunt Pilulæ veræ Becherianæ, quarum aliquot saltem doses Diarrhœam quamcunque ut plurimum brevi tollunt.

4 Præparata & evacuata materia postea motus spastici sopiantur per opiata legitime præparata, qualia sunt Theriacalia & Tinct. Opii Langelotti per fermentationem cum succo cydoniorum parata, Massa Pilularum de Cynoglossa: quibus interponantur vel jungantur lenia adstringentia & absorbentia superius laudata. Huc pertinet etiam Nux Moschata, cujus pulvere cum vitello ovi aliquo modo ad duritiem cocto vulgus Diarrhœas sæpius feliciter sistit: eundem usum habet Nux Moschata si cum vino rubro fumitur, cum fructu quoque usurpantur pyra & cydonia exsiccata, mespila immatura, Dyacidonium cum & sine aromatibus, Semen Plantaginis exsiccatum ad 3j. cum cerevisia vel ovo sorbili exhibitum. Insignem pariter laudem meretur Cortex Chacarillæ ejusque Extractum, utrumque enim remedium tam in Dysenteria quam in Diarrhœa quacunque, præmissis convenientibus aliis remediis non sine fructu exhibetur.

5 Hisce omnibus peractis tandem remedia tonum Ventriculi & intestinorum restituentia exhibeantur, quod partim remedia adstringentia modo recensita, partim supra allegata tonica præstant.

6 Si tormina insigniter urgent, uti id interdum in Diarrhœis contingit, externa quoque locum habent: uti sunt Spiritus Vini Camphoratus, Aqua Reginae Hungariæ, Theriaca, Emplastrum de Tacamahaca, cum Stomachico Cratonis mixtum, Olea carminativa & aromatica &c. abdomini applicata.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1 Satius interdum est in Diarrhœa legitime procedente a remediis abstinere, quam eandem imprudenter per adstringentia & alia artificia suppressere.

2 Eo magis autem ab adstringentibus abstinendum est, si Diarrhœa fuerint periodicæ, & æquinoctiales, nam Natura per eas ordinarie corpus a multis humoribus vitiosis liberare solet, & hinc etiam eo promptius earum suppressionem graviora damna sequuntur.

3 Potius circa tale tempus exhibeantur remedia faburram humorum eliminantia & hoc modo Diarrhœas præcaventia: aut si fluxus alvi jam præsto est, conatus Naturæ præparando & blande evacuando Medicus adjuvet, abstineat tamen semper ab evacuantibus fortioribus.

4 Si Nitrum in Diarrhœis biliosis aliisque ab æstu sanguinis orti adhibendum est, præstat id minoribus & repetitis dosibus, quam majoribus, exhibere: comode tamen semper cum præcipitantibus & salibus neutris miscetur.

5 Opiata præmature exhibita sistunt, quidem alvi fluxum, materiam tamen morbificam cum damno retinent; quare non nisi præmissis præparantibus & evacuata materia præscribantur. Tutius longe est egregium illud Hallensium anodynum remedium Essentiæ dulcis, quæ confortando materiæ evacuationem promovet & alvi fluxum successive sistit: eandem efficaciam habent Pulveres Vitales & Solares.

6 Uti frigus sæpius multum ad Diarrhœarum produ-

ctionem confert, ita durante alvi fluxu corpus ab eadem sedulo muniendus est.

7 Potus quoque frigidus noxius est & Diarrhœam auget, calidus autem excretionem materiæ mucosæ promovet, partesque biliosas temperat, adeoque ægrotis commendandus est.

#### CAPUT OCTAVUM.

##### D E

##### Cholera Humida.

I. *Definitio.* Cholera est humorum biliosorum acriorum & corrosivorum aliorumque corruptorum, in Ventriculo & intestinis contentorum, per superiora & inferiora ejectio, gravibus symptomatibus ut plurimum stipata.

##### II. Differentia.

###### 1 Respectu gradus.

- Alia est gravior, quæ graviolem & acriorem causam præsupponit & hinc etiam gravioribus symptomatibus ac motibus febrilibus stipata est.
- Alia verò est mitior, quæ satis quidem gravis est, tantum tamen periculi non involvit ac prior, & febris expers est.

###### 2 Respectu causarum.

- Alia a causa interna, bile scil. nimium acris & corrosiva dependet.
- Alia causam externam venena scil. Purgantia drastica aliaque corrosiva assumpta aut cibos fermentescentes in Ventriculo corruptos sequitur.

3 Respectu vomitus aliarumque excretionum per inferiora: a quibus facile respectu signorum & excretionis per superiora & inferiora distingui poterit.

##### III. Signa.

- Quamvis nonnunquam subito & uno quasi impetu malum hocce oriatnr, frequentius tamen præcedunt signa vomitum alias indicantia, appetitus scil. prostratus, nausea, horror, vertigo &c.
- Hisce junguntur insignes anxietates præcordiorum cardialgiæ cum gravibus & lancinantibus doloribus abdominis.
- Frequentes occurrunt horripilationes.
- Accedit gravis hypochondriorum & dolorifica tensio ac abdomini inflatio aut extensio.
- Sitis adest anxia & interdum inexplabilis, post potum tamen inprimis frigidum dejectiones augentur.
- In faucibus, œsophago & ano sentiuntur molesti ardores, quo non raro dictarum partium excoriationes sequuntur.
- Lipothymia ordinarie hisce accedunt symptomatibus, quæ quo magis subjecta sunt sensibilia & bilis acris, eo gravius urgent.
- Corporis continua adest jectigatio & inquietudo ac vires magis magisque franguntur.
- Pulsus est celer & frequens & sæpius parvus.
- Ingravescente malo extrema frigescunt, cum unguum livore, interna vero uruntur ac simul anxietates præcordiorum una cum siti reliquisque symptomatibus circa Ventriculum augentur.
- In partibus extremis, inprimis circa frontem sudor frigidus observatur.
- Tandem singultus & convulsiones mortis instantis indices superveniunt.

##### IV. Subjectum.

- Homines adulti præ junioribus.
- Feminae magis quam viri.
- Cholericæ & Cholericæ sanguinei ad iracundiam maxime proni.
- Qui fermentescentia aut difficilioris digestionis alimenta assumerunt, uti sunt mala persica, melones, cucumeres, cibi pingues, dulces, mistum, cerevisia novella, fungi, ova barbi piscis, vinum acidum, potus frigidus &c.
- Qui post assumptos tales cibos ira excandescunt.



- 6 Quibus venena, purgantia drastica, corrosiva &c. exhibita fuerunt.  
 7 Qui decubitus humorum vitiosorum ad ventriculum patiuntur.  
 8 Qui corpus & inprimis pedes calentes subito frigori exponunt aut frigidæ immergunt.

V. *Pægnosis.*

- 1 Cholera grave & peracutum est malum, quod, nisi prompte succurratur, paucis diebus aut citius, 24. scil. horarum spatio, ut plurimum ægrotos jugulat.  
 2 Cholera, quæ absque causis manifestis subito ægrotos affligit semper periculosioris est indolis, quam ea quæ assumpta fermentescentia aut iram sequitur.  
 3 Qui cholera affecti fuerunt, facile ejusdem recidivam patiuntur.  
 4 Assuetis id malum minus periculosum est, ex quo aquam evomunt. *Forest. Lib. XVIII. Observ. 46. in Scholis.*  
 5 Qui eam frequenter incurrunt, facilius eam tolerant, materia non existente tam copiosa aut maligna: qui vero raro, difficulter sanantur ex causis contrariis; & ideo infantes citius curantur. *ibid.*  
 6 Quo magis lipothymia & cardialgia aliaque pathemata circa ventriculum urgent, eo periculosior est status.  
 7 Cholera in morborum malignorum principiis occurrens fere semper funesta est.  
 8 Quo impeditius procedit excretio humorum in cholera, eo magis metuenda est Ventriculi inflammatio.  
 9 Quo magis horror in extremis urget, eo citius cholera in Ventriculi & intestinorum inflammationem transit.  
 10 Sudores frigidi cum unguum livore & singultu inflammationem factam & mortem instantem utpl. indicant.  
 11 Cholera interdum transit in celiacam passionem. vid. *Forest. l. c. Obs. 20.* interdum quoque in Dysenteriam. vid. *Musit. Trutin. Med. Lib. III. Cap. 10.*

VI. *Remedia.*

- 1 Humores corruptos, biliosos &c. corrigentia: Nitrum, CrySTALL. mont. Lapid.  $\text{ss}$ . Mater Perl. Conch. ppt. aliaque absorbentia vel per se, vel cum acidis saturata: *acida*: Succ. Citri, Sirup. acetos. Citri. Berber. Ceras. acid. Cydon. Spiritus acidi: Salia neutra Arcan. duplic. Tart. Vitriolat. &c.  
 2 *Motus sistentia*: Species de Hyac. Corall. rubr. ppt. M. P. de Cynogloss. Theriac. cœlest. Androm. Laud. Opiat. Laud. liquid. Sydenham Tinct. Anod. Langelott. Opiata Bezoardica Timæi. Extract. torment. Essent. dulc. ordinariâ & concentrata externe aromatica.  
 3 Ventriculum & intestina roborantia, sive tonum eorum restituentia: Mixtura tonica D. D. Stahlî. Tinct.  $\sigma$  t. Ludov. &c.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pulvis temperans.

Rx. Nitr. depur. *div. in 6. p. æq.*  
 Cryst. mont. *D. singulis 2. 3. horis.*  
 Tart. Vitriolat.  $\mathfrak{z}$ ij. M.

## 2 Alius.

Rx. Nitr. regener. *Conch. citrat.  $\bar{a}$ .  $\mathfrak{z}$ ij. M.*  
 Crystall. mont. *Div. D. ut antea.*

## 3 Potiuncula temperans.

Rx. Aqu. Plantag. *Lap.  $\text{ss}$ . a.  $\mathfrak{z}$ ij.*  
 C. C. Citr.  $\bar{a}$ .  $\mathfrak{z}$ ij. *Sir. acetos. Citr.  $\mathfrak{z}$ ss. M.*  
 Nitr. depur. *D. singulis horis coch. ij.*

## 4 Alia.

Rx. Aqu. Rub. id. *Spir. Vitriolat. gr. v.*  
 Portulac. a.  $\mathfrak{z}$ ij. *Sir. herb.  $\mathfrak{z}$ vj. M.*  
 Succ. citr. rec.  $\mathfrak{z}$ ij. *D. ut antea.*

## 5 Potiuncula temperans &amp; sistens.

Rx. Aq. Menth. *Diascord. Fracast.  $\mathfrak{z}$ ij.*  
 Aq. Meliss.  $\bar{a}$ .  $\mathfrak{z}$ ij. *Sir. acetos. citr.  $\mathfrak{z}$ vj. M.*  
 Cinnam. cyd.  $\mathfrak{z}$ vj. *D. ut antea.*  
 Spir. Vitriol.  $\mathfrak{z}$ ss.

## 6 Essentia confortans &amp; sistens.

Rx. Ess. dulc. Hall.  $\mathfrak{z}$ j. *D. singulis horis 15. 20. gt.*

## 7 Alia.

Rx. Ess. amar.  $\mathfrak{z}$ ij. *D. singulis 2. vel 3. horis*  
 dulc.  $\mathfrak{z}$ j. M. *gt. 20. 25.*

## 8 Pulvis sistens.

Rx. Corall. r. ppt.  $\mathfrak{z}$ j. *M. Div. in 3. p. æq.*  
 Spec. de Hyac. gr. xxiv. *D. singulis 2. 3. horis.*  
 MP. de Cynogl. gr. iij.

## 9 Auid simul temperans.

Rx. Pulv. antispasmod. Div. *M. P. de Cynogl. gr. iij.*  
 Corall. r. ppt.  $\mathfrak{z}$ ij. *M. div. in 6. p. æq.*  
 Spec. de Hyac.  $\mathfrak{z}$ ss. *D. ut antea.*

## 10 Bolus sistens.

Rx. Ther. Androm.  $\mathfrak{z}$ ss. *Sir. pap. rh. q. s.*  
 Pulv. chacar.  $\mathfrak{z}$ j. *M. F. Bolus.*

## 11 Pilulæ sistentes.

Rx. Extract. torment.  $\mathfrak{z}$ ss. *M. F. Pil. xxxvi.*  
 Ther. cœlest. gr. vj. *D. singulis 6. horis.*

## 12 Tinctura tonica.

Rx. Tinct.  $\sigma$  t. Lud.  $\mathfrak{z}$ ss. *D. ter per diem gt. 30. 40.*

## 13 Alia.

Rx. Tinct.  $\mathfrak{z}$ ij. *D. ut antea.*  
 Spir. C. C.  $\mathfrak{z}$ j. M.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Cum materia ut plurimum sit corrupta & maxime acris optime præparanda est & corrigenda ut a Natura eo melius & sine noxa evacuari queat, cui fini inserviunt remedia supra præscripta quæ & corrigunt & abstergunt.  
 2 Præparationis gratia mucilaginosâ & gelatinosâ uti Decoctum C. C. reliquis præparantibus & corrigentibus ad mitigandam humorum acrimoniam interponi possunt.  
 3 Si cholera a venenis corrosivis ortum traxit, frequenter ad obtundendam corrosivitatem dentur pingua & oleosa, uti Lac, Oleum amygdalarum dulcium & juscula pingua.  
 4 Si vero purgantia drastica in culpa sunt Theriaca aliaque Opiata legitime correctâ insignem præstant usum.  
 5 Si magna humorum corruptorum saburra hæret in Ventriculo blanda evacuantia, ad promovendam excretionem, interdum conducunt, uti Rhabarbarum cum absorbentibus exhibitum, quod semper lenem adstrictionem post se relinquit: imo aliquoties Radicem Ipecacuanhæ ad  $\mathfrak{z}$ j. Sal Tart.  $\mathfrak{z}$ ss. summo cum fructu dedimus.  
 6 Clysteres abstergentes hic interdum etiam optimum exerunt effectum.  
 7 Facta sufficienti præparatione & correctione humorum acrium in usum trahantur Theriaca alia, opia correctâ & adstringentia superius laudata, ut nimii & excedentes motus sopiantur.  
 8 Nullum datur præstantius in cholera remedium quam Essentia dulcis tam ordinaria quam concentrata, cujus quinque dosibus choleram gravissimam in femina, duabus etiam non ita gravem & tribus iterum aliam, omisiss omnibus aliis remediis, feliciter sustulimus.  
 9 Tandem ad restituendum tonum detur Tinctura Martis Ludovici aut Mixtura tonica D. Stahlî, quarum prior & temperat & leniter fibras roborat, altera vero fibras non tantum stringit, sed & discutit, adeoque ulteriorem humorum ad primas vias fluxum metuendum præcavet.

VIII. *Cautele Præcticæ.*

- 1 Quoniam malum hocce est admodum acutum & grave, ideo etiam mature convenientibus remediis ipsi occurrendum est, neglecto enim morbi principio, reliquus morbi cursus utpl. male cedit.  
 2 A calidis remediis hic omnino abstinendum est, quoniam materiam, jam satis acrem, magis effera reddunt, ac febrem periculosam inflammatoriam facile producant.  
 3 Theriaca sola statim ab initio exhibita noxium edunt effectum.  
 4 Absorbentia quidem acrimoniam optime temperant, nunquam tamen sola præscribantur, sed Nitrum,

tan-



- tanquam optimum bilis corrigens ipsis addatur.
- 5 Potus sufficiens ægrotis nunquam denegetur, quoniam Natura ipsa per sitim auctam materiæ biliosæ dilutione per potum opus esse, demonstrat, frigidus tamen cane & angue pejus fugiatur, quoniam singultum excitat, ac reliqua symptomata graviora reddit.
  - 6 Vomitoria & purgantia non facile exhibeantur, si per alia curatio institui potest; si vero insignem ciborum corruptorum saburram in Ventriculo hære certo constat, interdum locum habere possunt, si in minori dosi exhibentur.
  - 7 A manna etiam laxandi fine in hoc morbo abstinendum est, & abstergentibus ex melle, statim enim in corruptelam trahuntur & bilescunt. *Septalius*. Magis convenit Pulpa aut Decoctum Tamarindorum.
  - 8 Jectigationes & frigus maxime nocent cholericis, quare calor & quies ipsis commendentur.

## CAPUT NONUM.

D E

## Fluxu Cœliaco &amp; Lienteria.

- Definitio.** I **F**luxus cœliacus est Diarrhœæ species, in qua excrementa liquida cerneritia aut albicantia, ob chylum admixtum, excernuntur.
- 2 Lienteria est itidem species alvi fluxus, ubi assumpta prouti ingesta fuerunt, sine sensibili eorum alteratione per inferiora egeruntur.
- I. Differentia.**
- 1 Quomodo Lienteria & Fluxus cœliacus inter se differant, ex modo dictis apparet.
  - 2 Quomodo vero a reliquis alvi fluxibus distingui debeant, ex supra dictis patet & ex infra dicendis patebit.
- II. Signa.**
- 1 In fluxu cœliaco cibi quidem aliquandiu retinentur & aliquatenus digeruntur, nulla tamen chyli fit secretio & excrementa hinc chylo permixta deprehenduntur.
  - 2 Ciborum paulo post eorum assumptionem sine notabili alteratione ejectio.
  - 3 Quum murmura abdominis & frequentes, sed obscuræ constrictiones spasmodicæ in intestinis se exerentes præcedunt.
  - 4 Adest appetitus fere plenaria prostratio & nausea insignis ciborum.
  - 5 Non raro quoque hisce cardialgicæ stricturæ junguntur.
  - 6 Sequitur corporis totalis emaciatio.
- IV. Subjectum.**
- 1 Infantes tenerioris constitutionis magis, quam adulti hisce affectibus corripiuntur.
  - 2 Phlegmatici & feminæ facilius quoque iisdem laborant quam Viri & aliorum temperamentorum homines.
  - 3 Qui pinguibus & lubricantibus, fermentescantibus aut etiam aliis corruptis abusi sunt.
  - 4 Qui frequentes Diarrhœas, aut Dysenteriam passi sunt.
- V. Prognosis.**
- 1 Uti Cœliaca a Lienteria gradu tantum differt, ita facile in eam transit, nisi mature convenientibus remediis tollatur.
  - 2 Lienteria semper curatu difficilior est passione Cœliaca.
  - 3 Utrumque malum, quoniam nutrimentum corpori subtrahitur, Atrophiam, Hecticam, Cachexiam, Hydropem &c. post se trahit.
  - 4 Lienteria, cicatrificationem intestinorum post Dysenteriam excipiens, curatu difficillima, aut plane incurabilis est.
  - 5 Lienteria morbis tam acutis, quam chronicis su-

- perveniens, quoniam vires per præcedentem morbum jam fractæ sunt, periculosa est.
- 6 Lienteria & Cœliaca in gravidis ob metuendum abortum sunt periculosæ.
  - 7 Uterque affectus, quamvis semel curatus fuerit, propter malam diætam facile recurrit.

## VI. Remedia.

- 1 Humores blande resolventia, & vias obstructas referantia: Radix Ari, Galang. Zedoar. Acor. Herb. cent. min. Absinth. Salia neutra & fixa, absorbentia, Gummata aliaque superius in Diarrhœa laudata.
- 2 Blande humores evacuantia: Rhabarb. Magnes. alb. Pilulæ ex Extractis amaris & Gummatibus cum leni stimulo, Pilulæ Becherianæ, Stahlianæ &c.
- 3 Lenia adstringentia & anodyna sive opiata legitime correctæ, vid. supra l. a.
- 4 Tonum Ventriculi & intestinorum restituentia: Tinctur. ♂ t. Ludov. Mixt. tonica D. Stahlian, Essent. dulc. Hall. Pulv. Ores tonici D. Richteri.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis incidens & præparans.  
R. Conch. ppt. Rad. Ari ppt. ʒss. M.  
Tart. Vitriolat. D. aliquot cusp. ultr. singulis  
Cinnam. acut. a. ʒj. 4. 6. horis.
- 2 Alius.  
R. Pulv. stomach. Birckm. D. ut antea.  
ʒss.
- 3 Pulvis laxans.  
R. Rhab. elect. ʒss. D. in juscule.
- 4 Alius.  
R. Magnes. alb. ʒj. D. ut antea.
- 5 Infusum præparans & laxans.  
R. Rad. Gentian. ʒiij. Cort. Ont. ʒiij.  
Galang. Sem. Anis.  
Zedoar. a. ʒiss. Fœnic.  
Ari ʒj. Cinnam. ac. a. ʒij.  
Herb. Absinth. Sal. absinth. ʒj.  
Centaur. minor. Inc. Cont. g. m. infund. in  
a. mss. Vin. generos. lb. ij. iij.  
Rhab. elect. ʒss. D. singulis diebus mane ʒvj.
- 6 Pulvis adstringens & anodynus.  
R. Lap. ʒiij. Spec. de Hyac. ʒss.  
Corall. r. ppt. MP. de Cynogl. gr. vj. M.  
Cort. Chacarrill. a. ʒj. D. sing. 6. horis 2. cusp. cultr.
- 7 Pulvis tonicus.  
R. Pulv. O. tonic. Ri. D. singulis 4. 6. horis do-  
cht. dos. vj. sis j.
- 8 Mixtura robórans.  
R. Ess. amar. ʒij. M. D. 30. gt. ter quovis die.  
dulc. ʒj. Reliqua vid. supra.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Si malum utrumque conjuncta habet multa excrementa pituitosa, incidentia & resolventia superius laudata non sine fructu exhibentur, quatenus non solum materiam ad excretionem disponunt, sed etiam obstructions vasorum lacteorum referant.
- 2 Hisce subjungantur blanda laxantia inpr. vero Rhabarbarum, quod in hoc morbo, uti in aliis Diarrhœis, egregie se gerit, evacuando scil. & leniter postea adstringendo. Optimo quoque cum effectu exhiberi possunt Pilulæ Stahlianæ aut Polychrestæ Becherianæ.
- 3 Si multæ cruditates mucosæ in Ventriculo hærent, vomitus per lenia vomitoria excitatus, Lientericis interdum, si alia non obstant, prodest.
- 4 Remotis, quæ removeri debebant, adstringentia quoque atque opiata locum habent, ut hoc modo nimia humorum evacuatio sensim sensimque sistatur.
- 5 Tandem tonico discutientia locum habent, partim ut tonus partium debilitatarum in pristinum ordinem redigatur, partim ut humores nimia copia ad intestina ruentes ad alia loca deriventur & per eadem lento gradu evacuentur.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 Nisi in fluxu cœliaco incidentia & resolventia & quidem præcipue amara ex Regno Vegetabili diu usur-



- usurpentur, frustra utpl. laborat Medicus, mucus enim viscidus intestina obsidens & poros obstruens utpl. hujus affectus est causa.
- 2 Uti lenia laxantia solventibus mixta insignem in hisce affectibus habent usum, ita e contrario fortiora & acria affluxum augendo insigniter nocent, & hinc fugienda sunt.
  - 3 Adstringentia, uti in aliis alvi fluxibus, caute sunt usurpanda, quoniam neglecto aliis gravioribus malis, infarctui viscerum, Hæcticæ, Hydropi aliisque portam pandunt.
  - 4 Opiata nimium quidem & auctiorem peristalticum intestinorum motum aliquo modo sopiunt, si tamen cum aliis leniter solventibus provide non miscentur & exhibentur, statim humorum circa intestina producant & multis inde dependentibus affectibus anam præbent.
  - 8 In Lienteria omnia nimis acria, calida & stimulantia incidentia & solventia remedia exulent.

## CAPUT DECIMUM.

## DE

## Fluxu Hepatico.

- I. *Definitio.* **F**luxus hepaticus est species Diarrhœæ five alvi fluxus, in quo excrementa liquida & instar loturæ carnis rubentia excernuntur.
- II. *Differentia.* Differt
  - 1 A *Dysenteria*, quod in hac excrementa mucosa, utpl. rubicunda, interdum vero alba, cum torminibus & tenesmo, in *Fluxu* vero hepatico, fluida & leni tantum rubore tincta, sine dolore aliisque gravioribus Symptomatibus sæpius ejiciantur.
  - 2 A *Diarrhœa* strictè sic dicta, in qua excrementa fluida quidem frequentius excernuntur, colore tamen rubicundo minime tincta sunt, uti in fluxu hepatico.
  - 3 Ab *Hæmorrhoidibus*, in quibus sanguis sincerus cum excrementis, debita utpl. consistentia præditis, excernitur, cum e contra in hocce fluxu excrementa sint liquida & instar loturæ carniæ.
  - 4 A *Lienteria* & *Cœliaca* respectu signorum supra recensitorum.
  - 5 Juxta veteres Fluxus hepaticus est vel *verus*, vel *spurius*: ille est quando serum tinctum solummodo excernitur: hic vero, quando partes acres biliosæ aut aliæ feculentæ ac corruptæ excrementis admiscuntur, adeo ut excretio propter mordacitatem eorum cum molestia & dolore contingat.
- III. *Signa.*
  - 1 Frequens excretio sine insigni molestia, quam
  - 2 Ordinatio varii motus in abdomine & murmuræ præcedunt.
  - 3 Quibus interdum titillationes & lenes morcificationes in intestino recto junguntur.
  - 4 Excrementa fluida sive serosa sanguine leniter tincta.
- IV. *Subjctum.*
  - 1 Adulti & inpr. juvenes & viri magis quam juniores.
  - 2 Viri molimina varia ad Hæmorrhoides sentientes, aut earundem suppressione laborantes.
  - 3 Femine mensium imminutione aut suppressione affectæ.
  - 4 Infarctibus & Scirrhis viscerum & glandularum infimi ventris laborantes.
  - 5 Homines a *Dysenteria* male curati & excoriationem adhuc in intestinis habentes.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Fluxus hepaticus utpl. chronicum est malum & hinc curationem difficulter admittit.
  - 2 Si malum est recens & subjecta adhuc sunt juniora ac vegeta, interdum curatur, in senibus vero ac morbo jam inveterato nulla curationis spes est, præsertim si labes, quod sæpissime contingere solet, in viscere quodam infimi ventris hæret.
  - 3 Utpl. si nimis diu durat, in Cachexiam & Hydropem

in aliis vero in Tabem five Hæcticam degenerat.

VI. *Remedia.*

- 1 Blanda laxantia: inprimis vero Rhabarbarum, Pilulæ Becherianæ, Stahlianæ, polychrestæ, balsamicæ viscerales.
- 2 Abstergentia, uti sunt Salia neutra & fixa cum absorbentibus mixta, Arcan. duplic. Tart. Vitriolat. Nitr. Antimoniatum, Sal Absinth. Cent. min. Conch. citrat. Lap. ☉. Mart. Perl. &c.
- 3 Tonico discutientia: Mixt. Tonica Stahlii, vel sola, vel cum Essent. Pimpin. alb. vel Adianth. albi mixta. Radices solventes & Herbæ amaræ, Rad. Pimpin. alb. Ari. Angel. Summit. Absinth. Cent. min. Card. Bened. &c.
- 4 Huic referri etiam merentur lenia diaphoretica, serum ad cutim derivantia: Antim. diaphoret. Bezoard. miner. Essent. alexipharm. D. Stahlii.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis laxans.  
℞. Rhab. elect. ℥ss. D. pro 1. dosi.
- 2 Pilulæ laxantes.  
℞. Pil. balsam. Stahlii ℥j. D. 15. vel 20. vesp.
- 3 Pulvis temperans.  
℞. Conch. citr. Div. in 6. p. æq.  
Tart. Vitriolat. D. singulis 4. hor. dos. j.  
Sal Absinth. a. ℥ij. M.
- 4 Potiuncula diaphoretico-temperans.  
℞. Aq. Scorzon. Tart. Vitriolat. a. ℥ss.  
Meliss. a. ℥ij. Succ. citr. rec. ℥ss.  
Antimon. diaph. Sacch. canar. ℥ij. M.  
Laq. ☉. D. singulis 2. hor. cochl. ij.
- 5 Infusum resolvens & roborans.  
℞. Rad. Levist. Cort. Citr.  
Pimpin. alb. a. Ont. a. ℥ss.  
Ari. ℥j. ℥ij. Winter. ℥j.  
Summit. cent. min. Inc. infund. in Vin. alb. ℥ss.  
Herb. Fumar. a. mj. D. sing. 6. hor. ℥iv.
- 6 Mixtura Tonico discutiens  
℞. Tinct. ☿ t. ac. Spir. C. C. a. ℥j. M.  
Essent. Adianth. alb. D. 3. q. gt. mane & vesp.
- 7 Alia.  
℞. Tinct. ☿ t. Lud. a. ℥ij. M.  
Ess. Adianth. alb. D. ut antea.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Exhibeatur Rhabarbarum in convenienti dosi, utpote quod non solum optime laxat, sed etiam ob lenem adstrictionem, quam post se relinquit, facilem affectus promittit curationem. Majoris tamen efficaciae sunt Pilulæ Becherianæ, aut hisce adhuc meliores Stahlianæ, quæ solæ repetitis vicibus exhibitæ totum malum brevi sine ullo noxæ metu tollunt.
- 2 Hisce subjungantur vel interponantur lenia abstergentia & temperantia ad infringendum humorum æstum & acrimoniam ac mucositatem Abstergendam. Ad eundem finem etiam tendunt remedia ex incidentibus & amaris parata, quæ humores vitiosos optime corrigunt.
- 3 Tandem curæ finem imponant discutientia, quæ simul etiam humores vitiosos alterant, & ad alias partes derivant, uti ex Mixtura Tonica D. Stahlii, quæ præter discussionem & humorum correctionem lenem quoque excitat diuresin. Essentia alexipharmaca huic sociata disponit ad Diaphoresin, quæ hoc in affectu optima est. Si harum usui succedit Tinctura Martis Ludovici, eo melior sperandus est curæ successus.
- 4 Si fluxus hepaticus a suppresso quodam sanguinis fluxu originem traxit, Venæsectio interdum locum habet, si subjecti conditio eam permittit.

VIII. *Cautela Practica.*

- 1 Cautelæ quæ in cura Hæmorrhoidum propositæ fuerunt, hic quoque locum habent.
- 2 Laxantia aloetica hic nullius sunt usus, quia malum exasperant: idem quoque judicium ferendum est de Purgantibus resinosis & acribus.
- 3 Adstringentia, quamvis fluxum huncce brevi sup-



primant, multa tamen incommoda post se trahunt, & hinc fugienda sunt. Vid. *Tab. de Hæmorrhoidibus*.

- 4 Opiata, uti in multis aliis fluxibus, ita & hoc loco admodum suspecta sunt, & ideo non nisi præmissis convenientibus remediis cum debita cautela exhibeantur.

## CAPUT UNDECIMUS.

## D E

*Hæmorrhoidibus Seroso Mucosis & sudore circa anum Hæmorrhoidali.*

I. *Definitio.* **E**st species excretionis Hæmorrhoidalis, in qua Natura materiam seroso mucosam in Hæmorrhoidibus hærentem, modo per internas sub forma feri mucosi, modo per externas sub sudoris specie expellit.

II. *Differentiæ.* Differt fluxus hic.

- 1 Ab Hæmorrhoidibus veris respectu materiæ excretæ, in illis enim sanguis, in hoc vero materia mucosa serosa excernitur.
- 2 A Diarrhœa variis speciebus, ratione quantitatis materiæ, quæ in illis magna in copia, in hoc vero parcius evacuatur.
- 3 A Dysenteria, uti a quibusdam appellatur, alba, respectu ingentium torminum & tenesmi, quæ symptomata in nostro affectu ordinarie non reperiuntur.

III. *Signa.*

1 *Hæmorrhoidum Mucosarum.*

- a Habitus corporis constrictus, ac faciei pallor.
- b Debilitas pedum & sensus stricturæ ac frigoris in pedibus.
- c Respirandi difficultas cum vertigine inpr. post motum corporis, sub quo etiam abdominis tensio augetur.
- d Motus tensivi, spastici varii, interdum sine, interdum vero cum doloribus satis gravibus, in hypochondriis & potissimum in abdomine se exercentes.
- e Borborygmi, flatus, ructus.
- f Pressio in lumbis & circa os sacrum.
- g Lenis tenesmus cum punctura ani.
- h Frequentes dejectiones in principio fecum molliorum, postea vero muci cum aliquali sibilo prodeuntis, quas pressionis circa lumbos & os sacrum remissio, & reliquorum symptomatum cessatio excipit.

2 *Sudoris Hæmorrhoidalis.*

- a Pressiones lenes circa os sacrum.
- b Pruritus insignis circa anum, in perinæo & scroto.
- c Qui tamen fluente copiosius sudore in confiniis ani cessat.

IV. *Subj. etum.*

- 1 Homines temperamenti sanguineo-phlegmatici, in ætate virili & consistente constituti, & plethorici.
- 2 Potu abutentes & vitam sedentariam amantes.
- 3 Veneri dediti.
- 4 Plethoram uno impetu commoventes, inpr. quando jam antea ad talem evacuationem dispositi fuerunt.
- 5 Sudores matutinos avrocraticos negligentes & urinam nimis diu retinentes.
- 6 Venæ sectiones & scarificationes consuetas negligentes.

V. *Prognosis.*

- 1 Uti Hæmorrhoides, ita & excretiones, de quibus hoc loco sermo est, a multis infimi ventris imbris præservant, eisdemque præsentis tollunt, adeoque sunt salutare.
- 2 Si vero negliguntur, abdominis inflationes, tormina colica &c. post se trahunt.
- 3 Si per malum regimen, aut per adstringentia saprimuntur, tumoribus pedum œdematosis, Hydropi aliisque affectibus serosis ansam præbent.
- 4 Interdum, si excretio post varia molimina est vel

nulla, vel insufficiens, feri mucosi ad pectus fit translatio, unde tussis humida cum multa excretionem originem trahit.

- 5 Si post nullam vel insufficientem excretionem, incommoda adhuc supersunt, larga urinæ vel sudoris excretio ea tollit.
- 6 Sudorem & pruritum nimium, sæpius partium circa anum excoriatio sequitur.

VI. *Remedia.*

- 1 Evacuantia, serum copiosum imminuentia: uti sunt Purgantia, Magnesia alba, Rhabbarbarum, Jalapa, Specificum jalapinum, Folia Sennæ, Fibr. Helleb. nigr. Salia neutra in majori copia data, Infusa laxantia & diuretica.
- 2 Serum ad alia loca derivantia, Diuretica & Diaphoretica: Sal. Tart. Genist. onon. Tart. Vitriolat. Arcan. dupl. Conch. ppt. ♂. diaph. Bez. miner. Ess. Alexiph. Mixt. simpl. Tinct. ♂ii, Resolvens, Tartari &c.
- 3 Tonum partium, per quæ fit excretio, roborantia, humoresque discutientia: Tinct. ♂t. Ludov. Mixt. Ton. D. Stahlî, Pulveres Solares tonici D. Richteri &c.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis laxans.  
R. *Magnes. alb.* ʒj. D. pro 1. dosi.  
2 Alius.  
R. *Rhab. elect.* ʒij. D. pro 1. dosi.  
3 Alius.  
R. *Specif. jalap.* ʒss. D. ut antea.  
4 Infusum laxans & diureticum.  
R. *Rad. onon.* Fol. *Senn. S. S.* ʒj.  
    *pimp. alb.* Rhab. *elect.* ʒij.  
    *vincecox. a.* ʒij. Cort. *Ort.*  
    *Herb. bellid.* Tart. *solub. a.* ʒiss.  
    *Chereseol.* Incis. *Inf. in Aq. fervent.* ℥ij.  
    *Capill. ♂. a.* adde *Vin. alb.* ℥ij. D. ʒvj.  
    *ms.* vel viij. mane.  
5 Potiuncula diuretico-diaphoretica.  
R. *Aq. scabios.* ♂. diaph.  
    *Chereseol. a.* ʒij. Lip. *Tr. a.* ʒj.  
    *Sal. Onon.* Sacch. *cassar.* ʒij. M.  
    *Tart. Vitriolat.* D. singulis biboribus cochl. ij.  
6 Tinctura diaphoretico-diuretica.  
R. *Tinct. ♂ii.* succ. ʒj. M.  
    *Ess. alexiph. a.* ʒiss. D. mane & vesp. 30. gt.  
7 Tinct. roborans.  
R. *Tinct. ♂t. Lud.* ʒss. D. mane & vesp. 40. gt.  
8 Mixt. tonico discutiens.  
R. *Tinct. Antim. Tartar.* Sp. C. C. ʒj. M.  
    *risat.* ʒij. D. 30. gt. mane & vesp.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Cum corpora talia utpl. multis humoribus seroso mucosis repleta sint, farrago humorum excrementitiorum removeatur per modo laudata laxantia, aut exhibeantur singulis septimanis aliquoties Pil. Becherianæ, stahlianæ aut Balsamicæ viscerales, utpote quæ majoris sunt efficaciæ, quam reliqua laxantia.
- 2 Hisce subjungantur diuretica & diaphoretica, quo hoc modo feri pars per alia loca evacuetur, & ejus uberior ad hæmorrhoidales venas affluxus intercipiatur.
- 3 Cum venæ hæmorrhoidales propter frequentem muci effluxum admodum laxæ reddantur, adeoque talis fluxus facilius recurat, ad roborandas hæc partes, Tinctura ♂tialis legitime præparata, uti est Tinct. ♂t. Lud. detur, ut tono roborato, si ve fibris aliquo modo constrictis, eo melius postmodum per Mixturam tonicam D. Stahlî serum cum sanguine discuti queat.
- 4 Præservationis gratia lenes laxationes frequentius repetitæ, scarificationes & interdum Venæ Sectio, si subjecti & Temperamenti conditio eam permittit, aliaque humores superfluos partim imminuentia, partim eorum crasin corrigentia, insignem usum præstant.



VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 Fortiora Purgantia inpr. nimis acria nullum hic habent locum, utpote quæ partes affectas nimis stimulando affluxum humorum augent; magis E. profunt lenes laxationes repetitæ.
- 2 Uti in hæmorrhoidibus legitime fluentibus, ita & in hisce adstringentia noxia sunt, nunquam enim simul & semel supprimantur; ne graviora earum suppressionem sequantur mala.
- 3 Si cum talibus hæmorrhoidibus conjunctus est simul sudor in partibus vicinis, internas & externas hæmorrhoides conspirare indicat: in tali casu vitentur Diaphoretica calida, ne internis in mere externas mutatis, partium externarum sequatur exulceratio, quæ facile in fistulosum abit ulcus, uti id in duobus observavimus subjectis.
- 4 Nec etiam in tali casu fortiora diuretica usurpentur, ne hæmorrhoides mucosæ plane supprimantur, & facta humorum nimia congestione horum exulceratio & calculus sequatur, quod eo facilius contingit, si Massæ humorum multæ insunt partes excrementitiæ.
- 5 Cibi flatulenti, potus nimius, vita sedentaria & mœstitia maxime augent malum, quare fugiantur.
- 6 Motus vero corporis placidus & continuatus, & potus leniter diureticus in tali casu conducunt.

## CAPUT DUODECIMUM.

## D E

*Dysenteria Benigna.*I. *Definitio.*

**D**ysenteria benigna est Diarrhœa plus vel minus cruenta, magnis torminibus stipata, a materia fermentativa contagiosa originem trahens, quam Natura auctiori motu peristaltico & intercurrentibus motibus febrilibus, per alvum expellere conatur.

II. *Differentia.*

- 1 Alia est *maligna*, (de qua inferius sub *Febris*) alia vero est *benigna*, (de qua hoc loco) Hæc differt.
- 2 Ab aliis alvi fluxibus, quod patet.
  - a Ex epidemica certo anni tempore grassatione.
  - b Ex torminum & reliquorum symptomatum ferocia.
  - c Ex excretorum subcruenta & mucida consistentia tunicæ interioris villosæ intestinorum abrasionem referente,
- 3 A fluxus hæmorrhoidali, impeditius & cum torminibus sensibilibus emicante, in eo præcipue differt, quod in hoc sanguinis excretio augescens morbi & præsertim torminum impetum minuat, in Dysenteria vero exasperet.
- 4 Alia respectu materiæ excretæ, est *alba*, alia *rubra*.
- 5 Alia est *sporadica*, alia est *epidemica*.

III. *Signa.*

- 1 Ordinarie incipit cum horrore modo majori, modo minori.
- 2 Sæpius vero nullus febrilis horror observatur, sed statim ingens cruciatus, intestinorumque depressio cum dolore & molestissimo viscerum omnium quasi descensu adest, vid. *Sydenh.*
- 3 Quos fluxus alvi frequens & stimulans excipit.
- 4 Excrementa sunt ordinariæ mucosa variis coloris, admodum acria & hinc locis per quæ transeunt, infesta.
- 5 Interdum etiam in principio vomitus observantur, in aliis vero & quidem frequentius cardialgia & nausea, quæ etiam reliquo morbi cursu continuant.
- 6 Postea sensim sensimque sanguine tinguntur excrementa.
- 7 Interea appetitus prostratur, vires labascunt & fitis urget.
- 8 Tenetismus individuus hujus mali comes reliquis jungitur symptomatibus.
- 9 Parum tamen est, quod urgente tenesmo excerni-

tur, imo sæpius irritus est excernendi conatus.

- 10 Urinæ fluxus est impeditior, ita ut vel parum ejus excernatur, vel interdum prorsus supprimatur.
- 11 Vigiliæ continuo urgent, nec ullus est somno locus.
- 12 Variæ etiam toto morbi cursu febriles observantur commotiones.

IV. *Subjectum.*

- 1 Qui fructibus horræis facile fermentescentibus abundantur & potum frigidum superingerunt.
- 2 Otiosi, gulæ dediti multasque cruditates a mala digestionem ortas in se habentes.
- 3 Temperamento sanguineo aut cholericum præditi, inpr. si simul sunt plethorici.
- 4 Quibus fermentum acre ex Atmosphæra in corpus illatum fuit.
- 5 Corpus calidum aeri frigidiori exponentes, aut in aere continuis mutationibus ex calido in frigidum & viceversa obnoxio versantes.
- 5 Quibus ulcera antiqua pedum consolidantur. vid. *M. N. C. D. 2. Ann. 2. Obj. 213.*

V. *Prognosis.*

- 1 In viris Dysenteria ordinarie magis est periculosa, quam in feminis.
- 2 Adulti gravius affliguntur quam juniores, inpr. lætantes, interdum tamen multi quoque infantes dysenteria interimuntur. Vid. *Hist. morb. Uratisl. T. I. p. 73.*
- 3 In Senibus Dysenteria pariter maxime est periculosa.
- 4 Cholericæ, ad iram proni sanguinei & Plethorici semper etiam gravius laborant quam Melancholici & Phlegmatici.
- 5 Quo magis sanguis est corruptus, eo facilius quoque Dysenteria ægrotos jugulat.
- 6 Phthifici & quibus occulta in visceribus hæret labe, aut qui a morbis præcedentibus contagiosis insigniter sunt labefactati, pereunt in Dysenteria.
- 7 Venerei per salivationem curati maxime dispositi sunt ad Dysenteriam, sed eam ægerrime ferunt.
- 8 Dysenteria a contagio orta magis est periculosa, quam ea quæ a fructibus horræis dependet.
- 9 Quamvis Dysenteria benigna non adeo periculosa sit, periculosa tamen facile fit.
- 10 Duratio Dysentericæ non est adeo certa, ob subjectorum, causarum, aliarumque circumstantiarum diversitatem, ordinarie tamen ad aliquot septimanas extenditur.
- 11 Quo graviore in principio statim sunt symptomata, eo citius quoque ad finem, sed utpl. lethalem, properat & contra.
- 12 Curatio spontanea, uti in aliis morbis, hic parum loci habet, sed fere semper artis concursus requiritur, alias ægrotantes jugulat.
- 13 Dysenteria alba sive mere mucosa gravioribus semper stipata est symptomatibus & hinc etiam magis periculosa est quam cruenta.
- 14 Quo magis excrementa Dysentericorum sunt stercorea, eo minora sunt tormina, quo vero magis mucosa, eo graviora & eo periculosius quoque est malum.
- 15 Quo magis urget tenesmus, eo majoris tenacitatis & acrimoniæ muci est indicium & hinc periculum portendit.
- 16 Tormina fortiora subito evanescentia, præsentibus adhuc reliquis Dysentericæ symptomatibus, semper mali sunt omnis.
- 17 In longis Dysentericis appetitus prostratus, malum, & cum febre, pejus. *Hipp. 6. Aph. 3.* Appetitus vero adhuc aliquo modo vicens aut rediens cum somno & aliquali remissione doloris, bonum præbet signum.
- 18 Si Dysentericæ ructus vel crepitus ventris superveniat, bonum. *Sennertus.*
- 19 Dysenteria tenuia affligens intestina periculosior est ea, ubi crassa afficiuntur.
- 20 Sanguinem sincerum in Dysenteria effluere malum est.
- 21 Inflammatio intestinorum Dysentericæ superveniens mala est, eo pejor vero si extrema frigent, interna vero uruntur.



- 22 Singultus Dysentericorum possumus & utpl. convulsionum prodromus est.
- 23 Vomitus in statu morbi affligens malus, & læsionis in Ventriculo signum est, in principio vero si assumpti fructus horræi rejiciuntur, bonus, quatenus, si sufficiente quantitate antequam alvus turbetur, contingit, totum malum præoccupat.
- 24 Si in Dysenteria adhibueris Opiata & altero mane color oculorum ægri est mutatus, certe non superabit morbum. Si vero color oculorum non mutatus visitur, indicio est ægrotum posse reconvallescere. waldschmid. Reliqua Vid. Tab. de Dysenteria maligna.

## VI. Remedia.

- 1 Abstergentia & evacuantia, Rhabarbarum in substantia datum, vel in infuso saturatiore, Pil. Polychr. Becheri vel Balsamicæ Stahlianæ, Clysteres ex fero lactis, vel Decocto furfurum tritici.
- 2 Humores acres biliosos fermentescentes temperantia & obtundentia Absorbentia, Crystall montana, Corall. præparata &c. Nitrum, Gummi Arabicum, Lac aqua largius dilutum, Ol. Amygd. dulc. vel Lin. Vitelli ovorum in jusculis; Decocta Gelatinosa ex Raf. Eboris, C. C. Rad. Scorzon. Clyster. ex Lacte, aut ex Decocto Flor. Verbasci, Sambuci, Linariæ parati cum pluribus vitellis ovorum & Terebinthina in his soluta.
- 3 Dolorificas fibrarum intestinalium convulsiones demulcentia, Anodyna, Theriaca Androm. Ther. celest. M. P. de Cynogl. Pil. wildegans. Pil. antidysent. VValdschm. Laud. cydon. Langelotti, item Carminativa v. g. Decoct. Sem. Carvi calide haustum: tandem Sacculi, Fomenta, Cataplasmata, Linimenta & Epithemata calida ac nervina, v. g. Balf. Scherzerian. umbilico & scrobiculo cordis inunctum, Spir. Vin. Camphoratus cum linteis toti abdomini impositus, Empl. de Crufta panis cum Ol. dest. Macis & Menthæ. vel stomachico Cratonis malaxatum, vel Emplastrum de Tacamahac, Balsam. Peruv. saturatum & regioni epigastricæ atque umbilicali applicitum, sacculo calente ex avena ustulata desuper imposito.
- 4 Tonum Ventriculi & intestinorum roborantia: Vinum generosum Tragææ stomachicæ ex frusto panis similaginei tosto, pulvere aromatico consperso, & Vino Hungariensi vel Canariensi irrorato; item fructus Sorbi majoris exsiccati, Miva Cydoniorum, & alia Cydoniata, item Cinamomum masticatum & deglutitum.
- 5 Specifica Hepar. Serpent. Priapus Cervi, Smaragd. præp. Crûor. lepor. exsic. & quæ nuperius famam affecuta sunt, Radix Ipecacuanhæ, & Cortex Chacarillæ.
- 6 Externa: Theriaca, Emplastra, Balsama, Sacculi, Epithemata &c.

## Formula. Remediorum.

- 1 Pulvis laxans.
  - Rx. Rhab. elect. ℥ij. D. pro 1. dosi.
  - 2 Alius.
    - Rx. Rhab. elect. ℥ij. D. ut antea.
    - Nitr. ℥ss. M.
  - 3 Pulvis emeticus:
    - Rx. Rad. ipecac. ℥ss. D. ut antea.
  - 4 Bolus emeticus.
    - Rx. Conf. rosar. ℥j. Sir. Fl. persic. q. s.
    - Pulv. ipecac. gr. xxvj. M. F. Bolus.
  - 5 Pil. laxantes.
    - Rx. Pil. polychr. ℥j. D. 15. 20. mane.
  - 6 Potiuncula diapnoico-temperans.
    - Rx. Aq. Card. Bened. Nitr. depur. ℥ss.
    - Flor. acac. a. ℥ij. Sacch. perlat. ℥ij.
    - ℥. diaph. D. sing. 2. vel 3. horis cochl.
    - Lap. ℥. a. ℥ij.
  - 7 Potio diapnoico anodyna.
    - Rx. Aq. Menth. Theriac. Androm. ℥ss.
    - Meliss. a. ℥ij. Antimon. diaph.
    - Mastich. ℥j. Matr. perl. a. ℥ss.

- Sir. Papav. rhæad. M. D. versus vespem singulis 2. vel 3. horis 2. cochl.
- ℥ss.
- 8 Pulvis diapnoico sistens.
- Rx. Antimon. diaph. Theriac. cel. gr. iij. M.
- Lap. ℥. D. a meridie sing. 4. horis
- Pulv. Chacarill. a. ℥j. 2. cusp. cult.
- 9 Pilulæ anodyno adstringentes.
- Rx. Extract. Torment. ℥ss. F. Pil. ad pond. gr. j.
- Ther. celest. D. vesperti 6. vel 8.
- L. O. a. gr. iij. M.
- 10 Balsamum Stomachicum.
- Rx. 〇〇 N. M. expr. ℥ss. Tacamah. a. ℥ss.
- ℥t. Absint. Caryoph. gr. vj.
- Menth. Balsam. Peruv. ℥j. M.

## II Aliud.

- Rx. Mastich. Irror. 〇〇 ℥t. Caryoph.
- Tacamah. a. q. s. f. Empl. Applicetur abdomini.
- 12 Emplastrum roborans.
- Rx. Empl. de crust. pan. Malax. 〇〇 dest. Menth. 〇
- ℥j. stomach. Crat. q. s.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Cum in hoc affectu materia corrupta intestina stimulans eaque præter naturam afficiens potissima sit causa, ad eam removendam tutissimum & multiplici experientia probatum Rhabarbarum & quidem in substantia magis, quam alio modo alteratum, tempore matutino exhibeatur, & spatio aliquot dierum continuetur.
- 2 Si materia corrupta ex fructibus horræis vel Diætâ incondita nata in primis viis hæret, ea quantocius eliminanda est, id quod præ cæteris præstat Ipecacuanha, cui præter vim emeticam specifica adhuc antidysenterica virtus a multis Recentioribus adscribitur.
- 3 Vesperi subjungatur usus Anodynæ alicujus selectioris v. g. Theriac. Androm. ℥j. idque ad mentem Sydenhamii etiam postero die repetatur. Vel exhibeantur mane Pilulæ Balsamicæ & binæ doses Pulv. chacarillæ ℥ss. idque eodem die adhuc semel repetatur a meridie. Proximo die denuo dosis Pilul. Balsam. & binæ doses Pulv. Chacarillæ. assumentur, quod raro ultra tertiam vicem repetendum erit.
- 4 Mitescente sensim dolorum ferocia, dejectionumque frequentia, ac redeuntibus paulatim viribus, potest ad roborandum Ventriculum subadstringentium ex sorbis vel cydoniis usus esse, non tamen absoluta necessitas.
- 5 Cum Dysentericæ semper jungantur commotiones febriles, inpr. si a contagio orta est, ad expellendas particulas acres lenia alexipharmaca, uti Ess. alexiph. D. Stahlî, & diaphoretica fixa cum regimine moderatæ diaphoreticæ ægrotis exhibeantur.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Vomitorium si adhibere consultum videatur, fiat hoc viribus constantibus, in initio morbi & ubi iusta cruditas in Ventriculo hospitantium suspicio subest.
- 2 Pertinet huc specificum istud decantatum Rad. Ipecac. quod non solum pro hac intentione, sed etiam in allegatis circumstantiis commodissime datur: contra vero in malo provectiori, & præsertim ubi Febris inflammatoria jam valde invaluit, raro voto & expectationi satisfacit.
- 3 Inter Purgantia Scammoniata & Aloetica, præprimis largiora exulent.
- 4 Nitrosa cum Absorbentibus data non solum sine damno, sed etiam cum eximio levamine inter initia exhiberi possunt: at vero in malo provectiore & graviore, ubi non injusta ulcerationis intestinorum præsentis suspicio adest; præstat ab iis abstinuisse.
- 5 Anodyna five Opiata non adhibeantur, nisi viribus nondum exhaustis, cum Alexipharmacis five lenibus diaphoreticis juncta, & potissimum circa tempus consuetum somni, intempestive enim data sphaecelum inducunt.
- 6 Adstringentia in malo, mox a primo impetu graviore, & citra materialem causam, ex nudo contagio coorto, aut altius jam radicato, præprimis vero febris



febri evidentiore stipato, certissime noxia, imo in hoc morbo plane non sunt necessaria.

- 7 Ægrotus ob frequenter, surgendi necessitatem, & hinc refrigerationis facillimam occasionem, vestimentis laxioribus ( *mit einem Schlaff-Rock* ) & tibialibus indutus, decumbat. Sellæ foricariæ aqua calida supponatur.
- 8 Omnis refrigeratio nocet & exasperat malum: calor vero, si minus totum malum directe, certe tamen impetum ejus minuit & mitigat.
- 9 Quieta corporis continentia lenit & placat; agitatio auget incommoda.
- 10 Potus quilibet fovet ad minimum, communissime vero exasperat malum, idque tanto certius, quo magis frigidus.
- 11 Præstat tamen legitimo febris complicatæ decursui per sufficientis potus subministrationem, etiam cum aliquali fluxus præjudicio consulere, quam cum febris præjudicio fluxui per adstringentia obistere. Calidus tamen sit potus, v. g. Decoctum Carvi, jussula cum ovo.
- 12 Moderatus potus vini, imprimis generosioris, morbo huic non modo non obesse, sed familiariter, etiam si febris complicata sit, prodèsse observatur. Reliqua Vid. *Tab. de Febre Dysenterica*.

## CAPUT DECIMUM TERTIUM.

### D E

#### Incontinentia Urinæ.

I. *Definitio.* Incontinentia Urinæ est involuntaria eisdem interdum diu & noctu, interdum vero per intervalla, affligens excretio, vel a sphincteris vesicæ relaxatione aliaque læsione, vel a mala consuetudine dependens.

#### II. Differentia.

##### 1 Ratione causarum.

- 1 Alia a sphincteris relaxatione aliaque læsione originem trahit.
- 2 Alia in dormientibus propter malam solum consuetudinem observatur. Huic adde incontinentiam urinæ ebriorum, qui urinam post præfigurationem mictionis in somno involuntarie emittunt.

##### 2 Ratione temporis excretionis.

- 1 Alia continuo affligit, ita ut urina semper guttatim effluat, ut id contingit in paralytica aliisque sphincteris læsionibus.
- 2 Alia per intervalla contingit, uti in dormientibus propter malam consuetudinem.
- 3 Stillidium urinæ differt a Stranguria in qua quidem urina guttatim sed cum insigni dolore prodit, cum e contra in hoc affectu sine ullo dolore emittatur.

#### III. Signa.

Involuntaria sine ullo doloris sensu contingens excretio, eaque vel continua vel per intervalla repetens.

#### IV. Subjectum.

- 1 Senes & infantes magis quam reliqui, propter fibrarum laxitatem.
- 2 Quibus sphincter vesicæ Paralyti affectus fuit.
- 3 Puerperæ & inpr. primiparæ jam annosiores partum difficilem perpeffæ, aut quibus imperita obstetricantium manus sphincterem læsit.
- 4 Quibus post calculi sectionem sphincter læsus fuit.
- 5 Hæmorrhoidum suppressione laborantes, aut quibus post varia & diuturna molimina Hæmorrhoides non succedunt.
- 6 Diureticis fortioribus tractati (observavimus hoc in femina, quæ post cessationem mensium gravibus in osse sacro affligebatur doloribus: cum vero Medicus eam nephriticam crederet, & hinc Therebinthinata, Juniperina, succinata aliaque in copia ad expellendum calculum præscriberet, tandem Urinæ incontinentia affligebatur. Et quamvis alius Medicus postea dolores hosce moliminibus potius hæmorrhoidalibus quam sabulo ac calculo adscriberet ac per con-

venientia remedia fluxum Hæmorrhoidum provocaret, urinæ tamen incontinentia omnibus remediis irritis ad finem usquæ vitæ durabat.)

7 Ulceribus vesicæ colli fistulosis tam propter causas internas, quam externas violentas laborantes.

8 Apoplexia fortiore afflicti.

#### V. Prognosis.

Stillidium Urinæ in senibus raro curationem admittit.

2 Quo magis inveterata est sphincteris relaxatio, eo difficilius curatur.

3 Si vero adhuc est recens, convenientibus & penetrantibus remediis, quamvis non sine difficultate, cedit.

4 Stillidium urinæ a sphincteris exulceratione, sectione calculi, aut læsione in partu difficili dependens, ferè nunquam plenariam admittit curationem.

5 Involuntaria urinæ excretio in Apoplecticis mortem instantem uspl. indicat. Idem censendum est de eadem emissionem plagas capitis fortiores excipiente.

6 In febribus acutis sine delirio contingens urinæ involuntaria excretio pessima & motus prodromus est.

7 Incontinentia urinæ recens in somno convenientibus tractata remediis equidem sæpe curatur, inveterata vero non raro ad mortem usque durat. Interdum tamen per incrementum annorum subinde sponte cessat, sicut intra annum vigesimum quintum, Ettmüll. ex Timæo.

#### VI. Remedia.

##### 1 Interna.

1 Nervina antepileptica aromatica & adstringentia: Cinnab. Antimonii & nativa, Nux Moschata, Cubebæ, Caryophylli, Cardamomum, Piper, Zingiber, Macis, Rad. Galang. Zedoar Ari, Pimpin. alb. Cort. Citri, Herb. Calaminth. Mastiche, Thus, Gummi Arab. G. Junip. Succinum. Extract. amara Vegetabilium, Essent. Alexiph. Corc. Ont. Rad. Consol. maj. Plantag. Cyperi, Herb. Equiset. Agrimon Flor Hyper. Sem. Agrimon. Hyper. Glandes & earum cupulæ.

2 Specifica: Guttur Galli tostum, tritum & cum vino propinatum ad ʒj. Pulvis erinac i combusti: Tunica interior Ventriculi Gallinarum: Vesica suis vel capræ exsiccata, aut tosta: Vulva suis pulverisata: Ungule porci castrati: Piscis in ventre lucii repertus: Mures exsiccati, aut in butyro eixi: Cerebrum & testiculi leporis exsiccati: Stercus leporis, capræ: Pulvis pulmonis hæditosti: Rana viridis per medium scissa & renibus regioni applicata: Pulvis bufonis in nova olla combusti & in Sacculo collo appensus: Medulla Saxorum: Pulv. prolectiming.

##### 2 Externa.

1 Nervina: Herb. Menthæ, Absinthii, Major. Orig. Thym. Serpill. Rosmar. & Olea destill. dictarum herbarum aliaque aromatica. Succinum, Thus &c.

2 Adstringentia: Rad. Symp. maj. torment. Plantag. Herb. Alchimill. Sanicul. Flor. ros. rubr. Hyperic. Balauft. Thermæ sulphuræ & aluminosæ &c.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis nervinus.

Rx. Nuc. Mosc.	Gutt. Gallin. a. ʒj. M.
Cubeb.	Dof. 2. cusp. cult. sing. 4.
Cardom.	hor. aut ʒj. versus vesperam.
Lap. ʒi.	

##### 2 Alius nervinus & adstringens.

Rx. Thur.	Cardam.
Vesic. apri.	Mac. a. ʒss.
Mastich.	Spec. de hyac. ʒj. M.
Corall. r. ppt.	D. ut antea.
Spod. a. ʒj.	

##### 3 Pulvis pro lectimingis ex Ettmüll.

Rx. Pell. stomach. Gall.	Agrimon.
Mastich.	Lap. ʒi.
Galang. a. ʒj.	Alchimill. ʒ. ʒij.
	Cupul.



*Cupul. gland. ʒij.*  
*Nuc. Myrist. ʒj.*  
*Cinn. combust. ʒj.*

*Sacch. ʒii. M. F. Pulv.*  
*Dof. ʒj. in Aqua Plantagi-*  
*nis.*

## 4 Pulvis Adstringens.

*R. Corall. r. ppt.*  
*Ebor. ust. a. ʒj.*  
*Spec. de Hyac. gr. xviii.*

*Croc. ʒt. Stahlii gr. vj. M.*

*Div. in 6. p. aq.*

*D. sing. 4. hor. dof. j.*

## 5 Mixtura roborans &amp; nervina.

*R. Eff. Alexiph.*  
*Cort. Ont. a. ʒij.*  
*Myrrh.*

*Castor. ʒ. ʒij. M.*

*D. 30. gt. mane & vespere.*

## 9 Alia.

*R. Eff. Ont. ʒij.*  
*Cinnam.*  
*Ambr.*

*Succ. a. ʒj. M.*

*D. ut antea.*

## 7 Balsamum nervinum.

*R. Ol. N. M. expr. ʒj.*  
*dest. Major.*  
*Meliss. a. ʒss.*  
*Succin. gt. viii.*

*Cinnam. gt. iv. M.*

*Applicetur perinaeo bis vel*  
*ter quavis die.*

## 8 Emplastrum nervinum.

*R. Empl. Oxyroc. q. s.*

*Applicetur perinaeo.*

## 9 Suffitus nervinus.

*R. Rad. Cyper. rot.*  
*Angel.*  
*Bistort. a. ʒijj.*  
*L. Rhod. a. ʒij.*  
*Herb. Puleg.*  
*Major. a. mfs.*  
*Thur.*

*Mastich.*

*Styrac. calam.*

*Succin. a. ʒj. M.*

*F. Pulvis grossus carbonibus*  
*injiciendus & perinaeo ex-*  
*ciendus.*

## 10 Spiritus nervinus.

*R. Spir. Vin. camph.*  
*Lumb. terrest.*  
*Aq. Reg. Hung. a. ʒss.*  
*Ess. Croci.*

*Castor. a. ʒj.*

*Ol. dest. N. M. gt. vi. M.*

*Applicetur perinaeo.*

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Alvus in hoc morbo laxa servetur, cui fini præceteris inservit Rhabarbarum.
- 2 Postea in relaxatione sphincteris exhibeantur Nervina interna, tonum relaxatum sensim sensimque restituentia.
- 3 Hisce vel interponantur vel subjungantur ad majorem stricturam sphincteri conciliandam Adstringentia leniora.
- 4 Horum usui jungantur Mixturæ roborantes, præsertim in senibus aut aliis paralytica sphincteris resolutione laborantibus.
- 5 Eodem tempore externe applicentur partim Nervina, partim Adstringentia: ad hunc scopum tendunt, non solum Balsama varia nervina, suffitus & spiritus supra præscripti, sed etiam foci & injectiones in vesicam ex Rad. & Herb. nervinis & adstringentibus parati.
- 6 Si ulcera vesicæ ejusque colli incontinentiæ urinæ sunt causa, Mixturæ ex Essent. alexipharm. Succ. Tinct. ʒii acri, Bals. Peruv. &c interne profunt, externe vero injectiones in Vesicam abstergentes, ut hoc modo ulcus abstergetur & mundum reddatur ac tandem consolidetur.
- 7 Eadem quoque remedia locum habent in sphincteris aliis læsionibus a partu difficili, & calculis: quibus tamen provida Chirurgi manus & instrumenta appropriata jungenda sunt.
- 8 In pueris cura moralis magis quam Medica locum habet, arcendi tamen ii sunt a potu vespertino & nocturno, inpr. vero vino diuretico, ac urinæ missio ante lecti ingressum iis imperanda est. Si vero mictio involuntaria jam degeneravit in consuetudinem & actualis etiam sphincteris laxitas concurrit, remedia nervina & specifica ipsis præscribenda sunt.

## VIII. Cautela Prædicæ

- 1 Omnia fortiora Purgantia, quoniam humores nimium commovent, in hoc affectu fugienda sunt.
- 2 Nervina, volatilia aliaque nimis commoventia ob eandem rationem pariter hic nullum habent usum.
- 3 Adstringentia nisi nervina aliaque convenientia remedia præmissa fuerint, parum habent utilitatis, eorumque usum præsertim in senibus calculosis & puerperis graviora sequuntur mala, inpr. si fortiora fuerint.

- 4 Opiata majorem causantur laxitatem, adeoque non nisi cum damno ægrotis præscribuntur.
- 6 Diuretica fortiora, Terebinthinata, juniperina, fucinata &c. malum augent, adeoque fugienda sunt.
- 6 Puerperæ interna & externa refrigerantia vitent, ne in lochiorum suppressionem incidant.
- 7 In laxitate sphincteris paralytica remedia nervina interna, quam externa, diu continentur, alias nullius sunt usus.
- 8 Clysteres insignem quidem ad referendam alvum habent efficaciam, emollientes tamen fibras relaxando malum augent, quare nervina semper iisdem addantur.
- 9 Curatio in sphincteris relaxatione mature per convenientia instituantur remedia, ne postea medela frustra queratur.

## CAPUT DECIMUMQUARTUM.

D. E.

Diabete.

I. *Definitio* **D**iabete est affectus rarissimus & in Scholis Medicorum nil nisi vel frequentem & copiosam urinæ minus digestæ & tenuis excretionem, vel humorum colliquationem, assumptum potum quantitate superantem, denotat.

II. *Differentia*.

- 1 Alia est, quando potulenta assumpta cito sine ulla, vel admodum pauca alteratione a Massa sanguinea beneficio renum separata & in Vesicam injecta iterum egeruntur: & hanc speciem quidam Diabeten vocant veram.
- 2 Alia est, quam notham vocant, quando humores corporis etiam utiles colliquati & in serum conversi, in magna copia cum corporis emaciatione & virium prostratione, cum urina in insigni & sæpius excedente quantitate excernuntur.
- 3 Liceat hisce accensere etiam illam Diabetes speciem, quam tertiam constitavimus, quando chylus sanguini mixtus cum urina excernitur. Cujus speciei duo exempla vidimus, (Notatu autem digna est observatio in lanione juvene, qui post insignem fatigationem corporis in alvi & urinæ suppressionem incidebat: applicatis externis emollientibus & stimulantibus urina excernebatur prorsus chylosa, & cum alvus clystere aperiretur, eadem materia post excrementa per alvum ejiciebatur, urina colorem naturalem servante: alvo obstructa eadem erat urina, quæ colorem alvo aperta mutabat, atque hæc vicissitudo aliquoties observabatur; quia morbi finis fuerit, nescimus, ægrotus enim ab amicis petebatur & ad locum dissitum transferebatur.)

III. *Signa*.

- 1 Urinæ minus alteratæ & sedimento carentis frequens & copiosa excretio, eaque vel statim post potum assumptum, vel etiam sine eodem in utroque tamen potulenta respectu quantitatis assumptæ longe superans.
- 2 Sapor (in notha scil.) ejusdem (ob resolutam & intermixtam pinguedinem) subdulcis.
- 3 Continuus ad excernendam urinam adeft stimulus, & si eam retinere volunt ægrotantes, lumborum & testium tumor ac tensio & gravitas in Hypochondriis sequitur.
- 4 Insignis debilitas & macies corporis concurrit.
- 5 Sitis hisce jungitur continua cum oris siccitate & ardore interno & exæstuatione sine tamen febre acuta typica.
- 6 Ardorem ac calorem molestum in dorso patiuntur ægroti.
- 7 Ac tandem pinguis urinæ supernatant.

IV. *Subjectum*.

- 1 Interdum hic effectus corripit homines post abusum nimium acidularum.

T

2 Non-



- 2 Nonnunquam vero ob abusum remediorum & in-  
pr. Salium diureticorum quosdam affligit.
- 3 Homines qui succo betulæ, potu spermatis rana-  
rum, Thee, Cydoniis & vino Rhenano abutuntur,  
Etmull. ex variis Authoribus.
- 4 Qui in Febribus inpr. acutis male & incongrua me-  
thodo tractati fuerunt.
- 5 Quibus viscera secretoria infarcta, scirrhusa aut  
alio modo læsa sunt.
- 6 Senes ad Marasum tendentes.

## V. Prognosis.

- 1 Si larga talis urinæ excretio fit cum reliqui cor-  
poris levamine, Naturæ opus est, & hinc nullum  
periculum involvit.
- 2 De cætero omnis Diabetes minus est tuta, & nisi  
mature eidem occurratur debitis remediis, certissi-  
me periculosum habet exitum.
- 3 Quo diutius durat, eo minus curationem admittit.
- 4 Quo magis viscera sunt læsa, eo minus affectus cu-  
ratio speranda est.
- 5 Quo magis corpus contabescit & sitis cum oris  
siccitate urget, eo certius etiam Tabes lethalis me-  
tuenda est.
- 6 Pingua urinæ supernatantia in Diabete magnum  
periculum portendunt.
- 7 Diabete immodicum laborem & nimiam Venerem  
excipiens, utpl. incurabile est malum.
- 8 In senibus periculosior est, quoniam Marasmus eam  
excipit.

## VI. Remedia.

- 1 Laxantia lenia, Rhabarbarum, Folia Sennæ, Ta-  
marindi, Manna, Magnesia, & in robustioribus vi-  
ribus adhuc constantibus, emeticum blandum.
- 2 Temperantia & incrassantia Lapid. ☉. Mater Perl.  
Conchæ præpar. Nitrum, Sperm. Cet. Lactinia,  
Pulmenta, Emulsionem non adeo refrigerantes, Ge-  
lat. C. C. Mastiche, Gummi Arab. Tragacantha,  
Sem. Papav. alb. Lactucæ, Portulacæ, Plantag. suc-  
ci aciduli ribium, Berberum, Ceras. acid. Citri,  
Tinct. Rosar. &c.
- 3 Adstringentia lenia & Anodyna: Corall. r. ppt.  
Croc. ꝑt. ꝑiat. D. Stahl. Tinct. Vitriol. ꝑt.  
Lud. Theriaca, MP. de Cynogl.
- 4 Aperientia lenia: Rad. Bubiæ Tinct. Cichor. Po-  
lyp. Herb. Lingu. Cervin. Epithym. Tart. Vitriol.  
lat. Arcan. duplic. Sal. polychrest. Pil. Stahlianæ,  
Becherianæ &c.
- 5 Tonica: Tinct. ꝑt. Ludov. Eff. adianth. al. cum  
Splene icis & Hepaticis Radic. & Herb. leniter ad-  
stringentibus.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis laxans.

℞. Rhabarb. elect. ʒss. a ʒij. D. pro 1. dosi.

## 2 Alius.

℞. Magnes. alb. ʒij. a ʒj. D. ut antea.

## 3 Potio laxans.

℞. Decoct. Passul. ʒv. Mane Colat. adde.  
Infund. per noct. Mann. elect. ʒj. M.  
Fol. Senn. ʒij. D. pro 1. dosi.

## 4 Alia.

℞. Decoct. Tamarind. Mann. elect. ʒij. M.  
ʒv. D. ut antea.

## 5 Potiuncula temperans.

℞. Aq. Millefol. Conch. citrat. a. ʒss.  
Plantag. ā. ʒij. Sir. acetos. citr. ʒss. M.  
Tart. Vitriolat. D. sing. 2. vel 3. horis.  
Nitr. depur. Coch. ij.

## 6 Pulvis anodyno temperans.

℞. Matr. Perl. Spec. de Hyac. a. gr. xvi.  
Nitr. regener. MP. de Cynogl. gr. iv. M.  
Arcan. dupl. Div. in 4. p. æq. D. sing. 4.  
Corall. r. ppt. a. ʒj. vel 6. hor. dos. j.

## 7 Emulsio temperans.

℞. Amygd. dulc. ʒss. F. l. a. Emulsio.  
Sem. Papav. alb. ʒij. Colat. adde.  
Aq. Scoryon. Matr. Perl. ʒj. Sacch.  
Cichor. ā. ʒij. q. s. M.  
Cinnam f. v. ʒss. D. sing. 2. hor. coch. iij.

## 8 Pulvis anodyno temperans &amp; adstringens.

℞. Conch. citrat. Cror. ꝑt. adstr. gr. xii.  
Tart. Vitriolat. M. P. de Cynogl. gr. iij. M.  
Corall. r. pp. a. ʒj. Div. in 3. p. æq. D. sing. 6.  
Spec. de Hyac. gr. xviii. horis dos. j.

## 9 Infusum aperitivo tonicum.

℞. Rad. Cichor. Hepat. nob.  
Caryophyll. Agrimon. a. mʒs.  
Polyp. Flor. Rosar. r.  
Rub. Tinct. ā. ʒss. Flor. Bellid. ā. p. ij.  
Herb. Capill. ♀. Inc. infund. in Vin. rubr.  
Epithym. ʒv.  
Acetos. D. ʒvj. ter quovis die.

## 10 Tinctura Tonica.

℞. Tinct. ꝑt. Lud. M. D. 30. gt. mane & ve-  
Eff. Adiant. a. ʒij. sper.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In cura Diabetes semper respiciatur ad alvi laxi-  
tatem, quo hoc modo seri fluxus nimius ad renes  
intercipiatur: quare lenia laxantia reliquis reme-  
diis vel præmittantur, vel convenienti tempore  
interponantur. Huic fini inserviunt etiam Clyste-  
res emollientes & carminativi.
- 2 Hisce subjungantur remedia temperantia tam Ab-  
sorbentia, quam Salia neutra ac blanda Acida, par-  
tim ut nimius seri motus ad renes impediatur, par-  
tim ut invalescens sanguinis resolutio & in serum  
conversio præcaveatur.
- 3 Insignem quoque usum hic habent Emulsionem non  
adeo refrigerantes, imprimis vero Gelatinæ variæ  
cum Amygdalis paratæ, quæ & temperant & con-  
sumptionem corporis ac virium defectum impe-  
diunt.
- 4 Temperatis aliquo modo humoribus, ante dictis  
remediis Salinis & Absorbentibus admisceantur le-  
nia Adstringentia, ut pori renum nimis relaxati aut  
dilatati sensim constringantur, & nimia urinæ trans-  
colatio aliquo modo sistatur.
- 5 Ubi vero labe in visceribus secretoriis occurrit, in-  
farctus illorum tollendi sunt per remedia Aperien-  
tia, quæ simul leniter sunt tonica: quibus tempe-  
rantia antea allegata interponantur.
- 6 Tandem in usum trahantur remedia tonica, ut re-  
nes debilitati pristinum recuperent vigorem, quo  
in casu optime convenire videtur Tinct. ꝑt. Lu-  
dov. cum Eff. Adianthi albi remixta.
- 7 Externe regio renum inungatur Ungu. Comitissæ aut  
imponatur Empl. Saponatum Barbettianum.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Purgantia fortiora humores adhuc magis colliquan-  
tia nullius hic sunt usus.
- 2 Abusus Emulsionum & Gelatarum propter me-  
tuendam majorem relaxationem fugiatur.
- 3 Adstringentia fortiora aut alia quoque nimis matu-  
re exhibita, viscerum infarctum & Hydropem pro-  
ducunt, quare vitentur.
- 4 Remedia calida & spirituosa renum confortationi  
dicata, hic exulent, quoniam sanguinem magis re-  
solvunt, affectum augent & Hæticam producant.
- 5 Narcotica nimis præmature data noxia sunt.
- 6 Diabete laborantes fugiant motum corporis nimium,  
Vinum diureticum, Diætam aromaticam & animi  
affectus graviores,

## CAPUT DECIMUMQUINTUM.

## D E

Pollutione nocturna & Gonorrhœa simplici  
sive benigna.

## I. Definitio.

- 1 Pollutione nocturna, est involuntaria seminis ex-  
cretio in somno cum vel sine insomniis vene-  
reis sive lascivis contingens.
- 2 Gonorrhœa simplex autem est itidem involuntaria  
liquoris vel continua, vel successiva ante vel post  
urinæ



urinæ emissionem excretio, a nimia partium semen  
asservantium laxitate dependens.

II. *Differentia.*

- 1 Quomodo Pollutio nocturna & Gonorrhœa inter se differant, ex definitione patet.
- 2 Gonorrhœa simplex a Virulenta distinguitur.
  - 1 Ratione *materiæ excretæ*, quatenus in hac materia solum dilute mucida sine dolore & alba, in virulenta vero varii coloris acris & cum insigni dolore & molestia excernitur.
  - 2 Ratione *quantitatis*: dum in benigna parum, in virulenta vero multum materiæ per genitalia effluit.
  - 3 Ratione *temporis excretionis*: quatenus in virulenta copiosus & continuus, in benigna vero parvus & moderatus & sæpissime cum urina vel ante aut post ejus emissionem est effluxus.
  - 4 Ratione *causarum*: benigna enim utpl. laxitatem tantum, virulenta autem virus venereum pro causa agnoscit.
  - 5 Hisce Gonorrhœæ speciebus adhuc accenseri meretur species illa fluxus seminalis, quam Galli stricte Gonorrhœam, *la Gonorrhée*, appellant, quæ inter utramque medio quasi modo se habet, & vel simplicem inveteratam, vel virulentam utcumque curatam vel mitigatam sequitur, & sæpius ad longum tempus extenditur.

III. *Signa.*

- 1 Pollutionis nocturnæ signa per se patent, quando scil. semen involuntarie in somno excernitur.
- 2 In Gonorrhœa simplici observatur seminis excretio ut plurimum cum urina vel post ejus emissionem, inpr. tempore matutino & hinc in urina multa filamenta alba fundum postmodum petentia & sedimentum album flocculentum constituentia apparent.
- 3 In aliis vero continuus in urethra mador occurrit, aut etiam excretio materiæ aquoso-mucidæ & albæ, sine ullo tamen dolore.
- 4 Huic excretioni jungitur defatigatio corporis aut successiva virium prostratio, quæ inpr. in femoribus & pedibus se exeat.
- 5 Corpus sensim contabescit ac floridus color in pallidum mutatur.
- 6 Appetitus perit, sitis vero sensim sensimque augeatur.
- 7 Animus ob majoris periculi metum est abjectus.

IV. *Subj. Eun.*

- 1 Pollutione nocturna corripuntur sæpius juniores temperamentis sanguinei & sanguineo cholerici, Plethorici, laute viventes, otiosi, cogitationibus lascivis indulgentes, in dorso cubantes; aut etiam in conjugio viventes & sub Diæta lauta diu a Venere abstinentes, vino generoso, aromatibus, rebusque falsis utentes.
- 2 Gonorrhœa autem simplici affliguntur.
  - 1 Qui frequenter pollutiones nocturnas passi sunt.
  - 2 Venere in juniore inpr. ætate, aut etiam in conjugio abutentes.
  - 3 Quibus semen vel copiosum nimis, vel tenue vel acre est.
  - 4 Phlegmatici, alique quorum vesiculæ seminales vel ob naturalem constitutionem, vel ob morbos chronicos atonia laborant.
  - 5 Manustupratores. vid. *Timæus* L. 3. *Caf.* 49.
  - 6 Qui stimulantibus remediis abutuntur.
  - 7 Qui Gonorrhœa virulenta laborarunt.
  - 8 Nimis diu a Venere abstinentes. Vid. *Wedelii Pathol.* pag. 570.
  - 9 Anomalicos motuum hæmorrhoidalium decursus & successus patientes. Vid. *D. Alberti Introd.* p. 340.

V. *Prognosis.*

- 1 Pollutio nocturna rarior periculo caret, sæpius tamen affligens facile in Gonorrhœam degenerat, aut vires tollendo ad corporis consumptionem disponit.
- 2 Gonorrhœa simplex recens facile curatur: inveterata autem sæpius majorem attentionem, quam ipsa virulenta requirit.
- 3 Quæ virulentam sequitur, ob glandulas corruptas semper est difficilioris curationis.

VI. *Remedia.*

- 1 Laxantia lenia: Rhabarb. Magnesia alba, Mercur. dulc. Pilul. Becherianæ, Stahlia. n.
- 2 Massam sanguineam depurantia: Decocta & Essentia ex ligno Sassafr. Guajac. Rad. Chin. Sarsap. Pimp. alb. Lapath. acut. Tinct. Jii, Tartari, Essent. Succini, Alexipharm. &c.
- 3 Temperantia: Nitrum, Tart. Vitriolat. Arcan. duplic. Nitr. Jiat. Emulsiones.
- 4 Lenia adstringentia & Tonica: Os sepiæ, Corall. rubra, Croc. J t. Mixt. Tonica D. Stahlil, Tinct. J t. Ludov.

*Formula Remediorum.*

- 1 Pulvis laxans.  
R. Magnes. alb. Jss. D. pro 1. dos.
- 2 Alius.  
R. Rhabarb. elect. Jj. D. ut antea.
- 3 Bolus laxans.  
R. Conf. rosar. Jij. Sir. flor. Persic. q. s.  
Mercur. dulc. gr. xii. M. F. Bolus.  
Res. jalap. gr. iij.
- 4 Decoctum purificans.  
R. Ras. L. Sassafr. Vincetox.  
Sanct. a. Jij. Lapath. ac. a. Jj.
- 5 Mixture purificans.  
Rad. Chin. Cort. Winter. Jss.  
Sarsap. Incis. Coq. in B. viij. Aq. simpl. ad remanent. B. vj.  
Pimpin. alb.
- 6 Alia.  
R. Tinct. Jii tartarizat. Jss. Myrrh.  
Ess. Pimpin. alb. Bals. Caparb. a. Jj. M.  
Ess. Succin. a. Jij. D. ut antea.
- 7 Pulvis temperans.  
R. Conch. citrat. Cinnab. Jii Jss. M.  
Nitr. depur. D. sing. 5. horis 2. cuspid. cult.
- 8 Emulsio temperans.  
R. Sem. Cannab. Jvj. Colac. Jvj. adde.  
4. frig. mij. a. Jj. Succ. alb. ppt.  
Aq. Nymph. J. diaph. a. Jss.  
Portul. Sacch. q. s. M.  
Millefol. a. q. s. D. sing. 2. hor. cochl. aliquot.
- 9 Pulvis temperans & adstringens.  
R. Nitr. Jiat. Off. sep. a. Jj.  
Arcan. dupl. Spec. de hyac. Jss.  
Cryst. mont. Croc. J t. Jiat. gr. xv. M.  
Corall. r. ppt. D. ut antea.
- 10 Mixture Tonica.  
R. Tinct. Jii ac. D. mane & vesp. 30. 40. gr.  
Spir. C. C. a. Jij. M.
- 11 Alia.  
R. Tinct. J t. Lud. D. ut antea.  
Ess. Adianth. alb. a. Jij.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Curæ initium fiat lenibus laxantibus, quæ etiam postea reliquis interponi possunt: præ ceteris laudari merentur Pilulæ Becherianæ, Stahlia. n. & Balsamica viscerales nobis familiares spatio aliquot dierum usurpatæ & depurantibus interpositæ. Insignem quoque usum habet Magnesia alba ad Jij. mane & vesp. per tres vel quatuor dies data Rhabarbarum quoque optimum est, dum lenem post se relinquit adstrictionem.
- 2 Hisce subjungantur remedia purificantia sive lympham corrigentia, qualia sunt remedia supra allegata, inpr. vero Tincturæ alcalinæ acres, quæ lympham, si spissa est, optime incidunt ac fluxilem reddunt, & simul diuresin promovendo vias abstergunt, adeoque alia metuenda damna præcavent.
- 3 Si minimus etiam ardor aut æstus inter vel post mictionem in radice penis sentitur, temperantia purificantibus interponantur, vel subjungantur: cui fini potissimum inserviunt Nitrosa.
- 4 Tandem in usum trahantur selecta Adstringentia & Tonica, ut horum ope partes relaxatæ aliquo modo



do constringantur, & uberior affluxus impediatur.

### VIII. *Cautela Præctica.*

- 1 Omnia Purgantia acria nimium stimulantia aut humores colliquantia hic nullius sunt usus, quare etiam Merc. dulc. & Jalapa cum debitis cautelis ægrotis exhibeantur.
- 2 Si in tali casu subiecta sunt Plethorica V. S. locum habet, ubi vero corpus jam per nimium fluxum debilitatum est, optime ea omittitur.
- 3 Omnia balsamica fortiora atque nimis diuretica, humores ad partes genitales pellendo affectum & affluxum feminis augent, & hinc fugienda sunt; quorum præcipue Cantharides pertinent, quæ tantopere a quibusdam tam in benigna, quam in virulenta laudantur Gonorrhœa.
- 4 In subiectis Plethoricis & Cholericis eo magis hæc regula observanda est, imo ipsa etiam Lignorum Decocta atque Essentiæ non nisi caute sunt exhibenda.
- 5 In Temperantium quoque usu justæ observandæ sunt cautelæ, ne quod excerni debet, per Nitrosa nimium incrassetur, aut per Emulsiones aliaque corrigentia, simul tamen emollientia, viæ magis, quam par est, relaxentur.
- 6 Adstringentia, nisi sufficiens præcesserit humorum correctio, in usum non trahantur, ne tumores testium sequantur, aut ex benigna maligna, sive virulenta fiat Gonorrhœa.
- 7 Si corpora sunt Plethorica, Diætâ tenuis prodest; sin vero malum a nimia venere dependet, abstinentia est optimum remedium: hæc enim nisi observetur, malum hocce vel in tabem dorsalem, Hæcticæ speciem, vel interdum in impotentiam degenerat.
- 8 Si Gonorrhœa simplex virulentam sequitur, omnia remedia, inpr. Abstergentia & Balsamica consolidantia diu continentur, alias irrita sunt omnia.
- 9 Præstat Os sepiæ minoribus & repetitis dosibus, quam majoribus dare.
- 10 Secretiones & Excretiones, inpr. vero alvum apertam esse in hoc morbo optimum est, quare Medicus ad alvi apertionem maxime attendere debet, Reliqua vide de *Gonorrhœa Virulenta*.

## CAPUT DECIMUM SEXTUM.

### DE

#### *Fluore albo simplici.*

I. *Definitio.* **F**luor albus est materiæ mucidæ albæ e partibus mulierum genitalibus, vel periodica vel vaga, interdum vero continua, excepto mensium tempore, excretio.

#### II. *Differentia.*

- 1 Alius certas observat periodos, dum vel ante, vel post mensium fluxum feminas corripit.
- 2 Alius nullis certis sed modo his, modo illis contingit temporibus.
- 3 Alius continuo durat, sine ullis tamen Luis Venereæ indiciiis. Talem observavimus in femina gravida: hæc febre continua, tum temporis epidemice grassante, corripiebatur, quarto vel quinto circiter graviditatis mense: cessante febre adeo copiosus sequebatur fluor albus, ut quovis die aliquoties industria mutare cogeretur: hic fluxus varii coloris usque ad partum continuo durabat, ubi post tres vel quatuor Pilularum Stahlianarum doses plenarie cessabat.
- 4 Differt a virulento sive Gonorrhœa.
  - 1 Ratione *fluxus* quatenus in virulento materiæ hæcce continuo & etiam non gravidis cum mensibus ipsis fluit.
  - 2 Ratione *coloris*: in virulento enim ordinarie mucus vario tinctus est colore, in benigno autem albus & mucidus est.
  - 3 Ratione *acrimoniæ*: quæ in virulento tanta est, ut non solum vaginæ glandulas erodat aliasque partes, sed etiam partes externas vicinas, cum econtra in benigno nihil tale observetur.

### III. *Signa.*

- 1 Effluxus materiæ albæ, limpidæ & aliquo modo mucosæ.
- 2 Ordinarie excretio hæc contingit ante mensium eruptionem & post eorum fluxum: si vero simul cum istis & continuo fluit materia mucosa, venerei quid subest.
- 3 Ubi malum inveteratum est, fluxus hicce toto intermedio tempore observatur, & simul menses sensim sensimque imminuuntur, ita ut cessantibus mensibus postea mucus continuo fluat.
- 4 Nulla tamen in excreta materiâ deprehenditur acrimonia, nec hinc etiam genitalia lædit, nisi fortior sub corporis motu genitalium attritus concurrat.
- 5 Instantibus mensibus, ubi ordinarie magis affligere solet hic fluxus, feminæ in lumbis & osse sacro insignes dolores urentes & tendentes cum corporis & inpr. partium inferiorum fatigatione sentiunt.

### IV. *Subiectum.*

- 1 Feminæ annosiores circa ultimum mensium terminum, aut post plenariam eorum cessationem.
- 2 Hisce succedunt feminæ mensium fluxu inordinato & non sufficiente laborantes.
- 3 Viduæ, vel ob turbatum mensium fluxum, vel ob fortiores cogitationes venereas.
- 4 Virgines insigniter phlegmaticæ & ad venerem pronæ, sed rarius. Talem fluorem album observavimus in puella 10. annorum, qui post varia usurpata remedia apparentibus anno duodecimo mensibus plenarie cessabat. Imo in infante duorum annorum cum dimidio fluorem album vidimus.

### V. *Prognosis.*

- 1 Fluor albus simplex quidem ordinarie videtur esse malum, unde etiam benigni accepit nomen, respectu tamen curationis sæpius est admodum rebellis & non nisi cum magna difficultate curatur.
- 2 Quo magis inveteratus est fluor albus, eo difficilius curationem admittit.
- 3 Quo magis libidinosæ sunt feminæ fluore albo laborantes, eo minor promptæ curationis spes est.
- 4 Fluor albus sponte cessans vel imprudenter suppressus, graves utpl. post se trahit affectus arthriticos. (Vidimus hocce in femina sexagenaria: hæc dolore in lumbis & osse sacro sensim sensimque ingravescente & femora simul afficiente affligebatur, adeo ut per plures annos ambulare nequiret: suadebantur a Medicis varia resolventia, opiata, Acidulæ, Thermae unguenta, Emplastra &c. sed omnia frustra. Vocatus aliquoties ad eam in antecedentia inquirebam: ac Tincturas quasdam alcalinas præscribebam, incertus tamen adhuc a quam causa proveniret rebellis hæc affectus. Tandem cum urinam accuratius examinarem deprehendebam in urina sedimentum album mucidum, sed in exigua tamen quantitate; quærebam E. ex ægrota, an unquam fluore albo laboraverit? & cum illa quid fluor albus sit nesciret, mutata quæstione eam interrogabam, an mucum quandam ex utero exeuntem senserit? Respondebat se eodem fluxu versus ultimum mensium terminum & post eorum cessationem laborasse: ulterius interrogata, num post hujus fluxus imminutionem dolores quosdam senserit? affirmabat se eosdem in pedibus & dorso sensisse. De causa E. certus Tincturas alcalinas continuabam, quibus Pilulas Becherianas jungebam: & cum horum usum spatio aliquot mensium continuarem, semper major muci copia cum urina excernebatur, dolores vero sensim sensimque imminuebantur, ita ut sola baculo tamen suffulta, templum ingredi posset. Cum vero anno sequente eodem affectu corriperebatur & remediis a Medico acceptis uteretur, Hætica moriebatur.)
- 5 Etiam si fluor albus interdum plane curatus videatur, facile tamen eodem feminæ iterum corripuntur.
- 6 Fluor albus inveteratus feminas tandem reddit steriles.
- 7 Idem fluxus imprudenter suppressus aut male curatus, concurrente simul malo regimine in humidioribus interdum cachexiam, Oedemata, Hydropem, in siccioribus vero Hæticam post se trahit.



8 Fluor albus cessationem mensium excipiens semper difficilius est curationis & interdum nullis prorsus cedit remediis.

9 Procidencia uteri interdum fluxum hunc immodicum & inveteratum sequitur.

## VI. Remedia.

1 Venæ Sectio revulsoria in pede, scarificationes in subjectis Plethoricis & sanguinis evacuationibus asuetis.

2 Incidentia & Resolventia: Rad. Angelic. Ari, Imperator. Helen. Galang. Zedoar. Pimpin. alb. Vincetox. Levist. Herb. Matricar. Meliss. Artemis. O-rigan. Scord. Marrub. Fol. Lauri. Flor. Chamom. Galeops. Cent. min. Sem. Anisi, Daucis, Baccæ Lauri, Juniperi. Gumm. Amoniac. Junip. Hederæ, Galb. Sagapen. Terebinthina cocta, Mastiche, Myrrha, Succinum, Salia fixa & neutra. Absorbentia &c. Tinct. Gii. Tartari. Ess. Sacc. Myrrh. Pimpinell. alb.

3 Evacuantia: Rad. Rhabarb. Helleb. nigr. Jalap. Mechoac. Fol. Senn. S. S. Agaric. Merc. dulc. Pilul. Becher. Stahlianæ, de Ammon. Quercet.

4 Discutientia & Tonica: suffitus ex Mastiche Olibano, Tacamah. Succino, Herb. Thym. Serpill. Antimon. &c. Rad. Cyper. rot. Galang. Zedoar. Ari, Cost. ver. Herb. Rosmar. Puleg. Pol. montan. O-rigan. Thymi, Cort. Citri, Ont. Cinnamom. Sem. Carminativa. L. Aloes, Mixt. Tonic. Tinct. St. Ludov. Croc. St. Giat. Ess. L. Aloes. Adianth. alb. Millefol. &c.

## Formula Remediorum.

## 1 Infusum incidens.

Rx. Rad. Imperat. Fol. Lauri a. mss. 1  
Angel. Fl. Anthr. a. 1  
Pimpin. a. 3ij. Galeops. a. p. 1ij.  
Zedoar. Bacc. Laur.  
Ari. a. 3iss. Cort. Ont. a. 3ij.  
Herb. Meliss. Incis. infund. in Vin. 15. 3ij.  
Origan. vel iv. D. ter quovis die  
Hyssop. 3iv. vel vj.

## 2 Pulvis incidens.

Rx. Pulv. stomach. Birkm. D. sing. 4. horis 2. cuspid.  
3ss. cultri.

## 3 Mixture resolvens.

Rx. Tinct. Gii. acr. 3ij. Succin. a. 3j. M.  
Essent. Pimp. alb. D. ter quovis die gt. 30.

## 4 Alia.

Rx. Tinct. Tart. Myrrh. 3j. M.  
Ess. Succin. a. 3ij. D. ut antea.

## 5 Infusum resolvens &amp; laxans.

Rx. Rad. Gentian. Fibr. bell. nigr. 3ij.  
Bryon. Cortic. Ont. 1  
Calam. arom. a. 3ij. Cinnam. ac.  
Summit. cen. min. Sal. Tart. a. 3ij.  
Card. bened. a. mj. Incis. affund. Aq. fervent. 15.  
Fol. Senn. S. S. 3j. Chir. alb. 15. 3ij.

## 6 Pilulæ laxantes.

Rx. Pil. Becher. 3ss. D. vesp. 15. vel 20.

## 7 Mixture roborans.

Rx. Tinct. Gii. acr. 3ij. D. mane & vesp. 30. gt.  
Spir. C. C. a. 3ij. M.

## 8 Alia.

Rx. Tinct. St. Lud. D. ut antea  
Ess. L. aloes a. 3ij. M.

## 9 Infusum roborans.

Rx. Rad. Cyper. rot. L. Aloes.  
Cost. ver. Cort. Ont.

## 10 Species pro Balneo.

Rx. Herb. Chamom. Puleg.  
Rosmar. Pol. montan. a. m. iv.

## 11 Species pro Balneo.

Rx. Salv. Coq. in 1/2 q. Aqu. f.  
Orig.

## VII. Methodus medendi.

1 Cum in Fluore albo status utpl. adfit humorum cacochymicus eo semper respiciendum est, ut hic, quantum quidem possibile est, tollatur, cui fini potissimum inserviunt omnia incidentia, mucum crassorem & acriorem resolventia & temperantia, quod inpr. præstant remedia superius laudata.

2 Si vero status adest Plethoricus, aut subjecta ad sanguinis missiones jam prona sunt, ventilationes sanguinis maxime sunt necessariae, tales præcipue, quæ sanguinis nimium ad uterum affluxum impediunt, & eum ad alia loca derivant, uti sunt Venæ Sectiones & Scarificationes in pedibus.

3 Antea dictis remediis incidentibus & resolventibus, vel præmittantur & postea supponantur, vel, quod melius est simul jungantur remedia laxantia convenientia humores correctos evacuantia. Potissimam autem hoc loco merentur laudem Pilulæ Becherianæ veræ & Stahlianæ, quæ solæ legitime usurpatæ & continuatæ chronicum hunc affectum sæpius tollunt. Optimæ quoque sunt Pil. de Ammon. utpote quæ & resolvunt & evacuant.

4 Correcta & evacuata materia in usum trahantur remedia tonica, ut hoc modo fibris roboratis & poris constrictis, nimius ad partes uteri humorum affluxus inhibeantur & sensim immoderatus atque intempestivus effluxus coerceatur.

## VIII. Cautela Practicæ.

1 Quoad resolventia & Incidentia respectu Temperamentorum merito cautus instituendus est selectus, ita ut ea, quæ proficua sunt, unicuique præscribantur.

2 Phleomaticis E. præscribantur magis calida resolventia cum aromaticis, eorum constitutioni magis convenientibus. Cholericis vero & siccioribus temperata magis, uti sunt Rad. Cichor. Polypod. Tarax. Herb. capillares &c.

3 Si suspicio est labis cujusdam in viscere & quidem præcipue in Hepate, hæc ultima temperata locum quoque habent, videntur tamen nimis acria & calida, vel pariori saltem dosi reliquis admisceantur.

4 In genere omnibus Fluore hoc laborantibus convenit usus remedium continuatus, & urgente necessitate repetitus, qui si negligitur, Medicus utpl. omnem perdit operam.

5 Resolventia nimis acria & inpr. Cantharidēs, quas quidam in hoc affectu curando commendant, merito suspecta sunt.

6 Multa quidem a mulierculis & Medicis quoque tanquam specifica laudantur in hoc affectu, quæ tamen speratum effectum non edunt. Duas nihilominus novimus feminas, quæ omnibus aliis irritis in solo Decocto Flor. Chamom. & Galeops. cum vino parato paucis diebus a chronico hoc malo liberatæ fuerunt.

7 Adstringentia & Tonicam nisi præmissis præparantibus & evacuantibus in usum trahantur: hoc enim neglecto facile humorum sunt translationes ad alia loca & graviora mala sequuntur.

8 Suffitus ex Antimonio non semper tutus est in subjectis inpr. sensibilibus, novimus feminam exinde lipothymiis ac postea vertigine graviori correptam.

9 Aer frigidus & humidus humores dincassans, cibi difficilius digestionis, tristitia, veneris abusus, lascivæ cogitationes ac motus immoderatus fugiantur.

10 Utrum Pulvis Dolæ (ex Test. Ovov. calcinat. 3ss, Vatriol. St. a gr. vj. ad 3ss. etiam iudungit Camph. gr. iij. L. Q. gr. j. Sacchari Saturni. gr. v.) tantæ sit efficacis, ut eo solo malum, nisi aliud quid obstat, quod eus curationem impedit, certe tolli possit, experientia docebit.



## CAPUT XVII.

D E

## Sudore Nimo.

I. *Definitio*: Sudor nimius est humorum aquoso halitusorum ac Sulphureo Salinorum superflua eaque vel continua, vel certas periodos observans excretio, cum insigni virium lapsu juncta.

II. *Differentia*.

- 1 Alius est *naturalis*, qui homines Plethoricos humidioris temperamenti post leves etiam corporis commotiones affligit.
- 2 Alius *medio modo* se habet: qualis potissimum est sudor autocraticus, quem Natura in hominibus quoad cætera sanis versus matutinum tempus instituit & a multis morbis præservat.
- 3 Alius est *mare præternaturalis*, qui aliis morbis superveniens eos graviores reddit, uti est sudor colliquativus Hæticorum.

III. *Sig. a.*

- 1 In *naturali*, laxa corporis constitutio, pori ampliores & copiosa sudoris post quemvis laborem & motum corporis excretio, cum aliquali fatigatione.

2 In *avocratio*.

- 1 Præcedunt eum variae in quibusdam inquietudines somnum turbantes: ut & insomnia de magnis laboribus corpus insigniter fatigantibus.

- 2 Hæc utpl. sequitur pulsus cordis auctus.

- 3 In nonnullis observatur aliqua oppletio pectoris, respirationem aliquatenus difficilem reddens.

- 4 Sub hoc ipso pulsu aucto nihilominus in partibus exterioribus nulla relaxatio, sed potius aliqualis constrictio observatur.

- 5 Tandem lenis sentitur calor in partibus externis ab intra extrorsum vergens, & sub cute magis vel minus urens.

- 6 Hanc immediate excipit habitus corporis relaxatio, & sudor primo in pedibus, sed moderate, postea vero in femoribus, abdomine, pectore ac tandem ultimo loco in capite erumpit.

- 7 Augetur postea sudoris excretio, ut instar rivulorum a corpore defluat.

- 8 Tandem sudore declinante placidus ingruit somnus atque hoc ipso sudor cessat.

- 9 Observatur hic sudor potissimum circa æquinoctia & potissimum autumnalem versus diluculum.

- 10 Duratio ejus est inæqualis pro subjectorum diversitate; in aliis enim citius, in aliis tardius finitur.

- 11 Homines electo surgentes insignem sentiunt in soluto corpore alacritatem.

3 In *præternaturali* & quidem

- 1 Hætico, sudor primo lenis, postmodum vero sensim invalescens, & per intervalla repetens, ultimo vero loco continuo cum summa virium prostratione affligens.

- 2 Febrili, ubi præter morbi interdum indolem nimius erumpit sudor vires maxime frangens,

IV. *Subjectum*.

- 1 Homines Plethorici Temperamenti sanguinis Phlegmatici, habitus corporis spongiosi, laete viventes, somno & potu abutentes.

- 2 Venæ Sectiones, scarificationes ac alias evacuationes consuetas negligentes.

- 3 Homines ætatis consistentis magis, quam juniores.

- 4 Viri præ Feminis.

- 5 Varia molimina hæmorrhoidalia, sed frustanea passi.

- 6 Ad affectus varios rheumaticos proni.

- 7 Hæctici & Febricitantes.

V. *Prognosis*.

- 1 Sudor nimius etsi vires quoque aliquo modo frangat, nullum tamen insigne portendi periculum.

- 2 Quo magis homines ad sudores sunt dispositi, eo facilius etiam a morbis, qui alias per sudores solvi solent, liberantur.

- 3 Uti sudores spontanei multos morbos præcavent, ita etiam suppressi vel neglecti non paucos eosque graves producant.

- 4 Sudores post febres inpr. diuturnas, si reliqua consentiant, sunt admodum salutares.

- 5 Sudores autocraticos suppressos pressio sæpius pede affectus rheumatici & anhrítico-spastici; in aliis vero varii affectus cutanei: in aliis, ubi humorum translationes ad interiora fiunt, Tusses graviores, Asthma, Febres, inflammationes &c. sequuntur.

- 6 Sudores Hæticorum colliquativi pessimi sunt & brevi tempore ad mortem ducunt.

- 7 Sudores Febricitantium excedentes non raro labem visceris pro causa agnoscunt, & Hæctiam post se trahunt.

VI. *Remedia*.

- 1 Vemperantia, Absorbentia acidis saturata, Nitro-sa, Salia neutra, Nitr. depur. Arcan. duplic. Tart. Vitriolat. Conch. citr. &c.

- 2 Lenia diaphoretica fixa hisce sociata: ꝯ. diaph. Bezoard, min. &c. aut etiam Mixt. alexipharmaca acidis mitigata.

- 3 Blanda laxantia cum diuretis mixta: Rad. aperient. Cichor. Tarax. Herb. Capill. ꝯ. &c.

- 4 Tonica sæpius laudata: Tinct. ꝯ. Lud. &c.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis temperans.

- Rx. Arcan. dupl. Div. in 6. p. æq.  
Nitr. depur. a. ʒj. D. sing. 4. hor. dos. j.  
Cinnab. ʒij gr. xviii. M.

## 2 Pulvis temperans &amp; anodynus.

- Rx. Tart. Vitriolat. M. P. de cynogl. gr. iij. M.  
Conch. citr. Divid. in 3. p. æq. D. vesp.  
Nitr. depur. a. ʒj. dos. j.  
Spec. de Hyac. gr. xii.

## 3 Pulvis temperans &amp; diaphoreticus.

- Rx. ꝯ. diaph. Cinnab. ʒij gr. xvij. M.  
Arcan. dupl. Div. in 6. p. æq.  
Conch. citrat. a. ʒij.

## 4 Potiuncula diaphoretico temperans.

- Rx. Aq. scabios. ʒij. Sir. ceras. acid. ʒss. M.  
C.C. citr. ʒj. D. durante sudore sing. 2.  
Su c. citr. rec. ʒij. horis cochl. ij.  
Ess. alexiph. ʒiss.

## 5 Infusum laxans.

- Rx. Radic. Cichor. Rhub. elect.  
Tarax. Tat. solub. a. ʒij.  
Polyp. Inc. infund. in Vin. ꝯ. Aq.  
Onon. a. ʒij. aa. ʒ. j. vel ʒ. iss D.  
Herb. Capill. ꝯ. miss. mane ʒvj. vel viij.  
Fol. Senn. S. S. ʒvj.

## 6 Tinctura Tonica.

- Rx. Tinct. ꝯ. ʒj. D. mane ꝯ. vesp. gr. 40.

VII. *Methodus medendi*.

- 1 Sudor excedens in subjectis ad excretionem periphericam alias dispositis, magis semper promovendus, quam coercendus est, cui fini potissimum inserviunt antea allegata remedia temperantia & diaphoretica fixa.

- 2 Potus sufficiens, diluens & præcipue calidus, hinc maxime quoque, sudoris placidam excretionem promovendo, prodest.

- 3 Nec nimis etiam Emulsionem temperantes lenibus diaphoreticis junctæ, insignem habent usum.

- 4 Acida temperata alexipharmacis lenibus sociata, nimiam humorum resolutionem impediunt, simul tamen Naturæ, excretionem per sudorem molientis, scopum minime invertunt, sed promoventia insignis hic sunt efficaciz.

- 5 Lenia anodyna temperantibus & Gemmatis remediis comode quoque admiscuntur & circa lecti ingressum exhibentur.

- 6 Alvi libertas per lenia laxantia conservetur, hæc enim multum ad sudoris imminutionem contribuit.

- 7 Venæ sectiones versus æquinoctia ad præcavendos sudores nimios instituantur.

- 8 Tandem Tonica in usum trahantur & inpr. Tinct. ꝯ. Ludov. quæ & temperat & leniter adstringit.



VIII. *Cautela Practica.*

- 1 Sudores spontanei Adstringentibus nunquam supprimantur, ne graviores supra indigitati affectus sequantur.
- 2 Narcotica & Opiata minus correctâ hic merito quoque suspecta sunt, quatenus motus nimium sopiendo, excretionem sudoris, quam Natura intendit, impediunt: Satiâ E. est, ea legitime correctâ temperantibus admiscere,
- 3 Motus moderatus uti placidam excretionem sudoris promovet, ita auctus eandem auget, & hinc fugiendus est.
- 4 Abusus quoque Vini omniumque sanguinem nimis attenuantium vitetur.
- 5 Qui sudoribus auctoritatis afficiuntur, nunquam nisi iisdem finitis e lecto surgant, nec etiam post eos corpus statim frigori externo exponant.
- 6 Potius calidus sudores spontaneos optime promovet, frigidus vero eosdem retardat, quare fugiatur.
- 7 Si lenia temperantia emulsiva ac gelatinosa sudores Hecticorum non mitigant, res conclamata est: opiata & adstringentia in hoc casu mortem accelerant.

## S E C T I O II.

## D E

CONGESTIONIBUS ET SUPPRESSIO-  
NIBUS FLUXUUM SERI.

## C A P U T P R I M U M .

*De Gravedine & Dolor Capitis  
Catarrhali.*I. *Definitio.*

- 1 **G**ravedo est species catarrhi a congestione feri ad nares & partes vicinas facta, ob minus succedentem ejusdem feri excretionem multa accidentia molesta juncta habens.
- 2 Dolor capitis catarrhalis est species Cephalalgiae a congestione sanguinis serosi & hinc feri secessione ortum trahens.

II. *Differentia.*

- 1 A Coryza, ubi materia mucosa cum sternutatione excernitur, in Gravedine vero & Cephalalgia catarrhali retinetur.
- 2 Gravedo & Dolor Capitis catarrhalis gradu & loco affecto differunt, quatenus illa ordinarie infirmam frontis partem circa radicem nasi, Cephalalgia vero serosa plures capitis partes & aliquo modo gravius simul occupat.

III. *Signa.*1 *Gravedinis.*

- 1 Sensus rei tendentis & prementis in inferiore frontis parte supra radicem nasi.
- 2 Cui jungitur dolor capitis obrusus & stupor, in aliis vero satis sensibilis & pungens, inpr. in Syncipite.
- 3 Supra oculos & in postica eorum parte sentiunt Gravedine affecti insignem pressionem, ac si pondere quoniam extrorsum urgente premerentur.
- 4 Ipsi etiam oculi ad visionem torpidi sunt, interdum multo & copioso sero irrigantur, ac lucem ferre nequeunt.
- 5 Somnolentia continua affligit patientes, qui tamen ad tranquillum somnum minus sunt idonei.
- 6 Nonnulli, si intensior est affectus, modo horrores, modo æstus vagos in habitu corporis sentiunt, inpr. aere frigido & humido existente.
- 7 In auribus non raro percipiunt patientes susurrum & tinnitum vagum & interdum dolorem obtusum, inpr. quando congestio gravedinosa incipit.
- 8 In quibusdam prædictis accedit symptomatibus

appetitus imminutio & digestionis læsio, tæste nausea & flatulentia.

- 9 Plerumque etiam adest sitis cum oris siccitate & aliquali gustus & olfactus depravatione.
  - 10 In pectore occurrit opptetio cum aliquali, sed leviori respirandi difficultate.
- 2 *Cephalalgiae catarrhalis.*
- 1 In hac observantur fere omnia modo dicta symptomata, sed gravius affligunt.
  - 2 Major quoque hic est sensuum internorum stupor, ita ut ad cogitationes minus sint idonei ægrotantes.
  - 3 Dolor hicce latius se extendit & quidem primo ad tempora, postea vero ad summitatem capitis, & ad occiput usque ad processus mastoideos.
  - 4 Hoc in passu communiter capitis agitationes vertigo sequitur cum doloribus vagis lancinatoriis.
  - 5 Si vero congestio non est simpliciter serosa, dolores sunt quidem tendentes, prementes & gravantes, sed magis acuti & urentes.
  - 6 Febriles etiam concursu hic magis familiares sunt.
  - 7 Sæpius quoque congestione ad aures facta, dolores otalgici insignes modo in interioribus, modo in exterioribus se exerunt partibus.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines Temperamenti Phlegmatici, aut Sanguineo Phlegmatici Plethorici.
- 2 Infantes post suppressas feri & inpr. sudoris, excretiones.
- 3 Viri quoque & senes ad narium Hæmorrhagias non amplius proni.
- 4 Otio, somno ac vino dediti.
- 5 In aere humido & frigido versantes.
- 6 Evacuationes sanguinis aliasque consuetas negligentes.
- 7 Pulveribus sternutatoriis abutentes.

V. *Prognosis.*

- 1 Uterque affectus magnæ non est considerationis & periculo vacat.
- 2 Quo frequentius autem recurrit, eo gravius etiam affligit & diutius durat.
- 3 Coryza superveniens utrumque malum solvit, quando nimirum serum a sanguine congesto secedens a Natura, cujus prima intentio excretionem respiciebat, expellitur.
- 4 In senibus autem periculo non vacat, inpr. quando frequenter eosdem affligit & habitum acquirit: facile enim graviores vertigines & apoplecticos affectus post se trahit.
- 5 Nonnunquam etiam humorum acrium & mucosorum decubitus ad pectus fiunt, unde in junioribus pulmonum erosio, in senibus vero catarrhi suffocativi aut Asthmata ac Tusses Chronicæ metuendæ sunt.

VI. *Remedia.*

- 1 Resolventia externa & sternutatoria: Herb. Thym. Majoran. Serpill. Beton. Orig. Fol. Tabac. Flor. Lavend. Lil. convall. Sem. Nigell. Salia volatilia &c.
- 2 Resolventia interna & anticatarrhalia: Tinct. ðii, Tartari, Essent. Lignor. L. Sassafr. Alexipharm. Succini. Infusa & Decocta ex Radic. & Herb. resolventibus.
- 3 Laxantia: Pilulæ Becherianæ, Stahlianæ, de Succin. Crat. Merc. dulc. Extr. panchymag. Croll. &c.
- 4 Tonica: Mixt. Tonic. Stahlî &c.
- 5 Venæ Sectio, Scarificationes & Laxatia præservationis gratia.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pulvis sternutatorius.

Rx. Herb. Major.  
Serpill.  
Flor. Lavend.

Lil. convall. ap. iij.

F. Pulvis.

## 2 Mixtura anticatarrhalis.

Rx. Tinct. ðii.  
Ess. alexiph.

Succen. a. ʒj. M.

D' 30. gt. mane & vespere.



## 3 Pilulæ laxantes.

Rx. Extr. panchym. Cr. gr. xii. Eff. Succ. q. s. M.  
 ʒ. dulc. gr. viij. F. Pil. pro 1. dosi.

4.

Rx. Pil. de Succ. Crat. n. D. ut antea.  
 xx. xxv.

## 5 Mixture Tonico discutiens.

Rx. Tinct. Tart. ʒij. Spir. C. C. a ʒj. M.  
 Eff. Succ. D. mane & vespere 30. gt.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In Gravēdine & Dolore Capitis catarrhali eo ante omnia Medicus respiciat, ut materiæ, a Natura ad exitum destinatæ, excretio mature contingat, cui fini potissimum inserviunt Errhina & Ptarmica leniora.
- 2 Cum vero hæc materia semper aliqualem mucidam spissitudinem habeat, ea quoque corrigenda est per anticatarrhalia, lymphæ & feri depurationi dicata, uti sunt potissimum Tinct. ʒii cum Essentia Succini, aut Alexipharmaca mixta.
- 3 Remediis hisce interponantur vel subjungantur lenia laxantia, ut materia in nimia quantitate ad caput congesta in inferiora derivetur: quem in finem conveniunt Pil. de Succ. Crat. de Ammon. Quercet. Panchymag. Croll. Pilulæ Stahlianæ & Becherianæ vel solæ vel reliquis mixtæ.
- 4 Derivationem talem quoque præstant lenia Diaphoretica & Diuretica. Hic præcipue laudem merentur Tincturæ & Essentiæ antea allegatæ, quæ utrumque effectum edunt, inpr. si diaphoreseos respectu cum moderato regimine dantur.
- 5 Tandem detur Mixta Tonica Stahlī, quæ in Doloribus capitis catarrhalibus curative & præservative insignem habet usum.
- 6 Præservationis gratia instituantur versus æquinoctia Venæ Sectiones & Scarificationes præsertim in Plethoricis & assuetis, & blandæ laxationes cum catarrhalibus non negligantur.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Si lenibus sternutatoriis resolutio & evacuatio materiæ obtineri potest, fortiora in usum non trahantur, si vero illa nullum edunt effectum, hisce locus concedatur, qualia sunt Rad. Helleb. nigr. & alb. Euphorb. ad pauca grana, Vitriol. alb. in Aq. major. solutum, quod ultimum sæpius optimo cum successu dedimus juxta mentem Wedelii in A. M. M.
- 2 Volatilia ad materiæ resolutionem quidem sunt optima, cautela tamen opus est, ne per frequentiorum eorum usum, caput nimium afficiatur, memoria debilitetur & olfactus lædatur.
- 3 In malo habituali nil magis provenit, quam maturæ præservatio & prudens convenientium remedium continuatio.
- 4 In anticatarrhalium præscriptione semper prudenti selectu opus est: quamvis enim acria Phlegmaticis convenient, calidioribus tamen & ubi congestio magis sanguinea, quam serosa est, minus conveniunt.
- 5 Pari cautela opus est in Balsamicorum Cephalicorum & Cucupharum applicatione, facile enim in calidioribus vertiginem, caput nimium turbando, pariunt.
- 6 Vesicatoria, Fonticuli & Setacea etsi malum chronicum interdum mitigent, parum tamen constans est eorum effectus, vel enim affectus facile recurrit, vel graviora mala eorum consolidationem sequuntur. Commodius E. iisdem cautus & continuatus anticatarrhalium, discutientium, & ad alia loca derivantium usus substituitur.
- 7 Uti vita otiosa ad generationem horum affectuum multum contribuit, ita motus moderatus & continuatus ad lymphæ catarrhalis resolutionem & discussionem optime convenit.
- 8 Repetitæ crapulæ & nimius somnus fugiantur.

## CAPUT SECUNDUM.

D E

Brancho &amp; Raucedine.

## I. Definitio.

- 1 Branchus est affectus catarrhalis sive species catarrhi, a congestione humorum plus vel minus serosorum acrium & mucidorum & superiores asperæ arteriæ partes & fauces facta, dependens, cum raucedine & doloribus plus vel minus sensibilibus in parte affecta conjunctus.
- 2 Raucedo vero est tunicæ interioris asperæ arteriæ constrictio; irrigationem debitam dictæ tunicæ impediens & vocem claram raucam reddens.

## II. Differentia.

- 1 Quomodo Branchus & Raucedo differant ex Definitione patet, a plerisque tamen pro uno eodemque affectu habentur, & in Praxi sub eodem titulo tractantur. Melioris tamen distinctionis gratia notetur.
- 2 Quod in Brancho contingat depositio & secessio humorum seroso mucidorum in asperam arteriam, quæ Raucedinem comitem habet: e contra vero in vera Raucedine excretio illius lymphæ, ad irrigationem necessariæ, impediatur.
- 3 Quod Branchus ordinariæ Coryzam sequatur: Raucedo autem vera non.
- 4 Quod Branchus in principio respicit excretionem sanguinis, qua frustrata postea humorum fit decubitus in asperam arteriam, quod in Raucedine vera contingit.
- 5 Quod in Brancho dum humorum decubitus ad imas fauces & asperam arteriam fit, inpr. in Senibus & valde Phlegmaticis aliquid defectivi vel passivi, in Raucedine vero spasticum quid occurrat. Adeoque Branchus commode ad superiorem classem de Fluxibus feri referri potest, Raucedo vero, effluxum feri lymphatici impediens, magis hujus est loci.
- 6 Uterque affectus respectu causarum modo ab internis, modo ab externis dependet.

## III. Signa.

- 1 Branchum fere ordinariæ vel præcedit vel comitatur Coryza.
- 2 Accedit utpl. tussis cum excretionem materiæ vel tenuis acris, sed paucioris, vel mucosæ & copiosioris.
- 3 Inter tussendum ægrotantes in aspera arteria sentiunt dolorem quasi exulcerationis.
- 4 Hisce raucedo tanquam symptoma junctur.
- 5 Respirandi quoque diffultas, quando copiosus humorum est decubitus, sæpius concurrit.
- 6 Junguntur adhuc alia symptomata Coryzam & Gravēdinem ordinariæ comitantia.
- 7 Raucedinis signa per se patent.

## IV. S. bjectum.

- 1 Brancho subiiciuntur:
  - 1 Juvenes & viri, in quibus adhuc congestiones sunt ad pectus.
  - 2 Phlegmatici.
  - 3 Senes catarrhis obnoxii.
  - 4 Infantes quoque humidioris constitutionis.
  - 5 Aeri frigido & humido se exponentes.
- 2 Raucedini.
  - 1 Brancho affecti.
  - 2 Tussi vehementi & inpr. sicca laborantes.
  - 3 Quibus vel sulphuris aut alius acrioris mineralis fumus in fauces illatus fuit.
  - 4 Corpore calido subito statum calidum cum frigido commutantes.
  - 5 Nimis fermocinantes & clamantes.
  - 6 Phthisici & Hæctici.
  - 7 Scorbutici & Venerei, propter erosionem vel majorem vel minorem partium voci inservientium.
  - 8 Mensium suppressione laborantes.
  - 9 Nimis salaces. Talem Raucedinem observavi in filia futoris, quæ, discrimen inter utrumque sexum bene



bene sciens, quoties cum quodam, quem amabat, (amabat autem multos ob spem matrimonii) amice colloquebatur, toties Raucedine corripiebatur: cum vero post aliquot annos filium in cœlibatu pareret, Raucedo illa disparebat.

V. *Prognosis.*

- 1 Branchus per se malum non est periculosum, sed brevi utpl. tempore finitur: si tamen congestio est copiosa & materia nimis acris, metuenda est Pulmonum erosio.
- 2 In senibus catarrhalibus Branchus, si humorum congestio est insignis, ob pulmonum debilitatem facile degenerat in Catarrhum suffocativum.
- 3 Ob eandem copiosam congestionem in vegetioribus interdum Tussim, in effectis vero Asthma post se trahit.
- 4 Raucedo a causis externis orta, minoris est momenti, & brevi sponte cessat.
- 5 Raucedo diuturna, cui Tussis sicca chronica supervenit, utpl. Hecticum quid supponit.
- 6 Raucedo a profundiore partium voci inservientium erosione dependens, rarissime curatur.
- 7 Raucedo a causis internis & morbis complicatis, Scorbuto v. g. & Lue Venerea ortum trahens, non, nisi hisce remotis, curationem admittit.
- 8 Raucedo inveterata vel difficillime, vel prorsus non curatur.
- 9 Raucedines Phthisi vel Hecticæ supervenientes pessimæ sunt indolis.

VI. *Remedia.*

- 1 Humores acres temperantia & corrigentia, Nitrum, Salia neutra, Absorbentia.
- 2 Materiam mucosam resolyentia: Ess. Pimpin. alb. Alexipharm. aliaque superius jam tacta.
- 3 Lenia laxantia: Rhabarb. in substantia, Pil. Becher. Stahl. &c.
- 4 Abstergentia: Salia neutra cum Absorbentibus. Ol. amygd. dulc. Sacch. cant. Sperm. Cet. iuscula ex hordeo aut avena parata.
- 5 Discutientia & lenia Diaphoretica ac Diuretica: Tinct. Jii, Tart. Ess. Succ. Mixt. Tonica Stahl. &c.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pulvis temperans.

- R. Conch. ppt. Div. in 6. p. æq.  
Tart. Vitriolat. D. sing. 6. hor. dos. j.  
Nitr. depur. ã. Jij. M.

## 2 Potiuncula temperans &amp; diaphoretica.

- R. Aq. scabios. Cinnab. Jij. Jij.  
hyssop. ã. Ziiss. Sacch. perlat. Ziij. M.  
J diaph. D. sing. 2. vel 3. hor. cochl.  
Conch. Citrat. ij.  
Tart. Vitriolat. a. Jss.

## 3 Mixture incidens &amp; discutiens.

- R. Tinct. Jii ac. Ziij. succin. Zj. M.  
Ess. alexiph. Zij. D. mane & vespere 30. gt.

## 4 Pulvis laxans.

- R. Rhab. elect. Jij. D. pro 1. dosi.

## 5 Pilulæ laxantes.

- R. Pil. Polychr. Zi. D. 15. 20. vespere.

## 6 Aliæ.

- R. Extr. Panchym. Ess. succ. q. s.  
Pil. Becher. a. Jss. M. F. Pil. D. pro 1. dosi.

## 7 Linctus abstergens.

- R. Ol. amygd. dulc. rec. Sperm. cet. rec. Zij. M.  
Sir. violar. D. singl. 4. horis dimid.  
Sacch. violac. a. Jss. cochl.

## 8 Mixture Tonico discutiens.

- R. Tinct. Tart. ac. Zij. Spir. C. C. a. Zj. M.  
Ess. succ. D. mane & vespere 30. gt.

II. *Methodus medendi.*

- 1 In curatione Branchi ante omnia respiciendum est, ut congestiones ad pectus factæ & adhuc fientes moderentur, & humores acres temperentur, cui fini inserviunt hinc inde laudata Nitrosa, Absorbentia, Salia neutra cum Cinnabarinis mixta.
- 2 Cum vero non raro etiam mucositas humorum

fauces & asperam arteriam affligens concurrat, modo dictis temperantibus subjungantur Incidentia & Resolventia, ut hoc modo eorum excretio promoveatur, insignem in tali casu edunt affectum supra laudatæ Essentiæ, ut & Aqua Veronicæ Spirituosa juxta methodum Stahlianam parata.

- 3 Ad alvi laxitatem hinc respiciatur, hac enim aperta humores ad pectus ruentes ad inferiora derivantur & evacuantur: hic præ ceteris conveniunt Pilulæ Stahlianæ, Becherianæ aut aliæ quoque ex Gummatibus, ac Extractis amaris leniterque laxantibus præparatæ, quæ & incidendo & laxando operantur.
- 4 Hilce & superioribus interponantur abstergentia ex Ol. Amygd. dulc. Sperm. Ceti, & Absorbentia cum salibus neutris.
- 5 Denique in usum trahantur Discutientia & Tonica, quibus pro Diaphoresi vel Diuresi promovenda, vel Essent. alexiph. D. Stahl. vel Ess. Succini admisceatur.
- 6 In Raucedine exhibeantur relaxationis gratia lubricantia, Sirup. Violar. Capill. Jis, Ol. Amygd. dulc. Mucilago hordei &c. quibus interponantur Temperantia & lenia Laxantia.

VIII. *Cautele Practicæ.*

- 1 In utroque calu abusus Expectoantium vitetur, quatenus partes nimium emolliendo affluxum humorum augent, & affectum pejorem reddunt.
- 2 Resolventia & Discutientia acriora, ut & Volatilia humores nimium commovent, quare mitiora iis semper præferantur.
- 3 Narcotica & emulsiva refrigerantia, quæ a quibusdam in hoc casu commendantur, humores increasando & torporem fibræ conciliando excretionem humorum impediunt & infarctum glandularum augent.
- 4 Purgantia acriora hic nullius sunt usus, quare mitioribus & inpr. Pilulis Stahlianis potius locus concedendus est.
- 5 In Raucedine inveterata respiciendum ad affectus conjunctos & remediis diu insistendum est.

## CAPUT TERTIUM.

## DE

*Catharro Suffocativo.*I. *Definitio.*

**E**st subitanea & maxime periculosa pulmonum ab humoribus seroso mucidis, nimia copia in eos irruentibus, orta repletio aut oppletio, congestionem & nimiam partium respirationi inservientium, Pulmonum scil. ac Thoracis, relaxationem sequens.

II. *Differentia.*

1 A congestione sanguinis in Pulmones: in hac enim insignis quidem occurrit ab oppletione respirandi difficultas, tanta tamen non est ac in catarrho suffocativo, quatenus Thoracis motus adhuc aliquo modo est liber: nec etiam tanta virium adest prostratio, uti in catarrho: ut taceam, quod congestionem facile tollat Venæsectio, quæ in Catarrho sæpius frustra instituitur. Reliquæ differentiæ ex collatione utriusque affectus facile apparebunt.

2 Ab *Apoplexia serosa*, quæ quidem subito etiam patientes corripit, præcedunt tamen eam ordinarie, varii catarrhi in capite se exferentes, Vertigines, stupor capitis diuturnus: comitantur vero repentinus in terram casus cum motus abolitione, sensuum vero, si non totali, maxima tamen abolitione, pulsus & respirationis insigni interceptione, aut plenaria suppressione, inpr. si est fortior, stertore & spuma ante os, quæ tamen in Catarrho suffocativo non occurrunt, uti ex signis patebit.

3 A *Tussi humida*, in subjectis valde humidis, per remedia expectoantia emollientia, & narcotica, exaf-



exasperata & depravata: quamvis enim in hoc insignis, ob nimiam pulmonum, a remediis productam, laxitatem, occurrat pectoris ab humoribus oppletio, tanta tamen non producit symptomata ac in Catarrho suffocativo.

- 4 A *subitaneis pectoris oppletioibus*, retropulsis ulceribus Rheumatismis, exanthematibus & Scabiei originem debentibus: quamvis enim hæc interdum satis graves sint, ita ut mortem etiam inferant, (observavimus talem suffocationem in infante duorum annorum, Temperamenti maxime Phlegmatici ob retropulsionem scabiei humidæ) nihilominus tamen a Catarrho suffocativo insigniter differunt: quatenus

a Opletio a dictis affectibus respectu *quantitatis* materiæ rarius tanta est, ut statim ingens & præsentaneum vitæ periculum ægrotantes conjiciat.

b Respectu *qualitatis* materiæ: in dictis enim translationibus ad pectus, magis anxietas urget, & verus constrictionis sensus percipitur, adeo ut tales affectus ordinarie spasticum quid conjunctum habeant. Cum e contra in Catarrho suffocativo laxitas potius occurrat.

c Respectu aliorum *symptomatum*, inpr. *prostrationis virium*, illa nunquam in tanto gradu ac in catarro suffocativo observantur.

d Quod hæc pathemata semper magis ipsos pulmones, quam thoracem adorianur, adeoque Respiratio respectu thoracis ejusque musculorum non sit adeo intercepta ac in catarrho suffocativo, ubi totus thorax cum pulmonibus laborat.

e Ratione *exitus*, quod hi affectus vel spasmodice pulmones constringendo, & motum sanguinis interceptiendo, vel inflammando, vel exulcerando, aut corrodingo eisdem, catarrhus autem suffocativus suffocando & nimium opplendo ægrotos jugulet.

### 5 Ab *Asthmate convulsivo*:

a Hoc enim exacerbationem motus tonici, Catarrhus vero suffocativus remissionem ejus conjunctam habet.

b Illud sanguineis familiare, hic vero Phlegmaticis senioribus, vel junioribus Phlegmaticis valde repletis & catarrhis valde obnoxiiis.

c In hoc multa materia catarrhalis serosa concurrit, in illo vero nihil tale conspicitur.

d Asthma convulsivum per intervalla ægrotos corripit, & in junioribus commotiones febriles concurrentes habet, cum e contra catarrhus suffocativus continuo urgeat, Conf. Tab. de *Asthmate convulsivo*.

### III. *Signa*.

1 Uti alii Pulmonum affectus utpl. successive invadunt, ita hic repente, & quidem uno impetu instar Apoplexiæ corripit ægrotos.

2 Respiratio etiam uno eodemque impetu ita difficilis redditur, ut præsentaneum subitanæ suffocationis periculum ægrotantes, partim ob pulmonum infarctum, partim etiam propter Thoracem movendi impotentiam incurrant.

3 Observatur quoque inter respirandum spumidus fremitus & sonus oppletiois Pulmonum index.

4 Sub prima etiam invasione, insignis statim & tanta adest virium prostratio, ut vix halitum ducere queant ægri.

5 Ob eandem quoque graviores debilitatem nulla adest tussendi potestas, & etiam si levis quidam tussendi conatus excitetur, minus tamen sufficiens est ad excernendam materiam.

6 Prostrationi virium summa quoque animi jungitur abjectio & anxietas.

7 Facies etiam, ob motum sanguinis in pulmonibus interceptum tumida est, oculi vero prominent & fulgent.

### IV. *Subjctum*.

1 Senes Phlegmatici vel etiam juniores ejusdem Temperamenti, Valerudinarii, catarrhalibus pectoris affectibus vel sæpius recurrentibus, vel chronicis obnoxii.

2 Tonum remissiore pulmonum vel per Naturam, vel ob morbos habentes.

3 Ad affectus Paralyticos & Apoplecticos dispositi.

4 Quibus ulcera chronica manantia, scabiosi vel rheumatici affectus uno impetu retropulsi sunt, insignem quoque ad hunc affectum nanciscuntur dispositionem, aut eum actu incurrunt, si Temperamentum & Ætas respondent.

5 Infantes quoque humidioris constitutionis post largum corporis sudorem aeri frigidiori expositi, vel in crustosis affectibus per repellentia male tractati.

6 Qui ad catarrhos jam proni, aut ipsis actu affecti aeri humidiori nimium sese exponunt & pectori non satis prospiciunt.

7 Evacuationes consuetas, Venæ-sectiones, Scarificationes, Purgationes, sudationes &c. vel Plethora vera, vel humorum serosorum abundantia, præsentem, negligentes.

8 Vino nimium dediti.

### V. *Prognosis*.

1 Catarrhus suffocativus est morbus admodum periculosus, patientes, inpr. seniores, intra 12. vel 24. horarum spatium e medio tollens.

2 Qui hoc morbo pereunt, utpl. syncoptici moriuntur.

3 Febris, quæ in junioribus malo hocce laborantibus utpl. jungitur, vel eidem succedit, ordinarie mali est moris, quia nunquam perfecte typica est, sed Hecticam habet indolem, ac vires indies consumendo nihilominus ægrotos jugulat, inpr. si respirandi difficultas cum anxietate continua perseverat, hoc enim in casu in pulmonibus aliquid inflammatorii esse, non improbabile videtur.

4 Et etiam si tale quid non contingat, ob paralyticam pectoris & pulmonum relaxationem (quæ utpl. ordinaria est hujus affectus & primaria causa) insignis non solum harum partium laxitas remanet, quæ viam copiosæ humorum in pulmones irruptioni & Tussi, vel Asthmatis portam pandit, sed etiam tandem toni remissio in reliquis partibus cum cachecticis accidentibus observatur.

5 Hisce interponuntur interdum varia molesta asthmatica spastica molimina, inpr. si causæ externæ concurrunt, quæ tamen, etsi ad excutiendam & expellendam materiam a Natura instituantur, utpl. frustraneæ sunt, & majori materiæ incarcerationi malisque exinde dependentibus viam sternunt.

6 Interdum etiam insignem post se relinquit debilitatem catarrhus, ut ægri toti, respectu prioris status, alterati & mutati appareant, & negotiis solitis prospiciendis impares sint.

7 Qui semel Catarrho suffocativo fortiori correpti fuerint, facile in inprævisam incidunt recidivam, & subito, instar Apoplexiæ fortiori tactorum, moriuntur.

### VI. *Remedia*.

1 Congestionem derivantia: Venæ-sectio in pede vel brachio, Clysteres acriores, Frictiones, Sinapismi.

2 Evacuantia: Sal Vitrioli, Radix Asari, ejusque Decoctum, Resin. Jalap. Scammon. G. Gutt. Extr. Coloc. Helleb. nigr.

3 Stasin materiæ serosæ, mucidæ discutientia & Resolventia: Ess. Succin. Alexiph. Pimpin. alb. Tinct. ʒii acris, Tart. acris, Resolvens, cum Salib. Volat. Spir. C.C. Sal Ammon. anis. combinatæ, Gummata in Acet. squillit. soluta & sub potionum pectoralium forma in usum vocata, Sperm. Cet. cum Ol. Amygd. dulc. rec.

4 Virium languescientium robur restituentia: Analeptica: Aqu. fragrantiores destill. Nymph. Rub. id. Ceras. nigr. Cordial. Cinnam. bugloss. Conf. de Hyac. Alkerm. Corall. r. ppt. Matr. Perl. ppt. Sirupi Confortantes, Essent. dulc. concentr. Emulsiones, Cibi suaviter aromatizati, Vinum generosius.

5 Febrem concurrentem, vel succedentem mitigantia, Absorbentia, Oc. ʒ. ppt. Conch. ppt. Diaphoretica fixa ʒ. diaph. Bezoard. miner. Cinnabarina, Cinnab. ʒii, nativa, cum interpositis Alexipharmacis discutientibus.



6 Partium relaxatarum tonum restituentia : Mixture Tonica Stahlī, Tinct. Vitriol. ꝑt. Ludov. Essent. dulc. ordin. & concentr. Pulv. Ores Tonici Richteri, motus corporis sufficiens, diætā aromatica, vinum generosum, externa spirituosa, linimenta, fottus &c.

Formula Remediorum.

1 Pulvis emeticus.

R. Sal Vitriol. f. Gille. D. ꝑro 1. dosi.  
Paracels. ʒss.

2 Potiuncula emetico purgans.

R. Aq. Cinnam. ʒj. Sir. Pom. lax. ʒij. M.  
C. Gutt. ʒss. D. ꝑro 1. dosi.  
Tart. Vitriolat. g. iij.

3 Clyster acrior.

R. Spec. carmin. Elect. cathol. ʒi.  
Herb. major. Sal Gemm. ʒj.  
Cent. min. a. mj. Extr. bell. nigr. ʒj.  
Fol. Tabac. mls. Euphorb. gr. iij.  
Còq. in f. q. Aq. f. Vir. Ov. n. j. M.  
Colat. ʒj. adde. F. Clyst. calide applicand.

4 Potio resolvens pectoralis.

R. Aq. Hyssop. solut. & inspiss. ʒj.  
Tussilag. a. ʒss. Spir. Sal Ammon. anis. ʒss.  
Asthmat. ʒj. Sir. de Erysim. Lob. ʒss. M.  
G. Ammon. in Aq. to. D. sing. 2. hor. cochl. aliquot.  
Squallit.

5 Potio cardiaca.

R. Aqu. Rub. id. Lap. ʒ. ppt. a. ʒss.  
Nampb. Cens. alkerm. ʒj.  
Ceras. nigr. a. ʒj. Julcp. gemmat. ʒss. M.  
Cinnam. bugl. ʒvj. D. cochleatim.  
Matr. Perl.

6 Mixture resolvens.

R. Ess. alexiph. D. gt. 30. bis vel ter quovis  
Succin. a. ʒj. die.  
Tinct. ʒij. ac. ʒij. M.

VII. Methodus medendi.

1 Cum in affectu hocce omnia propter præsens vitæ periculum maxime urgeant, Medicus mature nimium in Pectus humorum affluxum imminuere vel intercipere tentet, ne æger plane suffocetur.

2 Huic fini inservit in subjectis Sanguineis & Plethoricis Venæ Sectio larga ad ʒviii. X. si fieri potest in pede, aut obstantibus quibusdam circumstantiis in brachio.

3 Huic revulsioni inservit quoque Clysterum acriorum injectio, qui pro subjectorum & gradus diversitate magis vel minus acres reddi possunt.

4 Si suspicio est, in ventriculo hæere cruditates ob malam diætā, partim ob hæc, partim etiam ob materiam in pectore collectā ejiciendam, exhibeatur vomitorium: cui usui potissimum a Practicis destinantur Sal Vitrioli & Radix Afari.

5 Si vero subjecta sunt Phlegmatica, aut ob vim morbi debiliora, ita ut emeticum ferre nequeant, eisdem substituatur purgans Phlegmagogum & simul stimulant ex Etr. Helleb. nigr. Colocynth. G. Gutt. utpote quæ & incidendo & evacuando scopo Medico apprime satis faciunt.

6 Cum vero in hocce affectu Paralytici quid semper occurrat, externa quoque excitantia in usum trahantur, qualia sunt potissimum Vesicatoria & Sinapismi; Frictiones, partibus tam proximis, quam etiam remotis applicita.

7 Postea materia lenta & viscida per convenientia remedia incidentia resolvatur & ad excretionem præparetur, ulterior vero & uberior ad pulmones affluxus per discutientia partim Diapnoica, partim Diurética præcaveatur. Cui fini inserviunt supra laudatæ Essentiæ & Tincturæ, inpr. vero Gummatæ vel soluta & potiunculis admixta, vel iterum inspissata & in Pilulas redacta. Hæc enim non solum optime incidunt, sed etiam majori dosi exhibita alvum laxam servant, adeoque derivando & resolvendo conducunt.

8 Vires admodum prostratæ restaurentur per potiones analepticas, vini generosioris & Diætæ aromaticæ usum. Inprimis iisdem cum summa efficacia prospicere posset Ess. dulc. Hall. ordinaria & adhuc efficacius concentrata. Hæc autem analeptica semper interponantur resolventibus atque incidentibus, ut sic & materiæ & tono consulatur.

9 In concurrente Febre per interposita alexipharmaca & diaphoretica leniora succurrendum est, auxilium etiam tunc ferunt Emulsionēs & Gelatinæ, ut & Nitrosa aliaque temperantia.

10 Si vero febris deest, & ad chronicum statum affectus declinat, tunc præter incidentia & resolventia, laxantia per epicrasin in usum vocentur, non neglecto sufficiente motu corporis & Diætā convenienti.

11 Mitigato morbo partium etiam tono prospiciatur, partim per supra laudata analeptica & Cardiaca, partim per Nervina & lenia interne & externe usurpata Martialia.

12 Ut porro novus Paroxysmus imposterum præcaveatur, modo dicta roborantia & nervina sæpius repetantur, aer humido frigidus evitetur, successus alvi quotidie observetur, & si evacuationibus quibusdam solennibus inpr. sanguinis assueti sunt ægrotantes, ad eas vel consueto, vel æquinoctiali tempore oculus dirigatur.

VIII. Cautelæ Practicæ.

1 In Venæ Sectione instituenda & exhibendis vomitoriis semper ad subjecti conditionem, ætatem, temperamentum & inpr. ad vires respiciendum est, quo neglecto, in gravi & præcipiti hocce malo facilis est lapsus.

2 Seniores debiles infarctu non ita enormi, ex liberiore respiratione facile cognoscendo, oblecti, non tractandi sunt per fortiores commotiones, sed potius methodum leniorem evacuatoriam, subjunctis resolventibus & tincturis tonicis, repetitis vicibus, sed dosibus parvis, exhibendis.

3 Anticatarrrhalia calidiora & volatilia in subjectis Sanguineo Plethoricis humores nimium commovendo affectum pejorem reddunt.

4 Catarrrhalia nunquam in usum trahantur, nisi alvus sit aperta.

5 In Febre quoque concurrente aut subsequente cautiissime sunt usurpanda, facillime enim febris genius exinde exacerbatur.

6 Obstructio alvi in hocce morbo semper noxia est, quare semper aperta servetur, nunquam tamen fortiora purgantia hunc in finem præscribantur.

7 Evacuationem tam sanguinis, quam feri solennium, nimirum Hæmorrhagarum spontanearum, Venæ Sectionum, Scarificationum, Fonticulorum &c. neglectus damnum affert eximium, ideoque eorum successus, quam maxime observandus.

8 Omne regimen calidum fortius noxium est, temperatum vero prodest.

9 Aer humido frigidus inprimis autumnalis catarrhis & sensibus admodum est inimicus, pariter ac Diætā cruda & somnus nimius.

10 Motus corporis e contra moderatus & continuatus in locis calidis & temperatis, frequens usus Pilularum Becherianarum, aliarumque ex Gummatibus paratarum, Tincturæ alcalinæ aliæque pectorales non adeo calidæ, cum infusis aut decoctis Herb. & Rad. resolventium ac Diætā aromatica & vinosa in talibus subjectis magnæ sunt utilitatis, & optime affectum huncce præcavent.



## CAPUT QUARUM.

## D E

## Tussi sicca.

1. *Definitio.* **T**ussis sicca est motus pectoris validus & concussorius diuturnus, a Natura ad excutiendam materiam molesta institutus, quem tamen utpl. nulla materię humidę excretio sequitur.

II. *Differentia.*

- 1 Alia est *idiopathica*, quando materia molesta in Pulmonibus hæret, & est vel mitior, uti *ordinaria*, vel fortior uti *ferina*.
- 2 Alia est *sympathica*, quę est vel *hypochondriaca*, vel *stomachica*, quando vel ab hypochondriorum, vel stomachi vitio originem trahit.

III. *Signa.*

- 1 Valida & diu durans pectoris concussio, sine tamen materię mucosę excretionem.
- 2 Huic jungitur sæpius raucedo, præcipue si vitium hæret in pulmonibus, in Tussi vero hypochondriaca hæc non est adeo frequens, nisi nimis diu duret.
- 3 Tussis hæc facile exacerbatur ab aere frigido, si fuerit pectoralis: hypochondriaca vero a potu frigido, assumptis & motu corporis, inpr. ascensorio.
- 4 Affligit autem potissimum noctu, præcipue hypochondriaca, ita ut ob frequentem tussim ægroti totas noctes insomnes transigant.
- 5 Accedit subinde etiam insignis respirandi difficultas.
- 6 In hypochondriaca sensus concussionis in hypochondriis jungitur.

IV. *Subjectum.*

- 1 Respectu ætatis juvenes ficcioris temperamenti, quibus congestiones ad pectus, ad hæmoptycam excretionem tendentes, impendent, vel eveniunt.
- 2 Viri etiam & Senes ejusdem temperamenti, propter dispositionem, ex consuetudine natam, sive quia antea sæpius congestionibus ad pectus laborarunt.
- 3 Hæmorrhoidarii, quibus Hæmorrhoides vel sponte, vel ob alias causas cessarunt, ut & feminę mensium ataxia laborantes, post factas sanguinis ad hypochondria, vel pectus congestiones.
- 4 Quibus copiosus mucus, sed viscidus tenax & excretioni minus obtemperans, aut serum nimis acre, aut paucum, in bronchiis hæret.
- 5 Venę Sectiones & Scarificationes consuetas negligentes.
- 6 Infantes qui morbillis laborarunt, aut post variolarum malam tractationem.
- 7 Quibus scabies, achores & tinea repulsa fuerunt.
- 8 Tuberculis Scirrhis pulmonum, aut hepatis vel lienis Scirrhis afflicti.
- 9 Concretionibus item tophaceis pulmonum laborantes.
- 10 Gibbosi & Scrophulis affecti.
- 11 Qui vapores sulphureos, antimoniales, arsenicales, mercuriales &c. attraxerunt.

V. *Prognosis.*

- 1 Tussis sicca semper majoris est momenti quam humida, nisi forsan alia accidentia eam comitentur.
- 2 Quo magis invalescit Tussis sicca & quo diutius affligit, eo certior est metus Scirrhi visceris cujusdam.
- 3 Tussis sicca sympathica facile degenerat in idiopathicam, permanente nihilominus læsione in parte primum affecta: adeoque ob complicationem affectuum totus status morbosus eo gravior redditur.
- 4 In juvenibus, ubi congestiones ad Hæmoptysin tendentes Tussis sicca causa sunt & frequentius recurrunt, Phthisis metus non inanis est.
- 5 Si vero molimina congestoria aut actuales congestiones mature sequitur sanguiseruptio, nullis gravibus symptomatibus stipata, & etiam congestioni respondens, ita ut nihil talis congesti sanguinis in pulmonibus remaneat & corrumpatur, Phthisis

metuenda præcaveri solet.

- 6 Tussis hypochondriaca chronica frequentius & inpr. noctu affligens, ob obstructionem vel Scirrhositatem viscerum Hecticam facile post se trahit.
- 7 Tussis sicca in infantibus cum aliis signis concurrentibus interdum indicat variolas aut morbillos instantes.
- 8 Tussis sicca stomachalis facile transit in ferinam, ita ut ægroti, dum tussire incipiunt, vix remittere queant.
- 9 Tussis ferina in infantibus & adultis non raro Herniam, in feminis vero abortum producit.
- 10 Si Tussis sicca in Asthma siccum degenerat, malum est.

VI. *Remedia.*

- 1 Temperantia: Nitrosa, Conch. ppt. Mat. Perl. Tart. Vitriolatus, ꝑ. diaphor.
- 2 Humores a pectore derivantia: lenia laxantia, Rhabarbarum, Magnesia, Pilulę Balsamicę &c. Venę Sectiones, Pediluvia &c.
- 3 Discutientia: Rad. Ari, Pimpin. alb. &c. Tinct. ꝑ. ii, Tartari, Ess. Pimpin. alb. Succini &c.
- 4 Sedantia: Cortex Chacarillę, Emulsiones temperantes & anodynę, Cinnabarina, M. P. de Cynoglossa &c.
- 5 Tonica: Mixtura Tonica Stahlii, Infusa ex Herbis pectoralibus blande adstringentibus parata.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis temperans.

Rx. Conch. citrat. Div. in 6. p. æq. D. sing.  
Tart. Vitriolat. 5. vel 6. horis.  
Tarr. depur. a. ꝑ. ij. M.

## 2 Alius temperans &amp; diaphoreticus.

Rx. Matr. Perl. Arcan. dupl. a. 3ss. M.  
Nitr. regener. Divid. & D. ut antea.  
ꝑ. diaph.

## 3 Pulvis laxans.

Rx. Rhabarb. el. ꝑ. ij. D. pro una dosi.

## 4 Infusum discutiens.

Rx. Rad. Pimpin. alb. Veron. ā. mis.  
Vincetox. a. 3ss. Ex Inc. et Cont. F. Infusum  
Herb. Scabios. Theiforme sæpius sum-  
Hyssop. mendum.

## 5 Mixtura discutiens.

Rx. Tinct. Tart. D. mane & vesperi gt. 30.  
Ess. alexiph. a. 3ij. in Infuso præcedente.  
Succ. 3j. M.

## 6 Pulvis temperans &amp; sopiens.

Rx. Lap. cancr. M. P. de Cynogl. gr. iv. M.  
Sal polychrest. a. 3ss. Div. in 4. p. æq. D. dos. j.  
Pulv. chacar. ꝑ. j. vesperi.  
Cinnab. ꝑ. ii gr. viij.

## 7 Emulsio temperans &amp; sopiens.

Rx. Amygd. dulc. 3ss. Mucilag. hord. 3vj.  
Sem. Pap. alb. 3ij. c. F. l. a. Emulsio.

## 8 Alia.

Rx. Amygd. dulc. 3vj. F. l. a. Emulsio.  
Sem. Card. Mar. 3iii. Colat. 3vj. adde  
Papav. alb. 3ij. Conch. ppt. 3j.  
Aqu. Cheresfol. Sacch. perlat. q. s.  
Hyssop. ā. q. s. ad gratiam.

## 9 Pilulę sopientes.

Rx. Succ. liquirit. 3j. M. F. Pil. ad pond. gr. ij.  
M. P. de cynogl. gr. vj. D. vesperi 10. pro dosi.

## 10 Mixtura tonico-discutiens.

Rx. Tinct. ꝑ. j. Spir. C. C. a. 3j. M.  
Ess. Pimp. alb. a. 3ij. D. mane & vesp. gt. 30.  
Succin.

VII. *Methodus medendi.*

## 1 Tussis sicca idiopathica sive Pectoralis.

- a Si talis tussis sicca a congestionibus sanguinis ad pectus trahit originem, hæc ante omnia mitigentur & quidem primo per temperantia, qualia sunt Nitrosa, Salia neutra; absorbentia, cum Antimonio diaphoretico aut Bezoardico minerali mixta, ut hoc modo temperati humores ad peripheriam cor-



- corporis pellantur & simul humorum affluxus ad pectus intercipiatur.
- b Si Plethora in talibus subjectis urget, Venæ Sectio mature institatur, quippe quæ impetum morbi maxime imminuit & sanguinem ad alia loca derivat. Ad præoccupandum morbi recursum præservatorie etiam instituitur.
- c Hisce vel præmittantur, vel interponantur lenia laxantia. inpr. si alvi siccitas adest, Magnesia scil. Rhabbarum, Pilulæ Becherianæ aut aliæ cum hisce convenientes, quæ non solum resolvunt, sed etiam humores ad intestina derivando congestiones ad pectus imminuunt.
- d Temperatis humoribus congestis ad discussionem eorum respiciendum est, quod inpr. præstant varieg. radices & herbe pectorales, tam in infuso quam in Essentiis, uti sunt Rad. Ari Pimp alb. Emul. &c. Herb. Scabios. Veron. Virg. aur. Tussilag. &c. Essent. Pimp. alb. Tinct. Hii &c. quæ pulmones partim ab uberiore humorum affluxu præservant, partim humores ad alia loca derivant.
- e Discussionem peracta, si Tussis adhuc urget, aut si discutientibus non obstantibus Tussis semper perseverat, anodyna sunt exhibenda, & inpr. tempore vespertino. Optime h. l. convenit Cortex Chacarillæ, Pilulæ ex succo Liquiritiæ & MP. de Cynoglossa, quæ etiam reliquis temperantibus una cum Cinnabari Antimonii admisceri & vespere exhiberi potest. Parem efficaciam quoque habent Emulsionem ex Amygd. dulc. & Sem. Papav. Rh. cum aquis pectoralibus paratæ, quæ & temperant & sopiunt.
- f Si in tali Tussi sicca tandem aliquid materiæ deponitur in pulmones, illud removendum est per lenia abstergentia & expectorantia, qualia sunt potissimum Oleum Amygdalarum dulcium recens & Sperma ceti.
- g Tandem ad ulteriorem affluxum præoccupandum & ad roborandos pulmones in usum trahatur sæpius laudata Mixture tonico-discutiens Stahliani.
- h Si ob mucum tenacem Tussis est sicca, materia illa per emollientia, oleosa leniterque resolventia remedia ad excretionem promoveatur: qualia sunt gelatinæ, cremor hordei, Oleum Amygd. dulc. Sperm. Cet. Sir violar. Sacch. &c.
- i Hisce jungantur lenia laxantia ex Jalapa, Pilulæ ex Gummatibus & solventibus paratæ, Extract. Panchymag Croll. &c.
- k Interponantur superius laudata solventia ac discutientia, ac tandem agmen claudant remedia tonica.
- l Si tussis sicca originem trahit a nodis scirrhis pulmonum, exhibeantur remedia in Tuberculis pulmonum præscripta.
- 2 Tussis ferina.
- a Cum materia in hoc affectu sit admodum acris, ea ante omnia temperanda & evacuanda est, quod præstant supra laudata absorbentia, nitrosa, salia neutra, cum mucilaginosi & gelatinosi & oleosi, Decoct. raparum, Sperm. Ceti, Emulsi. &c.
- b Postea exhibeantur lenia laxantia & discutientia simul diuresin & diaphoresin promoventia, adeoque pectus ab humorum acrim affluxu præservantia.
- c Nimia Tussis mitigetur per superius commendata sopientia, ac pulmones roborentur per tonica.
- 3 Tussis sympathica sive hypochondriaca.
- a Si tussis hujus causa tenax & viscida in Ventriculo hæret, exhibeantur digestiva cum absorbentibus mixta.
- b Hisce subjungantur lenia laxantia, præcipue vero Pilulæ Becherianæ aut Stahlianæ, Extr. Panchymag. Pil. de Ammon. aut præscribantur etiam noduli resolventes & laxantes.
- c Tandem tonica & roborantia hisce substituantur & continuentur, ut partim Ventriculus pristinum

recuperet robur, partim ut novus materiæ proventus præcaveatur.

- d Si prorsus sicca fuerit, causa magis in hypochondriis quam in ipso Ventriculo latet, & hinc ante omnia sollicite inquirendum est, a quibusnam causis proveniat? Si abundantia sanguinis concurrat, Venæ Sectio maxime convenit, quæ quoque locum præservationis gratia habet, si a congestionibus ortum traxit. Quod reliquam curationem concernit, ea juxta methodum sub infarctu & Scirrho hepatis præscriptam adornetur.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Nisi in corporibus Plethoricis Venæ Sectio larga instituat, ut plurimum nullum habet usum.
- 2 Venæ Sectio in brachio instituta affluxum sanguinis ad pectus auget & majorem pulmonum oppletionem causatur, quare fugienda est.
- 3 Omnia purgantia acria in tussi sicca nil profunt, imo malum exasperant.
- 4 Discutientia fortiora, volatilia & oleosa sanguinem nimium commoventia, affluxum sanguinis ad pectus augent, & continuata ad Phthisin disponunt, imo eandem sæpius actu producant.
- 5 Opiata ad sedandam tussim non nisi probe correctâ materia & præmissis præmittendis summa cum circumspexione exhibeantur: quod nisi observetur, irritationes quidem supprimant, sed simul materiam acrem in pulmonibus detinendo Phthisin producant.
- 6 Expectantium quoque abusus hic summo studio vitetur, quoniam majorem materiæ affluxum ad pectus excitant.
- 7 Traumatica reliquaque pectoralia adstringentia materiam incarcerant, & malum augent, quare semper post alia præmissa, leniora saltem solventibus mixta in usum trahantur.
- 8 Nisi in Tussi hypochondriaca labes viscerum tollatur, Medicus frustra contra Tussim pugnat.
- 9 Antihecticum Poterii in tali casu a quibusdam commendatum Hecticam producit & hinc fugiendum est.
- 10 Acidulæ in hisce affectibus ut plurimum sunt pocula mortis.

### C A P U T Q U I N T U M .

#### D E

#### Asthmate Sicco.

- I. *Definitio.* **A**sthma siccum est species respirationis difficilis cum sibilo & sono acuto, ut plurimum sine tussi & excretionem materiæ, a pulmonum relaxatione, & humorum ad illos congestionem, aut etiam a pulmonum scirrhisitate dependens.
- II. *Differentia.* Differt
- 1 Ab *Asthmate humido*, in quo materia humida viscida, in hocce autem prorsus nihil excernitur.
  - 2 Ab *Asthmate convulsivo*, in quo insignis pectoris spastica compressio per intervalla solum ægrotos corripit, in sicco vero respirandi difficultas sine tali compressione continuo durat.
  - 3 A *Tussi sicca*, in qua frequentes convulsivi pectoris commotiones ad materiæ cujusdam molestæ excretionem tendentes deprehenduntur, quæ in Asthmate sicco desunt.
- III. *Signa.*
- 1 Adest insignis & continua fere inspirandi sive acriem hauriendi difficultas.
  - 2 Quem tamen aerem semel haustum diutius retinent, adeo ut respiratio quidem difficilis, non tamen brevis sit.
  - 3 Sub inspiratione auditur sibilo & sonorus stridor.
  - 4 Ordinarie tussis ei non jungitur, nisi in malo chronico quando scirrhi pulmonum ad exulcerationem tendunt, aut actualis jam corruptio adest.
  - 5 Respirandi difficultas continuo quidem ægrotantes affli-



affligit, ordinarie tamen mane & vesperi exacerbatur.

6 Eadem quoque exacerbatio ingressum aeris frigidi aut vaporum acriorum in pulmōnes sequitur.

#### IV. Subjectum.

1 Respectu *temperamenti*, homines strictioris habitus corporis magis, quam quibus is porosus est, hoc malo corripiuntur.

2 Respectu *ætatis* juvenes atque in prima virili ætate constituti magis quam senes.

3 Plethorici evacuationes sanguinis artificiales negligentes.

4 Diæta lauta utentes & otio simul indulgentes.

5 Viri & feminae, quibus Hæmorrhoides vel menses suppressi sunt.

6 Qui frequentes congestiones ad pectus passi sunt.

7 Qui in tussiculosis affectibus male tractati fuerunt.

8 Qui nodos scirrhosos in pulmonibus absconditos habent.

9 Hypochondriaci sinistre curati, & scirrho viscerum abdominis aliaque labe laborantes.

10 Lapidicidæ ob multum haustum pulverem lapidarem vel calcarium.

11 Qui halitus mercuriales, arsenicales, saturninos &c. in pulmōnes receperunt.

12 Quibus scabies, inpr. sicca & ferina, aut similia circa caput oborta maligniora impetiginosa inquinamenta retropulsa fuerunt.

13 Quibus reliquæ Variolarum & Morbillorum in corpore remanserunt.

14 Quibus pectus male conformatum est.

15 Quibus pulmōnes nimium sunt relaxati & debilitati.

#### V. Prognosis.

1 Asthma siccum est malum admodum chronicum & non raro ad plures annos extenditur, inpr. si humorum affluxus, & phthisica pulmonum corruptio quantum fieri potest præcaveatur.

2 Sæpius tamen in Phthisin transit, inpr. quando a retropulsa scabie, aut reliquiis Variolarum & Morbillorum ortum trahit.

3 Quo magis antea pulmōnes per frequentiores congestiones & alios affectus debilitati fuerunt, eo facilius Asthma siccum graviora habet consecutaria.

4 Asthma siccum inveteratum raro radicitus tollitur, sed etiam si aliquo modo mitigatum sit, ob diætæ vitia facile recrudescit.

5 Asthma siccum si in Tussim siccam cum aliis bonis signis mutatur, spem melioris curationis facit.

6 Qui ad frequentiores congestiones ad pectus proni sunt, facile iterum in Asthma siccum, licet ab eo semel liberati sint, incidunt.

7 Nonnunquam etiam Asthmatis sicco diuturno Cachexia, tumores pedum œdematosi & Hydrops succedunt, inpr. quando Asthma hocce nocturno potissimum tempore affligit, quod sæpius observamus.

8 Asthma interdum in Peripnevmoniam mutatur. *Sennertus.*

9 Asthma febribus acutis vel in morbi cursu superveniens, vel post easdem affligens periculo nunquam vacat.

10 Si simul labes viscerum scirrhusa inpr. hepatis conjunctum est, malum, si non plane incurabile, curatu tamen difficillimum est.

#### VI. Remedia.

1 Affluxum humorum intercipientia; eosque temperantia: V.S. revulsoria, pediluvia, lenia laxantia, Rhabarbarum, Magnesia, Pilulæ Stahlianæ &c. nitrosa, absorbentia, Salia neutra &c.

2 Discutientia: Rad. Pimpin. alb. Vincetox. Ari &c. Herb. Scabios. Cheresol. Virg. Or. &c. & ex his parata infusa Theiformia aut etiam Essentiæ discutientes. Aqua Veronicæ Vinosa D. Stahlian.

3 *Sopientia*: Cortex Chacarillæ, Cinnabarina, Emulsiones temperantes & anodynæ factæ cum Sem. Papav. albi. &c. Reliqua remedia vid. in Tab. præcedentibus.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pilulæ laxantes.

R. Extr. Panchym. Cr.  
Pil. Stabl. a. gr. viij.  
Ess. Succ. q. s.

M. F. Pil. D.  
pro una dosi,

##### 2 Infusum incidens & laxans.

R. Rad. Vincet.  
Caryoph.  
Helen. a. Zijj.  
Ari. Ziss.  
Herb. Hyssop.  
Cent. min. a. mss.  
Fol. Senn. s. s. Zij.  
Rhab. elect.  
Fibr. Hell. nigr. a. Zij.

Sem. Anis.  
Fenic.  
Cort. Cit.  
Citr.  
Cinnam. ac. a. Ziss.  
Tart. solub. Zij.  
Inc. inf. in Aq. ferv. lb. ij.  
adde Vin. alb. lb. j. Dof.  
Zij. vel viij. mane.

Reliquas Formulas vide Tabula præcedente.

#### VII. Methodus medendi.

1 Cum Asthma varias atque diversas causas, a quibus originem trahit, agnoscat, hinc etiam ad eandem respiciendum est. Sæpiissime congestiones sanguineæ a suppressis consuetis sanguinis fluxibus dependentes, ansam ei præbent. In tali E. casu

a Præservationis gratia Venæ Sectio versus æquinoctia instituta insigniter prodest, quatenus hoc modo translationes & congestiones sanguinis ad pulmōnes & viscera vicina optime præcaventur, præsertim si subjecta tali jam Asthmate laborant, aut respectu temperamenti ad congestiones dispositio in subjectis occurrit.

b Nec minorem habet usum Venæ Sectio curatorie mature instituta, ante scil. humorum nimiam in pectore innidulationem, ut hoc modo humores versus pulmōnes nimirum ruentes ad partes inferiores revellantur, & uberior infarctus impediat.

c Postea eo allaborandum est, ut consueti illi fluxus per convenientia remedia denuo revocentur, quo in casu optime se gerunt Pilulæ veræ Becherianæ aut Stahlianæ, quæ in Mensibus & Hæmorrhoidibus revocandis omnibus aliis remediis palmam facile præripiunt.

d Hisce tamen semper præmittenda vel jungenda sunt temperantia & motus congestorios mitigantia, uti sunt superius sub Tussi sicca laudata remedia nitrosa, absorbentia & Cinnabarina, quibus etiam sopiendi fine Cortex Chacarillæ addatur.

e Ad discussionem peragendam & ulteriorem humorum irruptionem in pulmōnes præcavendam in usum quoque trahantur discutientia eodem loco laudata. Præprimis vero Aqua Veronicæ vinosa & Spirituosa Stahliani matutino & vespertino tempore ad aliquot cochlearia sumpta.

2 Si tussiculosis affectus male curati prægressi sunt, aut externi affectus serosi per imprudentem medicationem suppressi fuerunt, ad hos quoque quam sollicitè respiciendum est.

a Cum talibus in casibus humorum acrimonia ordinarie adsit, ea temperanda est, per remedia jam laudata nitrosa & absorbentia, ut & per Salia neutra materiam hancce abstergentia: quibus interponantur etiam Emulsiones temperantes Gelatinæ, Cremor hordei &c.

b Ad evacuandam materiam præparatam exhibeantur blanda laxantia & inpr. Magnesia albarite præparata, quæ & temperat & evacuat. Potest etiam exhiberi Rhabarbarum vel solum, vel in Infuso cum aliis incidentibus & resolventibus.

c Tandem in usum trahantur superius laudata discutientia & Mixtura Tonica Stahliani.

3 Si a nodis scirrhis in pulmōnibus hærentibus Asthma



ma siccum dependet, methodo in tali casu propo-  
ra tractetur.

4 Si vero labes in hypochondriis hæret, in usum tra-  
hantur remedia Tab. de Infarctibus & Scirrhis vi-  
scerum allegata.

5 Si reliquæ Variolarum & Morbillorum in pulmonibus  
sunt, exinde sæpe originem trahit vel Tussis sicca vel  
Asthma siccum. In talibus casibus Sydenham magno-  
pere laudat Venæ-sectionem, cum vero adstantes eam  
in tenera ætate vix aut prorsus non admittere velint,  
substituuntur ei blanda temperantia repetitis vicibus  
exhibita, quibus interponatur mane & vesperi mode-  
rata dosis Essent alexiph. Stahlii.

6 Si tandem ob frequentes congestiones pulmones insi-  
gniter relaxati sunt, & ipsi quoque nervi atonia labo-  
rant, in usum trahantur lenia laxantia, quibus sub-  
jungantur Discutientia & tonica sæpius laudata.

### VIII. Cautela Practica.

- 1 Nisi Venæ-sectio mature aut statim in principio in sub-  
jectis dispositis, & ubi causæ prægressæ ejus usum sua-  
dent, instituatur, nil juvat.
- 2 In revocandis fluxibus sanguinis consuetis in subjectis  
asthmaticis cautissime procedendum est, & omnes il-  
læ cautelæ summa cum prudentia sunt observandæ,  
quæ in hisce affectibus commendatæ fuerunt.
- 3 Si discutiendum est, vitentur omnia volatilia &  
acria, quæ humores nimium commovendo affectum  
augent.
- 4 Expectorantia præpostere data affluxum humorum  
ad pectus promovent & affectum graviolem red-  
dunt, quare fugiantur.
- 5 Pectoralia adstringentia sive traumatica in principio  
data materiam in pulmones illatam magis figunt &  
facile ad Phthisin disponunt, post alia tamen præ-  
missa suo non carent usu.
- 6 Purgantia acria in hocce affectu ut plurimum sunt  
noxia.
- 7 Graviore animi commotiones & diæta calida aro-  
matica hic nullius prorsus sunt usus.
- 8 Externa Unguinea pectori illita vel nil juvant, vel  
humorum ad pectus fluxum promovendo affectum  
diuturniorem & graviolem reddunt.

## CAPUT SEXTUM.

D E

Ictero.

I. **Definitio.** Icterus est suppressus bilis ad intestina flu-  
xus, diffusionem bilis ad habitum cor-  
poris, eum colore vel flavo vel plumbeo tingentis,  
comitem habens, partim ab obstructione ductus bi-  
liarii, partim vero ab hepatis constrictione originem  
trahens.

### II. Differentia.

- 1 Respectu coloris.
  - a Alius est flavus, quando oculi & habitus corporis  
flavo colore sunt tincti.
  - b Alius vero est niger, si color plumbeus vel niger in  
habitu corporis occurrit.
- 2 Respectu aliorum morborum.
  - a Alius est idiopathicus, qui nullo alio concomitante  
morbo, a constrictione hepatis ob varias causas  
originem trahit.
  - b Alius est sympathicus, qui morbos biliosos comi-  
tatur. Talem observavimus in Febre tertiana ano-  
mala, in qua post gravissima in quarto paroxysmo  
partim spasmodica, partim convulsiva pathemata, tan-  
dem icterus cum sensibili morbi levamine sequeba-  
tur, ita ut Febbris quinto paroxysmo prorsus ces-  
saret.
- 3 Respectu gradus.
  - a Alius est mitior.
  - b Alius vero gravior.
- 4 Respectu causarum.

a Alius a causa benigna, nempe bile sincera origi-  
nem trahit.

b Alius causam malignam, morsum v. g. animalium  
venenatorum, sequitur.

### III. Signa.

#### 1 Icteri flavi.

- a Utpl. incipit cum dolore & pressione cardialgica,  
quæ etiam in hypochondriis præcipue dextro ob-  
servatur.
  - b Quam insignis totius corporis lassitudo ulcerosa  
vel præcedit, vel comitatur.
  - c In quibusdam pressione illi jungitur etiam insi-  
gnis & inexplicabilis præcordiorum angustia &  
anxietas.
  - d Succedit hinc color flavus primo oculos & tem-  
pora, postea vero successive totum corpus tin-  
gens.
  - e In quibusdam oculorum acies est obtusa, si nimi-  
rum oculi nimis sunt tincti.
  - f In habitu corporis insignis occurrit ariditas & sca-  
brities, cui in quibusdam pruritus præcipue dorsi  
jungitur.
  - g In non paucis observatur capitis vel stupor vel  
dolor.
  - h Somnus in aliis est turbulentus, & variis insomniis  
interruptus, in aliis vero satis profundus.
  - i Appetitus ordinarie est prostratus, & licet cibos  
assumant, exinde tamen majorem statim in Ven-  
triculo sentiunt pressionem.
  - k In quibusdam occurrit vomendi conatus.
  - l In nonnullis observatur etiam ardor Ventriculi.
  - m Gustus interdum est depravatus, ita ut insignis  
occurrat amarities, utpl. tamen talis amarities in  
ictericis non deprehenditur.
  - n Sitis etiam sæpius huic affectui jungitur cum sicci-  
tate linguæ.
  - o Alvus utpl. est segnis, in non paucis tamen la-  
xior etiam, uti in lentericis & cœliaca passione  
laborantibus; ita ut crudi adhuc cibi, vel pa-  
rum tantum resoluti mox post assumptionem ex-  
cernantur.
  - p Feces alvinæ colore ordinario non sunt tinctæ,  
sed utpl. albidæ & argillaceæ ac simul siccæ de-  
prehenduntur.
  - q Urina regulariter est crassa & crocei coloris, ita  
ut etiam linteamina tingat.
  - r Pulsus est minor, frequentior & durior non au-  
tem velox.
  - s Si iram graviolem sequitur, accedit etiam levior  
febris, quæ tamen etiam in aliis observatur cum  
æstu arido & volatico ac rubore genarum inpr.  
post pastum vel potum.
  - t Respiratio redditur difficilior post motum cor-  
poris.
  - u Adest quoque insignis animi torpor.
- #### 2 Icteri nigri.
- a In hoc multa jam enumeratorum signorum oc-  
currunt, quæ tamen longe sunt graviora, quam  
in ictero flavo.
  - b In oculis, temporibus & habitu corporis plum-  
beus aut nigricans observatur color.
  - c Eodem colore sæpius tincta est saliva, vel saltem  
insigniter flavescit: interdum vero nulla in ea oc-  
currit mutatio præternaturalis.
  - d Feces modo ejusdem sunt coloris, modo natura-  
liter se habent.
  - e Urina, licet interdum a statu naturali parum  
abeat, utpl. tamen justo plus saturata & obscu-  
re flavescente ac nigricante colore emittitur.
  - f Præterea sæpius plus justo crassa, obscure ta-  
men perspicua est, cum sedimento croceo ni-  
gricante.
  - g Languor & lassitudo corporis continuo adsunt,  
gravitas tamen membrorum tanta non est ac  
in ictero flavo.
  - h Major tamen hic est animi languor ac fasti-  
dium, ita ut ægri sibi ipsis aliisque molesti  
sint.
  - i Appetitus hic semper magis est prostratus, & licet



quidam cibos satis a vide assumant, appetitus hic tamen magis vagus, quam constans est.

k Sitis etsi continuo cum oris siccitate affligat, potum tamen antea consuetum fastidiunt.

l Pressio quoque insignis occurrit in hypochondrio sinistro & nonnunquam durities.

m Concurrit etiam calor hecticus cum corporis contabescencia.

#### IV. Subjectum.

1 Respectu *etatis* nulla ab Ictero libera est, sed is omnis generis ætates corripit, magis tamen ad eum proni sunt adulti & senes.

2 Respectu *Sexus* idem tenendum est.

3 Respectu *temperamenti*, Cholerici magis ad eum inclinant, quam alii, uti & omnes insigni sensibilitate præditi & ad promptas toni alterationes proni.

4 Respectu *animi pathematum* iracundi præ ceteris facilius Ictero corripiuntur, ut & tristitiæ nimium indulgentes.

5 Respectu *morborum prægressorum*, quartanarii imprudenter per antifebrilia tractati facile in Icterum incidunt.

6 Scirrhus hepatis vel lienis laborantes ad utrumque Icterum maxime sunt proclives.

7 Hepatis inflammatione correpti.

8 Quibus Hæmorrhagiæ consuetæ, inpr. vero Menses & Hæmorrhoides imprudenter suppressæ sunt.

9 Obstructione ductus cholodochi a calculis aut materia viscida afflicti.

10 Sensibiles & Cholerici vomitoriis drasticis tractati.

11 Diæta viscida & crassa abutentes.

12 Ab animalibus venenatis morfi, aut qui venena assumerunt.

13 Quibus bilis in Massa sanguinea corrupta est, præ ceteris ad Icterum nigrum maxime sunt dispositi.

#### V. Prognosis.

1 Icterus recens in subjectis junioribus & vegetis spatium paucorum dierum sæpius tollitur.

2 In annosis autem & senibus diu durat & difficulter admodum curatur.

3 Icterus per se non est lethalis, nisi graviores aliæ causæ simul concurrant.

4 Quo magis est inveteratus, eo tardius etiam remediis, licet optimis, cedit.

5 Icterus a graviore iracundia ortus, licet curatus, facile iterum eundem animi impetum insequitur.

6 Quo sæpius quis Ictero laborat, eo facilius eum ob causas etiam levissimas denuo incurrit.

7 Si ab initio sive prima invasione gravibus statim symptomatibus, insigni scil. anxietate & angustia præcordiorum, suffocationem quasi minitante, stipatus est, periculosior semper est status, & Hecticam aut Febrem acutam inflammatoriam portendit.

8 Idem fere etiam metuendum est, si talia symptomata hypochondria affligentia, & respirationem insigniter turbantia, diu continuant, ordinariæ enim vel Hectica vel Hydrops sequuntur.

9 Icterus Hydropi superveniens malum indicat statum & fere semper incurabilis est, pariter ac Hydrops Ictero accedens.

10 Icterus contabescentiæ corporis junctus hecticici quid conjunctum habet, & hinc semper mali est ominis.

22 Icterus die septimo aliisque criticis præcedentibus signis coctionis Febribus acutis superveniens non est malum indicium, quoniam Crisin indicat: pessimum vero, si ante septimum sine præcedentibus coctionis signis aut aliis diebus non criticis ægrotos affligit. Conf. Hippocr. 4. Aphor. 62. & 64.

12 Icterus Scirrhus hepatis aut lienis junctus ordinariæ est incurabilis, quoniam Hectica & Hydrops ei utpl. junguntur. Conf. Hippocr. 6. Aphor. 42.

13 Satius est Quartanam supervenire Ictero, quam Icterum quartanæ.

14 Hæmorrhoides Ictero accedentes ejus curationem faciliorem reddunt.

15 Quo magis obstructus est ductus biliaris a calculis eo minor curationis est spes.

16 Icterus ab abusu diætæ calidæ aromaticæ, vini & li-

quorum spirituosorum ortus ordinariæ inclinatur ad Hecticam vel Hydropem.

17 Icterus morsum animalium venenatorum sequens semper malæ est indolis.

18 Si color flavus, sensim sensimque perit, cum mitigatione reliquorum symptomatum bonum præbet indicium: si vero subito in album mutatur, utpl. Scirrhus quid conjunctum habet & hinc mali est ominis.

19 Sudores copiosi indusia tingentes facilem morbi pollicentur curationem.

20 Icterus Mensium vel Hæmorrhoidum suppressionem sequens, vix nisi his in ordinem reductis curatur.

21 Icterus niger in genere difficilioris est curationis, quam flavus.

22 Quo magis corrupta est bilis in Massa sanguinea, eo difficilior curationem admittit Icterus niger.

23 Icterus niger in junioribus vegetis semper facilius curatur, quam in senibus.

24 Senes hoc malo laborantes ordinariæ Hectica moriuntur.

25 Quo magis scirrhus adest lienis dispositio, eo minor etiam curationis est spes.

#### VI. Remedia.

1 Materiam mucoso-biliofam resolyentia & Abstergentia: Tart. Vitriolat. Sal polychrest Arcan duplic. Tart. solubilis, Nitrum, Nitr. & iat. Liq. Terr. fol. Tartari, Sal Tart. Onon. Genist. absorbentia varia. Rad. Cichor. Tarax. Chelid. maj. Pimp. alb. Vincetox. Apii, Ari, Gentianæ, reliquæque aperientes. Herb. Endiv. Marrub. alb. Capillares, Cent. min. Fragar. &c.

2 Materiam resolutam blande evacuantia: Radix Rhabbarbari, Folia Sennæ, Fibra Hellebori nigri, Pilulæ ex Gummatibus & Extractis amaris paratæ, uti Becherianæ, Stahlianæ, Liqueur aperitivus mineralis, qui constat ex Sale cathartico amaro, polychresto & Tartaro Vitriolato, in f. q. Aq. f. solutis.

3 Diuretica & Diaphoretica bilem per habitum corporis & renes expellentia: uti sunt salia digestiva, Tinct. & ii Tartarifata. Tartari, & diaph. Bezoard. miner. Ess. Alexiph. Stahlî, Pimpin. alb. &c.

4 Tonica: Radix Rub. Tinct. Caryophyllat. Herb. Adianth. alb. &c. Tinct. & t. Ludov. Crocus & tis & iat. Stahlii, & & le Cachect. Ludov.

5 Specifica: Radix Chelidonii majoris, Curcumæ, Urticæ, Herb. Marrub. alb. Abrotan. Sem. Nasturt. Napi, Aquilegiæ, Crocus, Aselli, Lumbrici terrestres, Calculi ex vesicula fellea, Fel tauri, Lapis Ceraunius &c.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis abstergens.

Rx. Arcan. dupl. div. in 6. p. æq.  
Nitr. regener. a. ʒj. M. D. singulis 3. 4. horis.

##### 2 Alius.

Rx. Tart. Vitriolat. Nitr. & iat. a. ʒss. M.  
Conch. citr. Divid. & D. ut antea.  
Crysl. mont.

##### 3 Pulvis laxans.

Rx. Sal cathart. am. ʒvj. D. in copioso vehiculo.

##### 4 Alius.

Rx. Rhab. el. ʒij. D. in juscule aut alio vehiculo

##### 5 Infusum laxans.

Rx. Rad. Gentian. Sem. Dauc.  
Pimpin. alb. Fœnic. a. ʒij.  
Vincetox. Fol. Senn. f. s. ʒj.  
Cichor. a. ʒij. Rhab. elect. ʒij.  
Suavit. Cent. min. Tart. solub. ʒss.  
Herb. Marrub. alb. Inc. affund. Aq. fervens.  
Cappil. ♀. ʒj. & Vin. alb. ʒ. iv.  
Abrot. a. mss. D. mane ʒvj. viij.

##### 6 Pilulæ laxantes.

Rx. Pil. Stahl. ʒj. D. 15. 20. pro dosi.

##### 7 Aliæ.

Rx. Pil. Tart. ʒj. D. 20. pro dosi alternis dieb.

##### 8 Aliæ.

Rx. Pil. de Ammon. ʒj. D. ut antea.



## 9 Potiuncula diuretica.

R. *Aq. Cichor.* *Sacch. canar. & Zij.*  
*Cherefol. & Zij.* *D. sing. 3. horis cochl. ij.*  
*Terr. fol. Tart.*

## 10 Potiuncula Diaphoretica.

R. *Aq. Cord. Bened.* *Arcan. dupl. & 3ss.*  
*Fl. acac. a. Zij.* *Sacch. Perlat. Zij.*  
*8 diaph.* *D. versus noctem cochl. iij.*  
*Matr. Perl.* *iv.*

## 11 Pulvis diaphoreticus.

R. *Arcan. duplic.* *Div. in 6. p. aq. D. dosi*  
*Cryst. mont. prap.* *versus somnum.*  
*Bezoar. miner. a. Zij. M.*

## 12 Pulvis Specificus.

R. *Millep. ppt.* *Croc. orient. Zij. M.*  
*Arcan. dupl. a. Zij.* *D. 2. cusp. cultr. sing. 4 hor.*

## 13 Alius.

R. *Rad. Curcum. Zij.* *D. sing. 6. horis.*  
*Div. in 6. p. aq.*

## 14 Pulvis tonicus.

R. *Tart. Vitriol. Zij.* *Div. in 6. p. aq. D. dosi ver-*  
*Croc. & t. stabli gr. 18. M.* *sus prandium & cœnam.*

## 15 Tinctura tonica.

R. *Ess. amar. Hall. 3ss.*

## 9 Alia.

R. *Tinct. & t. Ludov. 3ss.* *ridiem.*  
*D. 40. gt. ante & post me-*

## 17 Infusum tonicum.

R. *Rad. Fragar.* *Agrimôn.*  
*Gent. rubr.* *Abrotan.*  
*Rub. Tinct.* *Epithym. a. mj.*  
*Caryophyll. a. 3ss.* *Inc. infund in Vin. alb. 15. 4. D.*  
*Herb. Scolopendr.* *30. vi. bis vel ter, quov. die.*

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Cum sæpius in primis viis & præcipue in ductu biliario hæret materia mucoso-biliosa, eundem ductum obstruens, ea quam primum removenda est, quo postmodum reliqua remedia eo magis penetrare queant, Huic scopo inserviunt præ ceteris Salia neutra, sive digestiva, quibus etiam jungantur Absorbentia & præcipue Crystallus montana. Salia fixa suo quidem non carent usu, si modo dictis sociantur, si vero sola exhibentur, tantam efficaciam ac Salia neutra vix exerunt.
- 2 Quamvis autem hæcce sola in malo mitiori sufficere queant, præcipue si repetitis aut majoribus dosibus exhibeantur, in malo tamen graviore sæpius insufficientia sunt: quare iisdem subjungantur lenia laxantia, inpr. vero Rhabarbarum, vel per se vel cum Folii Sennæ & Radicibus ac Herbis resolventibus supra allegatis, ut hoc modo, si quid adhuc adest causæ morbificæ, id resolvatur & successive evacuetur. Insignem quoque hic laudem meretur Sal catharticum amarum in principio ad drachmam unam singulis quatuor horis abstergendi gratia, postea autem laxandi scopo ad unciam semis vel drachmas sex in largiori vehiculo exhibitum. Hisce laxantibus aliis adhuc obtinetur scopus, motus scil. illius constrictorii hepatis, in Ictero sæpius occurrentis, relaxatio.
- 3 Quoniam vero magna bilis portio ad habitum corporis est lata & adhuc in Massa sanguinea heret, ea partim per Diuresin, partim per Diaphoresin est eliminanda. Prior scopus obtinetur salibus digestivis supra laudatis & absorbentibus: posterior vero fit diaphoreticum fixum, uti Bezoardicum minerale aut Antimonium diaphoreticum modo dictis salibus & absorbentibus admiscetur. Eidem fini etiam inserviunt Tincturæ alcalinæ, inpr. Antimonii & Tartari, ut & e Gummatibus resolventibus paratæ, quæ ulteriorem abstersionem & bilis expulsionem promonent.
- 4 Tandem quoque ad Tonum partium respiciendum est, ubi præ ceteris commendari meretur Tinctura Martis Ludovici, qua sola, missis omnibus aliis remediis, Icterus sæpiissime feliciter curavimus: aut antea dictis digestivis addatur crocus Martis & iatus Stahlî vel Antimonium Martiale cachecticum Ludovici, alique Croci Martis non adeo adstringentes.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Quo magis placide Icterus tractatur, eo citius & melius etiam curatur, quare fugiantur omnia commoventia fortiora & tonum magis exasperantia.
- 2 Inprimis vero abstinendum est a Vomitoriis & acrioribus Purgantibus, quæ partim constrictionem hepatis augment, partim vero serum sanguini nimis subtrahunt, adeoque bilis in Massa Sanguinea herentis expulsionem impediunt. (Notabile huius rei vidimus exemplum ante sex & quod excurrit annos in hortulano quodam: hic post iracundiam graviores Ictero corripiebatur, Medicus ad evacuandam bilem præscribebat Tartarum emeticum, ac postea Pulverem Cornach. & cum ægrotus nihilominus de pressione atque constrictione præcordiorum conquereretur, Medicus adhuc majorem bilis copiam in Ventriculo herere credens, continuationem dictorum remedium suadebat. Sed tantum abest, ut levamen exinde perciperet, ut potius quotidie magis magisque colore croceo tingeretur. Medicus postea varia quidem alia remedia sed sine ullo effectu præscribebat. Quare ægrotus pertesus me confulebat: erat autem tum temporis admodum macilentus, & debilis ac de insigni pressione in hypochondrio dextro conquerebatur, appetitus plane erat prostratus, sitis vero cum oris siccitate continuo urgebant. Suadebam usum jusculi cum radicibus & herbis leniter resolventibus parati, una cum Salibus digestivis & absorbentibus, quæ cum spatio aliquot septimanarum sumisset, symptomata illa sensim mitiora reddebantur: cum vero pressio in hypochondrio continuo urgeret, præscribebam pro usu externo Empl. de Cicut. & de Ammon. Foresti, pro interno vero Tinct. & t. Ludov. & simul continuationem jusculi suadebam, atque sic elapsis duobus mensibus curabatur. Sed in hunc usque diem quam primum levissima etiam ira commovetur, statim Ictero denuo corripitur, qui tamen brevi cessat.)
- 3 In præscribendis resolventibus semper respiciatur ad temperamentum, & uti Sanguinei & Phlegmatici fortiora resolventia, non tamen nimis acria, optime ferunt, ita e contra hæcce Cholericis noxia sunt, quare hisce semper mitiora exhibeantur.
- 4 Eo magis abstinendum est ab acrioribus resolventibus, aliisque commoventibus, si febriles commotiones Ictero junguntur; in tali casu magis profunt nitrosa cum Salibus digestivis & diaphoreticis fixis.
- 5 Regimen blande diænoicum uti ad expulsionem bilis e Massa Sanguinea multum confert, ita coactum sudoriferum non solum malum gravius reddit, sed & ad majorem corporis contabescentiam & Hæticam disponit.
- 5 Martialia nunquam, nisi præmissis præmittendis & in declinatione mali, in usum trahantur,
- 6 Idem judicium ferendum est de Specificis, vi communis regulæ practicæ: *Specificæ non exhibeantur, nisi præmissis universalibus.*
- 7 Limatura Martis quidem maxime a quibusdam commendatur, sed satius est ab ea abstinere & legitime præparata ipsi substituere: si tamen in usum trahenda est, detur in fine morbi robustioribus. Idem quoque sentiendum est de Hæmatite, qui a quibusdam ceu totus martialis in hoc affectu laudatur.
- 8 In Ictericis & inpr. junioribus a nimis remediis abstinendum est, prudens enim remediis convenientis continuatio plus, quam variorum coacervatio præstat.
- 9 In Ictero jam inveterato & contumaci lenissime procedendum & remedia incidentia diu continuentur, iisque laxantia lenia interponantur: festinatio enim in hoc casu maxime est noxia.
- 10 Quo magis sensibilia sunt subjecta, eo mitioribus etiam tractanda sunt remediis.
- 11 Remedia stomachica calida aut carminativa ad tollendum molestum pressionis sensum nunquam præscribantur, quia partim eum non tollunt, partim malum exacerbant: sub finem vero curationis Essentiæ



amaræ ad restituendum Ventriculi tonum suo non carent usu.

- 12 Multo minus suadenda sunt opiata & narcotica, quoniam materiam in hepate hærentem magis incassant & figunt, adeoque metuendæ hepatis infarctui portam certissime pandunt.
- 13 In Ictero a suppressis Hæmorrhagiis & Febris cautiſſime quoque procedendum & ab omnibus commoventibus abstinendum est, quoniam in tali casu ægrotantes longe facilius in Infarctus, Scirrhus, Inflammationes, Hæticam & Hydropem præcipitari possunt, quam si Icterus a mala Diæta originem traxit.
- 14 In tali etiam casu fugiantur remedia Martialia, licet a multis tamquam optima aperientia laudentur, revera enim adstringentia sunt & malum pejus reddunt.
- 15 Qui balnea in Ictero commendant, Æthiopem lavant.
- 16 Diæta crassa & viscida ut & ira, ut in multis Icteri sunt causa, ita etiam maxime vitari debent.
- 17 Quoniam IctERICI non raro recidivam patiuntur, præſervationis gratia lenia laxantia cum aperientibus ipsis præscribantur, id tamen semper debito tempore, & quidem præcipue circa æquinoctia, fiat.
- 18 Vini usus vel sit moderatus, si morbi conditio id permittit, vel prorsus nullus, inpr. si commotiones febriles frequentes concurrunt: magis in tali casu convenit Decoctum leniter aperiens & temperans ex Rad. Cichorii, Taraxaci &c.
- 19 Venæ Sectio ad curationem Icteri nil confert: si tamen subjecta sunt admodum plethorica, aut Icterus a sanguinis fluxuum suppressionibus ortum traxit, usum habet.
- 20 In ictero nigro tanquam summo morbi gradu cautiſſime & leniſſime procedendum est, quoniam hic majora adhuc metuenda sunt pericula, quam in flavo.
- 21 Nisi in hoc remedia convenientia diu continentur, frustra laborat Medicus.
- 22 In utroque Ictero alvi obstructio noxia est, quare semper aperta servetur; vitentur tamen acria & stimulantia.
- 23 Motus moderatus in omni Ictero egregie, partim ad stagnationes humorum dissipandas, partim ad promovendam bilis excretionem, convenit: excessus autem & defectus ejus fugiantur.

## CAPUT SEPTIMUM.

### DE

#### Ructibus & Inflatione Ventriculi.

- I. *Definitio.* **R**uctus sunt vapores flatulenti in Ventriculo e materia cruda, viscida, fermentescente &c. nati & ope motus constrictorii per superiora expulsi, aut in Ventriculo retenti, variarum molestiarum authores.
- II. *Differentia.*
  - 1 Alii sunt *naturales*, qui ab assumptis originem trahunt & sine insigni molestia expelluntur.
  - 2 Alii vero sunt *præternaturales*, quibus ordinarie molesta & interdum satis gravia juncta sunt symptomata.
  - 3 Alii sunt *inspidi*, alii vero assumptorum indolem referunt.
  - 4 Alii pro diversitate rerum hæterogenearum in Ventriculo latitantium diversum habent saporem & sunt vel *acidi*, vel *nidorosi*, vel *putridi* &c.
- III. *Signa.*

Quamvis hæc per se pateant.

  - 1 Ordinarie tamen præcedit aliqualis Ventriculi inflatio.
  - 2 Quam excipit motus quidam succussorius.
  - 3 Hunc vero, pro majori vel minori orificii sinistri

constrictione, ructus modo cum modo sine sono sequitur eruptio.

- 4 Si autem nimis constrictum est orificium, ita ut exitus ipsis denegetur, insignis deprehenditur Ventriculi inflatio, quæ ad hypochondria quoque se extendit.
- 5 Si manu tanguntur, renifus quidam observatur.
- 6 Jungitur hisce angustia & anxietas cardialgica, quæ sæpius adeo urget, ut ægrotantes, quos se veriant, nesciant.
- 7 Accedit etiam ob impeditum diaphragmatis motum respirandi difficultas.
- 8 Caput in quibusdam insigniter dolet.
- 9 In aliis vero vertigo tenebrosa, gravitas aut temulentum quid in capite cum tinnitu aurium observatur.
- 10 Alii percipiunt sensum flatulentia in ventriculo oberrantis, quando corpus movent.
- 11 Si ructus emittuntur, sentitur quidem aliqualis sublevatio tensionis Ventriculi, sed non cedit.
- 12 In quibusdam tanta concurrit corporis debilitas, ita ut pedibus insistere nequeant.
- 13 Nonnunquam etiam actuales accedunt Lipothymia.

#### IV. *Subjctum.*

- 1 Respectu *temperamenti*, Phlegmatici & Sanguinei magis quam CholERICI & Melancholici.
- 2 Respectu *Sexus*, feminæ præ viris.
- 3 Diæta cruda fermentescente utentes, aut laute viventes, vitæ sedentariæ dediti.
- 4 Sensibiles corpus modo aeri frigido, modo calido exponentes,
- 5 Viri hypochondriaci, sanguinis congestionibus ad ventriculum & hypochondria obnoxii.
- 6 Feminæ hystericae aut mensium ataxia, sive inordinato fluxu laborantes.
- 7 Hæmorrhoidarii, vanos conatus ad Hæmorrhoides experientes, aut earundem suppressione laborantes.
- 8 Nephritici & Podagrici.
- 9 Flatibus alias obnoxii, alvi obstructione laborantes.

#### V. *Prognosis.*

- 1 Ructus bene erumpentes & ab assumptis orti prorsus leve sunt incommodum & hinc etiam nullum periculum involvunt.
- 2 Si vero pertinaciter ventriculo includuntur, gravissimis sæpe incommodis, uti ex antecedentibus patet, ansam præbent.
- 3 Quo magis talis Ventriculi inflatio cum affectibus hypochondriaco-hystericis, arthritico-spasticis & nephriticis conspirat, eo graviora etiam producit symptomata.
- 4 Inflatio talis ventriculi, quo sæpius affligit, eo facilius etiam in habitum degenerat.
- 5 Quo magis hæcce inflatio pectus & caput in consensum trahit, cum vocis interceptione & insigni vertigine, eo magis etiam suffocationes & Apoplexiæ sunt metuendæ.
- 6 Et talia mala eo facilius sequuntur, si subjecta sunt plethorica & ad congestiones varias prona.
- 7 Si tali ventriculi inflatione jungitur flatulentia in intestinis, longe gravius redditur malum.
- 8 Quo magis alvus est adstricta, eo gravius etiam urget inflatio ventriculi, inpr. si intestina quoque flatibus sunt distenta.
- 9 Inflatio Ventriculi a ructibus, si cum aliis morbis inpr. acutis conjungitur, eos admodum exasperat, & gravem indicat statum.
- 10 Inflationes ventriculi diu durantes & sæpius affligentes non raro Tympanitem post se trahunt.
- 11 Inflatio ventriculi, quæ in reconvalescentibus observatur, recidivam interdum indicat.
- 12 Ructus foetidi & putridi odoris in morbis acutis pessimum præbent signum.

#### VI. *Remedia.*

- 1 Materiam crudam & viscidam incidentia & abstergentia: Arcan. duplic. Tart. Vitriol. Sal polychrest. Nitr. Giat. Sal cathart. amar. Conch. citrat. aliaque absorbentia. Rad. Vincetox. Pimpin. alb. Galang. Ari. Herb. Cent.



Cent. minor. Cochlear. Menth. Meliss. Cort. Ont. Citr. Sem. carminativa.

2. Materiam præparatam evacuantia : Rad. Ipecac. Tart. emet. Fol. Sennæ, Rhabarbarum, Magnesia alba, Pilulæ Becherianæ, Stahlianæ.

3. Discutientia: Eff. Cort. Ont. Carminat. wedelii, Pimpin. alb. Gentian. Tinct. Jii acris, Spir. C. C. Tartari, Nitr. dulc.

4. Concurrentem Plethoram removens, Venæ Sectiones, Scarificationes.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis abstergens & incidens.

R. Conch. citrat. Cinnam. ac. a. Jij. M.  
Tart. Vitriolat. a. Ziss. D. sing. 4. horis 2. cuspid.  
Rad. ari. cultri.

##### 2 Pilulæ incidentes & laxantes.

R. Pil. Becher. Zj. D. vesperti 20. pro dosi.

##### 3 Pulvis emeticus.

R. Rad. Ipecac. gr. xxiv. Sal absinth. Jss. M. D. mane

##### 4 Infusum incidens & laxans.

R. Rad. Vincetox. Fol. Senn. S. S. Zj.  
Pimp. alb. a. Ziss. Rhab. elect. Zj.  
Galang. Zij. Cort. Ont. Zij.  
Ari. Zj. Sal. Tart. Ziss.  
Summit. cent. min. Inc. infund. in Vin. alb.  
Herb. Menth. Ib. iv. D. mane Jvi. vel  
Meliss. æ. mss. VIII.

##### 5 Mixture incidens & discutiens.

R. Eff. Cort. Ont. Zij. Cinnam. Zj. M.  
Pimpin. alb. Zij. D. mane & vesperti 30. gt.

##### 6 Alia.

R. Eff. carminat. wed. Spir. Nitr. dulc. Zss. M.  
Zij. D. ut antea.

##### 7 Alia tonico discutiens.

R. Tint. Jii acris. D. ut antea.  
Spir. C. C. a. Zij. M.

##### 8 Tinct. Tonica.

R. Tinct. Jt. Ludov. Zss. D. ut at antea.

#### VII. Methodus medendi.

1 Si ructus a materia viscida tenaci & mala Diæta originem trahit, exhibeantur ab initio Salia digestiva, quæ materiam illam ceu Ructuum causam optime corrigunt & abstergunt ac ad excretionem disponunt. Eundem usum quoque habent vegetabilia modo enumerata, quæ non solum materiam illam incidunt, sed etiam ructus & flatus dissipant & Ventriculum roborant.

2 Hisce subjungantur emetica, inpr. si multæ cruditates in ventriculo hærent, & subjectum ad emesin dispositum est, quatenus hoc modo causa morbifica, e qua Ructus generantur, uno impetu tollitur: quod præ ceteris commode præstat Radix Ipecacuanhæ cum Sale quodam fixo mixta. In robustioribus Tartarus emeticus ad grana aliquot non sine fructu exhibetur.

3 Si vero subjecti sensibilitas aliæque circumstantiæ eorum exhibitionem non permittunt, in usum trahantur lenia laxantia cum incidentibus & amaris mixta, quæ successive materiam morificam evacuant, ac Ventriculum ab ea liberant: & talia in primis locum habent, si flatulentia simul est juncta. Eundem usum habent Pilulæ Becherianæ, Stahlianæ, Polychrestæ, aliæque ex extractis amaris & Gummatibus resolventibus & abstergentibus paratæ. Si flatulentia concurret, locum quoque habent clysteres emollientes & carminativi.

4 Tandem in usum trahantur discutientia ad impediendum ulteriorem humorum affluxum, iisque jungantur tonica ad roborandum Ventriculum, aut si quid materiæ adhuc in eodem hæret, ut incidatur & resolvatur.

5 Si pathemata hypochondriaca aut hysterica cum Ventriculi inflatione concurrunt, Venæ Sectiones, præservatorie & curatorie insignem habent usum, quibus reliqua tali in casu convenientia remedia jungantur. Vid. Tab. de hypochondriaco Hysterico malo. Quid Venæ Sectio in tali casu præstet in pro-

prio expertus sum corpore. Inflationi tali Ventriculi jam ultra quindecim annos obnoxius fui. Nunquam subito invadebat, cum tanta anxietate & respirandi difficultate, ut ne verborum quidem proferre valerem. Orificium Ventriculi semper arctissime clausum erat, ita ut prorsus nullus ructus egredi posset. Semel accedebant graves Lipothymia. Vertigo ordinariè maxime urgebat. Summa concurrebat totius corporis debilitas, ita ut pedibus vix insistere possem. Levissimus corporis motus omnia graviora reddebat. Occasionem huic malo dederant vomitoria, quæ insignem ventriculi sensibilitatem post se reliquerant: Malum hypochondriacum, molimina hæmorrhoidalia inania, cibi flatulenti, vina superioris Alsatia, cerevisia, vita sedentaria, Incubationes, meditationes, ira, tristitia, neglectus Venæ Sectionis, abusus Potus The, Caffæ &c. Si non repente invadebat, & si malum nihilominus imminere sentiebam, quod inpr. tempore antemeridiano continebat, vinum Rhenanum mature sumptum successive totum affectum præcavebat. Omnia carminativa malum accelerabant, & id longe gravius reddebant. Si vero inflatio me subito corripiebat cum reliquis symptomatibus nullum dabatur præstantius remedium, quam Venæ Sectio, quæ momento citius omnia tollebat, excepta aliquali lassitudine, quam spatio aliquot dierum sentiebam. Quamprimum Vena secta erat, ructus copiosi erumpebant, & hinc cardialgiæ passiones cessabant: Usus Venæ Sectionis præstantissimum jam duodecies in malo gravissimo expertus sum. Pilulas Becherianas quoque optimas deprehendi, hæ enim sæpius malum diu præcaverunt.

#### VIII. Cautela Præctica.

1 Si malum a cruditatibus dependet, omnino abstinendum est a remediis carminativis aliisque calidis, hæc enim omnia malum gravius reddunt, & majorem ventriculi inflationem ordinariè produciunt.

2 Eo certius autem nocent, si manifesta pathemata hypochondriaca & hysterica affectum huncce comitantur & fovent.

3 Si a mala Diæta originem trahit affectus, caveant sibi ægrotantes ab omnibus istis, quæ quocunque modo cruditatibus ventriculi ansam præbere possunt.

4 Vomitoria etsi interdum laudabilem edant effectum, maximo tamen studio vitanda sunt, si pathemata hypochondriaca & molimina hæmorrhoidalia affectum fovent, quatenus ventriculum insigniter debilitant, & frequentiori pariter ac graviore affectus recursum ansam præbent.

5 In tali casu fugiantur etiam alia Purgantia drastica, quia varias turbas in abdomine excitant, & variis hypochondriacis pathematibus portam pandunt.

6 Alvi laxitas etiam omni studio conservetur, hoc enim neglecto, inflationes ventriculi semper magis urgent.

7 Fugiantur etiam cibi flatulenti, animi pathemata fortiora & vita sedentaria, e contra vero corpus motu moderato continuo exerceatur.

#### CAPUT OCTAVUM.

##### DE

##### Flatulentia.

I. **Definitio.** Flatulentia est copiosa & subitanea flatuum ex humoribus in intestinis resolutis generatio, gravia mala conjuncta habens.

##### II. Differentia.

###### 1 Respectu gradus.

a Alia est mitior: quando in subjectis humidioribus ad Flatulentiam dispositis multi quidem flatus generantur, qui tamen vel iterum disparent, vel placide & sine molestia per inferiora eggeruntur.

b Alia est gravior: quando ob causas etiam leviores insignis flatuum copia generatur, cui graves etiam dolores ob flatus retentos junguntur.



## 2 Respectu causarum

- a Alia a cruditatibus primarum viarum originem trahit.
- b Alia varias sanguinis in vena portæ commotiones sequitur.
- c Alia ab intestinorum atonia dependet.
- d Alia a rebus fermentescentibus assumtis in subiectis jam dispositis ortum ducit.

3 Differt a *Tympanite*, in quo flatus copiosi in abdominis cavitate hærent, idque continuo & pertinaciter extendunt, qui in Flatulentia strikte sic dicta in intestinis generantur, & insignes molestias conjunctas habent.

## III. Signa.

- 1 Borborygmi & motus volutatorii in intestinis.
- 2 Cui modo extensio & inflatio abdominis, modo vero ejusdem subsidencia jungitur.
- 3 Interdum vero motus illi volutatorii defunt, & flatus in uno tantum loco incarcerantur.
- 4 Quo magis autem tales motus sive volutatorii, sive ad unum saltem locum directi exacerbantur, eo facilius etiam dolores graviores accedunt.
- 5 Hi dolores autem variant, interdum enim in hoc loco magis sunt spastici, in alio vero sunt distendentes, ut intestina quasi rumpi videantur.
- 6 Concurrit ordinarie alvi obstructio & hinc etiam dolores eo magis exacerbantur.
- 7 Interdum vero post varios motus flatus erumpunt & sic malum maxime imminuitur.
- 8 Si turbulentæ sanguinis in vena portæ commotiones concurrunt, accedunt cardialgicæ anxietates cum respirandi difficultate, aliæque hypochondriaca symptomata, modo in sinistro, modo vero dextro se magis exerentia.

## IV. Subjctum.

- 1 Respectu *Temperamenti*, Phlegmatici magis quam Sanguinei, Cholericæ & Melancholici, propter naturalem ad atoniam dispositionem.
- 2 Respectu *Sexus*, feminæ præ viris, inpr. vero eæ, quæ ob diætæ vitia mensium & lochiorum inordinato successu aut passione hystericâ laborant.
- 3 Abortum passæ aut in puerperio male tractatæ.
- 4 Fluore albo laborantes.
- 5 Respectu *sensibilitatis* ad varias toni alterationes ob calorem vel frigus proni.
- 6 Viri hypochondriacis passionibus afflicti.
- 7 Hæmorrhoidarii, partim ob varia, aut insufficientia, molimina, partim ob malum Hæmorrhoidum confluxum, aut plenariam suppressionem.
- 8 Nephritici & arthritici.
- 9 Hernia laborantes.
- 10 Atoniam intestinorum vel ob malam Diætam, vel ob alios morbos, Dysenteriam, Diarrhæam, frequentiores spasticas contractiones &c. patientes. unde hujus respectu plurimi homines ad Flatulentiam sunt dispositi.
- 11 Cibus flatulentis & fermentescentibus abutentes.
- 12 Ad alvi obstructiones proni.
- 13 Abdomen & pedes aeri frigido exponentes.
- 14 Qui decoctis & infusis calidis, præsentem jam aliqualem intestinorum atoniam, tonum adhuc magis relaxantibus, abutuntur.

## V. Prognosis.

- 1 Flatulentia malum non est contemnendum, ob gravissima mala quæ non raro eidem junguntur.
- 2 Quo magis intestina atonia laborant, eo minor plenariæ restitutionis est spes.
- 3 Idem quoque ferendum est judicium de Flatulentia, si jam in habitum deducta est.
- 4 Quo magis in Flatulentia urgent anxietates cardialgicæ cum respirandi difficultate & gravioribus capitis perturbationibus, eo gravius etiam metuentum est periculum.
- 5 Flatulentia a causis externis, refrigeratione scil. & assumptis orta, semper facilius & sponte sæpius curatur, quam quæ a causis internis originem trahit.
- 6 Flatulentia cum Hypochondriaco malo conjuncta semper gravius affligit & diutius etiam durat, quam reliqua.

7 Uti flatuum matura excretio symptomata ab ipsa pendencia maxime mitigat & non raro prorsus tollit, ita spontanea eorum retentio eadem fovet & exasperat: idque tanto magis in subiectis plethoricis, in hisce enim insignes circa venam portæ sequuntur turbæ, quatenus sanguinis motus per vasa mesaraica, dum hic intestina extensa, illic vero contracta sunt, maxime impeditur, unde non solum colicæ quasi convulsivæ, sed etiam translationes sanguinis partim ad vicinas, partim etiam ad remotiores fiunt partes, e quibus gravissima sæpe nascuntur symptomata.

8 Flatulentia ab Hæmorrhoidibus & mensibus male succedentibus dependens, aut cum Hypochondriaco malo connexionem habens, facile degenerat in Colicam convulsivam.

9 Imo iliacam passionem ex tali constitutione natam esse, in aliquot feminis observavimus.

10 Flatulentia uti facile habitum acquirit, ita etiam voluntaria flatuum emissio: novimus quosdam, qui ob continuam fere flatuum talem assuetam excretionem honestiorum consortium fugere coguntur.

11 Flatulentia & flatuum assueta emissio imprudenter suppressa, homines facile in Tympanitem, Hydroperem & Hæticam præcipitat.

## VI. Remedia.

- 1 Alvum apertam servantia: Clysteres emollientes, carminativi & leniter stimulant.
- 2 Lenia laxantia: Magnes. alba, Rhabarbarum, cum incidentibus solventibus & carminativis mixta, Pilulæ Becherianæ, Stah'ianæ, Polychrestæ, aliæque quarum compositionem Gummata cum Extractis amaris ingrediuntur.
- 3 Materiam flatuum abstergentia: Salia digestiva, Tart. Vitriolat. Arcan. dupl. Sal. cathart. amar. ut & Nitrosa cum Cinnabari mixta.
- 4 Tonum intestinorum restituentia: Essent. carminat. wedelii, Cort. Ont. aliæque ex incidentibus & solventibus paratæ. Tinct. Jii acris, Spir. C.C. Tartari, Nitri dulc. Spir. Ammon. anisat. Pro usu externo Emplastr. Stomach. Crat. G. Tacamah. Balsama ex oleis aromaticis & carminativis parata. Sacculi ex Herbis aromaticis & fragrantibus. Aqua Reginæ Hungariæ, Spir. Vini Camphor. cum linteaminibus abdomini applicita.

## Formula Remediorum.

## 1 Clyster.

Rx. Decoct. emoll. Sal. Gemm. ʒij.  
 carmin. ʒ. ʒv. Vit. Ov. N. j.  
 Ol. lil. alb. M. F. Clyster.  
 chamom. ʒ. ʒj.

## 2 Alius.

Rx. Rad. Alth. Colat. ʒx. adde  
 Lil. alb. ʒ. ʒvj. Ungu. clysmat. ʒvj.  
 Herb. Chamom. Ol. aneth. ʒss.  
 Meliss. a. mj. Sal. comm. ʒij.  
 Cent. min. Vit. Ov. N. j.  
 Fol. Tabac. ʒ. mss. M. F. Clyster.  
 Coq. in f. q. Aq. f.

3 Infusum laxans & carminativum.  
 Rx. Rab. Gent. rubr. Sem. Anis.  
 Pimp. alb. ʒiij. Fœnic.  
 Galang. ʒij. Cort. Ont.  
 Ari. ʒss. Winter. a. ʒss.  
 Summit. Cent. min. Cinnam. acut.  
 Herb. Meliss. Sal. Tart. a. ʒj.  
 Mentb. ʒ. mss. Incis. Contus. infund. in Vin.  
 Rhab. elect. ʒss. alb. generos. lb. iv. D. ma-  
 Fibr. Helleb. nigr. ʒij. ne ʒvj. vel viij.

## 4 Pilulæ.

Rx. Pil. Stabl. ʒj. D. 15. 20. vesperi.

## 5 Aliæ.

Rx. Extr. Cent. min. Aloes Gummof. ʒ. gr.  
 Helen. xv.  
 Pimpin. alb. a. ʒss. Tinct. Tart. q. f. M. F. Pilulæ  
 Hell. nigr. D. ut antea.



## 6 Pulvis abstergens.

- R. Arcan. duplic. ℥ij. XVIII. M.  
 Nitr. depur. ℥j. div. in 9. p. æq.  
 Cinnab. Antimonii gr. D. a meridie & vespere.  
 7 Mixture incidens & roborans.  
 R. Eff. Gent. rubr. Millefol. a. ℥iss. M.  
 Cort. Ont. D. mane & vespere 30. 40. gt.

## 8 Alia.

- R. Essent. Cort. Ont. ℥ij. D. ut antea.  
 Spir. Tart. ℥j M.

## 9 Alia.

- R. Tinct. ℥ii acr. Succin. ℥j. M.  
 Eff. cort. Ont. a. ℥ij. D. ut antea.

## 10 Emplastrum.

- R. Emplast. stomach. Ol. carvi, q. f.  
 G. Tacamah. a. q. f. applicetur abdomini.  
 M. F. Empl. irror.

## 11 Balsamum.

- R. Ol. N. M. expr. ℥ij Carvi. a. gt. xv.  
 dest. Anis. M. applicetur abdomini.  
 Chamom.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Cum alvus clausa ut plurimum magnas creet molestias & a deductione flatuum ad inferiora & excretionem magna pars curationis dependeat, alvus quam primum referenda est per Clysteres emollientes & leniter carminativos, cum oleis lenientibus & stimulo salino. Commode quoque Clysteribus hisce stimuli loco adduntur folia Tabaci & Centaurium minus. Laborabat ante aliquot annos quidam Colica gravissima cum abdominis inflatione & alvi obstructione pertinacissima, contra quæ mala omnia frustra exhibebantur: tandem folia Tabaci Clysteribus addebamus, quæ alvum feliciter referabant, ita ut ægrotus præter omnem spem feliciter restitueretur.
- 2 Hisce subjungantur lenia laxantia, inpr. talia quæ simul ventriculi & intestinorum tonum restituunt: quo nomine potissimum se commendant Pilulæ Stahlianæ & Becherianæ veræ, quæ alvo referata status expellunt primas vias abstergunt easque optime roborant: imo hisce ipsis flatus sæpius præcaventur, si interdum præservationis gratia sumuntur: si vero hæc haberi nequeunt, iisdem substituantur aliæ ex Extra-ctis amaris & Gummatibus paratæ. Vel præscribantur etiam infusa laxantia & roborantia.
- 3 Hisce jungantur & interponantur Pulveres digestivi, quo hoc modo materia flatuum eo melius removeatur: ita si v. g. mane exhibetur infusum laxans, a meridie dentur aliquot doses Pulveris digestivi cum Nitro & Cinnabari.
- 4 Cum vero intestinorum tonus a flatibus maxime debilitetur, agmen claudant Tonico discutientia & simul resolyentia, quo hoc modo constrictis & roboratis fibris per motum peristalticum materia flatuum eo facilius profligatur, & humorum decubitus ad intestina præcaveatur.
- 5 Exterius quoque flatuum discussionem optime promoveant supra allegata Emplastra, Fetus & Balsama, quare iisdem etiam in flatuum cura locus concedatur.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 In principio curationis fugiantur omnia carminativa, inpr. si magna flatuum adeest copia, cum enim constrictiones spasticæ sæpius hic & illic urgeant, & sic flatuum excretionem impediunt, metus est, ne per carminativa inpr. calidiora, spasmum cum insignibus doloribus augeantur & flatus cum majori damno incarcerentur.
- 2 Pari cautela opus est in applicatione clysterum carminativorum, quæ tantum abest, ut flatuum excretionem promoveant, ut potius majoribus incommodis, inpr. in subjectis sanguineis sensibilibus, anasam præbeant, quare in talibus casibus nullis, nisi emollientibus & leniter stimulantibus locus sit; si vero subjecta sunt phlegmatica, carminativa clysteribus emollientibus addita, etiam si aliquo modo penetrantiora sint, suo non carent usu.
- 3 Quod vomitoria concernit, omni studio ab eorum usu abstinendum est, etiam si aliquid in Ventriculo hæere videatur, quod sui remotionem postulet:

per hæc enim stomachus insigniter debilitatur & inflationi Ventriculi, de qua præcedente Tabula actum fuit, via sternitur: eo magis vero ab iisdem cavendum est, si symptomata hypochondriaco hysterica cum Flatulentia conjuncta sunt, exinde enim omnia symptomata gravissima redduntur.

- 4 Nec etiam Laxantia & Purgantia hic semper locum habent: illa enim uti Manna, Cassia, Folia sennæ &c. quatenus intestina magis relaxant, etiam si flatus ad inferiora promoveant, Flatulentiam & atoniam augent: hæc vero inpr. acriora insignes, præcipue in hypochondriaco hysterice subjectis, in abdomine excitant turbas & hinc ad ulteriorem Flatulentiam magis disponunt. Satiùs E. est loco horum supra allegatas Pilulas & Infusa in usum trahere.
- 5 Si ventriculi & intestinorum tonus restituendus est, remedia tonica diu continentur, alias nihil solidi efficitur, & Flatulentia ob leviores causas facile redit.
- 6 In Diætâ sollicite abstinendum est ab omnibus quæ Flatulentiam provocare possunt, v. g. a cibis flatulentis & fermentescentibus, refrigeratione pedum & abdominis.
- 7 Uti vita sedentaria multum confert ad flatuum generationem, ita motus moderatus & continuatus ad eorum dissipationem egregie convenit.
- 8 Si Flatulentia cum aliis affectibus, v. g. moliminibus Hæmorrhoidalibus, Mensibus, Lochiis &c. connexionem habet, convenit methodus in talibus casibus præscripta.

## CAPUT NONUM.

## DE

## Obstructione Alvi.

- I. *Definitio.* **O**bstrectio alvi est excrementorum, vel nimis tarda excretio, vel plenaria retentio, a segniore motu peristaltico originem trahens.
- II. *Differentia.*
  - 1 Respectu gradus: in aliis enim feces ad non adeo longum tempus, in aliis vero ad quatuor, quinque sex dies retinentur.
  - 2 Differt ab alvi adstrictione, quæ utpl. ab aliis morbis fovetur, & magis activum quid pro causa habet, cum e contra obstructio a causa passiva dependeat.
- III. *Signa.*
  - 1 Excrementorum alvi ultra consuetum tempus, aut ad aliquot dies retentio.
  - 2 Dolor abdominis gravativus & compressivus.
  - 3 Qui vel est vagus, ac plus vel minus lancinans.
  - 4 Adsunt varia incommoda a flatibus cum abdominis extensione & duritie.
  - 5 Hisce junguntur pressiones circa ventriculum cum angustia præcordiorum.
  - 6 In aliis appetitus est prostratus.
  - 7 Adeest etiam insignis corporis lassitudo.
  - 8 In aliis gravis occurrit inquietudo cum jectigatione corporis in lecto.
  - 9 In aliis observatur spirandi difficultas.
  - 10 Caput affligitur vertigine & dolore modo obtuso, modo magis acuto.
- IV. *Subiectum.*
  - 1 Homines siccioris corporis habitus, Cholerici scil. & Melancholici.
  - 2 Feminae hysterice & viri hypochondriaci, in quibus tamen sæpius magis alvus est adstricta, quam obstructa.
  - 3 Vitam sedentariam agentes & meditationibus indulgentes.
  - 4 Quibus scybala sunt nimis indurata.
  - 5 Ventriculi & intestinorum atonia laborantes.
  - 6 Flatibus obnoxii.
  - 7 Cibis siccioribus & crudis abutentes.
  - 8 Potum nimis parce assumentes.
  - 9 Largos sudores patientes.
  - 10 Sti-



10 Stimulum ad egerendum & ordinarium exonerationis tempus negligentes.

11 Febribus acutis afflicti.

#### V. Prognosis.

- 1 Alvi obstructio levior in assuetis, & ubi temperamentum respondet, malum est leve, inveterata autem ordinarie summe est periculosa & sæpius funesta.
- 2 Quo magis pertinax in colica & iliaca passione est alvi obstructio, eo gravius metuendum est periculum.
- 3 Alvi obstructio cum Flatulentia conjuncta semper gravior est quam simplex.
- 4 In tali casu gravissima quandoque excitatur Colica flatulenta, quæ eo pejor redditur, si saburra biliosa, ob alvi obstructionem in intestinis retenta, accedit.
- 5 Feces alvinæ nimis induratæ sanguinis cursum per vasa mesaraica impediendo stases & inflammationes intestini, in quo hærent, non raro producunt.
- 6 Venæ hæmorrhoidales internæ sæpius a talibus scybalis induratis, aut etiam propter fortiorem nisum rumpuntur.
- 7 Alvi laxitas in affectibus capitis & hypochondriacis, bona est, obstructio vero eisdem exasperat.
- 8 In omnibus morbis acutis satius est alvum esse liberam, quam obstructam.

#### VI. Remedia.

- 1 Diluentia & emollientia: Juscula cum hordeo parata, Decoctum prunorum, Passularum, Tamarindorum, Oleum Amygd. dulc. Gelatinæ &c.
- 2 Blanda evacuantia: Clysteres emollientes & leniter stimulant, Laxantia, Manna, Folia Sennæ, Pilulæ Becherianæ; Stahlianæ, contra obstructiones Hallensium. Sal. cathart. amarum, Salia neutra in majori dosi data.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Clyster emolliens.

R. Decoct. emoll. ℥ix.      Sal. Gemm. ℥ij.  
Ol. Chamom.      Vit. Ov. N. j. M.  
Ungu. elysmat. a. ℥vj.      F. Clyster. applicetur calide.

##### 2 Pilulæ laxantes.

R. Pil. Stahl. ℥j.      D. vesperi 15. 20.

##### 3 Aliæ.

R. Pil. de Ammon. ℥j.      D. 20. mane.

##### 4 Aliæ.

R. Pil. contr. obstruct. Hall.      D. vesperi 3. 4. 5.

℥ss.

##### 5 Aliæ.

R. Extr. Aloes Gumm. ℥j.      spiss. ℥ij. cum  
Helleb. nigr. ℥ss.      Ess. Absinth. q. s.  
Cent. min. ℥j.      F. Pil. ad pond. gr. j.  
Coloc. gr. iv.      D. vesperi 6. 7.

G. Ammon. solut. & in-

##### 6 Decoctum laxans.

R. Decoct. Prunor. ℥vj.      Colat. D. calide.  
Mann. elect. ℥ij. M.

##### 7 Electuarium laxans.

R. Pulp. Tamarind.      Sir. de pom. laxat. q. s.  
Passul. a. ℥j.      M. F. Electuarium.  
Diac. luc. jalap. ℥vj.      D. ℥ij. iij.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 In frequenti aut habituali alvi obstructione exhibeantur diluentia, emollientia ac potus sufficiens ad emolliendas feces alvinas & lubricanda intestina: & quam primum lenissimus ad egerendum adest stimulus, alvus, etiam cum aliquali vi & majori nitu, statim deponatur.
- 2 Corpus quoque quotidie motu moderato & continuato exerceatur, hic enim uti reliquas excretiones ita & hanc quam maxime promovet: ut taceam quod per hunc motus tonicus restituatur, peristalticus simul augeatur & hoc modo segnitie alvi impediatur.
- 3 Si vero feces sunt nimium induratæ & affectus nimium urget, ita ut graviora metuenda sint mala, Clysteres ex emollientibus & oleis paratæ injiciantur, qui in hoc malo præsentiorum & celeriorum edunt effectum, quam Purgantia remedia.
- 4 Si alvus hoc modo aperta est, convenit spatium ali-

quot dierum vel alternis diebus fumere Pilulas Stahlianas, aut alias alvum leniter stimulant, & motum peristalticum augentes. Cui fini etiam inserviunt Decocta & Electuaria aliquo modo stimulantia.

- 5 Si vero alvi obstructio est admodum pertinax, ita ut Clysteribus & internis emollientibus nihil effici queat, hisce interdum interponantur alia Purgantia, ut alvus eo citius referetur. Tali in casu optimum edit effectum Infusum cum Foliis Sennæ paratum. Medicus hujus loci mihi retulit, se sæpius Infuso tali ex Decoct. Prunorum ℥. iv. & Fol. Senn. ℥ij. parato, pertinacissimas alvi obstructiones, nullis aliis cedentes remediis, feliciter sustulisse. Tractabam hic aliquando feminam Passione Iliaca cum vomitu stercoreo laborantem, & cum alvus nullo modo referari posset, ægrota mane immittebatur in balneum ex radicibus & herbis emollientibus paratum & in eo ultra integram horam relinquebatur: exempta ex eo clyster emolliens injiciebatur & abdomen unguento emolliente calido continuo inungebatur: a meridie balneum denuo ingrediebatur, ac clyster & unguentum continuabatur: tandem vesperi post egressum e balneo, clyster ex Lactis & Olei oliv. a. ℥. ss. cum acris stimulo magna vi ope syringæ injiciebatur: & hinc elapso horæ quadrante alvus aperiēbatur, ac femina præter omnem spem restituebatur.

- 6 Si alvi obstructio aliis morbis jungitur, & eos, uti solet, graviores reddit, per Clysteres & Pilulas Stahlianas aperiatur.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Si diluentia & potus sufficiens ægrotis conceditur, motus ejus continuus sit comes, quo neglecto sola illa diluentia, tonum intestinorum magis relaxant, adeoque segnitie alvi augment.
- 2 Motus tamen nimius, inpr. neglecto sufficiente potu, fugiatur, quia alvi obstructionem promovet.
- 3 Purgantibus acris & continuatis nullus quoque concedatur locus, quoniam utpl. pertinaciorum alvi obstructionem post se relinquunt, & gravioribus malis viam sternunt. Vidi hocce in femina 54 circiter annorum, quæ tali habituali alvi obstructione laborabat, contra quam a carnifice hujus loci accipiebat nodulum purgantem, quem cum spatio 14. dierum quotidie assumeret, optime quidem purgabatur, ita ut quovis die duodecies, imo sedecies, alvum copiose deponeret: sed postea in pertinacissimam alvi præcipitabatur obstructionem, quam Passio Iliaca pressa pede sequebatur, a qua non nisi magno labore liberabatur.
- 4 Fugiantur quoque frequentia laxantia, quoniam si Natura huic stimulo assuecit, alvum postea non nisi eodem stimulo admonita solvit. Vivit hic femina quædam, quæ frequenter Pilulas contra obstructiones ad alvum aperiendam sumit, sed eo jam perducta est, ut alvum non nisi sumptis hisce Pilulis deponere queat.
- 5 Si alvi obstructio alios morbos comitatur, respiciendum est, an morbus primarius alvi apertionem commode ferat: id quod principaliter usum habet in Febribus acutis, quamvis enim quædam earum alvi apertionem admittant, & symptomata per eandem imminuantur, exanthematicæ tamen eam ægreferunt.

## CAPUT DECIMUM.

### D E

#### Stranguria.

I. *Definitio.* **S**tranguria est difficilis & laboriosa urinæ excretio, ubi urina solum guttatim cum dolore colli vesicæ & urethræ prodit, cum continuo ad mingendum stimulo conjuncta.

#### II. Differentia.

##### 1 A Dysuria,

a Quod in hac urina non guttatim, sed sæpius in suffi-



sufficienti copia, quamvis cum magno nisu & labore emittatur, in Stranguria vero guttatim effluat.

*b* Quod in Dysuria inter mingendum dolor æstuans & post mictionem interdum aliquandiu continuans observetur, qui e contra in Stranguria sub mictione est magis frigescent & postea ardens.

*c* quod in Dysuria continuus ad mingendum stimulus desit, in Stranguria vero continuo urgeat.

*d* Quod Dysuria ut plurimum a viarum urinarum vitio, Stranguria vero magis ab urinæ aliarumque rerum molestarum stimulo dependeat.

2 Ab *Ischuria*: in qua urinæ excretio plenarie supprimitur, in Stranguria vero sæpius & guttatim prodit urina.

3 Alia est *levior*, alia *gravior* & diu durans.

4 Alia est *idopathica*, quando causa hæret in vesica: alia vero *sympathica*, quando ab alio morbo fovetur & producitur.

### III. Signa.

1 Frequens stimulus ad excernendam urinam.

2 Urina prodit guttatim.

3 Concurrit dolor strictorius in collo vesicæ.

4 In urethra inter mingendum percipiunt sensum refrigerii.

5 Quem sequitur perfecta mictione dolor ardens.

6 In reliquo corpore inpr. vero ejus habitu sentiuntur horrores frequenter repetentes.

### IV. Subjectum.

1 Homines spongiosiori corpore præditi.

2 Nephritici & Hæmorrhoidarii.

3 Qui potum fermentescentem & nondum defecatum, cerevisiam scil. recentem & mustum assumerunt.

4 Cibis crudis & fermentescentibus utentes.

5 Diverso potu uno eodemque tempore, aut etiam minus consueto fruantes.

6 Corpus, præcipue abdomen calidum, una cum inferioribus partibus refrigerantes.

7 Pollutione nocturna frequentius laborantes.

### V. Prognosis.

1 Stranguria per se quidem periculo vacat, insignia tamen parit incommoda, præcipue si diutius durat: vid. *Forest. Lib. XXV. Obs. 6.*

2 Stranguria ab urinæ acrimonia dependens facilius curationem admittit, quam quæ a vesicæ vitio originem habet.

3 In senibus difficulter curatur & eos sæpius ad mortem usque comitatur.

4 Stranguria si diutius durat, colli vesicæ exulceratio metuenda est.

5 Stranguria frequentius sine prævio errore in diæta affligens, prodromus est calculi renalis.

### VI. Remedia.

- 1 Acrimoniam temperantia: Nitrum depur. regeneratum, Antimoniatum, Conchæ citratæ, salia digestiva. Emulsiones ex Amygd. dulc. Sem. Card. Mar. Papav. alb. 4. frig. major Potu. calidus. Mucilago Hordei, Sperm. Ceti, Oleum Amygd. dulc. Decoct. Glycyrrh. Raparum, Radix Malvæ cum Nummularia in jusculo cocta. Aut Decoct. Malvæ cum Sympo violarum, Syrupus Althææ. Gummi Arabicum. Pilulæ ex Terebinth. coct. clysteres emollientes. Externe Sevum hircinum, Fetus emollientes, Ol. Viol. Chamom. Nymph. Papav. &c. Cepæ assatæ,
- 2 Motus spasticos sopientia: Nitrum aliaque præcedentia, Cinnabaris,
- 3 Tonum roborantia: Cortices Aurant. pulverisati & Essent. Cort. Ont. Spec. de Hyac. Corall. rubr. Tinct. St. Ludov.

#### Formula Remediorum.

1 Potiuncula temperans.

Rx. Aqu. Petrosel. Conch. citrat. a. Zj.  
Cherefol. Sacch. perlat. Zij. M.  
C. C. citr. a. Zfs. D. sing. v. horis cochlearia  
Tart. Vitriolat. aliquot.

2 Emulsio temperans.

Rx. Amygd. dulc. Zvj. Aq. Cherefol.  
Sem. Card. Mar. Zij. Scabios.  
Papav. alb. Zij. F. l. a. Emulsio.

Colat Zvij adde

Matr. Perl. Zj.

Sacch. Canar. q. s. ad

3 Pulvis anodynus.

Rx. Nitr. regener.

Lap. St. a. Zij.

Cinnab. St. gr. XII.

4 Pulvis tonicus.

Rx. Lap. St.

Co all. r. ppt. a. Zj.

Spec. de Hyac. Zfs.

5 Essentia Tonico discutens.

Rx. Ess. Cort. Ont.

Alexiph.

VII. Methodus medendi.

1 Cum Stranguria diversa præsupponat causas, ad eas ante omnia in curatione respiciendum est. Si E. ex vitio primarum viarum orta est Stranguria, exhibeantur absorbentia & Salia digestiva ad temperandam & abstergendam materiam noxiam.

2 Quo facto dentur postea lenia laxantia, uti sunt Rhabarbarum & Pilulæ Stahlianæ, Becherianæ aliæque cum hisce aliqualem convenientiam habentes respectu Extractorum amarorum, Gummarum & Myrrhæ. Ut tales Pilulæ subinde sumantur, inprimis, quando subjecta ad Stranguriam sunt disposita & malum frequentius recurrit.

3 Hisce subjungantur Essentiæ incidentes, uti sunt Tinct. Antimonii acris, quæ sæpius sola in vehiculo largo calido sumpta totum malum prompte profligat. Huic jungi possunt adhuc aliæ, Essentia scil. Succini, in moderata dosi, Essentia Pimpinellæ albæ, Cort. Ont. &c.

4 Si vero a refrigeratione dependet Stranguria, sumantur frequentius juscula calida, cum semine Carvi, aut etiam potius Thee & Caffè. Insignem quoque efficaciam habent liquores & Aquæ destillatæ spirituosæ cum Essentia carminativa, Cort. Ont. &c.

5 Externe in tali casu conveniunt frictions abdominis & pedum cum linteaminibus calidis, aut etiam Fetus Linimenta Cataplasmata emollientia, Cepæ assatæ &c. pectini applicatæ, ut hoc modo molestia illa strictura mature tollatur.

6 Si urinæ acrimonia causa est Stranguriæ, in usum trahantur Nitrosa cum absorbentibus & salibus digestivis mixta, quibus etiam Cinnabaris ad temperandos motus addatur. Aut etiam præscribantur supra laudata alia temperantia & emollientia, Decoctum scil. Raparum, Chamomillæ Althææ, Oleum Amygdalarum dulcium cum Spermate Ceti, Emulsiones &c.

7 Si venereum quid subest, aliquandiu exhibeantur & continentur Tinctura Antimonii acris cum Essentia succini, cui etiam aliquid Balsami Peruviani vel de Copniba, si subjecti conditio aliæque circumstantiæ ejus usum permittunt, addatur, ut hoc modo abstersio promoveatur & causa mali tollatur.

8 Idem etiam observetur, si ab alia causa, aut etiam ab urina exulceratio quædam in vesica vel urethra producta fuit & affectum fovet.

9 In Stranguria habituali præcipue senum, præter Clysteres emollientes & Carminativos, Pilulæ Stahlianæ frequenter sumantur, iisque interponantur & subjungantur partim abstergentia salina, partim Essentiæ incidentes & roborantes ac carminativæ, eæque continentur, ut hoc modo illud quod molestias creat, removeantur, & partes debilitatæ eo melius roborentur.

### VIII. Cautela Practicæ.

1 Quamvis alvi laxitas multum ad Stranguriæ curationem conferat, acria tamen Purgantia, quia malum augment aut ejus frequentiores recursum causantur fugiantur.

2 Clysteres quoque non sint nimium emollientes, præsertim in senibus, ubi partes jam sunt insigniter laxæ, maiorem enim producant laxitatem vesicæ & maiorem humorem ad vias urinarias decubitum, semper E. iisdem addantur lenia carminativa.

3 Moderate etiam volatilia in subjectis, inprimis ju-



nioribus & Plethoricis præscribantur, insignes enim, si abusus accedit, in corpore excitant turbas: quare non nisi urgente necessitate in usum trahantur.

- 4 Ipsa quoque incidentia sint blanda, aut si sunt fortiora, semper cum largiore vehiculo fumantur.
- 5 Diuretica fortiora & nimis stimulantia in Stranguriæ cura exulent, quoniam majorem humorum ad renes affluxum producant, & hinc malum augment.
- 6 Opiata quoque non nisi doloribus maxime urgentibus & quidem refracta dosi cum aliis temperantibus exhibeantur.
- 7 Refrigerantia, inpr. actu frigida, etsi interdum aliquid præstiterint, non facile in usum trahenda sunt, quia malum ordinarie exasperant.
- 8 In subjectis Plethoricis ad Stranguriam pronis Venæ Sectio præservatoria non negligatur.
- 9 In Stranguria sympathica nunquam aliquid præscribatur, quod primarium affectum turbare queat.
- 10 In Diætâ sollicite abstinence ab omnibus iis, quæ quocunque modo ad affectus provocationem aliquid conferre queunt, inpr. vero a cibo & potu seculento & fermentescente.
- 11 Provide quoque alvi libertas conservetur, quem in finem lenia laxantia interdum præservationis gratia fumantur, ut primarum viarum vitia mature tollantur.
- 12 Ut quoque viæ abstergantur, temperantia cum Cinnabarinis ad præcavendam Stranguriam non negligantur.
- 13 Urina nunquam diu retineatur, sed sæpius, aut præsentente leniori etiam stimulo statim excernatur.
- 14 Vinum bonum diureticum, ut præcipue est Rhenum, ad Stranguriam dispositis maxime convenit, abusus tamen vitetur.
- 15 Fugiant quoque tales vitam sedentariam & corpus potius moderato motu exerceant.
- 16 Veneris quoque exercitium frequens, ad hunc affectum di ponens, quam maxime vitetur.

## CAPUT UNDECIMUM.

### D E

#### Dysuria.

I. *Definitio.* **D**ysuria est urinam excernendi difficultas, cum magno nisu atque impetu & sæpius doloribus stipata, modo a vesicæ, modo a renum, modo ab urethræ vitio originem trahens.

II. *Differentia.*

- 1 A *Stranguria*. Vid. *Tab. præced.*
- 2 Ab *Ischuria*, ubi urinæ excretio prorsus supprimitur, cum e contra in Dysuria adhuc in sufficiente copia urina excernatur.
- 3 *Ratione causarum.*
  - a Alia dependet ab urinæ nimia acrimonia, sed rarius.
  - b Alia ortum trahit ab exulceratione vesicæ.
  - c Alia carunculam veneream pro causa agnoscit.
  - d Alia conjunctam habet erosionem sphincteris.
  - e Alia ab inflammatione & mala constitutione partium vicinarum, intestini recti, vaginæ uteri &c. fovetur

III. *Signa.* Hæc quidem sunt satis manifesta, observandum tamen est, quod sequentia præcipue occurrant:

- 1 Debito tempore adest qui sem ad mingendum stimulus, magno tamen nisu & pressione opus est ad urinam expellendam.
- 2 Sub ipsa excretionem vel magnæ vel parvæ urinæ quantitatis dolor ordinarie maximus, sed pro diversitate causarum varius ægrotos affligit, æstuosus scil. lancinans, tendens.
- 3 Interdum vero præter magnum illum nisum & pressionem, nullus vel paucus sentitur dolor: quod tamen rarius contingit. vid. *Forestus Lib. XXV. Obs. 6. in Scholiis.*

4 Si dolor sub mictione urget, etiam aliquandiu post illam continuat.

IV. *Subjectum.*

- 1 Senes magis quam reliquorum ætatum homines.
- 2 Calculo renum & vesicæ laborantes.
- 3 Stranguria frequentius affligit.
- 4 Vesicam, ejusque sphincterem aut urethram exulceratam habentes.
- 5 Qui cantharides assumerunt & hinc vesicæ exco-riationem reportarunt.
- 6 Quibus caruncula venerea est in urethra.
- 7 Puerperæ interdum ob admissum frigus. vid. *Forestus l. a. obs. 8.*
- 8 Nonnunquam etiam feminæ quibus menstruæ purgationes imprudenter suppressæ sunt. *ibid. obs. 6.*
- 9 Femine hysterice interdum.
- 10 Diætâ cruda, falsa & acri utentes.

V. *Prognosis.*

- 1 Si malum est levius, per se nullum periculum involvit.
- 2 Si autem causæ graves & fonticæ, exulcerationes scil. & inflammationes graviores concurrunt, periculo non vacat.
- 3 Quo magis diuturna est Dysuria & quo magis dolores urgent, eo facilius Febris vel convulsiones accedunt.
- 4 Dysuria in Ischuriam degenerans majori periculo exponit egrotantes.
- 5 In senibus decrepitis malum utpl. est incurabilis & sæpius lethale. B. Pater meus post annum septuagesimum frequentius hoc malo corripiebatur, & quamvis per remedia assumpta mitigaretur, semper tamen redibat: tandem anno ætatis septuagesimo sexto urina magis magisque imminuebatur, & aliquoties Ischuria accedebat: unde propter humores acriores falsos ad peripheriam corporis latos multa in cuti & subjacentibus partibus oriebantur ulcera manantia & vicinas partes depascentia, quibus tandem accedebat insignis virium consumptio & post aliquot menses placida mors.
- 6 Dysuria si diutius durat post se trahit exulcerationes viarum urinaryarum.
- 7 Si a caruncula venerea dependet, nunquam nisi hac sublata tollitur.
- 8 Si cum urina excernitur mucus viscidus acris, in Dysuria, eo gravius est malum, & eo difficilius etiam curatur. Vidimus hoc in Viro septuagenario, qui per plures annos talem mucum cum ingentibus doloribus excernebat: mucus hic adeo viscidus erat, ut non nisi cum summo labore exprimi posset. Tandem marasmo consumptus moriebatur.
- 9 Gravior etiam est Dysuria ab exulceratione vesicæ dependens & multum temporis ad curationem requirit. Laborabat ante aliquot annos femina tali Dysuria cum ingenti dolore ardente, qui ad frequentem urinæ excretionem stimulabat: cum urina excernebatur materia purulenta & quo diutius urina retinebatur, eo magis cruenta ea erat: tandem post varia exhibita remedia elapso mense tertio restituebatur.

VI. *Remedia.*

- 1 Alvum aperientia: Clysteres emollientes & carminativi, Magnesia alba, Pilulæ Becherianæ, Rhabbarbarum &c.
- 2 Blanda diuretica & spasmos demulcentia, Arcanum duplic. Tart. Vitriolat. Nitrum, Absorbentia, Cinnabaris M. P. de Cynoglossa Emuls. Vid. *Tab. præcedens.*
- 3 Resolventia. Rad. Pimp. alb. Vincetoxici, Ari, Tinct. Tart. Antimonii, Ess. succin. &c.
- 4 Externa demulcentia, Fodus, Cataplasmata, unguenta &c. ex Althæa, Meliloto, Malva, Parietaria, Chærefolio, Ruta, Lacte, Butyro, Oleo Scorpionum &c.



## Formula Remediorum.

## 1 Cataplasma ex Foresto.

R. Herb. Pariet. mij. tur in lacte, adde Buty-  
 Cheresol. miss. ri rec. ℥ij. Ol. Scorp. ℥iss.  
 Incisa ad mollitiem coquant. calide pectini applicetur.

## 2 Aliud.

R. Cepar. assat. N. vj. Scorp. a. ℥ss.  
 Ol. Chamom. Cort. Ont. Dj. M.  
 Lil. alb. applicetur ut antea.

## 4 Unguentum.

R. Ungu. de Alth. dest. Anis. ℥j. M.  
 Martiat. a. ℥j. imungatur pectini & peri-  
 Ol. Aneth. ℥ss. neo.

## 4 Aliud.

R. Ungu. Martiat. Ol. laurin. a. ℥ss.  
 Agripp. M. aplicetur calide.

Reliquas Formulas internas vid. Tab. præced. & se-  
 quentibus.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In curatione hujus affectus respiciendum est in gene-  
 re ad alvi laxitatem, hæc enim ad diuresim promo-  
 vendam multum confert: obtinetur autem hæc la-  
 xitas potissimum per clysteres emollientes & aliquo  
 modo carminativos, quibus salinus stimulus adden-  
 dus est. Huic fini etiam inserviunt Pilulæ Stahlianæ,  
 Becherianæ & balsamicæ viscerales, Extract.  
 Panchymag. Crollii, Rhabarbarum &c.
- 2 Postea exhibeantur lenia Diuretica simul temperan-  
 tia, qualia sunt nitrosa, Salia digestiva cum absor-  
 bentibus & Cinnabari mixta, ut hoc modo spasticis  
 motibus aliquo modo relaxatis urina eo melius ex-  
 cerni queat. Huc pertinent etiam reliqua tempe-  
 rantia, Emulsiva & mucilaginosæ præcedente Ta-  
 bula allegata.
- 3 Hisce interponi possunt Infusa aut Decocta ex Ra-  
 dicibus incidentibus & resolventibus, aut si magis  
 placent Essentiæ Vegetabilium horum, ex in usum  
 trahantur & cum Essentia Succini, Tinctura Anti-  
 monii acri aut Tartari misceantur.
- 4 Si a calculo Dysuria dependet egregie convenit post  
 Clysteres Decoctum nephriticum Foresti, quod &  
 emollit, & leniter pellit. Huic jungantur pulveres  
 antispasmodici, ita ut Decoctum & mododisti pul-  
 veres alternatim sumantur. Emulsiones cum Semi-  
 ne Card. Mariæ & Lapathi majoris paratæ hic quo-  
 que locum habent. Quoad cætera, reliqua quæ de  
 Calculo dicta sunt, etiam observentur.
- 5 Dysuriæ, quæ a cantharidibus ortum trahit, lac calidum  
 copiosius sumptum, Oleum Amyg. dulc. Sperm.  
 cet. aliaque mucilaginosæ insignem ferunt opem.
- 6 In Dysuria ab exulceratione orta, exhibeantur &  
 observentur ea, quæ Tabula de Exulceratione Ve-  
 sicæ dicta fuerunt.
- 7 Si dependet a caruncula Venerea, ea juxta metho-  
 dum suo loco præscriptam removeatur.
- 8 Externe in quavis Dysuria ea imponantur, quæ  
 stricturam relaxant & excretionem urinæ promo-  
 vent, uti sunt supra dicta externa pectini ap-  
 plicanda.

## VIII. Cautela Præctica.

- 1 In aperienda alvo abstinendum est a stimulantibus  
 acerbis remediis, quia talia majorem stricturam pa-  
 riunt & dolores augment.
- 2 Deinde Medicus provide inquirat, an cum aliis &  
 cum quibus affectibus, Dysuria connexionem habeat,  
 & hinc in cura semper respiciat ad effectum prima-  
 rium, qui scil. Dysuriam fovet, quod si negligit, vel  
 frustra laborat, vel malum augeat.
- 3 Diuretica fortiora prorsus hic nullum habent u-  
 sum, a quacunque etiam causa Dysuria dependeat,  
 inpr. si statim in principio exhibentur: producant  
 enim majorem humorum affluxum ad renes, ac  
 metuendis febribus & convulsionibus portam ape-  
 riunt. in calculosis vero vel calculos in ureteres  
 impellunt, vel renum inflammationem ansam præ-  
 bent: si exulceratio jam adest, eam augment.

- 4 Si dolores nimium urgent, granum unum aut al-  
 terum Massæ Pil. de Cynoglossa quidem adeos mi-  
 tigandos prodest, abusus tamen est vitandus.
- 5 Si exulceratio vesicæ Dysuriam fovet, vitetur exces-  
 sus in remediis terebinthinatis, succinatis & Myr-  
 rhatis, quamvis enim sint optima in exulceratio-  
 nibus remedia, cautela tamen h. l. opus est, quo-  
 niam humores nimis commoveant & affluxum eo-  
 rum ad partem affectam cum damno augment: qua-  
 re semper refracta dosi aliis admisceantur abster-  
 gentibus.
- 6 Balnea interdum in Dysuria usum habent, inpr.  
 quando a calculo impactato fovetur, nimis tamen  
 calidorum usus vitetur.
- 7 Præservationis gratia alvi libertas semper conserve-  
 tur, & Venæ Sectiones consuetæ non negligantur.

## CAPUT DUODECIMUM.

D E

## Mictione imminuta.

- I. *Definitio.* **M**ictio imminuta est parciore urinæ ex-  
 cretio, vel a feri defectu, vel a se-  
 cretione urinæ deficiente aliisque causis internis ori-  
 ginem trahens.
- II. *Differentia.*
  - 1 Alia est *mitior*, quæ v. g. potus defectum, & su-  
 dores nimios sequitur, utpl. parva vel nulla in-  
 commoda secum trahit.
  - 2 Alia est *gravior*, quæ aliis morbis v. g. Hydropi  
 cedit, & gravia pathemata conjuncta habet.
  - 3 Differt a Dysuria, quod in hac ordinariè dolor inter  
 mingendum urgeat, qui in mictione imminuta deest.
- III. *Signa.*
  - 1 Urinæ parciore excretio nec sero in corpore conten-  
 to, nec potui assumpto quantitate respondens.
  - 2 Tardior etiam ejusdem excretio.
  - 3 Nullus ordinariè sub mictione sentitur dolor.
  - 4 Concurrent hinc inde in abdomine tensiones &  
 pressiones.
  - 5 Quibus junguntur internæ angustiae.
  - 6 Accedunt etiam in malo provectione ardores aut  
 febriles commotiones, inquietudines & jectigatio-  
 nes corporis.
  - 7 Vires languescunt.
  - 8 Appetitus prostermitur.
  - 9 Somnus interrumpitur.
  - 10 Dolores quoque conjunguntur strictorii, in renibus  
 & pectine se potissimum exerentes.
  - 11 Nonnunquam etiam in sensibilibus & juniori-  
 bus superveniunt motus convulsivi.
- IV. *Subjectum.*
  - 1 Potum sufficientem negligentes,
  - 2 Spissitudine sanguinis laborantes.
  - 3 Feminae hystericae & viri hypochondriaci,
  - 4 Nephritide afflicti, aut quibus alias renes spastice  
 constringuntur.
  - 5 Febricitantes & alii nimios sudores patientes.
  - 6 Qui partes inferiores & abdomen nimis refrigerant.
  - 7 Qui in affectibus renum aliisque abdominis morbis  
 adstringentibus imprudenter tractati fuerunt.
  - 8 Cachexia, Leucophlegmatia aut Anasarca afflicti.
  - 9 Tympanitici & Ascitici.
  - 10 Infartibus & Scirrhis viscerum abdominis labo-  
 rantes.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Si malum est mitius & solum a defectu potus, aut  
 alia leviori causa dependet, periculo caret.
  - 2 Quæ vero aliis morbis juncta est, majore periculo  
 ægrotos exponit, facile enim in totalem urinæ sup-  
 pressionem degenerat.
  - 3 Quo magis imminuitur urina, eo magis partes in-  
 teriores a sero obruuntur, & eo facilius etiam va-  
 rii metuendi sunt affectus serosi.
  - 4 Si in Cachexia & Leucophlegmatia urina magis ma-  
 gisque imminuitur, Hydrops ante fores est.



- 5 Si in urinæ imminutione sudor in larga fluit quantitate, bonum est.
- 6 Si autem prorsus nulla adest vicarie feri excretio, eo facilius symptomata sub signis recensita generantur.
- 7 Uti in Hydrole largius urinæ profluvium bonum, ita e contra paucum malum est.
- 8 Urinæ imminutio ab aliis morbis dependens nunquam, nisi sublata illorum causa, tollitur.

VI. *Remedia.*

- 1 Diluentia & Resolventia Diuretica. Potus sufficiens. Radix Vincetoxici, Pimpinellæ albæ, Ononidis, Bryoniæ, Ari, Caryophyllatæ, Petroselinii &c. Herb. Bellid. Cherefol. Petrosel. Sem. Violar. Milii Solis, Tinct. Tart. ℥ij &c.
- 2 Alvum aperientia: Clysteres emollientes & carminativi. Pilulæ balsamicæ.
- 3 Strictura relaxantia: Nitrum, absorbentia Salia digestiva, Cinnabaris, Balnea, Fetus, Cataplasmata &c. Tab. de Dysuria allegata.

*Formula Remediorum.*

## 1 Infusum resolvens &amp; Diureticum.

- Rx. Rad. Onon. Bellid. a. mij.  
 Vincetox. Flor. Genist.  
 Pimp. alb. a. ℥ss. Violar. a. p. ij.  
 Ari ℥ij. Cort. Ont. ℥ij.  
 Herb. Petrosel. Inc. infund. in Vini albi ℥.iv.  
 Capill. ♀. vel v. D. quotidie ter ℥iv. vj.

## 2 Infusum Theiforme.

- Rx. Herb. Veron. Inc. infund. Aq. fervent. sumatur calide.  
 Virg. Or. a. mij.

## 3 Mixtura resolvens.

- Rx. Tinct. Tart. ℥ij. D. Mane & vespere gt. 30.  
 Ess. Succ. ℥j. M.

## 4 Tinctura temperans.

- Rx. Liq. terr. fol. Tart. ℥ss. D. Mane & vespere gt. 40.

## 5 Clyster emolliens &amp; carminativus.

- Rx. Decoct. emoll. ℥vj. Sal. Gemmæ ℥j.  
 carmin. ℥ij. Vit. Ov. N. j. M.  
 Ol. Oliv. F. Clyster.

## Chamem. a. ℥vj.

## 6 Potiuncula temperans &amp; anodyna.

- Rx. Aq. rub. id. ℥iv. Cinnab. ℥ij. ℥j.  
 Nir. Regener. Sacch. canar. ℥ij. M.  
 Tart. Vitriolat. a. ℥ij. D. cochl. aliquot sing. 3.4. hor.

## 7 Oleum externum.

- Rx. Ol. Scorp. ℥j. Cort. Ont. a. ℥ss. M.  
 Aneth. ℥ij. applicetur calide regioni redest. Anis. num, pectini & perinæo.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Si imminutio Urinæ a defectu potus originem trahit, concedatur ægrotantibus largior potus, cui jungantur alia humectantia calida, juscula, Cremor hordei, Gelatinæ tenuiores &c.
- 2 Si serum a nimis sudoribus exhaustum est, & mictio imminuta exinde originem trahit, eadem conveniunt: Si vero sudores adhuc præsentis sunt & urgent, interponantur temperantia, absorbentia & nitrosa.
- 3 Ubi Plethora mictioni deficienti occasionem præbet, ea per venæ sectionem mature imminuatur.
- 4 Quando huic simul spissitudo juncta est, eadem venæ sectio locum habet, postea vero ei subjungantur incidentia & motus corporis moderatus ac continuatus.
- 5 Si alia mucida humorum spissitudo præsens est, incidentibus leniter diureticis interponantur laxationes cum Pilulis Becherianis.
- 6 In omni Urinæ imminutione respiciatur ad alvi laxitatem, eaque vel per modo dictas Pilulas, vel per alia lenia laxantia & clysteres conservetur.
- 7 Si urinæ imminutio alios morbos, Malum v. g. hypochondriaco-hystericum, Cachexiam, Hydropem &c. conjunctos habet, ad hosce primario respiciendum est, iique convenienti methodo tractandi sunt.

VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 In urinæ imminutione mature auxilium cum debita circumspectione feratur, ne plenaria ejusdem sequatur suppressio.
- 2 Abstinendum tamen est a Diureticis fortioribus, quæ vel utpl. urinam magis imminuunt, vel ejus plenariam suppressionem producant.
- 3 Id quod eo magis in urinæ imminutione a feri defectu originem trahente, observandum est, talia enim fortiora diuretica exhibita, sanguinem nimium resolvendo corpus magis exsiccant.
- 4 In corporibus vero plethoricis gravissimas & periculosas sanguinis ad renes congestiones ac inde dependentes inflammationes & ulcerationes producant.
- 5 Si spissitudo sanguinis affectum fovet, eadem mala ab iis remediis metuenda sunt & adhuc graviora.
- 6 Alvi libertas quidem optima est in talicasu, nunquam tamen fortiora & acria exhibeantur Purgantia, quoniam malum augent. Idem judicium ferendum est de clysteribus.
- 7 Si emollientia sunt exhibenda, respiciatur primo annon major hæcce sequi possit ad renes humorum depositio majusque exinde urinæ impedimentum, dein an morbi complicati talium remediorum usum commode ferant.
- 8 Opiata quidem hic interdum suo non carent usu, præcipue ad stricturas imminuendas, ubi vero laxitas in viis urinariis occurrit, ea omnimodo fugienda sunt, præsertim in senibus. Tali in casu roborantia magis profunt.
- 9 Vita sedentaria fugiatur in urinæ imminutione, e contra vero corpus moderato motu exerceatur.

## CAPUT DECIMUMTERTIUM.

## D E

*Ischuria, sive urinæ suppressione.*

I. *Definitio* Ischuria est urinæ plenaria retentio aut suppressio, a variis causis ortum trahens.

II. *Differentia.*

- 1 Alia est *renalis*, quando causa suppressionis in renibus & ureteribus hæret.
- 2 Alia vero est *vesicalis*, quando Ischuria a vitio vesicæ originem trahit: & hæc iterum dividitur in  
*a Propriam*, quando vesica urina quidem maxime repleta est, propter spasticam aut colli vesicæ constrictionem emitti nequit.  
*b Impropriam*: ubi urinæ minus copiosæ excretio per alias causas impeditur.

III. *Signa.* Hæc respectu causarum & partis affectæ varia sunt.

- 1 Si causa hæret in *renibus*, aut *ureteribus*, occurrunt  
*a* Dolores fixi lumborum gravativi, ita ut spinam dorsi vix flectere queant ægrotantes.  
*b* Hisce accedunt sæpius etiam dolores ischiadici.  
*c* Jungitur in aliis cardialgia satis gravis:  
*d* In aliis vero non solum nausea, sed actualis vomitus observatur.  
*e* Acutissimi sunt & pungentes dolores cum vomitu & stupore cruris, si calculus ureteribus est impactus.  
*f* In vesica paucissima vel nulla deprehenditur urina, etiam si catheter immittatur & suctio instituitur.
- 2 Si ex *vesicæ* vitio nata est Ischuria, ægroti sentiunt  
*a* Vel pressionem vel tensionem in pectine.  
*b* Deprehenditur etiam tactu tumor in regione vesicæ & perinæo.  
*c* Percipiunt quoque patientes ponderis sensum in dicto loco.  
*d* Adest mejendi desiderium cum conatu irritato.  
*e* Si catheter in vesicam immittitur urina copiose effluit.
- 3 Si Ischuria dependet a tumore inflammatorio  
*a* Adest dolor acutus & æstuans.

b Con-



6 Concurrit etiam Febris cum siti deliriis aliisque febrilibus symptomatibus.

4 Si calculo originem debet, adsunt signa *Tab. de calculo Vesicæ* recensita

5 Si a grumo sanguinis, aut pure dependet, præcessit mictus ejusdem.

6 Si mucus ejusdem est causa, antea apparuit in urina.

7 Si vero a caruncula fovetur, ea per stylum in urethram immisam detegitur.

#### IV. Subjectum.

1 Juvenes & Viri temperamenti Sanguinei ac Plethorici.

2 Spastica sphincteris constrictione tam idiopathica, quam sympathica, uti in Tenesmo, laborantes.

3 Congestionibus gravioribus ad renes obnoxii.

4 Renum & vesicæ calculo afflicti.

5 Urinam nimis diu retinentes. Talem urinæ suppressionem ante viginti annos passus sum: tempore matutino cum quibusdam virginibus, iter parantibus, potum Caffè in copia sumebam, easque postea comitabar, itinere continuo iisdem cinctus, urinam emittere nequibam: tandem in patriam dictarum virginum latus, in consortium aliorum honestorum virorum & feminarum veniebam: tabulæ affixi hærebamus in feram usque noctem, tempus edendo, bibendo, cantando & fidibus canendo terentes: continui quidem ad mingendum aderant stimuli, sed in tempestiva verecundia me ab urinæ emissionem retinebat: tandem cum post mediam noctem omnes lectum petiissent, urinam emittere volebam, sed tantis statim corripiebar. post leniorem etiam nisum, doloribus, ut Lipothymia sequeretur, qua finita, pedibus amplius insistere nescius, manibus & genibus suffultus cubiculum petebam: quoniam vero dolores continuo urgebant, Aquam uti vocant, vitæ, quam in cubiculo deprehendebam, larga copia sumebam: tandem elapsa integra fere hora sequebatur primo urinæ stillicidium cum acerbissimis urentibus doloribus ac tenesmo gravissimo & tandem urina in maxima copia excernebatur, atque hoc modo omnes molestiæ, excepta lassitudine, quæ spatio aliquot dierum urgebat, cessabant. Nemini tamen autor sum, ut in tali casu pari remedio, quod desperatio magis, quam sana ratio suadebat, utatur.

6 Sanguinem grumosum, pus vermes aut materiam mucosam in viis urinariis habentes.

7 Gravidæ interdum ultimo gestationis tempore.

8 Caruncula venerea laborantes.

9 Tumore inflammatorio vel in collo vesicæ, vel circa eam afflicti.

10 Tunicæ vesicæ exterioris sive musculosæ Paralyfi correpti.

11 A causis violentis externis læsi, inprimis in partibus renibus & vesicæ vicinis.

#### V. Prognosis.

1 Inter reliquas, urinam excernendi difficultates Ischuria est periculosissima & gravissima, nisi mature tollatur, habet confectaria.

2 Ischuria a renum vitio originem trahens semper gravior est Ischuria vesicali, quoniam in illa causæ non adeo facile removeri possunt ac in hac.

3 Si dependet a calculis utrique ureterum impactis, paucis diebus ægri post insignes dolores pereunt.

4 Nisi ante septimum diem ægroti mingant, Febris inflammatoria quam Gangræna & Sphacelus sequuntur eosdem jugulant.

5 Superveniunt etiam nonnunquam Convulsiones mortis instantis indices.

6 Non raro quoque in Hydropem degenerat.

7 Nonnunquam etiam soporem affert & Apoplexiam.

8 Ischuria a renum aut vesicæ Paralyfi producta periculosissima & ut plurimum lethalis est.

9 Si sudores suppressionem urinæ sequuntur, morbus aliquo modo mitior evadit, ita ut ægrotantes eum interdum ad plures dies sine queant, uti testantur observationes.

#### VI. Remedia.

1 Alvum aperientia: Clysteres, Fol. sennæ cum Diureticis & Seminibus cartumixta, Passulæ,

Pilulæ Becherianæ.

2 Temperantia: Nitrum, Lap.  $\text{ss}$ . Conchæ citratæ, Tart. Vitriolat. Cinnabris Antimonii &c.

3 Diuretica & Resolventia: Rad. Vincetox. Onon. Pimpin. alb. Ari &c. Herb. Petrosel. Cherefol. &c. Tinct. Tart. Antimonii &c.

4 Externa: Balnea, Fetus, Unguenta, Cataplasmata &c.

5 Tonica e Mixtura tonica Stahlî: Eff. Cort. Ont. Tinct.  $\text{gt}$ . Tartarifat. Ludov.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Clyster.

Rx. Decoct. Veron.  $\text{℥x}$ .

Ol. Chamom.  $\text{℥j}$ .

Aneth.  $\text{℥ss}$ .

Sal. Gemm.  $\text{℥ij}$ .

Vitell. Ov.  $\text{N. j. M}$ .

F. Clyster.

##### 2 Infusum diureticum & laxans.

Rx. Rad. Onon.

Vincetox.

Cicbor.  $\text{ā}$ .  $\text{℥ss}$ .

Herb. Cherefol.

Petrosel.  $\text{ā}$ . mss.

Fol. Senn. f. f.  $\text{℥vj}$ .

Sem. anis.

dauc.  $\text{ā}$ .  $\text{℥ij}$ .

Tart. solub.  $\text{ā}$ .  $\text{℥ij}$ .

Inc. infund. in Vin. alb  $\text{℥ij}$ .

D. mane & vesperi  $\text{℥vj}$ .

##### 3 Pulvis antispasmod.

Rx. Conch. citrat.

Nitr. regener.

Tart. Vitriolat.  $\text{ā}$ .  $\text{℥ij}$ .

Cinnab.  $\text{℥ii gr. xviii. M}$ .

divid. in 6. p.  $\text{æq}$ .

D. sing. 4. horis dos.  $\text{j}$ .

##### 4 Emulsio diuretica.

Rx. Sem. Viol.

Milii  $\text{Q}$ .  $\text{ā}$ .  $\text{℥ss}$ .

Aq. Veron.

Fragor.  $\text{ā}$ .  $\text{℥iv}$ .

F. l. a. Emulsio Colat. adde

Test. Ovor. calcin.  $\text{℥j}$ .

Sacch. canar.  $\text{q. s}$ .

ad gratiam.

D. saepius cochlearia aliquot.

##### 5 Mixtura abstergens.

Rx. Tinct.  $\text{℥ii acris ℥ij}$ .

Eff. Succ.  $\text{℥iss}$ .

Bals. Peruv.  $\text{℥ss. M}$ .

D.  $\text{gt. 30. mane & vesperi}$ .

##### 6 Linimentum.

Rx. Ungt. de Alth.  $\text{℥vj}$ .

Ol. Scorp.

Petrol. alb.  $\text{ā}$ .  $\text{℥ij. M}$ .

applicetur calide.

VII. Methodus medendi. Cum causæ Ischuriæ sint diversæ, diversa quoque curatio instituenda est.

1 In Ischuria reliquis remediis, nisi circumstantiæ aliud quid postulent, præmittantur Clysteres aut lenialaxantia, hæc enim non solum alvum liberam servant, sed & ipsam Diuresin promovent, inpr. si laxantia cum Diureticis maritantur.

2 Quoniam in Ischuria facile humores stagnantes acrimoniam concipiunt, eique stases inflammatoriæ superveniunt, exhibeantur temperantia, qualia sunt nitrosa, digestiva & absorbentia.

3 Si a congestione sanguinis nimia ad renes in hominibus Plethoricis Ischuria dependet, quam præcedentia remedia tollere nequeunt, illico Venæ Sectio in pede instituat, hæc enim sola interdum brevi tempore totum malum tollit teste experientia. *Vid. River. Cent. I. Obs. 1. & 39.* Si subjecta ad Hæmorrhoides sunt prona, aut si eæ sunt tumidæ, applicentur hirudines. *vid. Cent. II. obs. 29.* Externe regio renum, pedinis & perinæum Oleo Scorpionum aut Unguento Comitisæ Camphorate inungatur.

4 Quando vero nimia vel renum & ureterum vel sphincteris vesicæ adest constriction, in usum trahantur pulveres antispasmodici ex nitro, absorbentibus digestivis & Cinnabari parati. Externe vero conveniunt Balnea, Unguenta, Cataplasmata &c.

5 Si calculus urethræ impactus urinæ suppressionem producit, ejusdem excretio per injectionem oleosorum promoveatur, aut cathetere in vesicam retropellatur: si autem nimis firmiter impactus est, ita ut nullo modo ope catheteris moveri queat, fiat incisio urethræ & calculus extrahatur: talem incisionem aliquoties cum optimo successu factam esse vidimus.

6 Si ob urinæ retentionem & vesicæ extensionem nimiam urina excerni nequit, injiciatur primo Clyster, postea vero ope catheteris aut candelæ cereæ, per urethram in vesicam intrusæ, urina evacuetur. Externe applicentur emollientia, v. g. Cataplasma ex Malva, Althæa, Violaria, Parietaria, Chamomilla, Semine Lini, Cepis &c.



- 7 Quando mucus, grumus sanguinis, & vermes in urethra hærentes urinæ excretionem impediunt, cathetere removeantur: si vero in renibus & ureteribus talis causa est, exhibeantur aperientia & blanda diuretica: contra vermes vero specifica remedia, de quibus suo loco, exhibeantur.
- 8 In gravidis si Ischuria easdem affligit, urina per catheterem educatur.
- 9 Si caruncula venerea adest, ea per septica, mercurialia &c. extirpetur & per balsamica locus affectus consolidetur.
- 10 Si forsan exulceratio in Ischuria occurrit, ea per abstergentia & balsamica præcipue vero per Pilulas e Terebinthina cocta tractetur, uti suo loco monstratum est.
- 11 Tumor inflammatorius, si Ischuriæ est causa, convenientibus remediis, diaphoreticis scil. Nitrosis absorbentibus, alexipharmacis ac discutientibus internis, & externis curetur.
- 12 In Ischuria a Paralyfi orta interna & externa nervina in usum trahantur.
- 13 Si causas externas violentas sequitur Ischuria, interne sumatur pulvis ad casum Ludovici Lap. 33. 5. diaph. & Sperm. Cet. exterius vero læsioni per convenientia remedia prospiciatur.

#### VIII Cuncta Præctica.

- 1 Clysteres nimium stimulant & acres hic nullius sunt usus, sed sufficit, si sunt emollientes & carminativi ac oleosi cum convenienti stimulo salino.
- 2 Temperantia & inpr. nitrosa in suppressione urinæ ad præoccupandam stasim inflammatoriam mature exhibeantur, quamprimum enim inflammatio invaluit nimium, sero medicina paratur.
- 3 Venæ-sectio si in subjectis Plethoricis Ischuria laborantibus instituitur, semper sit larga & sanguis fere ad libram usque emutatur, alias nullius est usus.
- 4 Præsentē constrictione Diuretica præsertim fortiora nunquam exhibeantur, partim quia sanguinem nimium ad renes urgent eosque opplent, adeoque secretionem urinæ impediunt, partim etiam quoniam ipsam strictionem adhuc magis augment.
- 5 Eo magis autem ab eorum usu abstinendum est si calculus ureteribus aut urethræ impactus Ischuriæ causa est, quoniam omnia symptomata graviora reddunt.
- 6 In urinæ retentione & vesicæ extensione diuretica dare velle contra omnem rationem est, urinæ enim copia vesicæ tonum jam maxime fregit, si ergo urinæ copia major diureticorum ope secernitur, necessario etiam vesica magis cum dolore & reliquorum symptomatum augmento dilatatur.
- 7 Specificis in Ischuria non semper fidendum est, alia enim irrita sunt, alia vero nullum edunt effectum, si tamen quædam occurrunt, quæ per experientiam probata sunt, in usum trahi possunt. Ex posteriorum sensu sunt simus equinus cum vino calido Rhenano per filtrum trajectus & epotus. Cerebrum Picæ exsiccatum & cum vino albo propinatum, quod secundum Riverium Observ. a Ruo commun. 33 tribus Ischuria laborantibus profuit. Succus millepedum & Concharum nigrarum, in quo granum unum Cantharidum fuit incoctum. Urina hirci calide pota. Infusum Calcitrappæ in Vino. Emulsio Seminis violarum & nucleorum persicorum cum aqua urticæ. Testæ ovorum: pulvis lumbricorum cum vino mulso. Succus cancrorum fluviatilium cum vino. Sal radices lupinorum. Decoctum plantaginis aquaticæ. Tali leporum in forma pulveris &c. In talium tamen usu non ad unam tantum, sed ad multiplicem respiciendum est experientiam.
- 8 Si urina jam effluxerit, blanda diuretica nihilominus conveniunt ad abstergendas vias urinarias.
- 9 Præservatorie instituantur Venæ-sectiones in Plethoricis: fugiatur diæta crassa, venus nimia, adstringentia &c.

## CAPUT DECIMUM QUARTUM.

D E

### Sudoris suppressione & defectis.

- I. *Definitio.* **S**udoris defectus est vel consueti sudoris ob varias causastam internas quam externas suppressio, vel, præsentē etiam corporis ad sudorem dispositione, ejusdem parca vel nulla excretio, varia molesta pathemata conjuncta habens.
- II. *Differentia.* Ex ipsa definitione patet
  - 1 Aliam esse sudorem, vel consuetorum vel ob alias causas præsentium suppressionem.
  - 2 Aliam vero ejusdem, positis licet circumstantiis, subjecti ad sudandum dispositionem manifestantibus, retentionem.
- III. *Signa.*
  - 1 Absentia madoris in peripheria sive habitu corporis.
  - 2 Constrictio partium externarum.
  - 3 Quam excipit corporis lassitudo.
  - 4 Jungitur etiam gravitas artuum.
  - 5 Accedit oppletio pectoris & respirandi difficultas.
  - 6 In aliis observatur pressio præcordiorum.
  - 7 Non raro quoque Vertigo sequitur sudoris suppressionem.
  - 8 Appetitus etiam prostermitur. Reliqua ex sequentibus patebunt.
- IV. *Subjectum.*
  - 1 Infantes sudore madidi aeri frigidiori expositi.
  - 2 Adulti quoque ad sudores spontaneos proni, eosque vel negligentes, vel corpus sudore madens aeri exponentes.
  - 3 Multas partes mucidas in sanguine habentes.
  - 4 Sanguinis spissitudine & abundantia præditi.
  - 5 Sensibiles & ad varias toni alterationes proni.
  - 6 Nimia sanguinis ebullitione laborantes.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Omnis sudoris suppressio varia mala post se trahit, eaque eo certius, si ea in subjectis humidioribus subito contingit.
  - 2 In junioribus subjectis exinde oritur Crusta lactea, Scabies, Tusses, Coryzæ, Gravedines, Convulsiones &c.
  - 3 In adultis Febres, Tusses, Asthmata, aliæque spirandi difficultates.
  - 4 In hypochondriacis translationes humorum ad Hypochondria, pathemata cardialgica, Colicæ graves & sudorem suppressiones sequuntur.
  - 5 Non raro etiam exinde oriuntur varia rhevmata & affectus arthritici, præcipue in Sanguineis & Plethoricis.
  - 6 Mortem subitanam etiam sudoris matutini suppressionem insecutam esse, in viro hypochondriaco observavimus. Hic sudore madidus lecto surgebat atque corpus aeri liberiori exponebat, sed paucis elapsis momentis subito in terram prosternebatur, uxor ejus accurrens credebatur eum lipothymia correptum esse, sed revera mortuus erat. Quænam incommoda passus sim a suppressione sudorem spontaneorum, in *Theoria Hominis aegroti* jam aperui.
  - 7 Quo minus sudores in Febribus erumpunt, eo diuturniores sunt.
  - 8 Si autem sudores actu fluentes subito supprimuntur in intermittentibus, vel sequentes paroxysmi graviores fiunt, vel degenerant in continuas, vel in lentas, Hecticas, vel tumores œdematosi & Hydropes sequuntur.
  - 9 In acutis ob sudores deficientes vel suppressos semper pejor est status, pessimus vero in malignis: omnia enim symptomata magis urgent, & hinc facile accedunt Lipothymia, Inflammationes partium internarum, Convulsiones &c.
  - 10 Sudoris defectus a dyscrasia humorum originem trahens, mala quoque habet consecutaria, quoniam maxime necessaria humorum per transpirationem depuratio insigniter impeditur.



11 Sudorem suppressum si larga sequitur urinæ excretio, bonum est.

# VI. Remedia.

- 1 Temperantia: Nitrum regeneratum, depuratum, Antimoniatum, Lapid. ☉. Conch. citrat. Arcan. duplic. Tart. Vitriolat. Sal. polychrest. Potus sufficiens.
- 2 Diaphoretica: Antimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, Mixtura simplex, Essentia alexipharmaca Stahlî &c.
- 3 Alvum blande aperientia: Magnesia alba, Rhabbarum; Pilulæ Stahlîanæ, Becherianæ.
- 4 Incidentia, & Resolventia: Radix Ari, Helen. Vincetox. Pimpin. alb. Ari &c. Tinct. Tart. Antimonii acris &c.

## Formula Remediorum.

### 1 Pulvis diaphoretico temperans.

R. Nitr. regener. div. in 6. p. aq.  
Conch. citr. D. sing. 3. 4. horis.  
℞. diaph. & ℞. M.

### 2 Alius.

R. Nitr. depur. Bezoard. min. & ℞.  
Tart. Vitriolat. Cinnab. ℞. gr. XII. M.  
Lap. ☉. div. & D. ut antea.

### 3 Potiuncula diaphoretica.

R. Aq. flor. Acac. Sir. contraj. ℞ss. M.  
C. B. A. ℞ij. D. cochlearia aliquot pro  
Ess. Alexiph. ℞ij. dosi.

### 4 Pilulæ laxantes.

R. Extr. Panchymag. Cr. F. Pil. 60. D. 15. pro  
Pil. Stahlî. & ℞ss. M. dosi.

### 5 Aliæ.

R. Pil. balsam. ℞j. D. ut antea.

### 6 Species pro Infuso incidente.

R. Rad. Vincetox. Bellid.  
Pimp. alb. Capill. ℞. & mj.  
Helen. & ℞ss. Inc. infund. successive Aquæ  
Herb. Scord. ferventi & sumantur ca.  
Scabios. lide.

### 7 Mixtura incidens & diaphoretica.

R. Tinct. Oii acris. D. mane & vespere 30. gr.  
Ess. Alexiph. & ℞ij. M.

### 8 Aliæ.

R. Tinct. Tart. Myrrh. ℞ss. M.  
Ess. Pimp. alb. & ℞ij. D. ut antea.  
Succ. ℞j.

# VII. Methodus medendi.

Cum sudor suppressus multa, uti ex antea dictis patet, post se trahat incommoda, mature prospiciendum est, ne metuenda mala in actum deducantur: quare statim temperantia & moderate diaphoretica exhibeantur, partim ut partes salino Sulphureæ in sanguine herentes temperentur & præparentur, partim ut a corpore per diaphoresin expellantur.

2 Id quod ut eo melius contingere queat, assumentur sæpius jussula calida, & infusa Theiformia ex radicibus & herbis incidentibus: si vero subjecta potui Thee & Caffæ assueta sunt, potus hic dilutus in largiori etiam copia ipsis ad diluendos humores concedatur, eique moderatæ & reiteratæ doses Tincturæ bezoardicæ, non camphoratæ, Mixturæ simplici aut Essentiæ alexipharmacæ interponantur.

3 Respiciatur quoque ad alvi statum an sit libera, an vero obstructa: si alvus non respondet, Clysteres insignem habent usum, quatenus multum sudoris suppressi cum aliis humoribus hoc modo evacuatur, præsertim si Clysteres sunt leniter stimulant. Longe præsentio rem autem habent efficaciam Pilulæ Stahlîanæ aut Becherianæ veræ, quæ non solum alvum aperiunt, sed etiam sudorem & Diuresin promovent, uti id sæpius in proprio expertus sum corpore. Ante aliquot annos sudore spontaneo matutino largissimo corripiebar, qui autem cum lectum deferere propter negotia urgentia cogerer, supprimebatur: sentiebam hinc statim insignem corporis lassitudinem, cum vero negotia quietem non concederent, ita ut non nisi a meridie aliquid assumere valerem, viginti Pilulas

Stahlianas deglutiebam: sed nihilominus circa vespere febre corripiebar maxime vehementi, quam paucus sudor excipiebat: circa mediam noctem novus accedebat paroxysmus & versus horam quartam matutinam tertius cum gravissimis tensionibus & doloribus in omnibus artubus, ac deliriis: tandem sequebatur sudor largissimus, quem finientem largius urinæ profluvium & aliquot sedes excipiebant, & hoc modo tota Febris cum omnibus molestiis statim cessabat. Hactenus sæpius talis sudoris suppressione laboravi, sed semper post laudatarum & nunquam satis laudandarum Pilularum usum statim ab omnibus molestiis liberatus fui. Eandem quoque efficaciam sæpius in aliis expertus sum.

4 Si subjecta alias ad diuresin sunt pronâ, Diuretica temperantia insignem quoque edunt effectum, & humores etiam tutissime per hanc viam excernuntur.

5 Si sudorem suppressum jam exceperunt morbi, respectus ad illos habendus est, iique speciali methodo tractandi sunt, prouti circumstantiæ id postulant.

6 Si post sudores suppressos in subjectis Plethoricis respirandi difficultas & pathemata cardialgica ac hypochondriaca nimium urgent, ita ut gravius metuendum sit periculum, Vena vel in brachio, vel in pede, pro ætatum & aliarum circumstantiarum respectu, illico secetur.

7 Quando sudores summe necessarij in Febribus supprimuntur aut prorsus non succedunt, res periculi plena est, & hinc mature sunt revocandi, quod fieri potest, partim per supradicta temperantia & diaphoretica fixa ac hisce interposita alexipharmaca, partim vero per frictiones, lagenas & vesicas aqua calida repletas & pedibus ac aliis corporis partibus applicatas.

8 Si sudorum defectus a Plethora & spissitudine sanguinis dependet, Venæ sectio mature instituta multum ad eorum revocationem contribuit, quatenus hoc modo proportio inter humores & motus restituitur, ita ut Natura postea reliquum sanguinem eo melius fluxilem reddere queat.

9 Eadem quoque Venæ sectio in principio Februm, sanguinis missionem commode admittentium, in subjectis Plethoricis instituta, ita tamen ut lenè regimen diaphoreticum statim subjungatur, insignem ad promovendos sudores habet usum.

10 Si sudorum defectus a dyscrasia humorum lenta & mucida originem trahit, hæc per lenia resolventia & incidentia ac convenientia laxantia tollatur.

# VIII. Cautela Practicæ.

1 In sudoribus suppressis nunquam in usum trahantur acria, volatilia aliaque nimis calida, quia sanguinem nimis commovent, atque gravia post se trahunt mala.

2 Eo magis vero nocent, si subjecta ad sudores non inclinant, aut si sudorum defectus a nimia sanguinis ebullitione dependet & hinc in tali casu Nitrofa aliaque temperantia cum diaphoreticis fixis plus conferunt ad sudorum promotionem, quam ante dicta acria.

3 Ad sudorum revocationem multum etiam confert quietia in lecto continentia, e contra corporis jectigatio sudoris fluxum maxime turbat.

4 Si alvus est aperienda, respiciatur an morbi conditio apertionem talem admittat, in Febribus enim acutis ea cautela opus habet.

5 In suppressis sudoribus fugiantur quoque Purgantia acria sanguinem nimis commoventia.

6 Pulvis pannonicus ruber, Terræ sigillatæ aliaque talia adstringentia quibus vulgo virtus alexipharmaca tribuitur, in Febribus acutis fugiantur, quoniam sudores necessarios & exanthematum expulsionem magis retardant, quam promovent.

7 Balnea & stuphæ sudatoriæ etsi ad sudores promovendos multum conferant, semper tamen respiciendum est prius ad statum humorum, an sufficienter resoluti & ad talem evacuationem dispositi sint, & an subjecta talium usum ferre queant: quo neglecto multis malis sæpius porta panditur. Balnea quoque semper sint moderate calida, & caput a calore bene defendatur: in stuphis quoque calor nimis abesse debet.



8 Ad sudores autocraticos suppressos revocandos motus moderatus & continuatus multum confert, nimius tamen, Massam sanguinis ultra quam par est commovens, fugiatur.

### S E C T I O III.

#### D E

## STAGNATIONIBUS ET STASIBUS SERI.

### C A P U T P R I M U M.

#### De Cachexia & Chlorosi.

#### I. Definitio.

- 1 **C**achexia est flaccidus, pallidus & subtumidus corporis habitus a feri & lymphæ mucosa spissitudine, in interstitiis fibrosarum partium stagnante, & ipsas quoque fibras imprægnante & turgidas reddente, ac motus tonici remissione, originem trahens.
- 2 Chlorosis, Cachexia virginum, febris alba & amatoria, Icterus albus dicta, est Cachexiæ species virginibus, obstructione mensium contumaci laborantibus, solennis, a restrictione Sanguinis versus venam portæ hepatisque infarctu dependens, foetidumque, pallidum, & ex albo quasi virentem ægrotis concilians colorem.

#### II. Differentia.

- 1 Uterque affectus magnam affinitatem inter se habet, & Cachexia a Chlorosi nonnisi per genus a specie differt.
- 2 Alius est incipiens & adhuc levior, alius contumax & per plures annos durans.
- 3 Alius simplex absque alio morbo occurrens, alius complicatus Scorbutum, Quartanam, obstructionem hepatis conjunctam habens.
- 4 A *Leucophlegmatia* & *Anasarca*:
  - a In *Leucophlegmatia* est major inflatio quam in Cachexia, & minor quam in *Anasarca*: in hac vero tanta est cum nitore, ut rupturam quasi minetur.
  - b In *Leucophlegmatia* & *Anasarca* ordinarie major observatur durities, & post impressionem digiti foveæ relinquuntur, quod in Cachexia, nisi jam proxime ad horum affectuum graduum acceperit, non contingit.
  - c In *Anasarca* ordinarie tumor pedum œdematosus jungitur, qui tamen in Cachexia stricte sic dicta non observatur, nisi forsitan aliæ causæ accedant, & morbus sit in summo gradu.
- 5 Ab *Alcite*: hic enim abdomen & inferiores partes solum affligit, Cachexia vero universum corpus & imprimis exteriores partes occupat.
- 6 A *Tympanite*:
  - a Ratione partis affectæ, quæ est abdomen in *Tympanite*, in Cachexia vero universum corpus.
  - b Ratione extensionis, quæ in *Tympanite* est maxima & dura, cum e contra in Cachexia sit flaccida turgescencia.
- 7 Ab *Ictero*:
  - a Respectu coloris, qui in *Ictero* est flavus & croceus, in Cachexia vero utpl. pallidus.
  - b Respectu penetrationis: Icterus enim fibras solum quoad superficiem affligit, Cachexia autem eas intimius penetrat, ut exinde turgidæ evadant.
  - c Ratione causæ, quæ in *Ictero* est bilis translatio in habitum corporis, in Cachexia vero feri & lymphæ mucidus status.

#### III. Signa.

- 1 Cachexia:
  - a Pallor universi corporis in facie præprimis & ipsis labiis sese manifestans, colorem quandoque subflavum, lividum & plumbeum conjunctum habens.

b Insignis fibrosarum partium flacciditas & turgida earundem inflatio in facie præprimis & artubus observanda.

c Externe fere nullus caloris, sed potius frigoris aut teporis sensus.

d Lassitudo totius corporis & torpor ad consueta negotia.

e Appetitus debilior, & ad frigida magis pronus.

f Post cibum inquietudo, pressio & tensio sub hypochondriis, flatulentia concursus.

g Alvus modo siccior, modo ad lubricitatem vergens, excrementa fere inconcocta projiciens.

h Urina vel plane aquea citra colorem & hypostasim in principio, in progressu vero magis turbida, & tincta, semper tamen pauca.

i Somnus interruptus & quandoque satis diuturnus, at pauca ab eodem refocillatio.

k Pulsus justo debilior vel languidus.

l Sanguis emissus plurima serositate abundans.

m Respiratio anxiosa, imprimis sub leviori motu, vel scalarum ascensione contingens.

n Succedens in contumaciori malo pedum tumor œdematosus, de die præcipue notabilis, nocte vero calore lecti iterum disparsens.

o Sensus etiam quandoque concurrentes varii pressorii, gravativi, constrictorii, sub hypochondriis aut umbilico sese exerentes.

#### 2 Chloroseos.

a Pleraque modo dicta signa communia.

b Concurrens mensium obstructio.

c Facies admodum pallida, & subflava, imprimis etiam labiorum insolitus pallor.

d Oculorum subsidentia, palpebrarum vero cingentium livor.

e Maxima corporis lassitudo, imprimis pedum gravitas & ad movendum inertia.

f Frequens intercurrentis palpitatio cordis.

g Subsequens tandem vel plenaria & contumax cachexia ad hydropem inclinans, vel hæctica.

#### IV. Subjectum.

- 1 Obnoxii Cachexiæ fieri possunt hypochondriaci, hæmorrhoidarii ab obstructione hujus fluxus, scorbutici, febribus diuturnis & præcipue quartanis aut aliis morbis chronicis laborantes.
- 2 Scabiei retropulsiones incurrentes.
- 3 Hæmorrhagias nimia passi.
- 4 Vitam otiosam, inertem degentes, & Diætæ crudiori addicti.
- 5 Temperamentum phlegmaticum aut Sanguineo-phlegmaticum possidentes.
- 6 Loca humidiora, Solis & aeris sanioris accessui minus exposita, inhabitantes.
- 7 Nimio vini & Spiritus Vini usu calorem naturalem destruentes.
- 8 Fœminæ præ viris mensium obstructione vel nimio fluxu laborantes.
- 9 Chlorosi præprimis expositæ sunt juniores, quibus mensium negotium minus feliciter, aut per incongruam Diætam, suppressum est.

#### V. Prognosis.

- 1 Cachexia sicut gradu differt, sic etiam faciliior vel difficilior ejusdem Curatio.
- 2 Quo minus viscera adhuc læsa sunt & pertinaciter obstructa, eo magis affectus medelam admittit.
- 3 Ubi malum adhuc in humoribus ad spissitudinem & visciditatem pronis hæret, ibi iusta & congrua methodo non admodum difficulter propellitur.
- 4 Juniores, corporis & animi vi adhuc pollentes, facilius curantur quam annosiores, qui non raro hydropicos affectus exinde incurrunt.
- 5 Quo magis hepar obstructum est, eo certius hydrops vel hæctica sequitur.
- 6 Cachexia quartanis male curatis superveniens, maturata paroxysmi febrilis revocatione haud difficulter tollitur.
- 7 Quæ haustu frigidæ tempore æstivo quandoque contingit, difficulter curatur, & certius in hydropem vel hæcticam migrat.



- 8 A mensium infausto successu originem habens, maturam eorundem restitutione solvitur.
- 9 Quo diutius autem menses jam subistere, eo longiori in Cura mora opus est.
- 10 Chlorosis non maritatarum sæpius admodum rebellis est, & quandoque hecticam vel plenariam cachexiam post se ducit.
- 11 Sæpiissime autem nulla certius, quam mutato statu virginali in matrimonialem, debellatur.
- 12 Omnis Cachexia a læsionibus viscerum adhuc aliena per plures annos durare potest, antequam morbus rebellis & incurabilis succedat.
- 13 Cachexia a simplici humorum visciditate orta magis Anasarcam, quæ vero in hepatis obstructione fundata est, Ascitem post se ducit.

## VI. Remedia.

- 1 Visciditatem humorum incidentia & corrigentia: Rad. Pimpin. alb. Vincetox. Ari. Cichor. Helen. Caryophyllat. Imperat. Herb. Card. bened. Fumar. Absinth. Cent. min. Cochl. Nasturt. Trifol. fibrin. Capill. Qris. Hyssop. Marrub. alb. Epithym. Salia media: Tartarus Vitriol. Arcan. dupl. Sal polychr. Glaser. Tartar. tartarif. Salia alcalia ex modo dictis vegetabilibus, Gummi resinæ: Galban. Ammon. Heder. Junip. Tincturæ diureticiæ: Jii, Tartari, Escent. Pimpin. alb.
- 2 Præparatos & digestos humores evacuantia: Jalappa, Mechoacanna, Fol. Senn. Rhabarb. el. fibr. Helleb. nigr. Agaricus Sem. Ebul. Carthami, Cort. intermed. Samb. Pil. Beccherianæ, Stahlianæ, polychrestæ Halenses.
- 3 Tonica Splenetica, & Hepatica: Rad. Tarax. Curcum. Cichor. Herb. Scolopendr. Agrimon. Adianth. alb. Flor. Schœnanth. Ligna Santal. Species diarrh. Abbat. Diarrion Santal. Tinctura Vitriol. Martis Ludov. Jtis Zwelf. Croc. Jii Jtis Stahlii.
- 4 Evacuationes sanguinis suppressas invitancia: V. S. in pede, Scarificationes, hirudines.

## Formula Remediorum.

## 1 Nodulus incidens &amp; laxans.

- Rx. Rad. Vincetox. Agar. albiss.  
Caryophyllat. a. ʒss. Rhabarb. el. a. ʒij.  
Irid. o. ʒij. Sem. anis.  
Herb. Card. bened. fœnic. a. ʒj.  
Agrimon. Sal polychr. ʒij.  
Beton. a. Mss. Incis. contus. infund. ʒj. ▽  
Summit. Cent. min. p. j. ferv. ʒ. ʒij. Vin. gener.  
Cort. Orum Dos. ʒvj. vij. alternis diebus usurpanda.  
Cleri a. ʒij.  
Fol. Senn. f. st. ʒj.

## 2 Pulvis incidens.

- Rx. Pulv. stomach. Birck- Sal absinth.  
man. ʒij. Tart. Vitriol. a. ʒss.  
lumbr. terrestr. M. f. Pulv. Dos. ʒj. ʒss.  
cort. Orum a. ʒj. bis, ter de die.

## 3 Alius tonico-resolvens.

- Rx. Rad. Pimpin. alb. ʒij. Sal. onon.  
curcum. ʒj. Croc. Jii Martial. a. ʒj.  
Oc. ʒ. ppt. M. D. S. ut antea.  
Lumbr. terrestr. pp. a. ʒss.

## 4 Essentia diuretico-tonica.

- Rx. Tinctur. Tartar. acr. ʒij M. Dos. gutt. 25. 30. bis de die.  
Ess. Cort. Orum,  
adiantb. alb. a. ʒj.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Cachexia per se considerata tractanda est remediis resolventibus, incidentibus, evacuantibus & roborantibus perite sibi invicem interpositis & subjunctis.
- 2 Quem in finem commode Curæ initium sit per Nodulos aut Pilulas laxativo-resolventes, aliquoties repetendas, interposito frequenti incidentium diureticorum leniorum usu.
- 3 Quando ex diuresi frequentiori & mitigatione symptomatum malum sensibilibiter remisisse constat, tunc locum habent tonica reliquiis interposita & subjuncta.

4 Ubique tamen ad originem mali respicere convenit. In mensium nimirum obstructione V. S. in pede & aperientibus lenioribus simul succurrendum est: in hæmorrhoidum suppressione vel pariter V. S. in pede, vel hirudinum applicatione ad loca hæmorrhoidalia.

5 Quando a nimis hæmorrhagiis dependet, supra dictæ methodo interponenda sunt analeptica & roborantia.

6 Quæ post febres evenit, a Nodulis laxativis, Pilulis Beccherianis, & interpositis digestivis & alexipharmacis auxilium recipit.

7 Ubi scabies retrōpulsa fubest, Mercurii dulcis & fl. Sulphur. usus haud negligendus.

8 Diætæ congrua multum etiam pro hoc malo debellando facit. Instituat igitur motus corporis placidus successive augendus, & continuandus; in usum trahantur expepta, assata, aromatica, Sinapi, raphanus marinus, Vinum generosum.

## VIII. Cautela Prædicæ.

- 1 V. S. in illo tantum casu prodest, ubi hæmorrhagarum spontanearum factæ fuere suppressiones.
- 2 Habent hic usum Sanguinem leniter attenuantia; ab omnibus vero pellentibus & Salibus oleoso-volatilibus abstinendum: quia facile Asciti vel Hæticæ via exinde paratur.
- 3 Diureticam etiam fortiora omnino fugienda: quia plerumque majora exinde emergunt damna.
- 4 Idem de omnibus, quæ sanguinem nimium exagitant, dicendum est.
- 5 Cum morbus sit chronicus, exposcit etiam methodum lentam, præparantem & evacuantem, nulla vi & uno quasi impetu in humores crudos agentem.
- 6 Commendant etiam absorbentia Auctores, sed nullam specialem efficaciam exercere, experientia docet, nisi quod aciditati in primis viis peccanti quandoque occurrunt.
- 7 Bufones tanquam specificum in hydrope commendantur, quid in Cachexia valeant, Experientiæ commendandum.
- 8 Salia Volatilia, adstringentia & tonica, non nisi præparantibus & evacuantibus præmissis & per aliquot tempus continuatis, in usum vocanda sunt,
- 9 Eodem tempore demum locum habent balneorum siccorum usus.
- 10 Ab omnibus vero repellentibus sulphureis & adstringentibus abstinendum est: quia facile Catarrhus suffocativus vel Hydrops exinde inducitur.
- 11 Evitandus etiam est aer autumnalis & vernalis humidior, cibus crassus, & viscidus, potus frigidus, vinum vel cerevisia recens, Spiritus Vini &c.

## CAPUT SECUNDUM.

## DE

## Leucophlegmatia &amp; Anasarca.

## I. Definitio.

**E**st tumor universalis habitus corporis externi, frigidus & pallidus a lymphâ viscida, intra cutem & musculosas partes stagnante, originem habens.

## II. Differentia.

- 1 Anasarca & Leucophlegmatia differunt in eo, quod illa cum splendore & nitore cutis contingat, & digitorum impressorum vestigia diu retineat; hæc vero aliquantisper flaccidiorem habitum corporis absque nitore cutis constituat, neque foveas a digitis impressis tam diu servet.
- 2 Utraque ab Ascite & Tympanite discernitur ratione loci: hæc enim cavitatem magis abdominis occupat, illudque in insignem molem attollit; illa vero in externis partibus fibrosis sedem habet.
- 3 A Cachexia ratione gradus: hæc enim non cum tanta cutis turgescencia, sed potius flacciditate, & ali-



& aliquali saltem tumore conjuncta est.

### III. Signa.

- 1 Universi habitus corporis insignis turgescencia ad nitorem cutis usque sese extendens, ratione gradus vel Anasarcam vel Levcophlegmatiam constituens.
- 2 Ejusdem pallor, frigiditas, duriuscula constitutio, quæ digitorum impressorum vestigia diu retinet.
- 3 Ingens corporis lassitudo & ad motum inertia.
- 4 Pulsus parvus, frequens & inæqualis.
- 5 Accedit etiam ordinarie febris lenta.
- 6 Appetitus fere dejectus & ad frigida magis inclinans.
- 7 Somnus profundus, inquietus, corpus non reficiens.
- 8 Sudoris omnimoda suppressio.
- 9 Respiratio difficilis, præcordiorum angustiae, maxime post pastum.
- 10 Intercurrentes phlogoses, fitim quandoque satis intensam conjunctam habentes.
- 11 Alvus ad lubricitatem magis, quam siccitatem, vergens.
- 12 Urina plerumque cruda & tenuis, quandoque etiam lixiviosa.
- 13 Ab initio tumor adhuc vagus, nocte calore lecti diminuens, in æquum vero fixus, æqualiter persistens.

### IV. Subjectum.

- 1 Phlegmatici & sanguinei, ut & feminæ magis quam viri.
- 2 Cachecticam a variis causis dispositionem possidentes.
- 3 Visceribus quidem adhuc vegetioribus instructi, insigni autem visciditate lymphæ laborantes.
- 4 Hepatis glandularumque abdominis infarctu afflicti.
- 5 In febribus præcipue intermittentibus male tractati.
- 6 Scabiei quoque retropulsione incurrentes.
- 7 Loca humidiora inhabitantes, victu vero crassiori viscido usi.
- 8 Hæmorrhagiis vel nimis vel suppressis laborantes.

### V. Prognosis.

- 1 Anasarca & Levcophlegmata simplex absque Ascite occurrens curatu non est ita difficilis ac Ascites.
- 2 Quo magis autem complicata est, eo difficilius curam admittit.
- 3 Omnis hydrops, quo magis a viscerum læsionibus adhuc alienus est & in humorum vitiis adhuc sedem habet, eo melioris spei est & contra.
- 4 Levcophlegmatia sicuti gradu ab Anasarca differt, sic etiam facilius curatur, si reliqua conspirant.
- 5 In omni hydropse urinæ adhuc aqueæ meliores sunt, quam rubicundæ, crassæ & inpr. lixiviosæ: denotant enim hæ viscerum læsiones & hæcticæ concursus.

### VI. Remedia.

- 1 Eadem, quæ in Cachexia laudata sunt, incidentia, resolventia, anti-Venerea lignosa, evacuantia, & tonica. Externe Balnea sicca, in stupha. Sumi possunt pro hoc scopo lateres vel globi tormentarii candefacti, & Decocto, ex herb. absinth. chamom. melilot. chelidon. Sem. anis. Carv. Cumin fœnic. Bacc. laur. Junip. aqua vel vino minus generoso parato, injici, sic cutis blande resolvitur, & ad sudorem disponitur.
- 2 Quæ speciali simul causæ satisfaciunt.
- 3 In febre male curata febrem ipsam restituentia & fundamentaliter eradicantia: Noduli laxativi, Digestiva, incidentia & lenia alexipharmaca.
- 4 In Scabie retropulsa, medicamenta expulsiua, sulphurea, succinata, absorbentia, mercurialia interne propinata.
- 5 In hæmorrhagiis nimis, vel interposita reliquæ Curæ balsamico-analeptica, vel tonica.
- 6 In suppressis hæmorrhagiis aperientia & fluxus ejusmodi revocantia.

#### Formula Remediorum.

- 1 Nodulus laxativus in Hist. morb. Urat. laudatus.

R. Rad. enul.  
asar. a. ℥ss.

Herb. Salv.  
Eupator.

cichor.

Veron.

Cuscut. a. Mj.

Gran. paradif. ℥ss.

Mac. ℥j.

Sem. Cartham.

anis.

2 Bolus emeticus pro robustioribus.

R. Conserv. cynosbat. ℥j.

Gumm. gutt. ℥ss.

R. Sem. Sinap. ℥ij.

Tartar. Vitriol.

Sal absinth.

onon. a. ℥j. M.

3 Cineres pro lixivio.

R. Ciner. genist.

stipit. fabar.

absinth.

junip.

5 Essentia stomachico-roborans.

R. Essent. Cort. Aur. ℥j.

mac. ℥ss.

Tinct. Vitriol. Mart. Lud.

6 Alia diuretico-diapnoica.

R. Tinct. ℞i acris

Essent. lign. a. ℥ss. M.

Quotidie mane, ad 30. gutt.

### V. I. Methodus medendi.

- 1 Generaliter nullam aliam requirit Curam, quam Cachexia. Specialiter autem secundum causarum diversitatem diversa exposcit medicamenta.
- 2 Pro priori itaque intentione in usum vocanda sunt medicamenta, muciditatem humorum incidentia, & corrigentia vegetabilia, aperitivo-diuretica vel diapnoica vi instructa, Salina, Gummi-resinæ, Tincturæ diureticæ, ordinando magis phlegmaticis acriora, Sanguineo vero phlegmaticis temperatiora, & conjungendo simul, si vires permittunt, motum corporis per vecturam & equitationem, successive in usum trahendum & diu continuandum, ut sic humorum massa eo melius conquassetur & ad secretionem & excretionem magis apta reddatur.
- 3 Interponenda & conjungenda sunt evacuantia phlegmagoga & quidem, secundum individuorum conditionem, vel fortiora, vel leniora, cum epicrasi agentia.
- 4 Peracta humorum præparatione, eorundemque præliminari evacuatione per alvum, locum etiam habent sudationes in stupha sudatoria peragenda.
- 5 Et tandem, humoribus superfluis per alvum, urinam & diaphoresin evacuatis, in usum trahantur tonica remedia, Diæta aromatica moderate vinosa cum interposita motione corporis per aliquod tempus continuanda.
- 6 In Speciali concurrentium causarum diversitate respiciendum est vel ad fluxus spontaneos suppressos, vel eorundem excessum, vel scabiem retropulsam, vel febres male curatas &c. pro quarum diversitate ea methodus est conjungenda, quam singulæ causæ specialiter exposcunt.

### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Venæsectio in nulla hydropis specie convenit; ubi tamen malum ab hæmorrhoidum suppressione provenisse comparet, locum habent hirudines ano applicitæ.
- 2 Scarificationes autem, sicuti in omni œdemate reprobantur, sic etiam in Anasarca non exigui periculi sunt, imprimis profundiores.
- 3 Evacuantia quoque fortiora non debent in usum trahi, nisi humores antea fuerint præparati; alias variis commotionibus & viscerum læsionibus demum via paratur.
- 4 Ad fortiora referuntur Gummi Gutt. Soldanell. Carthamus, Cortex Ebuli & Sambuci.
- 5 Securius ordinantur Noduli ex aperientibus, incidentibus & evacuantibus parati, vel etiam Pilulæ ex Extractis amaris cum evacuantem quodam combinatæ.



- 6 Interponi iisdem debent lenia diuretica & diaphoretica, ut sic humores undequaque ad excretionem disponantur.
- 7 Absint porro ab initio tonica, ad quæ etiam Salia volatilia referuntur, utpote quæ pariter pro visceribus obstruendis, correctæ & evacuata nondum materia, satis efficacia sunt.
- 8 Salivatio, per Mercurium facta, sæpius eximia damna, obstructiones viscerum, paralyses producit, ob visciditatem humorum & denegatam transpirationem. Magis etiam Mercurius in falsos, quam viscidos, humores agit.
- 9 Sudationes post præmissa incidentia & digestiva in Anasarca haud sunt contemnendæ; modofiant absque commotionibus æstuosis.
- 10 Hunc in finem Borrichius patientem vesicis aqua calida plenis fovere iussit.
- 11 Alius etiam folia fraxinifolia adhibuit & patientem iisdem circumdedit.
- 12 Alia externa, imprimis balnea, sive artificialia s. naturalia, nonnisi summe provide adhibenda sunt.

## CAPUT TERTIUM.

DE

*Ascite.*

I. *Definitio.* **E**st ingens ventris distensio, ab impedita secretionem feri in abdomine aliisque partibus stagnantis & quandoque extravasati orta, & œdematosam pedum intumesceniam cum aliis gravibus symptomatibus conjunctam habens.

II. *Differentia.*

- 1 Alius est *incipiens*, & adhuc curabilis, alius consummatus, cum ruptione vasorum lymphaticorum conjunctus, & fere incurabilis.
- 2 Differt a Tympanite, in quo venter, quidem etiam insigniter tumefactus est, sed non ab aqua s. sero stagnante solum, sed maximam partem a flatibus; unde etiam percussus instar tympani sonum edit.

III. *Signa.*

- 1 Incipit ut plurimum cum œdemate pedum circa talos initium sumente, versus vespertinam præcipue observabili, nocte vero iterum disparente.
- 2 Sensim sensimque augmenta capit hic tumor pedum, ut ab impressis digitis vestigia modo majora, modo minora, per aliquod tempus servet.
- 3 Progreditur hinc magis magis versus Ventrem, illumque tandem mirum in modum extendit, quo tempore ut plurimum etiam in viris Scrotum cum annexis partibus, in feminis vero muliebria, pariter occupat.
- 4 Et malo ad auxilium perveniente, præter tumorem abdominis in eximiam magnitudinem elatum, partes superiores macie quasi consumptæ conspiciuntur, licet interdum post somnum per aliquot horas subitumidæ iterum appareant.
- 5 Concurrent in hoc rerum statu secundum ipsius morbi statum modo graviora, modo leniora symptomata.
- 6 Nimirum lassitudo corporis & ingens virium prostratio.
- 7 Somnus ab initio quidem satis diuturnus, in progressu vero mali interruptus, paucus & delassans potius, quam reficiens.
- 8 Pallor totius corporis & conjunctum partium præcipue extremarum frigus.
- 9 Sitis in invalescente malo maxime intensa, tussis sicca, difficilis respiratio, cum concurrente febricula.
- 10 Appetitus etiam ad modum exiguus, & in malo consummato plane prostratus.
- 11 Urina primum tenuis & aquea, in progressu vero magis rubicunda, lixiviosa.
- 12 Oedemata insuper quandoque rumpuntur, & per longum satis tempus aquam plorant.
- 13 Venter vero, si movetur, fluctuationem & mur-

mura aquæ in abdomen effusæ patefacit.

- 14 In utroque etiam sexu concurrit quandoque Hydromphalos s. Hernia aquosa umbilici.
- 15 Quamvis aut in sæpius modo dicto ordine incipiat & progrediatur, nonnunquam tamen intumesceniam abdominis œdemata pedum præcedit.
- 16 Hanc vero antecedunt gravitas & angustia præcordiorum ac tensio in hypochondriis.
- 17 Cui jungitur respirandi difficultas sub motu corporis & ascensione scalarum.
- 18 Maligno progrediente angustia præcordiorum & respiratio difficilis ita augentur, ut ægri non nisi erecto collo respirare queant.
- 19 Angustia hæc cardialgicæ interdum, quando aliquid ciborum aut remediorum assumunt, semper magis magisque augentur.
- 20 Tandem sequitur abdominis tumor indies invalescens, cui reliqua recensita symptomata junguntur.

IV. *Subiectum.*

- 1 Temperamentum phlegmaticum, aut Sanguineo-phlegmaticum possidentes, & ad Cachexiam proni.
- 2 Viri fluxui hæmorrhoidali assueti & in ejus obstructionem imperita medicatione incidentes.
- 3 Spiritu Vini & Vino abutentes.
- 4 Fæminæ, post largum mensium fluxum ejusdem suppressionem passæ.
- 5 Frequentius hæc præ viris Asciti sunt obnoxia.
- 6 Uterque sexus post graves hæmorrhagias adstringentibus fortioribus tractatus.
- 7 Quibus in febribus intermittentibus paroxysmi febriles, citius quam par erat, per chinam chinæ & similia adstringentia suppressi fuere.
- 8 In viscerum mala constitutione acidulas usurpantes.
- 9 Cibis acidis, viscidis, Nitrosis abutentes.
- 10 Obstructionem viscerum a metastasi febrili vel scabie retropulsa reportantes.
- 11 Quibus venena loco remediorum incaute data fuere.
- 12 Frigidum potum, corpore valde calente, avidè ingurgitantes.
- 13 Frigida externa in nimis hæmorrhagiis regioni hepatis.

V. *Prognosis.*

- 1 Ascites cum magis in viscerum læsionibus quam humorum vitii radices habeat; ideo periculosior quam Anasarca habendus est.
- 2 Incipienti tamen & vasorum lymphaticorum integritatem adhuc conjunctam habenti non omnis spes Curationis deneganda.
- 3 Quod si vero orthopnoea, tussis sicca, sitis intensa cum hectico calore & urina lixiviosa succedant, mors ostia pulsat.
- 4 Juniores facilius adhuc superare possunt hunc morbum quam senes, imprimis quando morbus tardius incrementa sumit.
- 5 In quibus vasa lymphatica semel rupta sunt, rarissime evadunt.
- 6 Alvi lubricitas solatur ægros, siccitas vero omnia symptomata exacerbat.
- 7 Nihil periculosius est in invalescente malo quam urina rubicundo-lixiviosa: brevi enim moriuntur.
- 8 Oedemata, si rumpuntur, ægro quidem aliquod vitæ adhuc intervallum promittunt, nulla vero exinde speranda est restitutio. Vidimus hocce in ancilla, quæ excretionem taliaquarum in Hydrope spatio aliquot hebdomadum laborabat, symptomata omnia videbantur mitigari, sed ex improviso Gangræna, pedes corripens, vitæ finem imponebat.
- 9 Oedemata si externis incongruis medicaminibus repelluntur, reliqua symptomata graviora, & morbum ipsum pertinaciora reddunt.
- 10 Hæmorrhagiæ narium, Asciten vel præcedentes vel eidem supervenientes, labem viscerum graviores indicat, & utpl. funestum portendunt exitum.
- 11 Febris hectica Hydropi accedens ordinarie lethifera est.
- 12 Diarrhæa malo provento & visceribus læsis supervenientes mortem accelerant.
- 13 Idem censendum est si vomitus, viribus jam fractis, ægrotos affligunt.



- 14 Quo magis urget spirandi difficultas eo minor re-  
stitutionis spes est.
- 15 Si appetitus plane est prostratus ac ægroti post quæ-  
vis assumpta magna anxietate ructibus ac distensione  
affliguntur, res periculi plena est, præsertim in ma-  
lo provectiori.
- 16 Quo magis ægroti in hoc morbo bibunt, eo magis  
capit incrementa morbus.
- 17 Hydrops, post febres intermittentes male curatas  
contingens, per mature revocatos paroxysmos fe-  
briles & congruam methodum quandoque tollitur.
- 18 Paracentesis est tantum palliativum remedium, &  
nullum hydropem a læsionibus viscerum ortum cu-  
rat.

## VI. Remedia.

- 1 Viscera obstructa referantia & humores viscidos in-  
cidentia & resolventia: Rad. Pimp. alb. Vincetox.  
Armorac. Petasit. Raphan. Zedoar. Tarax. Bardan.  
Helen. Ari, Zinz. Herb. Cent. min. Artemis. Ab-  
sinth. Fumar. Card. bened. Salia media: Arcan. dupl.  
Tart. Vitriol. Solub. Sal polychr. Glas. Gummata  
temperata: Sagapenum, Galban. Ammon cum Ex-  
tractis amaris in pilularem formam redacta; Spiritus  
Tartari, Tinctur. Gijacris, Lumbrici terrestres  
& specificè commendati bufones. In cibis, præter  
quædam supra jam nominata, rad. petrosel Sem. Si-  
nap. piper, caryophyll. Cineres diuretici, vel armo-  
racia trita in Vino infusa. Externe Sedum minus,  
herb. Chelidon. maj. Geran. robert. raphan. niger. fol.  
lapp. maj. petasit. barban. nymph. contusa & malleo-  
lis l. plantis pedum apposita.
- 2 Materiam præparatam per alvum simul educientia,  
phlegmagoga, secundum subjectorum conditionem  
vel fortiora vel leniora: Elaterium, Extract. Esul.  
Gumm. Gutt. Succus rad. irid. nostrat. cort. Ebul. &  
Sambuc. Jalapp. mechoacan. Soldanella f. brassica  
marina, Sem. Cartham. Pil. Beccheri, Stahlii, Sal  
Cathart. amar. Clysteres hydragogi, paululum sti-  
mulantes.
- 3 Calorem hæticum mitigantia: Nitrosa, emulsiva,  
diaphoretica fixa, herb. & fl. bellidis, quæ quidem  
& in illo casu locum habent, quando malum a fic-  
citate, & exarescentia hepatis originem habet, ubi  
Saponis quoque philosophici usus commendatur.
- 4 Tono prospicientia: lenia Martialia cum amaris com-  
binata, Salia volatilia Tincturis alcalinis acris re-  
mixta, motus corporis fortior per vecturam aut equi-  
tationem. Diæta item Aromatica, & vini genero-  
sioris usus modestus.

## Formula Remediorum.

## 1 Bolus emetico-purgans.

Rx. Conserv. cynosb. ʒj. Syr. e spin. cerv. q. s. f. f.  
Gumm. Gutt. ʒss. Bolus. pro j. vice.

## 2 Potio laxans.

Rx. Fol. Senn. f. st. ʒij. Colat. Rx. ʒjv.  
Rhabarb. l. ʒj. Dissolv. Mann. Calabr. ʒj.  
Crystal. Tartari ʒss. Syr. e spin. Cerv. ʒls.  
Injund. in ʒ fragor. f. q. ms. pro j. vice.

## 3 Pilulæ hydragogæ Leonelli Faventini.

Rx. Elater ʒj. Salis Gemm. ʒij.  
Bdell. ʒj. ms. f. Pil. Dos. ʒss.  
Mastic. ʒss.

## 4 Clyster Phlegmagogus.

Rx. Rad. bryon. Coq. in f. q. Urin. puer. colat.  
Esul. a. ʒss. Rx. ʒviij.  
Herb. gratiol. Dissolv. Elect. hieræ picr.  
agrimon. ʒ. Mj. Mel. rosat. ʒvj.  
fl. Genist. Sal Gemm. ʒss.  
Samb. ʒ. Mss. ms. pro Clysmate.  
Bacc. Junip. ʒls.

## 5 Alius.

Rx. Urin. puer. ʒviij. Sal Gemm. ʒj.  
Terebinth. in Vitell. ov. ms. pro Clysmate.  
sol. ʒss.

## 6 Elestuarium diuretico-viscerale.

Rx. Conserv. cynosb. ʒj. Tartari Vitriol. ʒj.  
viscer. ʒls. Syr. bellid. q. s. f. f. Elect.  
Pulv. rad. ari. Dos. Magnitudo Castan.  
Lumbr. terrest. ʒ. ʒij. bis vel ter per diem.

## 7 Pulvis diureticus.

Rx. Pulv. Lumbr. terrest. Sem. ebul. ʒij.  
Gij diaph. ʒ. ʒj. ms. f. Pulv. Dos. ʒi. ʒss.  
Arcan. dupl. bis vel ter per diem.  
Buffon. pulver. a. ʒss.

## 8 Species diureticæ pro Nodulo.

Rx. Rad. bryon. junip. a. Mj.  
vincetox. a. ʒj. Incis. q. o. d.  
Ciner. stipit. fabar. pro Nodulo Vino genero-  
genist. so infundend.

## 9 Tinctura tonico-diuretica.

Rx. Spiritus Sal ammon. ms. Dos. gutt. 30. bis vel ter  
Tinct. Gij acris a. ʒj. fs. per diem.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Convenientissima, quæ hydropi debetur, Methodus,  
est laxatio cum diuresi leniori.
- 2 Ut vero eo melius succedat, corpus prius præpare-  
tur per resolventia, incidentia, Salia digestiva, sic  
humores mobiliiores & ad evacuandum aptiores red-  
duntur.
- 3 Sub his purgationibus semper toni ratio habenda est,  
quem in finem ægrotis cibi cum zinzibere conditi  
suadendi sunt.
- 4 Quod si vero concurrens calor hæticus temperantia  
exposceret, pulveres diaphoretici modeste Nitrosi lo-  
cum habent, reliquis medicamentis interpositi.
- 5 Tandem quando optatus secutus est effectus, subjun-  
genda sunt tonico-roborantia, sub quorum usu motus  
voluntarius præcipue in extenuatis conducit.
- 6 Externe œdemati pedum succurrunt acriuscula sub re-  
mediis commendata vegetabilia, abstinendo ab acro-  
ribus causticis, rubefacientibus.
- 7 Quod si malum a mensibus vel hæmorrhoidibus sup-  
pressis ortum duxerit, locum habere potest Venæsec-  
tio, sed nonnisi in principio morbi celebrata, inter-  
ponendo remedia aperientia, & Sanguinem ad con-  
suetos fluxus invitantia.
- 8 In Scabie retropulsa, præter supra dicta remedia, in  
usum trahenda sunt Mercurialia & sulphurea, non-  
nisi interne tamen administranda.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 In malo jam provectiori, quæcunque etiam causa  
concurrat, ordinarie neque Venæsectio, neque Sca-  
rificatio locum habet. Tractavi tamen aliquando  
puerperam, quæ ob lochiorum suppressionem in Hy-  
dropem inciderat; femina hæcce erat plethorica &  
largum semper mensium & lochiorum fluxum expe-  
riebatur. Tumor hydropicus, cum vocarer, genua  
jam superaverat & respirandi difficultas adeo urge-  
bat, ut singulis momentis suffocatio metuenda es-  
set: ad hanc E. præcavendam Venæsectionem,  
quam ipsa ægrotæ summis efflagitabat precibus, con-  
cedebam, unde summa illa respirationis difficultas  
maxime imminuebatur: sed nihilominus Ascites in  
dies incrementa capiebat, & cum denuo in maxi-  
mo suffocationis periculo versaretur, vena iterum  
aperiebatur, quæ eam a suffocatione liberabat; tan-  
dem post laxantia incidentia aliaque convenientia re-  
media exhibita largus sequebatur sudor, qui succes-  
sive Hydropem tollebat. A casu tamen hocce propter  
particulares circumstantias nemo conclusionem cer-  
tam formet, ac si venæsectio in Hydrope sit ne-  
cessaria: illud enim exinde saltim sequitur, quod  
Venæsectio interdum respectu subjecti & aliarum  
causarum aliqualem habeat utilitatem.
- 2 Omnes evacuationes non simul & temel instituendæ  
sunt, sed successive.
- 3 Unde cavendum est a purgantibus drasticis, præ-  
cipue quando humorum visciditas nondum correctæ  
est.
- 4 Quo magis Ascites inveteratus est, eo diutius etiam  
resolventia & incidentia continentur, ut hoc mo-  
do humores eo melius ad excretionem præparen-  
tur.



- 5 Palliativum etiam illud remedium externum Paracentesis per vices administranda est, quanquam & sic rarissime, nisi in principio morbi & ubi ægri adhuc *εὐσπλαγχοί* sunt, cum fructu adhibetur.
- 6 Cavendum est a remediis internis calidioribus oleosis, carminativis, resinosis, & quæcunque Sanguinis Massæ turgescientiam conciliare possunt.
- 7 Nocet etiam tam Salium volatilium quam Martiale præposterus usus.
- 8 Acidularum autem in hydropes usus omnino rejiciendus. Erat hic femina quinquaginta & aliquot annorum, quæ varia præludia ascitica sentiebat: Medicus ordinarius commendabat acidulas, quas alius dissuadebat & Hydropem prælagiebat. Prior tamen obtinebat: ab initio quidem acidulæ laudabilem videbantur edere effectum, sed paulo post earum usum ulterius ferre nequibat. Domum E. reversa semper de insigni lassitudine & spirandi difficultate conquerabatur, quam brevi Ascites lethalis sequebatur.
- 9 Aciora etiam diuretica, qualia sunt Cantharides, non temere in usum vocanda sunt.
- 10 Oedematosi tumoribus male applicantur sulphurea repellentia, item caustica aciora, rubefaciencia.
- 11 Omnes formulæ aquosæ plerumque nocent magis, quam prosunt, & radicem mali non tollunt.
- 12 Cataplasmata etiam e variis stercoreibus, nec non urinis, parata parum ad summam rei faciunt.
- 13 Thermarum tam internus quam externus usus merito rejicitur, posterior ad rupturas pedum patientes disponit.
- 14 Motus per vecturam aut equitationem in malo jam admodum inveterato locum quidem haud amplius habet, sed in recentiori egregium præstat usum, si moderatus est & continuatus.
- 15 A potu nimio hydropici sibi cavere debent, nec non cibis liquidioribus.
- 16 Ligna anti venerea in Anasarca magis quam in Ascite aliquem effectum edunt.
- 17 Efficacius in visceribus referendi se gerunt antiscorbutica.
- 18 A suffribus abstinendum est, quia ut plurimum repellunt. Experiebatur id femina hujus loci tumoribus pedum oedematosi laborans. Medicus ordinarius suadebat usum Pilularum ex Gummatibus, extractis amaris &c. paratorum, quæ malum sensim sensimque mitigabant. Alius adhuc consultus admodum laudabat vaporem balnei ex variis herbis præparati; pedibus exceptum; unde tumor disparebat quidem, sed Ascites incurabilis sequebatur.
- 19 Emplastra vero Diasulphuris Rulandi & de baccis lauri vulgo commendata parum ægrotos sublevant.
- 20 Non possum, quin hic breviter annectam observationem raram: Ehippiarii Gallici uxor 28. annorum temperamenti Sanguinei peculiarem prorsus patiebatur Hydropem spatio quinque annorum. Venter sensim intumescerebat, absque ullo pedum tumore, appetitus optime constabat & tranquille, donec tandem nimia abdominis intumescencia & appetitum & somnum turbaret. A variis Medicis varia laxantia, vomitoria, Diuretica &c. præscribebantur, sed frustra. Tandem Chirurgus Gallus Paracentesin suadebat, post quam peractam ea melius se habebat, sed paucis elapso tempore venter denuo inflabatur, & cum nullum remedium aliqualem ederet efficaciam, Paracentesis iterum instituebatur, quæ durante hocce morbo plusquam vigesies instituta jam fuerat. Summa autem admiratione dignum est, menses toto hocce tempore legitime fluxisse atque ægrotam res domesticas insigni celeritate peregisse. Vocabar tandem ad eam, a nullo autem medicamine ullum sentiebat levamen: quare Chirurgus Gallus Paracentesin reiterabat. Die sequenti ægrotam referabat, se insoliti quid sensisse sub ipsa intrusione instrumenti, ac si aliquid interius perforatum fuisset. Ab eo postea tempore semper pejor sese habebat, menses parcius fluebant, & paucis elapso tempore plenarie cessabant, pedes simul in-

flabantur & alia Ascitica symptomata accedebant: Irritis aliis Paracentesis adhuc aliquoties instituebatur, sed cum reliqua accidentia indies auferentur, tandem mors hisce omnibus finem imponebat. An post mortem cadaver apertum fuerit, me latet: Probabile tamen videtur, aquas hæce intra peritonæi duplicaturam latitasse. Similem fere observationem habet *Job van Meekren Obs.* 52.

## CAPUT QUINTUM.

D E

*Tympanite.*

- I. *Definitio.* **E**st species hydropis cum eximia expansione abdominis, ad instar tympani sonum edentis, quando percutitur, nec non continuo rugitu & ructus edendi conamine conjuncta, a flatibus originem habens.
- II. *Differentia.*
  - A reliquis hydropis speciebus concursus eximie flatulentie & majoris distensionis abdominis; splendendam fere cutem exhibentis & sonitum a compressionem vel percussione edentis. Vid. *Tabula præcedentes.*
- III. *Signa.*
  - 1 Plurima cum Ascite signa communia habet, respirationis nimirum angustiam, extenuationem faciei, pectoris & brachiorum.
  - 2 Lassitudinem corporis, tussim siccam, somnum graviolem, sitim & calores internos, urinam paucam aquosam vel lixiviosam.
  - 3 Tumores pedum, qui tamen proportionem, quæ reliquis Hydropis speciebus familiaris est, haud adæquant.
  - 4 Peculiare plane habet, quod abdomen magis quam in Ascite extendatur, & frequentia murmura & sonitus, præcipue si percutiatur, edat: tantum tamen abdominis pondus non sentiunt ægrotantes ac in Ascite.
  - 5 Insuper etiam rugitibus abdominis & vacuis ructandi conatibus stipatus est: si ructus per superiora evacuantur, aliquantulum melius se habent ægrotantes.
- IV. *Subiectum.*
  - 1 Atonia intestinorum, imperitis Medicationibus vel incongrua diæta debilitatorum & enervatorum, laborantes.
  - 2 Diuturnas obstructions mensium vel hæmorrhoidum & Hysterica vel Hypochondriaca mala habitualia tolerantes.
  - 3 Qui in febribus intermittentibus incongrue tractati sunt, & hinc intestinorum & viscerum labefactiones reportavere.
  - 4 Cibis crassioribus & flatulentis utentes & hinc Saburram vaporosam & verminosam colligentes. Vid. *Boner, Sepulchret.* p. 1121. & seq.
  - 5 Maxime etiam feminae, quæ infaustis puerperii successibus obnoxie fuere, aut abortum passæ sunt.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Tympanites nunquam non periculo vacat.
  - 2 Qui adhuc recens est, & febribus male curatis ortum debet, facilius curatur, quam qui a læsione insigniori viscerum internorum dependet.
  - 3 Omnis tympanites, qui alias jam in corpore radices egit, vel non, vel difficillime curatur.
  - 4 Quo magis ascitica pathemata concurrunt, eo minor reconvalescentie spes superest.
  - 5 Respirationis maxima angustia, sitis intensa, hectica corporis superioris consumptio, urina lixiviosa & pauca, pedum successiva intumescencia, pessima præbent signa.
- VI. *Remedia.*
  - 1 Materiam in intestinis hærentem incidentia & res solventia: Salia digestiva, Tartar. Vitriol. Arcan. dupl. Sal Polychr. Glas. digestiv. Sylv. Cathart. amar. f. Ep.



1. Epslon. Vegetabilia aperientia. Rad. pimpinell. alb. Vincetox. Apii, Bryon. Helen. Herb. Chamædr. Hyssop. Cochlear. Nasturt. Card. Bened. Absinth. Fumar. Cent. min. eorumque Salia fixa, Gummi-resinæ: Ammoniac. Galban. Sagapen. Heder. Juniper.

2 Superfluum serum & materiam flatulento viscidam per alvum evacuantia, phlegmagoga sic dicta: Gummi Gutt. rad. Irid. Bryon. Cort. Samb. ejusque, rob, nec non Ebullinum, Herb. Soldanell. Mercur. dulcis, Decoctum Epiphaniæ Ferdinandi, Pil. Beccheri & Stahlî veræ.

3 Roborationi toni prospicientia. lenia Carminativa & subadstringentia: iterne Sem. Dauci, Cumini, fœniculi, anisi, anethi, Cort. Citr. Aurant. Spir. Tartari a Sachio in Ampelographia laudatus, C.C. Tinctura Antimonii, Tartari, Martis Vitrioli Lud. Essent. millefol. Externe linimenta & Empl. nervina, nec non Sacculi discutientes & roborantes ex Herb. Chamom. Matricar. Nepeth. Bacc. Junip. Sem. Mil. Anis. Fœnic. fursur.

4 Sanguinis menstruo vel hæmorrhoidali obstructo viam aperientia: præter scil. interna appropriata Venæsectio in pede, vel hirudinum ad loca solita applicatio.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Nodus laxativus.

R. Rad. Pimpin. alb.	Fœnic. ã. ʒj.
Apij	Fol. Senn. s. fl. ʒj.
Bryon. ã. ʒss.	Rhabarb. el. ʒss.
Herb. Chamædr.	Fibr. Helleb. nigr.
Hyssop.	Agar. mund. ã. ʒij.
Card. bened. ã. Mss.	Tartar. Solub. ʒij.
Sum. Absinth.	Incis. contus. infund.
Fl. Cent. min. ã. p. j.	ʒi. ▽ fervent. & postea af-
Cort. Orum ʒij.	fund. ʒij. Vin. generos.
Sem. Anis.	

##### 2 Decoctum laxans Epiphaniæ Ferdinandi.

R. Rad. Cucum. agrest.	Daucis vel Seseleos, vel
Ireos.	Ruta) anethi ã. p. 1.
Cort. intern. Sambuc.	Cort. Citr. ʒj.
Herb. Soldanell. ã. ʒij.	Cinamom. ʒss.
Incisa infunde per 1 ½ dies	Sagapen.
in ʒvj. Vini albi & clari,	Mastich. an. ʒij.
deinde ebulliant ad	Hæc una ebulliant adhuc.
consumtionem unius tertie,	secundum artem coletur,
quo tempore adde	sevetur, Dos. ʒvj. ʒvij.
Cumini (l. anisi, vel	aliquoties, post aliquot
fœniculi, vel Ammios,	dierum intervalla, repe-
	tenda.

##### 3 Pilulæ laxantes & vomitoria.

R. Mass. Pil. Tartar.	Extr. helleb. nigr. an.
e Gummi ammon.	gr. ms. f. Pil. No. XIX.
an. ʒss.	pro 1. dosi.
Gummi. Gutt.	

##### 4 Pulvis resolvens & diureticus.

R. Lumbr. terrestr. ppt.	Sal absinth. a. ʒss.
Sem. Ebul. an. ʒj.	ms. f. Pulv. d. ad Scat.
Tartar. Vitriol.	Dos. ʒj. bis vel ter per
Arcan. dupl.	diem.

##### 5 Alius Stomachico-diureticus.

R. Pulv. Stomach. Birck-	Sal Card. Bened. ʒss.
mann. ʒij.	ms. f. Pulv. dos. & usus ut
Lumbr. terrestr. ppt.	precedentis.
Tartar. Vitriol. a. ʒj.	

##### 6 Essentia diuretico-nervina.

R. Spiritus Tartari,	ms. Dos. gutt. 30. bis vel ter
Tinct. ʒij acris a. ʒss.	per diem.

##### 7 Sacculus discutiens.

R. Herb. Chamom.	Sem. Fœnic.
Matricar.	Anis. a. ʒij.
Menth. crisp. a. Mj.	Incis. contus. includ. Sacc.
Bacc. Junip. ʒss.	ventri imponendo.

8 Balsamus Stomachicus & Carminativus.  
R. ʒʒ Nucist. expr. ʒj. Balsam. Peruv. ʒj. M.  
dest. Tacamah.  
Aneth.  
Anis. a. ʒss.  
[pro inungendo Scrobiculo cordis & umbilico.]

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Materia viscida lenta fermentescens, flatibus ansam præbens, incidenda, resolvenda & ad diuresin disponenda per remedia Salina, rad. aperientes & alexipharmaco-diureticas, nec non Gummi resinas.
- 2 Si obstructio mensium vel hæmorrhoidum prægressa fuerit, in malo recentiori vena secanda est in locis inferioribus, vel pro re nata locis hæmorrhoidalibus hirudines applicandæ, interpositis remediis, quæ hæmorrhagias consuetas restitunt.
- 3 Materia peccans ad excretionem disposita evacuanda est per alvum & in robustioribus per vomitum, & tales evacuationes, præsertim per alvum, repetantur, quoties necessitas earum usum suadet.
- 4 Substituenda tandem & interponenda sunt lenia Carminativa interne & externe usurpata, nec non subadstringentia.
- 5 Ubi a febribus intermittentibus ortum habuit, eo magis digestiva & Noduli laxativi, cum radicibus incidentibus & herbis amaris, locum habent, interponendo & alia, quæ partim diuresi, partim roborationi partium prospiciunt.

#### VIII. Cautela Practica.

- 1 Omnia quæ in hydropse annotata sunt, & hic observanda veniunt.
- 2 Omnes fortiores evacuationes, absque perito præparantium præmissio usu, plus damni quam emolumenti afferunt.
- 3 Optima methodus est, quæ per epigrasin instituitur, materiæ nimirum digestionem, leni diuretica & alvina evacuatione & tandem ipsius labefactati toni restitutione.
- 4 Calidiora carminantia remedia quam maxime nocent, imprimis si digestiva & evacuantia neglecta fuere.
- 5 Equitatio a Sydenhamio in Phthisi & Hectica laudata, imprimis & hic locum habet, ordinando ægrotis aliquantum adhuc orthostadiis; nulla enim fere re tonus viscerum abdominis certius restituitur, quam hoc exercitio sensim instituto, & diutius continuato.
- 6 Nimius potus, imprimis aquosus, adauget stases serosas; unde parciore potu utendum est.
- 7 Vinum ipsum Medice usurpatum non reformidandum est, & quo generosius, eo melius. Potest autem ejusdem vis inebriativa & sulphurea infringi per Decoctum diureticum Ordinarium.
- 8 Pro vi etiam diuretica ejusdem augenda optime cineres ex herbis diureticis parati eidem infunduntur.
- 9 In fœminino sexu usus Pilularum Stahlî vel Beccheri verarum haud male se gerit.
- 10 Nunquam concedenda sunt flatulenta, viscida & fermentescientia, neque in cibis neque remediis; horum loco potius usurpentur incidentia varia, succus Raphani, Armoracia, Sinapi, & Nasturtium.

## CAPUT QUINTUM.

### D E

#### Hydrocephalo.

I. *Definitio.* **E**st tumor aquosus Capitis quandoque satis insignis, a lymphâ, in capitis vel interni vel externis partibus stagnantem, originem habens.

#### II. *Differentia.*

- 1 Distinguitur ab aliis hydropis speciebus ratione loci, qui in hoc affectu Caput tantum sibi vindicat.



2 Ratione etiam sui ipsius differt. Alius enim sedem habet intra Cranium, alius extra illud.

### III. Signa.

- 1 Quando Hydrocephalus externe sedem habet, facillime sese manifestat. Conspicuum nimirum tumor est in superiori præcipue Capitis parte a fronte ad occiput usque.
- 2 Diaphaneitate præterea gaudet, quæ, opposita candela, oculis sese offert.
- 3 Tumor ratione magnitudinis variat: quandoque enim inter limites suos adhuc subsistit, quandoque extraordinarie attollitur.
- 4 Partes inferiores rarius ab eodem valde occupantur & inter eas minime labia, nasus, oculi.
- 5 Quod si intra cranium aqua stagnet, tumor externe durior, nec trasparens est, futuræ dehiscunt, oculi prominent, & patiens continuo ad soporem inclinatur.

### IV. Subjectum.

Obnoxia huic affectui præcipue est infantilis ætas, quæ sub partu difficiliore restrictiones violentas versus caput, ex utero jam exclusum, factas, vel aliam vim intra vel extra uterum, passa erat.

### V. Prognosis.

- 1 Prout tumor vel major vel minor est, eo faciliorem aut difficiliorem curam admittit.
- 2 Qui extra Cranium, intra cutem & pericranium, sedem habet, curatu multo facilius est, quam qui ad interiora cerebri sese etiam extendit, quippe qui non tantum plures in medendo difficultates involvit, sed & ut plurimum evidens periculum conjunctum habet.

### VI. Remedia.

- 1 Aquam collectam evacuantia, phlegmagoga, nutricibus vel infantibus aliquoties exhibenda: Mechoacann. Syrupus rosar. sol. e Spina cervin.
- 2 Eandem discutientia, lenia antiepileptica: e lignis anti venereis, Succino, Antimonio, Tartaro, Decoct. Lign. Quajac. Sassafr. Rad. Sarapar. Chin. Antimon. diaph. Tart. Vitriol. Arcan. Tartari, Tra Zij, Tartar. Essent. succin. vel infanti, vel, si teneriores adhuc fuerint, nutrici exhibenda. Externe fotus & Sacculi discutientes ex Herb. Chamom. Puleg. Origan. Absinth. Rut. Fl. Sambuc. Melilot. Sem. Cumin. Fœnic. Anis.
- 3 Quæ externe aquæ stagnanti immediate exitum concedunt, ex fonte Chirurgico depromuntur.

#### Formula Remediorum.

- 1 Species pro Decocto antiepileptico.  
R. Rad. Sarapar. Sem. Fœnic. Zij.  
Chin. Incis. contus. d. ad ch. pro  
Liquir. a. ʒss. Decocto loco potus ordi-  
Lign. Quajac. ʒvj. narii inserviendo.  
Sassafr. Zij.
- 2 Tinctura antiepileptica.  
R. Tra Zijacris, bis per diem ad 30. guttas  
Ess. lign. a. ʒss. assumenda,  
Succin. ʒj. M.
- 3 Sacculus discutiens.  
R. Herb. Origan. Sem. Cumin.  
Chamom. Fœnic. a. ʒj.  
Puleg. a. Mss. Incis. contus. includ. Saccu-  
Fl. Stœchad. Arab. lis in Vino coquendis &  
Lavend. calide applicandis.  
Ror. mar. a. p. j.

### VII. Methodus medendi.

- 1 Aqua in Capite stagnans discutienda & evacuanda est, per resolventia, antiepileptica & phlegmagoga sibi invicem iusto ordine interposita & subjuncta.
- 2 Quando internis & externis remediis malum haud obedit, Chirurgia in auxilium vocari potest, incisionem in loco quodam declivi Capitis per Scalpellum faciendo.

### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 In tenella adhuc infantis ætate ab omnibus fortioribus abstinendum est.
- 2 Præstat etiam medicamenta nutrici potius quam in-

fanti exhibere, nisi admodum blanda sint.

- 3 Forestus Unguentum ex ʒʒ chamom. ʒiv. & Sulph. pulv. ʒij. commendat, sed deterret sulphuris repellendi vis.
- 4 Incisio in illo tantum casu locum habet, quando intra cutem & pericranium aqua collecta est.
- 5 Neque etiam uno impetu eandem evacuare decet, sed sensim sensimque; alia mors accelerari posset.
- 6 Quando aqua intra cranium stagnat, suadent quidam Auctores trepanationem, sed imitari easdem variæ difficultates prohibent: adde, quod Summæ rei per hanc Operationem etiam feliciter institutam parum utilitatis accedat, cum in hoc casu aqua sæpius etiam in ipsis interioribus cerebri partibus stagnet.

## CAPUT SEXTUM.

DE

### Hydrope Pectoris.

I. *Definitio.* **E**st species hydropis satis gravis, a depositione feri ac lymphæ in cavitatem thoracis originem ducens.

### II. Differentia.

- 1 Alius utramque thoracis cavitatem occupat, alius alterutram tantum.
- 2 Quomodo ab Empyemate, Asthmate humido, aliisque pectoris morbis distinguatur, ex signis, cuique affectui propriis, facile patebit.

III. *Signa.* Si nullus est morbus cognitu difficilis, Hydrops sane pectoris est, sequentia tamen ab Authoribus recensentur.

- 1 Conqueruntur ægri de angustiis præcordiorum, respiratione difficili, noctu præcipue ægrum affligente.
- 2 Concurrit ut plurimum palpitatio cordis, tussis sicca, dolor gravativus in pectore ad circumferentiam diaphragmatis usque sese extendens.
- 3 Quando ægri corpus inclinant, percipitur aquarum fluctuatio.
- 4 Appetitus quandoque satis sibi constat, ipsa etiam excrementa per alvum, urinam, sudores sæpius rite excernuntur.
- 5 Malo tamen incrementa magis fumente, hæc omnia imminuuntur & extraordinarie se habent.
- 6 Scrotum etiam & pedes tunc cum abdomine intumescere incipiunt.
- 7 Et quod observatu dignum est, notante Histor. Morb. Urat. Scrotum attollitur in tumorem, antequam vel venter vel pedes intumescant.
- 8 Succedit etiam febricula hectica, ita ut partes superiores, tumentibus inferioribus, consumantur & exarefcent.

### IV. Subjectum.

- 1 Phlegmatici & Sanguineo-Phlegmatici labem insigniorem in visceribus, lymphæ secretioni potissimum inservientibus, possidentes.
- 2 Variis excretorum & retentorum vitiis expositi.
- 3 Aerem crassum, nebulosum inhabitantes, Diætæ etiam crudæ, phlegmaticæ addicti, nec non otium & somnum nimium amantes.
- 4 Imprimis scabiei perverfas medicationes passi, aut diuturnis asthmaticis affectibus vexati.

### V. Prognosis.

- 1 Cum morbus hic ut plurimum læsionem alicujus visceris pro causa habeat; ideo Curatio ejusdem non absque summa difficultate procedit.
- 2 Quando perite, secundum secretiones & excretiones debitas, tractatur, per plures annos durare potest.
- 3 Sæpius tamen ex improvise ægri, quasi suffocati, intereunt.
- 4 Urinam bene & in magna quantitate procedere, bonum est.
- 5 Quo magis imminuitur & tingitur, cum sedimento furfuraceo aut lateritio, eo pejor ægroti status.



6 Quo magis tussis, respiratio difficilis, præcipue sub somno, sitis, febricula urgent, eo omnia periculosa.

#### VI. Remedia.

- 1 Serofam colluviem in thorace collectam per alvum evacuantia, phlegmagoga, aliquoties jam nominata, ad quæ etiam Electuarium hydragogum Sylvii, quod tamen vehementius purgat, lenitivum Burri & similia referenda.
- 2 Eandem incidentia, per urinarias vias educunt: Salia alcalia & media prudenter exhibita: Arcan. dupl. Tartar. Vitriol. Sal digestivum Sylvii, Sal Genist. Absinthii Cent. min. Rad. Vincetox. Apii, Petroselinii, Pimpinell. alb. Raphan. Herb. Nasturt. Cochlear. Piperit. Sem. Sinap. Nasturt.
- 3 Diapnoen habitus externi promoventia, diaphoretica fixa: Oc. 3. ppt. 3 diaph. Bez. min. Cinnabaris anrimonii, Decocta ex lignis antivenereis.
- 4 Viscerum tonum & humorum fluiditati simul prospicientia, acriuscula, nec non subamara: Rad. Helen. Vincetox. Pimpin. alb. Ari, Curcum. Zinzib. Galang. Herb. Fumar. Card. Bened. Absinth. Cent. min. trifol. fibrin. Pilulæ ex extractis amaribus cum Gummatibus blandis sociatæ, Essent. Cort. Orum, Adianth. alb. Tinctura 3ij, Tartari. Huc etiam referendus Motus Corporis per equitationem aut vecturam, in malo non ad modum inveterato.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Nodulus laxativus.

Rx. Rad. Bryon.	Ebul. 3j.
Apii.	Fol. Senn. f. 3vj.
Polypod. qu. 3ss.	Agar. mund. 3ss.
Herb. Tussilag.	Fibr. belleb. nigr. 3ij.
Capill. 3ris,	Tart. Solub. 3ij.
Salv. Sylv. 3. Mss.	Incis. contus. d. ad. ch. c. aqua
Fl. Scabios.	& vino infundend. & al-
Bellid. 3. p. j.	ternis diebus ad 3vj. vij.
Sem. Erysim.	usurpand.

##### 2 Electuarium hydragogum.

Rx. Conserv. cynosb. 3j.	Syr. capill. 3ris q. s. f. E-
Rob. Samb. 3vj.	lect. bis vel ter per diem
Sem. Ebul. 3iss.	mucis juglandis magni-
Pulv. lumbr. terrestr.	tudine sumendum.
Tart. Vitriol. 3. 3j.	

##### 3 Mixtura pectoralis ex Hist. Morb. Urat. in suffocationis metu.

R. 3. amygd. d. 3j.	ad ignem sub diligenti a-
Sperm. Cet. rec. 3ij.	gitatione paratur.
Liq. C. C. Succin. 3ss. M.	

#### VII. Methodus medendi.

Eodem fere modo ac in reliquis hydropis speciebus instituitur.

- 1 Serum superfluum in corpore stagnans expellendum est, cum per laxantia & diuretica, tum diapnoica iusto ordine sibi interposita & subjuncta.
- 2 Quando febricula concurrit, auxilium ferendum est per gelatinosa, diaphoretica fixa, Nitrosa & emulsiva.
- 2 Ipsis vero viarum & humorum vitiis succurrendum remediis incidentibus, subamaris, tonicis.
- 4 Ubi suffocationis metus intercurrit, commiscenda sunt remediis pectoralibus, balsamicis, Salia volatilia in minori dosi, & alvus laxanda per Clysteres.

#### VIII. Cautela Prædica.

- 1 Venæsectio sicuti in aliis hydropis speciebus, ita neque hic conducit.
- 2 Neque etiam ea, quæ externe tantum serum evacuant, nimirum Paracentesis, Vesicatoria, Fonticuli aliquid ad summam rei conferunt, quin potius, præcipue posteriora, eximia sæpe damna & pericula pariunt.
- 3 A purgantibus fortioribus, in malo proventiori & concurrente febricula, abstinendum est.
- 4 Diuretica fortiora, imprimis Salina, in morbis pectoris caute sunt propinanda, ob stimulantem, & turgescientem, quam possident, vim.

5 Diapnoica quoque, quæ adhibentur, debent esse temperatoria, ne humores in orgasmum concitentur.

6 Quo magis viscera sunt læsa, eo blandior semper adhibenda medendi methodus, ne plus damni, quam emolumenti afferatur.

### CAPUT SEPTIMUM.

#### D E

#### Hydromphalo, & Hydrocele.

##### I. Definitio.

###### 1 Hydromphali.

**E**st ingens umbilici prominentia, a subtus stagnante ferro originem habens.

###### 2 Hydroceles:

Est tumor scroti solito major, ab aqua in ejusdem tunicis collecta proveniens.

##### II. Differentia.

1 Hydromphalos facile distinguitur ab *Enteromphalo* & *Epiplomphalo*: in illo enim tumor mollis & transparentes est, nec removeri potest; in his autem tumor non admodum mollis, nec pellucidus est, & si digitis premitur, vel æger in lecto situm servat supinum, tunc vel sensibilibus subsidet, vel plane disparet.

2 Hydrocele a *Pneumatocoele* distinguitur per tumoris transparentiam & gravitatem, quæ in hydrocele adest, in pneumatocoele vero opacitas & levitas ipsius tumoris observanda. Deinde etiam Hydrocele lento gradu procedit; pneumatocoele autem in infantili & puerili ætate ex improvise sæpius ingruit.

##### III. Signa.

###### 1 Hydromphali:

- 1 Tumor est laxus & mollis, plurimum asciten vel antecedens vel concomitans.
- 2 Quando digitis premitur, aqua intus contenta quasi fluctuans percipitur.
- 3 Præterea si candela apponitur, diaphaneitatem ostendit tumor.

###### 2 Hydroceles:

- 1 Tumor adest mollis & indolens solito major, in alterutro scroti latere vel etiam utroque conspicuus.
- 2 Si candela opponitur, instar vesicæ aqua plenæ, pellucidus est.
- 3 Gravitate etiam sua ægro molestus est.
- 4 Sæpiissime Asciten concomitatur, aliquando tamen etiam idiopathice evenit.

##### V. Subjectum.

- 1 Hydromphalo obnoxia quandoque est ætas infantilis, nec non consistens Ascite laborans.
- 2 Hydrocelen experiuntur tam adulti quam infantes, & præcipue illi, qui Asciti obnoxii sunt. Quandoque etiam illis familiaris est, qui partium relaxationem a contusione, & compressione scroti obtinuerunt.

##### V. Prognosis.

- 1 Hydromphalos, qui idiopathice infantibus evenit, facile medicationi obedit.
- 2 Quando vero symptomatice Asciten concomitatur, nulla Curatio solida, nisi causa mali primarii sublata, speranda est.
- 3 In Ascite rumpitur quandoque tumor & aqua cum impetu effluit, non absque levamine patientis.
- 4 Hydrocele idiopathica itidem facilius curatur, quam complicata cum hydrope, quæ difficillime Curam admittit.
- 5 Sæpius ad insignem magnitudinem excrescit tumor & per plures annos subsistit, aqua tamen stagnante nullam putredinem concipiente.
- 6 Quæ punctione curatur hydrocele, brevi redit, si ab interno fomite dependeat.

##### VI. Remedia.

- 1 Interne humores viscidos incidentia & evacuantia, quæ præcedentibus capitibus in hydropis speciebus sunt lau-



## CAPUT OCTAVUM.

D E

## Oedemate.

laudata, nimirum Noduli laxativi & resolventes cum epicrafi agentes.

- 2 Externa tumorem discutientia, Carminativa & resolventia: Rad. Sigill. Salom. Bryon. Vincetox. Irid. flor. Caryophyllat. Helen. Herb. Chamom. Calaminth. Origan. Matricar. Puleg. Chæref. Flor. Melilot. Ror. Mar. Bacc. Laur. Junip. Sem. Fœnic.
- 3 Externe aquam immediate evacuat punctio mediantibus instrumentis peculiariter ad hoc opus adaptatis.
- 4 Ulteriore aquæ collectionem præcavent exsiccantia & subadstringentia, cum discutientibus modo nominatis remixta, v. g. fl. Balauft. Ros. rubr. Bacc. Myrt. Nuc. Cupress. in Vino rubro cocta. Nec non Diæta sicca, aromatica, calor externus.

## Formula Remediorum.

## I Nodulus laxativo-resolvens.

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| R. Rad. Bryon.        | Rhabarb. el.              |
| Vincetox. a. ℥ss.     | Agar. mund. a. ℥ij.       |
| Irid. fl. ℥ij.        | Fibr. Helleb. nigr. ℥j.   |
| Herb. Card. Bened.    | CrySTALL. Tartari ℥ij.    |
| Capill. Qris.         | Incis. contus. d. ad ch.  |
| Triso fibrin. a. Mss. | Cum ℥j. aquæ fervent. ℥.  |
| Summ. Absinth. p. j.  | Vin. generos. ℥ij.        |
| Sem. Petrosel.        | infund. & alternis diebus |
| Cumin. a. ℥j.         | ad ℥vj. ab adultis usur-  |
| Fol. Senn. f. fl. ℥j. | pand.                     |

## 2 Pulvis diuretico-diapnoicus.

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| R. Oc. ℥. ppt.         | Cinnabaris ℥ij. ℥j. M. f.   |
| ℥ij. diaph. a. ℥j.     | Pulv.                       |
| Tartar. Vitriol.       | Dos. ℥j. bis, ter per diem. |
| Magist. Sulph. a. ℥ss. |                             |

## 3 Essentia diuretico-diapnoica.

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| R. Træ ℥ij. acris,   | ms. Dos. gutt. 30. Mane in |
| Ess. lignor. a. ℥ss. | juscule.                   |

## 4 Sacculus discutiens.

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| R. Rad. Bryon.    | Junip. a. ℥ss.               |
| Sigill. Salom.    | Sem. Cumin.                  |
| Vincetox. a. ℥vj. | Fœnic. a. ℥j.                |
| Herb. Puleg.      | Incis. contus. includ. Sacc. |
| Chamom. a. Mj.    | & Coq. in Vin. calide        |
| Flor. Ros. r.     | per aliquot dies appli-      |
| Melilot. a. p. j. | cando.                       |
| Bacc. Laur.       |                              |
- 5 Decoctum discutiens & subadstringens.
- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| R. Herb. Absinth. | Nuc. Cupress. a. ℥ij.       |
| Calaminth. a. Mj. | Incis. contus. Coq. in Vin. |
| Flor. Chamom.     | rubro cum spongia appli-    |
| Balaust.          | cand.                       |
| Bacc. Myrt.       |                             |

## VII. Methodus medendi.

- 1 In causa idiopathica corpus per remedia in serum & lympham viscidam stagnantem agentia expurgandum est.
- 2 Loco immediate affecto succurrendum per discutientia & resolventia, sub Sacculorum vel Decocti, in Spongia applicandi, forma usurpanda.
- 3 Ubi vero neque interna neque externa auxilium ferunt, & tumor admodum magnus est, per punctiorem aqua educenda est, subjungendo interne sanguinem purificantia, externe vero desiccantia & subadstringentia, aquarum collectionem præcaventia.
- 4 Insuper Diæta instituat sicca, paululum aromatica & modice vinosa.
- 5 In malo Symptomato respiciatur imprimis ad causam primariam: nam sublato morbo, tollitur effectus.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Sicuti Paracentesis in Hydrope merum palliativum remedium est, sic punctio in Hydromphalo & Hydrocele.
- 2 Eo minorem autem præstat usum, quo certius alius morbus concurret.
- 3 Quando symptomatice occurrunt hi tumores, magis ad primarium respiciendum est morbum, quam hæc symptomata.
- 4 Repellentia externa nunquam non fugienda sunt, ob majora exinde metuenda mala.
- 5 Camphorata in stasibus hujusmodi serosis parum auxilii præstant, sed potius subtiliores feri partes dissipant, crassioribus relictis.

I. *Definitio.* **E**st tumor indolens, mollis & pallidus, digitorum impressorum vestigia relinquens, & in superioribus vel inferioribus artibus v. g. manibus, aut pedibus contingens, a stagnante lymphatico-seroso humore originem habens.

II. *Differentia.*

- 1 Aliud est *idiopathicum*, a causis magis externis simpliciter dependens.
- 2 Aliud *symptomaticum*, Hydropem, Phthisin, Hæticam, Quartanam male curatam, Cachexiam concomitans & subsequens.
- 3 Differt a *Cachexia*, quæ universum corporis habitum, flaccidum, pallidum & subtumidum constituit.
- 4 Ab *Anasarca* & *Leucophlegmatia*, ubi pariter universum corpus tumore insigni, ad splendorem quasi cutis sese extendente, afficitur.
- 5 Ab *Ascite* & *Tympanite*, in quo, præter oedemata pedum, eximia abdominis distensio occurrit. Adeoque tumores hi magis pro universalibus, Oedemata autem pro particularibus pedum & manuum habenda sunt.
- 6 Differt denique a *tumore rheumatico* & *podagrico*, ubi dolor, rubor, & durities potius quam mollieties partis affectæ observatur.

III. *Signa.*

- 1 Occupant Oedemata ab initio extremos quasi artus id est, manus & pedes stricte sic dictos, parvumque & vix percipiendum tumorem constituent.
- 2 Sensim vero sensimque magis auferunt, cutemque tumidam & pallidam reddunt, digitisque impressis foveas præbent.
- 3 Nullo vero dolore molesta sunt, nisi ad eum gradum ascendant, ut cutem ad splendorem quasi extendant, ubi tensio dolorifica percipitur.
- 4 Præcipue autem circa vespere maxime sunt conspicua, nocte autem calore lecti fere discuti & disparere solent.
- 5 Frequentius vero occupant pedes, quam manus.
- 6 Corpus sub hac constitutione ad negotia consueta lassum & torpidum est, appetitus ad frigidos quam calidos cibos magis inclinat, somnus profundus & diurnus plerumque.
- 7 Urina in minori excernitur quantitate, sub pallida vel lixiviosa specie.
- 8 Quando cum alio morbo complicatum est malum, sive, ut illius sit quasi consequens, in extremitatibus artuum non solet subsistere, sed magis magisque sese extendere, & fere universam partem occupare.
- 9 Quoad tactum frigida sunt Oedemata & pallida, ultimo tamen tempore hinc inde maculae rubicundæ apparent, & vasa sanguifera in conspectum veniunt.
- 10 Non raro etiam in hoc casu contingit, ut rumpantur hæc oedemata, & sero stagnanti continuum concedant exitum.

IV. *Subjectum.*

- 1 Phlegmaticum, aut prædominans hoc temperamentum possidentes.
- 2 Senes, desides, somno & laetæ Diætæ maxime indulgentes.
- 3 Gravidæ, in ultimo gestationis tempore constitutæ.
- 4 Quibus apostasies febriles vel erysipelata per discutientia fortiora externa tractata fuere.
- 5 Loca humidiora inhabitantes, & victu crassiori utentes.
- 6 Sæpius etiam illis eveniunt, qui febres acutas vel alios morbos graviores superavere.
- 7 Symptomatice a mala viscerum & humorum constitutione experiuntur oedemata hydropici, cachectici,



quartanarii male tractati, Phthisici, asthmatici diuturni.

8 Quibus in febribus Salia volatilia in majori quantitate fuere exhibita, ut inde hepatis strictura fuerit inducta, aut etiam quibus nimia absorbentia data fuere.

9 Aut quibus Scabies retropulsa est.

10 Vulnerati, per refrigerantia externa tractati.

11 Fœminæ denique mensium suppressione & viri hæmorrhoidum obstructione laborantes.

12 Qui crura nimis stricte ligant & simul vitam sedentariam agunt.

#### V. Prognosis.

1 Omnia œdemata maximam merentur attentionem.

2 Quo simplicius est œd. ma, eo major restitutionis spes habenda.

3 Omnia Oedemata, ab humorum vitiis dependentia, facilius curantur, quam quæ a viscerum læsionibus ortum habent.

4 Unde ascitica, tympanitica, phthisica, asthmatica, hæctica admodum sunt periculosa.

5 Oedemata post male curatam Quartanam evenientia, nisi febris revocetur, facile hydropem post se ducunt.

6 Oedemata simplicia, si fortioribus discutientibus retropelluntur, viscera obstruunt & morbum complicatum non raro lethalem produciunt.

7 Quamdiu adhuc sunt vaga & in lecto disparent, eo magis restitutio speranda.

8 Meliorem etiam spem præbent, si interdiu & extra lectum non admodum frigida sunt, neque nocte aut in lecto insigniter æstuant.

9 Quod si rumpantur, aut plane in gangrænam cum symptomatibus gravioribus stipatam abeant, de ægroto actum est.

10 Quando dolores acerbiores in mediotallo quasi partis patiuntur ægri pessimum est signum & gangrænam imminuentem portendit. Observavi hoc in duabus feminis. Prima erat puerpera, quæ post lochiorum minus bene succedentem fluxum œdemate insigni sinistri pedis correpta fuerat. Tertio mense, post quam varia jam usurpaverat remedia, vocabar: tumor se ad inguina usque jam extendebat, cutis nitebat & hinc inde maculæ minores rubicundæ apparebant & ægra de magnis doloribus conquerebatur: præscribebam Tincturam alcalinam cum Ess. alexipharm. Stahlî mixtam; externe vero usum linteaminum calidorum suadebam. Sed do. ores indies augebantur, ita ut omnes noctes insomnes transigeret, maculæ colorem mutabant & fiebant plumbei coloris ac tandem nigrae, pusillæ quoque majores & minores ejusdem coloris hinc inde conspiciebantur, accedebant Lipothymia & tandem mors. Altera pariter post puerperium levi saltem Oedemate correpta fuerat, quod, cum nihil incommodi exinde sentiret, negligebat, sed elapso aliquo tempore insignes accedebant dolores cum aliquot maculis rubicundis hinc inde conspicuis. Medicus ordinarius credens erysipelacei quid subesse præscripserat pulverem erysipelatoden Mynsichti. Sed cum hicce nil solidi præstaret, vocabar ad eam, consentiente Medico ordinario: omnibus probe consideratis I bere profitebar, me Gangrænam metuere; & hinc usum alexipharmacorum suadebam: ordinarius vero metum huncce inanem esse excipiebat. Sed exitum monstrabat veritatem, Sphacelus enim elapsis octo diebus cum gravissimis Lipothymiis diu durantibus & mors sequebatur.

#### VI. Remedia.

1 Hæmorrhagiis obstructis v.g. mensibus vel hæmorrhoidibus, si subsunt, consulunt præter appropriata V. S. in pede, vel in posteriori malo hirudinum usus.

2 Seri muciditatem & spissitudinem incidentia & corrigentia: Rad. Ari, Bard. Cichor. Vincetox. Onon. Apii, Petrosel. Helen. Petasit. Pimpin. alb. Tarax. Lign. Quajac. Sassafr. Herb. Card. Ben. Fumar. Trifol. fibrin Nasturt. Cochlear. Capill. & Gris Summ. Absinth. Cent. min. Gummata temperata: Ammon. Heder. Junip. Galban. Salia digestiva: Tar-

tar. Vitriol. Arcan. dupl. Sal polychr. Glas. Liq. Nitr. fix. Sal. Absinth. Card. Bened. Cent. min. Lumbr. terrest. Tinct. diuret. Tartar. Antimon. acris, Nitri fixi, Cibi aromatici: Sem. Sinap. Rad. Armorac. Petrosel. Herb. Piperit. Nasturt. Asparag. pro cibis, Vinum generosum cineribus lixiviosis magis diureticum redditum. Externe huc pertinent acriuscula & discutiente vi prædita v.g. Chelidon. maj. rec. Raphan. Sedum Vermicular. murar. fol. Bardan. Petasit. Tabac. Saponata, Aqua Calcis vivæ, Fetus vaporosi ex ejusmodi herbis resolventibus & incidentibus cum Vino parati.

3 Præparatam materiam evacuant phlegmagoga: in robustioribus Gumm. gutt. Jalapp. Diagryd. Jalap. Specif. Jalapp. in delicatioribus Noduli laxativi cum Fol. Senn. Agar. Rad. Bryon. Rhabarb. Cort. Samb. Sem. Ebul. Cartham. nec non Sal. Cathart. Angl. Pil. Becheri, D. Stahlî, Polychr. Hall.

4 Tonum partium relaxatum corrigentia: præter supra nominata vegetabilia amaricantia, Martialia leniora reliquis perite interposita v.g. Tinct. Vitriol. Mart. Lud. Zwelf. Croc. & tis Antimon. Stahl. nec non Essent. Cort. Orum, trifol. fibrin. adianth. alb.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Nodulus incidens & evacuans.

R. Rad. Bryon.	Fol. Senn. f. st. ʒvj.
Onon.	Rhabarb. el. ʒiij.
Appl. ʒ.	Agar. mund.
Herb. Card. Ben.	Fibr. helleb. nigr. ʒ. ʒjss.
Trifol. fibrin.	Tartar. solub. ʒiij.
Capill. & Gris ʒ. Mss.	Incis. contus. infund. in ʒvj.
Fl. Cent. min.	aq. & ʒvj. Vin. generos.
Genist. ʒ.	alternis diebus ad ʒvj.
Sem. Ebul.	usurpandus.

##### 2 Pulvis incidens & diureticus.

R. Pulv. lumbr. terrest.	Sal onon. ʒss.
Sem. Ebul. ʒ.	M. D. bis vel ter per diem
Arcan. dupl. ʒi.	ad ʒj.

##### 3 Alius diureticus & diaphoreticus.

R. Lumbr. terrest. ppt.	Sal Cent. min. a. ʒj. M.
ʒi diaph. a. ʒij.	Dof. & usus ut præceden-
Tartar. Vitriol.	tis.

##### 4 Cineres pro potu lixivioso.

R. Cin. Fabar.	Bryon. a. Mj. M.
Genist.	Infund. potui ordinario.
Junip.	

##### 5 Essentia diuretico-tonica.

R. Tinct. ʒi acris ʒij.	M. D. bis per diem ad ʒo.
Ess. cort. Orum.	guttas.
Adianth. alb. a. ʒj.	

##### 6 Cataplasma.

R. Rad. Bryon. rec.	Incisa & contusa coq. ad
Chelid. maj. a. ʒj.	mollitiem & irrorentur
Herb. Bardan.	Spir. Vin. ac applic. ca-
Sed. verm. a. Mj.	lide.

#### VII. Methodus medendi.

1 Oedema idiopathicum exposcit materiæ seroso-lymphaticæ attenuationem & resolutionem, ejusdem evacuationem, & tandem partium relaxatarum roborationem, idque per remedia interna & externa.

2 In symptomatico vero ad primarium semper respiciendum est morbum.

3 Quando igitur hæmorrhoidum vel mensium vitia subsunt, cura a Venæsectione incipienda, eo tempore eandem celebrando, quo vasa sunt conspicua, & subjungendo resolventia & attenuantia.

4 Si febres quartanæ, citius, quam par erat, suppressæ œdematibus viam paraverint, illico febriles paroxysmi revocandi sunt per nodulos laxativos, interponendo illa remedia, quæ œdemati stricte sic dicto debentur.

5 Quæ Hydropem universalem concomitantur, eadem methodo, qua primarius morbus, tractantur.

6 Quæ Hæctica vero & Phthisi superveniunt, nullam curam



curam admittunt, nisi morbus primarius, quod rarissime fit, curatus fuerit.

7 Gravidarum œdemata V. S. iusto tempore instituta & motu corporis leniuntur, expectando cæterum iustum pariendi tempus, quo elapso iterum disparere solent.

8 Quando scabiei retropulsæ originem debent, interne Mercurius dulcis & fl. Sulph. usum egregium habent, interponendo attenuantia & resolventia supra nominata.

9 Quoad Diætam, eligenda sunt loca temperata, cibi expepti, aromatici, assati, vinum generosum. non negligendo motum corporis per aliquod tempus continuandum.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1 Camphoræ usus externus in hoc affectu nil valet: discutit enim subtiliores partes & crassiores relinquit.

2 Præstat fons vaporosus cum Vino, vel epithemata discutientia ex vegetabilibus acriusculis parata adhibuisse, sed sedulo cavendum est, ne sub horum usu pars affecta frigori exponatur & sic retrocessioni ansa præbeatur.

3 Quando œdemata a mensium vel hæmorrhoidum vitiis originem habent, ab omnibus remediis externis cessandum est, & res peragenda V. S. & internis resolventibus & attenuantibus.

4 Quando œdema jam admodum invaluit, tunc Venæsectiones in pede non amplius locum habent. Quamdiu vero adhuc vagum est, ita ut modo delitecat, modo redeat, commode institui possunt, dummodo vasa sint conspicua.

5 Et hoc etiam de Sacrificationibus tenendum, ut pote quæ in Oedemate præfente locum haud habent: quia mala ulcuscula & quandoque ipsum Sphacelum producant.

6 Oedemati insigniori cutis rupturam minanti prospiciendum est internis evacuantibus & resolventibus, externis vero discutientibus & balsamicis.

7 Quod ab internis causis originem trahit, primario internam exposcit medelam, & tandem subijunctum auxilium externum.

8 Quando interna medicatio negligitur, & saltem ad externam, discutientia animus intenditur, facile retropelluntur œdemata, & obstructions, scirrhus, vel inflammationes viscerum post se trahunt.

9 Inveterata œdemata, maximam partem causis externis originem debentia, præcipue si patientes sint annosiores, præstat sibi relinquere.

10 Emplastica resinosa acria minus conveniunt.

11 Saponata vero & Tabaci folia mature adhibita exerunt quandoque aliquam efficaciam.

12 Lixivii antimonialis, quod aliqui commendant, rarior & vix effatu dignus effectus est.

13 Efficaciorem adhuc se gerit aqua Calcis vivæ, quæ post extinctionem obtinetur, in ruboribus, qui tumoribus œdematosi quandoque superveniunt, mitigandis.

14 Pingua & unguinosa, a quibusdam laudata, vix aliquid utilitatis præstare possunt.

15 Repellendi vi instructa medicamenta cautissime sunt usurpanda, ob metuenda asthmata, scirrhus & inflammationes viscerum.

16 Unde sulphurata, aquæ fabrorum, aquæ aluminosæ prudenter in usum trahenda sunt.

17 Qui thermis uti gestiunt, integrioribus visceribus instructos esse decet, alias Oedemata, præsertim in sequiori sexu, facile incrementa sumunt & tandem dehiscunt.

18 Acidularum usum plus plerumque damni, quam emolumenti, præstare, quotidiana docet experientia.

19 Ulcera œdematosa non per acria, sed temperatissima, balsamica tractanda sunt.

## S E C T I O IV.

D E

# CORRUPTIONIBUS SERI

## C A P U T P R I M U M .

De Soda s. Oresi.

I. *Definitio Soda.* **E**st ardor s. dolor fervens in orificio Ventriculi superiori & toto œsophago sese exerens, ab acrimonia biliosa originem habens.

### II. *Differentia.*

1 Distinguitur a Cardialgia, in qua ut plurimum orificium tantum sinistrum Ventriculi vario doloris sensu afficitur: in Soda vero specialis ardoris sensus a superiori orificio per universam gulam sese extendit.

2 Alia est *simplex & brevis durationis*, alia est *composita & chronica*, quæ scilicet ab aliis affectibus chronicis, inpr. hypochondriacis, fovetur, qualem in viro nobili observavimus.

### III. *Signa.*

1 Cognoscitur ex ardore & fervore, in orificio sinistro ac universo œsophago sese exerente.

2 Qui ut plurimum digestionis tempore post assumptos cibos acres pingues contingit.

3 Saliva copiosa continuo in os effunditur.

4 Non raro etiam jungitur nausea.

5 Interdum non, nisi vomitu rejectis cibis, cessat.

6 Ordinarie concoctione atque distributione chyli iterum conquiescere solet.

7 Interdum tamen ad aliquot horas extenditur Oresis.

8 Nonnunquam etiam concurrit dolor capitis.

### IV. *Subjectum.*

1 Temperamento cholerico, aut cholerico-sanguineo vel sanguineo-melancholico præditi.

2 Cibos acres, aromaticos, pingues & potum spirituosum, sæculentum & fermentescentem assumentes.

3 Iracundiæ dediti & cruditates biliosas in ventriculo & primis viis habentes.

4 Immediate post cibos motionem vehementiorem per equitationem aut vesturam instituentes.

5 Ventriculum, abdomen & partes inferiores refrigerantes.

6 Gravidæ, quæ ordinarie capillis foetus majoribus Oresin adscribunt.

7 Hypochondriaci & Hæmorrhoidarii, aliasque frequentes sanguinis congestiones ad Ventriculum patientes.

8 Plethorici, Venæ sectiones & Scarificationes partium inferiorum assuetas negligentes.

### V. *Prognosis.*

1 Non magnam meretur attentionem affectus simplex, aut enim post breve temporis intervallum per se requiescit, aut medicamentis adhibitis facile obedit.

2 Si vero cum aliis affectibus complicata est soda, aut quando jam in consuetudinem abiit, sæpius diu satis affligit & magna secum trahit incommoda.

3 In Gravidis sæpius non nisi post partum cessat.

### VI. *Remedia.*

1 Acrimoniam biliosam diluentia & demulcentia: potus Thee, Caffee, Succus Sempervivi, Portulacæ, Gelatin. C. C. Ebor. Decoctum Aven. Hord. Glycyrrhizæ, Tragacantha.

2 Eandem præcipitantia & absorbentia: CrySTALL. mont. ppt. Cret. Oc. 5. ppt.

3 Saburram biliosam temperantia, Nitrosa & salia digestiva cum absorbentibus mixta, blanda acida.



- 4 Congestiones discutientia: Tinctur. *Œii acris*, Tartari cum Spir. C. C.

*Formula Remediorum.*

1 Pulvis absorbens.

Rx. *Crystall. mont. ppt.* N. M. *ā. ʒj. M.*  
Cret. D. aliquot cusp. cultri.

2 Morfuli.

Rx. Cret. albiss. *ʒij.* C. f. q. Sacchar. in *∇*  
Corall. ppt. portulac. soluti. f. Mor-  
Conch. ppt. *ā. ʒj.* fuli.

3 Pulvis temperans.

Rx. *Cryst. mont. ppt.* Conch. ppt. *ā. ʒij. M.*  
Nitr. depur. Div. in 8. p. *aq.*  
Tart. Vitriolat. D. sing. 2. 3. horis.

4 Tinctura discutiens.

Rx. Tinct. *Œii acris. ʒij.* D. 30. gutt.  
Spir. C. C. *ʒj. M.*

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Ubi nihil aliud pro materia acri obtundenda præsto est, *∇* calefacta vel potus Thee & Caffee officium præstat
- 2 Alius satis cito pulveribus absorbentibus vel etiam rebus multa gelatina gaudentibus obedit.
- 3 Si multæ adsunt cruditates biliosæ & mucosæ, Nitrosa potissimum cum absorbentibus ad eas corrigendas exhibeantur.
- 4 In tali casu lene vomitorium & laxantia cum abstergentibus mixta suo non carent usu.
- 5 Si subiecta sunt Plethorica, evacuationibus sanguinis assueta & ad congestiones prona, sanguinis missiones, debito tempore institutæ, præservatorie & curatorie profunt.
- 6 Si affectus est complicatus cum passionibus hypochondriaco-hystericis aut Hæmorrhoidibus, cura potissimum ad hos affectus dirigenda est, de qua suo loco.
- 7 Ad remedia naturalia pertinet quæta in dorso cubatio & continua salivæ deglutitio, per quam materia optime corrigitur, id quod sæpius in proprio expertus sum corpore.

VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 Vomitoria, quæ passim ab Auctoribus commendantur, rarissime necessaria sunt, nisi forte affectus sæpius repullulaverit.
- 2 Multo minus suadenda sunt Vomitoria, ubi pathemata hypochondriaca aut congestiones sanguinis concurrunt, quoniam dictos affectus graviores reddunt.
- 3 Abstinentum quoque est in tali casu a Purgantibus fortioribus & insigniter commoventibus, quæ æque periculosa sunt ac Vomitoria.
- 4 Medicamenta in majori exhibenda sunt quantitate, sic eo citius effectum optatum edunt.
- 5 Abstinentum est ab Absorbentium imprimis Cretæ, Terrarum sigillatarum, Unicornu fossilis, farinæ laterum aliorumque magis vel minus adstringentium abusu, quoniam fibras ventriculi nimis stringendo cardialgias, digestionis læsiones & viscerum constrictiones post se trahunt.
- 6 Ad præcavenda mala ab Absorbentibus metuenda pulvis Nucis moschatæ commode dictis pulveribus admiscetur.
- 7 Si assumpta pinguis, acris & fermentescentia sordæ sunt causa, ab iis abstinentum est. In tali casu spiritus vini ardorem optime temperat.

CAPUT SECUNDUM.

D E

*Fætoris Oris.*

I. *Definitio.* **F**ætor oris est exhalatio mali odoris ex ore ægrotantium & quorundam etiam Sanorum cum molesto adstantium sensu contingens.

II. *Differentia.*

- 1 Alius est continuus, alius per intervalla tantum affligit.
- 2 Alius contingit jejunis, alius cibis satiatis.
- 3 Alius est idiopathicus, absque alio morbo occurrens, alius symptomaticus, aliis morbis accedens.

III. *Signa.*

Fætor oris præcipue sentitur ab adstantibus, quando ægrotantes loquuntur, canunt, rident, oscitant.

IV. *Subjectum*

- 1 Scorbutici & qui præcipue Stomacace laborant.
- 2 Lue venerea correpti & in faucium parte inferiori jam sua mala perferentibus.
- 3 Qui vermes, cruditates nidorosas aliaque in Ventriculo abscondita habent.
- 4 Qui in pulmonibus stases l. ulcera gerunt.
- 5 Quibus dentes carie corripiti incipiunt.
- 6 Qui dentes a ciborum reliquiis non expurgant.
- 7 Qui raphanorum, ceparum & alii usudelectantur.
- 8 Ebrioli & Spir. Vini in copia haurientes.
- 9 Herba Nicotianæ oris interno continuo perfumantes.
- 10 Ulcere denique narium l. capitis laborantes.

V. *Prognosis.*

- 1 In Infantibus fætor oris sæpissime vermes indicat,
- 2 In adultis, qui fætoris oris alias non laborarunt, quandoque morbos præfagit.
- 3 Idiopathicus difficilior curatu est, quam symptomaticus.
- 4 Interdum per totam vitam hoc incommodo vexantur quidam, alias satis sani, nullis remediis scopum optatum efficientibus: hoc in casu vitium in hypochondriis hædere videtur.

VI. *Remedia.*

- 1 Primas vias evacuantia: Rhabarbarum, specificum Jalappinum, Pulvis Cornachini, Sal Catharticum amarum, Noduli laxativi.
- 2 Oris interna, & dentes in specie, a recrementis liberantia: oris collutio frequens & pulverum dentifriciorum usus.
- 3 Exhalationes male olentes corrigentia: Incidentia, amaricantia, suaveolentia: Rad. Angel. Imperator. Pimpinell. alb. Helen. Acori, Cort. citri, Aurant. Sem. Fœnic. Anis. Coriandr. Piper, Cinamom. Caryophylli, Nux. mosch. Cubebæ, Cardamom. Mosch. Ambr. Spec. diamb. diamosch. Trag. suav. Spec. vel. Tab. Imperat. Mastiche.
- 4 Morbi simul conjuncti expetunt remedia specialia, ex specialibus Tabulis, ubi tractantur, haurienda.

*Formula Remediorum.*

1 Pulvis laxans.

Rx. *Specif. Jalappin. ʒss.* D. ad. ch. pro una vice.

2 Alius.

Rx. *Pulv. Cornachin. ʒj.* Ms. f. Pulvis pro una vice.  
Rhabarb. el. ʒss.

3 Sal laxans.

Rx. *Salis Cathart. amar. ʒj.* lenè unica vice.  
Sumatur in jusculo ca.

4 Rotulæ fragrantæ.

Rx. *Pulv. rad. ir. flor. ʒss.* C. f. q. *ʒss.*, in *∇* rosar.  
Spec. diamb. sol. f. l. a. Rot.  
Diamosch. *ā. ʒj.*



5 Morsuli flagrantes.

R. Spec. diacinam. Pimpinell. a. ʒss.  
Aromat. rosat. a. C. f. q. ʒss in ʒ namph. solut.  
3ij. f. l. a. Morsuli.  
Cond. Cort. Orum.

6 Tragea.

R. Trag. suav. ʒij. ʒss. albiss. ʒss.  
Spec. diacinam. Ms post pastum ad aliquot  
diatr. santal. a. ʒss. cultri cuspides assumenda.

7 Pulvis dentifricius.

R. Ciner. rorism. ʒss. dest. lign. Rhod. gutt.  
Pulv. rad. ir. flor. ʒij. vj.  
Oust. Cinam. gutt. iij.  
N. M. a. ʒj. Ms f. Pulv.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Inquirendum ante omnia est in mali originem, secundum quam remedia sunt ordinanda.
- 2 In lue ʒ rea, Scorbuto, phthisi, ulceribus vicinis, præptimis ad morbum primarium respiciendum est, absque cujus Curatione nihil solidi efficitur.
- 3 Ubi Cruditates l. vermes in primis visceribus, ibi conducunt laxantia, inpr. Mercurialia.
- 4 Subjunguntur postea stomachica & roborantia: Piper, mastiche, Tragemata, Pulveres.
- 5 Quando malum a carie dentis ortum trahit, tunc evulsio ipsius dentis est optimum remedium.
- 6 In Sanis, si idiopathice affligit & refractarie subsistit, conducit commasticatio rad Pimpinellæ, Helen. frustul. Cinam. Cort. Orum aut Tabularum l. Rotularum fragrantium.
- 7 Ubique etiam frequens collutio oris & usus dentifricorum malum, si non tollit, eximie tamen imminuit.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 In sexu sequiori moschata & ambrata in formulis sunt omittenda, pleræque enim sæminæ illa ferre nequeunt.
- 2 In dentifriciis Corallia, & quæcunque duriores & lapideam fere compagem habent, non omnino profunt, quia dentium substantiam justo citius abradunt.
- 3 Subjectis siccioribus, Venereis, Phthificis calidiora aromatica aut oleosa non sunt præscribenda & commendanda, quoniam usum, quem in ore præstant, damno in reliquo corpore compensant.

### CAPUT TERTIUM.

DE

Fætores Sudoris.

I. **Definitio.** Est malus odor ab excrementitiis & corruptis Sudoris particulis ortum suum habens.

II. **Differentia.**

Ratione locorum, occurrit vel in pedibus, vel sub axillis, vel in toto corpore.

III. **Signa.**

Fætor sudoris sponte se manifestat & a subjecto & adstantibus facile deprehenditur.

IV. **Subiectum.**

- 1 Sanguinei & phlegmatici potissimum, sudoribus copiosis expositi & loca magis contacta, qualia sunt interstitia digitorum pedis, subaxillaris regio &c. a sudoribus erumpentibus minus bene liberantes.
- 2 Virgines temperamentis ejusdem, habitus corporis laxioris, capillitio rubro vel flavo præditæ ad Venereis pronæ & lascivis cogitationibus indulgentes hircum sæpius olent.
- 3 Vestimenta etiam rarius commutantes, & pedum præcipue sordes negligentes.
- 4 Qui morbo aliquo graviore laborant, ubi Natura per superficiem corporis particulas excrementitias e sanguine eliminat.

V. **Prognosis.**

- 1 Fætor, qui sub axillis & præcipue in pedibus quo-

rundam occurrit, nihil mali portendit, & vicinis magis molestus, quam corpori noxius est.

2 Per adstringentia tamen repressus & cohibitus varia damna corpori conciliare potest.

3 Sudor in morbis quibusdam graviter olens si occurrat, bonum signum est, cadaverosus vero in acutis pessimus est.

#### VI. Remedia.

1 Partes sudore affectas abstergentia: Pediluvia, Balnea &c.

2 Humorum vitia corrigentia & abundantiam tolerantia: Tinct. ʒii acris, Tart. Essent. Succin. Li-  
gnor. Alexipharm. Laxantia, Diuretica.

#### Formula Remediorum.

1 Species pro pediluvio.

R. Herb. Chamomill. Serpill.  
Matv. Salv. a. mj.  
Rosmar. Inc. coq. in f. q. Aq. f.  
Origan.

2 Pulvis temperans & diureticus.

R. Arcan. duplic. Sal. onon. a. ʒij.  
Nitr. ʒiat. D. sing. 4. hor. 2. cusp.  
Lap. percar. cult.

3 Nodulus laxans.

R. Rad. Gent. r. Fibr. Hell. nigr. ʒij.  
Pimpin. a. ʒij. Cort. Ont.  
Gelang. Winteran.  
Zedoar. Cinam. ac. a. ʒss.  
Ari a. ʒss. Tart. solub. ʒij.  
Summit. Cent. min. mj. Inc. infund. in f. q. Vin. & Aq.  
Fol. Senn. f. ʒj. D. ʒvj. vij. mane.

4 Essentia purificans.

R. Ess. alexiph. Tinct. ʒii acris. ʒj. M.  
Succin. a. ʒj. D. mane & vesperti grt. ʒo.

#### VII. Methodus Medendi.

1 In Fætores pedum nihil magis conducit, quam pediluvia sæpius in usum trahere & tibialia vel commutare vel ablueri. Possunt etiam Pediluvii vegetabilia fragrantia addi, sicuti sunt Rosmarinus, Pulegium, Mentha, Serpillum, Lavendula, Origanum.

2 In toto corpore, si extra morbos acutos l. alios febriles occurrat, conveniunt Balnea, quibus etiam dictorum vegetabilium unum l. alterum addi potest.

3 In morbis acutis externe nihil tentandum, sed res per diaphoretica interna peragenda, soluto enim morbo, symptoma hoc per se evanescere solet.

4 Si fætor sudoris ab humorum corruptione dependet, incidentia, resolventia, balsmica, diaphoretica, diuretica & laxantia in usum trahantur, quo per hæc sublata causa tollatur effectus.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1 In fætores pedum a quibusdam limatura ferri, aurichalci l. Aluminis pulvis tibialibus solet inspergi, quod absque damno haud fit, cum excretio sudoris per talia adstringentia reprimatur.

2 Si sudor fætidus est copiosus, in quacunque etiam parte occurrat, abstinendum est ab omni refrigeratione.

3 Fugiant quoque hujusmodi homines nimias corporis commotiones, diætam calidam, vinum generosum &c. hæc omnia enim & sudorem & fætorem augent.

4 Respiciant quoque tales ad reliquas secretiones & excretiones, quo magis enim hæc supprimuntur, eo magis sudoris fætor invalescit.



## CAPUT QUARTUM.

## D E

*Scabie benigna sive simplici.*

I. *Definitio.* **S**cabies benigna est affectus ulceroso-faniosus, externum corporis habitum pustulis modo majoribus modo minoribus hinc inde infestans, a corruptione feri & lymphæ originem habens.

II. *Differentia.*

- 1 Est vel *humida*, quando pustulæ sunt latiores & elevatiores, e quibus ruptis copiosum pus & sanies emanat.
- 2 Vel *sicca*, quæ pustulas format minores, parum puris, sed potius aliquid serosioris liquidæ materiæ, fundentes.
- 3 *Contagiosa*, quæ ab aliis Scabie affectis contrahitur, vel *per se* exurgens, malæ Diætæ & Corruptioni humorum originem debent.
- 4 *Chronica* item, quæ per plures menses, imo annos, affligit,
- 5 Vel *periodica*, quæ post aliquod temporis intervallum quidem evanescit, sed levi data occasione recurrit.

III. *Signa.*a *Humida:*

- 1 Pustulæ majores, multa materia fanioso purulenta scatentes
- 2 Quas circulus rubicundus, inflammatorius ambit.
- 3 Maturæ, si rumpuntur, fundunt copiosum pus & saniem.
- 4 Infestans præcipue artus præ aliis corporis partibus.
- 5 Et dolorem potissimum urentem conjunctum habent.
- 6 Evacuato pure, quo latiores fuere pustulæ & profundiores, eo certius aliquales formant cicatrices & cutis inæqualitatem.
- 7 Maculas etiam in partibus scabie antea afflictis diu relinquunt.

b *Sicca:*

- 1 Huus pustulæ multo sunt minores & nihil. parum puris continent, sed potius aliquid materiæ serosioris, quæ rarius per ruptionem spontaneam, sed post scalptionem & frictionem, effluere solet.
- 2 Dolorem hæ pariunt non urentem, ut priores, sed pruriginosum valde molestum, inpr. in locis calidioribus & lecto.
- 3 Occurrunt in toto corporis habitu, præcipue tamen in artubus, qui aeri liberiori patent.

IV. *Subiectum.*

- 1 Scabiosis affectibus obnoxii sunt homines, qui Diætâ crassâ difficultioris concoctionis, salsa, aqua palultri limosa stagnante utuntur.
- 2 Diætâ consuetam subito mutant.
- 3 Qui exercitia corporis negligunt, desidemque vitam agunt, uti studiosi, sartores, textores.
- 4 Qui vestimenta & indusia rarius commutant, transpiratione que cutis hoc ipso impediunt.
- 5 Aut qui vestimenta scabiosorum induunt, & eosdem sæpius frequentant.
- 6 Excretiones varias, inprimis vero diaphoresin & sudores autocraticos, negligentes.
- 7 Experiuntur quoque hoc malum Quartanarii diu decumbentes, qui hepatis læsione affecti sunt.
- 8 Item, qui Venesectiones, Scarificationes assuetas neglexere aut ulcera manantia & fonticulos artificis incongruis suppressere.
- 9 Evacuaciones primarum viarum & diaphoreses consuetas per remedia excitatas negligentes.
- 10 Virgines mensium emansione, inordinato fluxu, aut totali suppressione laborantes.
- 11 Scabiei humidæ obnoxii sunt homines habitus corporis laxioris & plethorici, siccæ vero, qui constitutionem aridam magis habent, melancholici & melancholico-cholericici.

12 Pueri & infantes præ adultis, viri præ mulieribus, hoc morbo laborare solent.

13 Denique etiam scabiem frequentius incurrunt homines in locis frigidis & humidis habitantes.

V. *Prognosis.*

- 1 Scabies sibi relicta nullum post se trahit periculum, sed homines a multis sæpe incommodis liberat.
- 2 Per artificia vero externa, nimirum adstringentia, repellentia, refrigerantia, retropulsa ingentia damna parit, scilicet anxietates præcordiorum summas, Catarrhos suffocativos, Asthmata convulsiva, Cardialgias, Febres acutas & inflammatorias, Oedemata, Hydropem, Hæticam.
- 3 Juniores facilius curantur quam Senes.
- 4 Scabies humida citius curatur quam sicca, pruriginosa.
- 5 Quo diffusior est Scabies, eo plus temporis in Cura requiritur.
- 6 Quo magis plethorica sunt subjecta, eo gravius affligit scabies humida & eo difficilius etiam curatur.
- 7 Quæ per Contagium communicatur, & adhuc recens est, facilius curatur, quam quæ a Dyscrasia humorum originem habet.
- 8 Scabies sicca cum vitio visceris præcipue hepatis conjuncta non nisi sublata visceris labe tollitur & facile vel in Hæticam vel Hydropem degenerat. Vidimus id in adolescente quodam, qui post graviolem Plethoræ commotionem & potus frigidi ingurgitationem narium Hæmorrhagia frequenter corripiebatur: cum vero eandem negligeret, accedebant commotiones febriles & scabies sicca, universum corpus occupans. Tandem superveniebat tumor pedum & abdominis, qui elapsis aliquot mensibus ægrotum jugulabat.
- 9 Quando in superiori corporis parte exiccatur & non nisi in pedibus pustulæ latæ sparsim præsto sunt, signum est scabiei mox prorsus cessuræ.
- 10 Scabies in senibus semper magis chronica & rebellis est, quam in junioribus.

VI. *Remedia.*

- 1 Primarum viarum saburram evacuantia & muciditatem feri & lymphæ simul incidentia: Jalappa, Extractum panchymag. Croll. Mass. pil. e Succin. Crat. Mercurius dulcis.
- 2 Sanguinem seroso-lymphalem corruptum mundificantia: Rad. Sarsapar. Chin. Pimpin. alb. Vincetox. Helen. Angel. Dictamn. alb. Lign. Sanct. Sassafr. Herb. Fumar. flor. Sambuc. Essent. alexipharm. Stahlii, Pimpin. alb. Essent. Succini, Lignorum, Tinct. Gii Tartarisat. Tartari; absorbentia item Conch. ppt. Oc.  $\mathfrak{z}$ . ppt. cum diaphoreticis fixis sociata,  $\mathfrak{z}$ . diaph. Bezoard. Min.
- 3 Scabiosam fermentescentem indolem specificè evertentia: Antimonium crudum, Decocta Glia, flor. Sulphuris cum Nitro & absorbentibus ordinati, Balf. Sulphuris cum  $\circ$  amygd. dulc. conjunctus.
- 4 Externe eandem vim exerunt  $\mathfrak{z}$ . in Unguenti formam redactus, Cingula  $\mathfrak{z}$  lia, Balneo naturalia varia & artificialia ex  $\nabla$  dulci & Rad. Lapath. acut. Bardan. Fumar. Scabios. Saponar. Scabios. Nicot. parata.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pilulæ laxantes.

Rx. Extracti Panchym. gr. vj.  
Croll. gr. xv. C. Essent. Succin. f. l. a.  
Res. Jalapp. gr. iij. Pil. gr. j. pond.  
Mercurii dulc. rit. par. Assumantur una vice.

## 2 Aliæ.

Rx. Pil. e Succin. Crat. Trochisc. alband. gr. iij.  
Extract. Panch. Cr. C. Essent. Lignor. f. Pil.  
Mercurii dulc. rit. par. ut præcedentes usurpant.  
a. gr. vij.  $\mathfrak{z}$ .

## 3 Decoctum mundificans pro potu.

Rx. Rad. Sarsapar.  $\mathfrak{z}$ j. Liquirit. a.  $\mathfrak{z}$ ss.  
Gramin. Lign. Sanct.  $\mathfrak{z}$ vj.  
Chin. Sassafr.  $\mathfrak{z}$ ij.



*Passul. min.* ℥j.  
*Sem. fenic.* ℥iss.

*Incis. contus. Coq. in Aq. f.*  
*℥. viij. ad remanent. ℥. vj.*

4 Pulvis. mundificans.

*R. Conch. ppt.*  
*Nitr. depurat.*  
*℥ii diaph.*  
*Arcan. dupl. a. ℥j.*

*Flor. Sulphuris* ℥ss.  
*Ms. f. Pulv. Dos. ℥j.*  
*Semell. bis per diem propinan-*  
*cus.*

5 Alius.

*R. Oc. ℥. ppt.*  
*Conch. ppt. an. ℥iss.*  
*Antimon. crud. ℥j.*

*Cinnabar. nat. ppt. ℥ss.*  
*Ms. f. Pulv. Dos. ℥i usus,*  
*uti precedentis.*

6 Essentia mundificans.

*R. Tinct. ℥ii Tartar.*  
*Essent. Lignor. an. ℥iss.*  
*Succin. ℥j.*

*Ms. Dos. xxx. gutt. bis per*  
*diem.*

7 Potio similis.

*R. V. Fumar. ℥ij.*  
*Fl. Sambuc. ℥j.*  
*e typh. Cerv. ℥vj.*  
*Oc. ℥. ppt.*  
*℥ii diaph. an. ℥ss.*

*Reg. ℥ii Med. ℥j.*  
*Tab. Man. X℥. f. ℥iij.*  
*Ms. d. f. Per quinas l. senas*  
*horas ad 2 cochlearia pro-*  
*pinanda.*

8 Unguentum abstergens.

*R. Mercurii viv. ℥ij.*  
*F. c. ℥ri p. ana. S.*  
*Add. Terr. Tripol. ℥j.*  
*Unguent. rosac. q. s.*

*F. Unguentum.*  
*Pro juncturis manuum &*  
*carpis pedum ad quantita-*  
*tem pisi quotidie illinen-*  
*dis.*

## VII. Methodus medendi.

- 1 In Scabie tam humida quam sicca curæ initium fieri potest per lene aliquod laxans ℥le, quod post 6. vel 8. dierum intervallum repetendum.
- 2 Subjungantur ea postea remedia, quæ humorum mucosam substantiam corrigunt, & quod corruptioni proximum est, leniter expellunt. Obtinetur hoc tam per pulveres diapnoico-absorbentes quam per Decocta & Essentias alexipharmacas. Illi versus noctem ad ℥j. propinentur: hæc mane & post meridiem in usum trahantur.
- 3 Quando hæc spatio aliquot septimanarum continuantur, tunc Scabies sæpissime absque aliis remediis omnimode profligatur. Quodsi vero hoc non fit, poterit externo remedio ℥li, nimirum Unguento, l. cingulo, malo ulterius succurri. Applicetur hoc abdominis regioni: illud vero juncturis carpi & tarsi quotidie versus vespere ad pisi magnitudinem tepide inungatur, ac mane sapone semper abluatur.
- 4 Opus vero est, durante horum remediorum usu, regimine calido, ut diaphoresis eo melius promoveatur.
- 5 Convenit etiam hoc ipso tempore patientem semel atque iterum laxare cum ℥. dulci, inprimis, si insignia incommoda circa pectus concurrant, & interponere pulverum fixorum & Essentiarum alexipharmacarum temperatarum usum, illos versus noctem, hos vero tantum mane usurpando, fugiendo hoc tempore Sulphuris exhibitionem.
- 6 Infantibus tutius exhibentur absorbentia & diapnoica & continuantur ad plenariam morbi curationem: regimen enim, quod sub Mercurii usu requiritur, ab iisdem rarius stricte observatur.
- 7 In refractaria Scabie pulveribus absorbentibus Merc. dulcis ad gr. ij. conjungi potest. Horum singulis diebus Dos. ana assumatur, nimirum, quando domi se continere licitum est, mane; quando vero per diem in aere versari oportet, noctu. Sic post 14. circiter dies Scabies sensim sensimque evanescit & quicquid effloruit in ulcuscula dissolvitur.
- 8 Ubi Scabie retropulsa est quantocyus occurrendum est Mercurio dulci, ad gr. vj. viij. alterandi scopo exhibendo, & si symptomata urgent, flores Sulphuris ad gr. iv. vj. cum absorbentibus conjungendos substituendo, quæ remedia per 8. aut 10. dies continuanda sunt.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Scabies quo magis sicca est, eo minus fert remedia acriora, diaphoretica.
- 2 Ligna anti Phrea, Essentiæ alexipharmacæ & similia remedia nunquam cum regimine diaphoretico exhi-

- beantur, quia omnes sudationes fortiores majora damna quam emolumenta præstare observantur.
- 3 Si Scabies retropulsa est, & febrile quid concurrit, Sulphuris usus omittendus est, & in ejusdem locum Nitrum substituendum.
- 4 Retropulsionem citissime & efficacissime peragit Sulphuris usus externus, a quo igitur, ob insignia exinde metuenda pericula, tanto magis abstinendum.
- 5 Facilius est Scabiem retropellere quam expellere, unde omnia adstringentia, refrigerantia, repellentia externa angue pejus fugienda sunt.
- 6 Mercurialia etiam externa non prius locum habent, quam post evacuationem & correctionem humorum internam.
- 7 Hoc demum tempore & Cingula Mercurialia & Unguenta efficaciter se gerunt, quæ alias, intempestivo tempore adhibita, plurimum damni inferunt.
- 8 Efficacia hæc tanto citius & securius absolvitur, quo certius malum per contagium fuit communicatum.
- 9 Ubi vero malum ab humorum intimiori corruptione originem habet, correctio diuturnior in usum vocanda, antequam specifica hæc externa applicentur.
- 10 Seniores Scabiosi, & illi, qui in viscere aliquo labem gerunt, cautæ & leniori methodo sunt tractandi, alias facillime noxa inferri potest.
- 11 Quando Scabies in ætate seniori lente retropellitur, oriuntur ex inde tumores œdematosi, qui mature tractati per absorbentia & Sulphuris internum usum sensim evanescunt revertente efflorescentia scabiosa.
- 12 ℥. specificæ fermentescentem scabiosam indolem evertit, absque tamen commotione sanguinis, quod Sulph. ejusque præparata haud faciunt.
- 13 Ideoque etiam, ubi febrile quid concurrit, semper caute usurpanda sunt.
- 14 Sub ℥lium adhibitione Sulphuris usum omittere decet, infringit enim hoc illius virtutem.
- 15 Antimonium crudum loco Sulphuris absorbentibus commixtum egregiam vim exerere, observavimus in pluribus, ubi Scabies copiosius primo expulsa erat, quæ postea intra paucum tempus omnimode profligabatur.
- 16 Cholericiis acrimoniam & pruritum Sanguinis gelatinosa demulcent. Convenit etiam his Serum lactis, fumaria alteratum.
- 17 Quando corpora bene sunt præparata usum quoque habent thermæ & acidulæ, tam externe, quam interne usurpatæ, absque tamen regimine sudatorio.
- 18 Scarificationes & Venæsectiones ad scabiem curandam parum aut nihil faciunt. Qui tamen his evacuantibus sunt assueti, circa solitum celebrandi tempus, easdem repetere debent, nisi pruritum adaugeri velint.

## CAPUT QUINTUM.

### Scabie maligna.

- I. **Definitio.** **E**st affectus cutaneus plus minus contumax, cum efflorescentiis vel squamosis vel pustulosis stipatus, a corruptione feri & lymphæ originem ducens.
- II. **Differentia.**
  - 1 Scabies maligna tres potissimum sub se comprehendit species: *Impetiginem*, *Scabiem ferinam* s. *Scorbuticam* & *Venereum*.
  - 2 *Impetigo*, iterum duplex: vel *benigna*, quando cutis alicubi rubet, a minimis exurgentibus pustulis leviter exasperatur, pruritum concipit & lente serpit; vel *maligna*, quæ cutim profundius erodit, latius serpit & universum quasi habitum defœdat.
  - 3 *Impetigo maligna* sub se comprehendit *Lepram Grecorum*, s. *Pforam*, quæ Scabies admodum fera & contumax est, cum erosione & squamositate totius cutis conjuncta, & *Elephantiasin* s. *Lepram Arabum*, ubi cutis summam scabritiem & rugositatem instar elephantorum præsefert.



- 4 Ratione coloris, quem squamulæ habent, varia sortitur nomina Impetigo. Quando nimirum albedinem referunt, vocatur *Leuca*, *Vitiligo alba*, quando nigro infecta sunt colore, *Melas* audit.
- 5 Ratione modi, quo incrementa sua sumit Impetigo, vocatur etiam *Serpigo*, quia serpendo sensim sensimque latius se propagat; ab aliis vero *Lichen*, quod ad instar Lichenis arborum per cutis habitum sese extendat.
- 6 Alii *Serpiginis* nomen illi tantum affectui tribuunt, qui præter cutis scabritiem, etiam erosionem & exulcerationem ejusdem latius serpentem conjunctam habet; *Impetiginis* vero, qui nullam exulcerationem sed tantum asperitatem & scabritiem in squamas magis & furfures æbeuntem exhibet.

## III. Signa.

1 *Impetiginis malignæ*:

- a Cutis in iis præcipue locis, quæ aeri exposita sunt, sensim sensimque aspera & scabra magis redditur, arroditur, finditur & in exiles pustulas sicca magis, quam humidas, abit, tandemque squamas producit.
- b Sudor & anhelitus fætorem concipiunt.
- c Dolores Capitis admodum defatigant ægros.
- d Capilli defluunt.
- e Cutis sensum amittit.
- f Et quando summam Scabritiem & rugositatem instar elephantorum concepit, Elephantiasis nuncupatur.
- g Facies tunc præcipue elevata & tuberculis ex rubro livescens obsita conspicitur.
- h Vox rauca & clangosa est.
- i Dentes nigrescunt.
- k Ungues non raro finduntur.
- l Et totum corpus, squamis rugositate, scabritie, ulceribus difforme redditur.

2 *Scabiei ferinæ s. Scorbucæ*.

- a Conjuncta est cum Scorbuto.
- b Pruritus satis gravis, æstuosus, subtilis ægros vexat, qui, quoties scalptione irritatur, non tantum exacerbatur, sed etiam facile in exulcerationes abit.
- c Formant hæc stigmata sanguinolenta cum ambitu inflammatorio ardente, modo rubicundo modo sublivido colore prædita.
- d Succedunt interdum ulcera cacoethea, ichorosa, lympham tenuem, subflavam, fundentia.
- e Cutis vel maculis rubicundis vel etiam tumoribus interspersa quandoque conspicitur.
- f Concurrunt dolores admodum acuti, subtiles, æstuosi per intervalla tamen remittentes & plura in Scorbuto recensenda Symptomata.

3 *Veneræ*.

- a Manifestat se præcipue in facie & quidem circa os, crustosis & glutinosis siccam & pertinacem escharam formantibus ulceribus.
- b Corpus hinc inde nodos atque tophos producit.
- c Sæpiissime etiam anum excoriationes & excrecentiæ verrucosæ, quod præcipue in infantibus facilius contingit, occupant.
- d Ulcera nauseolum & fracidum spirant odorem.
- e Dolores, qui membra & caput noctu præcipue affligunt, sunt rodentes, terebrantes, & acres quasi morsus inferentes.
- f Varia etiam plerumque concurrunt Symptomata Veneræ; Bubones, Gonorrhœa, fluor albus malignus &c. *Vid. Tab. de Lue Veneræ*.

## IV. Subjectum.

- 1 Impetiginem benignam facile incurrere possunt ii, qui tempore autumnali, & vernali multum in aere versantur, & lympham falso-biliofam possident.
- 2 Pforæ & Elephantiasi expositi sunt, qui summam corruptionem feri & lymphæ a variis causis contraxere.
- 3 Qui speciali Divini Numinis pœna eodem olim fuere correpti.
- 4 Ferinam experiuntur Scorbucici.
- 5 Sicuti Veneræam quidam, sed non omnes, Lue Veneræ affecti.

## V. Prognosis.

- 1 Impetigo benigna adhuc recens facile curatur.
- 2 Inveterata vero, valde squamosa, haud absque difficultate tollitur.
- 3 Lepra & Elephantiasis, sicuti morbi apud nos rarissimi sunt, sic etiam ratione causæ curatu sunt difficillimi.
- 4 Uterque pro summe contagioso nunquam non habitus fuit; unde etiam ægroti in publica nosocomia, Lazaret dicta, olim relegabantur.
- 5 Scabies Scorbucica s. ferina rarius, nisi ipse Scorbuto sublato, tollitur.
- 6 Veneræa facilius auscultat medicamentis, quam simplex; ubi vero inveterata jam est, & profundiores egit radices, cum concurrentibus gravioribus symptomatibus, ibi malum non nisi remediis admodum selectis abigitur. *Vid. Tab. alleg.*

## VI. Remedia.

1 *In Impetigine benigna*:

- a Diaphoretica fixa, absorbentia & Alexipharmaca: Gum diaph. Cinnabaris ʒii & Nativ. Bezoard. miner. Ess. alexiph. Stahlii, Pimpinell. alb. Lignor. ʒ. fumar. Galeg. Ulmar. Scorz. Fl Samb.
- b Laxantia ʒia: ʒius dulcis, Panacea ʒlis, cum stimulo acri.
- c Topica externa: Mercurius sublimat. Mercurius dulcis, cum Unguent. rosat. vel pomat. subactus, ʒss. Tart. per deliq. Ovor. Amygd. dulc. ʒ. omnium florum, album. ovor. Calc. viv. Lac. Sulphuris, Acetum Lithargyr.

2 *In Maligna*:

- a Laxantia Mercurialia, Noduli laxativi, cum mundificantibus combinati.
- b Remedia ex Antimonio & Mercurio parata, sub fixa magis quam volatili forma, medicamenta e viperis, succino &c.

3 *In Ferina s. Scorbucica*:

- a Omnia, quæ in Scorbuto profunt, vegetabilia, antiscorbucica: Cochlearia, Nasturtium, Beccabunga, Trifol. fibrin. Fumar. Acetof. Acetofell. Allium, Cepæ, quibus adde Acidulas, sub convenienti motu corporis usurpatas.
- b Externe balnea abstergentia & mundificantia, ex Lapatho acuto, Saponaria, Tabaco, Furfuribus; nec non Unguenta vel Linimenta Mercurialia. *Vid. Tab. seq.*

4 *In Veneræ*:

- a Laxantia e Mercurio parata: Mercurius dulcis, Panacea Mercurialis, Turperthum minerale.
- b Ligna anti veneræa, remedia sudorifera, ex Antimonio, & Mercurio: Antimon. diaphor. Cinnabar. Antimonii, Mercur. diaphor. Tar. Antimonii acris.
- c Externe Unguentum vel Linimentum Mercuriale, absque vel pro salivatione excitanda.

## Formula Remediorum.

## 1 Unguentum in Impetigine benigna.

Rx. Unguent. pomat. ʒss. ʒss Tartar. per deliq. ʒij.  
Mercur. dulc. ʒss. Ms d. ad Oll.

## 2 Aliud Riverii.

Rx. Unguent. rosat. ʒij. Mercur. sublimat. ʒij. M.

## 3 Aqua egregia Caroli Musit.

Rx. ʒss Tartar. per deliq. Destilla per retortam, prodibit primo Mercurius, deinde aqua.  
Merc. viv. ʒij.

## 4 Gelatina Viperina pro depurando Sanguine in Lepra &amp; Elephantiasi.

Rx. Viper. q. v. repone, coque per aliquot horas, donec omnia probe fuerint dissoluta, deinde exprime liquorem, cujus cochlearia aliquot munita, affusa simul s. quotidie in jussculo sumantur.  
q. aqua, vas in B. M.

## 5 Balneum mundificans.

Rx. Rad. Lapath. acut ʒiv. Nicot. Mij.  
Herb. Saponar. Ex Incis. F. Balneum.  
Fumar. a. Mij.



VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Impetigo benigna rarissime amplam internam Curationem exposcit, & ordinarie paucis ut plurimum externis appropriatis remediis tollitur.
- 2 In inveterata vero Impetigine, nec non Leprosis affectibus, conveniunt præter laxantia Mercurialia, efficacia mundificantia & diapnoica. Inprimis vero primatum obtinet, quæ ex Mercurio rite parata sunt, ut absque Salivatione, si possibile est, agant.
- 3 In Scabie Scorbutica primario ad ipsum respiciendum est Scorbutum, intermixtis, quæ Scabiei proprie sic dictæ conveniunt.
- 4 Idem etiam in Scabie Venerea observandum, in qua Mercurii legitimus usus utramque absolvit paginam.

VIII. *Cautela Practica.*

- 1 Impetigo & Serpigo benigna externo Mercurialium certius & securius quam sulphuratorum usui obedit.
- 2 In scæda & contumaci, Lepræ confimili, Scabie Mercurius & ex eo parata remedia omnia alia mundificantia, quæcunque illa fuerint, quoad effectum superant.
- 3 Qui verum Mercuriale diaphoreticum possidet, remedium habet, de quo sibi gloriari potest: Securiorem enim effectum præstat, quam Mercuriale salivatorium.
- 4 Sæpissime olim Scabies scæda & contumax male pro Lepra habita fuit; unde etiam Leproforum domicilia publica ubique fere apud nos hodie aliis usibus destinantur.
- 5 Quæ plures huc pertinent Cautelæ, ex Capite præcedent. repeti possunt,

## CAPUT SEXTUM.

## D E

## Scorbuto.

I. *Definitio.* **S**corbutus est insignis lymphæ & Sanguinis corruptio, ab impedita humorum circulatione & depuratoria eorundem secretionem originem habens, variaque spastico-dolorifica, nec non ulcerosa Symptomata post se trahens.

II. *Differentia.*

- 1 Ratione nominis. Vocatur a Foresto *Gingibrachium*, quia Gingivas & brachia præcipue infestat. Alii *Gingipedii* nomine affectum insignivere, quod præter Gingivas pedes simul laborare observaverint. Alii ob eundem crurum languorem conjunctosque dolores *Sceletrybes* nomen usurpavere. Qui *Stomacaces* voce utuntur, particularem Scorbuti speciem, in oris offensione & Gingivarum cruentatione ulcerosæque earundem corruptione consistentem, indignant.
- 2 Ratione Symptomatum, aliarumque circumstantiarum differt.
  - a A *Lue Venerea* a Hæc quippe dolores parit terebrantes, rodentes, plus minus fixos, noctu præcipue excruciantes; Scorbutus vero dolores magis acutos, æstuentes, transitorios, per incertos quasi paroxysmos sese exacerbantes, in lecto tamen plerumque admodum tolerabiles. β Hic anteriora potius oris occupat, relaxatione & cruentatione Gingivarum, dentium quoque nigredine & carie sese exerens, qui in faucibus occurrit dolor, magis est æstuosus quam acer, odor vero oris satis gravis: Lues Venerea vero posteriora fere tantum palati infestat, dum uvulam, fauces, nares acri dolore fatigat, eademque sensim sensimque ulceroso progressu erodit. γ In exteriori corporis habitu Scorbuto familiares sunt maculæ latiores, plus minus secundum temperamentorum diversitatem lividæ, ulcera etiam ichorosa, sanguinolenta, tenuiter manantia: Lue Venereæ vero nodi & tophi, efflorescentiæ ulceroso-scabiosæ, crustas & escheras formantes. δ Scorbutus sæpius

conjuncta habet varia abdominis incommoda lues Quæ vero nihil horum novit, sed sentit suas molestias maxime in artubus & capite. ε Urina in illo fere semper est colorata, in hac vero ut plurimum subturba, multum tenacis mucidi sedimenti deponens. γ Modus propagandi in utroque etiam malo est diversus: in Lue quippe Venerea hoc plerumque fit per genitalia mediante coitu impuro: in Scorbuto vero hocce magis contingit ex vitio dietæ rarius per contagium, nisi quod quandoque ore communicari possit.

b A *Malo hypochondriaco:*

- a In hoc dolores, qui observantur sunt spastico-tensivi, qui ab ipsa Natura ob humorum spissorum transpressionem instituuntur, atque hinc certum habent finem: in Scorbuto vero physice hoc magis fit; dum dolores acrimoniam humorum, eorundemque titillationem, pro fundamento habent. β Scorbutus efflorescentias macularum in ipso corporis habitu, corruptionemque gingivarum ulcerosam conjunctas habet, quod in malo hypochondriaco haud contingit. γ Familiares etiam sunt Scorbuto prævalescenti Lipothymia per paroxysmos recurrentes, quæ in malo hypochondriaco non deprehenduntur & facile a suffocationibus hystericeis discerni possunt. δ Sentiant etiam hypochondriaci dolores suos tantum fere in abdomine, versus pectoris & capitis regiones quandoque excurrentes: Scorbutici vero magis in artubus & gingivis, nec non exteriori corporis habitu symptomata sua experiuntur.

III. *Signa.*

- 1 Exerit sese Scorbutus præcipue in ore, ubi gingivæ laxæ & flaccidæ deprehenduntur, ita ut leviter pressæ sanguinem plorent.
- 2 Adest non tantum in iisdem, sed & in antetiori parte faucium, pruritus æstuosus, ab acri venereorum dolore facile discernendus.
- 3 Fatiscunt tandem gingivæ in ulcerosam corruptionem; labiorum etiam interna pars ulcuscula concipit.
- 4 Dentes hac ipsa Scenâ non tantum nigrescunt, sed cariosam constitutionem sensim sensimque acquirunt, imo vacillant & excidunt.
- 5 Anhelitus gravi odore adstantium nares ferit.
- 6 Sputatio crebra præcipue jejuno ventriculo ægrotis familiaris.
- 7 Accidunt ipsis quandoque narium hæmorrhagiæ.
- 8 Sæpius etiam occurrunt Vertigines in Lipothymias & syncopas terminantes & hoc quidem tanto magis, quo minus tranquille patientes in lecto sese continent.
- 9 Non raro etiam dyspnœa & cordis anxietas reliqua symptomata concomitantur.
- 10 In Abdomine observantur nausea & vomendi conatus, nec non flatulenta pathemata.
- 11 Externe in corporis habitu & præcipue artubus conspiciuntur maculæ plus minus rubicundæ, aut interdum lividæ, sæpius etiam ulcuscula sanguineo-ichorosa, tenuiter manantia, tumores livescents hinc inde dispersi.
- 12 Concurrent cum iisdem dolores acuti, æstuosi, subtiles artus præcipue affligentes, cum corporis lassitudine & torpore conjuncti.
- 13 Imo contingit quandoque, ut febris symptomata accedat, nullius neque periodi neque typi, sed ad vicitudines repentinarum impetuum & insperato redeuntium euphoriarum prona.

IV. *Subjectum.*

- 1 Corripit endemice populos maritimas, præcipue septentrionales regiones occupantes, rarius meridionales, nisi qui Oceano viciniore sunt.
- 2 Batavi ante aliquot secula hoc malum primum suere experti. Jam & Flandriæ, Brabantia, Frisiam, Daniæ, Norwegiæ & Sueciæ incolis illud familiare est.
- 3 Aggreditur præcipue otiosos, vitæ sedentariæ assuetos, nautas, dum in itinere maritimo versantur.



- 4 Nec non carnis falsis fumo induratis aliisque durioris concoctionis cibis, ut & spiritibus ardentibus, aut potu minus defecato utentes.
- 5 Juvenes & senes præ junioribus eodem corripuntur.
- 6 Interdum etiam Quartanarii & Hypochondriaci Scorbutum experiuntur, imprimis quando posteriores largis sudationibus morbum profligare voluerunt.
- 7 Observatus etiam est in hæmorrhoidariis, quando in nimio fluxu incongrue tractati fuere.

V. *Prognosis.*

- 1 Scorbutici, malo nondum inveterato laborantes, Diætæ & aeris mutatione, accedente simul convenienti medendi Methodo, non ita difficulter curantur.
- 2 Ubi autem malum prævaluit, ibi mora opus est, non tamen immedicabile censendum.
- 3 Quo magis viscerum læsiones concurrunt, eo difficilius cura procedit.
- 4 Præsentem viscerum labem non raro Cachexia, Hydrops & Hæctica sequuntur.
- 5 Juniores imprimis Sanguineo-Cholericis & Plethorici scorbuti affecti facile incidunt in Hæmoptysin.
- 6 Respirandi difficultas, impr. chronica, in scorbuto occurrens, interdum syncopen, interdum vero Hydropem post se trahit.
- 7 Hæmorrhoidum & mensium largior fluxus scorbutum sæpius admodum lenem reddit.
- 8 Sudores nocturni autocratici non nimis excedentes, cum macularum rosearum efflorescentia, scorbutum sensim sensimque imminuunt; neglecti vero eum augent.
- 9 Maculæ quo magis sunt rosei coloris, & meliores sunt & celeriores promittunt curationem: quo magis vero ad cæruleum aut lividum tendunt colorem, eo peiores & curationem retardant.
- 10 Quando ab alio dependet morbo, nimirum malo hypochondriaco vel Quartana, tunc nullum auxilium admittit, nisi priori morbo medela fuerit adhibita.
- 11 Qui a contagio provenit, facilius curatur, quam qui ex vitio diætæ & aeris fuit contractus.
- 12 Quando malum in superioribus adhuc partibus hæret, ita ut in ore tantum sese manifestet, cura leviori modo absolvi potest.

VI. *Remedia.*

- 1 Alvum laxam reddentia, primasque vias expurgantia, Lenitiva, per epicrasin educantia: Senna, Rhabbarum, Agaricus, Polypodium, fibr. Hellebor. nigr. cum antiscorbuticis conjungenda, Pil. Becherianæ, Stahlianæ.
- 2 Humorū crasin & specialiter sanguinis congruementiam corrigentia & attenuantia, sive catarrhalia vulgo sic dicta: Rad. Vincetox. Helen. Ari. Pimpinell. alb. Imperator. Valerian. Diapentan. alb. lignum sanctum, Sassafras Herb. Fumar Absinth. Centaur. min. Card. bened. Abrotan. Tinctura ʒii acris, Tartari, nec non antiscorbutica, temperatiora primo: Beccabunga, Acetosa, Acetosella, Succus Citri, Chærefolium, Sedum minus, Cichor. postea & acriora & penetrantiora: Armaria, Raphanus niger, Cochlearia, Nasturtium aquaticum, Sinapi, cepæ, Allium, Piperitis, Eruca, Trifolium fibrinum.
- 3 Sanguinis Orgasmodum, si concurrat, refrænantia, absorbentia aciditate citri saturata: Oc. ʒss. ppt. Conch. ppt. cum ʒ. diaph. Nitrosi & Cinnabarinis conjungenda, Emulsiva item, nec non Gelatinosa, Avenacea.
- 4 Tonum partium roborantia, præcipue ʒlia: Tinctura Vitrioli ʒtis Ludov. Zwelf. Tinct. ʒtis cydon. cum Succo pominor. Borsdorffianorum, Croc. ʒtis D. Stahl. Limat. ʒtis tenerior, Tinct. tonico-nervina D. Stahl.
- 5 Ulcerosæ corruptioni immediate succurrentia, balsamica, mundificantia & tonica s. subadstringentia: Myrrha in Substantia, Essent. ejusdem & Succini, Mel rosat. Decoct. ex Herb. Prunel. Salv. Agrimon. Pilosel. Rad. Bistort. Plantag. Torment. Fl. Ligust. Cort. Granat. Quistm, Sanguis Draconis, Tinctur. Laccæ.

*Formula Remediorum.*

## 1 Potio Laxans.

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| R. Tamarind. ʒss.      | Coq. in f. q. ʒss. In Colat.  |
| Fol. Senn. s. st. ʒij. | ʒijss.                        |
| Crystall. Tartari ʒss. | Dissolv. Mann. Calabr. ʒj. M. |
| Cinam. acut. ʒss.      | D. calide.                    |

## 2 Nodulus laxativus.

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| R. Rad. Helen.         | Foll. Senn. s. st. ʒvj.        |
| Vincetox.              | Rhabarb. elect. ʒss.           |
| Polypod. qu. a. ʒss.   | Fibr. Helleb. nigr.            |
| Lign. Sanct.           | Agar. mund. ʒ. ʒij.            |
| Sassafr. a. ʒij.       | Incis. contus. infund.         |
| Herb. Fumar.           | In ʒ. j. ʒ. fervent. ʒ. ʒ. ij. |
| Card. bened.           | Vini Generos.                  |
| Trifol. fibr. a. Mss.  | Dosis ʒvj. vij. viij. alternis |
| Summ. Cent. min. p. j. | diebus sumenda.                |

## 3 Species pro Infuso antiscorbutico.

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| R. Herb. Trifol. fibrin. | Incis. bis per diem loco Infusi |
| Chærefol.                | Thee usurpentur.                |
| Beccabung. ʒ. Mss.       |                                 |

## 4 Tinctura antiscorbutica.

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| R. Tinct. ʒii acris ʒij.       | D. bis l. ter per diem ad 30. |
| Essent. trifol. fibrin. ʒj. M. | guttas.                       |

## 5 Pulvis temperans.

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| R. Oc. ʒss. Citrat.     | Cinnabar. ʒii ʒss.             |
| ʒii diaph.              | Ms. f. Pulv.                   |
| Nitr. depurat.          | Dos. ʒj. D. singulis ʒ. vel 6. |
| Tartar. Vitriol. a. ʒj. | horis.                         |

## 6 Tinctura antiscorbutico-Tonica.

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| R. Essent. trifol. fibrin. ʒij. | dov. ʒj. M.                       |
| Tinct. Vitriol. ʒtis Ludov.     | D. 30. gutt. bis l. ter per diem. |

## 7 Mixtura Tonico-Nervina.

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| R. Tinct. Antimonii Tar- | Spir. C. C. ʒj. M.           |
| tar. acr. ʒij.           | Dos. gutt. 25. bis per diem. |

## 8 Mixtura externa pro Collutione oris

&amp; abstersione Gingivarum.

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| R. Spiritus Cochlear. ʒss. | Tinct. Lacc. ʒij. M. |
|----------------------------|----------------------|

## 9 Linimentum pro abstersione &amp; consolidatione Gingivarum.

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| R. Mel. rosar. ʒj.   | N. M. ʒiss.           |
| Succ. Cochlear. ʒij. | Liquam. Myrrb. ʒi. M. |

VII. *Methodus medendi.*

- 1 In Scorbuti Medela anima Curationis in eo consistere videtur, ut ægroto bona & conveniens Diætæ quoad motum, potum & cibos commendetur.
- 2 Sit nimirum motus corporis paulo vegetior, potus vero dilutus, acidulus, alimenta expepta, leniter aromatizata.
- 3 Alvi quoque ratio habeatur, ut libera quotidie existat, in cuius rei defectu lenientia in usum trahantur.
- 4 Deinde in usum vocentur anticatarrhalia & antiscorbutica remedia, ut horum ope humores resolvantur, attenuentur & corrigantur.
- 5 Exhibeantur vero hæc selecta, ita nimirum, ut sanguineo-Cholericis temperatiora, acidula: Phlegmaticis penetrantiora, incidentia: reliquis vero amara præscribantur.
- 6 Et quia febrilia Symptomata sæpius concurrunt, interponenda sunt lenia diaphanica, Nitrosa, Absorbentia, Gelatinosa.
- 7 Quando Symptomata plurimum sunt imminuta, reliquis remediis martialia & tonica addantur, ut partium solidarum tonus iterum restituatur.
- 8 Stomaci specialiter occurritur per abstergentia & mundificantia, succum scil. Cochleariæ & Beccabungæ, mel rosatum cum supra nominatis remediis, non neglecta simul, ut in vero Scorbuto, interna curatione.
- 9 Maculæ Scorbuticæ peculiarem curam haud exposcunt, sed efflagitant saltem universalem corporis diapnoen, sic enim sponte discutuntur. Externe etiam S. V. Camphoratus aliqualem medelam affert.
- 10 Interdum scorbutici Hæmorrhagiarum narium experiuntur, quæ quidem nulla re certius mitigantur & sistuntur, quam temperato regimine & Diætetico & Pharmaceutico: diluentia quippe, lubricantia, nitrosa, emulsiva egregie hic opem ferunt, ita ut sistentibus & anodynis rarius opus sit.



VIII. *Cautela Practice.*

- 1 Scorbutus omnes fortiores tam Sanguinis commotiones, quam artificiales humorum excretiones respuit: quia plerumque majora damna & incommoda easdem sequuntur.
- 2 Unde abstinendum est a Vomitoriis & Catharticis, quippe quæ majores anxietates, palpitationes, aliasque turbas excitant.
- 3 Idem etiam efficit Venæsectio & regimen Sudoriferum, quod præterea intensissimas excitare solet Cephalalgias.
- 4 Salivatoria vero in usum vocata stases ulcerosas non modo augent, sed & dentium casum promouent; unde nunquam locum habent, nisi Lues & rea in enormiori gradu concurrat.
- 5 Diuretica etiam excretionem moderate instituendæ sunt: acriora enim nocent; imo Tincturæ alcalinæ acriores non semper tutæ sunt, sed cautam exhibitionem exposcunt.
- 6 Sicuti vero artificiales ejusmodi excretionem fortiores non bene fert Scorbutus, ita voluntarie excitatas inpr. diaphoreticas & alvinas temere suppressi haud patitur.
- 7 Diarrhææ quippe suppressæ pariunt tormina ventris, colicæ convulsivæ, inflationes abdominis atque lienis, singultus & Cardialgias.
- 8 Vomitus spontanei, qui interdum Scorbuticis eveniunt, si supprimuntur, maximas post se ducunt anxietates cardialgicas, aliasque incommoda.
- 9 Quid ab hæmorrhagiis suppressis sperandum sit, facile augurari licet, nimirum enormiores cephalalgias: vertigines, sanguinis majores exæstuationes.
- 10 Repulsio macularum scorbuticarum omnia symptomata exacerbat, quare frigus sedulo vitandum est.
- 11 Dolorum ferociæ male opponuntur Anodyna, quippe quæ vires tantum prosternunt, stases adaugent & excretionem supprimunt, imo dolorum recrudescentiam tanto ferocius invitant.
- 12 Curatio, quo magis placide instituitur, eo certius ad finem optatum perducitur; unde etiam continua & anxiosa Medicatio non semper tuta est, sed symptomata ordinarie exacerbat.
- 13 Succus malorum Citrinorum & aurantium nec non herbarum temperatarum antiscorbuticarum, juscula præterea carniū recentium egregie sublevant Scorbuticos, reliqua tamen acida inpr. mineralia minus tuta sunt.
- 14 Acidulæ quoque cum bona Diætâ in usum vocatæ Scorbuticis haud inutiles esse observantur, usus tamen moderatus sit; necesse est, & motus continuatus semper jungatur.
- 15 Nitrum pro commotione Sanguinis sistenda & acrimonia ejusdem temperanda egregium est remedium, abusus tamen vitandus est.
- 16 Cephæ & allium nautis solatium afferunt, sensibilibus vero non æque conveniunt.
- 17 Trifolium fibrinum a Simone Pauli commendatum Phlegmaticis magis prodest, quam cholericis: inconvenienter enim propinatum anxietates inprimis colicæ adaugent.
- 18 In Paralyfi Scorbutica habet usum Sedum Vermiculare, quod testibus Actis N. C. vomitorium specificum edit effectum, in forma Decocti exhibitum.
- 19 Aromatica pro condimento moderate usurpata prolunt, nocet vero eximie eorundem abusus.
- 20 In Stomacace celebratur Cochleariæ succus, nec non Beccabungæ, a spiritu autem Cochleariæ abstinendum est, quoniam ordinarie insignes in Massa Sanguinea excitat turbas.
- 21 Si ulceratio subest, Linimentis mundificantibus aliquid Aluminis usi, sed in moderata dosi, commiscendum est.
- 22 Evitentur acida fortiora: Spir. Vitrioli, inprimis vero Salis & Nitr. quia dentibus admodum inimici sunt.
- 23 Substituatur acetum commune, Acetositas Citri, Acetum Scylliticum aliis convenienter commiscenda.
- 24 Quando lues venerea cum Scorbuto est conjuncta,

tunc prioris præcipue ratio est adhibenda, non neglecto tamen plenarie posteriore, sed adhibitis lenioribus & maxime convenientibus antiscorbuticis.

## CAPUT SEPTIMUM.

## DE

*Gonorrhœa Virulenta.*

I. *Definitio.* **G**onorrhœa Virulenta est saniosum profluvium, tetri ut plurimum flavo-virescentis coloris, ex genitalibus fiens, ab impuro concubitu originem habens.

II. *Differentia.*

- 1 A *Gonorrhœa benigna*, ubi semen in naturali suo colore ob vasorum continentium atoniam involuntarie absque erectione penis effluit.
- 2 A *Pollutione nocturna*, quæ adolescentibus & Veneris, sub lascivis insomniis & erectione membri virilis contingit, nullumque Seminis inquinamentum conjunctum habet. De qua utraque Specie superius actum est.

III. *Signa.*

- 1 Contingit hocce impurum profluvium non immediate post peractum coitum, sed communiter circa quartum l. septimum diem: nonnunquam tamen, ubi virus est admodum penetrans, citius se manifestat.
- 2 Antecedit vero dolor insolitus genitalium, cum quadam rotatione quasi testiculorum, observante Sydenhamio.
- 3 Liquor, qui emanat, Seminis primo naturam æmulat, postea flavescit & sensim virescit: in malo vero graviore sanguine etiam tingitur.
- 4 Noctu, quando corpus incalescit & penis erigitur, maxime dolorificam sentiunt constrictionem Patientes in membro.
- 5 In Præputio vero sæpius inflammatio cum sensibili ardoris sensu accedit.
- 6 Ardor hic exquisitissime semper in urethræ inferiore parte, five circa radicem penis, post indicationem absolutam percipitur & augetur.
- 7 Incidunt interim Patientes in virium prostrationem & membrorum lassitudinem haud exiguam.
- 8 Oculorum ambitus subsidet & lividum acquirit colorem, reliquis vero faciei conspectus pallidior evadit.
- 9 Incurvatur etiam interdum membrum ob acriorem materiam cum acerbissimis doloribus, quod malum Galli *Chaudepisse cordee* appellant.
- 10 Quando fluxus sub mala Diætâ aut inconvenientibus remediis diutius durat, urethra sensim erosa carnem luxuriantem, sub *Caruncularum* nomine notam, producit, quæ postea mictionem non absque magno Patientis incommodo impedire solet.
- 11 Interdum etiam statim in principio pustule in glande exurgunt, quæ in ulcera late & profunde depauperata (*Chancres*) abire solent.
- 12 Quod si vero fluxus impeditur & adstringentibus iusto citius tractatur l. tumores glandularum inguinalium, sub Bubonum nomine noti, l. atrocissimi dolores & inflammationes Scroti, cum ingenti unius vel amborum testiculorum tumefactione, superveniunt.
- 13 Sub iusta autem medicatione materia illa tetri coloris sensim naturalem assumit faciem & tandem l. sponte l. sub convenientium remedium usu evanescere solet, reliquis etiam symptomatibus omnino cessantibus.

IV. *Subjectum.*

Gonorrhœæ virulentæ expositi sunt personæ cum impuris & infectis aliis mediante coitu commercium habentes.

V. *Prognosis.*

- 1 Gonorrhœa Virulenta recens, legitime per convenientia remedia tractata, sæpius spatio paucorum dierum curatur.
- 2 Si autem malum jam invaluit, non sine insigni difficultate tollitur.
- 3 Quo major est gradus infectionis, eo gravior est Gonorrhœa.



norrhœa & eo diuturniori mora opus est ad curationem absolvendam.

- 4 Fluxus quo expeditius procedit, eo tolerabiliora sunt reliqua symptomata.
- 5 Quando vero incongrue per medicamenta supprimitur, eo certius bubones, tumores scroti & testiculorum aliaque pessima superveniunt Symptomata.
- 6 Eadem adstringentia, per Syringam in urethram injecta, sæpissime Caruncularum Auctores sunt.
- 7 Interdum etiam ipsa Lues Venerea iisdem artificiis inconcinne adhibitis originem suam debet.
- 8 Gonorrhœa vero Virulenta sibi relicta & legitime tractata rarissime Luem Veneream post se ducit.
- 9 Bubones, si interne tantum tractantur, plures septimanas exposcunt, donec plenarie evanescant.
- 10 Carunculæ vero semel enatæ solo interno remediorum usu nunquam curantur, nisi externe l. per convenientia remedia l. instrumenta chirurgica iisdem succurratur.
- 11 Gonorrhœa Virulenta nonnunquam in Gonorrhœam simplicem admodum rebellem mutatur, quam Galli stricte *Ante Gonorrhœe* appellant.
- 12 Gonorrhœæ virulentæ in benignas & habituales, jam per insigne tempus duantes, mutatæ difficile curantur.
- 13 Interdum vero ulcusculum in urethra remanet, quod saniei per intervalla emanantis, Gonorrhœam simplicem fere æmulantis, causa est, quod nonnisi præfidiis externis tollitur.

#### VI. Remedia.

- 1 Materiam Qream & corruptam derivantia & evacuantia: laxantia appropriata, e Mercurio præcipue desumpta: & dulcis, Turpethum minerale, præcipitata alia edulcorata & a Salibus liberata, cum Extr. & Panchym. Croll. Helleb. nigr. Trochisc. alhand. Resin. Jalapp commiscenda.
- 2 Eandem corrigentia & mundificantia, uti vulgo sic dicta anticatarrhalia: Rad. Sarsapar. Chin. Pimpinell alb Lign Sassafras, Guajac. Essent. alexiph. Stahlii, Pimpinell. Lignor. Succin. Tinct. Tartar. & Tartarifat. Bals. Peruv. de Capayv. Terebinth. Venet. & Spir. ejusdem, Gummi. Guajac. Junip. Mastich.
- 3 Ardorem partium affectarum mitigantia, Nitrata, absorbentia, diaphoretica fixa, Cinnabarina, Emulsiones, Gelatinæ, Decoct nephrit. Forest.
- 4 Partium relaxatarum tonum restaurant & fluxum reprimunt Off. Sep. cum Balsamicis supra nominatis exhibenda.
- 5 Inflammationes & tumores externos demulcent focus ex emollientibus, Rad. nimirum Alth Lil. alb. Herb. Meliloth. Malv. Branc. urfin. fl. Chamom. Verbasc. Sem Lin. Fœn græc. nec non Empl e melilot. Diabotan. e mucilag. Spir. Vini Camphorat.
- 6 Ulcera penis externa mundificant & ad consolidationem disponunt acriuscula:  $\bigcirc\bigcirc$  philosoph. cum oleo ovorum temperatum, Unguent. Nicot. Basilic. & ius Pt. albus l. ruber, Essent Succin. myrrh. Lapis medicamentos. Tinct. & ii acris.
- 7 Carunculas penis absumunt Cathæretica & erodentia mitiora, mediante candela cerea l. chorda ex intestinis contorta, l. etiam peculiari cannula applicanda: Off. Sep. Tut. ppt. Aristol. rotund. Alum. ust. & dulcis, præcipitatus.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pilulæ laxantes.

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| R. Extract. Panchym. Croll.  | Refin. Jalapp. gr. iij.        |
| l. gr. XII.                  | c. Essent. lignor. fiant l. a. |
| Hellebor. nigr. gr. viij.    | Pil. No. XXI. pro una vice.    |
| & ij dulc. rit. par. gr. vj. |                                |
- 2 Alia.
- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| R. Mass. pil. e Succin. Crat. | c. Essent. Pimpin. l. Tinct. |
| gr. XV.                       | & ij.                        |
| Extract. helleb. nigr.        | Tartaris. F. l. a. Pil. No.  |
| & ij dulc. rit. par. gr. vj.  | XIX.                         |
| Trochisc. alhand. gr. ij.     | S. Ut antea.                 |

##### 3 Essentia Balsamico-resolvens.

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| R. Essent. lignor.    | Succin. & j.                                      |
| alexiph. Stahlii & j. | Ms. S. bis l. 3. per diem ad 30. gutt. propinand. |
| & j.                  |   |
- 4 Alia.
- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| R. Tinct. & ij. acr.        | Bals. de Capayv. & jss. |
| Essent. Pimpin. alb. & jss. | Msc. S. Ut antea.       |
| Succin. & j.                |                         |
- 5 Alia.
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| R. Essent. Succin. & j. | Spir. Terebinth. & j. |
| myrrh. & j.             | Ms. S. ut antea.      |
- 6 Pulvis temperans.
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| R. Oc. $\bigcirc\bigcirc$ ppt. | Cinnabar. nativ. ppt. & j.                           |
| Nitr. depurat.                 | Ms. f. Pulv. bis l. 3. per diem ad & j. propinandus. |
| Tartar. Vitriol. & jss.        |  |
- 7 Emulsio temperans.
- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| R. Amygd. d. exc. & jss.         | & vj.                              |
| Sem. 4. frig. maj. & j.          | Add. Conch. ppt.                   |
| c. Decoct. C. C. f. l. a. Emuls. | Oc. $\bigcirc\bigcirc$ ppt. & jss. |
| Edulc. Syr. dialth. Fernel.      | D. pro duabus vicibus.             |
- 8 Pilulæ adstringentes & Balsamicæ Blancardi.
- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| R. Gummi. Elem.    | F. l. a. Pilulæ cum Balsam. |
| Mastich. & j.      | Indico.                     |
| Terr. Cathecu & j. | Dof. & jss.                 |

##### 9 Aliud mitius.

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| R. Off. sep. & j.           | ticis & j.                |
| Bals. de Capayv. & j.       | duabus vicibus assumendi. |
| Ms. cum aliquot granis Cor. |                           |

##### 10 Focus emolliens.

- |                |   |
|----------------|---|
| R. Rad. alth.  | Incis. contus. coq. in s. q. $\nabla$ . f.  |
| lil. alb. & j. | Admov. calide bis l. ter per diem parti affecta per l. $\frac{1}{2}$ horæ spatium, imposita postea Emplastro quodam emolliente. |
| Herb. malv.    |   |
| branc. urfin.  |   |
| melilot. & j.  |   |
| Sem. lin.      |   |
| fœn. græc.     |   |

##### 11 Linimentum abstergens & mundificans Sydenhamii in ulceribus penis.

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| R. Unguent. Raslici & j.            | optime lævigat. & jss.           |
| Nicot. & j.                         | Ms applicetur cum linteis rasis. |
| & Præcipit. $\nabla$ ros. lot. & j. |                                  |

##### 12 Emplastr. Cathæreticum in Carunculis penis Caroli Musitani.

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| R. Off. sep.   | Aloes lotæ,      |
| Tut. ppt. & j. | Aristol. rotund. |
| C. C. ust.     | O ust & jss.     |
- F. Pulv. subtiliss. Postea.
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| R. $\bigcirc\bigcirc$ rosar. & j. | Etato ac misceto, donec medicamentum evadat duriusculum.                      |
| Litharg. $\bigcirc$ & j.          | Annectitur hoc remedium extremitati candela l. chorda & Caruncula applicatur. |
- F. Decoctio, quousque acquirat Emplastri consistentiam, deinde ab igne deposito, adde illum pulverem & ad ignem tra-

##### 13 Pulvis ejusdem.

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| R. Dracon. mitigat. & j. | Cum $\bigcirc\bigcirc$ amygd. d. distemperatus illinatur candela l. chorda & applicetur Caruncula. |
| Sciblicrud. & jss.       |  |
| Tut. ppt. & j.           |  |
| Ms. f. Pulv. subtiliss.  |  |

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Curæ initium fiat per laxantia appropriata, quibus semper & tamquam optimus mali & rei domitor, admisceatur.
- 2 Repetantur eadem post 6 vel 7 dierum intervalum toties, quamdiu medicatio perdurat.
- 3 His ipsis interponantur primo corrigentia: Tinct. Tartar. & ii Tartarifat. resolv. nobis usitata, Essent. alexiph. Stahlii, Essent. lignorum bis l. ter per diem exhibendæ.
- 4 Ad ardoris sensum mitigandum aliquoties pulveres absorbentes & Nitratos per diem adhibere conveniet, cui finis etiam interserviunt Emulsiones.
- 5 Quando per 6 l. 8. dies talia usurpata fuere, & ardoris sensus aliquantum mitigatus est, admisceantur supra nominatis remediis balsamica: Essent. myrrh. Succin. Bals. Peruv. de Capayv. Terebinth. Spir. Terebinth. Opobalsam.
- 6 Sic materia sensim sensimque imminuetur & naturalem assumet colorem, quo tempore specifica sistentia



tia locum habent. Ad hanc classem referuntur præcipue ossa Sepiæ, l. pulveretenus vel cum Balsam. Indico albo sub bolari l. pilul. forma ad scrupulos aliquot per diem exhiberi possunt.

- 7 Quod si vero mitioribus his sistentibus fluxus haud auscultat, tunc magis fortiora, qualia sunt pilulæ adstringentes Blancardi, in usum trahere convenit.
- 8 Post sopitum hac ratione fluxum præstat Patientibus per aliquod adhuc tempus Balsamico-correctiva supra nominata commendare, ut, si forte aliquid adhuc inquinamenti remanserit, illud hac ratione prorsus edometur: quo in casu ceteris omnibus palmam facile præripit Tinctura Gii acerrima, cum Bals. de Copayva mixta.

- 9 Diæta toto Curationis tempore stricte observetur, ita quidem, ut nonnisi eupepta in moderata portione & potus dilutus ex lignis anti-Phlegmatis, l. vinum album tripla l. dimidia quantitate temperatum in usum trahantur, omnibus dyspeptis, salis, acidis, spirituosus omnino prohibitis.

- 10 Præputii tumores & inflammationes, necnon Scroti tractantur per emollientia: Fodus, Emplastrum, Cataplasmata, quæ bis l. ter per diem applicari possunt. Medetur etiam iisdem & solamen affert Spiritus Vini Camphoratus,

- 11 Ulcera vero l. in præputio l. in glande l. in urethra occurrentia mundificantur per abstergentia penetrantiora, subjunctis balsamicis & consolidantibus.

- 12 Pro Caruncularum extirpatione commendant Candelulas cereas, l. chordas ex intestinis contortas, quibus pulveres, unguenta & alia septica applicant, ad Caruncularum usque sedem intrudenda. Si æger urinam emittere cogitur, educenda candela est & post operationem recens insinuanda.

- 13 Quando Mictio per hæc Carunculas impeditur, quod sæpius contingit, Catheter in usum vocandus est, ut lotio exitus detur.

- 14 Bubones tractantur per Tincturas corrigentes supra laudatas, quæ per plures septimanas sunt continuandæ, donec Gonorrhœa redeat & tumores sensim evanescant.

- 15 Quidam etiam externe tantum per maturantia eodem tractant, ubi maximis doloribus patientes extorquentur, donec per Sectionem sanguini inquinato & corrupto exitus concedatur.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Quo majus Phlegma inquinamentum est, quod facile ex symptomatum atrocia colligitur, eo magis anticatarrhalibus corrigentibus & Phlegmatis laxantibus insistendum, vitatis in principio balsaminis acrioribus, imprimis terebinthinatis, a quibus non tantum graves inflammationes sed & ipsas penis sphacelosas corruptiones inductas esse vidimus.

- 2 Balsamica hæc tunc demum tempore commode reliquis remediis & quidem in moderata semper dosi adjungantur, quando ardoris sensus paulatim imminui incipit.

- 3 Pro corrigenda materia nihil potentius est Tra Antimonii l. tartari acris aut imprimis nostra resolvente, quibuscum combinari possunt Essent. alexiph. Stahlii, Pimpin. alb. lignor. ita tamen ut posterior in subjectis siccoribus cum cautela usurpetur.

- 4 Quamdiu ardoris sensus valde urget, nec ipsa Essentia myrrh. & Succini tuta, quæ post eundem aliquantisper mitigatum cum supra citatis combinata bene se gerunt.

- 5 Pro temperando ardoris illo dolorifico sensu inserviunt imprimis pulveres Nitrato absorbentes, tum etiam repetitæ laxationes per Phlegma dulcem: nimia tamen refrigerantia vitanda sunt.

- 6 Injectiones cum balsamicæ, tum adstringentes, plane exulent: illæ summos ardores & inflammationes inducunt, hi fluxum supprimunt, Bubones, Carunculasque invitant.

- 7 Si quæ in usum trahuntur, fiant ex abstergentibus, demulcentibus, mitigantibus: lacte, Decocto lignorum diluto, & mellis. & dulci.

- 8 Cantharides a quibusdam magnopere commendati dolores insignes, inflammationes renum & vesicæ,

non raro etiam mictum cruentum invitant. Acrimoniam eorundem Nitrata & Lac in copia haustum medentur.

- 9 Anti-Phlegma & correctiva nunquam cum regimine sudorifero exhibeantur: graves enim noxæ, bubones nimirum, tumores testiculorum, & ipsa lues Phlegma exinde originem suam ducere possunt.

- 10 Ideo etiam Decocta lignorum, quæ præscribuntur, nunquam sint saturata, sicuti in lue Phlegma commendari solent, sed dilutiora, Decoctis vulgo sic dictis secundariis correspondentia.

- 11 Majus & certius adhuc damnum ab adstringentibus, maturius justo exhibitis, expectandum est; unde ferio ab iisdem sibi cavendum, quam diu acrimonia Urinæ & alia Symptomata Patientem adhuc fatigant.

- 12 Quando etiam, post mitigata Symptomata, hæc remedia in usum trahuntur, præstat primo ad mitiora confugere, postea his nihil proficientibus, tandem ad fortiora transgressus fieri potest.

- 13 Hæc ipsa adstringentia cum Balsamicis conjuncta efficacius se gerunt, quam si sola exhibentur.

- 14 Venæsectiones pro curanda Gonorrhœa virulenta non sunt necessariae; ubi vero insignis plethora concurrat, faciunt aliquid & contribuunt ad symptomatum mitigationem.

- 15 Per Urinam intra præputium contentam, & repetitam hac ratione glandis absterfionem, secundum Botalli Consilium institutam, nullæ Gonorrhœæ virulentæ, nisi leviores sint, præservantur, nedum curantur.

- 16 Cathartici solis edomatur quidem hoc malum secundum Sydenhamii methodum, sed felicius & citius hoc fit mediantibus corrigentibus, interpositis laxantibus & tandem substitutis balsamicæ-adstringentibus.

- 17 Quando per adstringentia fluxus justo maturius suppressus est, conveniunt præter laxantia Mercurialia, correctiva acriora, inter quæ Tinctura Gii acris & Essentia Pimpinellæ albæ facile primum locum occupant, quæ tamen si sensibilem effectum exerere debent, aliquandiu continuandæ sunt, ut nimirum Gonorrhœa revocetur, quæ via est securissima.

- 18 Satiùs semper est, Bubones per interna resolventia & balsamica successive dissolvere, quam eadem per externa varia tractare, quoniam facile ulcera fordidam multum negotii facessentia sequuntur.

#### CAPUT OCTAVUM.

##### DE

##### Malo Neapolitano s. Lue Venerea.

- I. *Definitio.* **L**ues Phlegma est inquinamentum maxime fermentescens & contagiosum, lymphaticos primo humores corrumpens, post & ipsas glandulas nec non ossa firmissime obsidens, eademque sensim sensimque depascens, ab impuro coitu l. contagio communicatum.

##### II. *Differentia.*

- 1 A *Scorbuto*, de qua superius Tab. CV. fusius actum fuit.

- 2 A *Lepra*, ubi universa corporis superficies rugosa, elephantorum instar, cum insidentibus squamis obfessa conspicitur: In Lue Venerea autem hinc inde observantur nodosæ collectiones profunde ulcerascens, & ipsa ossa tandem erodentes, quod in Lepra non fit, ubi ulcera, quæ occurrunt, magis sunt superficialia. In Lepra cutis ita densa & aspera evadit, ut acus puncturam non sentiant Patientes; in Lue Venerea vero hic sensus non amittitur. Dolores in Lepra sunt acutissimi: in Lue Venerea rodentes & terebrantes noctu præcipue ægrotos defatigantes.

- 3 *Ratione Gradus,*

- a Quando inquinamentum Venereum adhuc hæret circa partes genitales.

- b Quando toti humorum Massæ jam communicatum fuit, & universalis adest humorum inquinatio.



c Quando virulentia partes solidas, glandulas, ossa jam afflixit & ulcerationes, caries, dolores capitatis gravissimi & artuum, nodi aliaque accidentia graviora adfunt.

### III. Signa.

- 1 Sequitur Gonorrhœam virulentam per impurum coitum contractam & male postea per Adstringentia vel etiam regimen sudoriferum tractatam.
- 2 Interdum vero tacite absque Gonorrhœa exurgit, lassitudine tantum membrorum & doloribus cum capitatis tum artuum obtusis, nec non efflorescentiis scabiosis; & hoc quidem, ubi malum per contagium fuit communicatum.
- 3 Adfunt tamen & hæc Symptomata in priori casu, sed conjuncti simul sunt statim in principio vel bubones, vel ulcera penis, Gallis *Chancres* dicta.
- 4 In Sexu sequiori excipit hoc malum fluorem album malignum s. Venereum, similiter incongrue tractatum.
- 5 Ubique inquinamentum Venereum humoribus intime sese commiscet, partem eorundem lymphalem corrumpit & ad stases disponit.
- 6 Quo magis itaque Sanguini innidulatur, eo certius dolores augmenta capiunt.
- 7 Occupant illi summum Caput, humeros, Scapulas, medium femur, medias tibias, inguina, perinæum, & noctu præcipue ægrotos excruciant.
- 8 Sunt vero dolores graves, osteocopi, rodentes, tebrantes, vibratiles, primo magis erratici, postea sensim sensimque fixiores & constantiores.
- 9 Aliis solennes sunt bubones, ulcera aliis, aliis Verrucæ & cristosæ excrecentiæ in ano & glande, scabiosæ aliis efflorescentiæ siccæ, urentes, superficiem corporis occupantes.
- 10 Omnibus vero contingunt pustulæ nodosæ, hinc illic erumpentes & tandem ulcerascentes, postin flavescences crustas & escharas abeuntes.
- 11 Color faciei pallescit & squalidus evadit, orbita vero oculorum subsidet & sublividum conspectum acquirit.
- 12 Uvula tandem aliæque oris glandulæ firmiter obsidentur; unde ab earum læsione vocis rauco inducitur.
- 13 Hæc si symptomata præsto sunt, de veræ & contumacioris jam Luis præsentia non amplius dubitare licet.
- 14 Nam non tantum eroditur rebus sic stantibus Columella, sed malum etiam sese diffundit ad Cartilagineas & ossa faucium, nariumque, eademque sensim consumit.
- 15 Præcipue vero admodum familiare est huic malo, ut oris angulos labiaque ulcusculis affligat, nariumque etiam pinnas inficiat & corrumpat.
- 16 Dolores hoc in statu eo usque exacerbantur, ut ægroti vix amplius præ eorum vehementia in lecto seesse continere possint.
- 17 Accedunt non raro hinc & illic ob hanc dolorum pertinaciam tubera perdura in ossibus, exostoses dicta, quæ tandem ossium cariem & consumptionem post se ducunt.
- 18 Alii experiuntur etiam in externa cutis superficie tumores majores, peculiari cysta inclusos, sub meliceridum, steatomatum, atheromatum nomine notos, quod tamen rarius contingit.
- 19 Urina, quæ emittitur, est turbida, sedimento mucoso & viscido odore nauseoso, subdulci, fætido prædita.
- 20 Sanguis vero per Venæsectionem emissus ostendit in superficie manifestum lentorem & glutinositatem.
- 21 Ultimo nisi malo medela afferatur, non tantum superficies corporis ulceribus quasi consumitur, sed & columella cum vicinis ossibus plane eroditur, ut ægrotus voce omnino fere privetur.
- 22 Cranium etiam aliaque ossa manifestam cariem concipiunt: Capilli defluunt & plantæ pedum, manuumque volæ rhagades & rimas acquirunt.
- 23 Et sic hæctica, macie & ulceribus consumtus patiens sub vehementissimorum dolorum atrociam miserrime vitam finire cogitur.

### IV. Subjectum.

- 1 Americani quidam populi endemici corripiscuntur hoc morbo.
- 2 Lucrati eundem ab his sunt Europæi, cum Anno 1493. Galli Neapolin obsidione cingerent.
- 3 Illis autem præcipue familiaris est, qui per impurum coitum corpus conspurcavere.
- 4 Interdum vero etiam innocentes corripit, qui cum infectis arctius habent commercium, in uno lecto dormiunt, poculis & cochlearibus, nec non vestimentis eorundem utuntur &c.
- 5 Non raro etiam infantes hæreditate & frequentius adhuc per nutrices impuras hoc malum acquirunt.

### V. Prognosis.

- 1 Recens Lues Venerea facilius curatur quam inveterata.
- 2 Quæ humores adhuc pro sede habet facilius quoque subigitur, quam quæ partibus solidis jam inhæret.
- 3 Quæ cum Scorbuto alioque morbo combinata est, difficilioris est curationis.
- 4 Lues Venerea, si conveniente Methodo curata est, & eadem subjecta semel adhuc l. altera vice invadit, refractarie magis se gerit, quam prima vice.
- 5 Quæ per contagium communicatur, lentius procedit & facilius medicamenti obedit; quam quæ impuro coitu contracta est.
- 6 Infantes tamen, quibus per matrem aut nutricem communicata est, plerumque satis graviter exinde decumbere & difficulter liberari conspiciuntur.
- 7 Qui insignem visceris læsionem simul conjunctam habent, difficillime valetudinem pristinam acquirunt.
- 8 Quo magis ossa jam sunt erosa & hæctica complicata, eo minor reconvalescentiæ spes superest.
- 9 Sibi relicta nunquam curatur, etiamsi optimum regimen Diæticum observetur.
- 10 Quando morbus per medicamenta curatur & non plenarie extirpatur, tunc post aliquot temporis decursum novas radices agit & priores tragœdias ludit.
- 11 Subjecta succulenta facilius hunc morbum ferunt, quam sicciora.
- 12 Unde etiam sexus sequior facilius & diutius hunc perferre potest quam virilis.

### VI. Remedia.

- 1 Corpus inquinatum præparantia & sordes primarum viarum eliminantia: Magnesia alba, &rius dulcis cum Extracto Panchymag. vel Hellebori nigri propinatus, Noduli etiam laxativi, cum anticatarrhalibus combinati.
- 2 Lympham corruptam corrigentia & inquinamentum Venereum per vias urinarias & superficiem corporis expellentia anti-catarrhalia, alexipharmaca: Essentiam Pimpinell. alb. alexipharmac. Stahlî, Lignorum, Scordii, Succini, & Tartarifat. Spir. Guajac. &rius dulcis, &ium crudum pulverisatum: ut & fortiora resolventia: Decocta lignorum saturata ex ligno Guajac Sassafr. Junip. Pini, Fraxini, Rad. Chin. Sarsaparill. Bardan. Vincetox. Petasit. Herb. Sapon. Tinct. &ii acris, Tartari acris, resolvens nobis usitata.
- 3 Lympham corruptam cum fermento Venereo per salivationem evacuantia, uti sunt &lia: interne &rius dulcis, Panacea l'Emery, Turpethum minerale; externe Suffimigia &lia, Unguenta &lia.
- 4 Faucium inflationes & exulcerationes sub salivatione metuendas demulcentia & abstergentia: Gargarismata ex Hord. Rad. Alth. Herb. Malv. Sem. Cydon. Fœn. Græc. Ficub. c. lacte, aquæ permisto, parata.
- 5 Ulcera Venerea abstergentia & consolidantia: interne &lia & anti &rea supra laudata; externe &rius dulcis bis l. ter per diem inspersus, vino calefacto ante applicationem novi ablendus, præcipitæus etiam ruber, Unguentis admiscendus, nec non secundum Paracelsum & Guajaci. In levioribus vero satisfacit Tinctura &ii acris, Decocto lignorum sufficienter temperata.
- 6 Bubonibus prospicientia: interne &lia & Tincturæ alcalinæ acres cum Decoctis Lignorum exhibitæ. Externe discutiunt eosdem Emplastr. diaphoretica & resolventia e melilot. Sperm. Cet. &io imprægnata: maturant vero Emplastr. e Mucilag. filii Zachariæ.
- 7 Nodos Gallicos dissolventia: præter interna anti &rea



Qrea Unguenta & Emplastra & lia v.g. Vigonis, cum bona & ii portione combinatum, applicatio Laminæ plumbeæ & io illitæ & externe impositæ.

8. Excrecentias fungosas & verrucosas absumentia : & ius præcipitatus, pulveres ex Alumine & Herb. Sabinæ, non neglectis internis remediis.

9. Cariem ossium tollentia : Tinct. & ii acris, Euphorb. ceteraque usualia, & Guajaci, rasura.

10. Scabiem Veneream curant interne & lia: Panacea & lis, Mercurius dulcis, externe Unguentum quoddam Mercuriale. *Formule Remediorum.*

#### 1. Pilulæ Mercuriales laxativæ.

R. Extract. panchym. Croll, c. Tra & ii acris f. l. a. Pil. gr. XII. No. XIX. *hellebr. nigr. Consp. pulv. liquir. prouna vice.*

#### 2. Nodulus laxativus.

R. Rad. Chin. Fibr. Helleb. nigr. & ss. Bardan. & & ss. Crystill. Tart. & iij. Sarsapar. & vj. Incis. contus. infund. in Vini albi & Aqu. f. a. & iij. Lign. Guajac. & ss. Dos. & vj. vij. singulis vel Sassafr. & iij. alternis diebus. Herb. Saponar. Mj. Fol. Senn. f. st. & jss.

#### 3. Essentia resolvens & diuretica.

R. Tinct. & ij acris & ss. Ms Dos. gutt. 30. 40. bis l. Essent. lignor. ter per diem propinanda. Succin. & & j.

#### 4. Alia.

R. Tinct. Tartari acris & ss. & j. Essent. Pimpinell. alb. & j. ut antea.

#### 5. Pulvis expellens.

R. Conch. ppt. Cinnabaris & ij & iij. & ij diaph. & & ss. Ms f. Pulv. bis per diem ad Antimon. crud. & iij. & j. propinandus.

#### 6. Decoctum lignorum saturatum.

R. Rad. Sarsapar. & iij. in pet. ligat. a. & iij. Chin. Punic. & ss. Bardan. & & j. Coq. c. & S. Mensur. XII. Lign. Sanct. & iij. ad tertias. Sassafr. & iij. Decant. & colat. serv. & ij. viv. in pet. ligat. pro usu. Antim. Crud. pulveris. Dosis & vj.

#### 7. Aliud Baglivi pro valde emaciatīs & Tabidis.

R. Rad. Sarsapar. a. & iij. Bulliant ad tertias : in Visc. Quercin. a. & iij. fine Adde : & font. & XL. Cinam. contus. & ss. Infund. in vase terreo vitreato super Cineres calidos per 24. horas. Tunc Coletur. & ex residuis fiat Secunda Decoctio cum eadem & quantitate. adde : Antim. crud. Dosis prioris & iij. singulis seorsim in petia ligat. mane per 30. l. 40. dies.

#### 8. Pulvis Salivatorius.

R. Panacea & lis l. Emery & ss. Exhibe prima vice & ss matutino & vespertino tempore : 2da die propinentur 15 gran. bis quoque per diem : 3tia 20 gran. iterum bis : 4ta die 25 gran. bis quoque : 5ta die 30. gran. etiam bis per diem. Continuando hac ratione semper in auctiori dosi, donec Salivatio procedat copiose, tunc cessandum & alter- nis l. ternis saltem diebus 12 circiter gran. exhibenda, ut Salivatio in iusto conservetur gradu, quam quidem per 4 circiter septimanas durare necesse est.

#### 9. Unguentum Mercuriale Sydenhamii.

R. Axung. porcina & iij. Vel possunt juxta Methodum Stahlianam primo & ii. crud. & j. die carpi, secundo tarsi, tertio bi & surg illini & hoc tamdiu continuari, donec dentes vacillare & glandulae Salivales tumescere incipiant & ipsa tandem excretio sequatur. Tertia bujus Unguenti parte Patiens brachia, crura & tibias (muniendo omnes reliquas Corporis partes) ad 3 noctes continuas inungat. Post tertiam inunctionem ut plurimum Gingivæ intumescunt & Ptyalismus se-

10. Decoctum septicum ad Verrucas absumentias Caroli Musitani.

R. Alum. roech. ust. ad tertias & excrecentias abluere ter in die & Virid. aris a. & j. insensibiliter evanescent. Bulliant in & rosar. & iij. Pulvis Eiusdem.

R. Alum. ust. Adsparg. aliquoties per diem. Pulv. Sabin. a. f. Pulv.

#### VII. Methodus medendi.

1. In Curatione Luis Venereæ duplex methodus solet observari; mitior scil. quando fermentum adhuc sanguini tantum innidulatur, quæ fit per Sudationem: altera vero fortior, ubi malum jam partibus solidis infidet, quæ Salivatione peragitur.

2. In utraque methodo solenne est, ut corpus præparatur per laxantia, aliquoties exhibenda, antequam ad ipsam methodum transgressus fiat.

3. Gallis etiam in usu est, ut ante salivationem excitatam per balneorum usum cutem magis perspirabilem reddant.

4. Quando itaque corpus præparatum est & malum sit adhuc mitius, tunc exhibeantur Decocta lignorum saturata, singulis mane ad & vj. vij. & imperetur de super regimen sudoriferum ad 2. 3. horas, in stupha instituendum, quod quidem per tres circiter septimanas continuandum est.

5. Aut loco horum Decoctorum assumatur Essentia quædam anti-Venerea acris probata, qualis est Tinctura balsamica Heinsii, Hundertmarck & nostra resolvens bis l. ter per diem, cui interponatur pulvis balsamico-expellens; Decoctum vero non nisi bis forte per septimanam cum regimine sudorifero in usum trahatur.

6. Interdum malum, quando in primis suis initiis adhuc constitutum est, auscultat tantummodo Essentia Pimpinellæ albæ cum Tra & ii acris, absque ullo Decocto lignorum adhibita.

7. Quando vero lues partibus solidis & ipsis ossibus sese communicavit, & non penetrantissima appropriata Tinctura alcalina ad manus sit, tum ad ipsum Mercurium refugium suum habere convenit.

8. Adhibetur hic vel interne sub Mercurii dulcis aut Panaceæ compositione, methodo jam supra descripta, l. externe in Unguentis, ubi intra aliquot dierum spatium glandulae Salivales & oris interna intumescere & Salivæ copiosus effluxus subsequi solet.

9. Hanc ipsam Salivationem ita moderari decet, ut intra nycthemeri spatium libræ iij. l. iv. expuantur.

10. Quod si non iuste procedat, stimuletur per internam & ii dulcis l. Panaceæ l. Emery exhibitionem, alternis forte diebus repetendam.

11. Ubi vero iusto fortius procedit, ibi Catharticis frænum eidem injicere necesse est.

12. Sub hac ipsa salivatione convenit, faucium habere rationem, ut nimirum nimia intumescencia & exulceratio præcaveatur.

13. Fit hoc partim per gargarismata resolutentia & discutientia, partim per emollientia.

14. Reliqua symptomata quibus remediis sint tractanda, superius dictum est.

15. Illud autem in fine curationis adhuc est monendum, quod utraque supra allegata methodus & in primis salivatoria requirat regimen exacte Diæticum, ut nimirum omnia dyspepta & spirituosia fugiantur, sub salivatione etiam omnis carnis & Vini usus omnino vitetur.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1. Laxantia, quæ pro corpore præparando exhibentur, non sint fortiora, sed mitiora, per intervalla repetenda; nihil enim hic impetu fieri debet, sed mora opus est, donec malum subjugari possit.

2. Mercurius dulcis, cum speciale habeat efficaciam in hoc morbo, reliquis laxantibus, si formulæ permittunt, cum fructu semper additur.

3. Egregiam etiam efficaciam habet Magnesia alba, rite parata, per 6. 7. dies in usum vocata.

4. Omnis lues Venerea, etiam si adhuc sit mitior, plures efflagitat septimanas, donec per remedia possit profligari.

5. Ideo vani sunt & spe sua plerumque excidunt, qui pul-



- visculis & Mercuriis suis Obus intra aliquot dierum spatium quamcunque Luem Veneream radicitus se extirpare posse gloriantur.
- 6 Quidam, antequam ad ipsam realem Curam sese accingant, Venæsectionem celebrant, quæ quidem in subjectis Plethoricis non est dissuadenda, promiscue tamen non instituenda est.
  - 7 Tincturæ alcalinæ si acerrimæ sunt & specialiter componuntur, interdum solæ sufficiunt, pro malo hoc prorsus extirpando, inprimis si iisdem pulverum absorbentium & balsamicorum usus interponitur, quod a Tincturis Heinii, Hundertmarck & nostra resolvente impetratur: in malo tamen graviore non semper sufficiunt, quare Mercurius dulcis iisdem frequenter interponetur.
  - 8 Decocta lignorum secundum temperamentorum diversitatem sunt formanda. Cholericis enim & siccioribus conveniunt Sarsaparilla, Chin. Pimpinella: Succulentis vero & phlegmaticis Lign. Guajacac. Sassafras.
  - 9 Siccioribus semper etiam præscribenda sunt Decocta lignorum paulum diluta: succulentis vero magis saturata.
  - 10 Sudatio melius procedit in stupha, accenso Spiritu Vini & hausta portione Decocti lignorum, quam sub multis tegumentis.
  - 11 Promoveant hanc ipsam sudationem, & humores simul per diuresin evacuant Tincturæ supra laudatæ alcalinæ, si aliquoties per diem exhibentur.
  - 12 Aromata, sinapi, allium exulent: humores quippe magis exagitantur.
  - 13 Ex eodem etiam fundamento neque amara & præprimis fumaria conveniunt, cum inquinamentum Venereum humoribus magis insinuent.
  - 14 Acria antiscorbutica calidiora pectori damna intulisse observatum fuit.
  - 15 Salivatio non instituenda est, quamdiu morbus in leviori adhuc constitutus est gradu: inquinamentum enim, tanquam adhuc subtilius & tenerius non aggreditur & subigit satis; unde inveteratæ Lue magis convenit Salivatio, mitiori vero sudatio & diuretica evacuatio.
  - 16 In Salivatione administranda præprimis ad vires Patientis est respiciendum, debiliores enim & morbi pertinacia fere consumti, vix illam ferunt.
  - 17 Qui visceris aliquo vitio insigniori laborant, plane ab eadem absteineant.
  - 18 Salivatio, quæ per Mercurium dulcem & Panaceam, & lem excitatur, tam sensibilem effectum non edit, ac illa, quæ fit per Inunctionem.
  - 19 Quando post ultimam inunctionem Salivatio non procedit, tunc Panacæ l. & li dulcis exhibitio eandem invitant.
  - 20 Salivatio per suffimigia, mediante & iol. Cinnabari, instituta, magis est incerta; unde præstat inunctionem in usum vocare.
  - 21 Sub Salivatione ægrotus sustentandus est Diætâ tenui evchyma, Decocto lignorum diluto, iusculis.
  - 22 Vitanda sunt omnia solida: quia dentes vacillant, & ad masticandum plane sunt inepti.
  - 23 Acida non conveniunt, cum Mercurii actionem impediunt.
  - 24 Inquietudo & frigus admissum maxima damna infert, cum salivationem imminuat & Mercurium in glandulis stagnantem relinquat, a quo pessima induci solent symptomata.
  - 25 Sudatio etiam nimia sub Salivatione omni modo præcavenda est, quia Mercurium altius in partes nervosas & tendinosas impellit, a quo deinde tremores, paralyse, ariduræ initia sua sumunt.
  - 26 Convenit potius Salivationi diapnoe, quæ Mercurii actionem suffulcit & fovet.
  - 27 Quando Mercurius in corpore remansit, quod ex glandulis tumefactis & aliis symptomatibus hariolari licet, Tinctura alcalina acris, aliquoties per diem propinata, bonum edit effectum, salivationem denuo invitando.
  - 28 Adstringentibus in Gargarismatibus, quæ adhibentur pro ore tumefacto & ulcerato, non concedatur lo-

cus, quia similiter salivationem reprimunt.

- 29 Diarrhææ torminosæ, mucosæ & sanguinæ sub salivatione nihil boni portendunt, cum effectum exoptatum imminuant. Resistendum iisdem est interne Tincturis alcalinis, interne vero clysteribus lenientibus ex Cremore hordei, amygd. dulc. & Vitell. Ov. & a Mercurii cum interno tum externo usu abstinentum.
- 30 Si Salivatio nimium procedat, ad justum ordinem redigenda est per lene laxans, & imminutam l. plane omissam ulteriorem inunctionem.
- 31 Quando vero Salivatio imminuitur, antequam symptomata dispareant, tunc denuo exstimulanda est per exhibitionem Mercurii dulcis ad scrupulum circiter unum pro dosi.
- 32 Quando inunctio celebrata est & Salivatio rite successit, tunc ægrotos licitum est, ut indusium & linthea lecti commutet cum aliis jam antea usurpatis & calefactis: priora enim Unguento infecta Salivationem justo fortiorem reddere possent.
- 33 Quando omnia symptomata evanuerunt, tunc Salivatio per aliquot adhuc dies potest protrahi, ultimo vero lene aliquod laxans in usum vocari.
- 34 Salivatio, si prima vice non legitime fuit administrata, repeti potest post aliquod tempus, dummodo ægroti vires illud permittunt.
- 35 Si vero post legitime institutam & bene finitam Salivationem dolores fixi in aliqua parte remaneant, signum est os illius partis concepisse cariem, quæ remediis chirurgicis removenda est, omnibus internis hic prorsus inefficacibus.
- 36 Omnia reliqua symptomata Luis Venereæ, nimirum bubones, ulcera, Verrucas, Scabiem absque internis curare velle, irritum est negotium.

## CAPUT NONUM.

D E

Cancro.

- I. *Definitio.* **C**ancer est obstructio partium glandulosarum collectiones primo varicoso-nodosas & scirrhasas, postea & corruptiones ulcerosas, cum acutissimis doloribus conjunctas, formans: a stagnatione lymphæ & feri originem habens.
- II. *Differentia.*
  - 1 A *Carcinomate*, quod proximam, similemque Cancro constitutionem & dispositionem innuit.
  - 2 Ab *ulcere cancroso*, non ipsum cancerum, sed simillimam fere naturam & constitutionem referente.
  - 3 Est vel *occultus*, qui citra actualem corruptionem, sed nodosa tantum collectione in occluso quasi patientes excruciat; vel *exulceratus*, ubi malum jam in actuale ulcus pessimi moris abiit, ægrotosque lento suo progressu & pertinacia miserrime extorquet.
  - 4 Ratione *locorum* contingit vel in mammis mulierum, vel strumis exulceratis, l. labio exulcerato, l. utero, l. aliis partibus glandulosis & tendinosis, naso, genis, membro virili, &c.
- III. *Signa.*
  - 1 Observatur & conspicitur nodosa aliqua varicoso-scirrhasa collectio, pisi primo magnitudinem vix adæquans.
  - 2 Subsistit hæc sibi relicta sæpius per plures annos, male autem tractata intra paucum tempus visibilia sumit incrementa & in pessimam abit corruptionem, præcipue in mammis.
  - 3 Venæ in & circa partem affectam sunt inflatæ & humidæ, lividamque præ se ferunt faciem.
  - 4 Dolor pro temperamentorum & circumstantiarum differentia modo est major, modo minor, semper tamen maxime acutus, urentem & subtilissime sectilem sensum inferens.
  - 5 Animus admodum prostratus & summe anxius est, ita ut Lipothymia interdum accedant.
  - 6 Contingit autem hoc eo certius, quo activiori temperamento ægrotus præditus est.



- 7 Nimirum minus vivaces ex majori & satis ampla nodosa collectione parum sapius incommodi, activiores vero ex minori Cancro ingentes perferunt cruciatus.
- 8 Quando scirrhus hæc constitutio majorem mammae partem obfedit, tunc communissime latius terpere & glandulas axillares ejusdem lateris non absque acuti doloris sensu prehendere solet.
- 9 Quo sensibiliores & frequentiores dolores sunt, eo magis intercurrent animi anxietates gravissimæ, insomnia terroris plena, vigiliæ, metus.
- 10 Subsistere autem hac ratione potest per plures menses, imo aliquot annos absque actuali corruptione.
- 11 Quando vero ad *exulcerationem* pervenit, & ad ipsam jam corruptionem tendit scirrhus, tunc plane intolerabiles dolores concurrunt cum omnium reliquorum symptomatum exacerbatione.
- 12 Quæ quidem in tali gradu perseverant, donec corruptio & ulcus sequantur.
- 13 Materia, quæ in eodem continetur, non est purulenta, neque etiam simpliciter ulcerosa, sed acris, acido-salina, corrosivo-putredinosa, ita ut non tantum metalla corrodat, cum absorbentibus effervescat, linteamina friabilia reddat, ad instar spirituum corrosivorum, sed & ipsam cutem sanam, si eam alicubi attingit, veluti adurat.
- 14 Color, quem exhibet, est modo subflavus tenuioris consistentiæ, modo suberuentus, ichorofus.
- 15 Odor est valde gravis; putredinosus quidem, si dolores sunt mitiores, ubi putredo prævalet & depascit; acetosus vero & corrosivus, si cruciatus & dolores dominantur, ubi illa magis cessare solet.
- 16 Labia hujus ulceris cancrofi sunt turgida, callosa, livida, l. roseam faciem præ se ferentia; cutis autem iisdem vicina est admodum laxa, post cuticulæ abrasionem, acre & tenue subflavescent serum ex pluribus poris fundens.
- 17 Progreditur autem hæc ipsa corruptio ulcerosa, si dolorum per emollientia tantum ratio habetur, eo usque, ut quandoque integra frustula solidæ substantiæ excidant.
- 18 Quod si autem putredini resistitur per gummatoso-ballamica, tunc dolorum atrocitas exquisitissime augetur.
- 19 Durat hæc Scena, donec ægrotus putredine & doloribus consumtus, nisi vel manu chirurgica l. remediis secretioribus eidem occurratur, miserrime vitam deponere cogatur.
- V. *Subiectum.*
- 1 Incurrunt hoc malum quandoque foeminae, menstruum suppressiones perpeffæ.
  - 2 Viri etiam, quanquam rarius, in hæmorrhoidum ataxias dilapsi.
  - 3 Qui per Venerem & Bacchum humorum crasim insigniter immutavere.
  - 4 Coccochymici hæreditariam dispositionem a parentibus possidentes.
  - 5 Qui vi externa, contusione, allusione, compressione nimia glandulis læsionem graviolem induxere.
  - 6 Vulnerati in partibus glandulosis & male per remedia externa tractati.
- V. *Prognosis.*
- 1 Cancros occultos omnes melius est non curare; curati enim citius intereunt, non curati per longius tempus perdurant. Hippocr. 6. Aph. 38. exceptioni tamen hic adhuc locus est.
  - 2 In primo statim principio facilius curantur, quam si per aliquod jam tempus persistere, ubi rarissime curari solent.
  - 3 Cancros exulceratos non nisi per sectionem aut ustionem curare novit Medicina vulgaris.
  - 4 Dantur tamen selecta & appropriata remedia, quibus absque auxilio chirurgico uterque Cancer tolli potest, sicuti nuper demum Cancrum labiorum exulceratum in viro & mammarum in femina plus quam sexagenaria sub nostra medicatione feliciter curatum fuisse adhuc dum gaudemus.
  - 5 Quando in Sectione Cancri malum non radicitus ex-

tirpatur, tunc facillime de novo propullulat & eadem tragedias ludit.

- 6 Imo contingit quandoque, etiamsi mamma cancro affecta radicitus extirpetur, ut post plenariam Curationem altera eodem malo afficiatur, imprimis si a causa interna originem suam ducat.
- 7 Cancri, si subjecta ad eosdem recipiendos inveniunt, interdum sunt contagiosi.
- 8 Quo mitius tractantur, eo longius perdurant & minus extorquent Patientes.
- 9 Quo vero acriora & penetrantiora remedia applicantur, eo magis & putrefactio & dolores augmenta capiunt.
- 10 Etiam si exquisitissima remedia præsto sint, mora tamen opus est, donec hoc nialum radicitus subigi & extirpari possit.

#### VI. *Remedia.*

- 1 Primas vias & humores ab inquinamentis crassioribus liberantia: Fol. Senn. Rhabarb. Agar. Mann. Fibr. helleb. nigr. Magnes. alb. & dulcis, Emeticum sine pari, a D. Kortholtio, Regiomontano communicatum.
- 2 Sanguinis abundantia consulentia: Venæsectio, Scarificatio.
- 3 Humorum acrimoniam temperantia & diapnoen corporis promoventia: Conch. ppt. Oc.  $\mathfrak{z}$ . ppt. Unicorn. foss. & diaph. Bezoard. min. Nitr. depurat. & tum, Antimon. crud. Cinnabar.  $\mathfrak{z}$  ii & nativ. ppt. Tartari.  $\mathfrak{z}$  ii acris, resolvens nobis usitata, Decocta lignorum non admodum saturata.
- 4 Affluxum nimium discutientia: Spir. Vin. rectificat. Spir. Vin. Camph. Crocat. externe applicandi.
- 5 Ulcus, si quod adest, mundificantia & corruptionem inhibentia:  $\mathfrak{z}$  laterinum empyreumaticum, liquamen Myrrhæ, mel rosatum cum specificis subactum.
- 6 Ulcus mundificatum consolidantia: Empl. e Minio, e spermat. ranar.

#### *Formula Remediorum.*

##### 1 Nodulus laxativus.

- |   |   |
|---|---|
| R. Rad. Sarsapar. $\mathfrak{z}$ j.         | Rhabarb. elect. $\mathfrak{z}$ iij.                       |
| Cbin.                                       | Fibr. hellebor. nigr.                                     |
| Gramin. $\mathfrak{a}$ . $\mathfrak{z}$ ss. | Agar. albiss.   |
| Lign. Sassafr. $\mathfrak{z}$ iij.          | Tartar. Solub. $\mathfrak{a}$ . $\mathfrak{z}$ j.         |
| Herb. Virg. aur.                            | Incis. cantus. infund. in $\mathfrak{z}$ j.               |
| Veron. $\mathfrak{a}$ . Mss.                | $\nabla$ fervent. $\mathfrak{O}$ $\mathfrak{z}$ iij. Vin. |
| Summ. cent. min. p. j.                      | generosi Dos. $\mathfrak{z}$ vj. viij.                    |
| Fol. Senn. s. st. $\mathfrak{z}$ j.         | alternis diebus.  |

##### 2 Pilula laxativa.

- |   |   |
|---|---|
| R. Extract. Panchym. Crol.                  | Trochise. alband. gr. ij.                     |
| gr. XV.                                     | e. Tra $\mathfrak{z}$ j Tartar. s. l. a. Pil. |
| Hellebr. nig. gr. viij.                     | No. XIX. pro una vice.                        |
| $\mathfrak{z}$ ii dulc. rit. par. gr. viij. |   |

##### 3 Pulvis diapnoico-temperans.

- |  |   |
|--|---|
| R. Oc. $\mathfrak{z}$ . ppt.                               | Sal. Guajac. $\mathfrak{a}$ . $\mathfrak{z}$ j. |
| Conch. ppt.  | Cinnabar. $\mathfrak{z}$ ii $\mathfrak{z}$ ss.  |
| $\mathfrak{z}$ j diaph. $\mathfrak{a}$ . $\mathfrak{z}$ j. | Ms. f. Pulv. bis per diem ad                    |
| Nitr. depurat.   | $\mathfrak{z}$ j. assumendus.                   |

##### 4 Alius.

- |  |   |
|--|---|
| R. Conch. ppt.                                 | Lumbric. terrestr. ppt.                                 |
| Unic. foss. $\mathfrak{a}$ . $\mathfrak{z}$ j. | Cinnab. nativ. ppt. $\mathfrak{a}$ . $\mathfrak{z}$ ss. |
| Antimon. crud. $\mathfrak{z}$ j.               | Ms. f. Pulv. S. ut antea.                               |

##### 5 Essentia discutiens.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| R. Tra $\mathfrak{z}$ j tartar. $\mathfrak{z}$ j. | Ms. S. bis per diem ad 30. |
| Essent. lignor. $\mathfrak{z}$ j.                 | guttas propinanda.         |

##### 6 Alia.

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| R. Tinctur. resolv. $\mathfrak{z}$ j. | Ms. S. ut antea. |
| Essent. Succin. $\mathfrak{z}$ j.     |                  |

##### 7 Alia.

- |   |                  |
|---|------------------|
| R. Tinct. Tartar. $\mathfrak{z}$ j.       | Ms. S. ut antea. |
| Essent. trifol. fibrin. $\mathfrak{z}$ j. |                  |

##### 8 Species pro Infuso.

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| R. Rad. Sarsapar. $\mathfrak{z}$ j. | Incis. d. ad. ch.               |
| Lign. Guajac. $\mathfrak{z}$ ss.    | Cum $\nabla$ infund. & loco In- |
| Herb. Heder. terrestr.              | fusi Thee usurpanda.            |
| Virg. Or. $\mathfrak{a}$ . Mss.     |                                 |

#### VII. *Methodus medendi.*

- 1 Cancrum in primo adhuc suo ortu constitutum tractare de-



re decet per lenia laxantia, sæpius & per intervalla repetenda, subjunctis internis solventibus diapnoicis, absorbentibus & discutientibus externis.

- 2 Remedia igitur, quæ hoc tempore usurpantur, sint selecta & per longum tempus continentur, si effectum sensibilem ab iisdem sperare velimus.
- 3 Noduli quidem laxativi optime vernali & autumnali tempore ordinantur, helleborata vero & Mercurialia laxantia singulis mensibus in usum vocari possunt. Intermedio tempore Pulve es diapnoico-absorbentes bis per diem & toties etiam Tincturæ solventes in Infuso aliquo Vulnerario commendandæ veniunt.
- 4 Si hæmorrhoidum & mensium suppressiones subsint, Vena in pede secanda & simul appropriata remedia interna ordinanda sunt.
- 5 In Cancro jam exulcerato præter nominata exquisitissima & selectissima, quorum effectum jam certi sumus, corrosivum scil. liquidum D. Kortholti & Bals. Vulner. ejusdem externe in usum trahantur.
- 6 Aut si hæc desint, auxilium Chirurgicum per sectionem est invocandum, quod quidem præcipue in mammis labior. & membro virili locum habet.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 In Cancris occultis omnia emollientia & maturantia sunt vitanda; exulceratio enim scirrhi exinde contingit, ulteriorem putredinosam corruptionem post se ducens.
- 2 Irritantia & aciora balsamica majorem humorum affluxum invitant & dolores exacerbant.
- 3 Diæta etiam salsa & acida cancriosis admodum inimica est.
- 4 Opiata ulceribus cancriosis pro dolorum mitigatione applicata stupefactionem inducunt & quandoque ipsum sphacelum post se trahunt.
- 5 Omnia etiam corrosiva, nisi maxime cicurata fuerint, perversum semper edunt effectum.
- 6 Cancri palati, uvulæ, tonsillarum, uteri, glandularum axillarium ulcerati difficillime per Sectionem extirpantur ob locorum inconvenientiam.
- 7 Salivatio in extirpando Cancro exulcerato parum aut nihil facit, imo Cancrum labiorum exinde augmenta fuisse clarissime conspeximus. Laborabat scil. vir 38. circiter annorum cancro labii inferioris, Chirurgus cum per Ælia continuo tractabat, per quæ malum ab initio quidem aliquo modo mitius reddebatur, sed mox Cancer magis magisque exulcerabatur, atq; paucis elapso tempore totum labium ad mentum fere usque occupabat: exhibebantur & applicabantur varia tam interna & externa, inpr. vero Mercurialia, sed tantum abest, ut malum per hæcce imminueretur, ut potius in dies incrementa caperet, ita ut non nisi sectione curari posse judicaretur. Cum vero ægrotus eam rejiceret, curæ nostræ committebatur. Exhibebamus E. post varia alia aliquoties emeticum sine pari, exterius vero applicabamus corrosivum liquidum atque Balsamum vulnerarium, remedia a Kortholtio transmissa, quorum ope tandem elapsis octo mensibus egrotus curabatur: qua de re latius in *Breblavischen Natur. Veschichten*. Hisce ipsis remediis, omisso tamen corrosivo, & interposita Tinctura Jii acerrima aliisque a D. Kortholtio transmissis, curavimus Cancrum mammae sinistrae, primo occultum (qui spatio septem jam annorum feminam sexagenariam affligerat) & paulo post exulceratum. Et adhuc dum (Mense scil. Mayo) tractamus cancrum exulceratum ejusdem mammae in femina nobili sexaginta sex annorum, ubi etiam, quoniam suppuratio hactenus optime processit & alia signa bona adsunt, felicem speramus eventum. De duobus hisce casibus prolixius agemus in *Breblavischen Natur. Veschichten*.

## LIBER IV.

D E

# AFFECTIBUS MOTUUM.

## SECTIO I.

D E

# MOTIBUS EXCEDENTIBUS.

## CAPUT PRIMUM.

### De Motibus Spasifico-convulsivis in genere.

I. *Definitio.* Sunt motus tonici exacerbationes plus minus violentæ, l. ob causam materialem e corpore eliminandam l. moralem graviores a Natura excitatæ.

#### II. Differentia.

- 1 Alii sunt *Idiopathici*, certo iterum tempore, præcipue circa insigniores phases Lunæ recurrentes, alii vagi.
- 2 Alii *periodici* certo iterum tempore, præcipue circa insigniores phases Lunæ, recurrentes, alii vagi.
- 3 Alii *causas materiales* pro fundamento aut fomento agnoscunt, v. g. cruditates primarum viarum, vermes, crustam lacteam, achores, aliasque ulcerationes scabiosas, præsertim circa caput retropulsas, Urinam suppressam, semen retentum, graviores corruptiones & profundiores puncturas nervosarum & tendinosarum partium; alii causam magis *immaterialem* respiciunt, v. g. hæreditariam dispositionem, commotiones animi turbulentiores, præcipue iram, terrorem, amorem vesanum, impressiones ideales per veneficia & philtrea.
- 4 Alii servant adhuc aliquam cum causarum prædictarum præsentia & energia proportionem; alii neglectis his incitamentis materialibus & occasionalibus in frivolam quasi assuetudinem & proterviā abeunt.

#### III. Signa.

- 1 Cognoscuntur spasmi simpliciores completi ex partis alias mobilis obrigescentia, sive rigida membri tensione, ita ut ne voluntatis propriæ imperio, nec partium reliquarum sanarum ministerio, nec adstantium auxilio sine violentia & dolore flecti queat.
- 2 Motus vero Convulsivi ex reciprocis partis alicujus vel totius corporis agitationibus violentis & repentinis præter voluntatem, imo sæpe citra reminiscen-tiam, continguntibus.
- 3 Concurrent in posteriori casu sæpissime torsiones oculorum & labiorum, sensuum abolitio, casus repentinus, spumæ ex ore effluxus, pollicum in pugnum retractio, non raro Urinæ vel seminis involuntaria emissio, dentium quoque frequens & vehemens collisio.
- 4 Subsequuntur hæc vertiginosa capitis pathemata, insignis corporis lassitudo, siticulositas, sudor graveolens.

#### IV. Subjctum.

- 1 Morbis spasifico-convulsivis præcipue obnoxii sunt Plethorici & qui insigni crassitie Sanguinis laborant.
- 2 Impeditiorem secretionum & excretionum consuetarum successum habentes.
- 3 In retropulsiones excretionum scabiosarum & ulcerosarum per incongruam medicationem incidentes.
- 4 Qui in primis viis saburram verminosam contentam habent.
- 5 Repletiores, pulmones materia valde tenaci obfesos possidentes.



- 6 Animi pathematibus, præcipue terrori, iræ, amoris, vehementer obnoxii.
- 7 Hæreditariam dispositionem a parentibus habentes.
- 8 Infantes magisquam adulti, fœminæquam mares.

## V. Prognosis.

- 1 A spasms ad motus convulsivos facilis est transitus.
- 2 Motus spastico-convulsivi symptomatici semper magis periculi inferunt, quam idiopathici.
- 3 Sunt tamen hi recuribus magis obnoxii, ita ut facile in consuetudinem abeant.
- 4 Qui in morbis acutis contingunt in ipso principio non tam periculosi sunt ac illi, qui circa statum & declinationem sese repræsentant.
- 5 Periculosiores quoque sunt in adultis, quam infantibus; in maribus, quam fœminis.
- 6 Motibus convulsivis assueti, si morbo alio correpti eosdem experiantur, non tantum inde metuendum habent ac illi, quibus insolite ita contingunt.

## VI. Remedia.

- 1 Causas materiales removentia: Venæ sectiones, scarificationes, Hirudinum applicationes, Vomitoria, Purgantia, Clysteres &c.
- 2 Sanguinis spissitudinem resolventia & humorum dyscrasiam corrigentia: anticatarrhalia, Tincturæ alcalinæ, Essentia Succini &c.
- 3 Motus temperantia & sistentia: Cinnabarina, Nitrofa, Lumbrici terrestres, Essent. dulc. Pulv. Ores &c.

## Formulæ Remediorum.

## 1 Pulvis emeticus.

R. Auri fulmin. gr. j.      nondum supergresso, propinanda.  
Arcan. dupl. g. v.  
Ms. pro dosi infanti, annum

## 2 Alius.

R. Tart. emet. gr. iij.      Ms. F. Pulvis adulto ordinandus pro j. vice.  
Cinnabaris ℥ij gr. ij.

## 3 Pilulæ laxantes Mercuriales.

R. Extract. Panch. Croll.      ℥ij dulc. rit. par. ā. gr. vij.  
gr. XV.      C. Elix. propr. Parac. f. Pil.  
Extract. Helleb. nigr.      No. XIX. proj. vice.

## 4 Pulvis antepilepticus.

R. Cord. talp. exiccat. No.      Visc. quern. ā. ℥ss.  
IV.      Ms. f. Pulv. pro adulto gr. XV.  
Cran. Human.      ante paroxysmum  
Talor. lepor.      exhibenda cum somni,  
Lumbric. terrestr. ā. ℥j.      etiamsi non parum urgeat, interpellatione.

## 5 Alius.

R. Bilis Canis atr. quantum ex cane mediocri haberi potest, misce cum unicornu fossilis ℥ss. f. Pulvis, div. in 4. part.

## 6 Potio.

R. Δ fl. til.      Specif. cephal. Mich. ℥ss.  
tunic.      Liq. C. C. succin. ℥j.  
ceras. nigr. ā. ℥j.      Syr. pæon. ℥ss.  
epilept. Lang. ℥ss.      Ms. D. singulis 2. vel 3. horis cochl. ii.

## 7 Alia.

R. Δ fl. til. ℥j.      Ms. pro tribus dosibus.  
Dissolv. Sal Succin. vol. ℥j.

## 8 Alia.

R. Δ pæon. ℥ij.      cata ℥ss. M.  
Secundin. mulier. vino      Versus novilunium usurpanda.  
lota & in furno exsiccata.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Ubi materialis causa subest, hujus correctioni l. sublationi ante omnia animus intendatur; adeoque in motibus epilepticis, qui a cruditatibus primarum viarum, vermibus, crusta lactea, achoribus s. scabie retro pulsis, menibus dependent, vel cum his colludunt, primarum viarum evacuatio, etiam paulo fortior, aut repetita, reliquæ curæ præmittatur vel interponatur.
- 2 Evacuationem quoque Sanguinis, si malum e Plethora vel suppressione fluxuum consuetorum origi-

ginem habet, institui necesse est, quamquidem aliqui specificè in pedum digitis majoribus celebrant.

- 3 Hisce præmissis, specifica subjungantur & quidem versus ipsos Paroxysmos exhibenda, respiciendo semper ad phases Lunæ insigniores.

- 4 Motus convulsivi symptomatici, febribus supervenientes directe non oppugnentur, imprimis per Opiata, sed reliquus febris decursus & successus legitimus omni modo promoveatur, poterunt tunc ▽ diapnoicæ, Emulsiones, Cinnabarina sufficere.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Specifica ante præmissa universalialia parum ordinarie efficiunt.
- 2 Nunquam etiam ad motus saltem sistendos dirigatur intentio.
- 3 Neque etiam materias, fortioribus præsertim medicamentis, aggredi tentemus, ubi nullæ tales præsto sunt.
- 4 Minime vero oppugnetur paroxysmi convulsivi per opiatâ, sed vel per sublationem materiæ morbificæ vel congruam exhibitionem specificorum.
- 5 Cinnabarina non semper expectationi satisfaciunt, in symptomatice tamen convulsivis motibus & spasticis restrictionibus ac congestionibus quandoque aliquid præstant.
- 6 Violentæ ereptiones pollicum, aliæque interpellationes paroxysmorum per odora penetrantiora, insignem post paroxysmum defatigationem aut promptiorem & frequentiore ejusdem recursum causari solent.

## CAPUT SECUNDUM.

## DE

## Spasms.

I. Definitio. Spasmus est exacerbatio motus tonici in partibus potissimum musculosis occurrens, gravissimos dolores quasi ruptorios cum rigiditate in parte affecta produciens.

## II. Differentia.

- 1 Dividitur spasmus in Universalem, qui sub se comprehendit
  - a Tetanum, qui obrigescentiam totius corporis denotat, ita quidem, ut in situ recto immoti jaceant prehensi.
  - b Emprosthotonum, per quem similis corporis rigor indigitatur, cum ea tamen differentia, ut in hoc corpus antrosum incurvetur & genua caput versus inclinentur.
  - c Opisthotonum, in quo contrarius corporis situs observatur & tanta posteriora versus incurvatio contingit, ut homo gracilior facile sub dorso perrepere possit.
  - d Catalepsi, quæ fortissimum & maxime repentinum corporis rigorem ob oculos ponit, per quem Patientes in eo statu, quem tenent, subitoprehenduntur, ita, ut deinde durante paroxysmo eandem staturam, quoad omnia corporis membra, firmiter conservare cogantur.
- 2 Particularem, qui sub se habet plures species, in variis corporis locis occurrentes:

- a In Capite 1 Spasmus Cynicus, per quem tortura oris, ad instar canis ringentis formata & per plures horas continuans intelligitur. 2 Risum Sardonium, qui similem spasmus, patientes vero simul delirantes sistit, quod Spasmus Cynicus haud facit.
- b In occipite Spasticum illum affectum, sexui præcipue fœminino, affectibus rheumaticis aut hemcranico-arthriticis pathematibus divexato, familiarem, ubi muscoli erectioni capitis inservientes ita firmiter tenduntur, ut non tantum caput libere circumflecti nequeat, sed etiam sensum quandam, musculos tensione quadam afficientem, distincte sæpius percipiat.



- c In *Collo* affectum illum tensivum, qui dormientibus, in malo capitis situ constitutis obtingit, ubi, postquam evigilarunt, aliquali impotentia caput flectendi afficiuntur.
- d In *Oesophago* atque *Ventriculo* spasticos exquisitos conatus, imo rigores, per quos libera deglutitio impeditur, ita ut non tantum nihil amplius admittat *Ventriculus*, sed & quandoque ægre, quod jam recepit, ferat, imo maximas sæpius angustias & anxietates Patientibus causetur.
- e In *Intestinis* spasticas atque rigidastensiones, sub colicis doloribus sæpissime occurrentes, per quas intestinum præcipue colon tam graviter quandoque afficitur, ut Patientes non tantum constringentem & tendentem illum sensum exquisite percipiant, sed & sæpius post mortem firmissimas intestini coli stricturas clare exhibeant, imo extendit sese hæc stringendi libertas in colicis exquisitis doloribus ad sphincteris usque ani confinia, ibique aditum ita firmiter obsidet, ut Clysteris applicationi vix locus sæpius concedatur.
- f In *Pene Priapismo*, per quem tensio penis dolorifica & violenta intelligitur, a Satyriasi, quæ in procaci erectione ad leves Venereas phantasias consistit, differens.
- g In *Vesica* & præcipue ejus *Sphinctere* spasticas stricturas, quæ in stranguria, calculi renum & vesicæ paroxymis aperte satis sese sistunt.
- h In *pedibus, brachiis, cruribus* spasticos illos rigores atque tensiones sub dolorum & affectuum arthritico Podagricorum schemate & classe notas: quibus adhuc annumerandus est repentinus ille spasmus, flatulentus alias dictus, qui muscolum celeriter contrahit, eundemque per aliquot tempus in rigore detinet.
- 3 Differunt Spasmi inter se, dum alii sunt *fibrillares*, alii *musculares*.
- a *Fibrillares* sunt, qui portionem tantum musculi & quidem paucas & singulas ejusdem fibras occupant; eandemque vibrili sensu graviter & pertinaciter exercent. Occurrunt tales in omni generis arthriticis doloribus & abeunt tandem in spasmus completum, totum muscolum cum vicinis occupantem & eo ipso exquisitam illi doloris sensum, qui antea in paucis fibris subsistebat, distribuentem & fere auferentem.
- b *Musculares* sunt; qui totum magis muscolum afficiunt, liberum humorum transitum excludunt, vasa inflant, & humores ad certa loca dirigunt.
- 4 Spasmi a *Convulsionibus* differunt ratione vehementiæ, durationis & prognoseos: hæc quippe sunt magis vehementes, instabiles, latius vagantes, periculosæ: illi vero lenti, statarii, immanentes, & in se minus periculosi.

## III. Signa.

Hæc ex præcedentibus peti possunt.

## IV. Subjectum.

- 1 Spasmi expositi præcipue sunt homines habitus corporis porosioris.
- 2 Ab arthriticis prognati & hæreditariam dispositionem possidentes.
- 3 Baccho & Veneri indulgentes.
- 4 Iracundiæ dediti.
- 5 Rheumatismis variis vexati.
- 6 Adulti & ætatis provectioris homines, præ Junioribus.
- 7 Qui Vomitoria & Purgantia drastica assumserunt.
- 8 Experiuntur etiam spasmos graviter vulnerati, nec non qui febribus acutis periculose decumbunt.

## V. Prognosis.

- 1 Omnes Spasmi a Natura ob certum quendam obtinendum finem instituuntur, sed rarius potitur suo scopo Natura.
- 2 Affequentur vero universales spasmi certiore & evidentiore suum effectum, cui destinati sunt, quam particulares.
- 3 Universales, quo vehementius instruuntur & pertinacius continuant, eo magis proni sunt ad inflammationes internas.

- 4 Partiales, si impetuose & vehementer, diuturnis vel brevioribus contentionibus fiunt, vergunt ad Convulsionem & hoc eo certius, quo partes, quas occupant, sunt nobiliores.
- 5 Particulares testantur de Conamine Naturæ incompleto, qui, datis occasionibus, facillime majora incommoda post se trahere possunt.
- 6 Acutis morbis & vulneribus, præcipue Cerebri, qui superveniunt spasmi, sunt maxime periculosi & facile Convulsionem lethalem post se trahunt.
- 7 Juniores, si spasmos simpliciores frequentius & pertinacius experiuntur, augescente ætate in arthriticos affectus devolvuntur & effectus illos spasticos majori vi sentire solent.
- 8 Senes gravioribus Spasmodis alias non assueti, correpti, facile in Apoplexiam, Paralyseos & catarrhum suffocativum incidunt.
- 9 Spasmi simplices, Plethoricis alias sanis rarius evenientes, plerumque sunt innoxii.
- 10 Spasmus Cynicus facile abit in Convulsionem & est plerumque lethiferi eventus.
- 11 Priapismus Veneris usum non adjuvat, ut satyriasis, sed potius eundem tollit.

## VI. Remedia.

- 1 Sordes primarum viarum aliarumque partium eliminantia: Helleborus niger, folia Sennæ, radix Jalappæ, Specificum Jalappinum, Trochisc. alhand. Vomitoria: Tart. emeticus, Vitriolum album, syrupus emeticus.
- 2 Sanguinem abundantem immediate evacuantia: Venæsectiones Scarificationes, Hirudines.
- 3 Partium stricturam demulcentia & imminuentia: Nitrosa, absorbentia, Cinnabarina, diluentia, gelatinosa, emulsiva.
- 4 Sanguinis spissitudinem tollentia, diuretica & incidentia mitiora: Rad. Vincetox. Valerian. Pimpinell. alb. Helen. Dictamn. alb. Essent. alexiph. Stahl. Tinctur. & Tartarifat. Tartari.
- 5 Partes affectas roborant, iisdem specificis succurrunt lenia nervina: Succinum, ejusdemque Essentia, Pæonia, Melissa, Betonica, Salvia, ungula Alcis & annuli ex eadem, nec non cornu rupicapræ, & Mercurio coagulato parati, Lumbrici denique Terrestres & dens Hippopotami.

## Formula Remediorum.

## I Nodulus Laxativus.

Rx. Rad. Valerian.	Stæchad. Arab. an. p. j.
Pæonia,	Fol. Senn. f. st. ʒi ss.
Polypod. querc. ā.	Fibr. Helleb. nigr. ʒss.
ʒss.	Crystall. Tartar. ʒiij.
Herb. Meliss.	Incis. contus. infund. in Vin.
Beton.	alb. ʒiij. & ∇ f. ʒj.
Salv. ā. Mss.	Dof. ʒvi. vii. alternis diebus.
Fl. Lil. convall.	

## 4 Pilulæ laxantes.

Rx. Mass. pil. e Succin. Grat.	c. Tinct. ʒi f. l. a Pil. No.
gr. xv.	XIX. Consperf. pulv. li-
Extract. Helleb. nig. ʒss.	quir. d. pro una vice.
Trochisc. alhand. gr. ii.	

## 3 Pulvis emeticus.

Rx. Spccif. Jalappin. ʒss.	Sal polychr. gr. iij.
Tartar. emet. gr. iiss.	Ms. D. pro una vice.

## 4 Alius.

Rx. Sal Vitriolat. alb. ʒss.	S. pro una vice.
------------------------------	------------------

## 5 Potiuncula Vomitoria.

Rx. Syr. emet. ʒvj.	∇ pæon. ʒj.
Salabsinth. gr. iv.	Ms. pro una vice.

## 6 Pulvis nervino-temperans.

Rx. Oc. ʒ. ppt. ʒi ss.	Cinnabaris ʒi ʒss.
Succin. ppt.	Ms. f. Pulv. Dof. ʒj. bis
Nitr. depurat. an. ʒj.	ter per diem.
Lumbr. Terrest. ppt. ʒij.	

## 7 Alius.

Rx. Conch. ppt.	Nitr. depurat. a. ʒj.
Rad. pæon. an. ʒi ss.	Spec. de Hyac. ʒss.
Ungul. alc.	Ms. f. Pulv. D. ut antea.



## § Essentia diuretico-nervina.

R. Tinct.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Tartari  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Ms. Dos. gutt. 30.  $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$ . bis  
Essent. Succin.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . per diem.

## 9 Alia.

R. Tinct. Tartari  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Ms. Dos. gutt. 25. bis per  
Essent. dul. Hallen.  $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$ . diem.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 In omni Spasmo observandum est, an affectus idio-  
pathice evenerit & totum corpus occupaverit, an  
vero sympathice aliis morbis accesserit, hancque  
tantum l. illam partem corripuerit.
- 2 In priori casu conveniunt in Paroxysmo diluentia,  
spasmos demulcentia, Gelatinosa, Nitrosa & Emul-  
siva.
- 3 Interponenda & conjungenda simul sunt, quæ fibras  
roborant & æqualem partibus tōtū conciliant.  
nervina nimirum selectiora, Cinnabarina & speci-  
fica varia.
- 4 Extra Paroxysmum suadendæ sunt Ventilationes  
Sanguinis, inprimis Plethoricis, aut per Venæse-  
ctiones aut Scarificationes aut Hirudines & inter-  
pellato hæmorrhoidum negotio instituendæ.
- 5 Subjungantur Cathartica aut, circumstantiis hocce  
suadentibus, Vomitoria, pro sordibus præcipue pri-  
marum viarum eliminandis.
- 6 Ratio tunc habeatur ipsius sanguinis craseos, ut in  
justam & legitimam suam redigatur qualitatem.
- 7 Ipsi vero paroxysmi obviam eatur per roboran-  
tia specifica, Tincturam item nervino-diureticam  
Stahlii, nec non Essentiam dulcem velut Paroxys-  
mos usurpandam.
- 8 In malo autem sympathico intentio primaria diri-  
gatur ad ipsius morbi originem, jungantur & inter-  
ponantur reliquis remediis specifica roborantia.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Motus spastici difficilius specificis compescuntur,  
quam Convulsivi.
- 2 Si effectum sensibilem exerere debent, plerumque  
opus est præmissione remediorum generalium.
- 3 Annuli antispastici quandoque effectum sensibilem  
edidere, a pluribus autem incassum adhibiti fuere.
- 4 A quibusdam annuli e catena patibuli commen-  
dantur, a quibus tamen parum emolumenti spe-  
rare licet.
- 5 Cinnabaris apud juniores & sensibiliores effectum  
edit egregium: omne tamen negotium haud exhau-  
rit & non ubique veram specificam efficaciam e-  
xerit.
- 6 Salia volatilia cum Tincturis diureticis commixta  
& versus Paroxysmos propinata in sensibilibioribus  
etiam aliquid effectus digni operantur.
- 7 Catalepsin ab Essentia dulci curatam fuisse novi-  
mus.
- 8 Quid oleum animale Dippelii hic possit, experien-  
tiæ committendum.

## CAPUT TERTIUM.

## DE

## Asthmate Spastico s. Convulsivo.

I. *Definitio.* Asthma Spasticum est spastica musculo-  
rum thoracis constrictio respiratio-  
nem maxime impeditam reddens.

II. *Differentia.*

- 1 Ab *Asthmate humido*: hoc a defectu Naturæ, mo-  
tusque tonici dependet, & feri vitii originem  
suam debet; Asthma vero Spasticum activitatem  
Naturæ pro causa formali agnoscit & plerumque  
ob Sanguinem in quantitatem peccantem insti-  
tuitur.
- 2 Ab *Asthmate sicco*, quod similiter defectum motus  
tonici conjunctum habet, a vitii tamen Sanguinis  
magis quam feri originem trahit;
- 3 Ab *Catarrho suffocativo*, ubi non tantum paraly-  
todes pulmonum & thoracis flaccescentia occurrit,

sed & vesiculæ pulmonum a materia seroso-mucosa  
opplentur.

- 4 Ab *Incubo*: hic malum transitorium est, dormien-  
tibus tantum contingit & maxime impeditam re-  
spirationem conjunctam habet; Asthma vero spa-  
sticum malum magis est pertinax, vigilantes ag-  
greditur & liberiores respirationem patientibus  
concedit.

III. *Signa.*

- 1 Asthma spasticum repente invadit, cum oppressio-  
ne totius thoracis.
- 2 Subsequitur impedita & brevis respiratio, cum  
membrorum & totius fere corporis insigni lassitu-  
dine.
- 3 Vasa temporum inflantur, facies rubescit, interne  
vero in Capite vertiginosi quid sæpius sentitur.
- 4 Concurrit non raro palpitatio cordis, nec non spa-  
stica constrictio circa scapulas.
- 5 Alvus ut plurimum est adstricta, Urina vero in mi-  
nori copia fluit.
- 6 Durat sic malum per aliquot horas, sæpius tamen  
recurrat & certas format periodos.

IV. *Subjectum.*

- 1 Plethorici, otiosi, evacuationes sanguinis artificiales  
& præcipue scarificationes, quibus assueti fuere,  
negligentes.
- 2 Fœminæ mensium suppressione l. imminutione la-  
borantes.
- 3 Hæmorrhoidarii male tractati, l. ataxias fluxus  
aliunde experti.
- 4 Adulti, præ junioribus & adolescentibus.
- 5 Podagrici denique l. rheumatici per repellentia tra-  
ctati.

V. *Prognosis.*

- 1 Asthma Spasticum præ reliquis asthmatis speciebus  
periculosum est, ob recursus paroxysantes, quos  
facile format.
- 2 Pueris & adolescentibus si accidat, peioris est præ-  
sagii, cum plerumque in hoc casu cum aliis sit con-  
junctum morbis.
- 3 Quo majori impetu & vehementiori invadit, eo  
periculosius esse & brevi quandoque jugulare solet  
ægrōtos.
- 4 Quo breviores sunt paroxysmi, eo frequentius com-  
muniter recurrunt.
- 5 In juniore ætate sæpius post se trahit morbos acu-  
tos & hæmoptysin, senioribus vero minatur Pa-  
ralyses Hemiplexias & Apoplexias.
- 6 Asthmate convulsivo laborantes, si corpulenti ni-  
mum sint, in Hydropem pectoris incidunt, longis  
enim pulmonum successibus rumpuntur eorum  
vasa lymphatica: hinc hydrops *Bagliv.*
- 7 Tales asthmatici melius manent ætate, quam hye-  
me. Idem.

VI. *Remedia.*

- 1 Constrictionem spasmodicam relaxantia: absorben-  
tia, Nitrosa, Gelatinosa, Emulsiva, Infusa diluen-  
tia ex Herb. Helet. Terrestr. Veron. Scabios. Fl.  
Pap. rh. Violar. Rosar.
- 2 Sanguinem versus pectus congestum derivantia: Cly-  
steres aliquantum aciores & stimulant.
- 3 Eundem abundantem evacuantia; Venæsectiones,  
in brachio l. pede instituendæ.
- 4 Febriculam, si quæ concurrit, tollentia: diaphore-  
tica fixa, cum supra nominatis absorbentibus &  
Nitratis commiscenda, nec non lenia alexipharma-  
ca: Essent. Alexiph. Stahlii, Mixture simplex.
- 5 Externa discutientia & partem roborantia: Cam-  
phorata, frictiones cum panno calido instituendæ,  
Suffimigia ex Gummi-resinis, Sacculi ex tempera-  
tis roborantibus.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis temperans & diaphoreticus.

R. Oc.  $\mathfrak{ss}$ . ppt.  
Nitr. depurat.  
Tartar. Vitriol.

$\mathfrak{z}\text{ij}$  diaph.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}\text{j}$ .  
Ms. f. Pulv. D.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . ter l.  
4. per diem.

Alius



## 2 Alius.

R. *Conch. ppr.* Arcan. dupl. ā. ʒj.  
*Bezoard. mineral.* Cinnabaris ʒij. ʒj.  
*Nitr. depurat.* Ms. D. ut antea.  
 3 Potio pectoralis & discutiens.  
 R. ▽ *Heder. Terrestr.* Syr. fl. bellid. ʒss.  
*Veron.* Ms. D. ad Vitr.  
*Tussilag. ā. ʒss.* Per binas l. trinas horas co-  
*Oc. ʒss. ppt.* chleatim porrigenda.  
 ʒij. diaph. ā. ʒss.

## 4 Infusum.

R. *Herb. Tussilag.* Violar.  
*Heder. Terrestr.* Pap. rh. ā. p. ii.  
*Veron. ā. Mj.* Incis. instar. herbe Thee in-  
*Fl. Scabios.* fund.

## 5 Clyster acrior.

R. *Decoct. Spec. emoll. pro* Sal Gemm. ʒj.  
*Clyst. ʒix.* Add. ʘ ʘ Verbasc. ʒvj.  
*Dissolv. Elect. lenit. ʒj.* M.  
*Extract. helleb. nig.* f. Clyst. applicetur cali-  
 ʒss. de.

## 6 Alius.

R. *Urin. Sani alicujus ʒviij.* rosat. ʒj.  
*in qua dissolv. Mel.* Injiciatur calide.

## 7 Potio laxans.

R. *Fol. Senn. f. ʒss.* In Colat. ʒiij.  
*Crem. Tartar. ʒss.* Dissolv. Mann. Calab. ʒss.  
*Coq. in f. q. ▽ f.* pro una vice.

## 8 Mixtura Tonico-nervina.

R. *Tinct. ʒij. Tartaris. ʒij.* D. 25. ad 30. gutt. bis per  
*Essent. Succin. ʒj.* diem versus paroxys-  
*Spir. C. C. ʒss. M.* mum.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Derivatio humorum versus partes inferiores tente-  
tur per injectionem Clysteris alicujus acrioris.
- 2 Pro eodem scopo instituatur Venæsectio l. in brachio  
l. in pede, & quidem in largiori quantitate, in pri-  
mis si Plethora concurrat.
- 3 Interne ordinentur discutientia, absorbentia, Ni-  
trata & diluentia, quæ alternis vicibus usurpari  
possunt.
- 4 Externe applicetur S. Vini Camphoratus discutiendi  
scopo, instituendo desuper perfumationes ex gumma-  
tibus & nervinis.
- 5 Extra paroxysmum derivandi scopo instituuntur le-  
nes laxationes per intervalla repetendæ, nec non  
Venæsectiones in pede, verno & autumnali præci-  
pue tempore in usum vocandæ, pro quo scopo adim-  
plendo pediluvia quoque inserviunt.
- 6 Versus metuendos vero novos insultus usurpetur  
mixtura tonico-nervina in infuso quodam pectorali.
- 7 Ubique etiam ratio habeatur evacuationum Sangu-  
inis spontanearum, mensium nimirum & hæmorrhoi-  
dum, ut ad consuetas reducantur leges.

## VIII. Cautela Prædictæ

- 1 Si ab hæmorrhoidum l. mensium suppressione origi-  
nem suam habet malum, præstat in Paroxysmo Ve-  
næsectionem in pede potius, quam brachio, insti-  
tuere, in primis si necessitas non admodum urgeat.
- 2 In necessitatis vero casu largior evacuatio in bra-  
chio est instituenda l. si minor jam facta fuerit,  
paulo post repetere eandem convenit.
- 3 Ubi malum est initius, præservative potius quam  
curative Venæsectio administretur, cum alias facile  
Natura huic evacuationi assuescat & in novo pa-  
roxysmo eandem medelam expetat.
- 4 Vomitoria nullum usum habent, nisi primarum  
viarum saburra malum foveat, in quo casu lene  
Vomitorium permittitur.
- 5 Salia Volatilia in largiori quantitate exhibita ma-  
xime sunt periculosa, in minori vero quantitate ver-  
sus paroxysmos l. in fine eorundem propinata egre-  
gii quandoque sunt usus.
- 6 Purgantia fortiora minus conveniunt, usum vero  
habent lenientia.
- 7 Anodyna, nisi necessitas hoc suadeat, haud exhi-  
beantur, & in hoc casu, non aliter quam in mi-  
nori quantitate.
- 8 Expectorantibus in hoc affectu opus haud est, cum

sanguinis potius quam muci rationem habere con-  
veniat.

- 9 Diaphoretica in primis calidiora insigne damnum  
afferunt, paroxysmum & fortiolem & pertinacio-  
rem plerumque reddendo, usum vero habent diap-  
noica leniora.

## CAPUT QUARTUM.

## D E

*Incubo f. Ephialte.*

- I. *Definitio.* Incubus est spasmodica thoracis constri-  
ctio, dormientibus nocturno tempore ob-  
tingens & tali gradu respirationem intercipiens, ut  
suffocationem sibi imminere metuant correpti cum  
sensu ponderis gravioris pectori incumbentis.

## II. Differentia.

- 1 Ab *Astmate Convulsivo*, Vid. Tab. præced.
- 2 A *Catarrho suffocativo*: in hoc paralytodes pulmo-  
num status concurret; in *Incubo* activum Naturæ  
conamen viget: hic malum est transitorium & mox  
sanitas pristina restituitur; ille vero l. pertinax est  
& diutius durat, quam Incubus, vel brevi tem-  
pore vitam finit.
- 3 Ratione *durationis* in aliis diutius durat, in aliis  
brevius.
- 4 Ratione *recursus*, alios rarius, alios vero frequen-  
tius invadit.

## III. Signa.

- 1 Invadit homines nocturno tempore sub somno,  
cum sensu gravis alicujus ponderis pectori incum-  
bentis.
- 2 Intercipitur respiratio & admodum anxia redditur.
- 3 Vocis etiam usus maximopere læditur, ut, etiamsi  
loqui aut clamare summo nisu contendant, illud  
tamen exequi haud possint, nisi admodum indistin-  
cte & inarticulate.
- 4 Pari ratione cum motu corporis res se habet, cujus  
usu omnino privantur.
- 5 Oberrant vero sensibus varia phantasmata, quæ ve-  
re se conspiciere & a quibus injurias se pati autu-  
mant, evitaturi eorundem insidias per motum cor-  
poris spontaneum, qui tamen iisdem denegatur.
- 6 Solvitur vero totum malum, si unica tantum cor-  
poris pars motum acquirit & somnus plenarie di-  
scutitur.
- 7 Remanet autem satis notabilis lassitudo per aliquot  
adhuc horas continuans.

## IV. Subjctum.

- 1 Expositi huic malo sunt plethorici, spissitudine san-  
guinis affecti.
- 2 Hypochondriaci & hystericæ.
- 3 Qui in cœna crudioribus & dyspeptis cibis stoma-  
chum onerant.
- 4 Imprimis qui tempore autumnali mustum & casta-  
neas in copia assumunt.
- 5 In dorso cubantes.

## V. Prognosis.

- 1 In junioribus si rarius evenit, nil mali portendit:  
cito enim fit & cito perit, absque subsequentibus  
incommodis.
- 2 In Senioribus vero, si frequenter occurrit, Apo-  
plexiæ subsequituræ metum affert.
- 3 Si sanguinis quantitas cum spissitudine conjuncta &  
supinus corporis situs in causa est, non liberi pror-  
sus ab eodem evadunt, nisi utrumque corrigatur.

## VI. Remedia.

- 1 Sanguinem abundantem imminuentia: Venæsectio,  
Scarificatio.
- 1 Ventriculum a cruditatibus liberantia: lenia Vo-  
mitoria, Ipecacuanna, Tartarus empticus & sy-  
rupus emeticus, in minori dosi propinata, nec non  
laxantia: Sal Catharticum amarum, Rhabarba-  
rum electum, Fol. Sennæ, Pil. Beccheri l. Stablia-  
næ veræ.



## CAPUT QUINTUM.

DE

## Colica Convulsiva.

- 3 Digestionem promouentia & sanguinem spissum simul resolventia, Salia media: Tartarus Vitriolatus, Arcan. duplicatum, Sal polychr. Glaferi, Crystall. Tartari & Vegetabilia amara: Rad. Ari. Pimpin. alb. Calam. aromat. Herb. Absinth. Cent. min. Fumar. Card. bened. Cort. Orum, Citri, Sem. Coriandr. Anis. Fœnic.
- 4 Stomachum & viscera infimi Ventris roborantia, Martialia tenuiora: Croc. Stis Stahlî, Zwelfferi, Tinct. Vitrioli Stis Ludov. cum pomis Borsdorff.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis Emeticus.

R. Rad. Ipecac. ℥j. D. pro una vice.  
Salis absinth. gr. vj. M.

## 2 Alius.

R. Rhabarb. elect. gr. XV. Sal card. bened. gr. v.  
Tart. emet. gr. ij. M. D. ut antea.

## 3 Sal Laxans.

R. Sal Cathart. amar. ℥j. vendum & unica vice  
In jussculo calido dissol- sumendum.

## 4 Potio laxans.

R. Rhabarb. elect. ℥ij. Mane post coctionem dissolv.  
Fl. cent. min. p. j. In Colat. ℥ij.  
Crem. Tart. ℥j. Mann. elect. ℥vj  
Infund. in f. q. v. f. pro una vice.

## 5 Pulvis digestivo-stomachicus.

R. Rhabarb. elect. ℥j. M.  
Tartar. Vitriol. ā. ℥ij. D. ij. cultri cuspides ver-  
Oc. ℥. ppt. sus prandium & cœ-  
Flaved. Cort. Orum, nam.  
Herb. Card. bened. ā.

## 6 Alia.

R. Pulv. Stomach. Birck- Fl. cent. min. ā. ℥j. M.  
mann. ℥ss. D. ut antea.  
Tartar. Vitriol.

## 7 Tinctura Tonica.

R. Tinct. Vitrioli Stis M.  
Lud. ℥ij. Dos. gutt. XXX. versus  
Essent. Cort. Orum ℥j. prandium & cœnam.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Si Sanguis quantitate peccat, quod facile ex reliquis circumstantiis augurari licet, per Venæsectionem l. Scarificationes imminuendus est.
- 2 Ubi vero malum in primis viis hæret, & cruditates in Stomacho hærent, ibi l. lene Vomitorium in robustioribus, l. blandum aliquod laxans in debilio-ribus locum habet.
- 3 Subjungantur Stomachica & digestiva versus pran-dium præcipue & cœnam usurpanda.
- 4 Colophonis vero loco Alia, cum amaris maritan-da, in usum trahantur.
- 5 Ubi Sanguinis insignis spissitudo in causa est, ma-lumque l. hypochondriacum l. hysterikum concur-rit, ibi præcipue eo respiciendum, ut Sanguis ma-gis fluxilis reddatur, & morbo primario medela afferatur, e suis locis petenda.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 2 Nisi frequenter hoc malum occurrat, vix opus est medicatione & Medici auxilio.
- 2 Cum decubitus in tergo multum faciat ad invitan-dum hocce malum, situs hic mutetur, & in late-ribus requies petatur.
- 3 Ubi pathemata hypochondriaco-hysterica concur-runt, ibi Vomitoria locum haud habent, sed per-agenda res est lenibus laxantibus & attenuantibus.
- 4 Diæta etiam in cœnis tenuior & levior observe-tur.

I. *Definitio.* Colica Convulsiva est insignis spastica in-testinorum torsio & contractio cum a-cutissimo eorundem dolore conjuncta.

II. *Differentia.*

Quomodo ab aliis speciebus Colicæ differat supra Tab. de Colica videre est.

III. *Signa.*

- 1 Sentiant summos cruciatus in abdomine.
- 2 Umbilicus modo retrahitur, modo distenditur cum abdominis portione.
- 3 Venter exinde inæqualis redditur, ita ut latera o-bliqua, muscoli vero recti introrsum retracti appa-reant.
- 4 Extendit sese hæc restrictio ad scrobiculum usque Cordis & respirationem turbat.
- 5 Intestinum colon, reliquaue intestina cum Ventri-culo, sursum versus convelluntur.
- 6 Quandoque etiam viscera abdominis cum vicinis partibus, vesica, ureteribus, testiculis in consensum trahuntur & constrictionem quandam spasticam si-mul patiuntur.

IV. *Subjectum.*

- 1 Infantes, recrementa biliosa summe acria in inte-stinis possidentes.
- 2 Fœminæ insigni gradu passionis hystericæ laboran-tes.
- 3 Nephriticis moliminibus expositi.
- 4 Scorbutici & Venerei, nec non febribus non rite liberati, methodoque perversa tractati.

V. *Prognosis.*

- 1 Infantes sæpius ex Colica Convulsiva in paroxysmos epilepticos incidunt.
- 2 Transit quandoque in adultis in Paralyfin.
- 3 In Colica pertinaci, si sudor copiosus & universa-lis superveniat, labefactatis & resolutis viribus, brevi Paralyfin expectato. *Bagliv.*
- 4 Si dolor gravissimus; nec mitigetur auxiliis, ni-hilque excernatur, vomitus autem vomitui succe-dat, ad quæ sudor frigidus mortis est periculum. *Chesneau*
- 5 Excrementa non retineri, dolorem locum mutare atque etiam intermittere, salutem promittunt. *Idem.*

VI. *Remedia.*

- 1 Ventriculum & intestina expurgantia, stricturam-que eorum inæqualem corrigentia: lenissima la-xantia ex Manna & Rhabarbaro potissimum & Clysteres Carminativo emollientes ex Chamomil-la & Veronica, addito o o anethi & Sale, pa-rati.
- 2 Sanguinis impedito motui per Venam portæ confu-lit Venæsectio in pede instituta.
- 3 Spasmos relaxant & discutiunt interne Nitrosa, ab-sorbentia, diaphoretica fixa, Cinnabarina, inter-positis Essentiis, alexipharmaca Stahlî, Pimpinellæ albæ, Tinctura Cort. Orum, Spir. Nitr. dulci. *Exter-ne* Unguentum antispasmodicum Mynsichti, Empla-strum e Galbano, Oleum Anethi, Chamom. Saccu-li ex Herb. Menth. crisp. Matricar. Chamom. Sem. Anis. Fœnic. Carvi.
- 4 Tonum partium debilitatarum roborantia: Mixtu-ra tonico-nervina Stahlî, Essent. Millefolii, Casto-rei, Liq. C. C. Succin.

## I Formula Remediorum.

## Laxans.

R. Manna Calabr. ℥jss. Sperm. Cet. ℥ss. M.  
o o amygd. d. ℥ij. Exhibeantur in jussculo.

Aa

2 Aliud.



## 2 Aliud.

R. Decoct. antisebr. ℥vj. portio, post. 2. l. 3. hora-  
Mann. Calabr. ℥iij. rum intervallum alte-  
Sal polychr. ℥ij. ra.

Sumitur primo dimidia

## 3 Pulvis temperans &amp; antispasmodicus.

R. Crystall. mont. ppt. Cinnabar. ℥ii ℥ij. M.  
℥ij. diaph. a. ℥fs. Singulis duabus vel tribus  
Nitr. depurat. horis.  
Tart. Vitriol. a. ℥j.

## 4 Potio temperans &amp; Carminativa.

R. ∇ Fœnic. ℥ij diaph. a. ℥fs.  
Chamom. a. ℥fs. Aq. Nitr. dulc. ℥j.  
Namp. ℥vj. Syr. cort. Orum ℥iij.  
Crystall. mont. ppt. D. cochleatim.

## 5 Alia.

R. ∇ fœnic. XXV.  
menth. a. ℥fs. Tab. ex o o Succt. ℥j. M.  
Liq. C. C. Succinat. gutt. D. ut antea.

## 6 Spiritus Carminativus.

R. Spir. Anis. ℥ij. Dos. gutt. 30. ter l. quater  
Nitr. dulc. ℥fs. per diem.

## 7 Unguentum.

R. Ungt. antispasmod. dest. Caru.  
Myns. ℥j. Cumin. a. ℥fs.  
o o Menth. crisp. Cer par f. Ungt. abdomini  
Chamom. a. ℥ij. inungendum.

## 8 Sacculus discutiens.

R. Herb. chamom. anis.  
menth. crisp. fœnic. a. ℥ij.  
matricar. a. Mfs. Incis. contus. includ. Sac-  
Baccar. Laur. ℥j. culo, calide imponen-  
Sem. Ca v. do.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Respiciendum est ad differentiam Causarum, secundum quam methodus est instituenda.
- 2 Ubi excrementa acria biliosa malum fovent, Clysteres abstergentes, emollientes & carminativi in usum sunt vocandi: in robustioribus autem & ubi malum non nimis vehemens est, lenia laxantia præscribi possunt.
- 3 Subjunguntur hoc in casu absorbentia, temperantia, antispasmodica & lenia Carminativa interne & externe.
- 4 Quando sanguinei quid subest, Vena secatur & quidem optime in pede.
- 5 Præscribantur tunc Nitrosa, Salia media, diaphoretica fixa & Cinnabarina, interpositis discutientibus, nec neglectis externis paregoricis.
- 6 Tandem utroque in casu tono partium est consulendum per selecta nervina, quæ etiam reliquis remediis interponi possunt.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Purgantia, nisi sint selectissima dolores exacerbare solent.
- 2 Venæsectio non locum habet, nisi malum a moliminibus Sanguinis originem habeat, in quo casu egregium quandoque effectum exerit.
- 3 Opiata parcius sunt exhibenda, solet enim eadem magnus sudor excipere & exinde Paralysis, ut Baglivius observavit.

## CAPUT SEXTUM.

## D E

## Convulsionibus.

I. *Definitio.* **C**onvulsionibus sunt repentinae, reciprocae & maxime violentæ motus tonici exacerbationes, a Natura ob rem aliquam corpori molestam l. noxiam amoliendam & expellendam, institutæ.

II. *Differentia.*

- 1 Spasmi & Convulsionibus differunt gradu, duratione & eventu: hæ vehementiores instabiles, peri-

culosiores: illi mitiores, statarii magis & minus periculosi.

- 2 Ab Epilepsia distinguuntur Convulsionibus ratione causæ & morborum complicatorum: hæ causas pleurumque fonticas & morbos conjunctos pro fundamento habent; illa vero nullam proportionem cum causa physica l. morali servat, & idiopathice absque aliis morbis affligit, propriaque sui vehementia corpus percellit.

III. *Signa.*

- 1 Musculosæ præcipue partes reciproco raptim trahente & remittente motu corripuntur.
- 2 Format hic motus breves quasi Paroxysmos, per breviora temporis intervalla tam remittendo, quam revertendo.
- 3 In invalescentibus convulsionibus partes ipsæ non solum motu sed etiam situ exagitantur.
- 4 Si convulsionibus sunt graviores ipsi quoque sensus interni obnubilantur, ita ut antea actorum non reminiscantur.
- 5 Nonnunquam etiam in principio pollices in manus retrahunt.
- 6 Ordinarie, præsertim in junioribus, oculi hinc inde torquentur magis vero versus superiora, ita ut non nisi album oculorum appareat.
- 7 Interdum in casu graviore integri artus contorquentur & diu in illo perverso situ permanent.

IV. *Subiectum.*

- 1 Plethorici & iracundi.
- 2 Insigni crassitie Sanguinis laborantes.
- 3 Infantes, quibus humores ulcerosi, seroso-lymphales retropelluntur.
- 4 Idem tussi humida, cum materia valde tenaci respirationem ad tempus interceptante, laborantes.
- 5 Idem excrementis intestinorum acris biliosis divexati.
- 6 Imprimis vero Lumbricis obnoxii.
- 7 Nec non Dentitione difficiliori laborantes.
- 8 Qui morbis exanthematicis, præprimis morbillis & variolis corripuntur, & ubi exanthemata difficilius erumpunt.
- 9 Morbis acutis periculosioribus decumbentes.

V. *Subiectum.*

- 1 Quæ extra acutos morbos oriuntur & a chronicis causis & signis dependent, nihil æquæ periculi post se trahunt ordinarie, nisi admodum sint l. vehementes l. frequentes.
- 2 Facile abeunt in Consuetudinem, præprimis ab animi pathematibus, quandoque satis levibus.
- 3 Quæ causis acutis originem debent, sortiuntur magis ancipitem eventum, quam priores.
- 4 Qui chronice tamen Convulsionibus adsueta fuerant, si in acutis iisdem corripuntur, minus periculi incurrunt, quam si a talibus semper liberi fuerunt.
- 5 Convulsionibus ab initio morbi acuti contingentes minimi sunt periculi, longe majoris, quæ exquisito statui adveniunt, simplicius vero funesti exitus, quæ declinationis Periodo accidunt.
- 6 Secundum Sydenhamii & Baglivii Observationes Infantes, Dentitione jam perfuncti variolasque nondum perpassi, si moribus Convulsivis & ardore circa lumbos corripuntur, Variolæ in procinctu sunt & postero die sunt expectandæ.
- 7 Adolescenti & adultæ ætati quæ contingunt Convulsionibus, periculosiores sunt, quam quæ Juniori.
- 8 Paroxysmi Convulsivi sæpius Phasibus Lunæ respondent.
- 9 Quo magis Consuetudini l. animi pathematibus originem debent, eo minus remediis auscultant, nisi sint vera specifica.
- 10 Symptomaticæ vero Convulsionibus nulla re efficacius edomantur, quam promotionem motuum secretoriorum & excretoriorum morbo primario debita.

VI. *Remedia.*

- 1 Excrementa Ventriculi & intestinorum, si quæ adsunt, evacuantia: Radix Ipecacuanhæ, Vitriolum album, Rhabbarbarum, syrupus cichorio c. Rhabarb. & dulcis,



- Helleborus niger, ☉ fulminans, nec non Clysteres emollientes & abstergentes.
- 2 Vermes eorumque seminium extinguunt remedia anthelmintica, de quibus suo loco.
  - 3 Materiam mucosam & tenacem pulmonum vesiculis impactam incidentia: spec. diatr. Rad. Arippt. aliaque remedia appropriata pectoralia.
  - 4 Motus secretorios & excretorios in febribus exanthematicis promoventia: diapnoica & alixipharmaca, regimenque corporis tranquillum.
  - 5 Motus ipsos convulsivos mitigantia & compescentia, nervina & specifica: Essentia dulcis Hallensis, Oleum animale Dippelii, Liq. C. C. Succinat. Lumbrici Terr. rite ppt. Rad. & Sem. Pæont. Os triquet. Cran. human. Os semilunare Carp. Talus Leporis, Spina Serpent. Pulv. epilept. niger Kuferi, Cinnabaris nat. ppt. Succinum ppt.

## Formule Remediorum.

## 1 Pulvis Emeticus.

Rx. Pulv. rad. Ipecac. ℥j. pro adulto.

## 2 Sal Emeticum.

Rx. Vitriol. alb. depurat. ℥ss. pro una vice.

## 3 Essentia antepileptica.

Rx. Essen. dulc. Hal. Ord. ℥ij postea aliquoties ad-  
Versus paroxysmum ad huc per diem conti-  
gutt. 20. propinanda, nuanda.

## 4 Oleum antepilept.

Rx. ♂ anim. Dippelii re- pro adulto, versus paro-  
tificatiss. gutt. XXX. xysmum propinandum

## 5 Pulvis antepilepticus D. Stahl.

Rx. Cord. Talp. exiccat. n. V. Lumbr. Terrestr. ℥j.  
Talor. Lepor. ℥j. Cinnabaris, si placet,  
Ungul. alc. subtil pulver. ℥ss. M.  
Cort. visc. quercin. ā. ℥ss Dos. gr. XV.

## 6 Alius D. Carl.

Rx. Conch. ppt. ℥ss. Cinnabaris nativ. ppt.  
♂ crud. Hung. ℥ij. a. ℥j. M.  
Lumbric. Terrestr. ppt. Dos. ut precedentis.

## 7 Potio Antepileptica.

Rx. ♀ pæon. Pulv. epilept. Kufer. a. ℥j  
lil. convall. Liq. C. C. succin. ℥ss.  
ceras. nigr. a. ℥j. Syr. e pæon. ℥ss. M.  
epilept. Lang. ℥vj. Dos. cochl. aliquot aliquoties  
Specif. cephal. Mich. per diem propinanda.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In Cura respiciendum est ad causas, quibus Convulsiones originem debent, secundum quarum differentiam cura diverso est instituenda modo.
- 2 In saburra igitur primarum viarum præscribantur & commendentur l. appropriata vomitoria l. lenia laxantia.
- 3 Si Scabies l. aliæ efflorescentiæ ulcerosæ retropulsæ sunt, expellentia fl. nimirum sulph anticatarrhalibus commisti, interposito ℥ii dulcis usu, usurpentur.
- 4 In pectoris vitis lymphæque visciditate eadem anticatarrhalia & discutientia, nec non lenia laxantia l. Clysteres locum habent.
- 5 Bilioæ acri intestinorum constitutioni medentur Diluentia, Lubrificantia, Absorbentia & inter ea præcipue CrySTALLUS montana ppt. nec non Clysteres abstergentes.
- 6 Vermes enecentur Mercurialibus, Myrrhatis, Sem. Santon. Corallin. aliisque.
- 7 Dentitioni difficili succurratur interne refrigerantibus & diapnoicis, externe Inunctionibus mucilaginum, incisuris Gingivarum, Clysteribus.
- 8 In Febribus exanthematicis l. aliis morbis, ubi Natura aliquid excernere molitur, excretiones promoveantur remediis appropriatis.
- 9 Ubique, quando causis primariis satisfactum est, subjungantur l. interponantur specifica antepileptica.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Remedia specifica affectum optatum haud edunt,

nisi causa primaria e medio prius sit sublata.

- 2 Vomitoria utilia sunt, ubi in primis viis materiam peccantem auguramur; si vero nulla præsto est, sed motus consuetudini l. materiis, aliis in locis peccantibus, originem debent, ab iisdem desistendum est.
- 3 Exhibenda sunt extra Paroxysmos, sicuti laxantia.
- 4 Opiata pro sistendis Convulsionibus pessimo anso in auxilium vocantur.
- 5 Pulvis epilept. March. & Specif. Ceph. Mich. absque damno propinari possunt, specificè tamen aliquid haud exerunt.
- 6 Majorem utilitatem habet ipsa Cinnabaris nativa l. ℥ij, in substantia propinata.
- 7 Liq. etiam C. C. succinatus in quibusdam egregie se gerit, vitandus tamen est ejus abusus.
- 8 Evitandæ quoque sunt pollicum ereptiones e manu l. etiam admotiones suffimentorum penetrantiorum: plerumque enim insignem virium prostrationem & promptiorem paroxysmi recursum causantur.
- 9 Ab animi Pathematibus imprimis sibi cavendum est: quia facile ab iisdem novi Paroxysmi invitantur.

## CAPUT SEPTIMUM.

## D E

## Epilepsia.

## I. Definitio.

**E**pilepsia est motus convulsivus plus minus repentinus, artus præcipue & pectus gravissime excernens, sensuumque abolitionem per totum paroxysmum post se trahens, idiopathice absque aliorum morborum concursu a Natura productus.

## II. Differentia.

- 1 Quomodo a Convulsionibus differat Capite prædictum est.
- 2 Alia est recens, alia inveterata.
- 3 Alia periodica, alia vaga.
- 4 Hereditaria alia, alia acquisita.
- 5 Alia fortis, alia levis.

## III. Signa.

- 1 Persentiscunt aliqui Paroxysmum paulo ante invasionem, frigore quodam e partibus remotis repente versus caput tendente & scintillulis oculis observantibus.
- 2 Plerique vero inopinato & repentine plus minus vehementibus corripuntur motibus convulsivis.
- 3 In quibusdam nulla insignis vis motuum observatur.
- 4 Ubi autem manus in auxilium vocantur, deprehenditur, quod contentio præsto sit contumacissima & fortissima corpus rigidum & mobile, non vero flaccidum & tranquillum servans.
- 5 Privantur statim in paroxysmi initio sensuum usu, neque eundem recuperant, donec ille sit finitus, ubi quid actum sit, ignorant.
- 6 Cadunt propterea, quam primum a paroxysmo corripuntur in terram.
- 7 Ubi peculiare & fere proprium Epilepticis est, quod manus in pugnum colligant, pollicemque fortiter eidem imprimant.
- 8 Adest præterea laboriosa respiratio.
- 9 Quidam in Paroxysmo insigniter clamant.
- 10 Junioribus solennes magis sunt Capitis exagitationes, oculorum distorsiones, & maxillarum ad stridorem usque dentium fortes commotiones.
- 11 Tam his quam adultis obtingunt motus linguæ indecentes, ut eandem exporrigant & mediante maxillarum forti motitatione & compressione vehementer lacerent.
- 12 Interim artus cum toto corpore maxime & violentius convelluntur.
- 13 Nonnullis caput in continuo est motu, ita ut illud



fortissime ad sanguinis usque effusionem terræ alidant.

- 14 Definit tandem Paroxysmus in expressionem spumæ e glandulis salivalibus & effluxum ex ore.
- 15 Specialiter in quibusdam simul claudunt paroxysmum hæmorrhagiæ narium, diarrhææ, feminis effusiones, vomitus.
- 16 Qui vomitu corripuntur, ante paroxysmum panem siccum, fecalinum potius quam triticeum, in magna quantitate devorant, eundemque semidigestum postea rejiciunt.
- 17 Finito paroxysmo nullius rei recordantur, nisi quod a violenta illa exagitatione remanentes dolores adhuc sentiant & lassitudinis proportionatum sensum servant, non aliter ac in aliis laboriosis conaminibus fieri solet.
- 18 Subsequentes Paroxysmi insigniores Lunæ phases Novilunia nimirum & Plenilunia, quandoque etiam ejusdem quadras observant & comitantur.

#### IV. Subjectum.

- 1 Qui Convulsionibus frequentioribus inprimis infantili ætate fuere correpti.
- 2 Fortiori iracundia commoti.
- 3 Terrore graviore concussi.
- 4 Veneris speculationibus nimium indulgentes.
- 5 Hæreditariam possidentes dispositionem.
- 6 Veneficiis & philtis perturbati & ligati.
- 7 Plethorici, habitu corporis poroso gaudentes.
- 8 Juniores & feminæ.

#### V. Prognosis.

- 1 Vehementior oculorum distortio non raro durabilem post se trahit Strabismus.
- 2 Quæ Caput sæpius & graviter affligit Epilepsia; stupefacit tandem sensus & rationis usum imminuit.
- 3 Epilepsia fortior juniore ætati obtingens paralyticam hujusl. illius membri impotentiam, posthac durabilem, quandoque post se trahit.
- 4 Epilepsia, quæ nocturno tempore invadit, curatu difficilior, quam quæ diurno corripit, quoniam remedia justo tempore, versus scil. Paroxysmose exhiberi nequeunt.
- 5 Quæ adultis obtingit & in consuetudinem abit, vix amplius eradicatur.
- 6 Juniores vero eadem correpti ad pubertatis annos accedentes sæpius ab eadem liberantur.
- 7 Sic etiam mutationes loci & vitæ Epilepsiam quandoque tollunt.
- 8 Habitualis Epilepsia interdum in Hæcticam lethalem degenerat.
- 9 In Epilepsia longa febris, ut quartana, pro valetudine est. *Chefneau.*
- 10 Solvitur aliquando Epilepsia septimo mense, septimo anno, primo puerperio. *Idem.*
- 11 Epilepsia, quæ parturientes corripit, non solet reverti, nec ea, quæ fit a vermibus. *Idem.*
- 12 Epilepsia uterina obedit remediis, malo Hysterico medentibus.
- 13 Quæ causis immaterialibus originem debet difficilior compescitur, quam quæ a causis materialibus ortum trahit.
- 14 Si magna vi pollicese manibus eripiuntur, impetus paroxysmi fere totus distrahitur: si vero per ipsa ejusdem initia hoc suscipimus, effectum hunc non æque assequimur.

#### VI. Remedia.

- 1 Primas vias expurgantia: Vomitoria, Vitriolum album, Tartarus emeticus, sympus emeticus; Laxantia cholagoga & melanachoga ex Rhabarbaro, Hellebore nigro.
- 2 Abundantiam sanguinis imminuentia: Venæsectiones, Scarificationes.
- 3 Lymphæ vitia corrigentia, anticatarrhalia: Essent. Succin. Pimpinell. alb. alexipharm. Stahlî, Tra. Jij Tartarifat. Tartari; Liq. C. C. succinat. Decocta lignorum diluta.
- 4 Orgasmi Sanguinis temperantia; Nitrosa; diluentia, laboriosum Vitæ genus.
- 5 Motus sedantia, specifica: Lumbrici Terrestr. in coitu mense Junio capti ante ortum Solis, Cor Tal-

pæ, Nepar & Cor Ranarum, Ostriquetrum humanum & porcinum, Talus Leporis, Os semi lunare & triangulare Lucii, ut & Carpionis, Ungula Alcis, Cranium humanum, Sanguis hominis violenta morte peremti, spiritus volatiles Urinosi omnes, Liq. C. C. succinat. radix & semen Pæon. Viscus quercinus & corylinus, Carbo Artemisiæ Spir. Vitrioli ant-epilepticus Quercetan., ☉ animale Dippellii, Essentia dulcis Hal. ordinaria & concentrata.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Sal Vomitorium.

Rx. Vitrioli alb. ʒss. *mum exhibendum.*  
pro una vice ante paroxysmum.

##### 2 Pulvis Emeticus.

Rx. Rhabarb. elect. gr. XV. Sal polychr. gr. ij. M.  
Tartar. emet. gr. iij. *pro una vice.*

##### 3 Pilulæ laxantes.

Rx. Mass. pil. e Succin. Crat. Ref. Jalapp. gr. ij.  
gr. XV. c. Tinct. Jij tartar. f. Pil.  
Extract. helleb. nigr. gr. No. XVII.  
viij. *pro una vice.*

##### 4 Essentia anticatarrhalis.

Rx. Tinct. Jij tartar. ʒij. diem extra paroxysmum  
Essent. Succin. ʒj. M. sumenda.  
Dof. gutt. 30. bis l. ter per

##### 5 Alia.

Rx. Tinct. Tartari Liq. C. C. Succin. ʒij. M.  
Essent. alexiph. Stahlî. D. ut antea.  
a. ʒjss.

##### 6 Pulvis ant-epilepticus.

Rx. Rad. Pæon. Dof. gr. XVI. vel ʒj. versus  
Lumb. Terrestr. ppt. ā. ʒij paroxysmum.  
Cinnabar. nativ. ʒj. M.

##### 7 Oleum antepilepticum.

Rx. ☉ animalis Dippellii Dof. gutt. 40. ante paroxysmum.  
rite ppti. ʒj.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Antequam ad ipsa Specifica fiat progressus, cruditates e primis viis sunt eliminandæ per appropriata Vomitoria l. purgantia.
- 2 Ubi sensibilis concurret Plethora, Venæsectio subjungenda est in pede, l. hujus loco Scarificatio.
- 3 In Sanguinis & Seminis orgasmo Diluentia, Nitrosa, Absorbentia & Cinnabarina posthac ordinanda sunt.
- 4 Quod si vero Lymphæ vitia præsto sint, adhibeantur anticatarrhalia remedia, pro temperamentorum diversitate seligenda.
- 5 In spissitudine Sanguinis Venæ portæ, Epilepsiam uterinam plerumque fovente, ordinentur resolventia & aperientia uterina.
- 6 Versus denique metuendos paroxysmos commendentur specifica.
- 7 Finito Paroxysmo clysteres locum habent, nec non lenia tonico nervina, interne propinanda.
- 8 Diæta insuper conveniens & accurata instituat per sufficientem potum & motum, cibos expeptos, excretiones spontaneas & artificiales consuevas, animique pathematum moderamen.

#### VIII. Cautela Practica.

- 1 Omnia vehementiora Purgantia & Vomitoria improbantur, quia motus plerumque exacerbant: levia vero locum & usum habent ante paroxysmum exhibenda.
- 2 Specifica, nisi versus paroxysmos propinentur, spem plerumque eluunt, etiam si sint efficacissima.
- 3 Effectus optati indicium est, si in fronte largus erumpit sudor.
- 4 Adstringentia & Narcotica pro repellendis Paroxysmis sunt insufficientia & damnum insuper secretionibus & excretionibus afferunt haud exiguum.
- 5 Oleum animale Dippellii sternutationes causatur & somnum per plures horas durantes; nisi vero sit rectificatissimum voto haud satisfacit.
- 6 Essentiam dulcem Halentem aliquoties cum fructu fuisse exhibitam novimus: in malo autem inveterato utpl. frustra propinatur.



- 7 Externa excitantia volatilia, Urinosa, aliaque fœtida naribus applicata in Epilepsia uterina non absque effectu adhibentur, imprimis si lenior sit affectus; in graviore vero malo post se trahunt cephalalgias vertiginosas, motus febriles & insignem lassitudinem.
- 8 Eadem etiam symptomata sunt metuenda, si Paroxysmi per violentam pollicum ereptionem e pugno interpellantur.
- 9 Ira, terror, Vini & Spir. Vini abusus, Venus, speculationes libidinosæ, aromata, acida paroxysmos invitant & pertinaciorum reddunt affectum.

## CAPUT SEXTUM.

## D E

## Palpitatione Cordis.

- I. *Definitio.* **P**alpitatione Cordis est motus cordis spastico-convulsivus, frequentius & fortius quam ordinarie fieri solet, a Natura institutus, ut Sanguinem nimia copia versus cor latum repellat, vel per certa loca expellat.
- II. *Differentia.*
  - 1 A Tremore Cordis non nisi gradu distinguitur, hic leviores pulsationem innuit, illa fortiores.
  - 2 Est vel *idiopathica*, per se absque aliis morbis exurgens, l. *symptomatica*, aliis morbis superveniens.
- III. *Signa.*
  - 1 Quando mitior est affectus, tunc solito tantum frequentior & fortior contingit pulsatio cordis, absque aliis concurrentibus symptomatibus.
  - 2 Ubi vero fortiori gradu sese sistit, tunc respiratio non tantum imminuitur, sed vocis etiam liber usus quandoque intercipitur.
  - 3 Concurrit in hoc casu anxietas cardialgica, cum pallore faciei & non raro sudore frigido in fronte.
  - 4 Cor vehementer pulsatur & thoracem elevat, ut non tantum ab adstantibus facile videri, sed quandoque, quanquam hoc rarius fiat, etiam audiri possit motus.
  - 5 Arteriarum quoque, præcipue carotidum, in collo occurrentium, fortior conspicitur pulsatio.
  - 6 Concurrit insignis virium prostratio.
  - 7 Interdum lipothymia accedunt.
  - 8 In quibusdam vero varia flatulenta observantur pathemata in abdomine.
  - 9 Alvus plerumque solet esse adstricta & Urina tenuis.
- IV. *Subiectum.*
  - 1 Sanguinei, Plethorici, vitæ lautæ & sedentariæ assueti, deinde insolitos & fortiores motus inconcinne instituentes.
  - 2 Fœminæ, quibus menses emanare aut obstructi sunt, l. viri, qui hæmorrhoidum suppressionem patiuntur.
  - 3 Qui evacuationes sanguinis artificiales assuefactas negligunt.
  - 4 Qui in statu plethorico balnea calidiora ingrediuntur.
  - 5 Hypochondriaci & Hysterici, sanguine spissiori gaudentes.
  - 6 Viscerum abdominis labe affecti.
  - 7 Præcipue qui Temperamento Melancholico præditi sunt.
  - 8 Qui facile a quibusvis rebus in terrorem conjiciuntur.
  - 9 Qui in juniore ætate vermibus laborant.
  - 10 Tandem, qui polypos in corde gerunt, ubi respiratio difficilis continuo conjuncta est.
  - 11 Hydrope denique pectoris laborantes.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Palpitatio cordis, quæ improvisum terrorem, motum vehementiorem immediate plerumque sequi-

- tur, malum est transitorium & rarius medelam exposcit.
- 2 Quæ vero absque talibus causis occasionalibus ex interno humorum vitio contingit, majorem attentionem meretur.
- 3 Quo fortior est palpitatione & frequentius recurrit, eo periculosior censenda.
- 4 Eadem etiam prognosis formanda, si summa spirandi difficultas, anxietas præcordialis & lipothymia concurrat.
- 5 In junioribus, si frequentius & fortius contingat, post se trahit sæpissime hæmoptyes, inflammationes, febres mali moris, interdum vero Polypos format.
- 6 Qui Polypos tales in corde gerunt, ex improvise sæpius moriuntur.
- 7 In hypochondriacis & hystericis plerumque absque periculo occurrit.
- 8 Si in his hæmorrhoides & menses ordinem suum inveniunt, malum mitigatur, quandoque etiam tollitur.
- 9 Si Vermes subsunt, non raro Convulsiones post se trahit.

VI. *Remedia.*

- 1 Primas vias expurgantia & humores ad partes inferiores invitantia, laxantia: Rhabarbarum, Senna, Helleborus niger, ejusque Extractum, Extractum panchym. Croll. & dulcis, Clysteres, Pediluvia.
- 2 Sanguinem abundantem evacuat Venæsectio, pro derivandi scopo in pede instituta.
- 3 Ebullitionem Sanguinis temperantia: Nitrata, Absorbentia, acido Citri saturata, Cinnabarina, Emulsionem, Gelatinæ, Julapia.
- 4 Sanguinis spissitudinem tollentia: Herbæ *antiscorbuticae*: Nasturtium, Cochlearia, Trifolium fibrinum, Beccabunga, Acetosella; *amaræ*: Carduus benedictus, Fumaria, Cent. min. Absinth. *alexipharmaca*: Rad. Helen. Valerian. Vincetox. Dictamn. alb. Petasit. Angel. Essent. alexiph. Stahl. Pimp. alb.
- 5 Partem affectam roborantia: Gemmata & Analeptica, spec. de Hyac. Corall. r. ppt. Syr. Corall. Conf. Alkerm. de Hyac. Condit. C. tr. Syr. Acetof. Citri, Pilulæ Wildegansii genuinæ, Essentia dulcis Halensis, Mixtura tonico-nervina Stahl. Aquæ cardiacæ; Externe Epithemata ex Herb. Melissæ, Borrag. Bugl. Fl. Rosar. Aqua Anhalt. Balsam. Embryon. cum Conf. Alkerm. l. Hyac. comm. scendæ: Balsam. Succin. o. o. dest. Citr. Orum, Angel.

## Formule Remediorum.

## 1 Potio Purgans.

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Rx. Tamarind. ʒss.     | Coq. inf. q. v. f.          |
| Rhabarb. elect. ʒj.    | Colat. ʒiv.                 |
| Fol. Senn. f. st. ʒij. | Add. Syr. epom. laxat. ʒss. |
| Crem. Tartar. ʒss.     |                             |

## 2 Pilulæ Purgantes.

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rx. Pil. Tartar. Querc. gr. xij  | Trochisc. alband. gr. ij     |
| Extract. Helleb. nig. ʒss.       | c. Tinct. Corall. f. l. a    |
| Mercurii dulc. rit. par. gr. vj. | Pil. No. XVII. pro una vice. |

## 3 Pulvis temperans &amp; tonicus.

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Rx. Oc. ʒs. acid. Citr. satur. | Cinnabar. ʒ ii an. ʒss. |
| Nitr. depurat.                 | Spec. de hyac. ʒj. M.   |
| Tartar. Vitriol. an. ʒj.       | Dos. ʒj. bis per diem.  |
| Corall. r. ppt.                |                         |

## 4 Emulsio temperans.

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Rx. Amygd. d. excort.  | F. l. a. Emuls.              |
| Pinear. mund. an. ʒss. | Edule. sacchar. perlat. ʒss. |
| Sem. Citr. ʒij.        | Add. Matr. perlat. ppt. ʒj.  |
| c. Aqu. rub. id.       | M. pro aliquot vicibus.      |
| meliss. an. ʒiv.       |                              |

## 5 Essentia Cardiacæ.

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Rx. Tinctur. Corall. ʒij. | D. gutt. 25. bis, ter per diem |
| Essent. dulc. Hal. ʒj. M. |                                |

## 6 Tinctura resolvens &amp; tonica.

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rx. Tinct. ʒ ii acris ʒ ij. | D. ut antea. |
| Spir. Sal. ammon. ʒj.       |              |



## 7 Epithema Cardiacum.

Rx. *Herb. Borrag.* *Lavend. an. p. ij.*  
*Bugloss.* *Incis. irror.*  $\circ \circ$  *dest. Citr.*  
*Meliss. an. Mj.*  $\circ$  *Grum an. gutt.*  
*Fl. Rosar.* *vij.*  
*Violar.* *Includantur Sacculis.*

## 8 Balsamum.

Rx. *Balsam. Succin. 3j.* *Caryoph. an. gutt.*  
*Cinam. ʒss.* *vij. M.*  
 $\circ \circ$  *dest. Angel.* *Inung. regio cordis.*  
*Lign. rhod.*

## CAPUT NONUM.

## D E

## Singultu.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Curæ initium fiat per per exhibitionem purgantis alicujus securi lenitivi.
- 2 Subjungatur Venæsectio in pede, ut humores ad partes inferiores revellantur, & Plethora simul imminuatur.
- 3 Ubi Orgasmus Sanguinis concurrit, præscribantur pulveres Nitroso-absorbentes, & Cinnabarini aliquoties per diem exhibendi. Conveniunt etiam in hoc casu Emulsiones, Gelatinæ, Potiones acidulæ.
- 4 Si vero spissitudo Sanguinis subest, locum habent Salia media, cum absorbentibus & Nitrosis combinanda, Extracta amara, Gummata temperatiora, Plantæ antiscorbuticæ & Alexipharmaco-resolventes, sub Pulverum, Pilularum, Essentiarum & Infusorum forma usurpanda.
- 5 In Scorbuto concurrente primario ad hunc affectum respiciatur, quod etiam in Vermibus, Mensium & Hæmorrhoidum obstructionibus observandum.
- 6 Ubique vero post præmissa specialia remedia subjungantur tonico nervina, pro affecta parte roboranda, quod quidem & externis fieri debet.
- 7 Interponantur universæ Curæ Clysteres & Pediluvia pro humoribus ad partes inferiores invitandis.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Præstat Venæsectionem in pede revellendi scopo instituere, quam in brachio.
- 2 Ubi Plethora concurrit, larga instituatur Venæsectio, alias parum utilitatis habet.
- 3 Quando mitior est affectus melius extra, quam in Paroxysmo celebratur hæc evacuatio, cum quandoque insignes commotiones Sanguinis post se trahat.
- 4 Vomitoria & Purgantia fortiora exulent: affectum enim pejorem reddunt.
- 5 Opiata etiam, nisi parcissime & debito tempore exhibeantur, damna potius, quam emolumenta pariunt.
- 6 Martialia & Salia volatilia usum habent in malo hypochondriaco-hysterico, si reliquis remediis perite subjungantur.
- 7 Ad vera Cardiacæ, stricte huc pertinentia, referimus Hyacinthum & Smaragdum verum, nec non Essentiam dulcem Halensem & Tincturam Coralliorum veram, quæ motus Naturæ inordinatos placent & in ordinem redigunt.
- 8 Pediluvia eximium exerunt usum, sed præmissam decet esse Venæsectionem in statu plethorico, alias commotiones Sanguinis post se trahit.
- 9 Animi Pathemata eximie exacerbant hunc affectum; unde quam maxime sunt vitanda.
- 10 Motus e contra placidus & repetitus maximopere prodest, pro circulatione sanguinis æquali reddenda.
- 11 Diætæ etiam tenuis, lubrica usum habet non contemnendum, præ aromatica, vinosa, sanguinis massam exagitante.
- 12 Quæ a Polypo cordis originem habet Palpitatio & remedia Pharmaceutica & Diætetica respuere solent.

I. *Definitio.* Singultus est motus spastico-convulsivus Diaphragmatis & Mesenterii a Natura, ob rem aliquam noxiam & sibi molestantem e corpore eliminandam, excitatus.

II. *Differentia.*

- 1 Est l. *idiopathicus*, qui a vitio stomachi originem sumit, l. *symptomaticus*, qui per consensum nervorum, in aliis morbis gravioribus contingit.
- 2 Ratione gradus est l. *vehementior*, cum summa vi & nisu obtingens, l. *mitior* per spontaneam oris clausuram facile moderandus.

III. *Signa.*

- 1 Præcedit ordinarie sensus alicujus pressionis circa orificium Ventriculi sinistrum.
- 2 Subsequitur deinde sub motu diaphragmatis concussorio exspiratio vehemens cum sono clangente.
- 3 Postquam horæ circiter quadrantem duravit, sponte plerumque cessare solet.
- 4 Nonnunquam vero ultra aliquot horas, imo dies, se extendit.

IV. *Subjectum.*

- 1 Extra morbos acutos eveniens omnibus fere hominibus familiaris quandoque est, si nimirum Ventriculi cibis crudioribus nimium prægravaverunt & frigidum potum in copia ingurgitarunt.
- 2 Dysenterici, quibus intestina sunt inflammata & ad necrosin disposita.
- 3 Aut, qui aliis morbis inflammatoriis, præcipue hepatis, Ventriculi &c. per quos Ventriculus in consensum trahi potest, laborant.
- 4 Qui Emetica & fortiora assumsere Purgantia.
- 5 Quibus Venena sunt propinata.

V. *Prognosis.*

- 1 A Singultu vulgari vix quisquam hominum est alienus.
- 2 Si Sanis a nimia ingurgitatione ciborum dyspeptorum obtingit, facile iterum cedit & medicatione vix opus habet.
- 3 Si vero sæpius recurrit, majorem considerationem meretur, quia facile in consuetudinem abit, multumque molestiæ patientibus afferre solet.
- 4 Si circa statum l. decrementum Februm inflammatarum Singultus accedit, malum.
- 5 In Dysenteria etiam, Causo & Colica si eveniat, idem dicendum: facile enim in Convulsiones mortem post se trahentes, abit.
- 6 Emetica & Purgantia qui excipit, Ventriculum summe affectum esse indicat & medelam repentine adhibendum suadet, ne mors sequatur.

VI. *Remedia.*

- 1 Singultum vulgarem sanis obtingentem moderantur & reprimunt potus Thee, Caffee, aut alius calefactus, exspiratio paulisper cohibita.
- 2 Cruditates primarum viarum evacuantia, laxantia: Sal Catharticum amarum, Rhabarbarum, Pilulæ Polychrestæ Stahlî, Beccheri.
- 3 Debilitati Ventriculi consuluntur: interne Tinctura Vitrioli Martis Ludov. Essent. Absinth. Cort. Grum Macis, Pulv. Stomach. Birckmanni; Quercet. Cortex Chacarillæ, ejusque Extractum, externe Balsa- ma Stomachica, Emplastra, Epithemata ex Herb. Menth. Matricar. Chamom. Fl. Ros. rubr. Sem. Aneth. Carv.
- 4 Febrim & inflammationem concurrentem mitigantia & discutientia: absorbentia, diaphoretica fixa, Nitrosa & Cinnabarina, nec non Emulsiones & Gelatinæ, frequentes & parvis dosibus exhibendæ.



## 1 Sal laxans.

R. Sal. com. Cathart. amar. Dissolv. in jussculo, pro uni-  
3vj. ca vice.

## 2 Potio laxans.

R. Rhabarb. elect. Zij. Dissolv. Mann. Calabr.  
Crystall. Tart. 3ss. Syr. c. cichor. c. Rha-  
Cin. acut. ʒj. b. ʒss.  
Infund. in f. q. v. Mane pro una vice.

## 3 Pilulæ laxantes.

R. Pil. Polychr. Beccher. ʒj. dies assumenda.  
Dof. gr. XV. per quatuor

## 4 Essentia Stomachica.

R. Tinct. Vitr. ʒtis Ludov. M.  
3ij. Dof. 30. gutt. bis l. 3. per  
Essent. Cort. ʒij. diem.

## 5 Alia.

R. Essent. Absinth. ʒij. Macis ʒss. M.  
ʒij. Dof. ut antea.

## 6 Potio Stomachica.

R. Aqu. Ment. ʒij. Extract. cort. Schac. gr.  
Plantag. ʒj. XV.  
Cinam. Cydon. 3vj. Syr. Cydon. ʒss. M.  
Corall. r. ppt. D. sing. 2. 3. horis coctura  
Smaragd. ppt. ʒj. tim.

## 7 Balsamum Stomachicum.

R. ʒij. N. M. expr. ʒj. Bals. Peruv. ʒj. M.  
dest. Absinth. pro inungendo Scrobiculo  
Tacamah. ʒss. cordis.

## 8 Emplastrum Stomachicum.

R. Emplast. Stomach. ʒv. Malax. ʒij. mastichin. f.  
v. q. f. Scutum stomachale.

## 9 Epithema Stomachicum.

R. Herb. Ment. crisp. Sem. Aneth. ʒss.  
Chamom. Incis. contus. includantur. 2.  
Matricar. ʒ Mj. sacculis, alternis vicibus  
Fl. Rosar. Mss. imponendis.

## VII. Methodus Medendi.

1 Vulgaris singultus per intervalla & rarius contin-  
gens medicatione opus haud habet.

2 Quod si vero frequentius & fortius recurat, debi-  
litateque Ventriculi indicet, l. etiam ejusdem sa-  
burram & cruditates, tum præstat leni laxante ap-  
propriato Ventriculum primo expurgare, deinde ta-  
lia remedia in usum trahere, quæ Ventriculi tono  
prospiciunt; usurpantur autem hæc optime matuti-  
no tempore & versus cœnam & prandium. Exter-  
ne etiam l. Emplastrum l. Balsama l. Epithemata pro  
Ventriculo roborando in usum vocari possunt.

3 Quando ab inflammatione interna singultus origi-  
nem trahit, tunc, omittis stomachicis, Nitrosa,  
diaphoretica fixa & Cinnabarina propriari debent,  
interpositis Emulsivis & Gelatinosis. Externe usum  
hinc habent Spir. Vin. Camphoratus, & lenissima di-  
scutientia.

4 Singultus a nimis Emeticis l. purgantibus excitatus  
exposcit eandem curam ac debilitatus Ventriculus,  
nec non lenia Anodyna.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

1 In Omni Singultu remedia fortiora emetica & pur-  
gantia sunt dissuadenda.

2 Blandus externus calor pro Singultu moderando e-  
gregie confert.

3 In Singultu a causa frigida, sic dicta, ortum ducente,  
nocent remedia refrigerantia & temperantia; pro-  
sunt vero eximie in causa calida i. e. in febribus in-  
flammatiis & acutis; ubi affectus a remediis ca-  
lescentibus maxime exacerbatur.

4 Singultus periodicus chronicus, nisi Dieta mutetur,  
difficiliter sæpius cedit medicaminibus.

DE

## Tenesmo &amp; Adstrictione Alvi.

## I. Definitio.

1 Tenesmus est continuus stimulus & ad egeren-  
dum conatus, sub quo tamen parum admo-  
dum excernitur.

2 Adstrictio vero est pertinax alvi retentio, a for-  
tiori sphincteris constrictione originem trahens.

## II. Differentia.

1 Tenesmus est ordinarie accidens aliorum morbo-  
rum, quorum respectu est vel Dysentericus vel Hæ-  
morrhoidalis vel biliosus, inpr. in Diarrhœa bilio-  
sa, vel verminosus ab Ascaridibus originem trahens,  
vel Gravidarum, Calculo vesicæ & Stranguria labo-  
rantium.

2 Tenesmus differt ab alvi adstrictione, quod in hac,  
quamvis etiam stimulus aliqualis adsit, prorsus ni-  
hil fortissimo quoque nisu expellatur, in illo vero  
post frequentem stimulum parum materiæ mucosæ  
& sæpius excernatur.

3 Adstrictio alvi distinguitur ab obstructione, (de qua  
Tab. LXXXVI. actum fuit,) quod in hac scybala  
duriora & motus peristaltici segnities, in illa ve-  
ro actualis constrictio in causa sit, ita ut hic ali-  
quid activi, illic vero in obstructione passivi quid  
deprehendatur.

## III. Signa.

## 1 Tenesmi.

a Continuas aut parvas intermittens irritatio in a-  
no.

b Cui jungitur ardor insignis & maxime molestus.

c Frequens ad alvum deponendum conatus.

d Excretio muci parca.

e Nonnunquam etiam concurrit Stranguria.

## 2 Adstrictionis alvi.

a Excretio fecum alvinarum ultra consuetum ordi-  
nem suppressa.

b Sensus quasi constrictorius in fine intestini recti.

c Stimulus quidem interdum adest ad egerendam  
alvum, nihil tamen excernitur.

d Et etiamsi aliquid excernatur, in parva tamen  
contingit quantitate & magno opus est labore &  
nisu.

e Concurrit sæpius flatulentia & dolor abdominis  
obtusus.

f Nonnunquam etiam in abdomine sentiuntur ten-  
siones & pressiones.

g Quas quidem stimulus quidam ad deponendam  
alvum sequitur, propter magnum tamen in inte-  
stino recto renisum nihil excerni potest.

h Si autem quid cum magno labore excernitur, non  
est induratum, sed vel naturalem habet consi-  
stentiam, vel etiam est liquidum.

i Crassities quoque excrementorum tanta non est  
ac in aliis, sed feces potius sunt tenues.

k Appetitus utpl. est prostratus.

l Somnus est inquietus & turbulentus.

m Jungitur etiam insignis lassitudo inpr. partium  
inferiorum.

n Vertigo quoque non raro vexat adstrictione alvi  
laborantes cum dolore capitis obtuso.

o Ordinarie concurrit dolor obtuse premens in ossi-  
bus sacro.

## IV. Subjectum.

## 1 Tenesmi.

a Diarrhœa biliosa laborantes,

b Dysenteria afflicti.

c Stranguria correpti.

d Hæmorrhoidarii, Hæmorrhoidibus non bene suc-  
cedentibus.

e Calculo vesicæ obnoxii.

f Stranguria affecti.

g Gravidæ, præsertim ultimis mensibus, quando ute-  
rus nimium distentus, intestinum rectum compri-  
men-



mendo, debitum sanguinis per venas hæmorrhoidales fluxum impedit.

h Qui Purgantia inprim. acriora resinosa assumserunt.

2 *Adstrictionis alvi.*

a Vitam sedentariam & otiosam amantes.

b Plethorici orgasmo sanguinis aut etiam ejusdem spissitudine laborantes.

c Femine Mensium ataxia & passione hysterica afflicta.

d Viri hypochondriaci, nephritici & arthritici.

e Variolis & aliis morbis acutis correpti.

V. *Prognosis.*

1 *Tenesmi.*

a Tenesmus Diarrhææ biliosæ junctus, cessante materiæ acrioris excretionē, facile cessat.

b Quo magis urget in Dysenteria Tenesmus, eo gravior est status.

c Tenesmus hæmorrhoidalis semper indicat incompletum, præsentibus licet moliminibus sufficientibus, Hæmorrhoides legitime fluunt, facile etiam Tenesmus præsens tollitur.

d Qui ab Ascardibus originem trahit levioris est momenti.

e Si vero gravidas affligit, majus periculum involvit, quoniam Abortus facile sequitur.

f Tenesmus diu affligens ani procidentiam post se trahit.

g Si calculosi Tenesimo corripuntur, ab eo non nisi remoto calculo tuto liberantur.

h Tenesmus, cui Singultus jungitur, præ cæteris magis periculosus est.

2 *Adstrictionis alvi.*

a Adstrictio alvi quo diutius durat, eo majora parit incommoda.

b Si ab ebullitione sanguinis dependet, levioris est momenti & hac sedata cessat.

c Sponte etiam solvitur alvi adstrictio in Variolis post sufficientem earum excretionem & maturationem.

d In morbis acutis satius est alvum esse liberam, quam adstrictam aut obstructam.

e Alvi adstrictio in Plethoricis interdum sola Venæsectione in pede solvitur.

f Magis refractaria est alvi adstrictio, quæ feminas hystericas ac viros hypochondriacos, arthriticos & nephriticos corripit, hæc enim non nisi longo tempore edomatur: imo non raro, nisi malum, quod comitatur, funditus tollatur, nunquam plane cessat.

g Adstrictionem alvi facile excipiunt congestiones sanguinis versus superiora & varia pathemata caput affligentia.

h Unde seniores ad Vertigines & Apoplecticos affectus disponit.

VI. *Remedia.*

1 *Tenesmi.*

a Materiam acrem biliosam temperantia & abstergentia: Absorbentia, Nitrosa, Salia digestiva, Rhabarbarum, Magnesia alba, Mucilaginosa, Gelatinosa, Clysteres &c.

b Ascarides tollentia: uti sunt omnia Anthelmintica & Clysteres, ex hisce parati.

c Motus spasticos lenientia: Clysteres emollientes, Vapor calidus, Fodus &c.

d Calculo prospicientia: Vid. *Tab. de Calculo.*

2 *Adstrictionis alvi.*

a Orgasmodum sanguinis sistentia, Nitrosa, Absorbentia, Conch. citrat. Tart. Vitriolat. blanda acida.

b Plethoram imminuentia: Venæsectiones, Scarificationes, Hirudinum applicationes.

c Adstrictionem relaxantia: lenissima laxantia liquida: Tamarindi, Manna, Pulpa Cassiæ recenter extracta, Passulæ, Clysteres emollientes & oleosi, aliquoties repetiti, Unguenta emollientia. Fodus, Balnea, Pediluvia, pulveres antispasmodici ex Nitro, Sale digestivo & Cinnabari, Potus sufficiens, Mucilaginosa, motus corporis.

*Formula Remediorum.*

1 Pulvis temperans.

R. Matr. Perl.

Chryst. mont. æ. ʒss. M.

Nitr. depar.

Div. in 6. p. æq.

Tart. Vitriolat.

D. sing. 3. vel 4. horis.

2 Clyster abstergens in Dysenteria.

R. Decoct. Furfur. ʒX.

Vitell. Ov. Noj.

Terebinth. Venet. ʒss.

M. F. Clyster.

3 Alius Ad Ascarides.

R. Rad. Filic.

Colat. ʒviij. adde.

Gramin. æ. ʒss.

Elect. Cathol. ʒvj.

Summit. Absinth.

Fell. Taur. inspiss. ʒj.

Herb. Tanac. æ. Mss.

Vit. Ov. No. j. M.

Coq. in f. q. Aq. simpl.

F. Clyster.

4 Bolus ad Vermes.

R. Conf. Gratio. ʒss.

Syr. Absinth. q. f.

ʒ dulc. gr. XII.

M. F. Bolus.

Res. Jalap. gr. iij.

5 Decoctum laxans.

R. Decoct. Tamarind. ʒiv.

Colat. D. calide:

Mann. elect. ʒii. M.

6 Pulvis antispasmodicus.

R. Nitr. regener.

D. sing. 4. horis 2. cuspid.

Arcan. dupl. æ. ʒij.

cultri.

Cinnabaris ʒii ʒij. M.

7 Clyster emolliens.

R. Decoct. emoll. ʒix

Mell. rosac. æ. ʒvj.

Ol. Chamom.

Sal. com. Genim. ʒj.

Lil. alb.

Vitell. Ov. No. j. M.

Elect. lenit.

F. Clyster.

VII. *Methodus medendi.*

1 *Tenesmi.*

a Si Tenesmus jungitur Diarrhææ biliosæ, exhibeantur temperantia & digestiva, quæ & bilem corrigunt & abstergunt, adeoque Tenesmus statim insigniter imminuit.

b Si vero Dysenteriam comitatur, præter lenia temperantia Nitrosa, absorbentia & Cinnabarina, conveniunt Clysteres emollientes, carminativi & abstergentes, quibus Terebinthina addatur. Eidem fini interserviunt Vapores & Fodus ex carminativis, ut & Linimentum ex Terebinthina & Vitellis ovorum paratum.

c Quando Tenesmus ortum trahit ab Ascaridibus, pro usu interno præscribantur Anthelmintica, inpr. vero Mercurialia, ano vero injiciantur Clysteres ex radicibus & herbis amaris parati. Mulierculæ quoque non sine fructu suppositoria ex lardo, felle Tauri aut oleo Absinthii cocto illita, ano intrudunt.

d In Tenesimo hæmorrhoidali respiciatur ad legitimum Hæmorrhoidum fluxum; si deficient, mittatur, si opus est, sanguis aut hirudines ano applicentur: si vero dyscrasia sanguinis in causa est, quo minus Hæmorrhoides legitime fluere queant, in usum trahantur Tincturæ alcalinæ cum Pilulis Becherianis aut Stahlanis, quæ & sanguinem corrigunt & debitum Hæmorrhoidum fluxum restituant.

e In tenesimo gravidarum, præter superius allegata temperantia, Clysteres carminativos & emollientes ac Fodus, apprime conveniunt Pilulæ Stahlianæ.

f Si Tenesmus dependet a Calculo, injiciantur Clysteres emollientes, aliaque, quæ supra *Tab. de Calculo* tradita fuerunt, in usum trahantur.

g In Stranguria denique ea, quæ *Tab. de Stranguria* laudata fuerunt, exhibeantur, sic enim Tenesmus facile cessabit.

2 *Adstrictionis alvi.*

a Si nimia sanguinis ebullitio alvi adstrictionem fovet, ceteris remediis præmittantur temperantia, inpr. vero nitrosa & salia digestiva, utpote quæ non solum orgasmodum sistunt, sed etiam, præcipue largiori dosi exhibita, alvum expediunt.

b Ubi vero Plethora & congestiones sanguinis adstrictionis alvinæ causæ sunt, instituat Venæsectione



otio in pede, injiciantur Clysteres emollientes, ac pediluvia in usum trahantur: interne vero affumantur antispasmodica, uti præcipue sunt Cinnabarina temperantibus mixta.

c Profunt hic quoque lenia laxantia liquida & mucilaginosa strictas fibras placide relaxantia.

#### VIII. Cautela Prædica.

##### I. Tenesmi.

a In omni Tenesmo exulent Purgantia acria, quia affectum magis augment & procidentiam ani post se trahunt.

b Inpr. vero in Tenesmo Hæmorrhoidali fugiantur Aloetica, hæc enim non solum affectum per se producant, sed eum etiam exasperant.

c Cum in gravidis Tenesmus facile sequatur Abortus, cautissime in hujus curatione procedendum est. Pilulæ Stahlianæ hoc in casu reliquis remediis merito anteposuntur, utpote quæ sine ulla violentia affectum suum edunt.

d In Tenesmo dysenterico emollientibus semper addantur carminativa & abstergentia, sola enim emollientia mitigant quidem aliquo modo malum, sed simul intestinum rectum nimium relaxant.

e In Tenesmo ab Aicæridibus vitentur suppositoria nimis acria, quamvis enim quædam eorum Vermes enecent nimis tamen intestinum irritant, adeoque affectum augment.

f In Tenesmo a Calculo oblierventur Cautelæ Tab. de Calculo traditæ.

##### 2. Adstrictionis.

a Aciora Purgantia in adstrictione alvi ordinarie majorem adstrictionem post se relinquunt, quare vitentur, & ipsis laxantia leniora liquida substituantur.

b Sed nec hisce folis fidendum est, utpote quæ malum hocce non radicitus tollunt, quare iis semper alia jungantur. quæ scil. causas mali magis respiciunt, Venæsectiones scil. maturæ institutæ, aliaque morbis specialiter convenientia.

c Vita sedentaria uti multum ad generationem alvi adstrictionis contribuit, ita fugienda est.

d Potus sufficiens semper concedendus ad fluxilitatem sanguinis conservandam, eique motus corporis moderatus & continuatus jungendus est, hisce enim neglectis frustra reliqua remedia in usum trahuntur.

e In Variolis & Morbillis aliisque exanthematicis alvus adstricta non temere aperienda est, ne placidus morbi successus cum insigni periculo turbetur.

f Ceterum in adstrictione alvi symptomata semper respiciatur ad affectus, an scil. commode alvi apertionem ferant? & hinc cautelæ necessariæ observentur.

## S E C T I O II.

D E

## MOTIBUS DEFICIENTIBUS.

### CAPUT PRIMUM.

#### De Motibus deficientibus in genere.

##### I. Definitio.

**M**otus deficientes sunt cessationes motuum vitalium, Pulsus scil. & Toni, Naturæ tergiversationem, trepidationem, terrorem aut debilitatem indicantes, gravia symptomata conjuncta habentes.

##### II. Differentia.

I Defectus motuum observatur in

a Tono, unde variæ partium relaxationes, Tremor, Apoplexia, Paralysis &c. originem trahunt.

b Pulsu, quam remissionem vel majorem vel minorem graves vel leviores sequuntur Lipothymia, sub animi deliqui, Syncopes & Asphyxiae nomine venientes.

2 Respectu motus tonici defectus observatur.

a Vel in toto corpore, uti in Apoplexia fortissima, ubi relaxatio funesta in omnibus partibus, actionibus tam vitalibus, quam animalibus, inservientibus deprehenditur: simile quid etiam occurrit in Tremore universali.

b Vel in uno latere, sive dimidia dextra, vel sinistra totius corporis parte, uti in Hemiplexia & Paralyti unius lateris.

c Vel in integro quodam artu, ut in Paralyti particulari brachii aut pedis.

d Vel in parte specialissima, v. g. nimia pulmonum relaxatione in Catarrho suffocativo, de quo superius egimus, Paralyti palpebræ, partium genitalium & inde dependente Impotentia, Lingua, Oesophagi & cum hisce conjuncta loquendi & deglutendi difficultate.

3 Respectu gradus differunt etiam motus deficientes:

a Nonnunquam enim aliqualis adhuc motus occurrit sensibilis, quamvis admodum debilis.

b Interdum vero prorsus insensibilis est, uti in Asphyxia & Suffocatione hysterica.

#### III. Signa.

1 Partium antea strictarum & tactui resistentium præternaturalis mollietates.

2 Insignis eorum ad movendum impotentia, aut motus plane abolutus.

3 Vigor pulsus imminutus, ita ut vix vel prorsus non pulsu deprehendi queat.

4 Actionum reliquarum vitalium & animalium notabilis imminutio & cessatio.

5 Excretionum vel suppressio vel involuntaria excretio.

6 Virium omnimoda vel prostratio vel insignis languor.

7 Caloris naturalis cessatio & eam insequens refrigeratio.

8 Cetera sub affectibus specialibus occurrent.

#### IV. Subjecta.

1 Homines temperamenti sanguinei, phlegmatici, aut ex hisce mixti, sanguineo-melancholici, Plethorici.

2 Insigni sensibilitate præditi.

3 Ad terrorem & iracundiam tacitam propi.

4 Otio nimium, quam par est, indulgentes.

5 Vino, diætâ lauta & Venere abutentes.

6 Excretiones naturales & hisce substitutas artificiales negligentes.

7 Feminæ præ viris.

8 Hypochondriaci, & Hysterici.

9 Morbis malignis aliisque gravioribus laborantes.

#### V. Prognosis.

1 Defectus motuum majus semper periculum involvunt quam eorundem excessus.

2 Motus tonici defectus aut nimie partium relaxationes utpl. difficilius restituantur, quam remissiones pulsus.

3 Diuturniores tamen pulsus defectus sæpius in præsentaneum quoque homines periculum conjiciunt.

4 Universales toni relaxationes ordinarie periculi sunt plenissimæ.

5 Imo particulares etiam inpr. inveteratæ sæpius vix ac ne vix quidem medicationem admittunt, exemplo Paralysis veræ palpebrarum, flacciditatis membri virilis &c.

6 In omnibus morbis acutis pulsus & toni notabiles & continuantes remissiones utpl. mortem instantem, ceteris paribus, indicant.

7 Si tamen in morborum talium declinatione cum aliis signis bonis occurrunt, non adeo metuendæ sunt.

8 Notabiles pulsus & toni sine manifesta causa labefactiones sæpius morbos malignos imminere indicant.

9 Eo majus vero metuendum est periculum, si simul in metuendis hisce morbis notabilis mentis occurrit perturbatio.

10 In senibus repentinæ totius corporis lassitudines & sen-



sensum interiorum immutatio Apoplexiam præ foribus esse indicant.

- 11 Artuum in junioribus movendi impotentiam non raro sequitur Rhachitis.
- 12 Animi affectus, uti sæpius defectibus motuum an- sam præbent, ita & iidem vel contrarii eorundem restitutioni viam sternunt.
- 13 Defectus motuum animia animi perturbatione ori- ginem trahentes semper difficiliter curantur, quam ii, qui causas materiales pro fundamento habent.
- 14 In torpidis subjectis curatio horum affectuum sem- per difficiliter procedit quam insensibilioribus.

#### VI. Remedia.

- 1 Motus stimulantia pro diversitate affectuum: Cly- steres aciores, Vomitoria, Sinapismi, Vesicatoria, Frictiones cum rebus asperioribus, Spiritus, Balsa- ma, Salia Volatilia, titillationes, suffimigia, pilo- rum extractions &c.
- 2 Æqualem Sanguinis circulum restituentia & promo- ventia: uti Venæsectiones maturæ & loco conve- niente institutæ, diaphoretica convenientia, inci- dentia & resolventia.
- 3 Naturam titubantem refocillantia: uti sunt, præter superius recensita, analeptica, Vinum generosum, Aquæ spirituosæ, Essentia dulc. Hall. &c.
- 4 Partibus flaccidis & debilibus prospicientia: interne Martialia legitime præparata, Mixtura tonica Sta- hlii, Essent. dulc. Pulv. Ores D. Richteri: externe vero Epithemata spirituosæ, sacculi ex herbis aro- maticis, Balsaма &c.
- 5 Causas procatasticas sive occasionales & materiales præcaventia: Venæsectiones, Scarificationes, Pur- gationes &c. mature institutæ & abstinencia ab ira, terrore, venere, vita sedentaria &c.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Pulvis emeticus.

Rx. Sal. com. Vitr. ʒss. D. in vehiculo largo.

##### 2 Clyster.

Rx. Herb. Rosmar. Colat. adde  
Salv. Elect. hier. picr. ʒvj.  
Serpill. & Mj. Mell. Mercur. ʒj.  
Fol. Tabac. Mss. Sal. com. Gemm. ʒij. M.  
Senn. ʒij. F. Clyster.  
Coq. in s. q. Aq. f.

##### 3 Potiuncula confortans.

Rx. Aqu. Rosar. dulc. ʒss.  
Namp. & ʒij. Julep. gemmar. ʒss. M.  
Cinnam. ʒj. D. Cochlearim.  
Essent. Ambr. ʒiss.

##### 4 Spiritus externus.

Rx. Spir. Lil. convall. ʒss.  
Lumbr. Terrestr. Ess. Castor. ʒij. M.  
Serpill. & ʒj. Applicetur naribus, lingæ,  
Sal. com. Ammon. parti affectæ.

##### 5 Mixtura tonica.

Rx. Tinct. ʒij. acr. ʒij D. 25. 30. gr. pro dosi bis vel  
Spir. C. C. ter per diem.  
Liq. C. C. succin. & ʒj. M.

##### 6 Pulvis temperans & diaphoreticus.

Rx. Nitr. depur. Cinnabar. ʒij. ʒj. M.  
Arcan. dupl. D. 2. cuspid. cultri sing. 4.  
ʒ. diaph. & ʒss. horis.

##### 7 Essentia diaphoretica & confortans.

Rx. Ess. alexiph. ʒij. Dos. 30. gutt. bis vel ter per  
dulc. ʒj. M. diem.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 In cura horum affectuum ante omnia ad excitatio- nem motuum naturalium, pulsus scil. & toni respi- ciendum est, hoc enim facto reliquæ conjunctæ mo- lestiæ facile cessant.
- 2 In pulsu ergo deficiente analeptica, vinum genero- sum, Aquæ fragrantæ, uti sunt Aq. Cinnamomi, Namp hæ aliæque spirituosæ, Essentia dulcis &c. ex- hibebantur.
- 3 Externe vero naribus salia volatilia, spiritus salis Ammoniæ, aliæque spirituosæ admoveantur. Pro- sunt etiam, inpr. in Lipothymia & Syncope, fri-

ctiones plantarum pedum, applicationes remediorum spirituosorum in regione cordis & carporum.

- 4 In tono vero deficiente pro diversitate affectuum Ve- næsectiones ad circulationem sanguinis promovendam instituuntur.
- 5 Si sordes primarum viarum adsunt, ac simul exci- tandi gratia præmissis præparantibus Purgantia aut Vomitoria exhibeantur.
- 6 Clysteres quoque aciores ad excitandum, inpr. in Apoplexia & affectibus soporosis, optime conve- niunt.
- 7 Externe in hisce casibus insignem quoque usum ha- bent frictiones cum panno asperiori, Rubefacientia, Vesicatoria, Errhina, irrigationes linguæ cum A- quis spirituosæ & Essentiis acrioribus ac oleis destil- latis, urticationes, spirituosorumque applicationes ad nares aliaque loca convenientia.
- 8 Respicendum quoque est ad æqualem sanguinis per universum corpus distributionem, quam præstant partim antea laudata analeptica, partim diaphore- tica, Essentia alexipharmaca. Tinctura bezoardica, Mixtura simplex, dictis analepticis vel interposita, vel juncta.
- 9 Præmissis hisce respectus habeatur ad roborationem partis debilitatæ & toni restitutionem: huic fini in- serviunt interne pariter modo allegata analeptica & alexipharmaca, Mixtura, tonica Stahlii, Liqueur C. C. succinatus, vina medicata ex herbis ac radi- cibus aromaticis & nervinis: externe vero omnia spirituosæ inpr. ex nervinis parata, spiritus Formi- carum, Lumbricorum terrestrium, Sapo Philoso- phicus &c.
- 10 Preservationis gratia venæ debito tempore aperian- tur, Purgationes instituuntur, atque roborantia in-terna & externa usurpentur.

#### VIII. Cautela Practica.

- 1 Ad excitandos ægros nunquam statim in usum tra- hantur spirituosæ fortiora, inpr. in subjectis ple- thoricis, quoniam nimiam sanguinis excitant ebul- litionem.
- 2 Eo magis vero ab hisce abstinendum est in mo- tuum defectu, ab orgasmo sanguinis orto, quoniam ebullitionem augent: magis in tali casu profunt tem- perantia.
- 3 Venæsectio in defectibus motuum, inpr. Apoplexia Sanguinea, semper larga sit necesse est, parciore enim plus damni, quam emolumenti affert.
- 4 Vomitoria, si motuum defectus a congestione san- guinis versus superiora ortum traxit, summe noxia sunt: feliciore cum effectu in hoc casu Clysteres in usum trahuntur.
- 5 Balnea nervina & aromatica ac Thermæ, quæ a quibusdam in defectibus motuum laudantur, non promiscue omnibus sunt suadenda, modo enim ebul- litiones sanguinis producant, modo partes magis re- laxant, modo prorsus nihil efficiunt, aut si quid ef- ficiunt, temporarium tamen illud magis est, quam firmum. Thermas tamen ferinas præ ceteris singu- larem habere efficaciam, mihi a fide dignis Medi- cis relatum est.
- 6 Usualia remedia ut plurimum in defectibus motuum inpr. paralyticis, parvam vel nullam habent effica- ciam, quare non nisi pauca, sed selecta in usum trahantur, ferrago enim medicamentorum plus ob- est, quam prodest. Essentiæ dulcis & Pulverum So- larium legitimum usum insignem, præceteris, in a- liquot junioribus paralyticis deprehendi.
- 7 Alvus in hisce affectibus, tam curationis quam præ- servationis gratia, aperta servanda est, vitentur ta- men acriora, & drastica purgantia.
- 8 Otium, vita sedentaria, animi pathemata, Venus &c. motum tonicum magis debilitantia, fugiantur. Reliquas Cautelas vid. Tabul. seq.



## CAPUT SECUNDUM.

## D E

## Tremore.

## Formule Remediorum.

## I Pilulæ laxantes.

R. Mass. Pil. e Succin. Crat.

Resin. Jalapp. gr. iij.

gr. XII.

c. Elix. propr. F. Pil.

Extract. helleb. nigr. ℥ss.

pro j. Dosi.

## I Potio laxans.

R. Fol. Senn. s. fl. ℥ij.

Dissol. Mann. Calabr. ℥vj.

Rhabarb. el. ℥j.

Colat. clar. d. ad. Vitr.

Infund. in f. q. ∇.

pro j. vice.

In Colat. ℥ij.

## 3 Pulvis temperans &amp; tonicus.

R. Oc. ℥. ppt.

Cinnabaris ℥ij. ℥j. M.

Lumbr. terrestr. ppt. ā. ℥j.

Div. in x. p. a.

Nitri depurat.

D. 2. vel 3. doses quotidie.

Succin. ppt. ā. ℥ss.

## 4 Essentia tonico-nervina.

R. Tra. ℥ij. tartarizat.

Essent. Succin. ℥ss. M.

Spir. C. C. rectif. ā. ℥j.

Dosi. 30. gutt.

## 5 Spiritus nervinus pro usu.

R. Spir. Vin. Camph. ℥j.

Essent. castor. ℥j. M.

Lumbric. Terrestr.

Applicetur partibus trementibus.

Formicar. ā. ℥ss.

## 6 Emplastrum.

R. Emplastr. e Galban. ℥j.

Add. Camph. ℥j. M.

Malax. cum o o Sca-

Imponatur cervici.

rab.

## VII. Methodus medendi.

1 Quando plethora malo ansam dare ex circumstantiis colligitur, imminuenda eadem est vel per Venæsectiones, vel Scarificationes, debito tempore institutas, vel denique hæmorrhagarum spontanearum promotionem.

2 In Senibus & Phlegmaticis, feri & muci plerumque superfluitate laborantibus, loco Venæsectionum aliarumque Sanguinis evacuationum præstant laxantia & quidem secundum causarum indicationes vel Sennata, vel Helleborata.

3 Sanguineis, & Baccho Venerique litantibus conducunt posthac temperantia, Emulsiva & Gelatinosa; phlegmaticis vero incidentia, discutientia & antiscarrhalia, sub infusorum vel Essentiarum forma propinnata.

4 In utroque statu subjungenda sunt Nervino-roborationia, ex iisque inprimis Essent. dulc. Hal. ordinar. & concentr nec non Lunæ rite parata. Externe vero Embrocationes, epithemata sicca, sacculi & frictiones.

## VIII. Cautela Præctica.

1 In Cura potissimum ad causarum differentias respiciendum est, ut in universalium adhibitione vel sanguinis vel ser. ratio habeatur.

2 Sanguinei calidiora minime ferunt, sed facile atrophias exinde reportant; adhibenda igitur potius sunt temperantia & substituenda nervina temperantiora.

3 Tremor acutarum exposcit tantum excretionum criticarum justam promotionem, nec non Gelatinosorum, subacidorum, vel Emulsivorum interpositionem.

4 Emarocationes in malo habituali quandoque officium faciunt, sed præmittenda sunt universalia, alias in sanguineis majorem noxam inducunt.

5 Veneris & Bacchi sequaces, nisi moderamen in hisce cupiditatibus ponant, a remediis parum auxilii expectent.

6 Mercurium nervis haud admodum amicum esse experientia constat; unde si malum ab eodem originem habuisse suspicio fert, alexipharmaca & diuretica in usum trahere convenit.

I. **Definitio.** **E**st involuntaria & inæqualis artuum commotio, a deficiente vel nimis aucto tono originem trahens.

## II. Differentia.

1 Alius est *idiopaticus*, quando a debilitate partium & tono relaxato primario dependet.

2 Alius *symptomaticus*, ubi morbus aliis v.g. febribus acutis, aliisque gravioribus morbis, necnon animi pathematibus, a nimio h. morum motu originem habens sese adjungit & supervenit.

2 Alius *universalis*, omnes corporis artus corripuens; alius *particularis*, hoc vel illud tantum membrum affligens v.g. Caput, labia, palpebras &c.

## III. Signa.

Tremores nulla speciali diagnosi indigent: ipsi enim conspectui statim se se offerunt: moventur autem partes involuntarie, vel continuo, etiam si nihil agant patientes, vel occasionaliter, quando levissimum pondus manibus attollunt, vel leniori tantum ira corripuntur, l. potum calidum, Thee, Caffee copiose bibunt.

## IV. S. Subjectum.

1 Obnoxii huic affectui præcipue sunt Senes, sufficiente robore destituti.

2 Juniores Veneri & Baccho admodum litantes.

3 Evacuationes spontaneas & artificiales, præcipue Sanguineas & diaphoreticas, negligentes.

4 Terrore graviore percussi.

5 Nimio æstu interno exagitati.

6 Hæreditariam dispositionem possidentes.

7 Venena & Mercurialia frequenter tractantes.

## V. Prognosis.

1 Tremor Senum, nec non habitualis juniorum, raro curatur.

2 In junioribus tamen, si adhuc recentior est affectus, curationis spes superest.

3 Sæpius paralyseos & Apoplexiæ aut Convulsionum prodromus esse solet.

4 Si Paralyti superveniat aut succedat tremor, signum est motum naturalem rediturum esse.

5 In febre acuta, si tremor cum delirio conjunctus sit, malum.

6 In eadem, si spastici tendinum subsultus eundem comitantur, Convulsiones subsequuturas portendit.

7 Tremor in labio inferiori plerumque imminuentem Vomitus in morborum initiis indicat.

## VI. Remedia.

1 Sanguinem abundantem evacuantia: Venæsectiones & Scarificationes, tempore præcipuis congruo repetendæ.

2 Primarum viarum saburram, si quæ adest, expurgantia: Helleborata, Rhabarbarina &c.

3 Humores nimium commotos demulcentia & temperantia: absorbentia, Nitr. Cinnabarina, Emulsiva & Gelatinosa.

4 Nervosa, partes relaxatas roborantia, interne Pulv. Lumbr. Terrestr. Succin. ppt. ejusque Essentia, Tinctura tonico-nervina Stahlii, Essentia Lunæ, a nauseabundis Veneris inquinamentis liberata, Essent. dulc. Hal. ordin. & concentr. Infusa ex herbis nervinis: Rad. Helen. Fœnic. Herb. Meliss. Serpill. Rorismar. Flor. Lavend. Anth. alv. Bacch. Laur. Junip. additis, si mucositates præsto sunt, lignis & radicibus antiveneris. Lign. Guajac. Sassafr. Rad. Chin. Sarsapar. Pimpinell. alb. Externe Spir. Lumbr. terrestr. Formicar. Juniper. Castorina, Empl. e Galban. camphorat. & cum o o Scarabæorum malaxatum, Potus ex herbis nervinis & discutientibus: Chamom. Matricar. Chamæpyth. Roris marin. Urtic. Flor. Sal-v. Primul. ver. Bacc. Laur. Junip.



## CAPUT TERTIUM.

D E

## Vertigine.

I. *Definitio.* **E**st perturbatio imaginationis, qua res externæ in gyrum verti & circum rotari videntur, ab expansione & congestione humorum, genus nervosum prementium, dependens.

II. *Differentia.*

- 1 Est l. *Sanguinea*, quæ a Sanguine florido, originem habet, l. *phlegmatica*, quæ natales suos debet Sanguini magis seroso & pituitæ superabundanti.
- 2 Est l. *idiopathica*, quæ in capite a stagnantibus humoribus sedem habet, l. *symptomatica*, a Ventriculi vitio originem ducens.
- 3 Ratione gradus est l. *levior*, quando externa solum circumagi videntur, l. *fortior*, ubi præter hoc oculi caligine obfuscantur & omnia nigra & obscura iis representantur. Vocatur hic gradus *Scotomia* l. *Scotodinia* aut etiam, quoniam ægroti in terram cadunt, *Vertigo caduca*.

III. *Signa.*

- 1 Exurgit plerumque ex improvise, antecedente aliquali visus obnubilatione.
- 2 Subsequitur deinde circum rotatio rerum externarum oculis oberrantium, quæ quandoque prorsus nigra & obscura iisdem representantur.
- 3 Non raro in terram concidunt, nisi ab adstantibus sustententur.
- 4 Sanguinei Cephalalgias prægressas accusant & faciei ruborem vasorumque capitis inflationem conjunctam habent.
- 5 Phlegmatici vero & qui Ventriculi vitio laborant, multum sputant, flatulentias in abdomine sentiunt, non tensiones cardiacas in Ventriculo.

IV. *Subjecta.*

- 1 Sanguineo-Melancholici, plethorici, spissitudine Sanguinis gaudentes.
- 2 Spontaneas & artificiales Sanguinis evacuationes consuetas diu negligentes.
- 3 Qui phantasiam & memoriam valde fatigant, literati.
- 4 Hypochondriaci & hysterici, hæmorrhoidum & mensium vitio laborantes.
- 5 Cibos crudiores in magna quantitate assumentes & minus bene digerentes.
- 6 Senes, præ junioribus.
- 7 Veneri & Vino nimium indulgentes, ebriosi.
- 8 Qui corpus in gyrum commovent, in præcipitia vident, aut res externas circumrotatas, aquarum vortices & similia diutius aspiciunt.
- 9 Halitibus carbonum aut nimio Tabaci fumo caput confundentes.
- 10 Quibus casu, ictu aut alia externa vi caput læsum est.

V. *Prognosis.*

- 1 Vertigo idiopathica in cerebro sedem habens periculiosior, quam symptomatica, a Ventriculi vitio originem habens.
- 2 Juvenes Plethorici ex invalescente Vertigine facile Epilepsiam incurrunt.
- 3 Idem subito & vehementer a Vertigine correpti in Apoplexiam quandoque incidunt, quamvis hoc rarius fiat.
- 4 Senes vero vertiginosi communiter Apoplexia tandem corripiuntur.
- 5 Si vehemens cephalalgia cum Vertigine concurrat, insequuntur quandoque Febres inflammatoriæ l. affectus arthritico-spastici, in aliis vero ipsa Apoplexia.
- 6 Vertigo hypochondriacorum & hystericarum, imprimis quæ junioribus accidit, non statim pro periculosa judicanda, neque prædicenda ex eadem Apoplexia. nisi seniores jam sint Patientes.

7 Fit hæc Vertigo plerumque habitualis & difficillime curatur.

8 Quandoque mensium & hæmorrhoidum legitimo fluxu l. mitigatur vel plane tollitur.

9 Quæ ex cruditatibus primarum viarum oritur facilius curatur, quam Vertigo Sanguinea.

VI. *Remedia.*

- 1 Sanguinem abundantem evacuantia: Venæsectio, Scarificationes, Hirudines.
- 2 Humores versus caput congestos revellentia, blanda laxantia: Massa Pil. e Succin. Crat. Pil. Tartar. Querc. Extract. Pachymag. Croll. Hellebor. nigr. Clysteres, Pediluvia. frictiones & ligatura extremorum.
- 3 Orgasum Sanguinis contemperantia: Nitrosa, absorbentia, Cinnabarina.
- 4 Primarum viarum saburram eliminantia: Tartarus emeticus cum Sal. digestivo, Vitriolum album.
- 5 Spissos humores in Ventriculo contentos incidentia: Sem. Coriandr. Cochlear. Nasturt. Eruca Cubeb Rad. Ari, Galang. Zedoar. Armorac. Calami aromat. Piperitis, Cochlearia, Aromatica, Pulvis stomachicus Birchkmanni, Quercetani, Essentia Cort. Orum, carminativa wedelii &c.
- 6 Nervina & Specifica: Mixtura tonico nervina, Stahlianii, Smaragdus pptus, Hyacinthus pptus, Cinnabaris nativa, Stercus Pavonis, Ungula Alcis, Agagropilæ, Radix Doronici, Externe Spir. Vini Camph. & Meliss. compos. &c. dest. Bux. Succin. Balf. Succin. Cucuph e Rad. Irid. Flor. Valerian. Bryon. Herb. Meliss. Hyssop. Salv. Chæref. Serpill. Sem. Carv. Fœnic.

## Formula Remediorum.

## 1 Pilulæ laxantes.

Rx. Mass. Pil. e Succin. Trochisc. alband. gr. iij.  
Tartar. Querc. c. Essent. Succin. f. Pil.  
Extract. hellebor. nigr. ā. D. pro una vice.  
gr. viij.

## 2 Aliæ.

Rx. Extract. Pachym. & ij dulc. rit. par. gr. vj.  
Croll. gr. XV. Res. Jalapp. gr. iij. M.  
Hellebr. nigr. gr. viij. F. l. a. Pil.  
D. S. ut antea.

## 3 Vomitorium.

Rx. Rhabarb. elect. gr. XII. Sal. polychr. gr. vj. M.  
Tartar. emet. gr. ijs.

## 4 Aliud.

Rx. Vitrioli albi depurat. Sumatur in jussculo calente.  
℥ss.

## 5 Pulvis temperans.

Oc. ℥. ppt. Arcan. duplicat. ā. ℥j.  
Succin. ppt. Cinnabar. & ii ℥j. M.  
Nitri depurat. Dos. ℥j. singulis 4. horis.

## 6 Alius stomachicus.

Rx. Pulv. Stomach. Birchkmanni ℥ss. Cort. Orum. ā. ℥j. M.  
Herb. Card. bened. Dos. ℥j. ante cœnam & prandium.

## 7 Essentia Stomachica.

Rx. Tinct. Vitrioli & tis Ludov. ℥ij. Dos. gutt. 35. ante prandium & cœnam.  
Essent. cort. Orum ℥j. M.

## 8 Mixtura Tonica.

Rx. Tinct. & ij. tartar. ℥ij. Dos. gutt. 25. 30. bis l. ter per diem.  
Essent. Succin. ℥j.  
Liq. C. C. Succin. ℥ij. M.

## 9 Tabulæ confortantes.

Rx. Spec. diamb. c. f. q. Sacch. in & Salv. solut.  
diamosch. ā. ℥ss. F. l. a. Tab. per. vices comedenda.  
Succin. ppt.  
Cinnabar. & ā. ℥j.

## 10 Balsamus Cephalicus.

Rx. Balsam. Succin. Pro inungendis temporibus & Vertice.  
Rut ā. ℥ss.

& dest. Buxi ℥ss. M.

## 11 Aqua Spirituosa.

Rx. & Meliss. compos. ℥ss. pro eodem usu.  
Spir. C. C. rectif. ℥j.



II. *Methodus medendi.*

- 1 In statu plethorico, ubi res a Sanguine dependet, instituenda est Venæsectio, & quidem optime revulsione scopi in pede; ubi vero hæmorrhoidum suppressio subest, hirudines ano applicari possunt.
- 2 In malo urgentiori subjungatur Clyster stimulan, ubi vero mora conceditur, præscribantur laxantia helleborata, aliquoties repetenda.
- 3 Revulsione etiam scopi in usum vocentur pediluvia, frictiones pedum cum Sale & aceto & ligaturæ extremorum.
- 4 Interponantur interne temperantia Nitrosa & Cinnabarina, externis discutientibus per Spir. Vini camphoratum, Cucuphas temperatas haud omittis.
- 5 In primarum viarum saburra ordinentur Vomitoria, omitta Venæsectione.
- 6 Subjungantur digestiva & stomachica.
- 7 Ubique colophonis loco in usum trahantur nervina & specifica selectiora.
- 8 Diæta etiam conveniens instituatur & ad evacuationes cum spontaneas, tum artificiales sedulo respiciatur.

III. *Cautele Practicæ.*

- 1 In Hypochondriacis & Hystericis, ubi concursus flatuum plerumque adest, a vomitoriis abstinendum est; flatu enim per hæc magis ad Ventriculum derivantur & flatulentia hisce subjectis familiaris augetur.
- 2 Quod etiam in aliis casibus, ubi flatulenta Ventriculi distensio adest, notandum.
- 3 Conveniunt his in casibus Digestiva salina & incidentia vegetabilia, pro re nata l. mitiora l. fortiora: Rad. Ari, Aristol. long. Helen. Irid. Flor. Herb. amar. Card. bened. Fumar. Absinth. Cent. min. antiscorbutica &c.
- 4 Sem. Coriandr. Eruc. l. Sinap. singulis mane ad aliquot grana comesta incidunt & cito digestionem promoveant, abusus tamen in calidioribus vitandus.
- 5 In Ventriculi constitutione frigidiori commendanda præterea sunt aromatica, sed in sanguineis in parca dosi.
- 6 Subjungenda & interponenda sunt lenia laxantia, vitando nimis acria.
- 7 Ubi vero tenax, viscosa materia, sine multo ruætu & flatu ventriculum onerans, in suspicionem venit, ibi tuto Vomitorium exhiberi potest.
- 8 Ungula alcis & sterco pavoris nullam peculiarem efficaciam exhibuisse Stahlus & Observat. Uratistav. testantur.
- 9 Inter usitatoria Cinnabaris optima est, quamvis nulla miracula præstet.
- 10 Radix Doronici, Sem. Coriandr. Cubebæ, Salvia bene se gerunt.
- 11 Pediluvia in idiopathica magis quam symptomatica vertigine locum habent.
- 12 Cucuphæ magis phlegmaticis quam sanguineis conveniunt, senibus magis quam junioribus.
- 13 Idem etiam de Salib. volatilibus fit dicendum, quæ quandoque eximium damnum afferunt.

CAPUT QUARTUM.

DE

Soporosis Affectibus.

I. *Definitio.* Sunt perpetuæ ad somnum propensiones vel actuales sopores, cum actionum vitalium & præcipue animalium insigni remissione conjunctæ, a congestione vel stasi Sanguinis vel Serii, in Capite facta, originem trahentes.

II. *Differentia.*

- 1 Sunt vel *idiopathici*; qui cum actuali stasi absque aliis morbis occurrunt, vel *symptomati* morbis aliis v. g. febribus acutis ob congestionem Sanguinis versus Caput supervenientes.
- 2 *Symptomati*, qui in morbis acutis sese offerunt vel contingunt cum actuali sopore & profundiori

somno, ubi *Coma somnolentum* l. *Cataphoran* constituant; vel absque ullo sopore, sed saltem insigni ad somnum propensione, quem tamen assequi haud possunt patientes, ubi *Comatis Vigilis* nomen assument.

- 3 *Idiopathici*, qui per se & citra alios morbos eveniunt, vel sunt *vehementiores* & pluribus stipati symptomatibus, ubi *Lethargi* l. *Veterni* nomen assument, vel *mitiores*, ubi *Carus* appellantur; uterque tamen perpetuum & graviolem soporem conjunctum habet. Alii Auctores hunc ordinem invertunt, & loco Comatis Lethargum pro symptomate febrili habent; alii etiam Carum graviolem esse Lethargo autumant & proximum ad Apoplexiam gradum.

III. *Signa.*

1 *Comatis.*

a *Somnolenti:*

- 1 Somnus præternaturalis profundus & diuturnus.
- 2 Ægri expergefatti delira quidem loquuntur, sed non ita pertinaciter ac in Comate vigili, cum sæpius eorum, quæ loquuntur, conscii sibi sint.
- 3 Mox vero expergefatti sibi relictis in priorem iterum somnum prolabantur.

b *Vigilis:*

- 1 Continuum dormiendi desiderium, cum oculorum ut plurimum clausura, sed nullo actuali somno stipatum.
- 2 Delirium pertinacius, jectigatio & inordinata commotio corporis, cum intermixtis quandoque clamoribus & vociferationibus conjuncta.

2 *Lethargi:*

- a Præcedunt fere ordinarie tremores, vertigines, cephalalgæ gravativæ, segnitie corporis, somnus profundus, aut magna in somnum propensio.
- b Incipit Paroxysmus sopore profundo & diuturno, ita ut ægroti sponte vix expergefiant, excitati autem plane immemores sint, & mox iterum in priorem soporem incidunt.
- c Pulsus est debiliior, calor vero, respiratio & color vix præternaturales; & quamvis prior quandoque aliquando exacerbetur, ut febrilis quid constituere videatur, ultra modum tamen non intenditur.

3 *Cari:*

- a Nullum delirium, neque tanta obliuio, ac in Lethargo.
- b Tactu vel clamoribus excitati percipiunt & audiunt, quid secum actum sit.
- c Mox autem in priorem soporem iterum prolabantur.
- d Aut juxta alios somnus adeo profundus, ut aciculis puncti membra quidem moveant, sed plane non excitentur.

IV. *Subjecta.*

- 1 Comati obnoxii sunt acute & maligne febricitantes, per regimina calidiora male tractati aut per opiata stupefacti, proprio & perverso Naturæ motu regurgitationes materiæ febrilis ad caput incurrentes.
- 2 Lethargum experiuntur Vulnerati, Narcoticis v. g. Tabaco, Hyoscyamo, Opio, Croco abusi, valde ebriosi, nimis curis & sollicitudinibus vexati.
- 3 Caro magis obnoxii sunt senes, phlegmatici, torpidi, otiosi, excretionis & secretionis mucido-færosæ materiæ vitio laborantes, catarrhis pectoris & capitis sæpius expositi.

V. *Prognosis.*

- 2 Comata per se quidem lethalia haud sunt, interim tamen nunquam non absque evidenti periculo occurrunt; inprimis si enormiores cephalalgæ & deliria præcessere.
- 2 Si sudor frigidus iisdem supervenit, actum de ægris est.
- 3 Lethargus, quo magis cum profundo sopore & memorie omnimoda prostratione conjunctus est, eo certius lethalis.
- 4 Lethargici septimum diem vix superant, imo plerumque ante septimum moriuntur, nisi excretio purulenta per aures, nares, aut infundibulum meliora iterum promittat, cui si adjungatur febris & reliquo-



rum symptomatum mitigatio, eo magis reconvalescentiæ spes habenda.

- 5 Pejus est Phrenitidi Lethargum supervenire, quam Lethargo Phrenitidem.
- 6 Tremor Lethargum excipiens periculosus.
- 7 In Senibus somnolentis, aliisque torpidis caro obnoxiiis, nisi vita otiosa in agilius genus mutetur, Apoplexia tandem supervenire solet.

#### VI. Remedia.

- 1 In Comate Vigili & Somnolento:
  - a Interne Cinnabarina, diaphoretica fixa, discutientia, Nitrat. absorbentia; Pulv. Bezoard. Hal. Cinnabar. diaph. Alexiph. Stahl's, Mixt. Simpl. Tra Bez. Mich. Nitr. depurat. Cinnabar. Conch. Oc.  $\mathfrak{E}$ . ppt.
  - b Lubricantia: Gelatin. C. C. Ebor. diluentia, sufficiens potus tenuis.
  - c Subacida: Sirup. acetos. Citr. Tinct. Ros. Violar. Succus Berber
  - d Externe camphorata, Ligaturæ extremorum, Vesicatoria, Bufonis applicatio & Sal. volatilia odoretenus usurpata.
- 2 In Lethargo & Caro:
  - 1 Sensum exsuscitantia & humores revellentia: Clysteres acriores & stimulantia, ex Fol. Senn. Colocynth. Fol. Tabac. Agaric. Extr. Helleb. nigr. c. f. q. Sal. Gemmæ, & Suppositoria ex similibus parata, Ligaturæ extremorum, Frictiones, Vesicatoria & Cataplasmata acriora, plantis pedum & volis manuum applicanda, odoretenus vero Salia volatilia adhibenda; ad exsuscitationem porro faciunt clamores, pilorum evulsiones, sternutatoria exhibita acu-puncturæ &c.
  - 2 Plethoram, si quæ adest, imminuentia: V. S. in pede administrata & quidem in primo statim principio, aut in assuetis Hirudinum applicatio.
  - 3 Sanguinem sincerum ad caput translatum temperant & discutunt: Cinnabarina, gelatinosa, diluentia, Nitrata, diaphoretica fixa, lenia alexipharmaca. Externe Camphorata, bufonis applicatio &c.
  - 4 Cruditates in subjectis phlegmaticis & pituitosis e primis viis eliminantia: Vomitoria, præmissis digestivis, adhibita, vel laxantia: Rhabarbarina, Helleborata, Sennata & Jalappina.
  - 5 Muciditatem terosam resolventia & per urinarias vias educantia. Tra Tart. Cinnabar. Tartarisata, resolvens Argent. Essent. Lignor. Pimpin. alb. Alexiph. Stahl. fortior.
  - 6 Nervosum genus roborantia: Essent. Succin. Spir. C. C. Sal. Ammon. Specif. cephal. Mich. interne adhibita. Externe vero Spir. Vini Camph. Cucuphæ, ex herbis nervinis & roborantibus.
  - 7 Nartorum, Venenorum & Sulphur. exhalationum vim infringentia: subacida cum alexipharmacis conjuncta, interne & externe in usum vocata, præmissis vel interposito, si e re videatur, Vomitorio.

#### Formule Remediorum.

##### 1 Clyster acrior.

R. Rad. Alth. Colat. R.  $\mathfrak{z}$ viiij.  
 Pyreth.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}$ ss. Add. Elect. hier. cum  
 Herb. Rut. Agar.  $\mathfrak{z}$ j.  
 Mnlv.  $\mathfrak{a}$ . Mfs.  $\mathfrak{O}$  Chamom.  $\mathfrak{z}$ vj  
 Pulp. Colocynth. in pet. Vit. Ov. No. j.  
 ligat.  $\mathfrak{z}$ j. Sal. Gemm.  $\mathfrak{z}$ j. M.  
 Coq. in f. q. Ter. font. F. Clyster.

##### 2 Alius,

R. Rad. Irid. nostr. Add. Elect. cathol.  $\mathfrak{z}$ j.  
 Alth.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}$ ss. Extr. Helleb. nigr.  $\mathfrak{z}$ j  
 Herb. Cent. min.  $\mathfrak{O}$  Oliv.  $\mathfrak{z}$ vj.  
 Branc. urfn.  $\mathfrak{a}$  Mfs. Vitell. Ov. No. j.  
 Fol. Senn.  $\mathfrak{z}$ j. Sal. Gemm.  $\mathfrak{z}$ j. M.  
 Coq. in f. q. Ter. f. F. Clyster.  
 Colat. R.  $\mathfrak{z}$ ix.

##### 3 Suppositorium acre.

R. Specier. hier. f.  $\mathfrak{z}$ j. Fell. Tauri inspissat.  $\mathfrak{z}$ j.

Sal. Gemm.  $\mathfrak{z}$ j.

c. f. q. Mellis f. l. a. Suppo  
 No. ij.

##### 4 Aliud,

R. Pulv. Agar.  $\mathfrak{z}$ j. Diagryd.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 Colocynth.  $\mathfrak{z}$ ss. c. f. q. mellis f. l. a. Suppo  
 5 Potio Vomitoria.

R. Syr. e. Cich. c. Rhab.  $\mathfrak{z}$ ss. Ter. Meliss.  $\mathfrak{z}$ j. M.  
 emet.  $\mathfrak{z}$ vj. Pro j. dosi.

##### 6 Pulvis Vomitorius.

R. Rhabarb. el. gr. XV. Sal. Polychr. gr. iv. M.  
 Tart. emet. gr. iij. Pro j. vice.

##### 7 Potio laxans.

R. Syr. fl. pers.  $\mathfrak{z}$ ss. Sal. polychr. gr. iv.  
 Diacyd. lucid. Jul.  $\mathfrak{z}$ ss. Ter. Meliss.  $\mathfrak{z}$ j. M.  
 Extr. helleb. nigr. gr. vij. Pro una dosi.

##### 8 Pulvis diaphoretico-discutiens.

R. Cinnabar. diaph. Nitr. depurat. a.  $\mathfrak{z}$ j.  
 Oc.  $\mathfrak{E}$ . ppt. Cinnabaris  $\mathfrak{z}$  ij.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
 Arcan. dupl. Dos.  $\mathfrak{z}$ j. ter l. 4. per diem

##### 9 Gelatina temperans.

R. Gelat. n. C. C. c.  $\nabla$  simpl.  $\mathfrak{z}$ j. M.  
 par.  $\mathfrak{z}$ vj. D. Cochleatim.

Add. Tab. e Succ. Citr.

##### 10 Potio diaphoretico-temperans.

R.  $\nabla$  Scorzon.  $\mathfrak{z}$  ii diaph. a.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 Meliss.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}$ ss. Tra rosar.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 C C. citr.  $\mathfrak{z}$ ss. Syr. acetos. Citr.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
 Oc.  $\mathfrak{E}$ . ppt. D. Cochleatim.

##### 11 Essentia discutiens.

R. Ess. alexiph. mitioris Dos. gutt. 35. ad 30. bis pe  
 Stahl, diem.

Mixtur. simpl. a.  $\mathfrak{z}$ ss. M.

##### 12 Alia diuretico-discutiens pro magis phlegmaticis.

R. Tra  $\mathfrak{z}$  ii acris, Pimpin. alb. a.  $\mathfrak{z}$ j. M.  
 Essent. Lignor. D. ut antea.

##### 13 Alia tonico-nervina.

R. Tinct.  $\mathfrak{z}$  acris. M. Dos. gutt. 25. ter pe  
 Essent. Succin. diem, præmissis præ  
 Spir. C. C. rectif. a.  $\mathfrak{z}$ j. mittendis.

##### 14 Species pro Cucuph.

R. Fol. Ros. mar. Benz. a.  $\mathfrak{z}$ j.  
 Majoran. Incis. contus. irror.  
 Puleg. a. Mfs.  $\mathfrak{O}$  dest. meliss.  
 Fl. Lavend. lavend. a. gutt. vi.  
 Salv. cinam. gutt. iij. M.  
 Lil. conv. a. p. j. F. Cucupha.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Comata futura nulla re certius præcaveri & præsentia subigi possunt, quam perita & ordinata febrium tractandi methodo, præscribendo nimirum illa remedia, quæ excretiones periphericas promovere, orgasmum contemperant, sanguinem diluunt, eundemque ad stases primum resolvunt. i. e. Absorbentia, Nitrata, Cinnabarina, Diaphoretica fixa, Gelatinosa, Emulsiva, & lenia Alexipharmaca; non neglectis externe Camphoratis, vertici, & temporibus largiter applicandis, Unguento alabastrino Camphor. Emu f. ex Nucl. perf. & Camphor. & in impetu vehementiori Vesicatoriis, frictionibus, Cataplasmatibus acribus pedibus, & Salibus volatilibus naribus applicandis.
- 2 Lethargus avertendus & domandus est partim internis resolventibus, discutientibus & temperantibus, partim Clysteribus & suppositoriis acribus, nec non Vesicatoriis.
- 3 Subjungantur in statu sanguineo, ubi translationes sanguinis in causa sunt, evacuationes sanguinis, in pede celebrandæ, i. hirudines, circa loca hæmorrhoidalia in assuetis, applicandæ.
- 4 Ubi vero phlegmatica & pituitosa constitutio potius malo originem dedit, ordinentur primo, loco Venæsectionis & hirudinum, Vomitoria, & laxantia Helleborata & Jalappina, subjungendo resolventia, & discutientia fortiora.
- 5 Quæ quidem methodus & Caro applicatur, commendando insuper ægroto agilius Vitæ genus.
- 6 Ubique curationi finis imponatur per nervina interne & externe usurpata.



7 In narcoticorum, carbonum & Venenorum sulphureis caput gravantibus inquinamentis ordinentur eadem Vomitoria, cum subjunctis alexipharmacis & diaphoreticis, subacidis maritatis.

8 Quod Diætam attinet, Sanguineis commendanda diluentia, potus & cibi tenuiores; pituitosis vero & serosis magis aromatica, Vini usus, cibi sicciores, assati.

#### VIII. *Cautele Præticæ.*

1 Causæ primariæ ubique examinandæ sunt, ut secundum easdem methodus medendi instituantur.

2 In febribus acutis verus somnus versus dies Criticos placide obveniens probe distinguatur a Comate: hoc enim medelas exposcit, ille sibi relinquendus & pro beneficio Naturæ habendus.

3 Comata ab opiatorum abusu excitata, per interna alexipharmaca & externa Salia volatilia, naribus applicata, quandoque auxilium recuperant.

4 Plethorici sanguinei Lethargo l. Caro correpti in primo statim principio evacuationes sanguinis celebrent, alias damnum magis quam emolumentum corpori parant.

5 Junioribus Vesicatoria, senioribus vero Fonticuli, pro materia serosa a capite avertenda profunt.

6 Cucuphæ serosis quidem & pituitosis auxilium præstant, roborando caput, & stases serosas discutiendo, sed sanguineis turbas majores afferunt.

7 Idem quoque sentiendum est de internis diaphoreticis <sup>o</sup>o<sup>o</sup> sis, aromaticis, spirituosiss; concedendo magis hæc pituitosis & phlegmaticis in refractori dosi, sanguineis vero temperatiora.

8 Somnus ubique interpellandus est colloquiis, sternutamentis, Sal. volatilium adhibitione externa, & ubi circumstantiæ illud permittunt, mobili vitæ genere.

9 Sternutatoriorum tamen usus magis phlegmaticis, quam sanguineis, concedendus est.

10 Anodyna in omnibus affectibus soporosis quam maxime vitentur, nec non carbonum sulphureæ stupefacientes exhalationes.

21 Phlegmaticis & serosis senibus imprimis noxia est autumnalis humida constitutio, nec non refrigeratio Capitis; unde hoc tempore præservantia in usum trahere debent.

### CAPUT QUINTUM.

#### D E

#### *Apoplexia.*

**I. Definitio.** **E**st affectus gravissimus, vel universalem sensuum & motuum abolitionem, vel motuum tantum plenariam privationem, sensuum autem aliqualem adhuc subsistentiam conjunctam habens, a stagnatione Sanguinis vel Serii, in Cerebro facta, originem habens, & ex improvviso ægrum corripiens & prosternens.

#### II. *Differentia.*

1 Dividitur in *sanguineam*, a Stasi Sanguinis ortum habentem, & *serosam* s. *pituitosam*, a seri vitiiis productam.

2 *leniorem*, motum cordis & vitæ signat adhuc relinquentem; & *fortiorem* uno quasi impetu ægrum corripientem & vitam privantem.

3 Differt a *Catarrho Suffocativo*, per prægressos capitis affectus serosos, Lippitudines, Cephalæas gravativas, & spumescentiæ oris, in *Paroxysmo* evenientem. Alias discretio amborum horum affectuum non est ita facilis.

4 A *Syncope*:

a Pulsus vel plenaria cessatione vel maxima saltem ejusdem imminutione, qui in syncope magis adhuc viget:

b Apertura & rigiditate oculorum, qui in syncope ordinarie clausi sunt;

c Rubedine quandoque faciei, quæ in syncope nunquam non pallida est:

d Stertore & sibilo pectoris, qui in syncope deest.

e Ab *Hemiplexia*, universali sensus & motus ablatione,

qui in hac in alterutro adhuc latere remanent.

#### III. *Signa.*

##### 1 *Generalia:*

a Præcedunt vertiginosa capitis mala, tinnitus aurium, Cephalæa obtusa in occipite, visus variæ interceptiones & obscuraciones, lassitudo corporis, dormiendi perpetuum desiderium, somnus profundus.

b Postea invadit quovis tempore ex improvviso, & ægrotos prosternit.

c Motus & sensus subito evanescent.

d Respiratio intercipitur, & fit cum stertore, oculi rigidi quasi vitrei & semi aperti tantum conspiciuntur.

e In leniori malo pulsus lenissima adhuc vestigia apparent.

##### 2 *Speciælia.*

###### a *Sanguineæ:*

α Major respirationis vis remanet, sensus autem prorsus.

β Facies & genæ rubent, & vasa circa tempora sunt inflata.

γ Ante mortem dentibus strident & convulsionibus tandem vitam finiunt.

δ Post mortem sanguis interdum ex ore & naribus erumpit, ipsum vero caput in miram attollitur magnitudinem.

ε In dissecto cerebro & quidem ejusdem ventriculis invenitur aliqua portio sanguinis extravasati.

###### β *Serosæ:*

α Motus omnes uno quasi impetu cessant.

β Respiratio etiam maxime turbatur & loco illius stertor & sibilus occurrit.

γ Facies pallet & nulla conspicitur venarum inflatio.

δ Circa mortis articulum spuma ante os erumpit.

ε Cerebrum autem dissectum in Ventriculis, loco sanguinis, aliquid feri extravasati ostendit.

#### IV. *Subjecta.*

1 Apoplexiæ sanguineæ expositi quandoque sunt juvenes plethorici, Baccho litantes, iracundi.

2 Frequentius viri & senes Plethorici, junioribus annis Hæmorrhagiis spontaneis vel artificialibus affuefacti, in senio vero iisdem privati.

3 Serosam experiuntur magis phlegmatici & pituitosi senes, vitam otiosam agentes, & somnolentiæ dediti.

4 Quibus ulcera inveterata spontanea vel artificialia curata fuere, aut catarrhi, tusses, pedum sudores repressi.

5 Nimias sanguinis & seminis profusiones passi.

6 Utramque facilius incurrere possunt, qui hæreditariam dispositionem possident.

7 Illi denique etiam non raro Apoplectici moriuntur, qui contusiones, aliasque capitis læsiones experti fuere.

#### V. *Prognosis.*

1 In Apoplexia, quo magis offenditur respiratio, eo fortior est morbus, quo minus, eo debilior. *Bagliv.*

2 Apoplectici plerumque intra paucas horas moriuntur & rarius ultra 24. horas vitam protrahunt.

Vidi tamen Anno 1697. Virginem 17. annorum ob suppressionem mensium diuturna Apoplexia correptam, quæ sub finem demum tertii diei moriebatur.

3 Quandoque tamen Apoplexia, si levior fuerit, in Paralyfin alicujus membri transit.

4 Febris superveniens salutaris, quamvis hoc in pituitosis rarius contingat.

5 Qui post superatum paroxysmum denuo vertiginosi fiunt, novos insultus expectent.

6 Si Apoplexiæ sanguineæ convulsionibus capitis superveniunt, actum de ægro est.

7 In Pituitosa, spuma oris lethalis. *Hipp. 2. Aphor. 43.*

8 Quando pulsus ex parvo fit magnus, & sensim in magnitudine crescit, brevi moriuntur. *Bagliv.*

9 Omnes Apoplectici sanati facillime novos paroxysmos incurrunt.



- 10 Si post Venæsectionem respiratio fit liberiori & pulsus quoque bene se habet, salutem prædicere poteris. *Bagliv.*
- 11 Clysteres in minori quantitate injectos iterum effluere, malum: denotat enim totalem toni resolutionem.
- 12 Quando patientes evadunt, sensuum debilitatem, paralyfes partium, tremores artuum & similia incommoda reportant.
- 13 Qui Apoplexia correpti fuere, frequentibus flatibus & borborygmis fiunt obnoxii.

VI. *Remedia.*

- 1 Sanguinem superfluum in capite stagnantem revelentia & evacuantia, Venæsectio in brachio large ad  $\mathfrak{z}$ vij. x. instituta, & subjuncta, si circumstantiæ illam suadeant, raninarum & frontaliū venarum incisio.
- 2 Serosam muciditatem eliminantia: Vomitoria, & quidem specificè ad commendationem Langii Sal Vitriol. f. Gilla Paracelsi a  $\mathfrak{d}$ j. ad  $\mathfrak{z}$ ss. in f. q. jusculi vel aq. stillatit. exhibitum, Clysteres acres ex Urina puerorum, Fol. Senn. Tabac. Colocynth. Sale comm. Gemm. Sapon. Elect. hier. picr. Extract. Helleb. nigr. Tartar. emet qui Clysteres & in causa sanguinea & serosa pro sensu excitando simul utiles sunt.
- 3 Naturæ sensum, præter nominatos Clysteres, revocantia: frictiones extremorum, Ligaturæ, Sinapismi, Vesicatoria, Vertici & Nuchæ aut etiam plantis pedum applicata, spiritus & Salia Urinosa naribus excepta & linguæ illita, Spiritus nervini, Camphorati & Succinati, vertici, temporibus & fronti appliciti, concussiones, vellicationes, acclamationes.
- 4 Specifica: Bufones exiccati, Vertici impositi,  $\circ\circ$  Succini, ejusque balsamus, Nuchæ temporibus & Vertici illita.
- 5 Interne nervina efficacia se commendantia: Cinnabarina, Lumbrici terrestres, liq. C. C. succinat. Essent. Succin. Spir. C. C. Essent. dulc. Hal. ord. & concentr.
- 6 Febrem supervenientem discutientia: diaphoretica fixa, absorbentia, Cinnabarina, in orgasmo sanguinis additis Nitrosis.

*Formule Remediorum.*

## 1 Pulvis emeticus.

Rx. Salis Vitriol. f. Gill. Pa- D. pro una dosi.  
rac.  $\mathfrak{z}$ ss.

## 2 Clyster acrior.

Rx. Herb. Salv. Coq. in f. q.  $\nabla$  f.  
Rut. Colat. Rx.  $\mathfrak{z}$ vij. lviij.  
Origan. a. Mj. Adde Elect. hier. picr.  $\mathfrak{z}$ ss.  
Fol. Senn.  $\mathfrak{z}$ j. Mel. anthos.  $\mathfrak{z}$ j. M.  
Colocynth.  $\mathfrak{z}$ j. f. l. a. Clyst.

## 3 Alius.

Rx. Rad. Aristol. rot.  $\mathfrak{z}$ vij. vel  $\mathfrak{z}$ viiij.  
Cyclam. a.  $\mathfrak{z}$ j. Dissolv. Exoract. Helleb.  
Herb. Rut. nigr.  $\mathfrak{d}$ j.  
Ror. mar. a. Mj. Elect. hier. picr.  $\mathfrak{z}$ ss.  
Agar.  $\mathfrak{z}$ j. M. pro Clystere.  
Coq. in f. q. aq. f. In Colat.

## 4 Spiritus resuscitans externus.

Rx. Aqu. R. g. Hurg. Salis ammon.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
Sir. lil. convall. a.  $\mathfrak{z}$ j. Naribus admovendus.

## 5 Sal volatile.

Rx. Sal volatil. Urin.  $\mathfrak{z}$ j. Admoveatur naribus &  
Succin. volat.  $\mathfrak{z}$ ss. M. affricetur linguæ.

## 6 Balsamus nervinus.

Rx. Bals. Succin.  $\mathfrak{d}$ j.  $\circ\circ$  dest. cinam. gutt. iiij. M.  
Apopl.  $\mathfrak{d}$ ss. Vertici & nuchæ illinatur.  
Axung. castor. gr. vj.

## 7 Potio nervina interna.

Rx. Aq. Salv. Cinnabar.  $\mathfrak{d}$ j.  $\mathfrak{d}$ ss.  
Fl. Til. Liq. C. C. succinat.  $\mathfrak{z}$ ss.  
Tuniv. a.  $\mathfrak{z}$ j. Syr. Pæon.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
Apopl. us.  $\mathfrak{z}$ ss. D. cochleatim.  
Pulv. Lumbr. terrestr.  $\mathfrak{d}$ j.

## 8 Essentia nervina.

Rx. Spir. C. C. rectif.  $\mathfrak{z}$ j. Dos. gutt. 25. vel 30. bis vel  
Essent. Succin. ter per diem.  
dulc. Hal. a.  $\mathfrak{z}$ j. M.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Apoplexia sanguinea præcipue Venæsectionem exposcit, & quidem largam. Quodsi turgescencia valorum in capite, post celebratam Venæsectionem in brachio, remaneat, vena frontis vel ranina aperiri potest.
- 2 In phlegmatica vero s. pituitosa Curæ initium a Vomitorio faciendum.
- 3 Subjungendi in utroque casu Clysteres tam pro alvo referanda, quam sensu Naturæ excitando, quem in finem debent esse acriores, stimulant.
- 4 Ut autem activitas Naturæ eo citius revocetur non negligenda sunt externe, quæcunque sensum fortiores excitare possunt, v.g. Vesicatoria, Sinapismi, Salia volatilia urinosa & similia.
- 5 Interne autem, post præmissa universalia & externa exsuscitantia, ordinanda sunt nervina, ubi specialem effectum Essentia dulcis, aliaque ex auro parata remedia exhibent, interponendo diaphoretica fixa, si forte febris sese adjunxerit.
- 6 Præservative suadendæ sunt sanguineis æquinoctiales V. S. phlegmaticis vero laxationes, Diæta parca, motus corporis, & interpositus remediorum nervinorum exquisitorum usus.

VIII. *Cautela Præcticæ.*

- 1 Venæsectio sicuti pituitosis, sic Vomitoria sanguineis nocent.
- 2 Quam diu Apoplexia fortior deglutitionem remediorum prohibet, ab omnibus internis abstinendum est: quia facile arteriam asperam ingrediuntur.
- 3 Clysteres in minori injiciendi sunt quantitate: facile enim iterum effluunt.
- 4 Vesicatoria magis in pituitosis, quam sanguineis, locum habent: in illis satis efficaciter quandoque se gerunt.
- 5 Frictiones optime in pedibus instituuntur cum panis asperis calefactis.
- 6 Ori spirituosa parce sunt imponenda, lingua potius fricanda salibus volatilibus.
- 7 Specificam quidem efficaciam Fol. Hellebr. nigr. balsamico tempore collectis quidam adscribunt, sed hoc ulterioris experientiæ committendum est.
- 8 Vita otiosa, lauta Diæta, Spir. Vini abusus, carbonum effluvia, aer humidus autumnalis, apoplecticis admodum noxia sunt.
- 9 Salia volatilia oleosa interne & externe usurpata sanguineis nocent magis, quam prosunt, Phlegmaticis vero in parciore dosi possunt concedi.

## CAPUT SEXTUM.

## D E

*Paralyfi & Hemiplexia.*

I. *Definitio.* Sunt motus tonici vitalis, repentinæ remissiones, in hac vel illa corporis parte contingentes, cum motus & ut plurimum etiam sensus læsæ partis privatione conjuncta.

II. *Differentia.*

- 1 *Ratione partis affectæ, est vel*
- a *Universalis*, quando omnes partes infra caput positæ, vel etiam dimidia totius corporis pars, ubi specialiter Hemiplexiæ nomen assumit, hac motus tonici desertione afficiuntur;
- b *Vel particularis*, ubi in his vel illis partibus seorsim v.g. vesica, ano, lingua, pede alterutro vel brachio hoc obtingit; unde Paralyseos variorum constituntur species.
- 2 *Ratione gradus, est vel*
- a *Perfecta* cum sensus & motus omnimoda privatione conjuncta, ubi proprie Paraplexia audit;
- b *Vel imperfecta*, quando motus quidem perit, sensus autem remanet, quod in spuria illa scorbutica contingere solet, ubi doloribus satis acerbis tendentibus, atque trahentibus afficiuntur.

III. *Signa.*1 *Generalia:*



- a Invasio vel subitanea vel successiva, præcedente partium torpore, debilitate, movendi & sentiendi aliquali defectu.
- b Motus tonici in affecta parte remissio, ita ut flaccidi in morem pristinum nequeat.
- c Abolitio etiam, in graviore malo, sensus, ut ulla & secta pars nullum dolorem percipiat.
- d Quo in casu plerumque pars redditur flaccida & frigida, ut etiam humores irruentes eandem insigniter inflent.
- e Malum in pejus ruens non raro sequuntur spastica & convulsiva pathemata vel etiam affectæ partis sphacelus.

## 2. Specialia.

## a Hemiplexia.

- α Alterutrum totum latus motu & sensu destituitur, cum tumida & livida quandoque ejusdem inflatione.
- β Loquela vel plenarie intercipitur, vel insigniter saltem læditur, ita ut non nisi balbutiendo loqui possint.
- γ Præcedunt fere ordinarie artuum lassitudines, stupores, tremores, palpitationes, sensuum motuumque perturbationes & debilitates, stridorque dentium sub somno.
- δ Concurrunt sensuum internorum obnubilationes obliviscentia, & somnolentia.
- ε Superveniunt in graviore statu vel universales vel particulares Convulsiones, aut ipsius partis necrosis.

## b Paralyseos Oris.

Os ad alterum latus distorquetur, & hoc vel symptomatice in Hemiplexia contingit, vel seorsim & idiopathice.

## c Lingua:

Sermocinatio l. deficit plenarie, vel læditur insigniter ex balbutie cognoscenda.

## d Musculorum Pharyngis:

Vel solidorum, vel liquidorum deglutitio impedita.

## e Paresis:

Præcedunt immania tormina colica, quæ perperam tractata exteriorum artuum Paralysis excipit.

## f Sphincteris ani:

Fæces involuntarie exeunt.

## g Vesicæ.

Urina continuo effluit.

Aliæ particulares sensibus facile sese offerunt.

## IV. Subiecta.

- 1 Sanguineo-Phlegmatici, Melancholici, & Phlegmatici.
- 2 Seniores, otiosi, somnolenti, debiles.
- 3 Vinis calidioribus, aut cum lithargyrio adulteratis, inscie usi.
- 4 Frequenti Mercurialium tractatione occupati.
- 5 Evacuationes sanguinis solennes negligentes.
- 6 Fæminæ in ultima mensium periodo constitutæ, eorumque malo successu affectæ.
- 7 Juvènes admodum plethorici, imo aliquando quoque pueri & infantes a febribus exanthematis male tractatis, contusionibus, convulsionibus.
- 8 Sudorum spontaneorum antea consuetorum emanatione laborantes.
- 9 Veneris castra nimium & frequentius, præcipue post crapulam, frequentantes.
- 10 Gravioribus doloribus spasticis vexati.
- 11 Dislocationes & distorsiones artuum incurrentes, ab imperito Chirurgo postea neglecti.
- 12 Vesicæ Paralysis obnoxii sunt fæminæ, puerperis, gravioribus defatigatæ, nec non calculosi, qui insigniores calculos excrevere, aut a vi quadam externa in sphinctere vesicæ damnum reportavere.
- 13 Ani Paralysis experiuntur quandoque hæmorrhoidarii, & dysenterici, nec non qui tenesino frequenter obnoxii sunt, aut qui frigori nimium exponunt anum.

## V. Prognosis.

- 1 Paralysis est morbus curatu admodum difficilis, & quo magis inveteratus, eo minus auxiliis medicis obedit.

- 2 Quod sitamen tremor & dolor æcedant, bonum & ut plurimum motus redituri indicium præbent.
- 3 Paresis ex Colica, uti admodum rara, ita curatu vix facilior quam ipsa Paralysis, præcipue si æger jam annosior sit.
- 4 Paralysis in junioribus, nisi mature medela afferatur, recrudescentiæ metuenda & quidem cum majori periculo, plerumque Hemiplexia, Apoplexia & ipsa morte stipata.
- 5 Quando post universalem Paralysis pars affecta redditur tumida & sensim livida, sphacelus metuendus est.
- 6 Paralysis particularem & leviores sæpius excipit aridura.
- 7 Quando post crapulam Hemiplexia vel Paralysis contingit, omnimodam fere memoriæ & ingenii privationem post se ducit.
- 8 Conjuncta ut plurimum est linguæ Paralysis, quæ in junioribus per plures annos subsistere potest, in annosioribus autem novo & fortiori insultui sternit viam.
- 9 Paraplegia, quæ Apoplexia succedit, sanata mox plerumque recurrit.
- 10 Quandiu membra paralytica adhuc sunt calida, spes restitutionis adhuc superest.
- 11 Quæ a vi externa contingit Paralysis, plerumque difficillime sanatur.
- 12 Hemiplexia, ubi dimidia etiam capitis portio est affecta, citius in veram & constantem medelam admittat.
- 13 Quo magis motus in eadem supprimitur, eo minus spes superest, imprimis, quando, ob pulmones læsos, aer non nisi cum stertore expiratur.
- 14 Omnis universalis Paralysis periculosior est particulari & difficiliorem etiam Curam admittit.

## VI. Remedia.

- 1 Plethoram imminuit & evacuationes sanguinis assuetas relâcit in ætate adhuc vegetiori V. S. larga, vel Scarificatio.
- 2 Cruditates primarum viarum evacuantia alvumque adaperiunt Vomitoria: Tart. emeticus, syrup. emet. Purgantia: Extract. Helleb. nigr. Trochisc. alhand. Phil. e Succin. Craton. Noduli laxativi ex Herb. appropriatis & laxantibus parati, nec non Clysteres nervino-carminativi.
- 3 Sanguinem & humores ad æqualem iterum circum disponunt lenia alexipharmaca, cum interpositis diaphoretico-Cinnabarinis.
- 4 Partem relaxatam roborant interne Sal. volatilia cum Tincturis alcalinis acribus combinata, succinata, Essent. & Succin. Liqueor. C. C. succinat. o. v. Spir. sis, infusa ex Beton. Meliss. Ror. mar. Chamædr. Chamæp. Puleg. Lavend. Stæch. Arab. Teucr. Mar. ver. Lil. convall. Schœnant. Salv. Calend. Cort. Orum, winteran. Cinam. specificæ Pulvis Lumbr. Terrestrium, Pilulæ wildegansii. Externe Fofus, Sacculi, Linimenta, Spiritus ex Rad. Imperat. Helen. Angel. Cyper. Irid. Flor. Herb. Origan. Siderit. Chamom. Matricar. Absinth. Basilic. Fl. Lavend. Melilot. Lil. convall. Gumm. Galban. Ladan. bedell. Styrac. Calam. Ambr. Mosch. Zibeth. Spir. Formic. Lumbr. terrestr. Serpill. o laterin. Vulpin. Juniper. Spic. Petrol.
- 5 Sensum amissum invitant Frictiones cum pannis asperioribus calefactis, Sinapismi, Embrocationes, Urticationes.

## Formula Remediorum.

1 Potio emetica.  
R. Syr. emet. ℥vj. Aqu. meliss. ℥ss. M.  
Sal. polych. gr. vj. pro una dosi.

2 Potio laxans.  
R. Syr. e pom. lax. ℥ss. gr. vj.  
Diag. yd. lucid. ℥al. ℥ij. Aqu. fl. acac. ℥j.  
Extract. Helleb. nigr. Ms. pro vice.

3 Potio nervina.  
R. Aqu. Pæon. Specif. cephal. Mich. ℥ss.  
Paralyf. Spir. Tart. rectif. ℥j.  
Fl. Til. a ℥j. Syr. e Beton. ℥ss. M.  
Apopl. Lang. ℥ss. D. Cochlearim.

Bb 3

4 Ef-



## 4 Essentia alexipharmaco-nervina.

R. Ess. alexiph. Stahl. ʒj. Ms Dos. gutt. 30. mane in  
Succin. ʒj. jusculo vel infuso pro-  
pinanda.

Spir. C. C. ʒss.

## 5 Infusum cephalico-nervinum.

R. Herb. Meliss. Lil. convall. ʒ p. j.  
Beton. Incis. Coq. in Vin. generos.  
Ror. mar. ʒ Mss. pro collutione oris.  
Fl. Tunic.

## 6 Sacculus nervinus.

R. Herb. Salv. Saehad. Arab.  
Lavend. Melilot. ʒ p. j.  
Hyssop. Bacc. Junip. ʒss.  
Ror. mar. ʒ. Mss. Sem. Sinap. ʒj. M.  
Pl. Cheir. Incis. contus. includ. saccul.

## 7 Spiritus nervinus.

R. Spir. Vini. Camph. ʒj. Tartar. rectif. ʒj.  
Lumbr. M.  
Formic. ʒ ʒss. pro usu externo.

## 8 Linimentum nervino-emolliens.

R. Axung. human. ʒj. ʒss.  
vulpin. dest. junip. ʒij. M.  
lumbric. terrest. ʒ.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In ætate juniore vel habitu corporis plethorico & in-primis, ubi evacuationes sanguinis consuetæ negle-ctæ fuere, larga instituatur Venæsectio.
- 2 Subjungatur, pro revocando sensu & alvo aperienda clyster acrior, aliquot vicibus repetendus, simul & in usum vocatis irritantibus & excitantibus aliis.
- 3 Deinde Ventriculus, & intestina repurgentur, vel in emetis per Vomitum, vel, ubi circumstantiæ hoc dissuadent, per laxans helleborinum.
- 4 Æqualitas circuli sanguinis restituatur per diaphore-tica fixa & regimen æqualiter diaphnoicum.
- 5 Tandem partium tonus relaxatus roboretur per ner-vina interna & externa.
- 6 In Linguae Paralyfi præter superius dicta specialiter usum habent Decocta, ex herbis acrioribus & ner-vinis, pro colluendo sæpius ore præscripta.
- 7 In Parefi ex Colica præprimis conveniunt abstergen-tia digestiva, & quæ leni carminativa efficacia præ-dita sunt.
- 8 In Ani & Vesicæ Paralyfibus præter interna usurpari debent externa nervina, sacculi nimirum ex Herb. a-romat. cum Castoreo & Emplastris nervos & sphin-cteres roborantia.
- 9 Ubi aridura Paralyfin excipit, ibi conveniunt pin-guedines animalium cum nervinis commixta.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 Venæsectio non nisi in malo recenti & hominibus adhuc vegetioribus, huic evacuationi assuetis, lo-cum habet.
- 2 In annosiori corpore & antiquiori malo non tantum vana in eadem spes ponitur, sed etiam facile fini-ster eandem sequi potest effectus.
- 3 In sanguineis acriora & calidiora externa, Urtica-tiones, Sinapismi non tantum inflammationi partis affectæ, sed & quandoque ipsi sphacelo viam sternunt.
- 4 Unde ab iisdem imprimis sibi cavendum est, quan-do universalia nondum præmissa sunt.
- 5 Nocent etiam in illo casu, ubi non tam Paralyfis quam stupor adest, ab infarctu humorum originem habens.
- 6 Emplastica non nimis sint mucosa, glutinosa & re-sinosa, calida, sed tenera penetrandi efficacia præ-dita.
- 7 Emollientia ungui & nosa non tam in Paralyfi, quam in rigore & aridura partium, ab externa vi ortum ducent conveniunt.
- 8 Castoreum a Practicis præcipue laudatur, sed ejus u-sum internum plerumque majora insequuntur in-commoda.
- 9 Olea destillata, partim ab Auctoribus pro usu exter-no celebrata, nunquam sola in usum trahenda sunt, sed cum aliis spirituosissimis commiscenda, ne eorundem usum inflammatio partis & sphacelus sequatur.
- 10 Liq. C.C. succin. in paralyticis & convulsivis in-fantum affectibus bene se gerit, in adultis vero o-

mnia Sal. volatilia cum cautione sunt ordinanda; præstat eadem cum Tinctura quadam alcalica acri commiscere.

- 11 Oleum Limacum, Scarab. majal. variæ axungiae, pro Paralyfi curanda laudata, spem non adimplent.
- 12 Melius se gerunt animalia viva dissecta & parti affe-ctæ imposita, sed multoties repetenda applicatio.
- 13 Epithemata & Sacculi ex nervinis parati melius in sicca, quam humida aquosa, forma imponuntur. Commodissime autem spiritu Fornicarum acido aut Serpili vel alio penetrante nervino imbuuntur.
- 14 Thermae quandoque etiam non sine utilitate in usum trahuntur, magis tamen Phlegmaticis quam sangui-neis conveniunt: his non nisi præmissis universali-bus ordinandæ sunt.
- 15 Paralytici, si siccioris sunt naturæ & calidioribus re-mediis tractantur, Hecticam incurrunt.
- 16 Alexipharmaca nunquam cum sudorifico regimine ordinanda sunt, sed saltem diaphnoico scopo; hinc optime diaphoreticis Nitrata & Cinnabarina admi-scentur.

## CAPUT SEPTIMUM.

## D E

## Lipothymia &amp; Syncope.

I. *Definitio.* Sunt subitaneæ actionum vitalium & anima-lium imminutiones vel abolutiones a defe-ctu motuum Vitalium, inpr. pulsus, originem trahentes.

II. *Differentia.*

- 1 Aliæ sunt *simplices*, quæ citra alios morbos eveniunt; aliæ *complicatae*, quæ aliis morbis accedunt & super-veniunt v. g. Febris acutis & malignis, Scorbuto, Passioni hystericae, &c.
- 2 Aliæ sunt *mitiores*, cum pulsus & respirationis ali-quali sensu stipatae, quæ *Lipothymia* constituunt; aliæ *fortiores*, cum plenaria actionum vitalium & animalium prostratione conjunctæ, quæ *Syncope* nominari solent.
- 3 Gravior etiam Lipothymia sive *Albhyxia* flacciditate membrorum ab ipsa morte distinguitur, ut pote quæ rigiditatem partium post se ducit.

III. *Signa.*

- 1 Ingruunt vel sensim vel subitaneæ.
- 2 Antecedunt in priori casu oculorum obscuraciones, languores totius corporis, volatici calores, pallores faciei, sudoris in externo corporis habitu & præci-pue fronte eruptiones, anxietates cardialgicæ.
- 3 Ipsi vero paroxysmi incipiunt cum sensus & motus privatione, interceptione vocis, pallore faciei, ex-tremorum frigore, pulsus & respirationis eximia imminutione.
- 4 In Lipothymia quidem aliqualis pulsus cum respi-rationis indiciis adhuc percipitur; In syncope vero plenaria pulsus & respirationis interceptio observa-tur.
- 5 In utroque casu instar mortuorum corruunt, occu-los claudunt, ore quandoque hiant & veram quasi mortis imaginem præbent.
- 6 Membra præterea sunt flaccida, non vero rigida, a quo proprie ab ipsa morte discernuntur hi affectus.
- 7 Tandem iterum sensim sensimque ad se redeunt, & antequam pristinas receperent vires, profunda sus-piria trahunt.

IV. *Subiecta.*

- 1 Lipothymia expositæ sunt personæ sensibiliores, meticulosæ & diffidentes, temperamento Melancho-lico, vel Phlegmatico-Melancholico præditæ.
- 2 Nimiis sanguinis profusionibus, laboribus & dolori-bus insolitis exhaustæ.
- 3 Animi pathematibus insigniter exagitatae, inprimis immediate post assumptos cibos.
- 4 Febris acutis & malignis laborantes.
- 5 Hyperemeses l. hypercatharses incurrentes.
- 6 Diarrhœis l. Dysenteris diuturnioribus admodum debilitatæ.



- 7 Vires exercitio nimio confuentes.  
 8 Puerperæ, partum laboriosorem sanguinisque profusiones passæ.  
 9 Gravidæ & inprimis juniores vestimentis suis pectoris & abdominis regiones admodum constringentes.  
 10 Solennes etiam sunt iis, quibus Venena improvide vel nefande data fuere.  
 11 Ut & dispositionem quandam hæreditariam ad hos affectus possidentibus.  
 12 Syncopitici insultibus præprimis expositæ sunt feminae hystericæ, spissiori sanguine laborantes, concurrentibus animi insignioribus pathematibus, tristitia, terrore, iracundia, Diætæ vitiis.  
 13 Nec non febribus biliosis causodeis, aliisque malignis, magnum periculum præ se ferentibus, laborantes.

V. *Prognosis.*

- 1 Lipothymia levioribus morbis & causis succedentes minus periculi portendunt, potiusque sensibilitatem Naturæ indicant.  
 2 Quo gravioribus autem morbis superveniunt, eo majoris periculi suspicionem præbent.  
 3 Morbos acutos cum Lipothymia incipere periculosum est, nisi dispositio ad easdem meliora sperare jubeat: ipsi vero statui easdem supervenire adhuc periculosius: versus criticos autem dies accidere, melioris spei: cum hic Natura ob motus eluctatorios sæpius trepidationibus sit obnoxia.  
 4 Dysenteria cum Lipothymia incipientes plerumque malignitatem indicant, præsertim si nulla dispositio adsit.  
 5 Quo magis absque causis evidentibus in morbis præcipue acutis ingruunt, eo majus periculum metuumdum est.  
 6 Quo diuturniores & frequentiores sunt Lipothymia, eo magis de ægrotis timendum est.  
 7 Syncope semper periculosa est Lipothymia, & diutius durans sæpe mortem post se trahit.  
 8 Syncopen graviolem quandoque febres excipiunt.

VI. *Remedia.*

- 1 Motus Naturæ resuscitantia, sensumque restituentia: cephalica & nervina penetrantiora, odoretenus usurpata, spir. Lil. convall. C. C. Sal. am Aqu. Regin. hungar. cum Ol. destill. suavioribus, v.g. Cinam. Caryoph. Lavend. Meliss. combinata: subitanea gelidæ adpersio, relaxatio vestium, sternutatoria, Salium volatilium linguæ applicatio, frictiones, & in casu urgentiori Clysteres acres.  
 2 Virium debilitati & Naturæ labefactatæ succurrentia: analeptica, Aqu. Borrag. Bugloss. Meliss. Ceras. nigr. Rub. id. Perlat. Namph. Cinam. Cinamom. buglossat. spec. de Hyac. Conf. de Hyacinth. Alkerm. Corall. r. ppt. Matr. perl. ppt. Julep. gemmat. Syr. e. Cinam. Acetof. Citr. Vinum generosum, Crocus in jusculis, Essent. dulc. Hal. ordin. & concentr. Emulsione, Gelatinosa.  
 3 Febrem supervenientem discutientia, alexipharmaca: Essent. alexiph. Stahl. Tinct. B. zoaid. Michael. Ess. Scord. Tra. Jij, Tart. diaphoretico fixa: J. diaph. Bez. min. Cinnabaris Jij, cum Sal. digestivis & pro circumstantiarum ratione, Nitr. conjuncta.

*Formula Remediorum.*

## 1 Spiritus resuscitans.

R. Aqu. Reg. Hung. Sal. Ammon. Jij. M.  
 Spir. Lil. convall. a. Jij. applicetur naribus.

## 2 Alius fragrantior.

R. Aqu. Reg. Hung. Jij. Caryoph.  
 Spir. Sal. Ammon. Jij. a. gutt. vj. M.  
 Ol. dest. Cinam.

## 3 Alius pro mulieribus.

R. Spir. Vin. alkohol. Jij. Essent. Castor. a. Jij. M.  
 C. C.

## 4 Potio analeptica.

R. Aqu. Borrag. Bugloss. Matr. perl. ppt. a. Jij.  
 Ceras. nigr. a. Jij. Conf. de hyac. inc. Jij.  
 Cinam. bugloss. Jij. Julep. gemmat. Jij. M.  
 Corall. r. ppt. D. Cochlearim.

## 5 Alia.

R. Aqu. Meliss. Matr. perl. ppt. a. Jij.  
 Rub. id. Essent. dulc. Hal. Ord. Jij.  
 Namph. Syr. Acetof. Citr. Jij. M.  
 Perlat. a. Jij. D. ut antea.  
 Bez. min.

## 6 Pulvis diapnoicus.

R. Oc. Jij. ppt. Cinnab. Antim. gr. XII.  
 Jij. ai. ph. M. D. versus vesperam &  
 Tartar. Virol. somni tempus,  
 Nitr. depurat. a. Jij. div. in 4. p. aq.

## 7 Essentia discutiens.

R. Tinct. Antimon. Tartar. Scord. a. Jij. M.  
 Ess. alexiph. Stahl. D. gutt. 30. Mane in jusculo

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Respicendum est, an affectus idiopathice vel sympathice obvenit. Illo in casu ante omnia Natura exsuscitanda est per externam Salium volatilium applicationem, adhibita sternutamenta, & subjunctum, si e re videatur, Clysterem.  
 2 Dein analeptica interna post recuperatos sensus locum habent, & pro Febre præcavenda alexipharmaca leniora.  
 3 In Symptomático vero affectu & in specie illo, qui febribus quandoque sese adjungit, adhibenda sunt, præter interna diaphoretica fixa & alexipharmaca, analeptica mitiora ex syrupo acetos. Citr. aquis Borrag. Bugloss. Namph. Rub. id. Perlat. Conf. de Hyac. Tab. Man. Christ. perlat. & similibus.  
 4 Quando uteri vitia subsunt habitualia, locum habent Pilulæ Polychrestæ D. Schali, & Beccheri veræ, Elix. antihypoch. Hal. quod est Miltura simpl. probe acidulata & extract. Panchymag. Croll. aliqui paratum esse volunt, nec non digestiva: Tart. vitriol. Arcan. dupl. cum interposito pedilavium usu.  
 5 Hyperemesi & exinde xortæ Lipothymia medentur Theriacalia correctæ in Vino calido exhibita, vel ipsum Vinum calidum aromatizatum.  
 6 Muciditates in stomacho, si in culpa sunt, exposcunt digestiva & subjunctum Vomitorium.  
 7 In gravioris vero iracundia causa mature exhibenda sunt absorbentia & Nitrosa, & ubi spontaneus jam Vomitus nondum secutus est, lenè emeticum.  
 8 Quæ nimis humorum profusionibus supervenit Lipothymia, tractanda est methodo superius enarrata & præcavenda gelatinosorum, emulsivorum & lautæ diætæ usu.

VIII. *Cautele Prædictæ.*

- 1 In Lipothymia leviori Clysteribus opus haud est; adhibendi demum sunt, quando exsuscitantia externa nil fecere.  
 2 Quamdiu Patiens nondum ad se rediit, interne nihil exhibendum est: quia medicamenta ob partium flacciditatem & deglutendi impotentiam facile arteriam asperam ingrediuntur.  
 3 Analeptica interna non sint admodum spirituosæ: facile enim Febri ansam dant, eandemque postea fovent. Præstat itaque semper mitiora adhibere.  
 4 Motus corporis, animique compositio hilaris ægrotis post superatum paroxysmum suadenda. Somnus vero per aliquot horas interdicens est.  
 5 Venæsectio lipothymicis affectibus per se consideratis haud debetur, nisi Plethora & spissitudo sanguinis occasionem subministraverit.  
 6 In Lipothymia a terrore orta, præter alia appropriata, inprimis resolventia locum habent.  
 7 Admodum familiare quibusdam est, ut post Venæsectiones administratas Lipothymias incurrant, ubi nil citius quam gelidæ affusio, & patientis tranquillæ continentia medelam affert. Inprimis autem talibus venæ per fasciam non nimis sunt ligandæ. Vinum generosum ante Venæsectionem sumptum sæpius hæc Lipothymias præcavet.  
 8 Refrigerium corporis Lipothymia obnoxia nocet, moderatus vero & continuus calor eximie eisdem refocillat.



## CAPUT OCTAVUM.

D E

## Uvula Prolapsu.

**I. Definitio.** **U** Vulvæ prolapsus est iusto longior ejus descensus. elongatio, sub deglutitione potissimum sensum molestum pariens, a lymphæ serosa intus stagnante & organi relaxatione originem habens.

**II. Differentia.**

- 1 Uvulæ simplex prolapsus distinguendus est ab ejusdem inflammatione, ubi præter elongationem, rubor, ardor & summus dolor occurrit.
- 2 Ab ejusdem exulceratione, quæ pariter summum dolorem antecedentem habet, & inflammationi prægressæ plerumque originem debet.

**III. Signa.**

- 1 Conspicitur ejusdem elongatio & laxitas, si lingua depressa, in interiora faucium videmus.
- 2 Colorem servat suum naturalem, sed quoad formam satis oblonga & tenuis redditur, ita ut in guttur pendeat l. supra linguam jaceat.
- 3 Sub Deglutitione parit sensum molestum, quasi nucleus l. bolus in faucibus hæreret.
- 4 Excitat nauseam & fere continuam expuitionem.
- 5 Quandoque etiam loquelam impedit.

**IV. Subjectum.**

- 1 Sanguineo-Phlegmatici & ipsi phlegmatici tempore vernali & autumnali corpus humidiori aeri nimium exponentes.
- 2 Qui collum hoc tempore minus bene muniunt.
- 3 Quidam corpore calente haustum frigidiorum assumentes.

**V. Prognosis.**

- 1 Si affectus adhuc recens est, facile curatur & nulum periculum involvit.
- 2 Quando vero negligitur & diutius subsistit, corrumpitur quandoque uvula, ut abscissione opus sit.
- 3 Abscisio hæc satis periculosa est, quia insignem sæpius sanguinis fluxum post se ducit.
- 4 Quibus uvula est abscissa l. corrupta, clara voce haud amplius loquuntur.
- 5 Nocet etiam hæc ipsa abscisio pulmonibus, quia aer liberiori modo in eosdem ruere potest.
- 6 Elongatio uvulæ sæpissime inflammationem comitem habet, quam exulceratio quandoque excipit.

**VI. Remedia.**

- 1 Serosos humores superne stagnantes evacuantia: Phlegmagoga, Rad. Jalapp. Specif. Jalappin. Pulv. Cornach. Diacydon. lucid. Jal. & ius dulcis.
- 2 Eisdem discutientia & ad urinarias vias ducentia: Essent. alexipharmaca Stahlî, Pimpinell. alb. Succin. Tinct. & ii tartarifat. Tartari.
- 3 Partem immediate affectam eluentia & roborantia: Gargarismata discutientia & subadstringentia: ex Rad. Bistort. Sigill. Sa om. Plantag. Torment. Herb. Hyssop. Pyrol. Uvular. Vinc. per vinc. Hyssop. Fl. Ligustr. Ros. r. Balauft. Alum. ust. addito Rob diamor. l. Mel. rosat.
- 4 Adstringentia magis & in pristinum statum uvulam restituentia: pulveres adstrictorii, ex Rad. Torment. Bistort. Angel. Pyrethr. Zingib. Piper. long. Mastich. Alum. cum spatula aut parvo cochleari, lingua prius depressa, columellæ applicando l. in eandem insufflando.

## Formula Remediorum.

## I Pulvis purgans.

R. Specif. Jalappin. gr.      & ii dulc. rit. par. ℥ss. M.  
XXV.

## 2 Pilulæ purgantes.

R. Pil. Tartar. Querc. gr.

XV.

Resin. Jalapp. gr. iij.

&amp; ii dulc. rit. parat. gr.

## 3 Tinctura discutiens.

R. Tinct. &amp; ii tartar. ℥iij.

Essent. alexipharm. Stah.

lii ℥j. M.

C. Essent. succin. f. Pil.  
No. XV.

D. pro una vice.

Dof. gutt. 30. 35. mane &amp; vespere.

## 4 Alia.

R. Tinct. Tartar. ℥ij.

Essent. succin. ℥j. M.

Dof. &amp; usus, ut præcedentis.

## 5 Gargarisma discutiens &amp; adstringens.

R. Rad. Bistort.

Torment.

Sigill. Salom. a. ℥ss.

Herb. Pyrol.

Hyssop.

Uvular. a. Mss.

Flor. Ror. r.

Balauft. a. p. j.

Coq. in f. q. ∇ f.

Colat. ℥j.

Add. Alum. crud. ℥jss.

Rob. diamor. ℥j.

Injiciatur aliquoties per diem calide.

## 6 Pulvis adstringens.

R. Rad. Bistort.

Torment. a. ℥j.

Pip. long. ℥ss.

Ms. f. Pulv. cum spatula  
Columella applicandus.

## 7 Alius.

R. Mastich.

Thur. a. ℥ss.

Alum. ℥ss. M.

Usurpetur ut antea.

## VIII. Methodus medendi.

- 1 Serum in superioribus partibus collectum evacuetur per laxantia phlegmagoga.
- 2 Subjungantur lenia antiecatarrhalia, pituitam stagnantem incidentia, aliquoties per diem in usum trahenda.
- 3 Quod si inflammatio uvulæ simul concurrat, in subsidium vocentur Nitrosa, absorbentia, diaphoretica fixa, modo dictis interponenda.
- 4 Pars vero affecta foveatur & roboretur, per Gargarismata discutientia & adstringentia, addendo iisdem in inflammationis concursu album Græcum & Nitrum.
- 5 Si in pristinam formam redire recuset Columella, adhibeantur colophonis loco pulveres antiecatarrhales fortiores & adstrictorii, immediate parti affectæ applicandi.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Ad abscissionem uvulæ non facile fiat progressus, nisi summa necessitas eandem suadeat.
- 2 Quando inflammatio concurrit ab applicatione fortiorum antiecatarrhalium & adstringentium pulverum desistendum, & potius Gargarismatibus discutientibus & leniter adstrictoriis res peragenda.
- 3 Revulsione scopo quidam ab Emplastris ex fermento, Succino, Thure l. Mastiche, Vertici capitis impositis, aliquem usum observare.
- 4 Propter signaturam specificè commendant Uvulariam f. bis linguam, quam etiam collo quidam appendunt.
- 5 Aquam destillatam Vincæ pervincæ, l. tantummodo ejus decoctionem gargarisatam, uvulam relaxatam erigere, Carolus Musicanus affirmat.

## CAPUT NONUM.

D E

## Procidentia Ani.

**I. Definitio.**

**P**rocidentia Ani est prolapsus intestini recti involuntarius, relaxationem tunicæ nervæ, ac sphincteris ani, excipiens.

**II. Differentia.**

- 1 Est l. idiopathica, ab ipsius partis morbosa constitutione dependens, l. symptomatica, morbis aliis tanquam symptoma superveniens.
- 2 Est l. brevioris l. longioris durationis.

3 Mo-



3 Modo *major*, modo *minor* portio erumpit.

4 Est l. *absque* l. *cum* inflammatione conjuncta.

### III. Signa.

1 Hæc per se clara sunt & ipsi visui statim sese manifestant.

2 Antecedit in symptomatico plerumque frequens & molestissimus tenesmus, quem tandem intestini re-  
cti procidentia excipit.

### IV. Subjctum.

1 Infantes diarrhœas acres biliosas cum tenesmo passi  
& fortius clamantes.

2 Adulti etiam, Diarrhœa diuturna l. Dysenteria la-  
borantes.

3 Qui animum nimium refrigerant.

4 Puerperæ in difficiliore partu constitutæ.

5 Qui cum magno conatu fæces induratas egerere ten-  
tant.

6 Quibus muscoli levatores in lithotomia sunt discissi.

7 Qui paralytica sphincteris ani relaxatione laborant.

### V. Prognosis.

1 Affectus idiopathicus difficilior curatur, quam sym-  
ptomaticus.

2 Juniores & pueri facilius ab eodem liberantur, quam  
senes.

3 Qui Diarrhœæ & Dysenteriae supervenire solet, pri-  
mario morbo mitigato, haud difficulter tollitur.

4 Idem etiam de reliquis symptomatice evenientibus  
judicandum.

5 Quo longius cura protrahitur, eo periculosior red-  
ditur affectus.

6 Frigus ano prolapsio maximopere inimicus est, teste  
*Hippocrate Aph. 22. sect. 5.*

7 Facile ab eodem inflammatio inducitur, quæ Gan-  
grænæ difficillime & vix curabili viam sternit.

8 Si magna inflammatio concurrit, repositio difficul-  
ter procedit, nisi hæc imminuatur l. tollatur.

9 Quo frequentius affectus redit, eo difficilior impo-  
sterum curam admittit.

10 Qui a nervorum l. musculorum ani læsione para-  
lytica l. alia violenta dependet, difficillime, præci-  
pue in senibus & ubi malum non amplius recens  
est, curatur.

### VI. Remedia.

1 Anum recenter elapsum reducant situs conveniens  
( ut Patiens pronus ponatur, vel, capite in terram  
inclinato, pedibus sursum eleveatur ) & opera ma-  
nualis, qua, adhibitis aliquot digitis oleo emollien-  
te inunctis, l. linteamine calefacto, anus leniter &  
paulatim reprimatur.

2 Inflatum & inflammatum emolliunt & minorem red-  
dunt emollientia, cum discutientibus juncta: Herb.  
Absinth. Origan. Puleg. Salv. Calaminth. Malv. Sum-  
mit. Aneth. Flor. Melilot. Sambuc. Chamom. Sem.  
Carv. Cumin. Fœnic. in aqua, lacte, l. Vino coquend.  
& cum spongiis, linteaminibus, sacculis calide ap-  
plicanda: nec non oleum Lil. alb. Verbasco. Chamom.  
Ov. post solum ano inungenda.

3 Relaxatum construngunt & in sua sede retinent ad-  
stringentia: Rad. Bistort. Torment. Symphyt. Plan-  
tag. Herb. Centumnod. Burl. Pastor. Fol. Querc. Mil-  
lesfol. Fl. Ros. r. Balauft. Bacc. Myrtill. Galæ, Nuc.  
Cupress. in Vino rubro decoquenda & in sacculis,  
linteaminibus, cum spongiis ægroto jacenti suppo-  
nenda. Olea item adstringentia, eadem ratione ap-  
plicanda. Mastiche porro, asseri ligneo lævigato  
pulveretenus inspersa, cui calefacto æger insidere  
debet. Specificæ tandem Scarabæi, in stercore equi-  
no nati, sub pulveris forma intestino prolapsio ad-  
spargendi.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Species emollientes & discutientes.

Rx. Rad. Alb. ʒj.	Sem. Aneth.
Herb. Chamom.	Fœn. Græc. ʒj.
Absinth. ʒ. Mj.	Incis. contus. d. ad ch.
Fl. Melilot.	In lacte, vino l. ∇ deco-
Sambuc. ʒ. Mss.	quenda & applicanda.

##### 2 Linimentum emolliens.

Rx. Unguent. dialth. ʒvj.	Ovor. ʒ. ʒij.
Verbasco.	Ms. pro inungendo ano.
Chamom.	

##### 3 Species adstringentes.

Rx. Rad. Symphyt.	Balaust. ʒ. pij.
Bistort.	Gallar. ʒss.
Torment. ʒ. ʒss.	Incis. contus. q. o. decoq.
Herb. Centumnod.	In Vin. rubr. l. aqua ferrar.
Millesfol. ʒ. Mj.	& applica calide.
Fl. ros. r.	

##### 4 Suffimigium adstringens & roborans.

Rx. Mastich.	Fl. ros. r. ʒj.
Succin.	Ms. f. pulvis, pro perfu-
Thur.	mando ano.
Myrrh. ʒ. ʒiss.	

### VII. Methodus medendi.

1 In omni ani Procidentia eo respiciendum, ut inte-  
stinum rectum illico, nisi sponte intret, in locum  
suum debitum reponatur.

2 Fit hoc per convenientem situm, ut Patiens pronus  
ponatur, pedibusque paululum sursum versus eleve-  
tur, deinde mediante uno l. altero digito oleo illi-  
to, vel linteolo molli, Decocto emolliente madi-  
do, obvoluto, aut etiam linteamine calefacto sen-  
sim intrudatur.

3 Reposito ano, præcaveatur, ne denuo elabatur.  
Prospiciunt huic rei Decocta & olea adstringentia in  
Sacculis, spongiis, linteaminibus ano supposita. Of-  
ficium etiam faciunt asseres calefacti Mastiche con-  
spersi, quibus æger insideat. Nec non particula pa-  
nis querni in vino rubro cocta & ad instar supposi-  
torii ano intrusa. Aut ex commendatione *Caroli*  
*Musitani* & *Hartmanni* Pulvis Scarabæorum, inte-  
stino recto intersus.

4 Quod si Paralysis musculorum & nervorum reten-  
tionem impediat, externe circa os sacrum nervina  
applicentur, in adminiculum etiam vocentur sub-  
ligacula.

5 Si muscoli retrahentes in Lithotomia sunt discissi  
res desperata est, nisi statim in principio exquisitis  
vulnerariis medela afferatur.

6 Si Dysenteria & Diarrhœa malum suffulciat, inter-  
ne mitigantia & demulcentia in usum sunt vocan-  
da, externe vero demulcendi scopo sacculi ex rapis,  
avena excorticata, herba Chamom. Samb. in lacte  
coct. ano supponendi; clysteribus abstergentibus &  
subadstringentibus haud omissis.

7 Fæces nimium exiccatae & induratae, si illæ malum  
procrearunt, exposcunt Clysteres emollientes &  
Diætam diluentem, subjungendo postea Methodum  
Procidentiae ani debitam, supra laudatam.

### VIII. Cautela Practica.

1 In omni procidentia ani, si a neglecta repositione  
intestinum rectum inflationem vel inflammationem  
concepit, ut repositionem ob hanc respuat, discu-  
tientia & emollientia in auxilium sunt vocanda,  
intestinum prolapsum iisdem calide per tempus fo-  
vendo, deinde subadstringentibus & manuum ope-  
ra repositionem tentando. Cavendo omni modo ne  
Gangræna, plerumque lethalis, accedat.

2 Adstringentia externe prolapsio intestino applicata  
non tantum repositionem faciunt, dum fibras con-  
stringunt, sed & ulteriorem prolapsum præcavent.  
Pulveres tamen, qui insperguntur, debent esse  
tenerrimi, alias tunicis sese insinuant & tenesmum  
adaugent.

3 Fortiora etiam adstringentia in substantia haud fa-  
cile sunt propinanda, quia nimium constringunt;  
unde etiam alumen in minori dosi in usum trahen-  
dum est.

4 In causa paralytica Junckerus Liquorem florum ver-  
basco in Unguenti consistentia redactum; tanquam  
egregium balsamicum & traumaticum, laudat.

5 Infantes Ascaridibus laborantes frequenter quoque  
Procidentia ani corripiuntur, ubi tamen non facile  
pulveres constringentes intestino prolapsio sunt asper-  
gendi, oculi potius dirigendi sunt ad ascarides, hi-  
sce enim remotis & cessante irritatione, postea ani  
Pro-



Procidencia non adeo facile metuenda est.

- 6 Qui semel Procidencia anilaborarunt, facile iterum in eam incidunt, inpr. si alvi depositionem maturam negligunt & fecum indurationi ansam præbent, quare, quantum quidem possibile, alvum liberam servant.
- 7 Nunquam tamen in usum trahant Aloetica aliaque Purgantia acriora; quoniam hæc in subjectis dispositis Procidenciam ani producere valent.

## CAPUT DECIMUM.

### DE

#### Impotentia Virili.

I. *Definitio.* Impotentia virilis est inhabilitas ad generandum, ea ætate sese exerens, quæ alias per leges naturæ hic operi dicata est, vel a vitiosa seminis qualitate aut defectu, l. a partium solidarum generationi dicatarum læsione originem habens.

#### II. Differentia.

- 1 Distinguitur a sterilitate subjecti diversitate: hæc quippe, stricte sumta, procreandi impotentiam a muliere dependentem innuit.
- 2 Alia membri virilis aliqualem erectionem & seminis ejaculationem, sed parcam, & vel præmaturam vel nimis tardam, conjunctam habet: alia l. neutro horum, l. alterutro tantum, nimirum erectione penis, non vero ejaculatione, stipata est.

#### III. Signa.

- 1 Cognoscitur impotentia virilis vel ex patientis relatione, vel oculari inspectione.
- 2 Hac quippe certiores reddimur l. testiculos Seminis generationi inservientes esse l. læsos, l. nimis parvos, l. plane deficere, aut urethram non in media sed infima ejus parte perforatam esse, aut Semen effluens nimis tenue aut aquosum esse.
- 3 Quando testiculi sunt læsi, l. plane abscissi, fieri quidem potest penis erectio, sed ob seminis defectum nulla contingit ejaculatio seu emissio ejusdem.
- 4 Urethra, si inferne perforata est, semen emissum non ad locum suum convenientem fertur, erectione tamen penis cum effluxu seminis recte contingente.
- 5 Eadem erectio & justa etiam ejaculatio præsto sunt, si semen nimis aquosum est, quod facile ex consistentia dijudicatur.
- 6 Interdum membrum virile nunquam erigitur, quod plerumque in senio & paralyfi musculorum erigentium accidere solet.
- 7 Si a Fascino res dependet, erigitur quidem penis sat frequenter, libido etiam rei Grææ adest, sed quando ad actum celebrandum sese parat, subito concidit & nulla facultate eundem absolvendi amplius gaudet.
- 8 Breviter scrotum pendulum, membrum flaccidum, defectus erectionis ejusdem & ejaculationis seminis constans, certa impotentia virilis sunt signa.

#### IV. Subjectum.

- 1 Legibus ipsius Naturæ impotentia laborant pueri, ab infantia ad 14 circiter annum.
- 2 Eidem obnoxii fiunt senes sexagenarii quidam l. septuagenarii quæ tamen res secundum subjectorum & roboris diversitatem valde differt.
- 3 Citius facultate hac privantur, qui constitutionem possident debiliorem, qui maturis admodum annis Veneri sese addixere, qui frequentius hoc opus exercuere, qui Baccho nimium litavere.
- 4 Qui Saturninis & acidis interne abutuntur.
- 5 Morbis diuturnis nimium exhausti per tempus tantum impotentes sunt.
- 6 Contingit hoc etiam mæstis, speculabundis, hypochondriacis.
- 7 Veræ impotentia obnoxii sunt, qui vitium in parti-

bus solidis generationi dicatis possident, testiculos nimirum contutos, abscissos, admodum parvos, muscululos erigentes paralyfi labefactatos, penem abscissum, urethram inferne perforatam &c.

8 Nec non qui Semen nimis aquosum producant.

9 Pertinacem quoque impotentiam incurrunt, qui fascino se ligatos esse firmiter autumant.

#### V. Prognosis.

- 1 Impotentia virilis, quæ a morbis diuturnis, fame nimia, speculationibus, mœrore originem trahit, & medicamentis & Diæta curari potest.
- 2 Quæ virium debilitatem & enervationem per senium, Bacchi & Veneris excessus pro causa habet, eadem ratione & modo sæpius levamen admittit.
- 3 Quando res a fascino dependere videtur, quandoque universa corporis consumptio exinde originem habet.
- 4 Potest tamen utrumque malum conveniente Methodo non ita difficulter tolli.
- 5 Qualitas ipsius seminis correctionem admittit, quando vero dispositio hæreditaria adest, tunc rarissime Curatio bene cedit.
- 6 Quando partium solidarum vitium l. Paralyfis musculorum subest, vix restitutionis spes remanet.
- 7 Quibus testiculi in infantia abscinduntur, mulieres imposterum quoad vocem & reliquum corpus magis æmulantur, quam viros.

#### VI. Remedia.

- 1 Lympham nutritiam adaugentia: omnes cibi evpepti, evchymi; porro Amygdalæ, Pineæ, Pistaciæ, Succolada Indica, vitella ovorum, Lac omne & inprimis muliebre.
- 2 Corpus roborantia & Venerem excitantia: interne vinum generosum, modicè usurpatum, Aromata, Cubebæ, Condit. Z. Z. Nuc. Ind. Rad. Pimpinell. Eryng. Elect. diasatyr. Ambra. Mosch. Confect. alkerm. aqua Magnanimitatis. Spiritus Formicarum, Priapus Cervi; testes gallorum; farcimina ex cristis & gallorum testibus facta, sanguis & cerebrum Passerum, Borrax, Millepedes, Cantharides, Externe Balnea ex Formicis, spiritus Formicarum, Zibethum, Ambra, Moschus cum  $\odot\odot$  destill. Caryophyll. Spic. Cinam. in balsamum redacta, & testibus penique inuncta.
- 3 Semen qualitate peccans corrigentia, gelatinosa, mucilaginosæ, evchyma, interpositis aromaticis selectis & potu defæcato vinoso.
- 4 Paralyseos vitiis opponuntur interna & externa nervina.
- 5 Incantamentis succurrentia Vomitoria in principio exhibita, nec non Abrotanum, Origanum, Antirrhinum, Adianthum, viscum quercinum, columbum, Momordica, succus Betulæ, Secundina primiparæ, Calculus humanus, Essent Hyperici, Tinctura Coralliorum. Externe miætus per scopas betulinas, & miætio per annulum sponsalium, lotio pudendi cum Decocto aquilegiæ &c.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Electuarium Aphrodisiacum.

Rx. Succolad. Ind.	Cinam. $\alpha$ . $\mathfrak{z}$ j.
Pinear. mund. $\alpha$ . $\mathfrak{z}$ ss.	Mosch. gr. iv.
Condit. Rad. Satyr.	Ambr. gryf. gr. ij.
Zinzib.	Syr. Cort. aur. q. f.
Eryng. $\alpha$ . $\mathfrak{z}$ vj.	F. elect. ad avellana magnitudinem bis forte per diem usurpandum.
Pulv. Cardam.	
Cubeb.	

##### 2 Aliud.

Rx. Elect. diasatyr. $\mathfrak{z}$ ss.	Sem. Bruc.
Condit. Z. Z.	Pastinac. $\alpha$ . $\mathfrak{z}$ j.
N. Ind.	Succ. Gran. Ch. rm. q. f.
Rad. Pimp. $\alpha$ . $\mathfrak{z}$ ss.	F. Elect.
Raf. Priap. Cerv. $\mathfrak{z}$ ij.	Usus, ut præcedentis.

##### 3 Linimentum.

Rx. Zibeth. gr. vj.	Cinam. gutt. iij.
Mosch. gr. iv.	F. Linimentum pro glande
Ambr. gryf. gr. ij.	& testibus inungendis.
$\odot\odot$ dest. Caryoph. gut. 6.	

##### 4 Aliud.



4 Aliud.  
*R. Axung. Castor. 3ls.*  
*Balam. Peruv. 3j.*  
*Zibethi gran. vj.*

3 3 dest. Caryop. 3ls. M  
 Usus, ut præcedentis.

LIBER V.

D E

## FEBRIBUS.

## CAPUT PRIMUM.

## De Febris in Genere.

## I. Definitio.

**F**ebri est complexus motuum, ut plurimum ordine sibi succedentium, secretoriorum & excretoriorum, præter gradum naturalem, seu tumorem consuetum auctorum & intensorum, ad noxam aliquam extraordinariam & fonticam, inpr. vero sanguini imminuentem vel jam inhærentem, præoccupandam aut tollendam Sive brevius

Febris est salutaris Naturæ conatus, quo per motus secretorios & excretorios, qualitati tamen & quantitati causæ proportionatos, materiam corpori & inpr. ejus partibus fluidis insensam expellere nititur.

## II. Differentia.

## I Ratione durationis &amp; decursus, Febres sunt vel

- 1 *Acute*, e. g. Petechialis, Pleuritica, Febris castrensis, Variolæ & Morbilli &c vel
- 2 *Chronice*, v. g. Intermittentes, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, it. Lentæ & Hæcticæ.

## 2 Ratione Typi sunt:

- 1 *Continente*, quæ nec intermittunt, nec remittunt, ut Ephemera simplex & plurium dierum, Synochus simplex & putrida.
- 2 *Continua*, quæ statas exacerbationes & remissiones, nunquam tamen plenariam intermissionem habent, uti Febres Catarrhales & Petechiales, quæ circa vespæram exacerbantur, horis vero matutinis mitius affligunt.

3 *Intermittentes*, quæ sensibilia intervalla vacua habent, ita ut æger ad orthostadium redeat, v. g. Quotidiana, Tertiana, Quartana legitima.

## 3 Ratione causæ, aliæ dicuntur:

- 1 *Inflammatoriæ*, quæ inflammationibus internis, vel externis gravioribus superveniunt, ut Pleuritis, Paraphrenitis, Vulnerariæ &c.
- 2 *Lochiales*, quæ Lochiis suppressis superveniunt.
- 3 *Lactææ*, quæ impeditiorem lactis in mammas ingressum comitantur.
- 4 *Biliolæ*, quæ iracundiæ, bilisque effusioni & regurgitationi superveniunt.
- 5 *Sanguinæ*, quæ sanguinis abundantis consumptionem & imminutionem intendunt.

## 4 Ratione symptomatum, aliæ sunt:

- 1 *Erbymaticæ*, quæ notabiles efflorescentia in superficie corporis formant, ut Petechiales, Purpuratæ, Scorbuticæ, Febres erysipelatodes, Scarlatinæ, Variolæ, Morbilli &c.
- 2 *Catarrhales*, quæ Gravedinem, Coryzam, Tussim comites habent, aut subsequuntur.
- 3 *Legitimæ*, quæ consuetis anni & diei temporibus invadunt, solitis symptomatibus stipantur.
- 4 *Anomalæ* sive *Nothæ*, quæ ab hac norma deflectunt.

5 *Simplices*, quæ nulli alteri complicatæ sunt.6 *Compositæ*, ubi continua cum intermittente, continens cum continua concurret, aut intermittens duplicatur, v. g. Quotidiana, Tertiana &c. continua, vel duplex.

## 5 Ratione moris sive indolis sunt

- 1 *Benignæ*, quæ raro interimunt, aut læsiones graves post se relinquunt, ut Tertiana legitima, Ephemera simplex, Catarrhales simplices.
- 2 *Malignæ*, quæ ut plur. exitium afferunt, aut noxas fonticas & fere immedicabiles post se trahunt, ut Febres inflammatoriæ internæ, inprimis vero

ex-

## VII. Methodus medendi.

- 1 Si impotentia virilis a nutrimenti & virium defectu originem tuam sumit, optimum effectum præbent gelatinosa, mucilaginosa & nutriente facultate prædita, interpositis roborantibus & leniter stimulantibus, quæ quidem re & semini nimis aquoso egregie succurritur.
- 2 Si animi mœror l. speculatio nimia in causa sunt, animum exhilarare & a seriis avocare decet. Commendant insuper quidam pro scopo hoc inflictionem plagarum & virgarum in nates.
- 3 In Paralyse s. vitiis l. etiam testiculorum læsionibus in gnioribus rarissime aliquid solidi efficitur. In illis in primis initiis res per nervina interna & externa tentari potest. Hæ chirurgicum auxilium exposcunt & aliquam adhuc spem promittunt, quamdiu partes generationi dicatæ adhuc sunt integræ: ablatas vero refarcire velle, stolidum foret conamen.
- 4 In incantamenti metu interna & externa specifica adhiberi possunt. Cardio tamen rei hoc absolvitur, ut impotenti fortior animus & confidentia inspiretur, omnem timiditatem & incredulitatem prorsus e mente adimendo, sic optime restituetur.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Senes & debiles bene succurrunt naturæ defectui per nutrimenta selecta, stimulantia & roborantia, semper tamen etiam examinandæ sunt corporis vires, an hoc negotium ipsa Natura permittat; alias Phthisis, Hæctica aliæque mala exinde exurgunt.
- 2 Præstaret sæpius antaphrodisiaca, quam aphrodisiaca exhibere medicamenta, cum plerumque plus in hac palæstra, quam debebat, fieri soleat.
- 3 Stimulantia nunquam absque nutrientibus sunt exhibenda, neque etiam in majori dosi præscribenda, alias eximia quandoque damna; nimirum insignis ad rem Quædam exercendam stimulus, dolores nephritici & mistus cruentus exinde originem trahunt.
- 4 Stimulo fortiori a medicamentis acribus producto consulunt lac in copia haustum & Emulsionem dilutiores.
- 5 Adscribunt vulgo Camphoræ odori & potui Caffee impotentiam inducendi vim, sed experientia rem hanc non confirmat.
- 6 Saturnina Venerem admodum enervant, & simul sanitati maxime sunt inimica.
- 7 Pro præcavenda fascinatione commendant Auctores varia v. g. ut sponsus ante, aut post copulationem per annulum sponsalium mingat, ut Mercurium vivum, in nuce avellana inclusum colloque appensum, durante copula Sacerdotali gerat, aliæque; sed his ipsis in timidis & valde credulis eo ipso impotentia sæpius inducitur.
- 8 Curiosum est, quod D. D. Weisbach in suo tractatu germanico ex Michaeli Montaigne allegat, quod hæc res timiditatem, diffidentiam & incredulitatem plerumque pro fundamento habeat. Adstipulamur & nos huic asserto, cum 2. 3 subjectis, per aliquot annorum seriem pro impotentibus a se & uxoribus habitis, nulla alia remediis allatis fuisse, quam medicina morali, sciamus, id est omnem incredulitatem & diffidentiam iisdem adimendo, & bonum cordatumque animum inspirando.



excretionibus externis arthriticis, vel erysipela-  
ceis retropulsis supervenientes, it. Epidemicæ  
pleræque.

- 3 *Pestilentes*, quæ plurimos eorum, quos prehen-  
dunt, interimunt, & quidem præcipiti admodum  
progressu, communiter cum excretionibus Bubonum,  
vel Anthracum, uti Pestis.

6 *Ratione ortus & grassationis*:

- 1 *Epidemicæ*, quæ ex communi aeris, vel aquæ  
vitio prognoscuntur, & facile per contagium pro-  
pagantur, quales plerumque sunt Ecthymaticæ,  
& Catharhales, v.g. Febris Scarlatina, Morbil-  
li, Variolæ.  
2 *Sporadicæ*; quæ ex individuali in diætâ vel animi  
pathematibus commisso errore Patientem inva-  
dunt, ut Tertianæ vel Quartanæ, a nausea vel  
cibis dyspeptis oborta, Febris ardens ab ira susci-  
tata, Febris lochialis a lochiis restituantibus, Fe-  
bris inflammatoria ab haustu frigido, corpore  
æstuante.

III. *Signa*.

- 1 Febres non certæ ætati propriæ sunt, sed in omnes  
sine discrimine sexus & ætatis grassantur.  
2 Febribus facilius obnoxia sunt personæ tempera-  
menti sanguinei vel cholericæ, status plethorici e-  
vacuationibus sanguinis, vel aliis excretionibus sta-  
tis assuetæ, indolis animi activioris; iracundæ, im-  
patientis.

IV. *Subjectum*.

- 1 *Magis essentialia* sunt:  
a Pulsus frequens & celer.  
b Frigoris & caloris vicissitudo citra notabilem cau-  
sam externam.  
c Urinæ quoad consistentiam, colorem & diapha-  
neitatem mutatio.  
2 *Consecutiva* sunt:  
a Pallor & rubor, subsidentia & turgescientia habi-  
tus corporis alternantes, citra notabilem causam  
aliquam occasionalem.  
b Remissio ab aliis actibus vitalibus, ciborum nem-  
pe appetitu & digestionem, nec non rationalibus  
h.e. wann. die Patienten verdriesslich und nicht  
disponirt sind zu ihrem Vorhaben. Eckel haben vor  
Fleisch. it. durstig und unruhig sind.  
c Sitis.  
d Insolida animi sollicitudo, indeque corporis in-  
quietudo.  
e Somni neglectus, *schlafflose Nächte*.  
f Prostratio virium.

V. *Prognosis*.

- 1 Febris, hoc est motuum secretoriorum & excreto-  
riorum præter gradum consuetum adauctorum in-  
tentio semper est salutaris, eventus tamen non ra-  
ro, præsertim in acutis, anceps est, imo lethalis.  
2 Febres sibi relictae tranquillius & tolerabilius ad e-  
xitum vel salutarem vel lethalem quoque decurrunt,  
quam variis artificiis interpellatae.  
3 Febres sibi relictae, continente ac modesto regimine  
saltem adjunctæ, statas excretiones aut mutationes  
criticas constantius & certius observant, quam quæ  
medicamentis & regimine calidiore exstimulatae,  
aut nimis absorbentibus suppressæ, aut opiatibus tur-  
batae fuerunt.  
4 Plures ex Febribus convalescunt sola quiete & ab-  
stinencia.  
5 Difficillime restituantur Febres corruptæ, h.e. tur-  
batae, violenter oppressæ & hinc recidivantes, it.  
in lentum & anomalum typum præcipitatae.  
6 In omni Febre, quæ alias statas mutationes, vel  
ecrises ferre solet, si hæc non succedunt, sequitur  
periculum.  
7 Nulla unquam Febris restituitur sine omni sudore,  
aut mutatione urinæ.  
8 In nulla Febre sudor fluit sub æstu æstus, sed quan-  
do hujus impetus remittit: sin secus, symptomati-  
cus est, inutilis, imo nocivus.  
9 In omni Febre acuta; si Urinæ nihil mutantur, aut  
mutatas crudæ sequantur, calamitosum est.  
10 Omnis Febris in alterius tempora, habitus, ætates,

opportunitates incidens, vel in illam degenerat,  
vel in ejus mores anomalizat. Alias enim synochi  
ante crepusculum, circa solstitium: Biliosæ circa  
ortum solis post solstitium; Catarrhales vespertino  
tempore circa Æquinoctia, invadere solent. Ter-  
tiana horas antemeridianas & tempus vernum ob-  
servant, ætati adolescentili & virili familiares sunt:  
Quartanæ horis pomeridianis, Autumno, ætati pro-  
vectiori & naturis segnioribus obtingunt.

VI. *Remedia*.

1 *Alterantia*:

- a Absorbentia, ex quibus seliguntur præcipue Ostra-  
codermata, sive Conchilia, v. g. Lap.  $\sigma$ . Con-  
chæ, Mat. Perl. præparata: exclusis subadstrin-  
gentibus, Bolaribus, Cervinis, v. g. Terr. figill.  
C. C. usto, C. C. sine igne vel Philosophorum præ-  
parato, imo Coralliis quoque.  
b Mucositatem humorum incidentia & vias abster-  
gentia, salia enixa aut digestiva, ex acido præ-  
cipue Vitriolico parata, ut Tart. Vitriolat. Ar-  
canum duplic. Nitr.  $\delta$ iatum. it. Tartarea, ut Ar-  
canum Tartari, solutio Oc.  $\sigma$  cum Vino vel suc-  
co citri: exclusis e Sale communi defumptis e. g.  
Sale digestivo Sylvii.  
c Æstum temperantia & acrimoniam biliosam miti-  
gantia, qualia sunt:  
1 Nitrosa e. g. Crystall. Nitratis. Nitr. depura-  
tum, Lapis Prunellæ sive Nitrum tabulatum,  
Nitr. regeneratum  $\delta$ iatum.  
2 Acida, v. g. Succus Citri, Berberum, Ribium,  
it. Spir. Vitrioli, Nitri, Clystus  $\delta$ ii, Tinct.  
Flor. Bellid. Papav. rhæad. &c exclusis spiriti-  
bus acidis dulcificatis, it. spiritu Salis & Vitrio-  
li Philosophico, ob vim nimirum minus diure-  
ticam & tussim facile irritantem.  
d Diluentia, secretiones & excretiones copiosius in-  
stituendas promoventia: Potus tenuior & suffi-  
ciens vel cerevisiarius, vel Decoctum Hordei aut  
C. C. vel Infusum Thee, Caffæ aliarumque herba-  
rum, florum aut radicum temperatorum, neque  
adeo fastidiosorum, e. g. Rad. Scorzonæ, Flor.  
Galeg. Herb. Meliss. &c.  
e Analeptica, v. g. Emulsionem amygdalinæ sufficien-  
ter edulcoratæ. Potiones ex Aquis odoriferis gra-  
tioribus, Vinum modice & medice sumptum,  
præsertim in assuetis.  
2 *Evacuantia*, & quidem:  
a *Cuiuslibet Febris commoda*, quin necessaria:  
Diaphoretica, v. g.  $\delta$  diaphor. recte præparatum,  
Aquæ diaphoricæ non ingratae, Flor. Samb. Card.  
bened. Scord. Galeg. &c.  
2 Alexipharmaco-diuretica, v. g. Essentia ex ra-  
dicibus alexipharmacis temperatioribus & hor-  
deo parata: Mixture simplex parcius campho-  
rata, excluso usu copiosiore Camphoræ, Myr-  
rhæ, rejectis itidem Spiritibus urinosi v. g. Spir.  
C. C. Fuliginis, Bezoardico Buffi: nec non  
Pulveribus sic dictis Bezoardicis, incondita far-  
ragine herbarum & radicum pulverisatarum,  
quin & Terris variis sigillatis adstringentibus  
suffarctis, v. g. Pulv. Bezoard. Sennerti, Sa-  
xonico, Pannonico rubro, Schneebergico  
*oder dem so genannten sieben und siebenziger-  
ley Pulver*.  
3 Successum alvi promoventia, non tamen posi-  
tive stimulantia & irritantia, ut Clysteres sive  
Enemata.  
b *Certo statui morbi, vel individuali circumstantia*  
debita.  
1 Vomitoria, in principio Contagiosarum, it.  
in Intermittentibus, die vacuo, subjectis eve-  
metis, quin actu vomituriensibus, exhiben-  
da.  
2 Purgantia, post declinationem Acutarum, iterum  
in Intermittentibus lentescensibus, vel per Ad-  
stringentia suppressis, itidem diebus Intercala-  
ribus exhibenda.  
3 Venæsectio larga in subjectis plethoricis, assue-  
tis, valde æstuantibus, insigni præcordiorum at-  
gu-



gustia oppletiva gravatis, antequam signa coctionis in Urina appareant.

c *Specifica*, qualia a Kergero, Riverio, Apino laudantur: sed potius optanda, quam speranda sunt.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis præparans.

R. *Conch. ppt.* Div. in 9. p. aq.  
*Nitr. ʒiāt.* D. sing. 3. vel 4. horis.  
*Tart. Vitriolat. a. ʒj. M.*

##### 2 Alius temperans.

R. *Nitr. depur.* Div. in 6. p. aq.  
*Arcan. dupl. a. ʒj.* D. ut antea.  
*Cinnab. ʒij gr. 18. M.*

##### 3 Potiuncula temperans.

R. *Aq. Borrag.* Tinct. Rosar. ʒjss.  
*Bugloss.* Sir. acetos. citr. ʒjss. M.  
*C.C. citr. a. ʒjss.* D. cochleatim.

##### 4 Pulvis emeticus.

R. *Rad. Ipecac. gr. XXV.* D. mane.  
*Sal absinth. ʒjss. M.*

##### 5 Alius Purgans.

R. *Specif. Jalap. ʒjss.* D. ut antea.

##### 6 Potiuncula diaphoretico-temperans.

R. *Aq. Fl. Acac.* Nitr. regener. a. ʒjss.  
*Card. bened. a. ʒij.* Sacch. perlat. ʒij. M.  
*ʒiaph.* D. cochleatim in astu.  
*Matr. Perl.*

##### 7 Alia alexipharmaca.

R. *Aq. Galeg.* Sir. Contrajerv. ʒjss. M.  
*Scorzon. a. ʒij.* D. cochleatim in declinatione paroxysmi.  
*Eff. alexiph. ʒj.*

##### 8 Mixtura alexipharmaca.

R. *Eff. Scord.* D. 25. 30. gutt. in declinatione paroxysmi.  
*Pimpin. alb. a. ʒjss. M.*

#### VII. Methodus medendi, varians pro diversitate

##### 1 Status morbi:

a In primo principio interdum Vomitorium, Venæsectio, quandoque etiam Sudoriferum cum regimine datum, locum habet.

b In Incremento Temperantia, Absorbentia, Diluentia, parcius vero Alexipharmaca usurpanda.

c In statu & circa dies criticos his ipsis insistentium, interponenda interdum Analeptica, præsertim ubi vigor Naturæ tepescere videtur, quo in casu etiam Alexipharmacis magis opus est.

d In declinatione, licet morbi impetus remiserit, & æger in portu jam navigare videatur, Alexipharmacorum tamen usus & calor conclavis temperatus nunquam negligatur.

##### 2 Paroxysmi:

a Ante paroxysmum & sub paroxysmis vegetioribus sola Temperantia, Absorbentia, Abstergentia locum habent: Alexipharmaca vero, & quascunque excretiones stimulantia exulent, uti & Analeptica, quæ commodius post paroxysmum dantur.

b Sub declinatione paroxysmi & tempore intercalari Alexipharmacis, ac, pro re nata, Analepticis agendum.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1 Febris in se, h. e. motus secretorii & excretorii ultra gradum consuetum intensi debent curari, i. e. tolli aut supprimi: causa vero sive materia, propter quam & contra quam Febris coorta est, curanda, i. e. corrigenda, vel expellenda est.

2 Id vero vix potest simul ac semel fieri, sed opus est iusta mensura & opportunitate temporis, quæ materia excernenda prius præparanda & separanda, quam evacuanda est.

3 Hinc Medicus ante omnia secretioni necessarium tempus indulgeat, & quicquid illam facilitare potest, contribuat: ubi excretionis subjungendæ opportunitas succedit, illa quoque placide foveatur, si non semper medicamentis, continente tamen & tranquillo regimine.

4 Tranquilla patientis continentia omnes excretiones

facilitat, inquieta jectigatio aut exasperat, aut turbat easdem, præcipue vero sudorem sensibilibus cohibet.

5 Retardationes vero sudoris, tempore debito sponte erupturi & omni opera, placide tamen, promovendi & prosequendi augment tensivam & gravativam lassitudinem artuum, protrahunt & foveant morbi durationem & in lentas typicas Febres transferunt.

6 Præmaturum tamen regimen diaphoreticum, vel etiam Diaphoretica positiva versus, vel in paroxysmo data, æstum inutiliter augment, symptomata exasperant, motus Naturæ ordinatos confundunt.

7 In omni Febre evacuationes artificiales, præpostero tempore institutæ, vel nimium effectum præstant, vel alium, vel utrumque.

8 In omni Febre potulenta congrua, sufficienter concessa, reficiunt patientem, minuunt æstum, promoveant quietem, & sudores debitos faciunt.

9 Potus esto dilutus, non inebriativus, feculentus, neque actu frigidus, neque nimis haustibus ingurgitetur.

10 In Febre omnis refrigeratio corporis voluntaria, aut accidentali insignis, noxia est.

11 In omni Febre regimen iusto calidius vel per medicamenta, vel per integumenta, vel per nimiam concalescentiam conclavis, ægrum præter modum debilitat, efflorescentias cutaneas aut parit, aut præmaturat, & nimis copiose expellit, neque, deprehensio etiam errore, sine periculo statim mutari, nedum abrumpi potest.

12 Sopitiones & cohibitiones motuum febrilium per Narcotica, præcipue in ipso vigore paroxysmorum, pervertunt legitimum Febris successum, vires prosterunt, mentem turbant, excretiones cohibent, aut novis anomalis commotionibus causam præbent.

13 Itaque symptomata Februm essentialium intrepide spectanda: *Appetitus* dejectio, præsertim in Acutis, parum curanda: *Sitis*, quantum sine immodestia fieri potest, largiter sublevanda: *Vigilia* nihil æstimanda: *Inquietudines*, a morali ægrotantis impatientia dependentes, feris dehortationibus prohibendæ: *Vires* interim judiciose Analepsi fovendæ sunt.

14 Nunquam nimium tribuatur nudæ materiæ febrilis correctioni, magis intendatur matura ejus secretio & excretio.

15 Materia non moveatur, nisi sit mobilis, viæ prædispositæ & Natura ipsa ad hujus emotionem propina.

16 Si ullibi in Febris certe obtinet: *In tempore venire primum est.*

17 Salia volatilia in Acutis largius & diutius adhibita, facile tumores pedum oedematosos, imo hydropicos affectus post se trahunt, potius Tart. Vitriolatus exhibeatur.

18 Acida temperata v. g. spir. Vitrioli, Clyffus ʒii, aciditas Citri & Berberum eximium sitis & nimii æstus solatium afferunt, si modo Tussis non obstet, quæ tamen ab acido Citri non tam facile, quam a reliquis, exasperatur.

19 Acida illa sibi relicta præstat ita pura adhibere, quam per Spir. Vini dulcificata: emergit enim inde plane nova crasis adhuc incognitæ efficacis: Spiritus Vini vero sensibilem inde nanciscitur adstrictionem, ut ut tenerrimam.

20 Acida magis Sanguineis, Nitrosa Cholericis & Melancholicis, imo quibuslibet conveniunt.

21 Nitrum in forma pulverulenta magis alterat, in potu vero, adeoque in forma diluta exhibitum, magis lubricat.

22 Acide, ut & Saccharata, convenienter data, in Febris non adeo reformidanda sunt, uti Recentiores nonnulli orbi persuadere tentarunt.

23 Mixtura simplex viris magis confert, quam feminis, nempe pro scopo diaphoretico.



## CAPUT SEXTUM.

D E

*Febris Ephemera sive Diaria simplici & plurium dierum.*

I. *Definitio.* **E**phemera est Febris continens sine ulla remissione affligens, eum in finem instituta, ut sanguis abundans vel per Hæmorrhagiam, vel motibus auctioribus in serum conversus, per sudorem expellatur, unum vel aliquot dies durans.

II. *Differentia.*

- 1 Respectu *durationis*, simplex spatio viginti quatuor horarum, altera vero effluxis tribus vel quatuor diebus absolvitur.
- 2 Respectu *gr. dus & temperamentorum*, prouti enim subiecta comparata sunt, eo mitius vel gravius affligit.
- 3 Respectu *excretionis finis & subiectorum*, in aliis enim per Hæmorrhagiam sed rarius, in aliis per sudorem, aut etiam interdum per urinam solvitur.
- 4 Respectu *indolis* alia est *benigna*, alia vero *maligna*: ad priorem pertinet ea, de qua hic agitur, ad posteriorem vero Febris illa pestilentialis, quæ continuis stipata sudoribus spatio viginti quatuor horarum ingentem hominum in Anglia copiam e medio sustulit, unde etiam *Sudoris Anglici* nomen obtinuit.

III. *Signa.*

- 1 Incipit statim cum calore, sine ullo frigoris, rigoris aut horroris sensu.
- 2 Calor tamen magis est moderatus, quam in aliis Febribus continentibus.
- 3 Conjungitur capitis dolor vel æstuans, vel pro subiectorum diversitate gravativus.
- 4 Facies rubet & turget.
- 5 Pulsus est celer, frequens & plenus.
- 6 Appetitus & vires prosternuntur.
- 7 Si subiecta sunt insigniter Plethorica, adest insignis artuum lassitudo, cum doloribus lancinantibus intercurrentibus.
- 8 Sitis est moderata ordinarie, in aliis vero magis urget.
- 9 Urina interdum parum a naturali stature cedit, interdum aliquo modo est tincta, in Ephemera vero sæpius saturati aurantii est coloris: quando turbatur roseum deponit sedimentum & signa coctionis mature apparent.
- 10 Vigiliæ fere sunt continuæ, & si somnus ingruit, est maxime inquietus.
- 11 In subiectis voracibus & post ciborum assumptionem interdum observatur vomitus.
- 12 Si Febris ortum ex haustu frigidus traxit, occurrit sensus pressionis in hypochondrio dextro.

IV. *Subiectum.*

- 1 Juniores Plethorici.
- 2 Homines temperamentis sanguineo-cholerici & sanguineo-melancholici, poroso habitu corporis præditi.
- 3 Consuetorum sanguinis fluxuum suppressione laborantes & evacuationes sanguinis artificiales negligentes.
- 4 Laute viventes & otio dediti.
- 5 Episcopi, Abbates & Monachi, vid. *Forest lib. I. Obs. XI in Scholio ex Savanarola.*
- 6 Quibus Plethora per iram graviolem, motum corporis nimium, potum spirituosum, æstum solis & ignis, vigilias nimias, Venerem &c. commota fuit.
- 7 Qui potum frigidum corpore æstuante assumerunt.
- 8 Qui corpus sudore madidum aeri frigido exposuerunt.

V. *Prognosis.*

- 1 Febris Ephemera simplex, si modo non pervertitur per malum regimen & imprudentem medicationem

periculo ordinarie caret & brevi finitur.

- 2 Solvitur ordinarie per largum sudorem.
- 3 Si multum adest materiæ morbificæ, ex simplici facile fit Ephemera plurium dierum.
- 4 Si æger nullo sudore corripitur, aut si quidem sudaverit & Febris tamen ex integro non desinat, quod monstrat pulsus aliæque reliquæ Febris, ultra consuetum tempus durantes, indicium est Ephemeram simplicem in alium morbum transire.
- 5 Transiit autem facile tam simplex, quam plurium dierum, vel in Synocham, vel in Febrem lentam vel Hecticam, partim diætæ, partim curationis vitio.
- 6 Quo magis corpus est macilentum & siccum, eo facilius etiam sequuntur hectica pathemata.
- 7 Hecticam ante fores esse colligitur exinde, si Ephemera diem naturalem excedit, Febris est uniformis: Calor est intensior post sumptos cibos: Pulsus durus, parvus & æqualis. *Vid. Forest. L. I. Obs. 7. in scholiis.*
- 8 Si corpus est insigniter Plethoricum, eo facilius in Synocham stricte sic dictam mutatur Ephemera.
- 9 Sin vero est simul Cacochymicum, Synocha Veterum putrida metuenda est, si scilicet transiit diem naturalem: calor augetur: Urina tingitur sine coctionis signis; si male olet, perseverans cum corporis fœtore, ac aliarum rerum exeuntium: pulsus fit diversus ac diastole minuitur, systole vero augetur. *Vid. Forest. l. c.*

VI. *Remedia.*

- 1 Sanguinis turgescientiam & æstum mitigantia: Nitr. depur. regener. Salia media Tart. Vitriolat. Arcan. dupl. Mater Perl. Conch. Citrat. Emulsiones, Julepi, Decoct. Rad. Cichor. Hord. Succ. Citr. rec. in potu sufficiente aut in Potiunculis, it. Clyst. § ii.
- 2 Diaphoresin promoventia: Aquæ destillatæ simplices Galeg. Scabios. Flor. Tiliæ &c. § diaphoret. Bezoard. miner. Potus calidus radicibus temperate alexipharmacis aliquantillum alteratus.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pulvis temperans.

Rx. Conch. citrat. Div. in 6. p. æq.  
Nitr. § iat. a. ʒj. D. 4. vel 6. horis dof. j.  
Cinnab. § ii gr. 17. M.

## 2 Julepus temperans.

Rx. Aq. Scabios. Ceras. acid.  
Plantag. Rib.  
Pl. Acac. Succ. Citr. rec. a. ʒls.  
Samb. a. ʒij. Sir. acetos. Citr. ʒjls. M.  
C. C. citrat. ʒj. D. sæpius cochleatim.  
Rob. Cydon.

## 3 Potiuncula diaphnoica.

Rx. Aq. Galeg. § diaph. a. ʒij.  
Scorzon. a. ʒij. Sacch. Canar. ʒij. M.  
Cinnam. ʒls. D. vesperi sing. 2. vel 3. horis cochl. ij.  
Lap. ʒ.

## 4 Emulsio diaphnoico-discutiens &amp; temperans.

Rx. Amygd. dulc. F. l. a. Emulsio.  
Sem. Citr. Colat. ʒviij. adde  
Card. Mar. a. ʒij. Matr. Perl.  
Aqu. Flor. Acac. § diaph. a. ʒj.  
Rub. id. Sacch. Canar. q. s.  
Scorzon. a. q. s. M. D. sæpius cochleatim.

## 5 Species pro potu.

Rx. Ras. C. C. Adde Pom. Citr. in frust.  
Rad. Scorzon. a. ʒj. disciss. No. j.  
Coq. in Aqu. ʒv. Colat. D. calide aut frigide.

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Cum Febres Ephemera inpr. simplices non sint vehementes, sed admodum mites & cito etiam transeant, hinc Medici opera rarissime opus est.
- 2 Si autem Medicus ad Ephemera laborantem vocatur, præscribat primo temperantia, qualia sunt Nitrosa, absorbentia, acida &c. ut hoc modo orgasmus sanguinis aliquo modo mitigetur.
- 3 Vesperi vero, inprimis quando indicia quædam sudoris imminentis adsunt, missis prioribus, exhibea-

tur



tur Potiuncula diapnoica ad promovendum sudorem, quo probe succedente brevi etiam totus finitur morbus.

4 In Ephemera plurium dierum eadem remedia recensito ordine exhibeantur.

### VIII. Cautela Practicæ.

1 Quia Febris hæc ordinarie lenis est, ideo etiam Medicus lenissima methodo utatur: sufficit ordinarie quies in lecto continentia & sufficiens potus calidus ad diluendum sanguinem & procurandum sufficientem sudorem.

2 Abstinendum tamen est a nimia potus inpr. frigidi ingurgitatione, utpote qui sudoris in hac Febre summe necessarij excretionem impedit, & actu fluentem ordinarie sistit.

3 Si in subjectis voracibus sub invasione morbi vomitus urgent, nunquam statim supprimantur, si vero etiam postea nimii sunt, convenientia, ipsum tamen morbum non exasperantia, exhibeantur remedia. Tali in casu sufficere possunt pulvere absorbentes & digestivi cum cortice Chacarillæ.

4 In subjectis insigniter Plethoricis Venæsectio interdum locum habet, ea tamen nunquam promiscue in usum trahatur.

5 Si alvus est obstructa Clysteres non sine fructu injiciuntur, abstinendum tamen est a fortioribus commoventibus, ne Febris mitior in graviores cum damno mutetur.

6 Diaphoretica fixa debito tempore exhibita insignem habent usum in hisce Febribus, alexipharmaca tamen, inpr. fortiora ad Hecticam viam facile sternunt.

7 Volatilia Febres hæc corrumpunt, & sudores vel nimios excitant, vel eisdem prorsus impediunt, & Febribus inflammatoriis portam pandunt.

8 Fugiendus quoque est abusus acidorum & nitrosorum, (quorum illa, legitime usurpata, Sanguineis, hæc vero Cholericis conveniunt) ne humores nimis increascentur & sudor impediatur.

9 Finita Febre ad expurgandas primas vias Purgantia profunt, lenia tamen sint oportet, uti sunt Pilulæ Stahlianæ, Beccherianæ, Rhabarbarum, Magnesia &c.

10 Præservatorie in subjectis dispositis Venæsectio egregium habet usum, semper tamen convenienti instituitur tempore.

11 Fugiendus quoque est motus corporis nimis commotioni Plethoræ ansam præbens.

12 Tandem abstinendum est ab omnibus iis, quæ quocunque modo ad productionem talium Febrium conferre possunt.

## CAPUT TERTIUM.

### D E

#### Febre Synocha five Continente.

I. *Definitio.* Synocha est Febris continens æquali fere æstus tenore absque remissione usque ad finem continuans, in qua Natura Plethoram vel per Hæmorrhagiam narium vel per sudores immuere conatur.

#### II. *Differentia.*

1 Ab Ephemera simplici & plurium dierum, quæ paucis diebus finiuntur, cum e contra hæc ad septimum & decimum quartum usque diem extendatur.

2 A Synocha putrida Veterum, quæ est composita magis, & præter quantitatem, qualitatem etiam sanguinis vitiosam pro causa agnoscit.

3 A Febre continua, in qua caloris remissio observatur, quæ in hac continuo durat.

4 A Febribus ardentibus.

a Respectu causæ, quæ in Ardentibus est bilis, in Synocha vero Plethora.

b Respectu symptomatum, quæ in Ardentibus sunt

gravissima, in Synocha vero mitiora & diversa. Vid. Cap. 6.

c Respectu solutionis: Ardentes enim per vomitum & secessum solvuntur; Synocha vero per Hæmorrhagiam & sudores.

### III. *Signa.*

1 Invadit ordinarie summo mane ante diluculum, secunda vel tertia circiter hora.

2 Incipit statim cum insigni calore, sine horrore.

3 Cui jungitur capitis dolor vehemens & lancinans.

4 Faciei adest rubor & turgescencia cum inflatione oculorum & vasorum, ac pulsatione temporum.

5 Concurrunt vertigines, tinnitus aurium & mentis perturbationes.

6 Sitis insigniter urget.

7 Respiratio est anhelosa & suspiriosa.

8 Adsunt graves anxietates & angustiae oppletivæ.

9 Ægroti sunt admodum inquieti in lecto.

10 Appetitus deficit.

11 Vires sunt prostratæ.

12 Alvus ordinarie est sicca.

13 Urina est pellucida & rubra.

14 Affligunt quoque ægrotantes tensiones molestæ in artubus.

### IV. *Subjecta.*

1 Homines temperamenti humidioris, Plethorici.

2 Personæ juniores, adolescentes mediæ ætatis.

3 Plethoram propter varias causas nimium commoventes. Conf. Tab. præced.

### V. *Prognosis.*

1 Licet Febris hæc per se non sit adeo periculosa, per ineptam tamen curationem & malam Diætam facile periculosa fit.

2 Si legitime decurrit, septimo die finitur, sin minus ulterius adhuc se extendit.

3 Optimum signum est, si die quarto coctionis signa in Urina apparent.

4 Si die quarto Hæmorrhagia lenis ægrotos corripit, eadem die septimo, nisi Natura turbetur, morbum solvet.

5 Narium Hæmorrhagia in iis, quæ annum trigesimum nondum attigerunt, semper melioris est spei, quam in illis, qui dictum terminum jam superarunt.

6 Narium Hæmorrhagia critica sufficiens sit necesse est, nam nihil paucum est criticum, alias vel morbum non solvit, vel alia mala, deliria scil. Phrenitides & Convulsiones post se trahit.

7 Hæc autem mala eo facilius sequuntur, si præsentem etiam congestionem nulla prorsus sequitur Hæmorrhagia.

8 In ætate consistente solvitur ordinarie per sudores vel criticos, vel successivos.

9 In provectioribus, si male cedit Synocha, affectus soporosi sequuntur.

10 Si angustiae oppletivæ & suffocativæ syncopales nimium urgent, facile in principio junguntur Peripnevmonie, in incremento vero & statu Anginæ.

11 Exolescente impetu Febris, inpr. si spissior est sanguinis consistentia, facile sequuntur Febres Hecticæ & tumores œdematosi.

12 Quo facilius est respiratio, eo melior quoque morbi est status.

### VI. *Remedia.*

1 Sanguinem imminuentia & orgasmum temperantia: Venæsectio, Nitrosa, absorbentia, potus sufficiens, Emulsiones, Julepi &c.

2 Diaphoresin promoventia: ☿ diaphoret. Bezoard. miner. Aqua Scabios. Scorzon. Fl. Acac. Sambuc. Galeg. &c. Eff. Alexiph. Stahl. Mixt. simpl.

3 Alvum aperientia: Clysteres, Suppositoria.

#### Formula Remediorum.

1 Potiuncula temperans.

Rx. Aq. Fragor. ℥iii.

C.C. Citr. ℥j.

Tinct. Fl. Bellid. ℥jss.

Sir. Ceras. acid. ℥ss. M.

D. Cochleatim.



## 2 Pulvis temperans..

- ℞. *Conch. citrat.* Cinnab. ℥ij. gr. 18. M.  
*Nitr. regener.* Div. in 6. p. eq.  
*Salpolychr. an. ℥ij.* D. sing. 4. horis dos. j.  
 3 Emulsio temperans & diaphnoica.  
 ℞. *Aq. Galeg.* F. l. a. Emulsio.  
*Scorzon.* Colat. ℥viii. adde  
*C. B. q. s.* ℥ diaph.  
*Amygd. dulc.* Matr. Perl. an. ℥ij.  
*Sem. Citr.* Sacch. q. s. ad grat. M.  
*Card. Mar. an. ℥iii.* D. sapius cochleatim.

## 4 Potiuncula diaphoretica.

- ℞. *Aq. Seabios.* Conch. ppt.  
*Fl. Samb.* Nitr. ℥iat. an. ℥ss.  
*Acac. an. ℥jss.* Sacch. Canar. ℥ij. M.  
*Bezoard. min.* D. sing. 3. hor. cochl. ij.  
 5 Julepus temperans & analepticus.  
 ℞. *Aq. Borrage.* Rib.  
*Rugloss.* Berb.  
*Rosar.* Ceras. acid. an. ℥ij.  
*Galeg.* Confect. alkerm. inc. ℥jss.  
*Cinam. cyd.* Sir. acetos. Citr. ℥j. M.  
*Namph. an. ℥j.* D. cochleatim.  
*Rob. Cydon.*

## 6 Mixtura alexipharmaca.

- ℞. *Ess. alexiph.* Vitriol. ℥j. M.  
*Pimpin. alb. an. ℥ij.* D. gutt. 25. 30 vesperi vel  
*Spir. Tart. ℥j.* post mediam noctem.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Cum in hac Febre Natura Plethoræ, tanquam causæ continentis, imminutionem quærat, Venæsectio reliquis remediis merito præmitti debet, hæc enim sola est Febris, quæ eam commode fert, si vero in aliis quoque interdum utilis deprehenditur, id fit potius ipsius individui quam Febris intuitu. Hæc ipsa Venæsectione mature instituta Febris Synocha admodum etiam mitigatur, ut cursum suum tranquille, sine gravibus symptomatibus absolvat.
- 2 Peracta Venæsectione exhibeantur partim temperantia supra allegata, ad orgasmum sanguinis mitigandum, partim diaphoretica & quidem fixa cum temperantibus mixta, ut hoc modo humores ad peripheriam corporis ferantur & eo facilius sequatur humorum per cutim excretio.
- 3 Si Medicus nimis sero vocatur, ita ut nullus amplius Venæsectioni sit locus, modo dictis remediis interponantur lenia alexipharmaca, qualia sunt Essentia alexipharmaca Stahlî & Mixtura simplex: commode autem exhibentur tempore vespertino & paulo post mediam noctem, hoc enim modo diaphoresis placida optime promovetur.
- 4 Si æstus & sitis nimium urgent, vel supra præscripta temperantia & Nitrosa, vel Julepi ex Aquis diaphnoicis & succo citri aut Clysto ℥ii exhibeantur, quæ symptomatibus hisce optime consulunt.
- 5 Si alvi adest obstructio ea per Clysteres aut supposito-ria non adeo acriter tollatur: alvi enim libertas multum contribuit ad symptomatum mitigationem.
- 6 Si Aigna huic Febri & quidem mature superveniat, Venæsectio larga in brachio instituatur, ac ipsæ quoque raninæ, si tumidæ sunt, aperiantur: Interius vero sumantur temperantia & diaphoretica fixa ad temperandum æstum & diaphoresin promovendam. Conveniunt quoque Gargarismata. Vid. Formulas.
- 7 Si morbus est in declinatione conveniunt lenia laxantia, inpr. vero Rhabarbarum.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Venæsectio optime quidem convenit in Febribus continentibus, sequentes tamen Cautelæ ut observentur necesse est:
  - a Ut mature primo vel secundo statim die, Urina adhuc cruda existente, instituatur.
  - b Ut sufficiens sanguinis quantitas, unicæ scil. sex vel octo emittantur.
- 2 Si morbus jam est in statu & signa coctionis nondum apparent, Venæsectio interdum adhuc locum habet, sed regimen placide diaphoreticum subjungendum est, ne humorum congestionem ad caput

cum periculo fiant: sæpius tamen præstat ab ea illo tempore abstinere.

- 3 Si vero signa coctionis jam præsto sunt, pessimo consilio Vena secatur: turbantur enim per eam placidæ & summe necessariæ per diaphoresin excretionem, fiunt insignes congestionem ad caput, quas vel Hæmorrhagiæ enormes, vel deliria, vel convulsiones, vel affectus soporosi sequuntur.
- 4 Purgantia & Vomitoria sæpius totum morbum pervertunt. Vir Sanguineo-Cholericus triginta & aliquot annorum circa vespertinam iram commovebatur, quam commotionem sequenti die mane Febris continens excipiebat: fumebat hinc suafu cujusdam illo ipso die in æstu febrili vomitorium, quod copiosus vomitus producebat; Febris videbatur mitigata aliquo modo; cum vero calor nihilominus continuaret, altero die secabatur vena in brachio: tertio ad mitigandam Febrem purgatio instituebatur & quarto, quoniam de auctorioribus doloribus capitis conquerebatur, vena in pede aperiebatur: tum vero morbus majora semper incrementa caperet, die quinto vocabar ad eum; Urina erat cruda, dolores capitis erant insignes, facies torva &c. & aliquoties sanguinis guttæ e naribus stillabant: prælagiebam deliria, quæ etiam a meridie sequebantur: sexto die interdum mens constabat, interdum vero vacillabat. Septimo die circa meridiem dolores capitis prorsus evanuerant, cum maximo gaudio adstantium: cum vero mortem instare assererem, irridebar ab iis: sed hora septima vespertina moriebatur: Alius eodem tempore tali Febre corripiebatur, quæ tamen magis composita erat, tertio die vocabatur Medicus, qui Purgantis usum suadebat ac quarto die Venæsectionem; quidam consanguineorum ex me quærebant, utrum Venæsectio utilis vel necessaria esset? & cum utrumque negarem ac me gravia deliria metuere assererem, hic ad ægrotum properabat, sed vena jam secta erat; Lipothymia statim sequebatur Venæsectionem & paucis elapsis horis deliria continua accedebant, quæ ad mortem usque, sexto die supervenientem, continuabant. Secundo Praxeos meæ anno consulebar ab ægroto simili Febre laborante; tertius jam erat dies; venam aperire jubebam, sed quarto gravia sequebantur deliria, quæ non nisi decimo septimo die finiebantur, & æger præter meam spem & opinionem evadebat. Illud adhuc notandum est, quod quinto die mane accederet Hæmorrhagia narium, quæ quotidie fere sine ullo levamine ægrotum affligebat.
- 5 Omnia Volatilia in hac Febre prorsus nullius sunt usus quoniam placidam excretionem turbant, & Inflammationes internas vel invitant, vel actu producant; vel ad minimum tumores cachecticos post se trahunt.
- 6 Abstinendum quoque est ab Opiatis, quæ alias ad sedandos capitis dolores a quibusdam laudantur, quoniam motus inessentialis supprimunt & excretionem impediunt, adeoque affectibus soporosis & gravioribus deliriis viam sternunt.
- 7 Nimia refrigerantia, emulsiva & acida sanguinem nimium inspissant & varia pathemata, inprimis stases mucosas, hinc inde & quidem præcipue in faucibus producant, quare fugienda sunt; si vero in usum trahuntur, præsertim quando nulla Vena secta fuit, alexipharmaca iisdem semper interponantur.
- 8 Tincturæ bezoardicæ, quarum compositione Camphora, Myrrha & Opium ingreditur, in hac Febre nullum habent locum, quoniam humores nimis exagitant, & graves turbas producant.
- 9 Quietam continentiam in lecto ægrotantes semper servant, ne placida diaphoresis impediatur.
- 10 Omne regimen nimis calidum in hisce Febribus summe noxium est.
- 11 Fugiant quoque ægrotantes animi commotiones graviores, quæ sæpius momento citius totum morbum bene etiam succedentem corrumpunt.
- 12 Præservationis gratia instituatur ad Plethoram imminuendam Venæsectiones & ægroti abstineant ab omnibus iis, quæ Plethoram commovere solent.



## CAPUT QUARTUM.

D E

*Synocha putrida sive Continente composita.*

- I. *Definitio.* **S**ynocha putrida est Febris composita ex continente & continua, in qua principium vitale sive Natura abundantiam sanguinis imminuere, & simul vitiosam ejus qualitatem corrigere & expellere nititur.
- II. *Differentia.*
- 1 A *Synocha simplici*, respectu compositionis sive Febris continuæ concurrentis.
  - 2 Ab *Ardente*. Vid. Tab. præced. & seq.
- III. *Signa.*
- 1 Invadit interdum uti *Synocha simplex* cum insigni æstu.
  - 2 Interdum vero cum horrore incipit, quem æstus gravior sequitur.
  - 3 Accedunt dolores capitis lancinantes, turgescencia & rubor faciei oculorum, respiratio profunda & laboriosa, anxietates oppletivæ &c. Vid. Tab. præced.
  - 4 Pulsus est magnus frequens & celer.
  - 5 Urina est rubicunda.
  - 6 Conjunguntur tensiones molestissimæ dorsi & artuum, quæ se tam in exacerbationum principio, quam eorum decremento manifestant.
  - 7 Omnia symptomata hic sunt graviora, quam in *Synocha simplici*.
  - 8 Hæc non continuo affligit eodem æstus gradu uti *Synocha simplex*, sed suas habet exacerbationes & aliquales remissiones.
  - 9 Æstus est major ac in continua simplici: adeoque ex hoc ipso & aliis præcedentibus facile apparet Febrem esse complicatam sive compositam.
- IV. *Subjectum.*
- 1 Juniores Plethorici.
  - 2 Diæta lauta utentes & corpus immoderate moventes.
  - 3 Spissitudine simul sanguinis aut alio ejus vitio laborantes.
  - 4 Subtilem orgasmicam materiam in sanguine abundantiam habentes.
  - 5 Evacuationes sanguinis consuetas negligentes.
  - 6 Suppressionem fluxuum sanguinis afflicti.
  - 7 Corpus sudore madens aeri frigido exponentes. Vid. Tab. præcedentes.
- V. *Prognosis.*
- 1 Quoniam morbus hic est complicatus & duplicem etiam causam, abundantiam scil. sanguinis ejusque vitiosam qualitatem, habet, ideo etiam majori periculo exponit ægrotantes, quam *Synocha simplex* & Febris continua.
  - 2 Quo mitiora sunt symptomata, eo melior est status, quo gravior eo pejor.
  - 3 Quando symptomata continuo ingravescent, pessimum est indicium.
  - 4 Quo citius signa coctionis in Urina apparent, eo major restitutionis est spes.
  - 5 Urina alba in *Synocha* mortem denotat. *Forest. Lib. I. Observ. 15. in Schol.*
  - 6 Febris hisce pro diversitate congestionum facile junguntur variæ Inflammationes, aliique affectus.
  - 7 In junioribus e.g. Phrenitides, Convulsiones, Peripneumoniæ, Anginæ, in senibus affectus soporosi, in aliis inflammationes intestinorum, viscerum, uteri &c.
  - 8 Emissio lachrymarum involuntaria, pulsus debilis atque deficiens, Urina pauca, livida aut nigra periculum significat. *Forest. l. a. Obs. 11. in Schol.*
  - 9 Somnus profundus ac difficultas sermonis malum portendit. *Id. id.*
  - 10 Si legitimo modo procedit, solvitur in junioribus per Hæmorrhagias narium criticas, in consistente vero ætate per sudores, tam criticos, quam successivos.

VI. *Remedia.*

- 1 Abundantiam sanguinis imminuentia, Venæsectio in brachio, sub lingua.
- 2 Æstus sanguinis temperantia: Nitrosa, absorbentia, salia digestiva, Emulsiones, Julepi.
- 3 Diaphoresin placide promoventia: Bezoard. miner. & diaphoret. Essent. Alexiph. Stahl's, Mixt. simplex.
- 4 Alvum aperientia: suppositoria, Clysteres.

*Formula Remediorum.*

- 1 Potiuncula diapnoico-temperans.  

Rx. Aq. Fl. Acac.	Matr. Perl.
Galeg.	Nitr. perlat. a. ʒss.
Scorzon.	Tab. Mixst. f. ʒij. M.
C. C. citrat. a. ʒj.	D. sing. 2. vel 3. horis cochl. ij.
ʒ diaph.	
- 2 Alia diapnoico-alexipharmaca.  

Rx. Aq. scabios.	Sir. acetos. citr. ʒvj. M.
Card. bened.	D. alternatim cum præcedente.
Fl. Til. a. ʒjss.	
Mixt. simpl. ʒjss.	

Reliquas Formulas Vid. Tab. præced.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Cum Plethora ordinarie in hocce affectu urgeat, ea mature instituat, si aliæ circumstantiæ eam permittunt, ut hoc modo Febris imminuatur, & materiæ orgasmicæ excretio promoveatur.
- 2 Id quod ut eo melius contingere queat, Venæsectioni subjungantur blanda diaphoretica fixa cum temperantibus mixta, quo eorum ope humores ad peripheriam corporis ferantur & materia vitiosa debito tempore per eam excernatur.
- 3 Hisce interponatur usus Essentiæ alexipharmacæ aut Mixturæ simplicis, hæc enim miasmata sanguini inhærentia aliquo modo fortius ad habitum corporis urgent, eorumque excretionem faciunt.
- 4 Insignem quoque in hoc affectu efficaciam habent Emulsiones temperantes ex Sem. Card. Mariæ aliisque paratæ, ut & Julapia, si reliquis remediis interponuntur, quoniam metuendum nimium orgasmum præcavent & præsentem tollunt.
- 5 Alvus continuo aperta servetur per Clysteres emollientes, qui subinde repeti possunt; alvo enim aperta translationes humorum ad caput, quæ frequentissime in hoc morbo occurrunt, præcaventur & imminuuntur.

VIII. *Cautele Practicæ.*

- 1 Venæsectio interdum quidem insignem habet usum in hisce Febris, quando Plethora nimium urget, non tamen indifferenter in omnibus instituat.
- 2 Si subjecta frequentibus alias ad caput congestionibus sine subsecutis Hæmorrhagiis obnoxia fuerunt, caute quoque cum Venæsectione procedendum est, quoniam eam, inpr. si intempestivo tempore instituitur, gravissimæ ad caput congestiones cum insigni periculo sequuntur, quibus non ita facile mederi possibile est.
- 3 Semper autem, ubi necessitas Venæsectionem urget, in primo statim principio ea instituat & quidem in satis larga quantitate, quod si negligatur, graviora semper damna sequuntur.
- 4 Cum vero nihilominus peracta Venæsectione sæpius circa criticos dies graves sequantur congestiones ad caput, quæ deliria & Phrenitidem ordinarie post se trahunt, versus dies criticos ad hæcce præcavenda vel vena frontis vel sublingualis aperiantur.
- 5 Post quamvis Venæsectionem in tali Febre composita diaphoretica fixa cum alexipharmacis lenibus in usum trahantur, ut liber motus humorum ad peripheriam corporis conservetur & congestiones ad caput præcaveantur.
- 6 Nunquam tamen præscribantur calida volatilia sanguinis orgasmum magis augmentia & congestiones ad caput cum variis malis confectariis producentia.



- 7 Pessima est quorundam Practicorum methodus in talibus Febribus, qui in principio statim Vomitoriis, Purgantibus & Venæsectionibus repetitis utuntur, Natura enim per talia remedia prorsus a suo scopo revocatur, & materia noxia cum magno periculo ad viscera derivatur. Adolescens hujus loci viginti annorum temperamenti sanguinei corripiebatur tali Febre, Medicus quidam consultus illico Vomitorium præscribebat, ac tertio die vena brachii aperiiebatur. Vocabar tertio die vespere ad eum; adstantes referebant ægrotum post assumptum evacuans plus quam vigesies vomuisse & alvum deposuisse, post Venæsectionem vero statim delirare incepisse. Præscribebam Potiunculam diaphoreticam & Essentiam alexipharmacam Stahlii & Emulsionem ex Amygdalis dulcibus, semine Citri & Cardui Mariæ cum Aquis diaphoreticis paratam, quibus analeptica interponere jubebam. Urina erat cruda ac deliria furiosa ad undecimum usque diem continuabant: tandem cum hæc remedia continuarentur ipso undecimo die coctionis signa in Urina apparebant, ac die decimo quinto æger ad se redibat. Femina fere quinquagenaria tum temporis eadem Febre corripiebatur, præscribebatur a quodam purgans, & Venæsectio aliquoties instituebatur, exhibebatur etiam Tinctura bezoardica ad venenum e tempore expellendum: die septimo, cum ad illam vocarer, Purpura miliaris erumpebat, deliria aquarum jam die aderant, præscribebam lenia alexipharmaca & diaphoretica cum analepticis, sed nono die accedebant Lipothymia graves, quas mors excipiebat.
- 8 Terræ sigillatæ aliaque adstringentia, alexipharmaca credita, quæ vulgares Pulveres bezoardicos ingrediuntur, hic nullius sunt usus, quia transpirationem necessariam magis retardant, quam promoveant.
- 9 Omne regimen calidum & coactum in hisce Febribus noxium est, magis convenit quæta & tranquilla continentia in lecto.
- 10 Versus dies criticos a refrigerantibus abstinendum & potius diaphoreticis & alexipharmacis insistendum est, ut evacuationes necessariae eo melius promoveantur.
- 11 Satius est evacuationes criticas, etiam nimias visas, tolerare, quam imprudenti medicatione eas suppressere, facilius enim est damna a nimia crisi inducta reparare, quam iisdem, quæ suppressionem earum sequuntur, mederi: sequuntur autem ordinarie Oedemata, Cachexia, Hæctica, Hydropes &c.
- 12 Si alvus est aperienda, sufficit, si singulis binis vel ternis diebus Clyster injicitur.
- 13 Potus ad diluendam massam sanguineam semper in sufficienti copia concedatur, abstinendum tamen est a frigido, necessariae secretionis & excretionis turbante: potius convenit calidus aquæ potus, alexipharmacis aliquantum alteratus.
- 14 Animi tranquillitas omnibus tali Febre laborantibus summe commendanda est, graves enim animi commotiones excretiones impediunt.
- 15 Vesicatoria, quæ a quibusdam ignaris in hujusmodi Febribus commendantur, æstum magis promoveant, quam imminuunt & inflammationibus internis anam præbent.
- 16 Externa refrigerantia oleosa & narcotica temporibus ad imminuendum capitis dolorem applicita interdum quidem aliqualem habent usum, sæpius tamen etiam frustra applicantur.
- 17 Oleum magnum Scorpionum Matthioli cum aliis scrobiculo cordis & carpis applicatum magis ad curialia, quam ad vera curativa pertinet remedia.
- 18 Nimia remediorum copia, uti in omnibus morbis, præcipue acutis, ita & in hisce quam maxime fugienda est; Natura enim paucis, convenientibus vero, remediis contenta est, & ægroti paucistractati ordinarie citius & certius convalescunt, quam si multa iisdem exhibentur.
- 19 Quoniam tales morbi complicati frequentibus obnoxii sunt mutationibus, ideo Medicus etiam serio ad illos attendat, & necessaria ac convenientia remedia

præscribat: nunquam tamen extra necessitatis casum illaudabilem eorum sequatur methodum, qui, ut se reddant necessarios, visitationes faciunt necessarias, atque hinc iisdem ægrotantes obruunt.

20 Post superatum morbum ad præcavendam recidivam semper exhibeantur lenia laxantia.

21 Præservationis gratia tempestivæ instituantur Venæsectiones, reliquaque sanguinis depurationi dicata non negligantur, ac omnia, quæ Massam sanguinis commovere solent, fugiantur.

## CAPUT QUINTUM.

### D E

#### Febre Continua.

I. *Definitio.* **F**ebbris continua est species Februm acutarum, in qua Natura ope motuum secretoriorum & excretoriorum auctorum vel materiam quandam subtilem & orgasticam ad sanguinis nimiam resolutionem & quidem putredinosam producendam aptam, vel lympham vitiosam corrigere & expellere conatur, sensibiles remissiones habens.

#### II. *Differentia.*

1 A *Febre continente*, quæ sine horrore incipit atque eodem æstus tenore ad finem usque fere durat, cum econtra continua cum horrore invadat atque sensibiles remissiones habet.

2 Differt etiam hæc Febris respectu *causarum, temperamentorum & graduum*, quorum intuitu vel gravius vel mitius affligit.

#### III. *Signa.*

1 Invadit ordinarie cum horrore, non quidem continuo, sed cum calore in principio aliquo modo alternante & sæpius recurrente, non tamen diu, ut in intermittentibus, durante.

2 Quem excipit æstus, sensim sensimque increscens.

3 Cui jungitur insignis capitis dolor.

4 Adest sitis cum oris & faucium siccitate.

5 Appetitus & vires prosteruntur cum tensione gravativa in artubus.

6 Pulsus est celer & frequens.

7 Conjungitur etiam interdum insignis nausea & actualis vomitus, inpr. si cruditates in Ventriculo hærent.

8 Somnus est nullus, vel admodum inquietus.

9 Urina est tenuis & rubicunda.

10 Alvus ordinarie est obstructa.

11 Post quartum diem, si Febris debito modo procedit, post quem vix Paroxysmum sequitur lenis mador atque tandem actuales sudores.

12 Nunquam tamen color reliquaque symptomata febrilia plane intermittunt, sed continuant ad novam usque exacerbationem, ubi iterum ingravescent.

#### IV. *Subiecta.*

1 Homines juniores & mediæ ætatis.

2 Cholerici & Sanguineo-Cholerici.

3 Ad iram maxime proni.

4 Materiam subtilem orgasticam in humoribus habentes.

5 Sanguinis fluxuum consuetorum suppressione laborantes.

6 Vino & liquoribus spirituosius indulgentes.

7 Necessarias assuetas evacuationes feri & sanguinis negligentes.

8 Corpus calidum frigido exponentes.

9 Motu immoderato corpus exercentes.

#### V. *Prognosis.*

1 Si præsentibus in Ventriculo cruditatibus ab initio statim hujus febris vomitus oriuntur, bonum est reliquus morbi cursus, nisi alia obstant, levior est.

2 Quo citius signa coctionis in Urina conspicua fiunt, eo facilius etiam sequitur totius morbi curatio.

3 Si legitime decurrit hæc Febris, quarto die ordinarie coctionis signa apparent, quæ sudor successive postquam-



quamvis remissionem sequitur cum euphoria.

- 4 Si Febris hæc occupat subiecta Plethorica, semper gravior est, quoniam duplex h. m. Naturæ obicitur labor, primario quidem repurgatio Massæ sanguineæ a materia subtili organica, secundario vero imminutio Plethoræ, quæ principalem actum admodum turbat.
- 5 Quo magis disposita sunt subiecta ad excretionem diaphoreticam & diureticam, eo facilius etiam morbus per dictas excretiones solvitur.
- 6 Si quarto diæ coctionis signa apparent, ut plurimum solvitur die septimo, sin minus, ad decimum quartum usque extenditur.
- 7 In subiectis junioribus & Plethoricis Natura interdum Febrem per Hæmorrhagias narium die critico contingentes vel sensibiliter imminuit vel prorsus solvit. Vidimus hoc in duabus sororibus, quarum altera erat quinque, altera septem annorum, utraque erat Plethorica & sanguinea a similis constitutionis parentibus genita. Hæ tempore verno corripiebantur hora circiter quarta pomeridiana levi horrore, quem æstus reliquaque symptomata febrilia sequebantur, versus diluculum aliqualis observabatur remissio, calore febrili cum reliquis symptomatibus, quamvis in mitiori gradu, nihilominus continuantibus. Circa vespæram recurrebat exacerbatio cum reliquis accidentibus. Durabant hæc ad quartum usque diem, ubi nati minor Hæmorrhagia narium larga corripiebatur, quæ eam a Febre liberabat. In altera non nisi aliquot sanguinis guttæ naribus erumpebant, & bina Febris ad septimum usque continuabat, quo ipso die versus meridiem per eandem Hæmorrhagiam solvebatur.

#### VI. Remedia.

- 1 Plethoram, si præsto est, imminuentia, Venæsectio mature instituta.
- 2 Temperantia & abstergentia: Nitrum depur. & iat. regneratum, Arcanum duplicatum, Tart. Vit. Conchæ citratæ, Lapides ☿, Mater Perlarum, succus citri, sirupus acetositate citri, Emulsionem, Potus sufficiens.
- 3 Diaphoresin & Diuresin promoventia: præter antea dicta Antimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, Essentia alexipharmaca Stahlî, Mixture simplex, Decocta calida cum Radicibus alexipharmacis temperatis parata, Regimen placide calidum, tranquillitas in lecto.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis temperans.

R. Lap. ☿. Div. in 6. p. aq.  
Nitr. regener. ʒj. D. sing. 4. horis.  
Cinnab. ʒij. ʒj. M.

##### 2 Alius.

R. Conch. citrat. Nitr. ʒiat. ʒj. M.  
Tart. Vit. Divid. & D. ut antea.  
3 Potiuncula diaphoretica.  
R. Aq. Card. bened. C. C. Philos.  
Pl. Acac. an. ʒij. Matr. Perl. an. ʒss.  
Cord. frig. ʒj. Sacch. Canar. ʒij.  
ʒ diaphor. D. cochleatim singulis 2  
Nitr. regener. vel 3 horis.

##### 4 Species pro potu.

R. Ras. C. C. ʒij. finem adde.  
Rad. Scorzon. Pom. Citr. q. s. ad gratam  
Pimp. alb. an. ʒj. aciditatem.  
Incis. Coq. in s. q. Aq. f. sub

##### 5 Potiuncula analeptica & alexipharmaca.

R. Aq. Borræ. Ess. alexiph. ʒij.  
C. C. citr. Sir. Ceras. acid. ʒvj. M.  
Ceras. nigr. D. cochleatim & interpo-  
Galeg. natur. reliquis diaphore-  
Cinnam. Cyd. an. ʒj. ticis fixis & temperanti-  
Succ. Citr. rec. ʒij. bus.

##### 6 Mixture alexipharmaca.

R. Ess. Pimpin. alb. Spir. Nitr. ʒj. M.  
Scord. an. ʒij. D. gutt. 25. 30. pro dosi.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Cum Naturæ principalis intentio sit in hac Febre per motus secretorios & excretorios auctiores expellere materiam quandam subtilem organica in humoribus hærentem, Medicus etiam Naturam in hoc casu imitetur & præscribat talia remedia, quæ eiusdem intentioni satisfaciunt.
- 2 Uti autem Natura materiam illam prius præparat ac postea successive expellit, ita Medicus eidem succurrat, & primo in usum trahat remedia præparantia, qualia sunt abstergentia, digestiva, diluentia, blanda acida, emulsiva, ut hoc modo materia illa temperetur ejusque nocendi qualitas aliquo modo imminuatur.
- 3 Cum vero nulla materia ita alteretur, ut iterum cum Natura in gratiam redire queat, sed ideo tantum præparetur, ut eo commodius sine noxæ corpore expelli possit: hinc etiam modo dictis remediis talia jungantur vel interponantur, quæ materiam præparatam sensim sensimque cum reliquis humoribus versus peripheriam corporis pellunt, ut ibidem placida fiat transpiratio: talia sunt potissimum remedia Antimonialia fixa, uti & diaphoreticum & Bezoardicum minerale.
- 4 Si vero hæc non sufficiunt, jungantur iisdem lenia alexipharmaca, v. g. Mixture simplex, de qua singulis diebus duæ doses ad 25. 30 gutt. dentur, hæc enim respectu acidi temperat, respectu vero alexipharmacorum moderate ad peripheriam corporis pellit.
- 5 Peracta tali præparatione, si post quartum diem placida nondum observatur transpiratio, exhibeatur remittente Febre dosis Tincturæ bezoardicæ sine Camphora, Myrrha & Opio, aut Essentiæ alexipharmacæ, ut hoc modo Natura ad auctiorem transpirationem incitetur.
- 6 Et talis methodus, digestivorum scilicet & diaphoreticorum fixorum cum abso bentibus in æstu, in declinatione vero Essentiæ alexipharmacæ oblatio, in reliquis subsequentibus paroxysmis observetur, donec Febris plenarie cesset.
- 7 Si vero subiecta calidioris sunt constitutionis, ita ut ab usu alexipharmacorum aliquid damni metuendum sit, iisdem substituatur decoctum ex Radicibus alexipharmacis temperatis paratum, quod in declinatione paroxysmi calide detur.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Si in subiectis voracibus aut multas cruditates in Ventriculo habentibus in initio morbi superveniunt vomitus, ii nequaquam sistantur, sed potius exhibeantur digestiva, ad promovendam illius materiæ excretionem: si vero nimium urgent, post digestiva aut cum illis detur pulvis Chacarillæ cum Cinnabari.
- 2 Venæsectio in hoc morbo respectu Febris prorsus nullum habet usum, nisi Plethora admodum urgeat, antea jam per varias causas commota fuerit & metus sit, ne necessarias reliquas secretiones & excretiones impediat.
- 3 Instituatur autem in primo statim morbi principio & post eam peractam exhibeantur remedia diaphoretica, ut hoc modo humores ad peripheriam corporis ferantur ac congestiones ad caput impediuntur.
- 4 Purgantibus quoque & vomitoriis nullus concedatur locus, quoniam ordinem Naturæ, juxta quem ope motuum febrilium materia organica a partibus interioribus ad exteriores ferri & per illas excerni debet, invertunt, & materiam illam ad interiores insigni cum periculo derivant.
- 5 Positiva sudorifera neque in principio hujus morbi neque in ejus cursu exhibeantur, quoniam Natura tum temporis adhuc in præparatione & abstersione materiæ occupata est: facta vero præparatione & lenia alexipharmaca locum habent, ad diaphoresim promovendam: fortiora vero eandem vel turbant, vel nimium cum damno augent.
- 6 Regimen calidum in hisce Febribus semper noxium est: quia Naturam non nisi placidam excretionem postulat.



- 7 Nimia quoque refrigerantia sanguinem incrassantia noxia sunt, quoniam excretionem necessariam impediunt.
- 8 Nec etiam opiata & narcotica externa, quæ ad dolores capitis compescendos & somnum conciliandum a quibusdam commendantur, in usum trahantur: febriles enim motus certissime turbant.
- 9 Tandem abstinendum est a jectigatione corporis, magis enim ad transpirationem promovendam confert tranquilla in lecto continentia.

## CAPUT SEXTUM.

## D E

## Febre biliosa ardente.

I. *Definitio.* **F**ebbris biliosa est Febris acuta, continua & secundaria sive symptomatice a Natura eum in finem instituta, ut materia acido-corrosiva, ex bilis effusæ & ciborum facile aculentium fermentatione nata, intestinum arrosionem & inflammationem producere apta nata, vel per vomitum, vel per Diarrhœam expellatur, quam gravia comitantur symptomata.

II. *Differentia.*

- 1 A *Synocha simplici*, quæ Febris est continens a causa sanguinea dependens sine remissione, hæc vero a bile originem trahens continua est, & exacerbationes habet. Cui adde quod Synocha sine horrore & statim cum calore invadat ægrotantes, in Febre biliosa autem ordinarie horror in principio observatur.
- 2 A *Synocha putrida*, quæ est Febris composita ex continente & continua, cum e contra biliosa sit solum continua.
- 3 A *Causo* sive Febre ardente strictè sic dicta, quomodo differat, vid. *Tab. seq.*
- 4 A *Cholera humida*, hæc si in simplicioribus Diarrhœæ biliosæ terminis subsistit, ut plurimum nullam Febrem comitem habet: si vero vera est Cholera, parum vel nihil secundum observationes rite considerata differt ab hac Febre, æque enim præcipitis, imo celerioris est exitus ac Febris biliosa, & omnia symptomata aut saltem præcipua de actuali Febris, licet per frequentiores anotericas & catotericas excretiones impeditæ, concursu testantur.

III. *Signa.*

- 1 Invadit ordinarie cum insigni horrore per universum habitum corporis, qui tamen prægressa alia pathemata sequitur.
- 2 Quem mox sequitur æstus siccus intolerabilis.
- 3 Hunc comitatur dolor capitis gravissimus.
- 4 Cui jungitur insignis anxietas & angustia præcordiorum.
- 5 Accedit æstus gravis præcordiorum ad os internum & fauces usque se extendens.
- 6 Hujus individuus comes est sitis intensa, ita ut vix extinguere possit.
- 7 Quæ symptomata omnia nisi mature cessent, (quod tamen post prægressum gravem horrorem raro contingit) cum Febre ingravescunt.
- 8 Tandem sequuntur vomitus biliosi, quibus materia caustica faucibus arrosionem & dentibus stuporem inducens ejicitur.
- 9 Jungitur huic utpl. inpr. si materia biliosa mature non ejicitur, ejectio ejusdem biliosæ causticæ materiæ per inferiora.
- 10 Somnus adest nullus aut maxime anxius & turbulentus.
- 11 Oculi & habitus corporis sæpius flavo tinguntur colore.
- 12 Accedunt sæpius deliria furiosa.
- 13 Quotidie summo mane circa ortum solis habet exacerbationes, semitertianaria commotione, sed sine vehementibus rigoribus.

- 14 Quæcunque Febres aliis horis invadunt, præcipue vero vespertinis, cum æstu arido, torrido, amaritie oris, illæ biliosæ non sunt, sed vel ab iracundia, vel ab habitu macilento, vel primarum viarum cruditate dependent. *Stahl. Problem. p. 8.*
- 15 Urina est rubicunda & in declinatione sedimentum deponit.
- 16 Tandem per sudores, in quavis remissione erumpentes, Febris solvitur.

IV. *Subiectum.*

- 1 Homines temperamenti Cholericæ aut Cholericæ sanguinei.
- 2 Vini & Spiritui Vini dediti.
- 3 Diætæ aromatica abutentes.
- 4 Cibos & potum ad fermentescendum pronos, fructus horæos, mellita, cerevisiam feculentam, mustum &c. assumentes.
- 5 Quibus bilis ante vel post tales sumptos cibos ob iram in intestina effunditur, & cum cibis fermentescens acrimoniam penetrantissimam acido-corrosivam producit.

V. *Prognosis.*

- 1 Quo citius materia corrupta copiose per superiora vel per inferiora ejicitur, eo melior curationis est spes & contra.
- 2 Si per superiora & inferiora simul humorum fit evacuatio, periculum semper subest.
- 3 Si post motus fortiores parum vel nihil per vomitum evacuetur, accedunt Cardialgiæ syncopaticæ, anxietates gravissimæ, tinnitus aurium, caligines oculorum, deliria furiosa.
- 4 Si impetus magis deorsum vergit, sequuntur tormina obtusa, puncturæ exquisitæ transitorie, palpitationes & tremores epigastricæ & hypogastricæ regionis, singultus &c. *Stahl. Problem. p. 8.*
- 5 Quando ab initio sensibilis adest horror, eo magis tendunt tales Febres ad Vomitum.
- 6 Quo minus vero sunt sensibiles sed diu durantes, eo facilius accedunt Diarrhœæ.
- 7 Alvus clausa semper periculum portendit, melioris vero spei est ejusdem laxitas.
- 8 Eo majus vero est periculum, si in statu contingit alvi adstrictio, præsentibus aliis gravioribus symptomatibus: imo ordinarie funestum est.
- 9 Vomitum in statu pessimus est. Plur. Vid. *Tab. sequ.*

VI. *Remedia.*

- 1 Materiam acrem evacuantia: Rhabarbarum, Decoctum Tamarindorum, Pulpa eorum, Magnesia alba, Clysteres cum oleis & stimulo salino.
- 2 Materiam causticam corrigentia: absorbentia, nitrofa, digestiva, diluentia, acidula, mucilaginosæ, emulsivæ. *Lap. ʒss, Percar. Mat. Perl. Conch. præparat. Cryst. montana. Nitr. depur. regenerat. ʒiat. Tart. Vit. Arcan. duplic. Potus sufficiens inpr. acidulus, uti Decoct. C. C. citrat. Julepi aciduli, juscula non pingua.*
- 3 Febri & humorum discussioni prospicientia: Nitrofa & absorbentia, Mixtura simplex, Essentia alexipharmaca Stahlî.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis laxans.  
*R. Magnes. alb. ʒj. D. pr. dosi.*  
*Nitr. ʒiat. ʒj. M.*
- 2 Alius.  
*R. Rhab. elect. ʒss. ʒij. D. ut antea.*  
*Nitr. ʒiat. ʒj. M.*
- 3 Potiuncula temperans.  
*R. Aq. Cheresol. Tart. Vit. an. ʒss.*  
*Plantag. an. ʒij. Syr. acetos. Citr. ʒss. M.*  
*Nitr. depur. D. sapius cochleatim.*  
*Lap. ʒss*
- 4 Species pro potu.  
*R. Raf. C. C. ʒiv. Pom. Citr. vel succ. Citr.*  
*Coq. in s. q. Aq. simpl. rec. q. s.*  
*sub finem Coct. adde*



## 5 Clyster emolliens.

R. Decoct. Chamom. Mell. Rosac. ʒvj.  
 Furfur. a. ʒv. Sal. Gemm. ʒij.  
 Ol. Chamom. Vit. Ov. No. j. M.  
 Lil. al. a. ʒj. F. l. a. Clyster.

## 6 Mixtura diuretico-diaphoretica.

R. Ess. alexiph. Spir. Vitr. ʒj. M.  
 Pimpin. alb. a. ʒij. D. 25. 30. gutt.

## 7 Alia Tonica.

R. Tinct. ʒiiacr. ʒij. D. mane & vespere 30. gutt.  
 Spir. C. C. ʒj. M.

## 8 Pulvis tonicus.

R. Lap. ʒv. D. 2. cusp. cult. sing. 4. vel 6.  
 Corall. r. ppt. a. ʒj. horis.  
 Spec. de Hyac. ʒss. M.

## VII. Methodus medendi.

1 Si Medicus in primo statim morbi initio vocatur, optimum est, si per lene vomitorium purgans aut conveniens aliud purgans materia acris caustica statim evacuatur, ne posteriores noxas edat.

2 Quando vero principium jam præterlapsum est, exhibeantur supra dicta corrigentia, ut hoc modo materię acidę corrosivę impetus frangatur; hisce remediis diversi obtinentur fines, nam

a Absorbentia & nitrosa incrassant agilem & penetrantissimam hancce materiam. ita ut tanto impetu in intestina corrosivitate sua agere nequeat.

b Salia digestiva partim abstergunt materiam illam ab intestinis, partim nitrosis juncta temperant æstum & arrosionem intestinis inductam, partim etiam materię excretionem tam per superiora, quam per inferiora promovent.

c Mucilaginosi, diluentia & emulsiva vero partim diluunt materiam acerrimam, ita ut viribus disjunctis minor ejus sit nocendi potentia, partim eandem involvunt, ut spiculis suis intestina tanta violentia aggredi nequeant, partim materiam salivalem coagulata in parte affecta fluxilem reddant & fibras constrictas relaxant, adeoque hoc ipso excretionem humorum corruptorum promovent.

d Omnia hæcce simul æstum sanguinis optime temperant & partes biliosas acres in sanguine contentas diluendo ad faciliorem per peripheriam corporis excretionem disponunt.

e Ac tandem ipsa admodum urgentia symptomata, sitim, ardorem &c. mitigant.

3 Si nulla post horum usum sequitur evacuatio per superiora vel inferiora, exhibeatur blandum quoddam laxans, v. g. Decoctum Tamarindorum, in quo infundatur Rhabarbarum, aut etiam hoc solum datur. Magnesia quoque alba hic suo non caret usu, quatenus causticam aciditatem & temperat & evacuat. Si autem hæcce commode exhiberi nequeunt, injiciantur Clysteres mucilaginosi, ex hordeo excoctato, cum oleis largiter commixti & sufficiente stimulo salino penetrantiores redditi.

4 Cum vero Febris, quam Natura potissimum ad impediendum Inflammationis intestinorum inceptæ ulteriorem progressum instituit, exacta consideratione opus habeat, exhibeantur quoque talia remedia, quæ discussioni inflammationis & resolutioni materię impactæ prospiciunt; hoc in casu insignem habet usum Mixtura simplex, quæ resolvit. temperat & diaphoresin promovet: huic fini etiam inservit Essentia alexipharmaca Stahlī, Pulveribus temperantibus & Nitrosis aut etiam Potiunculis parvis dosibus interposita. Discussionem quoque optime promovet Spiritus Vini camphoratus, cum linteaminibus Ventriculo impositus.

5 Si hoc modo materię causticę correctio & evacuatio peracta est, ac Febris quoque ipsa per diaphoretica indies mitigatur, tandem exhibeantur ad roborandas partes antea afflictas lenia tonica & adstringentia, Corallia scil. rubra præparata, species de Hyacintho & Mixtura tonica Stahlī, sed moderatis dosibus.

6 Hisce etiam non sine fructu præmitti possunt lenia laxantia, ut hoc modo sordes biliosę, intestinis

adhuc hærentes, eo melius removeantur.

## VIII. Cautela Practicæ.

1 Humorū corruptorum evacuatio summe quidem utilis est in gravi hoc morbo & sæpius etiam cito morbum huncce finit, in primo tamen statim morbi principio instituenda est, alias plus damni, quam commodi profert. Vir hujus loci quinquagenarius tempore prandii post gravem iracundiam gravissima corripiebatur cholera. Vocabar ad eum hora prima pomeridiana, ejiciebat materiam biliosam corruptam, frequentius tamen per superiora, quam inferiora: præscribebam pulverem emeticum ex Ipecacuanhe granis viginti & sex vel octo granis Tart. Vitr. sed uxor ejus referebat, eum laborare Hernia ventrali: urgebam nihilominus usum hujus pulveris. Quare loco Herniæ applicabatur orbis ligneus cum fortiligatura. Pulsus maxime erat febrilis, sitis, anxietates, ardor Ventriculi, dolor capitis &c. insigniter urgebant. Vespere referebant adstantes eum post usum hujus pulveris materiam admodum corruptam duodecies vomuisse. Præscribebam Potiunculam temperantem, cum Julapio acidulo: Sequenti die omnia admodum tranquilla erant. Tertio die præscribebam Rhabarbarum in Decocto Tamarindorum infundendum, & sic spatio aliquot dierum post alia adhuc exhibita perfecte convalescebat.

2 Si vero tempus opportunum elapsum est, nunquam evacuantia in usum trahantur, sive enim talis materia caustica per superiora, sive per inferiora evacuetur, ob acrimoniam suam partes, quas præterlabitur, arrodit, adeoque malum laxius extenditur: ut taceam, quod talis materia minus correctæ, uno impetu commota, gravissimis vomitibus & excretionibus per alvum ordinarie occasionem præbeat.

3 Si Natura sponte suscipit evacuationem talis materię corruptæ, nunquam nisi summa urgente necessitate talis excretio cohibeatur; suppressa enim humorum eliminatione, acrimonia, quovis momento invalescens, eo magis aggreditur & arrodit partes vicinas. Si vero aliquid exhibendum est, sufficit temperantibus & abstergentibus admiscere vel interponere Corticem Chacarillæ in dosi moderata: eundem etiam usum præstant Mixtura simplex & Essentia alexipharmaca debito modo exhibitæ.

4 De Venæsectione quæritur, an ea hic aliquem habeat usum? sed cum ad totum cursum Febris ea directe profus nil conferat, imo potius damna certissima circa dies criticos inferat, satius est ab ea abstinere. Si tamen quis eam proficuum aut necessariam esse existimat, instituat eam in morbi principio, in subjectis admodum Plethoricis, & alias ad hanc sanguinis missionem assuetis.

5 Alvus obstructa, uti in talibus Febris semper pessimæ est indolis, ita libera optime conducit, quare semper aperta fervetur.

6 Omnia diaphoretica acria causam acriorem reddunt & symptomata exasperant, quare fugiantur & non nisi leniora, præmissis præmittendis, exhibeantur.

7 Absorbentia, acida & reliqua temperantia insignem quidem in hac Febre usum habent, abstinendum tamen est ab eorum abusu, quoniam materiam incrassando Febrem talem in lentam & Hæcticam mutant.

8 Regimen diaphoreticum calidum hic profus nullius est usus, quoniam bilem in Massa Sanguinea hærentem acriorem reddit, adeoque omnia symptomata febrilia magis auget.



## CAPUT SEPTIMUM.

D E

*Causo sive Febre ardente stricte sic dicta.*

I. *Definitio.* **C**Ausus est Febris acuta continua & secundaria, summum Febris ardentis gradum constituens, cum quidem in finem Naturæ excitata, ut noxa a bilis acrioris effusione præternaturali & nimia metuenda mature præcaveatur, aut actu jam facta, quanto potest fieri celeritate, tollatur, gravissima & sæpissime funesta conjuncta habens symptomata.

II. *Differentia.*A *Febre biliosa.*

a Respectu *symptomatum*, quæ in Causo longe sunt acerbiora, quam in Febre biliosa.

b Respectu *causæ*, quæ quidem in utraque Febre est bilis, in Causo tamen magis est acris quam in illa.

c Respectu *excretionis*: in Febre enim biliosa, materia caustica vel per superiora, vel per inferiora, vel per utramque viam excernitur, in Causo vero materia illa in Intestinis quasi incarceratione hæret.

d Respectu *exitus & curationis*: Febris enim Cholericæ, si modo mature auxilium fertur, sæpius curatur: Causus vero rarius curationem admittit, imprimis si jam invaluit, & paucis diebus ad mortem properat, unde etiam non immerito ab Hippocrate *Febris lethifera* appellatus fuit.

2 A *Febribus Continentibus.* Vid. Tab. præced.

3 A reliquis *Febribus continuis & Inflammatoriis* respectu vehementiæ symptomatum, partis affectæ & causarum.

III. *Signa.*

1 Invadit ordinariè cum anxietate maxima & inexplicabili fere, atque ardore summo præcordiorum.

2 Quem vel immediate præcedunt, vel comitantur, vel statim subsequuntur horripilationes iam continuantes, quam per brevissima intervalla repetentes.

3 Quas excipit æstus summus, aridus & torrens, quem tamen ægrotus magis circa partes internas percipit, quam Medicus, tactu caloris gradum explorantes.

4 Huic jungitur sitis adeo intensa, ut fere nullo modo extingui queat, & cum maxima concupiscentia & clamoribus etiam potum desiderent patientes, sitis etiam talis *clamosæ* nomen obtinuit.

5 Assumptum tamen potum gravia statim sequuntur incommoda, nimirum exasperationes omnium pathematum in Ventriculo & hypochondriis se exerentium.

6 Capitis dolor adeo est intensus, ita ut ægroti eum vix ferre queant.

7 Ardor in faucibus & ore invalescit singulis momentis, ita ut interdum labia & partes internæ nigredine afficiantur ac dehiscant & sanguinem fundant. Vidi id in ancilla ante duodecim annos: lingua, fauces & omnes oris internæ partes cum labiis in hac Febre maxime aridæ erant, nigræ & tumidæ: ex labiis discissis cruor effluebat: summa virium prostratio aliæque symptomata, huic morbo ordinaria mortem portendebant, sed nihilominus post usum temperantium & emulsivorum brevi tempore reconvalecebat: ab illo tamen tempore semper valetudinaria est.

8 Febre & æstu urgente ardor faucium sæpius post se trahit actualem inflammationem.

9 Respiratio est laboriosa & magna, fitque sæpius ore aperto, halitus sub expiratione egrediens est admodum calidos.

10 Agrypnia continuo urget, & quamvis interdum spatia pauci temporis dormiant, insomnia tamen anxiosa

& motus artuum subsultorii & fere convulsivi sonum continuo turbant.

11 Mentis nulla est tranquillitas, sed fastidium ad omnia continuo adest.

12 Accedunt etiam deliria, maximam partem furiosa, ita ut ægrotantes fere in lecto contineri nequeant.

13 Junguntur etiam, uti in aliis Hepatis gravioribus affectibus decolorationes oculorum & habitus corporis, ita ut dictæ partes flavo colore tingantur.

14 Alvus pertinaciter in hac Febre est adstricta, Vomitus etiam materiæ biliosæ hic non observatur.

15 Urina est valde rutilans, nonnunquam prorsus flammæ, sed pauca & crassa: in loco frigido turbida & rosei quasi coloris fit & ejusdem coloris sedimentum deponit: Urinæ tali turbidæ roseæ notabilis flavedo admixta est, quæ deposito sedimento in reliqua Urina permanet.

16 Quando Causus insolescit, ægroti post levissimas refrigerationes horripilationibus corripuntur, quibus jungitur mador perpetuus anxius, qui tamen post quamvis membri denudationem frigidus statim evadit. Idem etiam observatur in Febre biliosa.

17 Tandem superveniunt etiam Cardialgiæ Syncopticæ, Singultus, Convulsiones.

IV. *Subiectum.*

1 Homines siccioris constitutionis.

2 Cholericæ-Melancholici & Sanguineo-Melancholici.

3 Iracundiæ dediti, iram tamen suppressentes, Reliqua Vid. Tab. præced.

V. *Prognosis.*

1 Causus est periculosissimus affectus & ægroti eo afflicti rarius septimum diem superant, plurimi vero ante eum moriuntur, imo quosdam tertio, quarto die jugulat.

2 Quamvis autem aliquando curetur, utpl. tamen labem visceris cujusdam post se relinquit, ita ut vel ægroti exinde lento gradu nihilominus ad mortem properent, vel perpetuo maneant valetudinarii.

3 Et cum in Causo prorsus nulla materiæ causticæ sequatur excretio, eo facilius talis materia arroSIONES & inflammationes non tantum Intestinorum & Ventriculi, sed etiam vicinarum partium, producit, quæ autem quanti sint periculi quivis facile comprehendere poterit.

4 Evacuatur quidem interdum in Causo versus dies criticos per vomitum pars materiæ corruptæ, sed nimis tarde: materia enim hæcce penetrantissima est indolis & paucio tempore effectum suum deleterium edit; unde, etiam si postea ejiciatur, nihilominus læsio illa partibus inducta remanet & nullum levamen, sed potius gravissima symptomata & mors sequuntur.

5 Quo magis urgent anxietates præcordiales, eo peior est status.

6 Prunellodes facium inflammatio ut plurimum est funesta.

7 Deliria fortiora & continuantia morbi periculosissimum statum indicant.

8 Frigus partium externarum, internarum vero æstus urens Febris Lipyriæ & mortis instantis utpl. indicium sunt.

9 Urinæ nigræ, tenues & paucæ cum siccitate alvi, in hac Febre exitialia signa sunt.

10 Singultus ordinariè convulsivum est prodromus, hæc vero mortem instantem indicant.

VI. *Remedia.*

1 Materiam acrem invertentia: Lapides ☿, Mat. Perl. Conchæ præparatæ, aliæque absorbentia cum acido citri saturata. Nitrosa, diluentia.

2 Inflammationem discutientia: Mixtura simplex, Essentia alexipharmaca, Millefol. &c.

3 Ardorem mitigantia: Nitrum depuratum, regeneratum, blanda acida. Julapia acidulata, Decoct. Tamerind.

4 ArroSIONem restaurantia.



*Formula Remediorum.*

## 1 Decoctum temperans.

℞. Decoct. Tamarind. ℥ij. D. sæpius tepide.  
Nitr. ꝑiat. ℥ss. M.

## 2 Pulvis temperans.

℞. Nitr. regener. Cryst. mont. ppt. ℥j. M.  
Conch. citrat. an. ℥ij. D. sing. 4. horis 2. cusp. cultr.

## 3 Emulsio temperans.

℞. Amygd. dulc. ℥ss. Lap. ☿  
Sem. Citr. Cryst. mont. an. ꝑij.  
Card. Mar. an. ℥ij. Sacc. Canav. q. s. M.  
Mucilag. Hord. q. s. D. sæpius aliquot cochl.  
F. l. a. Emulsio. Reliquas Form. vid.  
Colat. ℥viij. vel IX. ad- Tab. præced.  
de.

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Cum Materia morbifica acerrima vim causticam possideat, ea ante omnia, quantum fieri potest, ita corrigatur, ne factam jam arroffionem cum damno augeat. Huic fini potissimum inserviunt Nitrofa, quæ in compescenda bilis acrimonia omnibus aliis remediis palmam facile præripiunt. Reliqua tamen, absorbentia scil. & diluentia, hic quoque suo non carent usu. Conf. Tab. præced.
- 2 Quoniam alvus clausa ordinarie symptomata exasperat, & totum malum auget, hinc per clysteres emollientes continuo aperta servetur.
- 3 Ad æstum febrilem sanguinis & illum quoque interiora afficientem sensum ardentem temperandum in usum trahantur partim modo laudata temperantia, partim Mixture simplex rite præparata, quæ reliquis interposita & temperat & discussioni Inflammationis prospicit.
- 4 Quod arroffionis restaurationem concernit, ea quidem Naturæ solius opus est, interim tamen in casu adeo fontico Medicus nihilominus Naturæ succurre debet: mucilaginosæ interius assumpta aliquid præstant, majus tamen solatium sperandum est a Clysteribus ex hordeo cum lacte & oleis paratis.
- 5 Tandem tonica in usum trahantur. Vid. Tab. præced.

VIII. *Cautela Prædictæ.*

- 1 Quamvis in Febre biliösa Vomitoria debito tempore exhibita insignem habeant usum, in Causo tamen, ubi materia morbifica est acerrima & Natura ordinarie nullos nisi intempestivos & utpl. insufficientes quoque instituit evacuationes, religioni sibi ducat Medicus, materiam talem causticam per remedia acria, qualia sunt ordinarie vomitoria magis irritare & evacuare, exinde enim gravissima sequantur consecraria: quare quilibet sequentia perpendat necesse est.
- a Nulla fere datur Febris, ubi Causa morbifica adeo corrosivæ est indolis ac in Causo, exceptis Febribus malignis & Pestilentialibus, ubi etiam materia insigniter agilis & penetrantissima deprehenditur.
- b Inter hæcæ autem materias notabilis & considerata digna occurrit differentia, in malignis enim Febribus sæpius hæret in humoribus in principio morborum, adeoque longe facilius a corpore per moderatam & maturam intensiorem secretionum & excretionum e corpore expelli potest, in Causo autem statim aggreditur intestina, Ventricul. & partes vicinas ad vitam maxime necessarias, quas statim vel arrodit, vel inflamat, quæ læsio non adeo facile restitui potest; unde etiam viscerum læsiones, a quacunque causa productæ, pejores semper habent consequentias, quam vitia humorum. Merito tamen hoc loco excipio translationem miasmatum malignorum ad partes solidas; in tali enim casu sæpissime etiam funestus sequitur eventus. Imo etiam, si interdum in Pestis principio Vomitus mature institutus proficius deprehensus fuerit, ille tamen non habet locum, nisi venenum adhuc hæreat in humoribus salivalibus deglutitis: quam primum enim Ventriculo

communicatum est, Vomitus maxime periculosus est.

c Nunquam tamen Naturam in hisce affectibus utitur motibus fortioribus ad causam morificam expellendam, sed satis placide procedit, nisi forsitan nimia subjecti sensibilitas Naturam ad motus erroneos disponat: id quod tamen non sine ratione contingit. Quo magis enim talis materia ad motus præcipientes prona est, eo facilius etiam non solum omnibus humoribus communicatur; sed etiam in motum per remedia commoventia acta partes solidas eo citius aggreditur, & hinc sæpissime insignem edit stragem.

d Cum vero 1. in hisce Febribus Natura, ubi materia morbifica longe commodius e sanguine potest expelli, non nisi motibus placidissimis utatur, ne graviora mala sequantur: & 2. totus morbus per quævis commoventia reddatur gravissimus. ac 3. ut plurimum funestus sequatur eventus; ratio ipsa dicitur, quod etiam in Causo necessario graviores commotiones sequi debeant graviora incommoda; quoniam talis materia pariter 1. est summæ activitatis, ac 2. partibus nobilibus jam impacta actualem noxam induxit, quam 3. gravissima jam comitantur symptomata, quæ, levissimo etiam modo exasperata, adeo gravia redduntur, ut præsentaneum statim vitæ minentur periculum, & præterea 4. metuendum est, ne Vomitoria & Purgantia septica virtute prædita noxam ventriculo & intestinis illatam augeant, quando immediate in illa operationem suam edunt.

- 1 Quid de Venæsectione censendum sit præcedente Tabula jam indicatum fuit: quibus adde, quod diebus criticis & circa illos Deliria & congestiones ad caput quam maxime augeat, adeoque Convulsionibus alias metuendis portam pandat amplissimam.
- 2 Quoad discutientia & antifebrilia aliaque Inflammationi curandæ dicata summa cautela opus est, quæ enim minori commovendi vi pollent, gravissimas statim excitant turbas, quare non nisi maxime temperantia in usum trahantur.
- 3 CrySTALLUS montana a Cratone commendata, etfi in affectibus aliis biliosis insignem habeat usum, monente tamen D. Stahl in hocce affectu cautiissime est usurpanda, quatenus præter vim absorbentem, stypticam etiam possidet, quæ materiam in partibus inflammatis contentam magis inspissat & fibras constringit, adeoque Inflammationem augeat. In principio tamen mali cum aliis locum habere potest.
- 4 Opiata ad compescendos dolores commendata revera sunt deleteria remedia, quatenus quidem pathemata graviora aliquo modo sopiunt, causam tamen minime corrigunt, multo minus vero ad læsionem jam inductam aliquid conferunt, multo certius vero motus hic necessarios sistunt, & Naturam jam tergiversantem a motibus deterrent, quare fugiantur.
- 5 Lubricantia aliquem quidem habent usum in temperanda bile, quoniam vero partes affectas etiam simul emolliunt, adeoque majori humorum translationi ansam præbent, hinc abusus illorum vitandus est.
- 6 Carminativa & tonica remedia suo quidem non carent usu, nunquam tamen in usum trahantur, nisi discussione probe peracta, præpostere enim usurpata & Febrem & symptomata augent.
- 7 Potus frigidus anxietates præcordiorum & Inflammationem insigniter augeat, quare summa ab eo abstinendum est diligentia, magis convenit tepidus & calidus, qui & temperat & discussioni Inflammationis ac materiæ inspissatæ magis inservit.
- 8 Quieta in lecto continentia & animi tranquillitas multum ad sopitionem accidentium molestorum contribunt jectigationes vero corporis & animi impatientia eadem exasperat, quare provide, quantum morbi sævities permittit, ab iis abstinendum est.



## CAPUT OCTAVUM.

## D E

## Febre Inflammatoria.

I. *Definitio.* **F**ebbris Inflammatoria est Febris continua, acuta & juxta ordinarium Medicorum consensum benigna, aut symptomatrica aut secundaria, cujus ope Natura statim incipientem graviolem aut inprimis in partibus nobilioribus jam factam, iisque gravissimum periculum minitanti, auctis motibus vitalibus vel praeavere vel penitus tollere intendit.

II. *Differentia.*

1. Ab *Inflammatione simplici*, ubi Natura per motus auctiores, ordinatos tamen & affectui convenientes labem sed mitiorem, eamque imminentem vel jam factam reparare nititur, cum e contra in Febre inflammatoria Natura non actu tantum simplici inflammatorio, sed etiam ipsa Febre, adeoque vel duplicato vel auctiori motu ad malum illud tollendum utatur.

2. A Febre *Contingente & Continua*, ubi quidem Inflammationes interdum concurrunt, quæ tamen magis symptomatrica sunt, & vel malum regimen, vel imprudentem medicationem sequuntur: Febres autem inflammatoria Inflammationibus potius ad meliorem eorum discussionem, aut suppurationem superveniunt, adeoque tanquam activum quid considerari debent.

3. Ipsa Febris inflammatoria differt etiam quam maxime respectu partium, quas obsidet:

a Alia enim occupat partes *nobiliores* & exinde diversæ etiam Inflammationum species oriuntur & hinc.

1. Alia est *Febris phrenitica*, sive *Phrenitis*, quando Febris meningum cerebri inflammationi supervenit.

2. Alia *Paraphrenitis*, si diaphragma inflammatum est.

3. Alia *Ophthalmia*, si oculi Inflammatione correpti sunt.

4. Alia *Otalgia*.

5. Alia *Angina*, quando fauces laborant.

6. Alia *Phuritis & Peripneumonia*, si vel pleura vel pulmones sunt inflammati.

7. Alia *Hepatitis & Splenitis*, si malum hæret vel in hepate vel in splene.

8. Alia *Inflammatio Ventriculi, Intestinorum Vesicæ, Uteri &c.*

9. Alia *Nephritis*, si renes Inflammatione sunt afflicti. De quibus sub Inflammationibus jam actum fuit. *Tom. I. Tab. XXXVI. & seq.*

b Alia afficit partes ignobiliores externas varias, manus, pedes, abdomen, mammas &c.

III. *Signa.*

1. Invadit ordinarie cum horrore, uti reliquæ Febres continuæ.

2. Quem excipit æstus satis sensibilis & ratione partium affectarum gradu differens.

3. Cui junguntur ordinaria febrilia symptomata, magis vel minus pro diversitate subjectorum & loci affecti differentia & urgentia.

4. Qualia sunt sitis, dolor capitis, aut variæ ejusdem perturbationes, vigilæ, appetitus prostratus &c.

5. Dolor hisce in diversis partibus diversus accedit, modo lancinans &c. respectu Inflammationis vel profundioris, vel magis superficialiæ.

6. Urina ordinarie magis est tincta & ut plurimum deponit sedimentum ex roseo pallidum, aut etiam pro Inflammationum diversitate ab hocce distinctum.

7. Alvus ordinarie est clausa.

8. Tandem successive erumpunt sudores, qui morbum sensim sensimque leviolem reddunt, & ob hancce

placidam excretionem morbus tandem plenarie solvitur. Reliqua Vid. *loc. alleg.*

IV. *Subjectum.*

1. Homines Plethorici.

2. Commotionibus variis sanguinis obnoxii.

3. Temperamento Sanguineo & Sanguineo-Cholerico præditi.

4. Sanguinis fluxuum consuetorum suppressionibus laborantes.

5. Sanguinis missiones assuetas negligentes.

6. Plethoram uno impetu commoventes & corpus calidum aeri frigido exponentes.

7. Diæta lauta calida & vinosa abutentes.

8. In Arthriticis & Rheumaticis affectibus male tractati.

V. *Prognosis.*

1. Febres inflammatoriæ vulgo benignis accensentur, quia non sunt contagiosæ & uni tantum subjecto, quod affligunt, periculum minantur. De cetero autem fere omnes sunt satis periculosæ & malignis respectu exitus parum cedunt, quatenus paucorum dierum spatio ægrotos æque facile jugulant ac malignæ & pestilenciales.

2. Periculosissima omnium est *Hepatitis*, quam sequitur Ventriculi, Intestinorum tenuium, inpr. Duodeni, Pancreatis & Uteri Inflammatio: has Splenitis & ultimo loco Nephritis excipit. Peripneumonia, inpr. ubi profundior est Inflammatio, summe quoque est periculosa. Vid. *Tab. XXXVI.*

VI. *Remedia.*

1. Sanguinis æstus temperantia: Nitrum depuratum, ðiatum, regeneratum, Lapides ☿, Mater Perlarum acido citri vel alio saturata, Tart. Vit. Arcan. duplic. Julapia acidula, Emulsiones, potus sufficiens.

2. Diaphoresin promoventia: ☿ diaphoreticum, Bezoardicum minerale, Essentia alexipharmaca Stahlîi, Scordii, Pimpinellæ albæ, Mixtura simplex, Aquæ diapnoicæ: Flor. Acac. Galeg. Scorzon. Card. Bened. Scord. Regimen placidum, Potus calidus, Juscula.

3. Alvum apertam servantia: Nitrum subinde in Potiunculis datum, Clysteres.

4. Dolores mitigantia: Cinnabarina, Opiata legitime correctæ, Emulsiones ex semine Cardui Mar. & Papav. paratæ, Pulv. Chacarill. Eff. dulc. concentr. Hal. Conf. *Tab. alleg.*

## Formula Remediorum.

## I Potiuncula temperans.

Rx. Aq. Scorzon.	Arcan. duplic.
Rub. id.	Nitr. regener. an. ℥ss.
C. C. citr.	Sir. Cydon. ℥ss. M.
Cord. frig. an. ℥j.	D. sing. 2. horis cochleatim.
Conch. citrat.	

## 2 Alia diaphoretica &amp; resolvens:

Rx. Aq. Scord.	☿ diaph.
Scabios.	Nitr. ðiat. ℥j.
Cheref. an. ℥ss.	Sacch. perl. ℥j. M.
Mandib. Luc. pisc.	D. ut antea.
Dent. Apr. ppt.	

## 3 Alia diaphoretico-temperans.

Rx. Aq. Galeg.	Matr. Perl.
Fl. Acac.	Bezoard. min. an. ℥ij.
Card. bened. an. ℥ss.	Sir. Ceras. acid. ℥ss. M.
Succ. Citr. rec. ℥ij.	D. ut antea.

## 4 Emulsio resolvens.

Rx. Amygd. dule.	Colat. ℥vij. adde
Sem. Citr.	Dent. Apr. ppt.
Card. Mar. an. ℥ij.	☿ diaph. an. ℥ss.
Decoct. C. C. q. s.	Sir. de Alth. Fern. q. s. M.
F. l. a. Emulsio.	D. sæpius cochleatim

## 5 Potiuncula alexipharmaca.

Rx. Aq. Fl. Samb.	Succ. Citr. rec. ℥ij.
Card. Mar.	Sir. contrajerv. ℥ss. M.
e Typh. Cerv. an. ℥ss.	D. cochleatim.
Eff. Alexiph. ℥ss.	

6 Alia.



## 6 Alia analeptica.

B. *Aq. Rosar.**Confect. de Hyac. ʒiſs.**Namph. a ʒiſs.**Sir. acetos. Citr. ʒiſs. M.**Cinam. Cyl. ʒj.**D. ut antea.*

## 7 Mixtura tonica.

B. *Tinct. ʒii acris**D. 25. 30. gutt.**Spir. C.C. a. ʒiſs. M.*VII. *Methodus medendi.*

1 Cum Febres inflammatoriæ ordinariæ sint præcipitis eventus, hinc etiam mature auxilium ferendum est, ne nimis cum insigni periculo invalescant. Unice autem hic respiciendum est ad justum Febris successum, hæc enim ad discussionem staseos corruptoriæ a Natura excitata fuit, quæ, si vel excedit, vel deficit, utrinque periculum minatur. Justum hunc Febris progressum potissimum conservant varia temperantia tam Nitrosa, quam Salia digestiva & absorbentia Ostracodermata, acido quodam imprægnata, quæ omnia nimium sanguinis æstum optime refrænant. Huc pertinet etiam potus sufficiens & quieta in lecto continentia.

2 Quoniam autem per continuam hanc discussionem semper aliquid resolvitur, quod tanquam inutile expelli debet, placida quoque & continua semper fervetur diaphoresis. Cui scopo potissimum inserviunt diaphoretica fixa cum absorbentibus mixta, quibus nitrosa & temperantia inpr. blanda acida addantur ut hoc modo & humorum æstus blande temperetur & partes inutiles successive expellantur.

3 Cum vero hæc totam rem non semper exhauriant, ipsis jungantur moderata alexipharmaca, qualia sunt Mixtura simplex leniter vel prorsus non camphorata & paulo majus per Spiritum Vitrioli acida reddita: aut huic substituatur Essentia alexipharmaca Stahlî vel per se, vel quod melius in Potiunculis diaphoreticis cum succo Citri. Et talia remedia reliquis temperantibus vel jungantur, vel interponantur, ut placida & continua diaphoresis semper conservetur.

4 Sitim aliaque symptomata urgentia optime compeſcunt Nitrosa, acida, emulsiones ac potus sufficiens: quare talia urgente necessitate reliquis semper jungantur remediis.

5 Cum vero sub decursu hujus Febris vires sæpius maxime frangantur, analeptica quoque in usum trahantur: *Aq. Rosar. Namph. Cinam. Gemmata &c.* hoc in casu optime etiam se gerunt Essentia dulcis concentrata Hallensium & Pulveres Solares Richterî, quæ non solum blandam diaphoresin conservant, sed etiam optime roborant, quod frequens experientia me docuit: quo ipso tamen aliis remediis debitam laudem detrachere minime cupio.

6 Finita Febre exhibeantur remedia tonica, qualia sunt sæpius laudata Mixtura tonica Stahlî, Tinctura Martis Ludovici, ut hoc modo robur partium debilitatarum debito modo restituatur.

III. *Cautele Practicæ.*

1 Si statim in primo principio apparet, Febrem esse revera inflammatoriam & corpus simul insigniter plethoricum, Venæsectio mature instituta locum habet, nunquam tamen indifferenter in hac Febre instituitur. Sufficiens tamen (moderata) sit necesse est, alias plus damni quam commodi post se trahit. *Conf. Tab. alleg.*

2 Diaphoretica, etsi summæ sint utilitatis in Febre inflammatoria ad provocandum placidum & continuum sudorem, nunquam tamen sint nimis commoventia & fortiora, quoniam Febris per ea exasperatur & symptomata graviora redduntur.

3 Purgantia acria & vomitoria magis lethifera quam salutaria in hac Febre sunt remedia: id quod sæpius miseri Pleuritici in Nosodochiis quibusdam experiuntur, quibus Tartarus emeticus ad promovendam expectorationem datur.

4 Omnia volatilia, solventia credita, Massam humorum nimis commoventia & placidam discussionem impediunt exulenti in Febribus inflammatoriis.

5 Omne regimen nimis calidum & coactum contra

morbi, qui placida transpiratione tractari amat, indolem est, quare ab eo abstinendum.

6 Omnis refrigeratio morbo huic contrariatur, quatenus successivum sudoris fluxum retardat & supprimit.

7 Narcotica motus febriles ad discussionem necessarios facile supprimunt & hinc non raro sphacelum inducunt, quare non nisi summa cum prudentia ægrotis exhibeantur.

## CAPUT NONUM.

DE

*Febre Catarrhali benigna sive Continua Veterum quotidiana.*

I. *Definitio.* **F**ebbris Catarrhalis est Febris continua, benigna & secundaria, qua mediante Natura motibus extraordinariis febrilibus, placidis tamen, vitiosam lymphæ qualitatem & quidem præcipue mucositatem corrigere, & correctam eliminare nititur.

II. *Differentia.*

1 Alia est *benigna*, quæ pro causa agnoscit materiam mucidam lentam & mitiora habet symptomata.

2 Alia vero est *maligna*, in qua causa morbifica quidem etiam est mucida, sed hæc adhuc aliquid acre insigniter activum in se continet.

3 A Febre continente aliisque respectu symptomatum & causarum.

III. *Signa.*

1 Invadit, præcipue æquinoctio autumnali, tempore vespertino cum horrore aut rigore ac dolore tensivo dorsi.

2 Quem præcedit vel statim jungitur coryza vel humida vel sicca.

3 In aliis observatur Tussis, per totum morbi cursum affligens.

4 Horrorem statim excipit æstus.

5 Cui jungitur dolor capitis lenis gravativus.

6 Accedit pectoris angustia, & in quibusdam rauco & dolor faucium cum deglutiendi difficultate.

7 Durat hic æstus per totam noctem & sequenti mane vix aliquo modo imminuitur.

8 Appetitus est prostratus.

9 Sitis adest admodum moderata.

10 Vires sunt aliquo modo prostratæ.

11 Somnus est imminutus.

12 Pulsus, uti in aliis Febribus, est celer & frequens.

13 Urina est aurantii coloris, & in superficie habet cuticulam lacteo-rubentem vitro se adhærentem ac deponit sedimentum roseum pallidum.

14 Quovis die exacerbatio circa vespere sequitur.

15 Elapsis tribus vel quatuor diebus æstus versus diluculum sudor lenis sequitur.

16 In aliis vero accedit Diarrhœa, morbum sensibilibiter imminuens.

17 Rarius vero observatur Vomitus.

18 Sudor quovis mane æstus excipiens Febrem sensim sensimque leniorem reddit, ac catharrales affectus præsentis imminuit, donec tandem elapso primo vel secundo septenario Febris cum symptomatibus cesset.

IV. *Subiectum.*

1 Homines temperamenti pleghmatici aut sanguineo-phlegmatici.

2 Ad coryzam & catarrhales alios affectus proni.

3 Corpus calidum vel potu frigido vel admissione aeris, præcipue humidi autumnalis, refrigerantes.

4 Coryzam & Tussim negligentes, aut in iisdem male tractati.

5 Quibus Scabies aliæque cutis efflorescentiæ retro pulsæ fuerunt.

6 Potu & inpr. spirituoſo abutentes.

7 Nimium vigilantes.



V. *Prognosis.*

- 1 Febris catarrhalis simplex ordinariè est fatismitis & sine insigni periculo cursum suum intra duos septenarios absolvit.
- 2 Si vero imprudenter tractatur, ipsi facile junguntur graviora & periculosa symptomata.
- 3 Si placide procedit, stasis mucosa successivè resolvitur & per sudorem expellitur cum euphoria.
- 4 Quando absorbentia & refrigerantia nimia exhibentur, Febris hæc facile in lentam aut hecticam degenerat.
- 5 Si in principio gravia statim junguntur symptomata & frigus ac æstus est intensior, vel labes visceris imminens, vel alia causa gravior subest.
- 6 Febris catarrhalis benigna, per regimen stricte diaphoreticum & alexipharmaca acriter tractata, facile superveniunt Petechiæ, & benigna in malignam mutatur Febrem.
- 7 Idem regimen producit interdum etiam Pleuritides, Anginas, Aphthas, Cephalalgias graves lancinantes, Prunellam, Deliria.
- 8 Diarrhœæ in hac Febre etiam in statu contingentes, si sunt moderatæ nulloque dolore affligunt, nullum periculum portendunt.
- 9 Alvi vero adstrictio semper peioris est consequentiæ, inpr. in statu: producunt enim Deliria, Comata, Convulsiones.
- 10 Febris hæc, etsi sit benigna, nihilominus tamen, uti reliqui affectus catarrhales, est contagiosa.
- 11 Quo magis autem & quo facilius per contagium propagatur, eo certior etiam est metus latentium Petechiarum.

VI. *Remedia.*

- 1 Materiam mucosam resolventia. Tart. Vit. Arcan. duplic. Rad. Vincetox. Pimpin. alb. Ari, Helenii, Angelic. Imperator. Essent. alexiph. Stahliani, Pimpin. alb. Tinct. Jii Tart.
- 2 Motus Febriles conservantia & excretionem promoventia: J diaphoret. Bezoard. Miner. Mixture simplex, Essent. alexipharm. Stahliani, Salia digestiva, absorbentia, acido Tart. vel Citri saturata.
- 3 Alvum apertam servantia: Clysteres emollientes cum stimulo salino, Pilulæ Stahlianæ, Becherianæ, Potus sufficiens, Mucilago hordei, Decoctum prunorum, passularum, Manna, Magnesia alba.
- 4 Tussim temperantia: Sperma Ceti, Oleum Amygd. dulc. Liquiritia cocta, Sirup. Viol. de Erysimo Lobelii, Tussilaginis, Sacchar. Cand. Trochisc. Becchici.

*Formula Remediorum.*

## 1 Mixture alexipharmaca.

Rx. Ess. alexiph. Pimp. alb. a. ʒj. M. Scord. D. 25. 30. gutt.

## 2 Infusum resolvens.

Rx. Rad. Vincetox. Hyssop. Pimpin. alb. Bellid. Helen. a. ʒss. Veron. a. Mj. Ari ʒij. Incis. infund. in Aq. ferv. & Herb. Scabios. D. instar. Infusi Thee.

## 3 Potiuncula diaphnoico-temperans.

Rx. Aq. Scabios. Conch. ppt. Cheresol. Tart. Vit. a. ʒss. Hyssop. a. ʒss. Sacch. perl. ʒij. M. J diaph. D. Cochleatim.

## 4 Pulvis diaphnoico-temperans.

Rx. Bezoard. miner. Tart. Vit. a. ʒij. M. Nitr. regener. Div. in 8. p. æq. Conch. citr. D. sing. 4. vel 5. horis.

## 5 Emulsio diaphnoico-temperans.

Rx. Amygd. dulc. Colat. ʒviij. adde Sem. Card. Mar. a. ʒss. J diaph. Aq. Galeg. Matr. Perl. a. ʒj. Scorzon. Sacch. Canar. q. s. M. Hyssop. a. q. f. D. sapius cochleatim. F. l. a. Emulsio.

## 6 Linctus.

Rx. Ol. amygd. d. Sperm. Cet. ʒij. M. Sir. violar. a. ʒss. D. tepide. Sacch. Violac. ʒj.

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Cum causa hujus morbi sit lymphæ vitiosa, hæc commode est præparanda, ut postmodum per motus febriles eo melius a Natura expelli possit: cui scopo satisfaciunt partim Salia digestiva abstergentia, partim Radices alexipharmacæ temperatæ aut etiam Essentiæ ex his paratæ, uti Essent. alexipharmaca Stahliani, quæ loco omnium reliquarum commode tempore matutino exhiberi potest, quoniam non solum resolvit, sed etiam motus febriles conservat & placidam diaphoresin excitat.
- 2 Huic subjungantur placida temperantia, diaphoresin tamen simul respicientia, v. g. diaphoretica fixa ex Jio, cum absorbentibus & salibus digestivis mixta, quæ vel in forma pulveris vel Potiunculæ exhibeantur. Eadem quoque in ipsa exacerbatione moderate data locum habent, semper tamen interponendus est potus calidus, inprimis alexipharmacis quibusdam alteratus, ut hoc modo partim humores diluantur, partim blanda diaphoresis producat.
- 3 Modo dictis diaphoreticis fixis & temperantibus tempore pomeridiano, si necessitas requirit, dosis Mixturæ simplicis aut Essentiæ alexipharmacæ interponi potest.
- 4 Versus tempus matutinum hora scil. quarta, quinta, vel sexta, quando æstus remittit, exhibeatur iterum dosis Essentiæ alexipharmacæ vel Mixturæ simplicis, vel etiam dentur Potiunculæ diaphnoicæ ad diaphoresin promovendam.
- 5 Quando tussis insigniter urget, in usum trahantur remedia superius allegata, inpr. vero versus illud tempus, quo immoderate alias affligere solet, & sub isto tempore reliquis remediis interponantur. Emulsio e semine Cardui Mariæ hic præ ceteris convenit, quæ non solum egregie temperat, sed etiam inflammationes metuendas præcavet, aut jam præsentibus insigniter mitigat.
- 6 Si Gravedo huic Febri juncta est, remedia externa quoque locum habent ad evacuationem per Coryzam promovendam: quo in casu præ ceteris convenit Spiritus Salis Ammoniaci interdum naribus admotus.
- 7 Ad alvi libertatem semper respiciatur, hæc enim egregie Febrem & symptomata mitigat, & humorum ad pectus & caput congestiones impedit, cui fini inserviunt Clysteres & Pilulæ Stahliani.
- 8 Si Diarrhœa huic Febri supervenit & aliquo modo excedit, sufficit exhibere Essentiam alexipharmacam eique interponere moderatum usum pulverum nitroforum cum Crystallo montana.
- 9 Si alia concurrunt symptomata, aliorum Morborum complicationem, Anginæ scil. Peripneumoniam, Aphtharum &c. indicantia, methodus in talibus affectibus conveniens in usum trahatur.
- 10 Si hæc Febris in lentam degenerat, Essentia alexipharmaca ad revocandos sufficientes motus Febriles & materiam eliminandam aliquoties interdum, versus noctem vero Pulvis digestivus exhibeatur.
- 11 Si vero nulli alii morbi complicati sunt, ordinaria medendi methodus semper servetur.

VIII. *Cautele Practicæ.*

- 1 Venæsectionem in tali Febre nemo prudens facile suadet, nulla enim prorsus hic occurrit indicatio, quæ eam vel utilem, vel necessariam esse ullo modo demonstrare queat: imo potius non contemnendæ occurrunt rationes, quæ eam noxiam potius quam salutarem esse indicant.
- 2 Quoad temperantia abstinendum est a nimis refrigerantibus, ne causa morbifica magis incrassetur & motus febriles cum sensibili damno prorsus supprimantur.
- 3 Resolventia semper sint temperata & morbi gradu proportionata, fortiora enim Febrem augent & symptomata graviora reddunt.
- 4 Diaphoresis in hisce Febribus optima quidem est quatenus totus morbus per eam successivè solvitur abstinendum tamen est a præmatura diaphoresis promotione, ut & a remediis alexipharmacis acro-



acrioribus, quæ placidum Febris successum turbant & facile periculosas Inflammationes post se trahunt.

- 5 Regimen nimis calidum & coactum eadem mala excitat, sufficit lene & quieta in lecto continentia: abstinendum tamen est ab omni refrigeratione, hæc enim diaphoresin supprimendo Febribus lentis & hecticis portam pandit.
- 6 In Tussis promotione fugienda sunt nimia expectorantia, hæc enim nimia humorum ad pectus translationi ansam præbent, & non raro phthisicum quid post se trahunt.
- 7 Si Gravedo in hac Febre in actualem jam transit Coryzam, abstinendum est a remediis externis spirituosus.
- 8 Succinata cum Lignorum Decoctis & Essentiis in hac Febre nullum habent usum, quare solum in Catarrhis simplicioribus usurpentur.
- 9 Alvi libertas multum quidem contribuit ad feliciorum hujus morbi successum, nunquam tamen in usum trahantur positive Purgantia, præcipue acria, sufficiunt Pilulæ Becherianæ.
- 10 Abstinendum quoque est a remediis præcipitantibus, imprimis Cornu Cervi usto, Terris figillatis &c. quibus vulgo alexipharmaca adscribitur virtus, revera enim fibras constringendo & humores condensando sudoris placidum successum magis impediunt, quam promovent, adeoque Febribus lentis & hecticis viam sternunt.
- 11 Exulent in hac Febre salia volatilia quæcunque, quoniam humorem catarrhalem acrem nimis commovendo Inflammationes facile post se trahunt.
- 12 Opiata hic quoque nullius sunt usus, quoniam lympham mucosam jam magis incrassant, & motus placidos febriles ad materiæ discussionem summe necessarios supprimunt.
- 13 Potus sufficiens semper necessarius est ad diluendos humores, abstinendum tamen est a frigido.
- 14 Post morbum superatum ægri adhuc aliquandiu aerem frigidum vitent, ne recidiva sequatur. Ad quam præcavendam optime confert Essentia alexipharmaca, singulis diebus tempore matutino sumpta, ut hoc modo omne noxium successive e corpore expellatur.

## CAPUT DECIMUM.

## D E

*Febre maligna & Epidemica.**Definitio.*

**F**ebbris maligna est Febris acuta, contagiosa, in qua Natura per motus secretorios auctiores materiam quandam acerrimam subtilissimam, corpori celerem interitum minitantem, expellere nititur.

2 Epidemica vero est Febris acuta plus vel minus maligna, ob communem causam plures simul, imo integras regiones, sub diverso schemate affligens.

*Differentia.*

## 1 Febris maligna:

a Differunt hæc Febres respectu gradus malignitatis: summus gradus est in Peste, quam proxime excipit Febris Petechialis, hanc vero Petechizans, infimus gradus est in Variolis & Morbillis.

b Porro differunt respectu anni temporum & tempestatum: unde horum intuitu Pestis reliquique morbi maligni hoc anno majorem edunt stragem, quam altero.

## 2 Febris epidemica:

a Modo invadunt sub larva Tertianarum, uti tempore verno.

b Vere adulto Pleuritica habent symptomata.

c Æstate provectiore Dysentericæ schemate larvari solent.

d Autumno sub quartanarum specie homines affligunt.

e Autumno humidior Catarrhis & imprimis Tussi junctæ sunt.

## III. Signa.

## 1 Febris maligna.

a Insignis & repentina virium prostratio sine causa manifesta.

b Pulsus debiliior.

c Lipothymia in principio statim & incremento interdum affligentes.

d Agrypnia pertinax.

e Vacillationes mentis obliuioſæ.

f Actualia interdum deliria sine causarum manifestarum concursu.

g Insensibilitas Febris in genere, & fitis ac reliquorum symptomatum inadvertentia.

h Symptomatum febrilium sine causa evidenti & sine ullo proportionato utili effectu insolita exacerbatio: vel contra symptomatum consuetorum insidiosa dissimulatio.

i Animi desperabunda abjectio, ac præmaturum exitus lethalis præſagium.

k Exanthematum præmatura & vaga eruptio, vel subitanea retrocessio.

l Motus convulsivi, qui nulli causæ manifestæ adscribi possunt. Soror mea nati minor Anno 1698. cum Febris maligna in Patria mea Gelnhusa epidemice grassaretur, eadem quoque Febre corripiebatur: semper in lecto erat quieta, de nullis doloribus conquerebatur, semper tamen de insigni lassitudine querelæ erant: pulsus erat debilis, fitis nulla &c. erumpebant secundo statim die convulsiones, quæ tamen mox disperebant: sed paucis elapsis horis recurrebant & cito iterum finiebantur. Præscripseram statim ab initio morbi Potiunculam ex Aquis diaphoreticis cum Mixtura simplici, succo Citrio, & ſio diaphoretico & absorbente quodam: Convulsiones quovis die plus quam decies invadebant & cum omnia conclamata esse non levis suspicio esset, tandem lenis maior die quinto erumpens morbum sensim leviores reddebat, & ei elapsis aliquot diebus finem imponebat.

## 2 Febris epidemica.

a Frequentia morbi inter plures patientes.

b Modus invadendi unus idemque.

c Symptomatum eorundem, quæ in aliis observantur, concursus.

## IV. Subjectum.

1 Febres malignæ & epidemicæ nulli parcunt ætati, & temperamento, sed plerumque plurimos invadunt, quoniam causæ externæ omnibus communes sunt.

2 Ut pl. tamen invadunt homines mediæ ætatis, Juvenes & Adolescentes, Plethoricos, aut alios in vigore ætatis consistentis adhuc constitutos, inpr. vero qui Naræ sunt sensibiliioris.

3 Variolæ vero & Morbili epidemicæ grassantes magis affligunt juniores, infantes scil. & pueros.

4 Frequentius quoque hisce Febribus corripiuntur Sanguinei & Sanguineo-Cholerici.

5 Homines timidi, meditationibus dediti, Feminae, Literati.

## V. Prognosis.

1 Omnes morbi maligni præcipitis sunt exitus & periculum insigne ut plurimum involvunt.

2 Omnes morbi epidemici maligni Plethoricos invadentes semper sunt majoris considerationis.

3 Febres epidemicæ omnes, quamvis etiam mitiores & benigniores videantur, propter continuitatem insidiosam, debilitatem insignem & similia concurrentia semper monstri quid alunt.

4 Imo quo leniores, quoad symptomata febrilia generalia, æstus, sitis &c. apparent, tanto maligniores sunt.

5 Insolita animi circa initia trepidatio, vel præmaturum sinistri eventus præſagium, vel lethalem exitum portendit.

6 Quo major in hisce Febribus est mentis perturbatio ac virium lapsus, eo gravius quoque imminet periculum.



- 7 Diarrhœæ in Febribus malignis & epidemicis sunt innoxiae, si scilicet sunt tolerabiles, & quamvis morbum non solvant, semper tamen alvi adstrictione sunt meliores.
- 8 Alvi adstrictio in Febribus malignis & Epidemicis reliqua symptomata, præcipue caput affligentia, manifeste exacerbat.
- 9 Narium Hæmorrhagias in Epidemicis, quoque tempore contingentes, melius est non fieri, quam fieri; imo largiter recurrentes, alvo præsertim siccior, it. Deliria & Aphthas post se trahentes, plerumque lethales sunt: diuturnioribus vero deliriis tandem supervenientes, illaque sublevantes tolerabiliores existunt.
- 10 Si Febres malignæ & epidemicæ corripiunt homines cacochymicos aut labe visceris cujusdam laborantes, funestus ordinarie sequitur exitus.
- 11 Excretiones diapnoicæ cito erumpentes & bene procedentes bonum promittunt exitum.

#### VI. Remedia.

- 1 Temperantia: Conch. citrat. Mat. Perl. Lap. & aliaque absorbentia acidis saturata, Tart. Vit. Arcan. duplicat. Nitr. & iat. depurat. regnerat. Succ. Citr. Rob. Cydon. Ceras. acid. Rib. Berber. Sir. Cydon. acetosif. Citr. Ceras. acid. Vinct. Rosar. Violar. Flor. Bellid. Mucilaginosæ, Gelatinosæ, Potus sufficiens vel simplex vel alexipharmacis & acidis alteratus.
- 2 Diapnoica: & diaphoret. Bezoard. miner. Reg. & ii Medicin. Tinct. Bezoard. Mixt. simpl. Essent. alexipharm. Pimpin. alb. Scord. Aqu. Galeg. Scorzon. Flor. Samb. Flor. Acac. Card. bened. &c.
- 3 Analeptica: Aqu. Rosar. Borrag. Bugloss. C. C. citrat. Namph. Cinam. Cydon. Spec. de Hyacinth. Confect. de Hyacinth. Alkerm. Tinct. Corall. Essent. dulc. Hal. Pulveres confortantes Richter.

#### Formula Remediorum.

- 1 Potiuncula diapnoico-temperans.  

R. Aqu. Galeg.	Nitr. & iat. an. ℥ss.
Scorzon.	Reg. & ii medic. ℥j.
Fl. Acac.	Sacc. Citr. rec. ℥ij.
C. C. citrat. an. ℥j.	Sir. Ceras. acid. ℥ss. M.
Bezoard. min.	D. sæpius cochleatim.
Matr. perl.	
- 2 Alia alexipharmaca.  

R. Aqu. C. B.	& diaph.
Scabios.	Conch. citr. an. ℥ss.
Rub. id.	Sir. acetosif. citr.
Cord. frig. an. ℥j.	Contrai. an. ℥ij. M.
Mixt. simpl. ℥j.	D. ut antea.
- 3 Mixture alexipharmaca.  

R. Eff. Scord.	Mixt. simpl. an. ℥j. M.
Pimp. alb.	D. 25. 30. gutt.
- 4 Alia simul confortans.  

R. Eff. alexiph. ℥ij.	D. ut antea.
dulc. ℥j. M.	
- 5 Potiuncula confortans.  

R. Aqu. Scorzon.	Conf. Alkerm. inc. ℥ij.
Bugloss. an. ℥ij.	Sir. acetosif. citr. ℥vj. M.
Cinnam. cyd. ℥j.	D. Cochleatim.
- 6 Electuarium confortans.  

R. Conf. Pulp. Citr.	Conf. de Hyac. ℥iss.
Rosar. an. ℥ss.	Sir. Cydon. q. s. M.
Rob. ceras. acid.	F. Electuarium.
Rib. an. ℥ij.	D. sæpius.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Cum Febres hæ non raro insignem edant stragem ac mox vires maxime frangant, antequam vere cognoscantur, mature auxilium ferendum est & quidem statim in principio.
- 2 Si E. ex insigni virium prostratione, actionum vitalium & rationalium perturbatione aliisque signis de malignitate morbi constat, exhibeantur statim temperantia cum diaphoreticis fixis, ut hoc modo & æstus temperetur, & moderata diapnoe excitetur.
- 3 Cum vero hæ sæpius non sufficiant, hisce interponantur mitiora alexipharmaca, ut miasmata mali-

gna mature ad peripheriam corporis ferantur & expellantur.

- 4 Hisce semper jungantur analeptica, qualia sunt ea, quæ modo laudavimus, ne vires a morbo adhuc magis frangantur. Sanguineis præ ceteris conveniunt blanda acidæ, inpr. succus Citri recens, Potiunculis alexipharmacis & diapnoicis additus. Cholerici vero magis sublevantur per Nitrosæ, quando cum dictis alexipharmacis & aquis analepticis miscentur.
- 5 Si Febres malignæ epidemicæ grassantur, semper respiciendum est ad indolem earum, an scilicet sub Tertianarum, Quartanarum, Dysentericæ, Pleuritidis aliorumque morborum larva incedant: pro diversitate enim complicatorum affectuum cura eorundem interdum aliqua variatione opus habet.
- 6 Ad symptomata quoque urgentia horum morborum attendendum est, e.g. Si sitis nimium urget, temperanda est per sufficientem potum, blanda acidæ, nitrosæ, emulsivæ &c. reliquis vero prospiciendum est per convenientem methodum, quam sequentes Tabulæ tradunt.

#### VIII. Cautela Practica.

- 1 In Febribus malignis & epidemicis vena nunquam secanda est, nisi peculiares & urgentes circumstantiæ in subjectis eminenter Plethoricis ejus usum suadeant: imprudenter enim administrata graves circa dies criticos turbas post se trahit.
- 2 Vitentur etiam fortiora per superiora aut inferiora evacuantia, quoniam placidam diapnoen, quam Natura in hisce Febribus amat, impediunt aut insigniter turbant.
- 3 Blanda tamen per superiora evacuatio, si malignitas per salivam communicata fuit, symptomata circa præcordia urgent, & Ventriculum cruditatibus repletum esse constat, interdum locum habet, si statim in primo principio instituitur.
- 4 Fugiantur quoque omnia volatilia & calida sudorifera, quoniam humores nimium commovent, materiam malignam magis in motum conjiciunt, vires magis frangunt, aliisque funestis symptomatibus portam pandunt.
- 5 Similem effectum edit regimen nimis calidum: sufficit in hisce Febribus blandus calor externus, & defensio a frigore.
- 6 Si æstus est temperandus, vitentur nimia refrigerantia, ut pote quæ humores incrassando miasmata malignorum excretionem impediunt.
- 7 Idem sentiendum est de potu frigido, satius est exhibere tepidum vel calidum, qui & diluit & placidam materiam malignæ excretionem promovet.
- 8 Nihil magis vero hanc diapnoen adjuvat, quam quies in lecto, quare omnes jectigationes fugiantur.
- 9 Nunquam etiam fidendum est terris bolaribus & sigillatis, quæ vulgo tanquam efficacia alexipharmaca hinc inde ab Authoribus laudantur, revera enim sunt adstringentia & hinc excretionem diapnoicam sæpius turbant.
- 10 Si Febres tales sub alia larva apparent, semper magis respiciendum est ad Febrem malignam tanquam morbum primarium, quam ad reliqua concurrentia accidentia: hæc enim Febre superata sponte ordinarie cessant. Si vero hæc nimium urgent, iis occurrendum est, ita tamen, ut morbo primario nullum exinde nascatur præjudicium.
- 11 Alexipharmaca remedia non quovis tempore exhibeantur, inpr. in exacerbatione, satius est ea finiente talia remedia dare.
- 12 Alvum in hisce Febribus obstructam esse malum est: nunquam tamen præter Clysteres alia ad referendam alvum in usum trahantur remedia.
- 13 Remedia a morbis malignis epidemicis præservantia, quæ vulgo commendantur, utpl. parum efficacia edunt: optimum est hoc in casu remedium matura Plethoræ suspectæ imminutio & secretionum & excretionum in debito ordine conservatio.



## CAPUT UNDECIMUM.

D E

*Variolis distinctis.*

**I. Definitio.** Variolæ distinctæ sunt species Febris acutæ continuæ, exanthematicæ, plus vel minus malignæ, cujus ope Natura materiam acrem causticam, humoribus inhærentem, ad habitum corporis expellit, & ibidem pustulas primorubras, postea limpidas ac tandem purulentas a se invicem distantes format.

**II. Differentia.**

- 1 Aliæ sunt *veræ*, quas Febris acuta comitatur & tertio septenario finiuntur.
- 2 Aliæ sunt *nothæ*, quæ sunt pustulæ limpidæ, paucæ, in habitu corporis occurrentes & elapsis paucis diebus sine Febre acuta disparentes.
- 3 Differunt Variolæ distinctæ respectu indolis, aliæ enim sunt *benignæ*, quas Sydenham *regulares* appellat, aliæ vero sunt *malignæ & irregulares*, quæ plures jugulant.
- 4 Distinguuntur a *Confluentibus*, quod in his longe major pustularum, unam postea quasi crustam formantium, adsit numerus, quam in *Discretis*. Vid. *Tab. seq.*
- 5 A *Morbillis*, in hisce enim exanthemata tantum rubra paululum elata in habitu corporis erumpunt, quæ sine suppuratione post aliquot dies abeunt, cum e contra variolæ sint veræ pustulæ ad suppurationem tendentes.

**III. Signa.**

- 1 Invadunt sæpius cum horrore leni inpr. in paulo jam adultioribus, sæpius tamen etiam nullus observatur horror.
- 2 Concurrunt oscitationes & pandiculationes.
- 3 Quas excipit, pro temperamentorum & ætatum diversitate, calor vel magis vel minus urgens.
- 4 Huic jungitur dolor capitis itidem pro circumstantiarum ratione magis, vel minus tolerabilis, ac vertigo cum somnolentia & deliriis quamvis non semper.
- 5 Occurrit etiam ordinarie dolor dorsum occupans.
- 6 Juxta Sydenhamium adest quoque dolor partium scrobiculo cordis subjacentium, si manu premuntur.
- 7 Calori sitis juncta est.
- 8 Pulsus est celer & frequens.
- 9 Ciborum adest fastidium.
- 10 In multis observantur deliria & jectigationes corporis.
- 11 In aliis subsultus tendinum, quos non raro Convulsiones sequuntur.
- 12 In plurimis deprehenditur Tussis ferina & quasi suffocativa.
- 13 Cui junguntur frequentes sternutationes cum voce rauca & faucium dolore.
- 14 Oculi multo humore perfunduntur, in aliis vero sicci sunt magis, & lumen ferre nequeunt.
- 15 In non paucis observantur tormina colica, Diarrhœæ aut Vomitus, in multis vero & plurimis alvus est adstricta.
- 16 In aliis vero versus quartum diem aut ipso quarto occurrunt Hæmorrhagiæ narium.
- 17 Sub finem tertii vel principium quarti diei in facie, collo, pectore ac deinde in universo corpore erumpunt maculæ subrubræ exiguæ.
- 18 Hoc ipso tempore Febris vel insigniter imminuitur, vel in multis plane cessat.
- 19 Reliqua etiam symptomata maxime mitigantur, aut prorsus tolluntur.
- 20 Faucium vero dolor persistit & magis urget per totum morbi cursum.
- 21 Maculæ illæ statim post eruptionem extolluntur in pustulas ex roseo pallidas.
- 22 Hæ semper majus spatium occupant, inprimis secundo post eruptionem die.

- 23 Tertio aut septimo post invasionem die magis acuminatæ sunt.
- 24 Tum temporis, nempe quinto & sexto ab invasionem die, pustulæ limpidæ humore repletæ sunt.
- 25 Octavo die pustulæ cinguntur circulo rubicundo ac non solum latiores, sed magis acuminatæ redduntur.
- 26 Tum temporis tota facies insigniter intumescit, & Febris denuo accenditur.
- 27 Palpebræ quoque turgent, ita ut vel conniveant, vel prorsus claudantur.
- 28 Hinc reliquæ quoque partes inflantur cum dolore tensivo & lancinante, qui cum inflammatione in dies augentur.
- 29 Die nono pelluciditas pustularum perit & obscuræ vel flavescentes redduntur.
- 30 Et cum antea læves essent, jam in superficie asperæ fiunt.
- 31 Hoc ipso die & præcipue decimo rumpuntur eæ, quæ sunt in facie, ac pus contentum probe coctum effundunt.
- 32 Quæ sunt in reliquo corpore eodem tempore quoque maturitatem suam adipiscuntur.
- 33 Quæ verò in manibus & pedibus occurrunt lævitatem suam retinent & indies magis albescunt.
- 34 Maturatione ad finem tendente alvus pertinaciter hætenus clausa sponte aperitur.
- 35 Interdum etiam hoc ipso tempore in quibusdam Diarrhœa; in qua multæ squamæ cum excrementis excernuntur, invadit.
- 36 Die undecimo cessat inflammatio faciei, ac rubor, qui antea erat in interstitiis Variolarum, perit.
- 37 Cessat quoque palpebrarum tumor & oculi iterum aperiuntur.
- 38 Eodem die exarescere incipiunt, quæ exarescentia etiam sequentibus diebus tantisper continuat, donec decimo quarto vel decimo quinto prorsus decidunt.
- 39 Post casum illorum remanet squamula alba, qua decidente conspicitur macula rubicunda & sæpius fovea.
- 40 Die decimo quarto vel quinto concidunt eæ, quæ sunt in pedibus & præcipue in manibus, sine materiæ effusione, & sensim sensimque excrecentes usque ad diem decimum septimum decidunt.

**IV. Subjectum.**

- 1 In genere omnes fere homines semel in vita Variolis corripuntur & paucissimi sunt, qui ab iis immunes vivunt.
- 2 Nonnunquam etiam, sed satis raro, quidam bis & omnium rarissime ter easdem patiuntur.
- 3 In specie vero infantes iisdem affliguntur, præcipue quando constitutio est epidemica.
- 4 Pueri quoque easdem frequenter experiuntur.
- 5 Adulti de quibus. Vid. *Tab. seq.*

**V. Prognosis.**

- 1 Variolæ distinctæ, regulariter procedentes, ut plurimum nullum periculum portant & sine gravibus symptomatibus ad finem properant.
- 2 Imprudenter tamen tractatæ & propter malum regimen sæpius fiunt funestæ.
- 3 Infantes obesi & spongiosi valde habitus corporis semper in majori versantur periculo, quam reliqui.
- 4 Si æqualiter secundum naturalem ordinem primum in facie & postea in reliquis partibus prodeunt, semper melioris sunt spei, quam si successive & inæqualiter erumpunt, hæ enim facile retrocedunt.
- 5 Si in principio tertii diei jam prodeunt, pertinent ad irregulares ac ad confluentes inclinant, & hinc etiam peioris sunt indolis.
- 6 Si Febris vel nimium excedit, vel deficit in Variolis, periculum minatur.
- 7 Diarrhœæ in principio Variolarum earum excretionem impediunt, nunquam tamen per adstringentia suppressendæ sunt, sed sufficiunt lenia alexipharmaca, præcipue Essent. alexipharmaca Stahlii. Vid. *Cautel. Pract.*
- 8 Narium Hæmorrhagiæ circa eruptionis tempus aut sub ipsa eruptione, in pueris contingentes, nullum



periculum minuitur, sed patientes multum sublevant.

- 9 Nec etiam convulsiones eruptionem antecedens periculum portendunt: promovent potius earum largam excretionem, & totus morbus etiam postea magis tranquille ad finem properat. Vidimus id in multis Anno 1713. & 1714. cum epidemice hic grassarentur Variolæ.
- 10 Variolæ latiores in medio depressæ, five foveam habentes, semper pessimæ sunt indolis & utpl. funestum habent exitum.
- 11 Quo magis autem sunt elevatæ & turgidæ, eo meliores sunt.
- 12 Omnes Variolæ circulo rubicundo carentes periculum minantur & facile retrocedunt.
- 13 Inflammatio faciei & manuum, si tempore maturationis non observatur, pessimum præbet indicium, mors enim sæpe brevi sequitur, id quod etiam contingit, si præsens inflammatio subito perit.
- 14 Petechiæ aut exanthemata miliaria, in interstitiis Variolarum occurrentia, indicant insignem malignitatem & fere semper funestum post se trahunt exitum, inprimis si nigræ fuerint.
- 15 Variolæ suppurationis tempore non flavescentes, sed quasi impidæ & aquosæ manentes vel fiunt funestæ, vel alios morbos periculosos post se trahunt, quod sæpius observavimus.
- 16 Convulsiones, post eruptionem Variolarum aut suppurationis tempore affligentes, gravissimum semper portendunt periculum.
- 17 Alvi adstrictio nunquam non in Variolis melioris est conditionis quam ejusdem nimia laxitas.
- 18 Diarrhœa tamen mutationis tempore contingens, in qua materia quasi purulenta cum squamulis excernitur, si moderate succedit, non adeo reformidanda est.
- 19 Si Febris inflammatoria ultra maturationis tempus adhuc extenditur, malum est præsagium, indicat enim partem materiæ Variolarum interius remansisse, aut viscus quoddam affectum esse.
- 20 Si materia Variolarum omnis non expulsa fuit, sæpiissime sequuntur post morbum superatum copiosi furunculi, scabies rebellis, Tussis sicca gravis, imo interdum hæctica totius corporis consumtio & Phthisis.
- 21 Optimum signum est, si exarescentibus Variolis appetitus redit ac vigiliæ cum reliquis symptomatibus cessant.

#### VI. Remedia.

- 1 Temperantia aut præparantia, in aliis Febribus usualia: Mater Perl. Lap.  $\text{ss}$  Percar. C. C. Philol. Conch. ppt. aut acido Citri vel Tartari saturatæ, Salia digestiva Nitrosa, acida, mucilaginosa, emulsiva &c.
- 2 Diapnoica & alexipharmaca: Antimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, Regulus  $\text{ss}$  Medicinalis, Tinct. bezoardica, Mixtura simplex, Essentia alexipharmaca, Pimpinell. alb. Semen Aquileg. Card. Mar. Napi, Aquæ diapnoicæ, Galeg. Scorzon. Scord. Scabios. Flor. Sambuc. &c.
- 3 Symptomatibus prospicientia: Camphora, Oleum ovorum, Cinnab.  $\text{ss}$ , nativa, Lumbrici terrestres, Pulvis Chacarillæ, Lac, Spiritus Vini Camphorat. crocat. Pulv. solares, confortantes, Essentia dulc. &c. Vid. Meth. Med.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Potiuncula temperans.

Rx. Aqu. Borrag. Nitr.  $\text{ss}$  iat.  
Cichor. Matr. perl.  $\text{ss}$  3ss.  
Fragor. Sir. acetos. citr.  $\text{ss}$  3ss. M.  
Galeg.  $\text{ss}$  3j. D. sing. 3. 4. horis. cochlearim  
j. vel ij.

$\text{ss}$  diaph.

##### 2 Alia diapnoica.

Rx. Aq. Rub. id. Ess. alexiph.  $\text{ss}$  3ss.  
Scorzon. Succ. citr. rec. 3j.  
Fragor. Sir. Cydon.  $\text{ss}$  3ss. M.  
C. C. citr.  $\text{ss}$  3j. D. ut antea.

##### 3 Emulsio diapnoico-temperans.

Rx. Sem. Card. Mar. Colat. 3vij. adde  
Aquileg. Bezoard. min.  
Nap. Lap.  $\text{ss}$  3j.  
Amygd. dulc.  $\text{ss}$  3ij. Sacch. perlat. q. s. M.  
Aq. Scabios. D. cochlearim.  
Scorzon.  $\text{ss}$  q. s.

##### 4 Mixtura alexipharmaca.

Rx. Ess. alexiph. D. 15. 20. 30. gutt. pro ratio.  
Scord.  $\text{ss}$  3ss. M. ne atatis.

##### 5 Pulvis ad Diarrhœam.

Rx. Matr. perl. 3j. Nitr.  $\text{ss}$  iat. 3j. M.  
Pulv. Chacarill. 3ss. D. sing. 4. horis. cusp. cult.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Cum causa Variolarum sit miasma quoddam acre & causticum specificæ prorsus indolis, vel per contagium in corpus susceptum, vel juxta alios in corpore, sed ex incognitis adhuc dum causis, genitum, illud ante omnia ita præparandum est, ut eo facilius per Naturam ad habitum corporis pelli queat. Huic scopo potissimum inserviunt absorbentia ostracodermata cum diaphoretico  $\text{ss}$ iali fixo, ac potus sufficiens.
- 2 Semper quoque respiciendum est ad Febrem vel excedentem vel deficientem: si excedit & nimia exinde oritur sanguinis ebullitio, quæ ordinarie placidam Variolarum eruptionem impedire solet, ejus impetus moderandus est partim per modo dicta absorbentia & diaphoretica fixa, partim vero per Nitrosa & blanda acida, reliquis admixta.
- 3 Si vero Febris deficit, & Variolarum excretio minus bene succedens exinde metuenda est, exhibeatur Essentia alexipharmaca parvis & singulis quatuor vel quinque horis repetitis dosibus, vel etiam reliquis absorbentibus & diaphoreticis fixis interponatur.
- 4 Hæc Methodus tribus primis diebus observetur, quando vero erumpunt Variolæ opera danda est, ut excretio earum placide promoveatur: cui fini inserviunt Potiunculæ leniter diapnoicæ & Emulsiones supra præscriptæ, quæ ad maturationis usque tempus continuari possunt, exhibendo singulis tribus vel quatuor horis cochl. j. vel ij. pro ætatum diversitate.
- 5 Die octavo, ubi suppuratio incipit, denuo exhibeantur supra laudata absorbentia & diaphoretica fixa, quibus, si æstus urget, tantillum Nitri addatur, aut etiam reliquis Emulsionum usus jungatur.
- 6 Si vero interstitia non insigniter rubescunt & magis ad pallorem vergunt, interponatur Essentia alexipharmaca minoribus & repetitis dosibus usque ad tempus exarescentiæ & hoc ipso etiam tempore remedia diaphoretica & inpr. Essentia alexipharmaca non seponantur, sed aliquandiu adhuc continuentur.
- 7 Morbo finito ad evacuandas primas vias exhibeatur lene purgans, præcipue ex Mercurio dulci, ut hoc modo reliqui morbi tollantur.
- 8 Cum vero varia etiam in Variolis symptomata sæpius admodum urgentia occurrant, ad ea quoque oculi dirigendi sunt.
  - a. Dolor dorsi & lumborum, si est immoderatus, exhibeantur cum ante dictis absorbentibus & diaphoreticis fixis Cinnabarina, ut & pulvis aut extractum Chacarillæ. Insignem quoque hic usum habent Essent. dulc. ordinaria & concentrata ac Pulveres solares.
  - b. Quando Vomitus nimius in principio Variolarum adest, dentur Spec. de Hyac. MP. de Cynogl. Theriac. cœlest. cum reliquis remediis mixta: externe vero regioni vtriculi applicetur cum lintheaminibus Spir. Vini camphor. Aqua Regin. Hungar. Spir. Theriac. camphor. aut etiam Theriaca Androm. cum oleo Menthæ.
  - c. Diarrhœam in principio urgentem optime compefcit Nitrum, in parva dosi cum absorbente quodam exhibitum & pulvis chacarillæ. Eidem fini inservit Essent. dulcis & alexipharmaca parvis & repetitis dosibus exhibita. Si vero in statu occurrat & excedit, vel sæpius vel majoribus dosibus hæc remedia dentur. Externe applicetur Theriaca cum Oleo destillato Menthæ mixta.



- d *Convulsiones* eruptionem Variolarum præcedentes nullam ordinariæ medicationem postulant; si vero post eandem adhuc continuant, omnino sunt suppressendæ: hoc in casu præstant aliqua remedia Cinnabarina, absorbentia, diaphoretica fixa & Lumbrici terrestres &c. omnibus tamen palmam facile præripiunt Pulveres Ores Richteri, quæ sæpius momento fere citius non has tantum, sed & alias Convulsiones tollunt, si scil. singulis duabus horis dosis simplex vel duplicata exhibetur.
- e *Hæmorrhagia narium* præsertim in subjectis huic excretioni assuetis & plethoricis, circa eruptionis tempus contingentes, nullum prorsus inferunt periculum: si tamen excedunt, Nitrosa & alia temperantia ad sanguinis orgasmum compescendum præscribuntur.
- f *Tussis*, si nimium urget, Oleum Amygd. dulc. cum Spermate Ceti prodest. Eidem fini inserviunt etiam emulsionem temperantes.
- g *Dolor & ardor faucium* sæpius quoque admodum sunt molesti & sui mitigationem indicant: profunt in tali casu modo dicta temperantia, majorem tamen efficaciam edit Essentia alexipharmaca Stahlî vel sola, paucis guttis assumpta, vel in paucis vehiculo: eundem effectum habet Essentia Pimpinellæ albæ.
- h Adest etiam interdum, præsertim in natu majoribus, insignis ad sudores propensio, quæ postmodum debitam Variolarum impletionem & elevationem maxime retardat, ac sæpius subsistentiæ Variolarum viam sternit: in tali casu Nitrosa & Emulsionem ad temperandum nimium humorum æstum & resolutionem præ ceteris commendari merentur.
- i *Eruptionem nimis tardam & inæqualem* sublevat prudens usus Essentiæ alexipharmacæ & Emulsionum diapnoicarum, si scil. talia remedia frequentius sed parvis dosibus usurpantur; res eo melius procedet, si dictis remediis Essentia dulcis & Pulveres Ores interponuntur.
- k *Subsidentiam & retrocessionem* optime præcavent modo dicta remedia, & si tempore maturationis tale quid observatur, frequentius Essentia alexipharmaca & dulcis exhibeantur.
- l Si *Vigiliæ* urgent, in usum trahantur Emulsionem temperantes cum Semine Papav. albi, Nitrosa & Cinnabaris, meliorem tamen edunt effectum Essentia dulcis Hallensium tam ordinaria, quam concentrata, quod sæpius observavi.
- m *Oculos* quod concernit & *palpebras*, eorum læsiones præcavet lac calidum cum aliquali portione camphoræ & croci mixtum & oculis applicatum: lac humanum: camphora collo appensa: linteamina Spiritu Vini camphorato imbuta & exsiccata: sacculi ex semine Fœniculi confuso parati, aut etiam si semen hocce masticatur & halitus in oculos inflatur.
- n Si *colici dolores* urgent, potissimum convenit Essentia alexipharmaca & Essentia dulcis, aut etiam reliquis remediis Cinnabaris & pauca grana Massæ Pilularum de Cynoglossa addantur.
- o Si *Petechiæ & exanthemata miliaria* in interstitiis macularum occurrunt, insistendum est usui blandorum alexipharmacorum: Regulus quoque Antimonii Medicinalis, aliis blande diaphoreticis admixtus, ut & Pulveres Ores hoc in casu suo quoque non carent usu.
- p *Urinæ suppressio*, ordinariæ maxime periculosa, si urget, in usum trahantur diuretica: cum vero hisce sæpius nihil effici queat, juxta Sydenhamii Methodum ægrotus e lecto eximatur & adstantium manibus suffultus per cubiculum bis terve circumducatur.
- q Ad *consolidationem & crustarum* faciliorem remotionem præ ceteris convenit Oleum ovorum moderate camphoratum.
- r Ad *præcavendas foveas* nil magis convenit, quam

placida totius morbi tractatio & moderatum regimen

VIII. *Cautelæ Practicæ.*

- 1 Si ullus est morbus, ubi Cautelis Practicis opus, hic sane est: licet enim satis tranquille procedat, facillime tamen per perversam medicationem ita statim corrumpi potest, ut brevi lethalis fiat.
- 2 Tutissimum E. est ab artificiali Methodo, quantum fieri potest, abstinere & negotium soli Naturæ committere, sic enim longe facilius evadunt infantes. Observavi hoc Anno 1713. & 1714. ubi ultraintegrum annum epidemice grassabantur Variolæ & multos jugulabant infantes, quamvis magis e benignarum, quam malignarum essent censu. Unica hujus rei causa erat perversum regimen & copia medicamentorum, quibus miselli obruebantur. Vocabar tum temporis ad plures, si tranquille procedebant, prorsus nihil præscribebam: si Febris nimium urgebat, dabam Pulverem ex  $\delta$  diaphor. Conch. estrat. Nitr. depurat. Tart. Vitriolat & Cinnab. Quando in principio aderat Diarrhœa, quod sæpius fiebat, in usum trahebam Essent. alexipharm. Stahlî, quæ sensim alvi fluxum sistebat. Tempore maturationis dicto pulveri, ad promovendam suppurationem & subsidentiam præcavendam, Essentiam jungebam & sic omnes curæ meæ concrediti felicissime evadebant, paucissimis exceptis, quos parentes ipsi per regimen nimis coactum contra voluntatem meam jugulabant. Remedia muliercularum, tum temporis polychresta & maximam partem autoritate communis Praxeos approbata, erant Pulvis Pannonicus ruber, Aqua Fumarie, Lapis Bezoardicus, Vinum rubrum, Decoctum Lentium, hypocaustum fervidum: quæ mors, omnium miseriarum finis, sæpissime sequebatur.
- 3 Cavendum quoque est ab omnibus commoventibus calidis & alexipharmacis fortioribus, quæ vulgo ad venenum a corde removendum & per habitum corporis expellendum commendantur: quamvis enim Variolas expellant, nimis tamen præcipitanter id fit, & nimia simul humorum copia expellitur, unde postea maturationis tempore ob humorum, ad Variolarum impletionem necessariorum, defectum, pustularum subsidentia insigni cum damno & ordinariæ cum funesto eventu sequitur.
- 4 Eundem effectum edunt Myrrhata & Salia volatilia, quæ tamen hinc inde a non infimi subsellii Medicis tanquam maxime convenientia & utilia remedia pleno ore laudantur.
- 5 Abstinendum quoque est a regimine nimis calido: quamvis enim Variolarum excretionem promoveat, facile tamen postmodum retrocedunt: imo nimius æstus aliquando excretionem magis impedit quam promovet. Vocabar aliquando Mense Majo ad infantem quatuor annorum: Mater conquerebatur, quod infans frequentibus corripere lipothymiis: cum hypocaustum ingrederer, tantus in eo erat æstus, ut fenestras aperire cogerer: infans lecto matris ad nares usque inclusus, caput vero stragulis probe tectum & munitum erat: dissipato calore infantem propius aspiciebam, an forsan adessent Variolæ? quartus enim morbi dies erat, sed considerata facie & toto corpore prorsus nihil deprehendebam. Infantem E. e lecto eximi & indui jubebam ac præscribebam ad æstum temperandum Emulsionem temperantem. A meridie, cum ægrotum denuo visitarem, in hypocausto ambulabat ac tota facies cum reliquo corpore Variolis quasi tectum erat. Suadebam continuationem Emulsionis & sic Variolæ legitime tempus suum ordinarium cum salutari exitu absolvebant.
- 6 Quamvis autem calor nimius certissime noceat, corpus tamen frigori & aeri liberi minime exponendum est, quatenus hoc modo Variolarum excretio impeditur, aut excretarum retrocessio producitur: quare ægroti semper in loco moderate calido detineantur.
- 7 Alvus clausa nunquam aperiatur per remedia Purgan-



gantia aliaq; irritantia aut laxantia quoque, quoniam ab apertione artificiali alvi semper majus periculum, quam ab adstrictione ejusdem metuendum est: quare etiam Methodus *Gundelstheimeri*, de qua *Stallius* in *Dissert. de Variolis*, non temere in usum trahenda est. Post superatum vero morbum blanda laxatio cum Mercurio dulci locum habet.

8 Abstinendum porro est a remedijs nimis temperantibus: calorem enim febrilem nimium obtundunt, atque hinc summe necessariam Variolarum excretionem impediunt.

9 Abusus terreorum & incrassantium pariter noxius est, quatenus humores nimium incrassando excretionem retardant: quare etiam *Pulvis Pannonicus ruber*, *aus Giff-Pulverlein*, (ad quam tamquam ad sacram anchoram plerique nostratum non in Variolis tantum, sed etiam in alijs morbis confugiunt) quicquid etiam alii de insigni ejus efficacia proferant, in Variolarum cura exulet, quoniam maximam partem ex terreis & adstringentibus constat & hinc utpl. plus nocet, quam prodest, quod experientia frequentissime monstrabit.

10 Decoctum Lentium cum Terra sigillata, quod quidam tanquam Deum tutelarem in Variolis commendant, nullum habet prorsus usum, flatulentum enim est & ob Terram sigillatam adstringit, quare potius mulierculis relinquendum est.

11 Aqua Fumarizæ destillata, quæ tanquam evporistum in Variolis plerumque usurpatur, prorsus est nullius usus, imo plus nocet, quam prodest.

12 Nimia remediorum copia, uti in omnibus alijs morbis, ita præcipue in Variolis summe noxia est, & hinc etiam in urbibus, ubi homines sanitatem non nisi multis remedijs redimi posse pertinaciter credunt, & etiam a Medicis, qui se per remedia & visitationes necessarios reddere summa diligentia laborant, in perversa tali opinione ratiunculis varijs, ignorantiam utpl. magis quam experientiam sapientibus, confirmantur, plures semper a Variolis quam in pagis, ubi totum negotium Naturæ committitur, moriuntur. Vocabar ante octo circiter annos ad puerum octo annorum, filium unigenitum & ideo charissimum, temperamenti cholericum Variolis laborantem & quidem die sexto tempore summe matutino: omnia curialia jam observata fuerant, aderat pulvis lapidis bezoardici, Pannonicus ruber, Aquæ diaphoreticæ, myrrhatæ & salibus volatilibus penetrantiores redditæ cordiales, Oleum Scorpionum magnificentissimum Matthioli, sacculi ad pulvis, Epithema cordiale, Spiritus ad irrigandos sacculos, Species pro potu, Tincturæ ad alterandum potum, Species Theriformes contra Tussim, Balsamum cephalicum aliaque classica remedia, pompæ medicæ modernæ inservientia, quæ singulis horis alternatim dabantur: sed hisce omnibus non obstantibus puer pessime sese habebat; Variolæ enim paucæ aderant, Febris insigniter urgebat & omnia symptomata erant gravissima. Seponi E omnia jubebam ac nil nisi pulverem simpliciter temperantem & moderate diaphoreticum præscribebam: loco potus parci largum suadebam ac regimen, antea summe calidum, moderatum imperabam. Circa vesperam denuo vocabar, & symptomata omnia mitiora erant, Variolæ in copia erumpebant, ac tandem ægrotus, nimis antea remedijs obrutus, felicissime evadebat.

13 Diarrhœa ab initio in Variolis occurrens, nunquam per positive adstringentia sistatur, ne graviora damna sequantur.

14 In convulsionibus eruptionem præcedentibus vitentur Castorina, quæ alias tanquam optima antepileptica laudantur, etsi enim aliquid conferre queant, reliquum tamen morbi cursum nimium turbant.

15 Sanius est narium Hæmorrhagiam, ante eruptionem & sub eadem contingentem & non excedentem, intactam relinquere, quam eandem imprudenter per adstringentia suppressere.

## CAPUT DUODECIMUM,

D E

*Variolis Confluentibus.*

I. *Definitio.* **V**ariolæ confluentes sunt species Febris acutæ, continuæ & exanthematicæ, quæ Natura materiam corrosivam beneficio motuum auctiorum ad habitum corporis expellit, pustulas confluentes & ad suppurationem tendentes comites habens.

II. *Differentia.*

1 A Variolis distinctis:

a Respectu temporis eruptionis, quatenus distinctæ ordinarie inter diem tertium & quartum, confluentes vero secundo vel tertio erumpunt,

b Respectu numeri, in confluentibus enim major semper, quam in distinctis Variolarum est numerus.

c Respectu Febris, quæ ordinarie in confluentibus magis urget quam in distinctis, & diutius etiam durat.

d Respectu symptomatum,

a Generalium, quæ in confluentibus longe graviora sunt quam in distinctis.

β Specialium, quatenus Salivatio & Diarrhœa in confluentibus frequentius observantur, quam in distinctis.

γ Respectu indolis, confluentes enim semper plus malignitatis conjunctæ habent, quam distinctæ.

δ Respectu durationis, Variolæ enim distinctæ citius ordinaria sua tempora absolvunt, quam confluentes.

III. *Signa.*

1 Invadunt fere eodem modo ac distinctæ, omnia tamen symptomata sunt graviora.

2 Dolor dorsi & lumborum quam maxime urget.

3 Anxietas præcordiorum tanta est, ut fere Cardialgiæ sit similis.

4 Nausea longe est gravior, quam in discretis & vomitus sunt magis enormes.

5 Febris hæc comitans est admodum gravis.

6 Die tertio ordinarie Variolarum confluentium sequitur eruptio nonnunquam etiam secundo.

7 Longe tamen alia ratione se habet ac in Variolis distinctis, cum enim in his primo maculæ ac statim pustulæ sequantur, confluentes instar Morbillorum & interdum instar erysipellacæ Inflammationis in conspectum veniunt.

8 Facies tota quanta intumescit & ex hoc tumore interdum prodeunt pustulæ.

9 Interdum vero hisce non apparentibus tota illa inflammatio unicam quasi constituit Variolam.

10 Sub hac ipsa eruptione symptomata non cessant & Febris in quibusdam lenior quidem fit, in alijs vero potius augetur, quam imminuitur.

11 Hoc ipso tempore in paulo adultioribus, symptomatibus re iquis jungitur Salivatio, quam tamen etiam in aliquot infantibus observavi.

12 Durat hæc eruptio usque ad diem octavum, ubi rubor ille faciei album acquirit colorem.

13 Hic sequentibus diebus sensim in flavum & fuscum mutatur.

14 Sed nec hoc tempore symptomata remittunt, augentur potius ad diem usque undecimum, quo ipso materia quæ hætenus usque ad octavum satis fluxilis excreta fuerat, insignem acquirit spissitudinem, ita ut vix excerni queat, aut salivatio prorsus supprimatur.

15 Materia excreta ordinarie nullum spirat fœtorem, non nunquam tamen satis fœtens est.

16 Interdum diutius durat & undecimum diem trans-

scen-



scendit salivatio quod si fit, tumor faciei sensim imminuitur.

- 17 Decrescente faciei tumore magis intumescunt manus & pedes.
- 18 Tandem in facie sensim exarescunt Variolæ ac tandem decidunt, quas deinde exarescentia & decidencia in reliquo corpore sequuntur.
- 19 In junioribus accedit interdum Diarrhœa, quæ per totum fere morbi cursum durare solet.

#### IV. Subj. Etum.

- 1 Infantes maxime succulenti.
- 2 Natu paulo majores. Conf. *Tab. præc.*

#### V. Prognosis

- 1 Variolæ confluentes semper peioris sunt indolis, quam distinctæ & hinc etiam plures jugulant.
- 2 Quo magis confluent, inpr. in facie, eo sunt periculosiores.
- 3 Si die jam secundo erumpunt, eo magis confluent & maius quoque periculum portendunt.
- 4 Quo minor in facie Variolarum est copia, licet reliquum corpus in magna quantitate obsessum sit, eo minus metuendum est periculum: quo major vero earum copia in facie deprehenditur, minor vero in reliquis partibus, eo gravior est status. Vid. *Sydenh. Opusc. p. 168*
- 5 Salivatio quo diutius in Variolis confluentibus durat, eo major restitutionis spes est.
- 6 Si vero die undecimo cessat res periculi plena est & ægroti fere ordinarie eodem die suffocatione pereunt.
- 7 Si suppurationis tempore facies & manus nimis subito detumescunt, mors ut plurimum ante fores est.
- 8 Si vero tumor faciei sensim sensimque imminuitur, manuum vero tumor persistit, aut aliquo modo augetur, bonum est signum.
- 9 Diarrhœa nisi sit immoderata, non adeo metuenda est in Variolis confluentibus.
- 10 Petechiæ & efflorescentiæ miliares in interstitiis Variolarum in corpore & circa collum occurrentes pessimum semper indicant statum. Ante sex annos laborabat infans duorum annorum Variolis confluentibus cum Petechiis nigris omnia interstitia denso agmine replentibus: præscribebam emulsionem leniter diapnoicam, cujus usui Essentiam alexipharmacam jungebam. Petechiæ hinc sensim colorem mutabant, ita ut septimo & octavo die coloris purpurei essent & cum sequentibus diebus magis magisque pallefcerent, undecimo prorsus disperebant. Hoc ipso die ut & duodecimo ac decimo tertio facies sensibilibiter detumescerebat, ac infans oculos hactenus clausos aperiebat. Cum vero loco alexipharmacæ & confortantis remedii liquor quidam maxime vitriolicus ex Pharmacopolio mitteretur, post primam ejus dosin manuum subitanea detumescencia, Convulsiones & mors sequebantur.
- 11 Quo magis in Variolis confluentibus somnolentia & stupor urgent, eo peior est status.
- 12 Idem censendum est de continuis vigiliis, inquietudine & jectigatione corporis.
- 13 Deliria maturationis tempore nimium urgentia infaustum præbent præsagium.
- 14 Subultus tendinum, quia ordinarie convulsiones post se trahunt, malæ sunt indolis.
- 15 Convulsiones in primis in morbi statu occurrentes, in confluentibus Variolis semper peiores sunt, quam in distinctis.
- 16 Liporhymiz tempore maturationis contingentes pessimæ sunt.
- 17 Respirandi difficultas, vox rauca aut clangosa cum deglutitione difficili mortem instantem indicant.

#### VI. Remedia.

- 1 Temperantia & absorbentia: Lapid.  $\text{ss}$ , Mat. Perl. Conch. citrat. Salia digestiva, diluentia, mucilagines Hordei, Avenæ &c.
- 2 Blandam diaphoresin excitantia:  $\text{ss}$  diaphoret. Bezoard. miner. Regulus  $\text{ss}$  medicinalis, Essentia alexipharmaca, Emulsiones diapnoicæ ex Sem. Card. Mar. Aquileg. Napi &c.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Potiuncula diapnoico-temperans.

R. *Aq. Galeg.* Nit. depur. a.  $\text{ss}$ .  
*Scorzon. a.*  $\text{ss}$ . R g.  $\text{ss}$  medic.  
*C.C. citr.*  $\text{ss}$ . Cinnab.  $\text{ss}$  ii. a. gr. XV.  
*Bezoard. min.* Sacch. perl.  $\text{ss}$  j. M.  
*Matr. perl.* D. sing. 3. horis.

##### 2 Pulvis diapnoico-temperans.

R. *Conch. citrat.* Pulv. Chacar.  
 $\text{ss}$  j. diaph. Cinnab. nat. a.  $\text{ss}$  j. M.  
*Nitr. regener. a.*  $\text{ss}$  j. D. sing. 4. horis.

##### 3 Mixtura alexipharmaca.

R. *Ess. alexiph.* D. 15. 20. gutt. pro ratione  
*Scord. a.*  $\text{ss}$  j. M. atatis.

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Cum Variolæ confluentes longe peiores sint distinctis, hinc etiam eo majori diligentia & assiduitate earum curæ incumbendum est.
- 2 In hisce quoque, uti distinctis, materia, qua fieri potest prudentia, temperanda est, ut eo facilius vel per Naturam ipsam, vel artis adminiculo ad habitum corporis sine magnis incommodis ferri possit: id quod præ ceteris præstant superius allegata ostracodermata cum diaphoreticis fixis, Emulsiones &c.
- 3 Febris mitigationi & materiæ præparationi inferviunt quoque Nitrosa, inprimis in paulo adultioribus: ad eundem quoque finem tendunt blanda acida, succus Citri, Aqua C.C. citrata, Tinct. Bellidis, Rosarum &c. quare & talia quoque, si necessitas ea postulat in usum trahantur. Potus quoque sufficiens, inprimis Decoct. C.C. & rasuræ Eboris citratum, optime convenit ad temperandum.
- 4 Tempore eruptionis ad excretionem Variolarum promovendam & symptomata graviora præcavenda, reliquis remediis interponatur, sed in pauca quantitate, Essentia alexipharmaca Stahlî, & talia remedia continentur usque ad suppurationem, sine necessitas eorum usum requirit: si enim symptomata non adeo urgent, & eruptio sponte procedit, sæpius solus potus, præsertim aliquantisper medicatus, in debita quantitate exhibitus sufficit, inpr. si regimen moderate diapnoicum accedit.
- 5 Die octavo & sequentibus probe attendendum est ad faciem, an scil. probe; uti debet, intumescat, an vero subsideat? & an tumor quoque circa undecimum in manibus & pedibus appareat? Si hoc non contingit, Essentia alexipharmaca vel per se, vel cum tantillo Essentiæ Myrrhæ remixta, sæpius sed parvis dosibus exhibeatur. Quamvis enim alias a myrrhatis abstinendum esse *Tab. præced. sub Cautelis* dixerimus, hic tamen, ubi facies detumescere præter consuetum ordinem incipit, & hinc res periculi plenissima est, non reformidanda, sed audacter in usum trahenda sunt.
- 6 Tempore exarescentiæ insignem pariter usum habet Essentia alexipharmaca Stahlî, reliquis remediis bis vel ter per diem interposita.
- 7 Morbo superato post plenariam exsiccationem primæ viæ per purgans ex Mercurio dulci evacuentur & Essentia alexipharmaca adhuc aliquandiu mane & vesperi continueretur, ut hoc modo omne, quod adhuc remansit causæ morbificæ, sensim expellatur, atque varia mala consecutaria præcaveantur.
- 8 Ad symptomata urgentia quam maxime quoque respiciendum est, cum vero de illis jam *Tab. præced.* actum fuerit, de duobus tantum, salivatione scil. & Diarrhœa, quæ in Confluentibus interdum occurrere solent, paucis agemus.

a Salivatio in nostro climate rarior est in Confluentibus, iisque non adeo frequenter jungitur, & hinc eam toto, quo Praxin exerceo, tempore, non nisi in paucis deprehendi. Si tamen occurrat, probe ad eam respiciendum est, ut scil. conservetur: rectissime enim *Sydenham* annotavit, eam die undecimo insignem minari periculum. Vocabar aliquando ad infantem 18. mensium Variolis confluentibus laborantem:

parcn-



parentes referebant infantem hactenus satis tranquillum fuisse, materiam tamen mucosam continuo ex ore fluxisse & fluxum hoc ipso die, erat autem undecimus, cessasse: infans pessime se habebat, ægre spirabat & pavores contrinui aderant. *Sydenhamium*, qui Narcotica & Emetica suadet, imitari volebam, ne postea mors hisce remediis adscriberetur, Præscribebam E. aliquot Aquas destillatas cum larga quantitate Cinnabaris Antimonii, easque sæpius exhibere jubebam. Circa vesperam cum ægrotulum visitarem, adstantes referebant, post Potiunculæ usum Salivationem tempore pomeridiano rediisse & sic infans præter opinionem evadebat. Paulo post vocabar ad puerum 12. annorum tertio morbi die, Variolæ jam copiose prodibant & Saliva continuo effluebat ex ore. Cinnabarim E. statim remediis in largiori dosi admiscebam & ejus usum continuatum suadebam: die undecimo saliva quidem erat spissior, nihilominus tamen sine difficultate prodibat. Durabat hæc Salivatio usque ad diem decimum quintum atque sic puer a morbo felicissime liberabatur. Eandem Cinnabaris efficaciam adhuc in aliquot aliis observavi.

- b Diarrhæam vero frequentius observavi, inpr. in infantibus habitus corporis succulenti: hæc si nimium urget, Essentia alexipharmaca reliquis diaphoreticis fixis interponatur, sed parvis dosibus.

#### VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Quæ *Tab. præced. de Cautelis* dicta sunt, hic quoque quam maxime observari debent.
- 2 Quamvis *Sydenhamius* alias optimus fuerit observator, non tamen temere imitandus est in methodo medendi respectu Opiatorum in promovenda salivatione: nam eum præconceptis opinionibus quoad Opiata nimium indulgisse ex ejusd. *Opusc. p. m.* 230. oppido liquet.
- 3 Diarrhæam infantum non excedentem præstat non attendere in Variolis confluentibus, quam eam per adstringentia suppressere. Reliqua Vid. *Tab. præced.*

### C A P U T XIII.

#### D E

#### Variolis adultorum.

I. *Definitio.* Variolæ adultorum sunt utpl. species Febris ex continente & continua compositæ, a Natura institutæ, ut materia acris caustica humoribus inhærens ad habitum corporis feratur. Conf. *Tab. præced.*

#### II. Differentia.

- 1 A Variolis juniorum.
  - a Respectu symptomatum, quæ in adultis ordinarie magis urgent, quam in junioribus.
  - b Respectu Febris, Variolas comitantis, quæ in junioribus ordinarie magis est simplex continua, testibus concurrentibus phænomenis, in adultis vero utpl. ex continente & continua est composita.
  - c Respectu exitus, qui in adultis sæpiissime est funestus, cum e contra juniores Variolis tanquam morbum congruum longe facilius ferant, nisi forsan peculiaris aeris constitutio aut Variolarum indoles aliæque circumstantiæ aliquid ad sinisteriorem exitum contribuant.
  - d Respectu indolis, quoniam Variolæ adultorum utpl. ad indolem confluentium inclinant, ideo semper sunt periculosiores,
- 2 A Confluentibus & aliis Febribus exanthematicis. Vid. *Tab. anteced. & seq.*
- 3 Interdum sunt distinctæ, ut plurimum vero confluentes.

#### III Signa.

- 1 Invadunt ordinarie cum horripilatione, & nonnunquam cum horrore insigni.
- 2 Quem excipit æstus gravis, calori Continentium parum vel nihil cedens.
- 3 Cui junguntur dolores tensivi satis notabiles & partium quoque externarum lancinantes.
- 4 Accedit anxietas præcordiorum gravis, quæ tamen pro temperamentorum aliarumque circumstantiarum, temporum scil. anni, Pethoræ, aerisque diversa constitutione maxime variat.
- 5 Sitis satis est intensa & maxime urget.
- 6 Dolor capitis accedit molestissimus continuo affligens.
- 7 Respiratio summe est difficilis & laboriosa.
- 8 Quæ symptomata prorsus nullam concedunt quietem, & hinc ægroti admodum sunt inquieti ac corpus varie modo huc, modo illuc jectigant.
- 9 Sub eruptione ordinarie Febris minime mitigatur, aut prorsus cessat, sed vel eodem tenore pergit, vel augetur: interdum tamen aliquo modo cessat, quod non nisi semel observavimus. Nobilis westphalus ex illustri Familia ortus, temperamenti sanguinei & Plethoricus, corripiebatur ante undecim annos tempore matutino insigni horrore, quem æstus excipiebat, cum symptomatibus reliquis febrilem calorem ordinarie comitantibus: præscribebam Potiunculam temperantem & diaphoreticam, unde calor circa vesperam admodum mitigabatur. Propter Plethoram Vena aperiebatur sequenti die, quem sequebatur euphoria, ita ut ad quartum usque diem extra lectum continuo in conclavi deambulare. Sed eodem die tempore pomeridiano Variolæ copiosissime in facie erumpebant, ac postea in reliquis quoque partibus instar acupuncturarum, Febris quoque denuo jungebatur satis gravis in dies augmenta capiens, cum insigni dolore dorsi & lumborum aliisque symptomatibus. Die septimo accedebat Diarrhæa cruenta cum insignibus torminibus: ægrototo eruptionis tempore omnia respuebat remedia, cum vero Diarrhæa corripiebatur & omnia reliqua augerentur symptomata cum Febre tandem die octavo, post multas exhortationes a Confessionario factas, Tincturam bezoardicam aliquoties assumebat, unde non solum alvi fluxus sensim imminuebatur, sed etiam Variolæ, (quæ quidem ex distinctarum censu, sed admodum sessiles & depressæ erant,) rotundæ & elatæ fiebant, & cum Tinctura bezoardica sæpius repeteretur, ægrotus tandem evadebat.
- 10 Circa hoc tempus accedunt interdum Hæmorrhagiæ narium graviter urgentes inprimis die tertio & quarto. Nobilis quidam Helvetius ante biennium Variolis confluentibus corripiebatur, vocabatur Medicus domus, ubi commorabatur ægrotus, ordinarius, cum vero morbus esset gravissimus & Febris cum omnibus symptomatibus maxime urgeret, Medicus alium adhuc sibi adjungi petebat. Vocatus E. die morbi tertio deprehendebam ægrotum summe delirantem: pulsus erat plenus, celer, fortis. Cum deliberaremus quid agendum sit, ægrotus corripiebatur Hæmorrhagia narium largissima, quæ integram fere horam durabat. Præscribebamus temperantia, absorbentia & diaphoretica fixa. Circa vesperam & noctu aliquoties recurrebat Hæmorrhagia. Sequenti die denuo aliquoties satis largiter fluebat sanguis & hinc æger mentis optime erat compos usque ad octavum, ubi omnia symptomata reddebantur gravissima ac deliria denuo accedebant. Cum vero diaphoreticis fixis & temperantibus insistere-mus, ac iis alexipharmaca interponeremus, æger feliciter dirum huncce morbum superabat.
- 11 In aliis vero tempore eruptionis jungitur Salivatio, quæ interdum maturius cessat, interdum vero ad finem usque morbi durat.
- 12 Habitus corporis est strictus, ita ut prorsus nullus sudor erumpere queat: in aliis vero post quartum & septimum ingens est ad sudores propensio, quæ tamen magis noxia, quam proficua est.



- 13 Et quamvis interdum in habitu corporis aliqua observetur relaxatio, eam tamen mox ejusdem contractio excipit, & hinc Variolæ modo erumpunt, quamvis difficulter, modo retrocedunt.
- 14 Tempore eruptionis ferocia symptomata parum vel nihil remittit, sed potius omnia cum Febre augentur.
- 15 Deliria etiam, quæ non raro in principio statim morbi accedunt, magis iam exacerbantur.
- 16 Sin vero Coma prius adfuit, hoc magis progrediente morbo simul etiam augetur.
- 17 Variolæ ipsæ, postquam prodierunt, nunquam uti in junioribus sufficienter elewantur, sed potius latiores redditæ & depressæ ordinarie confluunt.
- 18 Facies, quamvis interdum die octavo satis inflata reddatur, facile tamen iterum detumescit: in aliis vero ita turgida evadit, ut inflationem faciei in junioribus maxime superet.
- 19 Hoc ipso tempore symptomata adhuc magis urgent, & dolor lancinans & urens in superficie sive habitu corporis est eximius, unde etiam corporisjectiones longe sunt frequentiores.
- 20 In hac morbi periodo superveniunt non raro perturbationes visus, tinnitus aurium, frigus extremorum.
- 21 In aliis Phrenitis, Inflammatio faucium, Aphthæ, Hæmorrhagiæ narium &c. accedunt.
- 22 Tandem, si scilicet res bene succedit, sequitur exarescentia, cum symptomatum imminutione, & decidentia.

IV. *Subiecta.*

- 1 Homines adulti quicunque, qui Variolis in Infancia vel Pueritia non laborarunt.
- 2 Magis tamen ii, qui Temperamento gaudent sanguineo vel puro, vel prædominante, & habitu corporis succulento.
- 3 Eo facilius vero hunc morbum incurrent, si simul sunt insigniter Plethorici.
- 4 Præcipue quando constitutio est epidemica: extra enim talem constitutionem rarius Variolis affliguntur.
- 5 Nimiis corporis commotionibus indulgentes & Plethoram ultra quam par est commoventes.
- 6 Aromatibus, Vino generoso, diætæ lautæ &c. Plethoram & augmentibus & commoventibus, dediti.
- 7 Animo trepido, meticuloso præditi.

V. *Prognosis.*

- 1 Variolæ adultorum semper gravius urgent & hinc longe etiam sunt periculosiores, quam Variolæ juniorum: id quod inprimis contingit propter duplicis Febris concursum, dum enim Febris ordinaria, Variolis junctæ, a centro ad peripheriam materiam expellere nititur, altera, in adultis occurrens, more continentium habitum corporis stringit, adeoque necessariam Variolarum eruptionem impedit, aut eruptionum retrocessionem cavetur.
- 2 Adultorum Variolæ ut plurimum ex confluentium sunt classe & hinc etiam magis periculosæ.
- 3 Quo graviora statim in principio morbi symptomata sunt, eo periculosior est status.
- 4 Quo magis instabiles sunt circa eruptionem Variolæ, ita ut mox erumpant, modo retrocedant, eo gravius metuendum est periculum.
- 5 Habitus corporis nimis pallidus & aridus sive siccus periculum semper indicat, quia in tali statu Variolarum eruptio maxime impeditur.
- 6 Nimia in sudores propensio aut actualis eorum eruptio copiosa nunquam non periculosa est, quia ob humorum, ad Variolarum impletionem necessarium, defectum earum subsidientia aut retrocessio facile sequitur.
- 7 Hæmorrhagiæ die quarto erumpentes & sufficientem sanguinem fundentes non sunt reformidandæ: sæpius vero recidiventes nimium urgentes aut guttatim, præcipue in statu, prodeuntes, semper monstri quid alunt.
- 8 Refrigerationes graviores cum insignibus anxietatibus & angustiis præcordiorum ac respirandi difficultate, periculo nunquam carent.

- 9 Eo magis vero periculum augetur, si auditus perturbationes, oculorum fulgor & splendor aut e contra eorum obfuscatio cum caligine modo dictis symptomatibus junguntur.
- 10 Deliria phrenitica, Aphthæ Anginæ, & Vigilæ continuæ, quovis tempore in Variolis adultorum contingentes, funestum ut plurimum portendunt exitum.
- 11 Soporos profundi in hisce Variolis semper sunt mali, quoniam non raro Apoplexiam post se trahunt.
- 12 Salivatio, quæ interdum in adultioribus observatur, si legitime procedit, morbum leviores reddit.
- 13 Si vero die undecimo cessat aut supprimitur, ægroti ordinarie suffocatione moriuntur.
- 14 Convulsiones in hisce Variolis semper pessimæ sunt indolis, præcipue in statu morbi, ubi ordinarie funestum portendunt exitum.

VI. *Remedia.*

- 1 Materiam acrem præparantia & alterantia: uti sunt absorbentia, Nitrofa, Emulsiones.
- 2 Materiam correctam expellentia: & diaphor. Bezoard. miner. Cinnab. & Effent. alexiph. Mixture simplex, Tinct. Bezoard.
- 3 Symptomatibus prospicientia. Vid. *Methodus Medendi.*

*Formula Remediorum.*

## 1 Potiuncula præparans &amp; diaphnoica.

Rx. <i>Aq. Galeg.</i>	<i>Conch. citr.</i>
<i>Scorzon.</i>	<i>Pulv. Chacar. an. ℥j.</i>
<i>C. C. citr. an. ℥iiss.</i>	<i>Cinnab. ℥ii. gr. XII.</i>
<i>Bezoard. min.</i>	<i>Sir. Contraj. ℥vj. M.</i>
<i>Nitr. depur.</i>	<i>D. Cochlearum sing. 2. 3. horis.</i>
<i>Tart. Viriolat.</i>	

## 2 Alia alexipharmaca.

Rx. <i>Aq. Scord.</i>	<i>Scord. an. ℥j.</i>
<i>Flor. Acac.</i>	<i>Succ. citr. rec. ℥ij.</i>
<i>Card. bened.</i>	<i>Sir. Cydon. ℥ss. M.</i>
<i>Cord. frig. an. ℥j.</i>	<i>D. ut antea.</i>
<i>Essent. alexiph.</i>	

## 3 Mixture alexipharmaca.

Rx. <i>Mixt. simpl.</i>	<i>D. 25. 30. gutt.</i>
<i>Ess. alexiph. a. ℥j. M.</i>	

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Cum periculum in Variolis adultorum longe sit majus quam in reliquis, hinc etiam majori circumspectione & prudentia omnia sunt exhibenda remedia.
- 2 Respiciendum autem quam maxime est ad materiæ præparationem, ut caustica ejus indoles aliquo modo mitigetur, quo eo facilius postea expelli queat.
- 3 Statim tamen hisce vel interponenda vel jungenda sunt lenia diaphnoica, inprimis Antimonialia fixa cum absorbentibus mixta, quæ & temperant & diaphnoen promovent. Et ut hæc excretio eo melius procedat, hisce interponatur Ess. alexipharmaca aut Mixture simplex, vel etiam iisdem præmittatur, v. g. tempore matutino & pomeridiano; vesperi vero detur pulvis Antimonialis cum absorbente quodam & Cinnabari, in Aquis diaphnoicis, quales sunt Galegæ, Scorzonæ, Florum acac. &c. quæ Methodus est optima.
- 4 Dictis pulveribus etiam, si fortiori opus est diaphoresi, pulvis Chacarillæ admisceatur, ut pote qui præter vim diaphoretica etiam in motibus excedentibus mitigandis insignem habet efficaciam: exhibeatur autem ad gr. XII. XV. cum toridem granis & diaphor. aut Bezoard. min. & parva Cinnabaris quantitate, & quidem singulis quinque vel sex horis: aut etiam Extractum Corticis Chacarillæ modo dictis pulveribus ad gr. IV. VI. addatur, & eodem tempore in vehiculo Aquarum destillatarum detur.
- 5 In hominibus Sanguineis & Plethoricis suo quoque non carent usu Emulsiones ex seminibus Cardui Mar-



riæ, Aquilegiæ, Napi & Aquis diaphoreticis paratæ. In Phlegmaticis vero hisce substituantur Essentia alexipharmaca aut Mixtura simplex, sed frequentius ut detur necesse est. Si Essentia dulcis concentrata ad manus est, dictis Essentiis addantur aliquot guttæ: hæc enim egregie non solum hic, sed & in aliis affectibus convenit, quod sæpius observavimus. Non minoris usus sunt Pulveres Solares reliquis remediis interpositi.

- 6 Post eruptionem Variolarum insistendum semper est antea allegatis pulveribus absorbentibus & diaphoreticis aut Potiunculis exinde cum Aquis diaphoreticis paratis: Si vero Variolæ nimis depressæ videntur, Essentia alexipharmaca, Mixtura simplex, aut Tinctura Bezoardica vel etiam parum Essentiæ Myrrhæ Potiunculis addatur, aut dictæ Essentiæ reliquis remediis interponantur.
- 7 Tranquilla in lecto continentia & regimen moderate diaphoreticum toto morbi tempore omni studio observetur, quod sæpius plus præstat, quam ipsa remedia.
- 8 Ultimo morbi tempore bis singulis diebus exhibeatur Essentia alexipharmaca per octiduum, ac tandem superato morbo ad evacuandas vias Mercurius dulcis legitime præparatus vel in Pilulis, vel etiam in bolo detur.
- 9 Ad symptomata etiam in hisce Variolis magis quam in aliis urgentia sollicitè respiciendum est. Vid. Caput XI.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 In Variolis adultorum abstinendum est, quantum quidem possibile, a Venæsectione, nisi extrema necessitas & aliæ circumstantiæ, quas præsens prudens Medicus dijudicare potest, ejus usum suadeant, v. g. Plethora maxime urgens: aliaseam dissuadent.
- a *Complicatio Febris*, quamvis enim Febris continens sive sanguinea simplex Venæsectionem mature & in primo statim principio institutam admittat, quatenus Natura in hacce sanguinis imminutione vel per Hæmorrhagiam narium, vel per sudores intendit, Febris tamen Variolarum, quæ ex continuarum est censu, eam minime fert, quoniam post Venæsectionem ordinarie major sequitur peripheriæ corporis constrictio, quæ placidam Variolarum excretionem impedit.
- b *Indoles causæ morbificæ*: quæ per Venæsectionem neque corrigitur, neque etiam ad peripheriam corporis ducitur, sed potius post eam institutam viscera magis petit.
- c *Varia mala consuetaria*: post Venæsectionem enim celebratam circa dies criticos variæ ad caput sunt sanguinis congestiones, quas, nisi debito modo iisdem occurratur, stillicidia sanguinis e naribus, sopores profundiores, deliria phrenitica, Aphthæ &c. sequuntur.
- 2 Si vero Plethora insigniter urget, & gravia in decursu morbi exinde metuenda sunt symptomata, in principio statim morbi vena aperiatur, sed simul larga satis sanguinis quantitas emittatur, & immediate subjungantur diaphoretica paulo fortiora cum moderato regimine, ut hoc modo Natura a proposito evacuationis sanguinis sinceri avocetur & Variolarum excretio promoveatur.
- 3 Reliquas Cautelas vide l.a.

#### C A P U T XIV.

##### D E

##### Morbilis.

I. *Definitio.* **M**orbilli sunt species Febris acutæ, continuæ, exanthematicæ, cujus ope Natura materiam acrem & causticam, in peripheria maculas rubicundas, superficiem cutis aliquo modo superantes, formantem expellere nititur.

##### II. Differentia.

- 1 A *Variolis*: quatenus hæc pustulas ad suppurationem tendentes formant, Morbilli vero sunt solum exanthemata lenticulari magnitudine cutim superantia, quæ nunquam in suppurationem abeunt.
- 2 A *Petechiis*: quæ profunde in cute hærent, & totum corpus, excepta facie, infestant: cum e contra Morbilli copiose ex facie & deinde ex toto corpore erumpant, ac supra cutim inpr. in facie emineant.
- 3 A *Febre populari* sive *Purpura urticata* aut *benigna*: quoniam in hac interdum sine Febre, utpl. vero cum illa exanthemata rubicunda, elata & admodum prurientia & pungentia, Morbillos magnitudine superantia, in peripheria corporis erumpunt: in Morbillis vero præcedit Febris ac postea die tertio vel quarto exanthemata prodeunt.
- 4 A *Purpura miliari*: in qua, inpr. *alba*, sunt pustulæ exiguæ pellucidæ, ex maculis rubicundis natæ: in *rubra* vero parvæ eminentiæ duræ instar seminis milii: quæ a Morbillis maxime differunt.
- 5 A *Maculis scorbuticis*: quæ sunt latæ, plane coloris obscure rubicundi, utpl. absque Febre: cum e contra Morbilli sint elati, coloris floridi cum Febre acuta.
- 6 Tandem morbilli sunt:
  - a Vel *sporadici* & *benigni*, qui paucos tantum affligunt.
  - b Vel *epidemicis* & magis *maligni*, qui multos ex communi causa corripunt.

##### III. Signa.

- 1 Invadunt ordinarie cum horrore leni, oscitatione, & pandicatione uti Variolæ, qui tamen interdum in aliis vix sensibilis est.
- 2 Sæpius primo die horror lenis & æstus mitis alternaim se excipiunt.
- 3 Hisce jungitur Nausea & Vomitus, cum jectigatione corporis & lassitudine ulcerosa.
- 4 Secundo die Febris augetur, ita ut æstus maxime fiat sensibilis.
- 5 Durat hæc Febris ad quartum usque diem & plerumque ingravescit, in paucissimis vero aliquo modo imminuitur.
- 6 Æstui jungitur sitis cum albedine linguæ, faucium siccitate & raucedine ac respiratione brevi & anhelosa.
- 7 Adest dolor capitis vel gravedinosus cum somno entia & vertigine continua; vel magis acutus cum Vigiliis continuis.
- 8 Frequenter etiam sternutant ægrotantes & liquorem e naribus emittunt.
- 9 Tussi etiam laborant sicca, per totum morbi cursum durante.
- 10 Oculi copiosis humoribus irrigantur, rubent & sunt minus splendidi.
- 11 Tussis sicca continuo urget.
- 12 Accedit hoc ipso apparatus tempore in quibusdam Vomitus, in pluribus vero Diarrhœa.
- 13 In Plethoricis occurrunt quoque Hæmorrhagiæ narium vel sæpius repetentes, vel largiores Vidimus hoc ante aliquot annos in multis patientibus, plerique enim vel narium Hæmorrhagiis vel alvi fluxibus corripiebantur: & omnestales longe melius morbum ferebant, quam alii, quibus hujusmodi excretiones non succedebant: in prioribus enim Febris cum reliquis sym-



symptomatibus insigniter imminuebatur, ita ut hinc status esset admodum tranquillus: posteriores vero longe pejus se habebant, post superatum enim morbum diu Tussi sicca affligebantur, quæ etiam paucò elapso tempore quosdam e medio tollebat. Hæmorrhagiæ tum temporis, nisi in eminenter Plethoricis, ultra quartum diem non extendebantur, Diarrhœæ vero in multis ad finem usque morbi continuabant.

14 Die quarto palpebræ aliquo modo intumescunt & in facie & fronte erumpunt parvæ maculæ rubicundæ, quæ tandem hinc inde coalescunt.

15 Hæc excipiunt deinde morbilli in dorso, collo, pectore & artubus erumpentes.

16 Illæ sensim sensimque elewantur, ita ut cutis superficiem superent: hæc vero planæ permanent, sed latius se diffundunt.

17 Hoc ipso tempore symptomata minime mitigantur, ut id in Variolis contingit, sed Febris cum reliquis symptomatibus vel eodem tenore pergit, vel increbescit.

18 Die sexto & septimo Morbilli in facie asperiores evadunt propter secedentem cuticulam & die octavo & nono prorsus evanescunt.

19 Qui vero in reliquo corpore sunt Morbilli, tum temporis insigniter rubent & latiores fiunt, donec tandem disrupta cuticula instar squamularum decidant.

#### V. Subiectum.

1 Infantes & pueri præ ceteris hoc morbo corripuntur.

2 Si tamen epidemice grassantur nec juvenes ab eo immunes sunt, quod inpr. Parisiis hoc ipso & aliis præcedentibus annis observatum fuit.

#### VI. Prognosis.

1 Morbilli sporadici paucos tantum affligentes, ut plurimum, nisi error quidam in methodo aut regimine committatur, salutarem habent exitum.

2 Si tamen tum temporis Febris quædam maligna grassatur, hæc illis facile se associat & eos summe periculosos reddit.

3 Epidemice grassantes Morbilli semper sunt dubii exitus & plures e medio tollunt.

4 Pro certa tamen aeris constitutione, diversis annis, magis vel minus periculosi existunt.

5 Symptomatum gravitas, in morbi principio interdum occurrens, non semper indicium malignitatis est, sub decursu enim morbi mitiora redduntur, ac Morbilli salutarem nanciscuntur exitum.

6 Nec etiam semper fidendum est mitioribus symptomatibus: uti enim aliæ Febres malignæ interdum in principio respectu symptomatum non adeo urgent, ita etiam Morbilli, etiam si ab initio benigni videantur, subito sæpius malignitatem suam manifestant, & plures neci tradunt.

7 Morbilli ante ordinatum tempus aut etiam nimis tarde efflorescentes semper monstri quid alunt.

8 Morbilli nimis pallidi & in facie cutim non superantes semper malæ sunt indolis.

9 Morbilli colorem sæpius mutantem salutarem vix nanciscuntur exitum.

10 Morbilli unam partem post alteram in efflorescentia & nimis tarde occupantes mali ominis sunt.

11 Morbilli ultra consuetum terminum in peripheria corporis permanentes cum reliquis symptomatibus malignitatis merito suspectæ sunt.

12 Si post Morbillorum evanescentiam Febris cum Tussi ferina adhuc graviter urget, res periculi plena est, facile enim faucium, pectoris & pulmonum inflammatio ut plurimum lethalis sequitur.

13 Morbilli male succedentes interdum viscerum labem post se relinquunt, unde Phthises, Hæcticæ & Hydropes lento gradu ad mortem tendentes sequuntur.

#### VI. Remedia.

1 Materiam acrem causticam temperantia: Lapidescantur, Cancrorum, Conchæ citrat. Emulsiones, Mucilago Hordei, Tinctura Rosarum, Succus Citri, Sirupus acetos. Citri &c.

2 Materiam per diaphoresin expellentia: Antimonium diaphoreticum, Bezoard. minerale, Regulus & ii me-

dicinal., Ess. alexipharmaca, Mixtura simplex, Emulsiones ex Sem. Card. Mar. Napi, Aquilegiæ.

3 Symptomatibus prospicientia, Vid. Tab. de Variolis.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Emulsiō diapnoico-temperans.

℞. Sem. Card. Mar.	F. l. a. Emulsiō.
Aquileg.	Colat. ʒvj. l. vii. adde
Amygd. dulc. an. ʒij.	ʒ diaph.
Aq. Aquileg.	Conch. ppt. a. ʒij.
Scorzon.	Sacch. perlat. q. s. M.
Galeg.	D. sing. 3. vel 4. horis co-
Fl. Samb. an. q. s.	chlearia aliquot.

##### 2 Species pro Potu ordinario.

℞. Raf. C. C. ʒiv.	Incis. Coq. in s. q. Aq. simpl.
Rad. Scorzon. ʒij.	ʒ D. sæpius.
Pimp. alb. ʒj.	

##### 3 Mixtura alexipharmaca.

℞. Ess. alexiph. ʒij.	D. 15. 20. gutt. pro ratio-
Spir. Tart. ʒij.	ne ætatis.
Vitrioli ʒj. M.	

##### 4 Bolus Purgans.

℞. Conf. rosar. ʒls.	Sir. rosar. solut. q. s. M.
ʒ dulc.	F. Bolus.
Pulv. Jalap. a. gr. vj.	

#### VII. Methodus Medendi.

1 Quod de Variolis dictum fuit, methodum scil. placidissimam optimam esse una cum regimine moderato, ac sæpius satius esse totum opus Naturæ relinquare, quam multis remediis morbum turbare, id quoque de Morbillis valet.

2 Si vero aliquid agendum videtur, in usum trahantur absorbentia, ostracodermata aliaque temperantia diaphoreticis fixis mixta, ut hoc modo materia morifica in primo morbi stadio præparetur & sensim sensimque ad peripheriam corporis expellatur. Hinc præparationi & expulsioni optime inseruiunt Emulsiones ex semine Cardui Mariæ, Napi, Aquilegiæ & paucis amygdalis paratæ. Nec etiam Nitrosa & Cinnabarina, ubi æstus & dolores urgent, suo carent usu, si reliquis admiscantur remediis in parciore dose, æstum enim optime temperant & dolorum ferociam mitigant.

3 Tempore efflorescentiæ iisdem insistendum est remediis, præsertim quando eruptio non adeo commode succedit, quibus frequenter interponantur mucilagines dilutiores ex hordeo paratæ, quæ & temperant & Tussim demulcent.

4 Potest etiam dictis remediis ad eruptionem promovendam interponi Essentia alexipharmaca Stahlî, tempore scil. matutino & pomeridiano.

5 Post diem octavum continuetur hæc Essentia tempore matutino & vespertino ac tandem exhibeatur laxans ex Mercurio dulci.

6 Quod Symptomatum mitigationem concernit, vid. Tab. de Variolis distinctis.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1 Uti in Variolis regimen nimis calidum, Volatilia, Purgantia, omniaque commoventia, ita & in Morbillis fugienda sunt.

2 In Tussi contumaci, post Morbillos relicta, Sydenham & Morton commendant quidem tanquam optimum auxilium Venesectionem, sed cum nostrates eam in infantibus nunquam admittere velint, determinare juxta experientiam nequeo, an Venesectio tantam habeat utilitatem, ac quidem Authores illi volunt. Hinc ordinariæ & quidem ut plurimum cum bono successu substitui Infusum Theiforme ex Radicibus & Herbis blande resolventibus, quibus Emulsiones temperantes ex Amygd. dulc. & semine Cardui Mariæ interposui.

3 Reliquas Cautelas practicas Capite de Variolis distinctis jam annotavimus, quare huc quoque trahantur.



## C A P U T XV.

## D E

*Febris Scarlatina.*

I. *Definitio.* **F**ebbris Scarlatina est species Februm acutarum, continuarum & exanthematicarum, in qua Natura materiam quandam acrem causticam corpori insensam in peripheriam, maculas latas rubras formantem, expellere nititur & expellit.

II. *Differentia.*

- 1 A *Morbilis*, in quibus exanthemata sunt parva, quæ postea racematim coalescunt: in *Febre* autem *Scarlatina* sunt latiores & magis rubicundæ, unde etiam hæc Febris ob intensiorem macularum colorem *Scarlatina* nomen obtinuit.
- 2 A *Purpura urticata*, in qua exanthemata sunt minora & eminentia cum insigni pruritu, quæ symptomata in *Febre Scarlatina* non reperiuntur.
- 3 A reliquis *Febribus exanthematicis* per signa Tab. præcedente recensita.

III. *Signa.*

- 1 Invadit cum horrore vel rigore, sed leni.
- 2 Quem excipit æstus pro causarum diversitate modo mitis, modo gravior.
- 3 Jungitur ei sitis & ardor faucium.
- 4 Adest etiam oppletio pectoris, respirationem difficilem reddens cum tussicula sicca.
- 5 Vires pro subjectorum & causarum varietate magis vel minus supprimuntur.
- 6 Accedit etiam capitis vel gravitas vertiginosa vel dolor magis acutus.
- 7 Durant hæc symptomata ad quartum usque diem, quo tota facies intumescit.
- 8 Erumpunt hinc exanthemata rubicunda primo parva, quæ tamen mox latiora redduntur ac coalescunt & totam faciem intensa rubedine tingunt.
- 9 Circa hoc tempus in quibusdam, præcipue Plethoricis, superveniunt Hæmorrhagiæ narium.
- 10 Postea eadem exanthemata in pectore quoque & dorso prodeunt & peripheriam harum partium quaquaversum tegunt.
- 11 Tandem etiam in artubus inferioribus & superioribus maculæ illæ latæ & insigniter rubicundæ conspiciuntur.
- 12 Postquam duas vel tres dies ita subistere, facies detumescit & rubor ille insignis perit.
- 13 Ipsa quoque reliqua symptomata vel admodum mitigantur, vel prorsus evanescent.
- 14 Secedit postea cuticula & abit in tenuissimas squamulas, quæ sensim sensimque decidunt.
- 15 Idem postea in pectore, ac tandem, morbo penitus ad finem properante, in artubus contingit.
- 16 Alvus ordinarie toto hoc tempore est clausa, uti in Variolis, quæ tamen sub finem morbi sponte aperitur.

IV. *Subjecta.*

- 1 Respectu ætatis: juniores præ adultis.
- 2 Temperamenti intuitu: Sanguinei Plethorici sanguine fluxili & poroso corporis habitu gaudentes.
- 3 Plethoram per motum immoderatum commoventes.
- 4 Quibus consuetæ narium Hæmorrhagiæ suppressæ sunt.
- 5 Virgines emanatione mensium laborantes. Vocabar ante paucas septimanas ad virginem quindecim annorum, quæ hæcenus varia molimina ad mensium excretionem tendentia senserat: hæc cum circa novilunium mensis Aprilis eadem molimina, sine tamen mensium successu, sentiret, subito circa vespere horrore corripiebatur, quem æstus, sitis & dolor capitis excipiebant; tertio die facies insigniter turgebat, palpebræ erant inflatæ ac oculi rubi-

cundi: die quarto facies insigniter rubebat, & idem rubor postmodum in reliquis quoque partibus observabatur, qui tandem a septimo usque ad undecimum decidentibus squamulis prorsus evanescebat: Soror ejus natu major ob eandem causam jam aliquoties simili morbo laboravit.

V. *Prognosis.*

- 1 Febris Scarlatina sibi relicta aut mitissime solo regimine moderato tractata periculo vacat & sponte ordinarie post septimum diem aut maturius etiam cessat.
- 2 Si vero per commoventia & regimen calidum tractatur, facile gravia ei junguntur symptomata.
- 3 Quo citius erumpunt exanthemata eo breviori etiam tempore totus finitur morbus.
- 4 Non raro tamen in tali casu nova exanthemata priora sequuntur.
- 5 Quo mitiora sunt symptomata, eo major etiam de salutari exitu est spes: si vero nimium urgent, merito etiam gravius quid metuendum est, inprimis si insignis Plethora concurrit aut gravior ejusdem commotio præcessit.
- 6 Hæmorrhagia narium sufficiens, sub eruptione exanthematum contingens, morbum insigniter imminuit, adeoque bonæ notæ est.
- 7 Adstrictio alvi exanthematum excretionem promovet, & hinc nil mali portendit: nimia vero ejusdem apertio nullius est usus.

VI. *Remedia.*

- 1 *Temperantia*: Succ. citr. recens, Rob. Cydon. Ribium, Berberum, Sirup. acetos. citr. Ceras. acid. Nitrosa, absorbentia, mucilaginoso, gelatinosa &c.
- 2 *Diapnoica*: Aq. Galeg. Ulmar. Fl. Acac. Card. bened. Scabios. Scord. & diaph. Bezoard. miner. Essent. alexiphar. &c.
- 3 *Symptomatibus prospicientia*: Vid. Tab. de Variolis & Morbillis.

*Formula Remediorum.*

## 1 Potiuncula diapnoico-temperans.

R. Aq. Galeg.	Conch. citrat.
Ulmar.	Tart. Vitriolat. an. ℥ss.
Rub. id.	Cinnab. ℥ij. ℥j.
Fragor. an. ℥j.	Sir. acetos. citr. ℥ss. M.
& diaph.	D. Cochleatim.

## 2 Julepus temperans.

R. Aq. Fl. Acac.	Succ. citr. rec.
Samb.	Rob. Cydon.
Scorzon.	Berb.
Scord.	Rib. an. ℥iij.
C. C. citr.	Sir. ceras. acid. ℥ss. M.
Cinnam. cyd. an. ℥j.	D. cochleatim.
Reliquas Formulas vid. in Tab. præced.	

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Si æstus in tali Febre insigniter urget, reliquis remediis merito præmittuntur temperantia, Nitrosa, absorbentia acidis saturata & salia digestiva, ut hoc modo æstu mitigato exanthematum excretio eo melius contingere queat.
- 2 Postea exhibeantur remedia excretionem promoventia: qualia sunt Antimonialia fixa, & Cinnabarina, reliquis remediis juncta vel interposita. Eidem fini etiam emulsionem partim temperantes, partim diapnoicæ inservunt.
- 3 Non sine fluctu exhiberi quoque poterunt lenia alexipharmaca, v. g. Essentia alexipharmaca Stahlî, Mixtura simplex &c. inpr. æstu declinante, aut extra exacerbationis tempus: potus tamen sufficiens hisce semper interponatur.
- 4 Si forsan in paulo adultioribus narium Hæmorrhagia nimium urgens accedit, dentur antea laudata temperantia cum Nitrosis in paulo largiori quantitate, quibus Corallia & Species de Hyacintho admisceantur: hæc enim nimium sanguinis æstum, quæ Hæmorrhagiæ occasionem dedit, optime refrenant.
- 5 Si alvus pertinaciter est clausa, ita ut aliquid exinde metuendum sit, Clystere emolliente aperiatur.



- 6 Si vero adhuc alia occurrunt symptomata, Diarrhœæ, Vomitus, Convulsiones, Comata &c. quæ Variolis aliisque morbis exanthematicis propria vel communia sunt, ea remediis Cap. de Variolis allegatis tractentur.
- 7 Post desquamationem spatio aliquot dierum Essentia alexipharmaca exhibeatur & primæ viæ laxante ex Mercurio dulci evacuentur.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Etiam si in hoc affectu in paulo adultioribus Plethora aliquo modo urgeat, Venæsectio non facile instituitur, quoniam eam non raro exanthematum retrocessio cum damno sequi solet. Multo minus ejus usus in junioribus & sensibilibus suadendus est.
- 2 Eo facilius vero exanthematum sequitur retrocessio, si Purgantia quæcunque, inprimis vero acriora, exhibentur; hæc enim materiam acrem causticam a peripheria corporis ad interiora derivant.
- 3 Imo ab ipsis quoque Clysteribus stimulantibus abstinendum est, quia eidem malo viam sternunt.
- 4 Nec etiam locus concedendus est fortioribus alexipharmacis positive diaphoreticis, volatilibus, regimini calido aliisque Massam humorum nimium commoventibus, quatenus per talia nimia humorum excitatur ebullitio, materia magis acris redditur, & Febris cum omnibus symptomatibus augetur.
- 5 Potius ad Febrem respiciendum est, ut ea in mediocritate conservetur; quare etiam e contrario a frigidis remediis, emulsionibus, nimis temperantibus & refrigeratione abstinendum est.
- 6 Reliquæ Cautelæ Practicæ sub *Variolis distinctis* jam traditæ fuerunt.

## CAPUT XVI.

## D E

*Purpura urticata.*

## I. Definitio.

**P**urpura urticata est species Febris benignioris & mitioris, in qua Natura per motus secretorios & excretorios auctiores, materiam quandam acrem, papulas sive eminentias, læsionibus post urticarum ictum relictis similes, formantem expellere nititur.

## II. Differentia.

- 1 Respectu *copiæ exanthematum*, interdum enim major, interdum vero minor eorum quantitas in peripheria corporis erumpit.
- 2 Respectu *Febris*, quæ modo morbum hunc comitatur, modo vero abest.
- 3 Respectu *indolis Febris*, quæ ut plurimum quidem est benigna, nonnunquam tamen etiam maligna est. Vidimus talem Febrem ante quatuordecim & quod excurrit annos, ubi plures Febribus malignis corripiebantur, in aliquot infantibus; exanthemata Purpuram urticatam exacte referebant, sed Febris juncta maxime urgebat, cum siti æstu & insigni virium prostratione: exhibebantur diaphoretica fixa, absorbentia & Cinnabarina cum Mixtura simplici, sed frustra, faucium enim inflammatio & convulsiones spatio paucorum dierum infantes jugulabant. Adeoque Febris maligna, quæ alias in constitutionibus epidemicis jungi solet, ad Purpuram quoque urticatam in hisce infantibus accesserat.

## III. Signa.

- 1 Invadit ordinarie cum leni horrore in peripheria corporis se manifestante.
- 2 Quem excipit calor præternaturalis moderatus.
- 3 Jungitur etiam aliqualis capitis perturbatio aut lenior ejusdem dolor.
- 4 Membra sive artus lassitudo occupat.
- 5 Calorem præternaturalem comitatur etiam sitis, sed non adeo intensa.
- 6 Tandem erumpunt hinc inde exanthemata faciem & habitum corporis occupantia.

- 7 Exanthemata cutis superficiem superant & faciem ac habitum corporis tumidum reddunt.
- 8 Coloris sunt ex pallido rubicundi.
- 9 Adest etiam pruritus ardens admodum molestus, continuo affligens, præsertim quando exanthemata effloruerunt.
- 10 Non tamen constanter permanent exanthemata in cute, sed modo, inpr. interdiu, erumpunt, modo iterum evanescunt, ac Febris conjuncta etiam cessat.
- 11 Circa vesperam vero, ubi Febris exacerbat, denuo prodeunt, & eo tempore etiam pruritus molestus insigniter urget.
- 12 Durant hæc symptomata spatio duorum, trium vel quatuor dierum ac tandem plenarie cessant.
- 13 In nonnullis etiam in superficie exanthematum observatur asperitas quædam.

## IV. Subjectum.

- 1 Homines junioris ætatis.
- 2 Temperamento sanguineo & laxiori ac poroso corporis habitu præditi & Plethorici.
- 3 Plethoram commoventes,
- 4 Transpirationem negligentes.

## V. Prognosis.

- 1 Affectus hic per se periculo caret & brevi etiam tempore finitur.
- 2 Si tamen imprudenter tractatur inpr. per regimen nimis calidum & commoventia, facile mala consecutaria habere solet.
- 3 Qui aliquoties Purpura tali laboravit, eam facile denuo propter leviores etiam Plethoræ commotiones incurrit: id quod in non paucis observavimus.

## VI. Remedia.

- 1 Acrimoniam biliosam temperantia & diapnoen corporis promoventia: Nitr. depur. regenerat. ʒiat. Lap. ʒi. ppt. ʒ. diaphor. Bezoard. miner. Cinnab. ʒii, nativ. Aq. Scorzon. Galeg. Card. bened. Essent. alexiph. Scord. Mixt. simpl. Tinct. Bezoard.
- 2 Primarum viarum cruditates, si quæ adsunt, evacuantia: Rhabarb. Tamarindi, Manna, Senna.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pulvis diapnoico-temperans.

Rx. Conch. ppt. Cinnab. ʒii gr. 24. M.  
 ʒ diaph. Div. in 8. p. aq.  
 Nitr. depur. D. sing. 4. horis.  
 Tart. Vitriolat. a. ʒij.

## 2 Potiuncula diapnoico-temperans.

Rx. Aq. Scorzon. ʒ diaph. a. ʒss.  
 Galeg. Nur. depur. ʒj.  
 Card. Bened. a. ʒj. Tab. M. ʒss. f. ʒj. M.  
 C.C. citr. ʒvj. D. sing. 3. horis cochlearia  
 Lap. ʒi. ppt. aliquot.

## 3 Essentia diapnoica.

Rx. Ess. alexiph. D. gutt. 30. mane.  
 Scord. a. ʒss. M.

## 4 Potio laxans.

Rx. Tamarind. ʒj. Colat. ʒiv. adde  
 Rhab. elect. ʒss. Mann. Calabr. ʒj. M.  
 Cryst. Tart. ʒss. D. calide.  
 Coq. in f. q. Aq. f.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Simplicissima Methodus in hoc affectu optima est, & sæpius totus morbus conveniente tantum & moderato regimine curatur. Si vero aliquid agendum est sola absorbentia cum Antimonio diaphoretico sufficiunt, quæ interdiu & circa vesperam exhiberi possunt.
- 2 Si vero Febris cum æstu aliquo modo urget, dictis remediis parum Nitri, Tartari Vitriolati aut alius salis digestivi addatur.
- 3 Si subjecta sunt aliquo modo Phlegmatica tempore matutino & pomeridiano Essentia alexipharmaca reliquis remediis interponatur.
- 4 Si alvus est obstructa Clystere emolliente aut blando laxante aperiat.



VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 Quamvis Plethora commota ordinarie huic affuectui ansam præbeat, Venæsectio tamen non temere instituenda est, ne exanthematum retrocessio ad interiora sequatur.
- 2 Satiùs quidē est alvum esse liberam quam obstructam in hoc morbo, nunquam tamen per positive purgantia acra aperiatur, quoniam per ea materia acris, quæ per diaphoresin excerni debet, ad interiora derivatur.
- 3 Abstinendum quoque est a positive diaphoreticis & alexipharmacis calidioribus, quoniam sanguinem nimium commovendo Febrem conjunctam & omnia symptomata augent: sufficiunt lenia diaphnoica & quieta in lecto continentia.
- 4 Porro abstineant ægrotantes a 'potu & aere frigido, ne efflorescentia exanthematum impediatur: fugiant tamen simul etiam regimen nimis calidum.

## CAPUT XVII.

## D E

*Purpurea rubra sive benigna.*

I. *Definitio.* **P**urpura rubra est species Febris exanthematicæ, in qua Natura per motus secretorios & excretorios auctiores materiam quandam acrem, exanthemata rubra miliaria in peripheria corporis formantem, expellere nititur.

II. *Differentia.*

- 1 A *Purpura urticata*, in qua exanthemata sunt majora & altiora quæ in hac Febre granum milii magnitudine vix superant.
- 2 A *Febre Scarlatina*, in qua exanthemata sunt admodum lata & insigniter rubentia, qualia phænomena in hac non occurrunt.
- 3 A *Morbilis*, in quibus exanthemata pariter sunt majora, quam in Purpura.
- 4 A *Maculis scorbuticis*, quæ quoque & colore & magnitudine a Purpura differunt.
- 5 A *Petechiis*, quæ cutim uti Purpura non superant, sed profunde in cute hærent.
- 6 A *Purpura alba*, in qua ex exanthematibus rubris pustulæ veræ, humorem aqueum limpidum continentes, emergunt, in Purpura vero rubra nullæ adsunt vesiculæ, sed tantum noduli.
- 7 Purpura rubra ut plurimum quidem est *benigna*, interdum vero quoque *maligna* est.
- 8 Respectu Febris ipsi junctæ, Purpura interdum magis ad statum acutum, nonnunquam vero ad intermittentem inclinat.

III. *Signa.*

- 1 Invadit cum horrore, & æstu frequenter alternantibus.
- 2 Hunc comitatur dolor capitis pro subjectorum diversitate diversus, utpl. tamen gravativus cum somnolentia.
- 3 Adest anxietas & angustia præcordiorum.
- 4 In aliis observatur oppletio pectoris & hinc respirandi difficultas cum aliquali Tussi.
- 5 Ordinarie quoque, uti in aliis morbis exanthematicis, ita & in hoc ægrotantes conqueruntur de dolore obtuso aut pressione in dorso.
- 6 Die quarto aut etiam septimo sentiunt ægroti insignem æstum sub cute & pruritum, sub quo exanthemata miliaria sequuntur & quidem primo in collo & pectore ac postea in reliquis quoque partibus.
- 7 Exanthemata hæc nullum limpidum humorem in se continent, uti in Purpura alba, sed sunt tantum instar nodulorum cutim asperam reddentium.
- 8 Febris in hoc affectu est admodum mitis, imo in quibusdam prorsus nulla, in subjectis tamen Plethoricis utpl. magis urget.
- 9 Ægrotantes maxime proni sunt ad sudores copiosos, graves, olentes.

10 Aliquot post eruptionem dies exarescunt exanthemata & sub squamarum forma decidunt.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines juniores temperamento humido & habitu corporis poroso præditi.
- 2 Otio dediti & diætâ lauta utentes.
- 3 Ad iracundiam proni.
- 4 Plethoram præsentem variis modis commoventes.
- 5 Feminae, mensium inordinato fluxu aut eorum suppressione laborantes.
- 6 Evacuationes sanguinis naturales & artificiales negligentes.

V. *Prognosis.*

- 1 Purpura rubra utpl. benigna est & raro gravia conjuncta habet symptomata, aut mala consecutaria.
- 2 Si vero constitutio est epidemica, sæpius eundem malignitatis gradum ac Purpura alba obtinet, imo hanc interdum adhuc superat.
- 3 Quo magis confertim erumpit Purpura rubra, eo citius etiam conjuncta symptomata mitigantur.
- 4 Juniores, laxo corporis habitu præditi, longe facilius ferunt Purpuram, quam adulti, strictiorem corporis habitum habentes.
- 5 Plethorici & Cacochymici gravius ordinarie laborant Purpura & graviora quoque patiuntur symptomata quam alii.
- 6 Retrocessio exanthematum hic non adeo periculosa est ac in Purpura alba, symptomata tamen omnia exinde maxime augentur.
- 7 Imo nova interdum superveniunt, motus scil. contractorii in artubus, insignis corporis fatigatio, virium prostratio, faucium inflammationes, Tusses siccae &c. quæ neglecta non minimo periculo ægrotantes exponunt.
- 8 Purpura rubra, etsi interdum cesset, facile tamen in dispositis ob leviores commotiones recurrit.

VI. *Remedia.*

- 1 Motus Febriles in justo ordine conservantia & temperantia; Nitrosa, Salia digestiva, absorbentia acida, mucilaginosâ, gelatinosa, diluentia &c.
- 2 Diaphnoen promoventia: ♀ diaph. Bezoard. miner. Reg. ♀ Medicin. Aq. Galeg. Scorzon. Flor. Acac. Card. bened. Eff. alexiph. Mixt. simpl. &c.
- 3 Symptomata mitigantia. Vid. *Tab. seq.*

*Formula Remediorum.*

## 1 Potiuncula temperans.

Rx. Aq. Scabios.	Conch. ppt.
Galeg.	Nitr. Fiat. a. ʒss.
Scorzon.	Succ. citr. rec. ʒij.
C. C. citr. a. ʒj.	Sir. Cydon. ʒss. M.
Lap. ʒ.	D. cochleatim.

## 2 Pulvis temperans.

Rx. Nitr. depur.	Cinnab. ʒii. gr. 18. M.
Arcan. dupl.	Div. in 6. part. æq.
Conch. citrat. a. ʒij.	D. sing. 4. horis.

## 3 Potiuncula diaphoretico-temperans.

Rx. Aq. Ulmar.	Conch. ppt.
Fl. Acac.	Nitr. Fiat. a. ʒss.
Card. bened.	Cinnab. ʒii ʒj.
Scord. a. ʒj.	Sacch. perl. ʒij. M.
♂ diaph.	D. cochleatim.

## 4 Mixture alexipharmaca.

Rx. Eff. Pimpin. alb.	Vitrioli ʒss. M.
Scord. a. ʒss.	D. 25. gutt. mane & a meridie.
Spir. Tart. ʒj.	

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Quoniam Naturæ scopus est in hac Febre expellere materiam acrem corpori molestam, ideoque in ea respiciendum est partim ad materiæ correctionem & præparationem, partim ad ejus expulsionem per habitum corporis & Febris in justo ordine conservationem.
- 2 Quod hosce scopos concernit, si Febris excedit, ita



- ut exinde omnia symptomata augeantur, remedia Nitrosa parvis & repetitis dosibus exhibita, & cum absorbente quodam mixta, hic optimam ferunt opem.
- 3 Si vero motus febriles nimis debiles sint, adeoque metuendum sit, materiam pereos sufficienter expelli non posse, Essentia alexipharmaca, Tinctura Bezoardica prorsus non vel leniter tantum camphorata, aut bona Mixtura simplex aliquoties nimirum bis ter vel quater minori, aut etiam pro circumstantiarum ratione paulo majori, dosi exhibeatur. In subjectis Phlegmaticis Essentiæ alexipharmacæ addatur Liquor C. C. succinatus.
- 4 Temperandi fine conducunt præter supra dicta Nitrosa & absorbentia Emulsiones, Mucilagines, Gelatinæ, blanda acida &c. de quibus hinc inde jam dictum fuit.
- 5 Optimum est, si dictis remediis jungitur Antimonium diaphoreticum aut Bezoardicum minerale, hoc enim pacto excretio materiæ per habitum corporis promovetur. Huic scopo etiam Emulsiones ex Sem. Card. Mariæ cum Aquis diapnoicis paratæ inserviunt.
- 6 Regimen moderate diaphoreticum hic sæpius plus præstat quam reliqua remedia, quare illud studiose conservetur.
- 7 Si morbus hic sine Febre est, uti illud non raro contingit, & ægroti sunt orthostadii, sufficit defensio pectoris & abdominis a frigore & motus moderatus in loco temperate calido ad lenem sudorem usque.
- 8 Potus sufficiens inpr. calidus optime quoque promovet exanthematum excretionem, quare ægroti frequenter Infuso diluto Thee & Caffee aut alio simili ex radicibus & herbis nostratibus blande alexipharmacis utantur.
- 9 Si affectus hicce, uti id interdum contingit, frequenter affligit, instituantur præservationis gratia Venæsectiones & primæ viæ per blanda laxantia, inprimis vero per Mercurium dulcem, aut etiam per nodulos laxantes evacuentur.
- 10 Eadem quoque laxantia finito morbo præmissa Essentia alexipharmaca in usum trahantur.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Venæsectio & Purgantia hic ordinarie nullum habent usum, imo interdum mala habent consecutaria, quare non suadeantur, nisi certæ circumstantiæ eorum usum postulent: Purgantia tamen nunquam sint acra & stimulantia, sed potius blanda.
- 2 Si affectus hic epidemice affligit & malignitatem conjunctam habet, eo magis talia auxilia fugienda sunt.
- 3 Alexipharmaca calida sæpius morbum hunc, per se benignum, malignum reddunt, inpr. in subjectis Cholericis-Sanguineis, Plethoricis & Cacochymicis, quare iis moderata semper substituantur.
- 4 Aer frigidus quam maxime cavendus est, quoniam ejus admissionem exanthematum retrocessio & partium internarum afflictio sequitur.
- 5 In Diarrhœa huic morbo interdum superveniente vitentur & adstringentia & opiata, quoniam priora materiæ morbificæ excretionem, etsi alvum adstringant, impediunt, posteriora vero motus febriles summe necessarios cum damno sedant.
- 6 Uti modicus vini, tanquam analeptici, usus non in aliis tantum exanthematicis morbis sed & in hoc maxime conducit, ita abusus ejus propter ebullitiones sanguinis subsequentes & Febris ac eorum symptomatum augmentum summe noxius est.
- 7 In alvo laxanda aut aperienda Clysteres emollientes suo quidem non carent usu, stimulant tamen vitentur.
- 8 Emulsiones temperantes & leniter diapnoicæ hoc loco conducunt, exulent vero eæ, quæ ex seminibus vulgo sic dictis frigidis parantur, quoniam motus febriles nimium sedant & necessariam materiæ morbificæ excretionem impediunt.
- 9 In animi pathematibus mediocritas observetur, om-

nis enim in iisdem excessus noxius est.

- 10 Qui huic morbo assueti sunt, fugiant aerem nimis calidum & diætam lautam & aromaticam, quoniam talia morbum semel curatum denuo producant.
- 11 Si morbus hic originem traxit ab excretionibus sanguinis suppressis, Mensibus scil. & Hæmorrhoidibus, eæ in ordinem revocandæ sunt, vitentur tamen semper omnia, quæ quocunque modo ad ebullitiones sanguinis aliquid conferre possunt, quoniam talia suppressionem fluxuum consuetorum augent, & vel alios affectus graviores, vel Purpuram aut provocant aut augent.
- 12 In cura Purpuræ rubræ, quæ interdum Arthritidem vel affectus rheumaticos suppressos sequitur, cautissime procedendum est, hic enim si aliqualis committitur excessus, inprimis quoad remedia commoven-  
tia, graves sequuntur affectus.

## CAPUT XVIII.

D E

*Purpura alba sive maligna.*

- I. *Definitio.* **P**urpura alba est ut plurimum species Febris acutæ, continuæ & exanthematicæ species, in qua Natura motibus secretoriis & excretoriis auctioribus materiam malignam, in habitu corporis parvas pustulas limpidas semen milii magnitudine ordinarie similes formantem, expellere nititur.

II. *Differentia.*

- 1 A *Purpura rubra*: Vid. *Tab. præced.*  
2 A reliquis *Febribus exanthematicis*, respectu exanthematum variorum. Vid. *Tabulas anteced. & seq.*  
3 Ab aliis *excretionibus cutaneis*, respectu Febris, quæ in hisce vel nulla, vel benigna, in hac vero acuta & ordinarie maligna est.  
4 Ut plurimum quidem *Purpura alba maligna* est & nonnunquam epidemice quoque grassatur, interdum tamen benigna est.

III. *Signa.*

- 1 Incipit ordinarie uti *Purpura rubra* cum horrore leni.  
2 Quem excipit æstus mitis frequenter cum horrore alternans.  
3 Hisce jungitur insignis anxietas & angustia præcordiorum cardialgica.  
4 In subjectis sensibilibus angustia præcordiorum ita urgent, ut interdum *Lipothymia* superveniant.  
5 Virium quoque adest summa prostratio.  
6 Multi quoque de faucium ardore & dolore, oris siccitate & siti conqueruntur.  
7 Capitis quoque dolor affligit, quamvis non acutus, sed magis turbulentus sit.  
8 Agrypnia adest continua.  
9 Alvus ordinarie est adstricta.  
10 Pulsus est quidem celer, sed impeditius procedit, & est quasi oppressus.  
11 Tensionem etiam subcutaneam cum insigni pruritu & ardore sentiunt ægrotantes, ac pressionem in dorso.  
12 Quo cessante quarto die copiosa exanthemata rubicunda primo in collo, pectore & postea in reliquo corpore erumpunt: eruptio hæc interdum etiam die scil. septimo, imo undecimo, quod in aliquot junioribus observavi, contingit.  
13 Ex quibus deinde copiosissimæ pustulæ albæ, limpido humore repletæ, totam peripheriam corporis denso agmine tengentes exurgunt.  
14 Eruptionem nonnunquam præcedunt deliria, quæ prodeuntibus exanthematibus cessant.  
15 Elapsis aliquot diebus pustulæ in siccioribus exsiccantur & decidunt, in humidioribus vero ruptis vesiculis humor effluit, id quod jam Anno 1698. cum Febris



maligna petechizans in patria mea grassaretur, in non paucis præcipue in Chirurgo quodam observavi: hic Febre hacce maligna correptus in principio statim positive diaphoretica & Theriacalia sumserat: erumpebant hinc copiosissimæ pustulæ miliares, quæ ordinarias magnitudine longe superabant: post quatuor vel quinque dies rumpebantur omnes, ita ut tota corporis superficies erosa videretur, tandem sensim sensimque exsiccabantur & ita ægrotusevadebat.

16 Interdum tamen diu in superficie corporis hærent, quod in aliquot ægrotis observavi. Femina hujus loci triginta circiter annorum multa jam in puerperiis ob plethoram passa erat, quare in ultimo puerperio suadebam, ut cessante lochiorum fluxu venam pedis aperiri curaret, sed cum hocce consilium negligeret, in gravissimam & universalem incidebat Arthritidem: cum ad eam vocarer, Chirurgus jam instituerat Venæsectionem, a qua tamen prorsus nullum sentiebat levamen. Præscribebam E. temperantia ordinaria cum Cinnabarinis & diaphoreticis fixis, quibus vesperi anodyna jungebam, sed dolores nihilominus integrum octiduum eodem tenore continuabant: tandem sequebatur sudor continuus penetrantis admodum odoris & insignem in cute pruritum excitans, unde dolores imminuebantur: quietam hinc in lecto continentiam imperabam, sed ægrota odoris & pruritus pertæsa continuo indusia & lectum mutabat: prælagiebam malum eventum, sed surdæ narrabatur fabula. Tandem sudores subito cessabant, quorum suppressionem illico excipiebat horror & æstus insignis cum aliis symptomatibus febrilibus: tertio post horrorem die totum corpus maculis copiosissimis obsidebatur, ex quibus pustulæ parvæ limpidæ erumpebant, quæ in dies augmentum capiebant, ita ut in frontis superiore parte & artubus variolas magnitudine æquarent. Durabat hic status ad diem decimum quartum usque, ubi in pectore & collo exarescere incipiebant: tandem etiam eæ, quæ in manibus & pedibus erant, a decimo septimo usque ad vigesimum exarescebant. Latio hujus loci subito corripiebatur horrore, quem æstus insignis cum reliquis symptomatibus & insigni faucium inpr. in dextro latere inflammatione, ita ut fere suffocaretur, cum vocarer, Chirurgus jam venam secuerat in brachio, a qua ægrotus respectu inflammationis insigne sentiebat levamen, Febris tamen in eodem permanebat statu: Sequenti die dolor inflammatorius subito deserebat fauces & pectus ejusdem lateris cum summa ferocia occupabat. Consultebatur adhuc alius Medicus, qui me absente Venæsectionis repetitionem suadebat, a qua iterum ægrotus levamen quoddam percipiebat. Exhibebantur diaphoretica fixa cum temperantibus, absorbentibus & bezoardicis, unde dolor lateris punctioris ita imminuebatur, ut tertio die prorsus evanesceret, sed subito insignia tormina colica ægrotum affligebant, injiciebatur E. clyster emolliens & leniter carminativus, unde tormina quidem, cum alvus copiose quater vel quinquies aperiretur, cessabant, sed æger tota nocte erat admodum inquietus & de ardore & puncturis sub cute maxime conquerebatur. Vocabar E. summo mane & cum adhuc de eodem ardore conquereretur, accuratius cutim examinabam & totum corpus innumeris pustulis limpidis refertum deprehendebam. Certus igitur jam Febrem esse miliarum, præscripta remedia continuare, iisque Essentiam alexipharmacam cum Essentia dulci interponere jubebam. Erumpebant hinc magis magisque pustulæ & eandem ac in priori casu acquirebant magnitudinem. Elapsis aliquot diebus multæ in collo, pectore & reliquo corpore exarescebant, sed statim novæ succedebant, atque hæc post exarescentiam adhuc aliæ sequebantur, quare antea dictis remediis emulsio temperans ex Sem. Card. Mar. & amygdalis jungebatur. Tandem prætergresso secundo septenario sensim exarescebant & penitus cessabant. Eodem fere tempore puerpera patiebatur lochiorum suppressionem, quam Febris acuta immediate seque-

batur, Medicus consultus suaserat Purgans & Venæsectionem: cum vero eam postea negligeret, quarto morbi die vocatus diaphoretica & temperantia præscribebam quorum ope Febris sensim mitigabatur & prorsus cessabat: sed elapsis tribus aut quatuor diebus subito Pleuritide corripiebatur, quæ elapsis decem diebus pariter cessabat. Et cum omnia jam in vado esse viderentur, repente horrore & æstu alternante affligebatur, quoseffluxis aliquot diebus exanthemata miliaria copiosissima, quibushinc inde petechiæ interspersæ erant, excipiebant: suadebam E. quietam in lecto continentiam & remedia convenientia præscribebam. Quinto post eruptionem die ægrota lectum contra voluntatem meam mutabat, sed mox sequebatur exanthematum retrocessio, cum vero mox lecto traderetur & Mixtura ex Essentia alexipharmaca & dulci parvis & repetitis dosibus ei daretur, denuo erumpebant ac elapso die decimo quarto sensim sensimque cessabant. Eodem tempore lochia sed admodum fœrentia redibant, atque hoc modo ægra tot malis afflicta evadebat.

#### IV. Subj. Sum

- 1 Juniores præ adultioribus.
- 2 Homines temperamenti humidioris & porosi corporis habitus.
- 3 Feminae præ viris.
- 4 Puerperæ præcipue.
- 5 Si tamen epidemica est constitutio, nulli parci ætati temperamento & sexui, quod Anno 1698. in Patria & hic quoque præcedente autumno observavi.
- 6 Plethorici & Cacochymici.
- 7 Quibus sanguinis evacuationes naturales suppressæ sunt.
- 8 Evacuationes sanguinis artificiales negligentes.
- 9 Quibus sudores vel per imprudentem medicationem vel inconveniens regimen supprimuntur.
- 10 Quibus alexipharmaca nimis commoventia exhibentur.
- 11 Qui in morbis acutis, præcipue vero in Febribus catarrhalibus petechizantibus, nimis calido regimine tractantur.

#### V. Prognosis.

- 1 Purpura alba per se nunquam periculo caret, præprimis si constitutio est epidemica, & hinc sæpius plures jugulat.
- 2 Interdum tamen aliquo modo benigna observatur, præsertim quando tum temporis nullæ Febres malignæ grassantur.
- 3 Quo citius erumpit Purpura miliaris, eo majoris malignitatis indicium est & contra.
- 4 Purpura miliaris in qua exanthemata non confertim, sed successive & nimis languide erumpunt, aut ubi post casum priorum nova succedunt, semper pejoris est indolis.
- 5 Exanthemata modo erumpentia, modo iterum disparentia merito suspecta sunt.
- 6 Plenaria exanthematum in statu morbi retrocessio vel lethalis est, vel reliqua symptomata longe graviora reddit.
- 7 Si post exanthematum repulsum novam expulsionem symptomata inpr. deliria & præcordiorum anxietates non miriora redduntur, sed in eodem tenore perennant, res periculi plena est.
- 8 Eo gravius vero metuendum est periculum, si Petechiæ Purpuræ albæ statim in principio eruptionis junguntur.
- 9 Purpura alba lochiorum suppressionem excipiens semper pejor est quam reliqua.
- 10 Purpura alba subjecta Plethorica aut cacochymica corripens semper gravius affligit & majori periculo exponit ægrotantes.
- 11 Diarrhœa symptomata retrocessionem exanthematum facile post se trahit, & hinc merito suspecta est.

#### VI. Remedia.

- 1 Temperantia: Succiaciduli, Succ. citr. rec Rob. Ceraf. acid. Rib. Berb. Cydon. Cynosb. Sir. acetos. citr. Cydon. Gr. nat. Nitrosa, absorbentia, digestiva, Gelatinosa &c.



- 2 Diaphoresin promoventia: Aquæ diapnoicæ variæ, Tinct. Bezoardica, Essent. alexipharmaca ♂, alia fixa &c.
- 3 Analeptica: Aq. Rosar. Namph. Ceras. nigr. Cinnam. Cydon. Conf. de Hyacinth. Alkerm. Essent. dulc. Hal. Pulv. solares.
- 4 Alvum apertam servantia: Clysteres emollientes, potus sufficiens, Salia digestiva.

## Formula Remediorum.

## 1 Potiuncula alexipharmaca.

- Rx. Aq. Scord. ♂ diaph.  
 Scabios. Conch. ppt. ā ʒj.  
 Scorzon. Succ. citr. rec. ʒij.  
 Fl. acac. ā ʒj. Sir. Cydon. ʒss.  
 Mixt. simpl. ʒj. D. Cochleatim.

## 2 Alia analeptica &amp; alexipharmaca.

- Rx. Aq. Card. bened. Scord. ā ʒj.  
 Ulmar. Succ. Citr. rec. ʒiij.  
 C. C. citr. Conf. de Hyac. ʒiiss.  
 Cinnam. cyd. Sir. contraj. ʒvj. M.  
 Namph. ā ʒj. D. ut antea.

Ess. alexiph.

Reliquas formulas vide in Tab. anteced. &amp; seq.

## V. I. Meth. dus medendi.

- 1 Cum morbus hic, inpr. in constitutionibus epidemicis, ut plurimum p æcipitis sit eventus, ab initio statim ægrotis succurrendum est, & quidem per temperantia, absorbentia & diaphoretica fixa, ut hoc modo materia morbifica corrigatur & sensim sensimque ad peripheriam corporis expellatur.
- 2 Eruptionis tempore excretio promoveatur per Essentiam alexipharmacam Stahlī, quæ tempore matutino & pomeridiano extra exacerbationis tempus sive æstum febrilem moderatis dosibus ad guttas 25. 30. exhibeatur.
- 3 Tempore vero intermedio continuentur pulveres diaphoretici fixi & temperantes vel in juscule vel in Aquis diapnoicis dati, quæ & Febrem in debito vigore conservant & symptomata mitigant.
- 4 Toto hoc tempore regimen moderate calidum servetur, ut hoc modo materia morbifica continuo exhalare queat.
- 5 Si ægroti sunt admodum debiles reliquis remediis interponantur vel jungantur analeptica, Aqua Namph. Cinnamon. Cydon. Ess. dulc. Hal. Pulv. Solares &c.
- 6 Diaphoresin optime quoque promovent Infusa ex Radic. alexipharmacis temperatis & Herbis quibusdam parata & reliquis remediis interposita.
- 7 Cessantibus exanthematibus Essentia alexipharmaca cum reliquis remediis nihilominus continuentur, ut hoc modo omne noxium placide per diaphoresin evacuetur.
- 8 Finito morbo primæ viæ leniter laxante Mercuriali, Rhabarbaro aut Extracto Panchym. Crollii cum Pilulis Stahlianis mixto evacuentur.
- 9 Si alvus est nimium obstructa, aperiatur per Clysteres emollientes aut suppositoria, sine stimulo acri.
- 10 Si Diarrhœa jungitur Febri miliari, pulvis Chacarillæ ad gr. X. XII. exhibeatur.

## VIII. Cautela Præctica.

- 1 Venæsectio hic nullius est usus, nisi in subjectis eminenter Plethoricis in primo statim morbi principio & subjuncto regimine moderate diaphoretico instituitur.
- 2 Multo minus Purgantibus inprimis acrioribus locus concedendus est, quatenus Naturæ ordinem invertunt, & materiam excretioni per habitum corporis destinatam ad interiora cum damno derivant. Observatum hoc potissimum fuit Anno superiori Anno 1719. tempore æstivo, ubi non pauci hac Febre laborantes per Purgantia & Venæsectiones neci traditi fuerunt. Post talium enim usum exanthemata vel nimis tarde vel successive erumpebant, sed mox ad retrocessionem pronæ erant, aut actu retrocedebant: ægroti delirabant, admodum debiles

erant: alii de insigni anxietate præcordiorum quas in quibusdam Lipothymia in aliis Convulsiones & mors sequebantur. Femina hujus loci quinquaginta & aliquot annorum sub finem Mensis Augusti corripiebatur leni horrore, quem calor excipiebat cum symptomatibus febrilibus: quare eo ipso die Venam sibi secari curabat: sequenti die consultus præscriberebam Pulverem temperantem & diaphoreticum loco Purgantis remedii, quod desiderabat: sed nihilominus suasu muliercularum amicarum Potiunculam purgantem a Pharmacopœo acceptam assumebat, a qua pluries & in sequentem usque diem purgabatur: die tertio vocatus Essentiam alexipharmacam & Pulverem Chacarillæ præscriberebam: hinc alvus sistebatur quidem & sopor quo antea affecta erat imminebatur, sed nihilominus de insigni & continua anxietate conquerebatur: jubebam continuare Essentiam & potiunculam diapnoicam, sed sine successu, sopor enim elapsis aliquot diebus redibat & magis quam antea urgebat. Tandem die nono hinc inde in collo exanthemata, sed in parva quantitate erumpebant, in reliquo autem corpore nihil horum conspiciebatur: die decimo aliquoties Lipothymiis affligebatur, quas undecimo mors excipiebat. Alias observationes ab aliis mihi communicatas silentio prætereo.

- 3 Remedia alexipharmaca calidiora & regimen coactum hic maxime exulent, quia Febrem, anxietates & reliqua symptomata augent.
- 4 Abusus quoque temperantium & fixorum vitandus est, quoniam æstum quidem febrilem temperant, sed simul placidam excretionem retardant, quare alexipharmaca lenia ipsis semper interponantur. Ob abusum absorbentium & fixorum in aliquot subjectis post Febrem miliarem tumores pedum oedematosos, qui non nisi longo tempore curari poterant, observavi.
- 5 Nitri prudentem usum (singulis scilicet quatuor vel sex horis parcis, & repetitis dosibus exhibitum) commendat Stahlus in Præfat. ad Junckeri Tabulas.
- 6 Ipsa quoque gemmata inpr. in subjectis teneris & sensibilibus fugienda sunt, quoniam adstringunt & excretionem impediunt.
- 7 Si ullibi in hoc sane morbo blanda est continua transpiratione opus est, quare huic methodo continuo insistendum & a mutatione regiminis & medicamentorum abstinendum est.
- 8 Nunquam etiam remedia in copia ægrotis sunt exhibenda, quia vel exanthemata per ea nimis mature expelluntur, vel ordo naturalis & placida transpiratio impediuntur.
- 9 Potus sufficiens ad diluendum & temperandum sanguinem ac excretionem exanthematum promovendam summe quidem necessarius est, frigidus tamen fugiatur.

## CAPUT XIX.

## D E

## Febre Catarrhali maligna sive Petechizante.

I. *Definitio.* **F**ebbris Petechizans est species Febrium acutarum malignarum, in qua Natura ope motuum febrilium materiam quandam acrem in lympha spissiori hærentem & corpori summe infensam expellere nititur.

II. *Differentia.*

## 1 A Febre Catarrhali benigna.

- a Respectu causæ: quæ in benigna mitior, in hac vero longe acrior est.
- b Respectu symptomatum, quæ in benigna leviora, in maligna vero graviora sunt.
- c Respectu exitus: qui in maligna sæpius funestus, in benigna vero utpl. salutaris est.



2 A *Febre Petechiali*, *stricta* sic dicta. Vid. *Tab. seq.*

3 A *Purpura miliaris*, *Morbillis*, *Purpura urticata* &c. Vid. *Tab. præcedentes*.

### III. *Signa.*

1 Præcedit *Coryza* aut *Gravedo* cum stupore capitis.

2 Cui jungitur *tussis* lenis, cum oppressione aut lassitudine pectoris.

3 In nonnullis occurrit *tonsillarum* inflatio.

4 Si vero a contagio orta est *Febris* sine *Coryza* aut *Tussi* præcedente statim affligit.

5 Insignis quoque lassitudo & virium prostratio concurrit.

6 *Febris* invadit tempore autumnali circa *vesperam* hora quinta vel sexta cum horrore ad semihoram vel interdum integram quoque se extendente.

7 Quem excipit æstus satis gravis inpr. in subjectis *Plethoricis*.

8 Huic dolor capitis, sitis, anxietates, inquietudines *agrypnia* junguntur.

9 Accedit dolor tensivus in dorso, qui non raro etiam artus occupat; ordinarie tamen non nisi de insigni artuum debilitate conqueruntur ægrotantes, ita ut eos hinc inde movendo levamen quærant.

10 Sitis quæ hic occurrit, non est adeo intensa ac in aliis acutis, sed respectu earum satis moderata.

11 Continuat æstus hic eodem ordinarie tenore per totam noctem.

12 Sequenti vero die inpr. versus meridiem aliquo modo remittit.

13 Circa *vesperam* hora consueta denuo exacerbatur ac ordinaria symptomata denuo urgent, maxime vero anxietates & *agrypnia*.

14 Primis diebus finiente paroxysmo nullus observatur sudor uti in aliis, sed solum lenissimus odor.

15 Continuat hoc modo *Febris* cum suis symptomatibus & præcipue inappetentia & *agrypnia* usque ad finem primi septenarii, ubi sudores lenes post exacerbationem magis conspicui fiunt.

16 In aliis transpiratio quarto jam die augetur.

17 In aliis die septimo catarrhus aliquantulum immittitur, vel plane tollitur.

18 In nonnullis eodem tempore dolores tensivi dorsi & artuum augentur & postea *Petechiæ* efflorescunt.

19 In multis tamen legitimo modo sine calido regimine tractatis *Petechiæ* in conspectum non veniunt, & morbus sine illis successive solvitur.

20 Non pauci quoque ægrotantium *Diarrhœas* patiuntur, ad quas *Febris* hæc admodum prona est.

21 Si alvus est clausa facile superveniunt *Aphthæ*, *Angina* & *deliria*.

22 Nonnunquam etiam *Lipothymia* licet incompletæ, in subjectis præcipue sensibilibus, observantur.

### IV. *Subiectum.*

1 Respectu *temperamenti*; homines *temperamenti* humidioris sanguinei scil. & sanguineo phlegmatici.

2 Otiosi, *Plethorici* & qui ob malam *Diætam* corpora habent *Cacochymica*.

3 Sensibiles & animo trepido præditi.

4 Qui ad catarrhos alias proni sunt.

5 Excretiones naturales, inprimis vero sudores spontaneos, negligentes.

6 Contagio affecti.

### V. *Prognosis.*

1 *Febris* hæc pro diversa annorum & aeris constitutione respectu malignitatis differt, adeoque etiam majus vel minus periculum involvit.

2 Quando epidemice grassatur semper majori periculo exponit ægrotantes, quam si ex causis domesticis oritur.

3 Nunquam respectu malignitatis periculo caret, quando vero mitissimo modo tractatur illud periculum facile superatur.

4 Tota hæc *Febris* legitime procedens ad diem usque decimum quartum se extendit.

5 Interdum tamen propter commissos in medendo &

regimine errores ante septimum lethalis evadit, nonnunquam vero decimum quartum diem superat.

6 *Diarrhœa* in hisce *Febribus* semper melior est alvi adstrictione.

7 Si tamen excedit aut nimis diu durat, excretionem sudoris & macularum per habitum corporis turbat.

8 Præmatura *Petechiarum* eruptio majorem malignitatem & majus periculum portendit,

9 Quando autem secundo septenario erumpunt, melioris sunt spei.

10 Quo major *Petechiarum* adest copia, eo majus metuendum est periculum; levissimam enim causam earum retrocessio sequitur.

11 Quæ modo erumpunt, modo retrocedunt, pessimæ sunt indolis.

12 Quæ autem constanter in habitu corporis permanent, colore rubicundo aut roseo sunt præditæ, magis magisque pallidæ fiunt ac cum aliquali euphoria sensim disparent, salutarem eventum præstagiunt.

13 Quæ contrario modo se habent, coloris scil. sunt obscuri & lividi, ac facile retrocedunt, aut disparentes ægrotum non sublevant, pessimi sunt omnis.

14 Si cum *Petechiis* *Purpura miliaris* alba simul & præmature, tertio scil. vel quarto die, erumpit, res pariter periculi est plena.

15 Tolerabilior vero est status, si *Purpura miliaris* maculis succedit aut præsentibus jam *Petechiis* erumpit.

16 Si disparentibus *Petechiis* ægrotantes nullum sentiunt levamen, facile *Purpura miliaris* corripitur.

17 *Aphthæ* huic *Febri* supervenientes ut plurimum lethalem post se trahunt exitum.

18 *Angina* *Petechiis* juncta vel accedens brevi mortem infert.

19 *Lipothymia* frequentius affligentes ordinarie admodum periculosæ sunt.

20 Sudores præmature erumpentes placidum morbi cursum turbant, & facile in nimios, ægrotos maxime debilitantes, degenerant.

21 Longe autem meliores sunt, qui quarto aut septimo die placide erumpunt post exacerbationes, sive sub finem paroxysmi.

22 *Hæmorrhagias* quoquo tempore contingentes melius est non fieri, quam fieri; imo largiter recurrentes, alio præsertim ficiore, it. *Deliria* & *Aphthas* post se trahentes, plerumque lethales sunt: diuturnioribus vero deliriis tandem supervenientes, illaque sublevantes, tolerabiliores existunt.

23 *Deliria* post primum septenarium semper pejoris sunt indolis, quam quæ ante eum occurrunt.

### VI. *Remedia.*

1 Materia malignam corrigentia & *Febrem* temperantia: *Conch.* citrat. aliaque absorbentia, acido quodam saturata, uti *Mat. Perl.* *Lap. ꝑ* &c. *Nitr.* depur. regenerat. *Stiat.* *Salia digestiva*: *Tart.* *Vitr.* *Arcan. duplic.* *Acida*: *Succ. citr. rec.* *Sir. acetos.* *Citr.* *Rob.* *Rib.* *Berb.* *Tinct.* *Rosar.* *Decoct.* *C. C.* & *Scorzon. citrat.* *Potus sufficiens*, *Emulsiones*.

2 Materiam correctam blande per diuresin & diaphoresin evacuantia: Absorbentia cum acidis maritata & diaphor. *Bezoard. miner.* *Reg.* & *Medic.* *Pulvis Bezoard.* *Hal. Ess. alexiph.* *Stahlii*, *Scordii*, *Mixt. simplex*, *Tinct. Bezoard.*

3 Vires conservantia: *Gelatinosa*, *Mucilaginoso*, *juscula carni*, *Emulsiones* cum *Aquis analeptics* paratæ, *Pulveres Solares Richteri.* *Essent. dulc. concentr.* & ordinaria *Hal.*

4 Symptomata urgentia mitigantia: *Camphorata*, *Nitrosa*, *Absorbentia acido saturata*, *CrySTALL. mont.* aliaque antea recensita.

### *Formula Remediorum.*

1 Potiuncula temperans.

R. *Aq. Scorzon.*

*C. C. citr.* & *℞iss.*

*Galeg.*

*Conch. citr.*

*Nitr.*



*Nitr. depur.* *Sir. acetos. citr. ʒss. M.*  
*Tart. Vitr. ʒ. ʒss.* *D. sing. 2. vel 3. horis cochl.*  
*Cinnab. ʒiij.* *aliquot.*

2 Alia temperans & diaphoretica.

*R. Aqu. Fl. Acac.* *Reg. ʒ Medic. gr. XV.*  
*Rub. Id. ʒ. ʒij.* *Succ. citr. rec. ʒij.*

*Lap. ʒ.* *Sir. contraj. rec. ʒss. M.*

*Bezoard. min.* *D. ut antea.*

*Nitr. regener. ʒ. ʒss.*

3 Alia analeptica & alexipharmaca.

*R. Aqu. Galeg. ʒij.* *Succ. citr. rec. ʒss.*

*Namph.* *Julep. gemmat. ʒss.*

*Cinnam. cyd. an. ʒvj.* *D. sing. 4. 5. 6. horis aliquot*

*Eff. alexiph. ʒij.* *cochlearia.*

4 Mixture alexipharmaca.

*R. Eff. alexiph.* *D. mane gutt. 2 ʒ. 30.*

*Scord. an. ʒij.*

5 Alia alexipharmaca & confortans.

*R. Eff. alexiph.* *dulc. ʒj. M.*

*Scord. an. ʒss.* *D. ut antea.*

6 Emulsio temperans & analeptica.

*R. Sem. Card. Mar.* *F. l. a. Emulsio.*

*bened.* *Colat. adde*

*Citr. an. ʒij.* *ʒ diaph.*

*Aq. Galeg.* *Matr. perl. an. ʒij.*

*Rosar.* *Sacc. perl. ʒss. M.*

*Scorzon. an. ʒss.* *D. cochleatim.*

*Cinnam. ʒj.*

7 Species pro Infuso Theiformi.

*R. Rad. Pimp. alb.* *Scabios.*

*Vincetox.* *Hyssop.*

*Imperat. an. ʒij.* *Bedid. an. m. j. M.*

*Ari ʒss.* *Incis. infund. in Aq. s. fer-*

*Herb. Scord.* *vent. & bulliant leniter.*

8 Species pro potu.

*R. Raf. C. C.* *Colat. adde*

*Rad. Scorzon. an. ʒij. M.* *Succ. citr. rec. q. s. ad*

*Coq. in Aq. simpl.* *gratam aciditatem.*

stallus montana parvis & sæpius repetitis dosibus usum trahantur.

10 Quando dolores capitis & vigilæ nimium urgent, externæ convenit primo Spir. Vini camphoratus, postea vero Unguent. Alabastr. quod dolores optime lenit. Vid. *Stablii Opusc. p. 617.*

11 Si Hæmorrhagia narium Febri huic jungitur, insistendum est temperantibus & nitrosis, paulo majori dosi exhibitis.

12 In Deliriis & Lipothymiis in usum trahantur partim Emulsiones, temperantia & Nitrosa, partim vero analeptica, inpr. Eff. dulc. Hal. tam ordinaria quam concentrata.

13 Si Aphthæ & inflammatio faucium supervenit, opem optime ferunt Gargarismata subadstringentia.

14 In Tussi catarrhali, quæ sæpius huic morbo jungitur, exhibeantur sæpius Infusa Theiformia, hæc enim non saltem materiæ excretionem, sed & diapnoen promovent.

#### VIII. *Cautele Prætiqæ.*

1 Si ullibi in hac sane Febre lenissime & cautissime procedendum est, omnia enim commoventia eam pejorem & ordinarie funestam reddunt.

2 Exulent hinc Purgantia & Emetica, quicquid etiam alii de virtute Ipecacuanhæ alexipharmaca proferant.

3 Absit quoque Venæsectio, utpote quæ ordinarie circa dies criticos incompleta molimina hæmorrhagica sive congestiones ad caput & inde pendentia deliria cum Aphthis & faucium inflammatione post se trahit. Si vero subjecta sunt eminenter plethorica, in principio instituitur, sed regimen diapnoicum continuum statim subjungatur.

4 Nullus quoque locus sit alexipharmacis calidioribus, utpote quæ Massam Sanguinis nimium commovent & gravia mala post se trahunt.

5 Insignia quoque damna infert regimen positive sudoriferum, Massam humorum nimium commovendo, quare fugiendum est.

6 Pulveres Bezoardici, inpr. quos multa adstringentia pro alexipharmacis falso habita, ingrediuntur, ut Pulv. Pannon. hic nullam habent utilitatem, quoniam placidam excretionem magis impediunt, quam promovent.

7 Omne frigus actuale nocet & diapnoen tollit, quare ægroti a potu frigido & omni refrigeratione abstineant, bibant potius tepide & placidæ diaphoresi indulgeant.

8 Quieta in lecto continentia optime hanc excretionem promovet, iestigationes vero frequentes eam impediunt, quare fugiantur.

9 Præsentē Diarrhœa nunquam præscribantur opiata & adstringentia, alvi enim adstrictionem ordinarie sequuntur Aphthæ & Inflammationes faucium funestæ.

10 In Agrypnia opiata & narcotica nunquam in usum trahantur, quoniam diapnoen magis tollunt, quam promovent.

11 Si Petechiæ erumpunt, Emulsiones temperantes potius, quam fortiora alexipharmaca, in usum trahantur.

12 Cum Febres tales recidivæ maxime obnoxie sint, finito morbo Essentia alexipharmaca adhuc aliquandiu continuetur, ut hoc modo omne noxium e corpore expellatur.

#### CAPUT VIGESIMUM.

##### DE

##### Febre Petechiali.

I. *Definitio.* **F**ebbris Petechialis est species Febrium extreme acutarum, contagiosarum & malignarum, in qua Natura miasmata maligna, maculas in habitu corporis pulicum moribus similes formantia, e Massa sanguinea separare & per peripheriam corporis expellere nititur.

II *Dis-*

#### VII. *Methodus medendi.*

1 In Cura hujus Febris partim ad Febrem ipsam, partim ad conjunctum catharrum acrem & falsum respiciendum est: & cum causa morbifica sit admodum acris, phlegmati immerfa, temperanda & involvenda, phlegma vero resolvendum & abstergendum est, ne in partibus solidis labes excitetur.

2 Hisce scopis inserviunt remedia antea allegata, inpr. vero Essentiæ alexipharmacæ aut Tincturæ Bezoardicæ moderate vel profus non camphorata, quæ phlegma tenue & falsum ad peripheriam corporis leniter pellunt: exhibeantur autem tempore matutino in moderata dosi.

3 Postea ad temperandam materiam acrem Potiunculae aut Pulveres temperantes leniterque diaphoretici, ex absorbentibus, Nitrosis & antimonialibus fixis parati propinentur, ut hoc modo placida diapnoe & materiæ successiva excretio promoveatur.

4 Eadem quoque inserviunt placidæ Febris promotioni & ejus excessum præcavent, si ante exacerbationem & in illa exhibentur.

5 Eo certius autem dictum effectum præstant, si illis Emulsiones & in subjectis sanguineis & activis blanda acida interponuntur vel junguntur, qualia sunt potissimum Succus Citri recens, Julapiis, Potiunculis & potui ordinario admixtus.

6 Si Petechiæ erumpunt, continentur Emulsiones temperantes & diapnoicæ cum mucilaginosi & Gelatinosi. Cremore Hordei, Gelatina C. C. &c. ut hoc modo materia morbifica magis temperetur, involvatur & leniter expellatur.

7 Hæc autem methodus, exhibendo scil. mane Essentiam alexipharmacam, postea vero in exacerbatione & extra illam diaphoretica fixa cum temperantibus, per totum morbi cursum servetur.

8 In adstrictione alvi exhibeatur potus sufficiens cum nitrosis & Clysteres lenientes injiciantur, aut detur Elixir Polychrestum Hal. juxta methodum in D. Richter's Tractatu præscriptam.

9 Si vero Diarrhœa accedit, eadem Nitrosa & Cry-



II. *Differentia.*1 A *Febre Petechizante.*

- a Respectu gradus: malignitas enim in Petechiali stricte sic dicta major est, quam in Petechizante.
  - b Respectu eruptionis Petechiarum: quæ in Petechiali mature, & sæpius in principio primo ante quartum & septimum diem, in Petechizante vero legitime tractata tardius vel prorsus non erumpunt.
  - c Respectu periculi: quod in Petechiali longe majus, quam in Petechizante est.
- 2 A *Purpura miliaris* differt respectu exanthematum, quæ in hac peripheriam corporis superant, in Petechiali vero profundius in cute hærent.
  - 3 A *Peste.*
    - a Respectu gradus malignitatis, in quo Pestis Petechialem Febrem longe superat.
    - b Respectu exanthematum: in Peste enim ordinarie Bubones & Carbunculi, in Petechiali vero macule sive Petechiæ erumpunt.
    - c Respectu periculi; Pestis enim ordinarie magis funesta est, quam Febris Petechialis.
    - d Respectu grassationis: quatenus Pestis longe plures, quam Petechialis Febris corripit.
  - 4 Febris ipsa Petechialis differt quoque gradibus, interdum enim magis, interdum vero minus periculosa est, respectu scil. locorum & anni temporum.

III. *Signa.*

- 1 Præcedit lassitudo corporis & artuum.
- 2 Cui jungitur stupor & gravitas capitis cum tensione dolorifica dorsi.
- 3 Invadit vero ipsa Febris tempore vespertino cum leni horrore.
- 4 Quem excipit æstus modo mitior, modo gravior.
- 5 Adest statim insignis virium prostratio.
- 6 Anxietates præcordiales insignes concurrunt, quæ sæpius adeo invalescunt, uti ægroti, quo se verterant, nesciant.
- 7 Dolor capitis interdum insigniter etiam urget.
- 8 Jungitur sitis cum insigni inquietudine.
- 9 Sæpius conqueruntur de ardore & dolore faucium ægrotantes.
- 10 Quem non raro excipit actualis faucium inflammatio cum Aphthis.
- 11 In non paucis urgent quoque Lipothymix & quidem modo in principio morbi, modo in ejus incremento.
- 12 Ut plurimum delirant ægrotantes.
- 13 Quæ tamen deliria pro temperamentorum diversitate diversa sunt.
- 14 Interdum ægroti quidem non delirant, adest tamen irrationalis animi abjectio & continuus mortis metus.
- 15 Pulsus ordinarie quidem est frequens & celer, sed justo debiliior & in multis inæqualis.
- 16 Respiratio, etiam non concurrente plethora, in multis est admodum laboriosa.
- 17 Urina rarius sanorum Urinæ est similis, utpl. vero rubello colore tincta.
- 18 In multis etiam observantur subsultus tendinum & actuales motus convulsivi.
- 19 Et talia symptomata sæpius in malo, graviore sub initium & in incremento observantur.
- 20 Tandem circa diem quartum aut septimum, raro serius, post varias magis vel minus sensibiles tractiones & tensiones in dorso erumpunt Petechiæ, pectore, collo, reliquisque partibus, excepta facie.
- 21 In malo tamen graviore Petechiæ in principio statim morbi prodeunt.
- 22 Imo vidimus Petechias in orthostadiis & de nulla re conquerentibus eripuisse. Ante septemdecim annos cum plures hic loci a Petechiis morerentur, amicum hoc morbo laborantem visitaturus alium in platea offendebam: & cum de amico ægroto sermones misceremus, observabam in commilitonis mei collo plures Petechias, quas etiam in brachiis deprehendebam: & cum ex eo quærerem, quid sibi

velint hæ maculæ? eas reliquias morsuum pulicum esse respondebat. Discedenti a me alii eandem quæstionem movebant, sed risu, cum de Petechiis mentionem facerent, eosdem excipiebat, Domum rediens matri, quid secum actum esset, narrabat: mater perterrita Medicum vocabat; hic Petechias statim cognoscens, prudentia tamen (cum æger se prorsus nihil incommodi sentire, constanter affirmaret,) utens nullam, ne terrorem ægrotanti incuteret, de Petechiis mentionem faciebat, Potiunculam tamen diaphoreticam præscribebat, acut lecto se traderet, suadebat; versus vesperam Febris invadebat cum gravissimis anxietatibus, deliriis, lipothymiis &c. & quarto die moriebatur. Ante duodecim & quod excurrit annos cum itidem Febris Petechialis hic grassaretur, visitabam inter alios virum hac Febre laborantem, qui etsi totus quasi conspersus esset maculis, lectum nunquam petebat, sed semper in hypocausto obambulabat. Uxor ejus elapsis aliquot diebus, cum lotium tempore matutino, uti hic moris est, afferret, & statum mariti referret, plures jam in collo & pectore habebat Petechias obscure rubicundas, sed de nullo prorsus incommodo conquerebatur. Discedens a me forum, aliquid emptura, petebat: & cum interim maritum visitarem, femina rediens mihi & marito referebat, quasdam feminas ipsi, se Petechias in collo habere dixisse. Suadebam ut aliquot cochlearia Potiunculæ diaphoreticæ marito præscriptæ assumeret, sed consilium hocce, quia se nihil incommodi sentire objiciebat, respuebat. Versus vesperam subito Febris invadebat cum gravibus deliriis; sequenti die abortum octavo graviditatis mense patiebatur: fœtus mortuus copiosas in habitu corporis habebat petechias. Deliria continuabant & tertio die moriebatur, maritus vero evadebat. Alia multa exempla silentio prætereo.

- 23 Petechiæ hæ sunt utpl. coloris rosei aut purpurei, interdum vero etiam sunt obscure rubicundæ.
- 24 Subsistunt hæ maculæ pro temperamentorum diversitate & morbi indole modo diutius in peripheria corporis modo brevius.
- 25 Morbo legitime procedente indies magis magisque pallidæ fiunt & tandem evanescunt.

IV. *Subjectum.*

- 1 Quando epidemice grassatur, nulli parcat ætati, sexui & temperamento.
- 2 Frequentius tamen affligit adolescentes, juvenes & homines mediæ ætatis, florido corporis habitu præditos & Plethoricos.
- 3 Adstantibus tamen etiam facile per contagium communicatur.
- 4 Facilius quoque eadem corripiuntur, qui Diæta calida & vinosa abutuntur.
- 5 Alexipharmacis calidis & volatilibus in morbis acutis.

V. *Prognosis.*

- 1 Febris Petechialis est morbus gravissimus & sæpe instar Pestis brevi tempore e medio tollit, quod hic sæpius experti fuimus.
- 2 Nonnunquam tamen si mitior est ad plures dies se extendit, & non raro secundum septenarium superat.
- 3 Semper tamen admodum maligna est, & ei nunquam fidendum, quoniam sæpius ex improvise homines jugulat.
- 4 Interdum mitiori modo incedit sine gravioribus symptomatibus, excepta insigni virium prostratione, ita ut hinc etiam aliquo modo negligitur, sed postea præter opinionem incrementa utpl. funesta sumit, quod sæpius observatum fuit.
- 5 Quo magis vires in hac Febre sunt prostratæ, eo majus metuendum est periculum.
- 6 Irrationalis animi abjectio, & constans mortis metus, sæpius est funestum præsagium.
- 7 Quo magis animi anxietates urgent, eo major est de interna læsione & funesti exitus suspicio.
- 8 Ictigationes continuæ in lecto, situs mutationes &



& denundationes pariter malum præbent præfagium. Ardor & dolor faucium cum insequente inflammatione & Aphthis fere semper lethalia sunt signa. Quo gravius affligunt Lipothymia in Febre Petechiali, eo gravius subest periculum. Deliria etsi non semper sint funesta, admodum tamen sunt mala, si ægroti continuo delirant, ita ut ad se non redeant.

Respiratio laboriosa in hac Febre cum gravibus anxietatibus sine concurrente Plethora, semper pessima est, utpl. enim Ventriculi & diaphragmatis incipiens subest inflammatio.

Pulsus debilis & intermittens aut inæqualis pessimum præbet omen.

Pariter mali est ominis sitis defectus.

Oblivio & omnium rerum negligentia infaustum portendunt exitum.

Alvi laxitas temper melior est ejusdem adstrictione, quia hæc inflammationem faucium & Aphthas facile post se trahit.

E contra vero largum Urinæ profluvium interdum satis periculosum observatum fuit. Vid. *Hist. morb. Urat. slav.*

Subsultus tendinum & motus convulsivi semper sunt mali, peioris tamen sunt illi, qui in statu & declinatione occurrunt quam qui in incremento ante Petechiarum eruptionem observantur.

Quo magis in principio urgent gravia symptomata, præprimis magna & præceps virium prostratio, Lipothymia, animi abjectio, sitis & dolorum inadvertentia, mentis vacillatio &c. eo peior est status.

Petechiæ nimis copiose & præmature erumpentes semper majorem indicant malignitatem.

Imo, si instabiles sunt aut inconstantes, ita ut mox appareant, modo dispereant, si non funestum, maxime tamen periculosum portendunt exitum.

Color Petechiarum roseus & floridus semper est optimus, quamvis morbus nihilominus maneat summe periculosus: calor autem earum obscure rubicundus, lividus & niger pessimus est.

Rigor aut saltem peripheriæ corporis, præsentibus jam Petechiis, constrictio pessima est; macularum enim retrocessio, Convulsiones & mors facile eam sequuntur.

Singultus in principio & statu morbi utpl. funestus est.

Coma cum frigore extremorum & stertore, hiante ore, lethale.

Tumores capitis & artuum in his Febribus pessimi sunt. *Hist. Morb. Urat. l. c.*

Remedia.

1 Febris debitum progressum conservantia: uti sunt absorbentia, Nitrosa, Salia digestiva, Gialia fixa, temperantia acidula, Emulsiva &c.

2 Blandam diapnoen excitantia: Antimon. diaphoret. Bezoard. minerale; Reg. & ii Medicin. Essent. alexiph. Scord. Pimpinell. alb. Tinct. Bezoar. Mixt. simpl. Extract. Chacarill.

3 Symptomatibus prospicientia: Analeptica, Camphorata, Clysteres &c.

#### Formula Remediorum.

1 Pulvis temperans & diaphoreticus.

R.  $\delta$  diaph. Divid. in 9. p. æq.  
Conch. citrat. D. sing. 4. horis.  
Nitr. depur. a.  $\mathfrak{z}$ j. M.

2 Potiuncula diaphoretica.

R. Ag. Galeg. Nitr.  $\mathfrak{z}$ iat. a.  $\mathfrak{z}$ j.  
Scorzon. Cinnab.  $\mathfrak{z}$ ii  $\mathfrak{z}$ ls.  
C.C. citr. a.  $\mathfrak{z}$ ls. Extr. Chacarill. gr. vj.  
Bezoard. min. Sir. contraj.  $\mathfrak{z}$ ls. M.  
Matr. perl. D. sing. 3. horis cochl. aliquot.  
Tart. Vitr.

3 Alia.

R. Aqu. Card. bened. Lap.  $\mathfrak{z}$ .  
Flor. Acac. a.  $\mathfrak{z}$ ij. Nitr. depur. a.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\delta$  diaph. Ess. alexiph.  $\mathfrak{z}$ ij.

Succ. citr. rec.  $\mathfrak{z}$ ij. D. ut antea.

Sir. acet. citr.  $\mathfrak{z}$ ls. M.

4 Alia.

R. Aqu. Scord. Matr. perl. a.  $\mathfrak{z}$ ij.  
Rub. Id. a.  $\mathfrak{z}$ ij. Mixt. simpl.  $\mathfrak{z}$ ls.  
Prophylact. Sylv. Sir. Ceras. acid.  $\mathfrak{z}$ ls. M.  
 $\mathfrak{z}$ j. D. ut antea,  
 $\delta$  diaph.

5 Julepus analepticus.

R. Aqu. Scabios. Rob. Cydon.  
Fl. acac. Ceras. acid.  
Galeg. Rib. a.  $\mathfrak{z}$ ls.  
Rosar. Sir. acetos. citr.  $\mathfrak{z}$ ls. M.  
Cinnam. cyd. a.  $\mathfrak{z}$ ij. D. sæpius cochleatim.  
Succ. citr. rec.

6 Mixtura diapnoico-confortans.

R. Essent. Scord. Dulc. a.  $\mathfrak{z}$ j.  
Pimpin. alb. D. gutt. 25. pro dosi.

7 Alia diapnoica.

R. Tinct. Bezoard. Mich. D. ut antea.  
Ess. Scord. a.  $\mathfrak{z}$ j. M.

8 Essentia confortans.

R. Ess. dulc. concentr.  $\mathfrak{z}$ j. D. gutt. vj. sæpius.

#### VII. Methodus Medendi.

1 Cum morbus hic sit admodum malignus & homines cito jugulet, ab initio statim exhibeantur tempore matutino blanda alexipharmaca, qualia sunt Essentia alexipharmaca Stahlia, Mixtura simplex &c. ut hoc modo blanda diapnoe excitetur, ac miasmata maligna successive e corpore expellantur.

2 Hisce subjungantur diaphoretica fixa, absorbentia & nitrosa, partim ut placida diapnoe promoveatur, partim ut nimius æstus temperetur, & excessus Febris ac nimia sanguinis resolutio præcaveantur.

3 Eidem fini inserviunt lenia acida, & quidem præcipue succus Citri recens, & liquis remediis vel juncta vel interposita, utpote quæ & æstum temperant & admodum refocillant.

4 Circa vesperam tempore exacerbationis eadem remedia, diaphoretica scil. fixa & temperantia exhibeantur & per noctem continentur matutino vero tempore detur iterum Essentia alexipharmaca, vel sola, vel cum Essentia Scordii, Pimpinellæ albæ Essentia dulci &c. remixta.

5 Hæc methodus continuetur per totum morbi cursum ut ope prædictorum remediorum maligna materia temperetur.

6 Quod symptomata urgentia concernit, ea juxta methodum in præcedente Tabula præscriptam tractantur.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1 Omnia remedia commoventia in hac Febre, ut in præcedente nullius sunt usus & magna post se trahunt incommoda, quare fugiantur.

2 Venæsectio non instituatur nisi in summe Plethoricis & in principio morbi ac subjungantur statim regimen diaphoreticum continuatum, nimius tamen calor vitetur.

3 Cum adstrictio alvi magna pariat incommoda & impr. congestiones ad caput, alvus per potum sufficientem, Nitrosa, Mucilaginoso, Gelatinosa & Clysteres emollientes continuo aperta serverur: laxantia autem, multo minus Purgantia acria, non facile in usum trahantur.

4 Animi tranquillitas & quies in lecto multum ad felicem morbi exitum contribuunt, jectigationes vero placidam excretionem turbant, quare quies corporis & animi semper suadenda est.

5 Medicus nunquam fidat huic Febri, etsi mitissima videatur, subito enim sæpius ægrotos jugulat: quare medicus semper caute procedat & Methodo Medendi præscriptæ semper insistat.

6 Reliquas Cautelas Vid. Tab. præced.



## CAPUT VIGESIMUM PRIMUM.

D E

## Febre Dysenterica.

S I V E

## Dysenteria cum Febre acuta.

- I. *Definitio.* **F**ebbris Dysenterica est species Febrium acutarum, malignarum contagiosarum & symptomaticarum, sæpius cum inflammatione intestinorum tenuium, & dejectionibus cruentis conjuncta, in qua Natura miasmata maligna, vel per contagium corpori communicata, vel in eodem ex assumptis generata, per intestina expellere nititur.
- II. *Differentia.*
- 1 A *Dysenteria benigna*: in hac enim motus quidam febriles frequentes observantur: in Dysenteria vero de qua hic sermo est Febris acuta semper affligit.
  - 2 A *reliquis alvi excretionibus*: Vjd. *Tab. de Dysenteria*.
  - 3 Hæc ipsa Dysenteria cum Febre acuta differt.
    - a Respectu gradus: alia enim est *mitior*, alia *gravior*.
    - b Respectu *Febris conjunctæ*, quæ in aliis est *lenis*, in aliis vero maxime urget.
    - c Respectu *grassationis*, alia est *epidemica*, alia vero *sporadica*.
    - d Respectu *exitus*, alia est simpliciter *lethalis*, quæ scil. graviolem conjunctam habet intestinorum inflammationem: alia *periculosa*, ubi mitior est inflammatio.
- III. *Signa.*
- 1 Invadit ordinarie cum horrore, aut saltem horripilatione.
  - 2 Quem excipit æstus satis gravis & sitis.
  - 3 Æstus tamen hic interiora magis affligit, quam exteriora.
  - 4 Huic junguntur tormina abdomini exquisita.
  - 5 Sequuntur dejectiones crebræ, ab initio mucosæ, postea vero striis sanguineis interstinctæ.
  - 6 Imò nonnunquam excrementa tota sunt cruenta, ita ut sanguis purus excernatur.
  - 7 Concurrit etiam Tenesmus gravissime affligens & continuo ad assidendum stimulan.
  - 8 Parum tamen est quod magno labore excernitur.
  - 9 Nonnunquam etiam ubi Tenesmus nimium urget, ani sequitur procidentia.
  - 10 Sub hisce ipsis symptomatibus, imò ut plurimum ab initio statim vires maxime prosteruntur.
  - 11 Appetitus quoque est insigniter læsus.
  - 12 Agrypnia propter dolores & dejectiones crebriores continuo urget.
  - 13 Interdum & Vomitus in principio urget, ita quidem ut quidam sanguinem etiam rejiciant.
  - 14 Multos vero insignis præcordiorum anxietas affligit.
  - 15 Quæ interdum adeo urgent, ut Singultus & Convulsiones superveniant.
  - 16 In aliis observantur Lipothymia frequentes.
  - 17 Lingua ordinarie muco albo viscido est obducta.
  - 18 In aliis vero est sicca, obscure rubicunda & nigra.
  - 19 Nonnunquam lingua fissuras patitur.
  - 20 Non raro quoque Aphthæ linguam & fauces obsident.
  - 21 Interdum etiam Petechiæ in cute erumpunt: observavi hoc ante sexdecim annos in virgine quadam quæ subito Mense Augusto gravissima Febre cum Dysenteria corripiebatur: superveniebant petechiæ & ægrota gravibus symptomatibus spatio aliquot dierum affligebatur: sed nihilominus post usum con-

venientium remedium elapso decimo quarto die evadebat.

- 22 Post sectionem cadaverum intestina deprehenduntur inflammata & sphacelata. B. D. Flach mihi retulit, se ultra ducentos, cum ante triginta & quod excurrit annos, cum Dysenteria in castris Gallicis epidemice grassaretur, aperuisse & in omnibus intestina inflammata deprehendisse.

- 23 Imò in quibusdam apostemata & ulcera in intestinis post mortem reperta fuere.

IV. *Subjectum.*

- 1 Hæc Febris ordinarie epidemice grassatur & hinc nullis parit subjectis.
- 2 Facilius tamen corpora plethorica & cacochymica eandem incurrunt.
- 3 Cholericis & Sanguinei præ ceteris facilius per contagium hac Febre corripiuntur.

V. *Prognosis.*

- 1 Plethorici & Cacochymici semper gravius malo hocce laborant quam reliqui.
- 2 Eodem modo res se habet in Cholericis & Sanguineis.
- 3 Viri semper gravius affliguntur hac Febre quam Feminae.
- 4 Senes & pueri ægerrime fuerunt hunc morbum.
- 5 Febris hæc nunquam non admodum periculosa est. & plures sæpius neci cito tradit.
- 6 Quo magis epidemice grassatur, eo malignior & periculosior est.
- 7 Quo graviora sunt tormina cum æstu febrili, eo major inflammationis præsentis metus est.
- 8 Si tormina maxime urgentia subito cessant, manentibus nihilominus reliquis symptomatibus graviorebus, actum est de ægroto, indicat enim Inflammationem in Sphacelum degenerasse.
- 9 Idem sentiendum est si æstus circa interiora maxime urget, habitus vero corporis horrore sæpius percellitur aut actu frigidus est.
- 10 Dejectiones mere sanguineæ, ita ut sanguis sincerus excernatur, utpl. lethales sunt, quod in non paucis An. 1707. observavimus.
- 11 Eo gravius vero est periculum, si cum talibus dejectionibus frigus extremorum conjungitur.
- 12 Si Carunculæ cum materia fœtida excernuntur, lethalis est status.
- 13 Nimia simultaneæ & graves virium suppressiones, semper mali sunt ominis.
- 14 Eo gravius vero est periculum si Lipothymia frequentius affligunt.
- 15 Quo magis urget ardor & ariditas faucium, eo magis metuende sunt Aphthæ maxime perniciosæ.
- 16 Lingua arida, obscure rubicunda, aut nigra actu munda pessimum præbet indicium.
- 17 Singultus & Convulsiones huic morbo supervenientes pessimum indicant statum.
- 18 Si potulenta cum sonitu & strepitu, ita ut ab adstantibus audiri possit, descendunt, signum ut plurimum funestum est.
- 19 Pessimus quoque est status, si Petechiæ huic morbo junguntur, plerumque enim exinde ægroti cito moriuntur.
- 20 Vomitus cum insignibus anxietatibus cardialgicis in statu hujus morbi malus, cruentus vero pessimus est.

VI. *Remedia.*

- 1 Materiam malignam corrigentia & evacuantia: Absorbentia & inpr. Crystall. mont. Rhabarbaro mixta, Pilulæ Stahlianæ, Magnes. alb.
- 2 Febri prospicientia: ☿ diaphoret. Bezoard. miner temperantia, absorbentia. Lapid. Cancr. Conch præp. Nitr. depur. Essent. alexipharm. Pimpin. alb. Scord. Mixt. simpl.
- 3 Symptomata mitigantia: anodyna legitime correctæ, Essent. dulc. ordinaria & concentrata, Pulveres vitales & Solares, Decocta mucilaginosæ & gelatinosæ, potus sufficiens, quieta in lecto continentia.
- 4 Ventriculi & intestinorum tonum restituentia: Infusa ex Radic. & Herb. amaris aut Essentiæ exhibitæ, Essent. amara Hallens. Tinct. ꝑt. Ludov. Mixt. Tonica Stahlian.



## Formule Remediorum.

## 1 Pulvis laxans.

R. Rhab. elect. ʒss. Lap. ʒ a. ʒss. M.  
Cryst. mont. D. pro una dosi.

## 2 Pulvis emeticus.

R. Pulv. Ipecac. gr. XXIV. D. ut antea.  
Sal. absinth. ʒss. M.

## 3 Pulvis temperans.

R. Cryst. mont. Divid. in 9. p. æq.  
Nitr. depur. D. sing. 4. horis.  
Conch. citr. an. ʒj. M.

## 4 Pulvis temperans &amp; diaphoreticus.

R. ʒ diaphor. Nitr. depur. M.  
Matr. Perl. Divid. & D. ut antea.

## 5 Alius.

R. Pulv. viper. ʒj. D. mane, a meridie & ve-  
Cryst. mont. ʒss. M. peri.  
Divid. in 3. p. æq.

## 6 Pulvis confortans.

R. Pulv. vital. dos. vj. D. sing. 2. vel 3. horis.

## 7 Potiuncula diaphoretica.

R. Aq. Meliss. Sir. contraj. ʒss. M.  
Flor. Galeg. an. ʒij. D. cochleatim.  
Essent. alexiph. ʒiss.

## 8 Alia diaphoretico-analeptica.

R. Aq. Scorzon. Mixt. simpl. ʒj.  
Scord. an. ʒij. Ess. dulc. ʒss.  
Cinnam. cyd. ʒvj. D. ut antea.

## 9 Pulvis confortans.

R. Pulv. Vital. dos. vj. D. sæpius dos. j.

## 10 Infusum Stomachicum.

R. Rad. Gentian. ʒss. Card. bened. an. mij.  
Galang. ʒij. Cort. ʒnt.  
Zedoar. Citr. a. ʒij.  
Ari an. ʒj. Incis. infund. in f. 4. Vin.  
Summit. Cent. min. D. ter per diem ʒiv.

## 11 Mixtura Roborans.

R. Essent. Cort. ʒnt. D. 30. gutt. mane & vesperi.  
Amar. a. ʒij M.

## II. Methodus medendi.

- 1 In cura Febris hujus malignæ & contagiosæ Medicus ad dua respiciat necesse est; nimirum ad Febrem ipsam & deinde ad alvi fluxum.
- 2 Quod Febrem concernit ejus potior habeatur ratio, hac enim legitime tractata alvi fluxus & reliqua symptomata facile cessant.
- 3 Mane E. Essentia alexipharmaca vel sola, vel cum Essentia Pimpinellæ aut Scordii mixta, vel dosis bonæ Tincturæ bezoardicæ aut Mixtura simplex detur, ut hoc modo miasmata maligna, in hac Febre inverso ordine, loco habitus corporis, intestina petentia, sensim sensimque expellantur, adeoque ab intestinis, in quibus sæpius inflammationem producant, ad peripheriam corporis deriventur.
- 4 Hoc ut eo melius succedat, & ut etiam simul nimius æstus febrilis mitigetur, postea vel pulveres temperantes cum diaphoreticis fixis mixti, aut Pulveres Ettmuleri ex pulvere Viperarum & Crystallo montana constantes exhibeantur; hæc enim materiam malignam temperant & inflammationem imminuent mature exhibita præcavent.
- 5 Talia autem remedia dentur in convenienti dosi singulis circiter noctem, versus diluculum vero exhibeantur denuo Essentia alexipharmaca aut alia similis: & talis methodus singulis diebus semper servetur.
- 6 Cum vero virium maxime in Febre hac prostratarum, ratio sit etiam habenda, dictis remediis interponantur, vel jungantur analeptica sive confortantia, qualia sunt Aquæ diaphoreticæ cum spirituosus & blandis acidis mixtæ: aut etiam in usum trahantur Pulveres Vitales & Solares cum Essentia dulci: hæc enim remedia sæpius, irritis omnibus aliis, insignem edidisse effectum plus simplici vice observavi.
- 7 Tandem morbo ad finem tendente & postea quoque exhibeantur adhuc aliquandiu alexipharmaca,

quibus Ventriculi & intestinorum tonum restau-  
rantia remedia vel interponantur vel junguntur.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Venæsectioni in hac Febre nullus concedatur locus, nisi peculiares & urgentes circumstantiæ in primo statim principio ejus usum suadeant.
- 2 Idem judicium ferendum est de Vomitoriis: inconsiderate enim exhibita materiam malignam magis versus ventriculum cum insigni periculo & anxietatum præcordialium augmento derivant: imo si inflammatio imminet, eam potius in actum deducunt, quam discutunt.
- 3 Utrum Ipecacuanha tantas possideat virtutes, quantæ vulgo ipsi adscribuntur, hoc loco definire nolo: illud tamen certissimum est, quod, præsentē dispositione ad inflammationem magis noxia quam proficua sit: & si omnino eam exhibere consultum ducitur, fiat id in primo statim principio, si scilicet oris amarities aliæque circumstantiæ ventriculum cruditatibus repletum esse docent. Si malum a contagio ortum est, aliqualem quoque usum habere potest, si mox exhibetur.
- 4 Laxatio per Rhabarbarum aut Pilulas Becherianas in principio hujus mali, si adhuc levius est, cum fructu instituitur, si vero Febris maxime urget, satius est a laxatione abstinere: consultius vero mendendi methodus dirigitur contra Febrem.
- 5 Clysteres abstergentes suo etiam non carent usu, abusus tamen quam maxime vitandus est, ne Febris per eos turbetur.
- 6 Alexipharmaca fortiora, uti in omnibus acutis & malignis, ita & in hac Febre noxia sunt, quia æstum nimium augent.
- 7 Adstringentia quoque maxime vitentur, quoniam Febrem turbant & anxietates præcordiales graviores reddunt.
- 8 Opiata in hac Febre prorsus nullum usum habent, sed potius motus Febriles sopiendo miasmata malignorum excretionem impediunt: quamvis enim dolores aliquo modo leniant, & ex hoc capite a quibusdam commendetur, magis tamen respiciendum est ad Febrem & materiæ malignæ eliminationem, quam ad symptomatum mitigationem, quia hæc bene succedente Febre sponte cessant.
- 9 Specifica quæ passim ab Authoribus laudantur, in Dysenteria benigna raro voto respondent, quare multo minus in Febre dysenterica suadenda sunt.
- 10 Refrigeratio omnis inpr. partium inferiorum in hoc morbo summe noxia est, & non solum Febrem turbat, sed & omnia symptomata graviora reddit, quare quam maxime fugienda est. Maneant. E. patientes in lecto, iisque supponatur vas quoddam, excipiendis excrementis idoneum.
- 11 Jectigationes in lecto diapnoen febrilem impediunt & accidentia molesta exacerbant, magis E. convenit quies in lecto continentia.
- 12 Vitent quoque ægrotantes potum frigidum, assument potius calidum, placidam diapnoen promoventem.

## CAPUT XXII.

## D E

## Febre Castrensi sive Hungarica.

- I. **Definitio.** Febris castrensis est species Februm malignarum & contagiosarum epidemice ut plurimum grassans, in qua Natura per auctiores motus materiam quandam malignam corporis communicatam expellere nititur.
- II. **Differentia.**
  - 1 Quamvis cum Febre Petechiali & Petechizante quoad multa imo plurima conveniat, nihilominus tamen a quibusdam respectu quorundam symptomatum, sub signis recensendorum ab iisdem, distinguitur.
  - 2 Quomodo a Peste differat sequens Tabula docebit.
- III. **Signa.**
  - 1 Invadit ordinarie cum horrore aut horripilatione.
  - 2 Quem



- 2 Quem excipit æstus satis gravis.
  - 3 Dolor capitis quam maxime urget & fere intolerabilis est.
  - 4 Facies & vasa in capite sunt inflata.
  - 5 Oculi sunt fulgidi & rubicundi.
  - 6 Jungitur etiam insignis anxietas præcordiorum cardialgica.
  - 7 Nonnunquam etiam concurrunt Vomitus.
  - 8 Ordinarie etiam percipiunt ægrotantes insignem ardorem in orificio Ventriculi sinistro.
  - 9 Conqueruntur etiam de maximo faucium ardore.
  - 10 Quem non raro actualis inflammatio excipit.
  - 11 Lingua continuo est sicca & sæpius tumida.
  - 12 Pulsus est celer & frequens ac fortior quam in aliis malignis.
  - 13 Sitis eximia adest.
  - 14 Patientes insigniter delirant.
  - 15 Alvus sæpius est nimis aperta.
  - 16 In aliis observatur quoque Dysenteria.
  - 17 Singulis diebus circa vespæram Febris exacerbatur.
  - 18 Junguntur etiam sæpius Petechiæ.
  - 19 Quidam inpr. Plethorici narium Hæmorrhagias patiuntur.
  - 20 In quibusdam observantur Parotides.
- IV. *Subjeſtum.*
- 1 Quando epidemice grassatur, nulli parcit ætati.
  - 2 Facilius tamen ea corripiuntur Plethorici.
  - 3 In aere inquinato degentes & putridas exhalationes haurientes.
  - 4 Aquas putridas & stagnantes bibentes.
  - 5 Prava diætâ utentes.
  - 6 Milites præ ceteris in castris, unde etiam *Febris Caſtrenſis* denominationem obtinuit.

V. *Prognosis.*

- 1 Febris hæc est admodum gravis & periculosa, partim symptomatum, partim exitus respectu.
- 2 Plethorici hac Febre correpti in majori versantur periculo, quam reliqui, ob varias sanguinis translationes & Hæmorrhagicas commotiones.
- 3 Dolores capitis maxime urgentes facile post se trahunt Phrenitidem.
- 4 Quo magis affligunt anxietates cardialgiæ cum æstu scrobiculi cordis, eo magis metuenda est inflammatio diaphragmatis & ventriculi.
- 5 Quo magis & diutius delirant ægrotantes, eo pejor est status.
- 6 Deliria extra exacerbationes tempus pessima sunt.
- 7 Deliria gravia cum torva facie Phrenitidem adesse indicant.
- 8 Quo maturius huic Febri supervenit Prunella & faucium inflammatio, eo pejor est status.
- 9 In hac Febre satius est fieri translationem humorum ad Parotides quam ad fauces. Femina hujus loci laborabat ante duodecim annos tali Febre cum faucium leviori & sensim invalescente inflammatione; tandem retro aurem dextram Parotis ovum gallinæ cum magnitudine superans erumpebat cum immutatione inflammationis faucium, & etiam brevi, mature aperta Parotide, præter omnium opinionem evadebat. Alius tum temporis eadem Febre corripiebatur, delirabat continuo usque ad undecimum diem, & hoc ipso ad se rediens de insigni faucium dolore conquerebatur: Chirurgus vocatur, fauces inspiciebat, tonsillam sinistram inflammata & ex atro rubentem deprehendebat: jubebam ut eam illico aperiret, quo facto materia atra teterrimi odoris effluebat & sic patiens optime restituebatur.
- 10 Alvus aperta semper melior est adstricta.
- 11 Hæmorrhagiæ narium die critico contingentes, interdum notabiliter sublevant patientes, ut plurimum tamen vel incompletæ sunt, vel auctiores & immoderate, ac hic utroque modo noxam edunt.
- 12 Si Petechiæ superveniunt huic Febri, res periculi plenissima est.

VI. *Remedia.*

- 1 Temperantia: Lapid. Cancr. Conch. citr. Nitrum depur. Succus Citri recens, Rob. Ribium, Berberum, Cydoniorum, Ceraforum acidorum, Tinct. Violarum &c.

- 2 Diaphoretica: ☿ diaphoret. Bezoardicum minerale, Regulus ☿ ii. Medicin. Tinct. Bezoard. Mixt. simplex, Essent. alexipharmaca, &c.
- 3 Symptomata mitigantia, Vid. *Methodus Medendi.*

*Formula Remediorum.*

## 1 Potiuncula temperans.

- Rx. Aq. Borrag. Nitr. regener. a. ℥ij.  
Bugloss. ā. ℥ij. Sir. acetos. citr. ℥ss. M.  
Conch. citrat. D. sing. 2. horis cochl. ij.

## 2 Alia.

- Rx. Aq. Scabios. Berber. a. ℥ss.  
Card. bened. a. ℥ij. Sir. granat. ℥ss.  
Rob. Cydon. D. ut antea.  
Ceras. acid.

## 3 Alia temperans &amp; diaphoretica.

- Rx. Aq. Galeg. Nitr. depur. a. ℥ss.  
Scorzon. a. ℥ij. Cinnab. ☿ ii ℥j.  
Cord. frig. ℥j. Sach. Perl. ℥ij. M.  
Bezoard. min. D. ut antea.  
Conch. citr.

## 4 Alia.

- Rx. Aq. Fl. Acac. Matr. Perl. a. ℥ss.  
Card. bened. Ess. alexiph. ℥ij.  
Scorzon. a. ℥ss. Sir. acetos. citr. ℥ss. M.  
☿ diaph. D. ut antea.

## 5 Mixture alexipharmaca.

- Rx. Ess. alexiph. D. mane 30. gutt.  
Scord. a. ℥ss.

## 6 Alia simul roborans.

- Rx. Ess. Scord. dulc. ℥ss. M.  
Pimp. alb. a. ℥j. D. ut antea.

## 7 Pulvis leniter sistens.

- Rx. Lap. ☿. ℥j. cultr. præſente Dy-  
Nitr. depur. senteria vel Diar-  
Pulv. Chacar. a. ℥ss. M. rhœa.  
D. sing. 3. vel 4. hor. 2. cusp.

## 8 Unguentum anodynum.

- Rx. Ungt. Alabaſtr. ℥ij. Applicetur temporibus  
Camph. ℥ss. M.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Cum Febris hæc ob varia conjuncta symptomata & malignitatem sit admodum periculosa, Medicus ante omnia id agat, ut mature omni periculo metuen- do occurrat & quidem in principio, si enim oppor- tunum tempus jam præterlapsum est, ægroti ordi- narie ob morbi vehementiam succumbunt.
- 2 Quare in principio, si Febris statim nimis vehemen- ter urget, ad eam mitigandam exhibeat remedia temperantia, absorbentia & Nitroſa ac potum suffi- cientem ægrotantibus concedat, partim ut nimius cal- or cum symptomatibus ab eo dependentibus aliquo modo infringatur, partim ut humores etiam ad pla- cidam diaphoresin disponantur.
- 3 Hisce subjungantur statim diaphoretica fixa cum tem- perantibus & blandis acidis mixta, ut eorum ope æ- stus febrilis mitigetur ac diaphoresis promoveatur: cum enim hæc Febris a contagio maligno ordinarie originem trahat, omni studio eo alla borandum est, ut miasmata maligna mature, successive tamen, e corpore eliminentur.
- 4 Et talia remedia potissimum ante exacerbationem & in ea locum habent, interdiu scil. circa vespæram & noctu: cum enim Natura in exacerbatione moti- bus vitalibus auctioribus materiæ morbificæ excre- tionem suscipiat, Medicus tanquam ejus minister o- ptime agat, si mature per temperantia & diaphore- tica fixa æstum nimium ante exacerbationem præ- cavere, materiæ vero malignæ excretionem in ea promovere tentat.
- 5 Si hæcce remedia in exacerbatione debito modo & cum prudentia exhibita fuerunt, versus diſſicul- dentur Alexipharmaca, Mixture simplex, Tinctura Bezoardica aut Essentia alexipharmaca Stahlii, ut hoc modo diaphoresis, quam Natura ordinarie eo tempore instituere solet, promoveatur.
- 6 Postea vero denuo porrigantur remedia temperan- tia & diaphoretica fixa & hæc methodus exhiben- do



do scil. mane Alexipharmaca, reliquo vero tempore dicta temperantia per totum morbi cursum observetur.

7 Cum vero symptomatum in hoc casu maxime urgentium etiam habenda sit ratio, Medicus mature, quid agendum & quomodo ipsis occurrendum sit, inquirat: quamvis, si morbus perite tractatur, hac medicatione non semper sit opus.

8 Si Deliria & capitis dolores nimium urgent, concedatur potus sufficiens & exhibeantur remedia temperantia. Emulsionem, blanda acida, ac diaphoresis per convenientia remedia & blandum regimen promoveatur: externe vero Unguentum de Alabaistro camphoratum temporibus, pedibus vero, si subjectorum conditio id permittit rubefacientia applicentur.

9 Diarrhoea & Dysenteria huic Febri juncta solummodo tractetur absorbentibus, nitrosis aliisque temperantibus ubi vero nimium urget, admisceatur dictis remediis Pulvis Corticis Chacarillæ, vel etiam solus detur, aut ubi Pilulæ Stahlianæ ad manus sunt, eæ exhibeantur.

10 Nimium faucium & scrobiculi cordis æstus atque exinde dependentes anxietates, mitigant emulsiva, mucilaginosæ, gelatinosæ, blanda acida, pulveres temperantes nitrosi &c. reliquis remediis interposita.

### VIII. Cautela Practica.

1 Venæsectio non facile instituatur in hac Febre, nisi habitus corporis summe Plethoricus, dispositio aut inclinatio patientis ad Hæmorrhagias, & assuetudo evacuationum artificialium ejus usum suadeant, semper autem in principio instituatur.

2 Sit autem largior potius quam parca, hæc enim non solum parum sublevari patientem, sed etiam gravioribus sanguinis commotionibus & congestionibus ad caput ansam præbet.

3 Et etiamsi larga fuerit, statim tamen, ad impediendas Hæmorrhagicas commotiones, subjungatur regimen constans diaphoreticum, ut hoc modo humores eo magis ad peripheriam corporis ferantur.

4 Vomitoria interdum in primo morbi principio, in subjectis evemetis, & si malum a contagio ortum traxit, aliquem habent usum, extra verò hæc circumstantias noxia sunt & anxietates præcordiales cum metu subsequens inflammationis augent. Præsentibus vero modo dictis circumstantiis locum habere possent Radix Ipecacuanhæ & Panacæa Coneringiana.

5 Purgantibus hic nullus est locus quia Febris hæc per se ad alvum liquidam inclinat: si vero alvi obstructio adest, loco Purgantium Clysteres in usum trahantur, ut hoc modo graviores congestiones ad caput præcaveantur. Idem Clysteres, sed abstergentes pariter locum habent, si Dysenteria juncta est cum hac Febre.

6 Continua diaphoresis maxime quidem est utilis in Febre Castrensi, abstinendum tamen est ab omnibus commoventibus & volatilibus, quoniam æstus & omnia symptomata augent.

7 Regimen etiam continuo moderatum sit, abstinendo ab omni nimio æstu externo, refrigeratione & jectigatione corporis, ut pote quæ placidam diaphoresin turbant.

8 Nimia refrigerantia impediunt blandam diaphoresin, quare fugiantur.

9 Narcotica in hac Febre revera fiunt necrotica, & hinc ab iis abstinendum est.

10 Nec etiam Theriacalia sunt tuta, quatenus æstus & deliria augent.

11 Præsentem Diarrhoeam vel Dysenteriam nunquam præscribantur, quoniam illorum usum gravissimæ anxietates, & intestinorum inflammationes excipiunt.

12 Potus ægrotantibus nunquam denegetur, non tamen sit frigidus, nec etiam magnis haustibus ingurgitetur; satius est sæpius & parum bibere.

13 Consultum quidem est symptomatibus occurrere, nunquam tamen id fiat cum morbi principalis neglectione.

14 Morbo superato ægroti non statim se exponant aëri liberiore, quoniam morbus hic recidivæ obnoxius est: maneant potius in aëre temperato, & spatio octo dierum usum Ess. alexiph. continueant.

15 Vitent quoque ab usum ciborum & quoad cætera Diætam bene observent, ne morbus recrudescat.

## CAPUT XXIII.

D E

Peste.

I. *Definitio.* **P**estis est Febris maligna, epidemica & contagiosa in summo gradu, in qua Natura materiam malignam subtilissimam per motus secretorios & excretorios auctiores per habitum corporis expellere nititur.

### II. Differentia.

1 Quomodo a reliquis Febribus malignis & epidemicis differat, præcedentes Tabulæ docent.

2 Ipsa Pests differt respectu.

a Gradus.

b Anni temporum.

c Constitutionis aeris.

d Locorum: & horum intuitu modo mitior, modo gravior est.

e Symptomatum: quæ pro diversitate graduum differunt, ita ut modo sudores copiosi, uti in Sudore Anglico, modo Bubones & Carbunculi, modo Petechiæ erumpant.

### III. Signa.

1 Signa sunt varia pro diversitate gradus Pestis & diversorum annorum.

2 Incipit tamen ordinarie cum horrore leviori vel graviore.

3 Quem excipit æstus mitis, interdum vero gravior, qualis est Februm continentium.

4 Non raro etiam ab initio graves statim affligunt vomitus materiæ ex nigro viridescantis, piceæ, fætidæ.

5 Alios vero vexat nausea insignis & inanis vomendi conatus.

6 Sæpius tamen nihil horum observatur, ita ut etiam ne manifesta quidem febrilis commotio in ægrotis deprehendatur.

7 Sub his vero circumstantiis eo gravius urgent summa virium prostratio & Lipothymia.

8 Alii non nisi de aliquali lassitudine conqueruntur, præterea autem nullius molestiæ mentionem faciunt.

9 Ut plurimum tamen multi ab initio corripuntur dolore capitis gravativo, & Vertigine ita ut vix erecti esse queant.

10 Cui semper dolor dorsi jungitur.

11 Vires ordinarie sine causa manifesta sunt maxime prostratæ.

12 Adsunt etiam graves anxietates præcordiorum & Cardialgia.

13 Junguntur hisce deliria, modo mitiora, modo graviora.

14 Pulsus sæpius est sano similis, ordinarie tamen febrilis, tantus tamen ei non inest vigor ac in aliis Febribus.

15 Etsi autem sit febrilis, nullus tamen sæpius manifestus & constans observatur typus, interdum vero tempore pomeridiano suas habet exacerbationes.

16 Nonnunquam etiam in principio statim copiosi & fætidi sudores erumpunt.

17 In aliis vero odor tantum circa præcordia observatur.

18 In inguinibus, sub alis, retro aures aliisque locis prodeunt Bubones, modo majores modo minores & quidem interdum sine ulla sensibili commotione febrili.

19 Sæpius vero sentiunt ægrotantes vel debilitatem vel tensionem in fervore, postquam cum dolore insigni,



Febre & anxietatibus præcordialibus Bubones erumpunt.

- 20 In aliis cum Bubonibus concurrunt Anthraces sive Carbunculi, qui tamen etiam soli sæpius prodeunt.
- 21 In aliis observantur Petechiæ & Vibices.
- 22 Quando Carbunculi erumpunt, apparet primo macula rubra cum pustula sensim crescente & tandem in ulcusculum livescens, nigrescens, cœrulescens, putridum, sub & circumjacentem carnem colliquans, cum fœtore magno, degenerans.
- 23 Ordinarie excitant dolorem maxime urentem & non adeo profunde in carnem subjectam penetrant.
- 24 Sæpius etiam Carbunculum circumdant pustulæ graviter ardentes & serum acre fundentes.
- 25 Interdum in quibusdam erumpunt Lenticulæ seu Pustulæ grano piperis similes exquisite ardentes.
- 26 In aliis observantur Diarrhœæ & Dysentericiæ, in aliis vero diversæ Hæmorrhagiæ.
- 27 Non pauci etiam in præphlegmaticorum censu affectibus soporosis corripuntur.
- 28 Ut alia signa pro Pestis varietate diversa silentio prætereamus.

#### IV. Subjectum.

- 1 Pestis seu morbus epidemicus & maxime malignus nulli parit ætati, sed sine discrimine in omnes sævit.
- 2 Observatum tamen fuit in Peste Dinticanæ, Podagricos, Chthysicos, Hæsticos & Calculosos a diu hoc morbo immunis mansisse, etiam si cum ægrotantibus commercium habuerint.
- 3 Spiritu Vini abutentes facilius quam reliqui Peste corripuntur.
- 4 Plethorici & otiosi.
- 5 Meditationibus dediti & timidi.
- 6 Qui effluvia putrida corporum mortuorum hauserunt.
- 7 Qui urgente fame cibos insolitos assumerunt.
- 8 Feminæ præ viris.

#### V. Prognosis.

- 1 Uti signa diagnostica sunt admodum fallacia, dum modo, sub Ephemerarum, Continuarum, inflammatoriarum &c Februm larva incedit, ita quoque Prognosis est dubia: referam tamen quid in nupera peste observatum fuerit a Medicis Gedanensibus & aliis.
- 2 In genere omnis Pestis est summe periculosa & malignitate omnes reliquas Febres superat, unde etiam citissime magnam edit stragem.
- 3 Idque eo certius si manifesta signa nondum ad sunt & Pestis aliorum morborum schema habet.
- 4 Imo cum Pestis morbus sit admodum præceps & sæpius admodum variet respectu variarum circumstantiarum & hinc non raro aliam medendi methodum postulet, multi sæpius, antequam Pestis indoles & methodus indagetur, pereunt.
- 5 Sudores, Carbunculi & Bubones mature die tertio scil. vel quarto erumpentes, boni sunt, morbum leviores reddunt, bonum enim exitum promittunt.
- 6 Si vero nimis tarde prodeunt post quartum scil. diem res periculi plena est & ægroti ordinarie moriuntur.
- 7 Sudores excedentes in principio etiam morbi malum portendunt exitum.
- 8 Sudor frigidus, aut etiam extrema frigida, in specie natus, malum.
- 9 Largos sudores die quarto sequitur crisis per Petechias aut Carbunculos.
- 10 Blandum vero udorem excipit Crisis per Bubones.
- 11 Id quod eo certius contingit, si antea dolores artuum & dorsi, capitis vero mitiores præcesserunt.
- 12 Si deliria sunt gravia & dolor capitis major est quam artuum, sequitur crisis per Anthraces aut per Petechias, cum Bubonibus.
- 13 Crisis per Bubones melior est reliquis.
- 14 Retrocessio illorum ordinarie est lethalis.
- 15 Retrocessionem eorum sequuntur Petechiæ cum enormi virium prostratione & morte.
- 16 Petechiæ lividæ obscuræ & tardæ post quartum scil. erumpentes semper pejores sunt reliquis.

- 17 Vibices sive Stigmata in cute adhuc pejoris sunt ominis, quam Petechiæ.
- 18 Vibices sive salutes appareant, sive Carbunculis juncti sint, si sine Febre albescant, pessimi moris observantur.
- 19 Carbunculi quamvis Vibicibus minori periculi sint, Bubonibus tamen ut plurimum pejores observantur.
- 20 Tumores delitescentes & imperfecte erumpentes aut ad interiora recedentes summum vitæ periculum portendunt.
- 21 Eminentibus Bubonibus seu exanthematibus superveniens singultus, malum & periculosum.
- 22 Horrores quidem in morbi principio ceteris paribus non adeo sunt mali, si vero postea adhuc recurrunt, semper monstri quid alunt & insigne periculum portendunt.
- 23 Vomitus, Diarrhœæ & Hæmorrhagiæ Narium ac Uteri non sunt adeo metuendæ, nisi alia mala signa conspirent.
- 24 Majorem vero attentionem merentur affectus soporosi, motus convulsivi, deliria cum abalienatione mentis ut & deliquia animi, & gravis virium suppressio, si ante dictis affectibus junguntur.
- 25 Irregulares morus febriles, si cum modo dictis malis signis concurrunt, periculum augent.
- 26 Qui in principio statim delirant & intra viginti quatuor horas ad se non redeunt, ante quartum moriuntur.
- 27 Sopore affecti moriuntur quidem certo, sed sæpius ad novum & undecimum usque diem vivunt.
- 28 Vomitus & Diarrhœæ ab initio morbi statim urgentes, pejores semper sunt iis qui post semicriticum diem se exerunt, & ægroti etiam citius moriuntur.
- 29 Hæmorrhagiæ narium non excedentes, absentibus aliis malis signis, & die quarto contingentes fere semper salutes sunt.
- 30 Idem de mensibus, per aliquot dies tolerabili fluxu durantibus ferendum est iudicium.
- 31 Feminæ præ viris periculosius decumbunt & citius etiam moriuntur.
- 32 Ratione ætatis homines ab anno decimo usque ad trigessimum periculosioribus corripuntur symptomatibus quam juniores & reliqui & fere omnes moriuntur.
- 33 Homines temperamenti calidioris pariter graviora patiuntur symptomata quam frigidiores.
- 34 Temperamento puro gaudentes citius moriuntur, quam reliqui, exceptis pure melancholicis, qui vel prorsus Peste non corripuntur, vel ea afflicti evadunt.
- 35 Sanguineorum pure sic dictorum crisis fit vel per Petechias vel Carbunculos, vel Bubones cum Petechiis.
- 36 In Cholericis per Bubones & Petechias vel plures Carbunculos simul.
- 37 In Phlegmaticis per Bubones lente prorumpentes vel Carbunculos haud adeo malor.
- 38 In Melancholicis autem per Bubones cito erumpentes.
- 39 Quoad symptomata, Sanguineis familiariora sunt, Deliria, Dolores vehementissimi, maxima Debilitas, sudores copiosi, Hæmorrhagiæ, sed cito iterum cessantes.
- 40 Cholericis, Vomitus, Diarrhœæ, Deliria, Hæmorrhagiæ excessivæ, Convulsiones & Spasmi.
- 41 Phlegmaticis affectus Soporosi, Dolores magis artuum, quam interni corporis, & interdum etiam Vomitus.
- 42 Melancholicis vero Dolores totius corporis & Debilitas, Angustia præcordiorum, difficultas respirandi, sudores pauci & interdum Diarrhœæ.
- 43 Respectu mixtionis temperamentorum symptomata maxime complicantur & exitus morbi quoque est diversus.
- 44 Quæ in Cholericis lethalia, observantur, Melancholico nil nocent & vice versa.
- 45 Plenilunia sæpius Peste affectis maxime sunt funesta & eo tempore plurimi moriuntur. Hæc ex Historia Pestis



*Pestis Danti scana & Rosenberghiana*, ac iis quæ B. Enmullerus ex variis Authoribus collegit, sufficiant, propriam auctoritatem & experientiam allegare nequeo, & Deus etiam, clementissime hanc luem ab urbe nostra, ut avertat, rogo, ne testem ocularem hujus flagelli divini agere cogar.

## VI. Remedia.

- 1 Temperantia: Lap.  $\mathfrak{z}$ . Conch. ppt. Mat. Perl. Sallia digestiva, Tart. Vitr. Arcan. dupl. Nitr. depur. Regener. succus Citri, Rob. Ribium, Berberum, potus sufficiens.
- 2 Diapnoica:  $\mathfrak{z}$  diaphoret. Bezoard. miner. Mixt. simpl. Tinct. Bezoard. Ess. alexiph. Pimpin. alb.
- 3 Specifica: Ossa humana semiputrida pulverisata, Bubones demortuorum excissi, exsiccati & in pulverem redacti.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis diaphoretico-temperans.

Rx. Bezoard. miner. Div. in 6. p. aq.  
Conch. vitr. D. sing. 4. vel 6. horis.  
Nitr. depur.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{ij}$ . M.

## 2 Alius ex Epist. D. Kanold.

Rx. Oc.  $\mathfrak{z}$ . Cinnab. nativ.  $\mathfrak{ij}$ .  
Conch. f.  $\nabla$ . Nitr. depur.  $\mathfrak{z}$  ss.  
Corall. rubr.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{ij}$ . Croci  $\mathfrak{z}$  t aperit. Stabl.  
Pulv. alexiph. nov.  $\mathfrak{ij}$ . M.  
 $\mathfrak{z}$  diaph.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{ij}$ . D. scrup. j. vel  $\mathfrak{ij}$ . sing. octo  
Spec. de Hyac.  $\mathfrak{z}$  ss. horis.

## 3 Pulvis alexipharmacus novus ex eodem.

Rx. Pulv. Pannon. rubr. Conch. f.  $\nabla$ .  
 $\mathfrak{z}$  diaph.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{ij}$ . Lap.  $\mathfrak{z}$ .  
Spec. de Hyac.  $\mathfrak{z}$  ss. Corall. rubr.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{ij}$ .  
Nitr. depur.  $\mathfrak{z}$  ss. Croc.  $\mathfrak{z}$  t Stablii  $\mathfrak{z}$  ss. M.  
Cinnab. nat.

## 4 Tinctura alexipharmaca ex eodem.

Rx. Ess. alexiph. Stabl.  $\mathfrak{z}$  ss. D. mane  $\mathfrak{O}$  a meridie  $\mathfrak{z}$  o.  
Spir. Tart. rec.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{ij}$ . ad 60. gutt. vesperi vero  
Vit.  $\mathfrak{ij}$ . M. dos. pulv. preced.

## 5 Alia.

Rx. Ess. alexiph.  $\mathfrak{z}$  ss. auctiori, mane  $\mathfrak{O}$  a me-  
Spir. Liq. C. C. succ. vel ridie, vesperi vero dos.  
C. C. rectif.  $\mathfrak{z}$  j. M. pulveris.  
D. Phlegmaticis, sed dosi

## VII. Methodus medendi.

- 1 Cum causa morbifica in Peste sit adeo subtilis ut ope colatoriorum minime scerni queat, sed brevi tempore humores intime penetret ac in corruptionem fatalem conjiciat, hinc omni studio eo allaborandum est, partim ut intima humorum resolutio partiumque solidarum lésiones præcaveantur, partim ut venenum mature e corpore expellatur.
- 2 Obtinetur autem hicce scopus potissimum per blandam & successivam diapnoen, ut hoc modo miasmata maligna sensim sensimque e corpore expellantur.
- 3 Blandam hancce diapnoen producant quietia in lecto continentia citra ulla corporis jectigationes, regimen moderate calidum cum potu, præcipue calido, & radicibus aliquot alexipharmacis alterato, quæ tria sola sæpius in subjectis calidioribus sufficiunt.
- 4 Hisce commode etiam ad meliorem expulsionem junguntur Alexipharmaca blanda, uti sunt Essentia alexipharmaca Stablii, Mixtura simplex probe acidulata, Essent. Pimpin. alb. Tinct. Bezoard modice camphorata, quæ parvis & repetitis dosibus exhiberi possunt. Maxime quoque laudatur Essen. antihypochondriaca Hall. quæ in Peste Regiomontana egregium edidit effectum, quando scil. singulis bihoriis ad gutt. 40 in multo vehiculo usque ad alvi largam apertionem exhibita fuit. Hac de re videri potest peculiaris tractatus B. Richteri.
- 5 Eandem efficaciam habent Antimonialia fixa cum absorbentibus nitrosis & acidulis, quæ nimiam sanguinis resolutionem simul impediunt, & in subjectis calidioribus potissimum locum habent.
- 6 Cum symptomata in Peste etiam quam maxime urgeant, iis quoque mature occurrendum est.

- 7 Si Vomitus urget, detur Essentia alexipharmaca Stablii cui addatur parum Liquoris C. C. succinati, aut Spiritus C. C. rectif. quod tamen remedium in Phlegmaticis magis locum habet: Cholericis vero magis præfunt pulveres absorbentes & nitrosi.
- 8 Eadem quoque remedia in Diarrhœa urgente insignem ulum præstant.
- 9 In virum prostratione, analeptica, & inpr. vinum moderate exhibeatur; egregium quoque usum in Peste confortantem habere dicitur Ess. dulc. Hall.
- 10 Si Hæmorrhagiæ symptomaticæ ægrotos fatigant, dentur temperantia, Nitrosa, acida &c.
- 11 Si Bubones erumpunt exhibeantur blanda diapnoica, externe vero applicentur emollientia sive maturantia, & anodyna ac Bubo mature aperiatur: postea vero per debita remedia mundificetur & consolidetur.
- 12 Eadem quoque remedia in curatione Carbunculorum sive Anthracum locum habent.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 In curatione Pestis lenissime procedendum est, & omnia commoventia cane & angue pejus fugienda sunt.
- 2 Absit E. Venæsectio, quæ directe hic prorsus nullum habet usum, nisi forsan specialis subjecti conditio ejus usum suadeat: si hoc est, instituat in primo statim principio & quidem satis largiter.
- 3 Exulent quoque Purgantia acria, ut pote quæ materiæ malignæ excretionem per habitum corporis impediunt: majorem hic efficaciam habet Elixir Polychrestum Hallensium, uti id ex Tractatu de Peste D. Richteri apparet.
- 4 Abstinentum quoque est ab indiscreto emeticorum usu, quoniam anxietates præcordiales augent ac facile Singultum, Lipothymias &c. post se trahunt.
- 5 Vomitus tamen in principio certa encheiresi institutus sæpius non solum maxime utilis, sed etiam necessarius est; uti id prolixè & fundamentaliter variis rationibus & experientiis demonstratum fuit a D. D. Kanold in epist. de Peste Gedanensi &c. Ratione ejus præcipuæ sunt sequentes.
  - a Quod miasmata maligna potissimum mediante Saliva corpori communicentur, adeoque citius vim suam exerant in Ventriculum & primas vias & quod ad præcavendam hancce noxam Medici unanimiter Masticatoria, Fumum Tabac &c. ad excitandam continuam salivæ excretionem commendent.
  - b Quod statim post infectionem Ventriculi symptomata, Nausea, Cardialgiæ, Amaritudines oris, Vomitus & Ardore urgeant.
  - c Quod sæpius in principio morbi saburra porracea, nigra, viridis, picea, fœtens per Vomitus ejiciatur.
  - d Quod fœtis cadaveribus viscera & partes infimi ventris Petechiis & Carbunculis affecta deprehensa fuerunt.
  - e Quod Vomitus artificialis in principio excitatus salutaris observatus fuerit.
- 6 His autem sequentes subjungit Cautelas.
  - a Ut Vomitus statim in Principio post infectionem excitetur.
  - b Patientibus nondum vomentibus.
  - c Præsentibus repentina (sub plenaria aut tolerabili alias sanitate) Inappetentia, Nausea, Amaritudo oris, Cardialgiæ initiantibus, imo vero his etiam absentibus.
  - d Illis principalissime personis, qui magis solitarie & unice per deglutionem infectæ fuerunt. Hoc autem exinde cognosci posse existimat, si noviter infectus commercium habuit cum aliis Peste laborantibus, iisque præsentibus cibos & potum assumpsit: si halitum ægrotantium ore excepit; si mox post hoc commercium Inappetentia, Nausea & Cardialgia corripitur; si statim post assumptos cibos se infectum esse sentit.
  - e Vomitorium illud esse debere lenissimum, certissimum, securissimum, quod magis blandissima provocatione & invitatione, quam pe-



netrantiore violenta stimulatione & coactione, h.e. magis nauseabunda averfatione, quam rofiva efficacia, affectum certo & statim edat. Et hunc in finem blandam faucium vel digito vel penna institutam titillationem commendat.

- 7 Cum Natura motus Febriles placidos in Peste instituat, nunquam exhibeantur remedia acria, volatilia & positive sudorifera, quoniam Massam sanguineam nimis commovent & humorum resolutionem funestam accelerant.
- 8 Medicus nunquam principaliter tentet Pestis curationem per diaphoretica, quoniam rarissime per sudores solvitur, frequentius vero & melius per Abscessus, Carbunculos & Bubones, præcipue posteriores: unde recte Sydenham: *Si quis materiam vere Pestis ope sudoris amoliri fatagat, is diversa a Natura via insitit, utpote quæ id per Abscessum melius.*
- 9 Theriaca etsi maxime a quibusdam laudetur magis tamen nocet quam prodest, quatenus Petechias in Peste ut plurimum funestas excitat.
- 10 Regimen positive diaphoreticum omnia symptomata exasperat, Bubonum & Anthracum excretionem sæpius retardat ac Petechias eorum loco producit, quare fugiatur.
- 11 Frigus vitetur, ne necessaria Abscessuum excretio impediatur.

## CAPUT XXIV.

### DE

#### Febre quotidiana intermittente.

I **Definitio.** **F**ebbris quotidiana intermittens est salutaris Naturæ conatus, cum horrore & insequente æstu quotidie affligens, cujus ope materiam quandam peccantem in primis viis hærentem per motus febriles quotidie repetitos expellere nititur.

#### II. Differentia.

- 1 A Febre tertiana duplici.
  - a Respectu temporis invasionis: Tertiana enim legitime procedens ordinarie tempus jentaculi observat, & si reduplicatur & secundus paroxysmus in aliud tempus incidit, utpl. primus & tertius, secundus & quartus paroxysmorum & sic porro sibi invicem respondent: Quotidiana vero circa horam septimam aut maturius affligit.
  - b Respectu temporis anni: quoniam Tertianæ duplices magis tempore autumnali, Quotidianæ vero ordinarie vernali invadunt, aut si tertianæ duplices sunt vernaes sæpius ad continuitatem inclinant.
  - c Respectu durationis paroxysmi: qui in Tertiana regulariter diuturniores sunt, quam in Quotidiana.
- 2 A Quartana triplici:
  - a Tempore invasionis: Quartanæ enim omnes regulariter tempore pomeridiano, Quartanæ vero matutino invadunt.
  - b Tempore anni: quatenus Quartanæ Autumni, Quotidianæ vero Veris soboles sunt.
  - c Duratione paroxysmorum: qui in Quartana breviores sunt, quam in Quotidiana.
  - d Respectu universalis ambitus: Quartanæ enim longe diuturniores sunt, quam Quotidianæ.
- 3 A Continua quotidiana sive Catarrhali benigna: quæ singulis quidem diebus circa vesperam invadit & matutino tempore aliquo modo remittit: cum e contra hæc de qua jam sermo est tempus matutinum observet, plenarie intermittat, ac respectu concurrentium symptomatum ab illa adhuc differat, uti ex collatione utriusque affectus facile patebit.

#### III. Signa.

- 1 Invadit more Februm intermittentium horrore satis gravi pro subjectorum conditione citius vel tardius finiente, ordinarie tamen integram fere horam consumente.

- 2 Observat autem ordinarie tempus vernali & quidem matutinum horam scil. sextam vel septimam.
- 3 Præcedunt uti in aliis intermittentibus, horrorem, pandiculationes, oscitationes & tensiones in dorso, cum gravitate capitis & artuum aut doloribus plus vel minus tendentibus.
- 4 Concurrent etiam horrores leniores dorsum percurrentes, quostandem universalis excipit horror.
- 5 In horrore, uti in aliis, insignis quoque adest præcordiorum angustia.
- 6 Cui jungitur insignis Nausea, quem horrore finiente sequitur in subjectis vegetioribus actualis Vomitus, in debilioribus vero Diarrhœa.
- 7 Post aliqualem moram aut quandam quasi remissionem sequitur æstus pro subjectorum varietate plus vel minus vehemens.
- 8 Quem comitantur symptomata ordinaria febrilia, sequenti Tabula, latius recensenda.
- 9 Durat hic æstus ordinarie sex vel octo horas, nonnunquam tamen ob subjectorum dispositionem ultra hunc terminum se extendit.
- 10 Tandem sequitur sudor lenis & non adeo copiosus ac in Tertiana, nisi subjecti conditio aliquid adejus uberiores fluxum contribuat.
- 11 Et modo dicta scena singulis luditur diebus, donec tandem Febris finiatur.

#### IV. Subjectum.

- 1 Homines humidiores & torpidioris temperamenti.
- 2 Plethorici spissitudine sanguinis simul laborantes.
- 3 Cibis crudis & viscidis abutentes.
- 4 Otio dediti.
- 5 Cruditatibus primarum viarum laborantes.
- 6 Tristitiæ & mœrori indulgentes.
- 7 Juniores phlegmatici.
- 8 Senes præ reliquis.
- 9 Feminae magis quam viri.

#### V. Prognosis.

- 1 Febris quotidiana rarior est & non adeo frequenter affligit ac reliquæ intermittentes.
- 2 Affligit ordinarie tempore Vernali, quæ vero Autumno singulis diebus format Paroxysmos Tertiana duplex est.
- 3 Febris Quotidiana ordinarie diutius durat, quam Tertiana.
- 4 Febres hæc facillime degenerant in continuas, inprimis in subjectis Plethoricis, aut quando alias æstus nimium urget.
- 5 In talibus etiam subjectis, præcipue concurrente spissitudine sanguinis, omnia symptomata diutius durant, & totus etiam morbus respectu durationis semper magis fit diuturnus.
- 6 Uti aliæ Febres intermittentes, inpr. Tertianæ, ita & hæc ceitas habent evacuationes quibus legitime succedentibus totus morbus bene decurrit & sensim imminuitur, male vero procedentibus in pejor ruit.
- 7 Tales Evacuationes potissimum sunt Vomitus, Diarrhœa & Sudor, de quibus vid. Tab. seq.

#### VI. Remedia.

- 1 Causam morbificam in primis viis hærentem corrigentia & ad excretionem disponentia: Tart. Vitri. Arcan. duplic. sal. Polychrest. Liq. Terrestr. fol. Tart. Sal. cathart. amar. Rad. Ari, Sal. Absinth. cent. min. Rad. & Herb. amar. Gumm. Ammon. Pil. Becher. Stahl.
- 2 Correctam evacuantia: Rad. ipecac. Tart. emet. Sir. emet. Specif. jalap. ꝯ dulc. Salia neutra Tart. Vitri. Arcan. duplic. Sal. cathart. amar. in majori dosi ad ʒvj. aut ʒj. data. Pilul. Becher. Tart. &c. Diaphoretico-Diuretica, uti sunt Essent. alexiph. Stahlii, Pimp. alb. sub finem Paroxysm. exhibitæ.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pulvis digestivus.

Rx. Lap. ʒ. Rad. Ari. ʒ ʒss. M.  
Tart. Vitr. ʒ ʒj. M. D. 2. cusp. cult.  
Sal. Absinth. pro dosi.

##### 2 Potiuncula præparans.

Rx. Aq. Cheresol. Plantag. ʒ ʒij.  
Arcan.



*Arcan. dupl.* *Sir. ceras. acid. ʒss.*  
*Matr. perl. a. ʒij.* *M. D. cochleat.*  
*Succ. citr. rec. ʒij.*

## 3 Pilulæ laxantes.

*R. Pil. Tart. Quercet. ʒj.* *D. vesperti.*

## 4 Aliæ.

*R. Pil. Stahlii. gr. XXV.* *D. ut antea.*

## 5 Julepus temperans.

*R. Aq. Ceras. nigr.* *Ceras. acid.*  
*Borrag.* *Berb.*  
*Bugloss.* *Succ. citr. rec. a. ʒss.*  
*Nymph. a. ʒiss.* *Sir. Cydon. ʒj.*  
*Cinnam. Cyd. ʒj.* *Spir. Vitriol. ʒj.*  
*Rob. Rib.* *D. sæpius cochleatim.*

## 6 Infusum Theiforme.

*R. Rad. Pimp. alb.* *Fol. Thee ʒss.*  
*Vincetox. ʒ. ʒss.* *Inc. D. ad Ch.*  
*Herb. Scabios.* *D. instar. Inf. Herb. Thee.*  
*Veron. a. mj.*

## 7 Essentia diaphoretica.

*R. Essent. alexiph. ʒij.* *D. 30. gutt. pro dosi.*  
*Spir. Vitriol. gutt. XV. M.*

## 8 Infusum roborans.

*R. Rag. Gent. r. ʒij.* *Cont. Ont.*  
*Galang. ʒij.* *Citr. a. ʒij.*  
*Ari. ʒiss.* *Incis. infund. in f. q.*  
*Summit. Cent. min.* *Vin. alb. generos.*  
*Card. Bened. ʒ. mj.* *D. ʒiv. vi. pro dosi.*

## 9 Pulvis antifebrilis.

*R. Tart. Vitriol. ʒj.* *D. sing. q. horis 2. cusp.*  
*Pulv. Cha arill. a. ʒiss.* *cultur.*  
*Chin. Chin. ʒj. M.*

## VII. Methodus medendi.

- 1 Cum in hac Febre materia morbifica digestionem lædens in primis viis lateat, itaque ea, antequam removeatur, prius præparanda est, ut postea eo commodius sine noxa e corpore expelli queat.
- 2 Præstant id præ ceteris salia digestiva extra Paroxysmi tempus mane & vespere exhibita, utpotæ quæ & blande incidunt & leniter materiam in primis viis hærentem abstergunt unde postea Febris eo facilius mitigari potest.
- 3 Urgente æstu exhibeantur temperantia Nitrosa, Acidæ, Emulsiva, Infusa temperata: eo frequentius vero talia repetantur, si sitis & Cephalalgia admodum urgent, hæc enim orgasmum sanguinis optime temperant & hoc ipso talia symptomata maxime leniunt.
- 4 Interdum etiam in talibus Febribus frigus nimium urget, atque in præcordia nimium affligit, tali in casu Spir. Vin. Camph. Aq. Reg. Hung. aut etiam Spir. Vin. rectificatiss. cum linteaminibus Scrobiculo cordis & regioni Ventriculi appliciti optime, sese gerunt: eundem habent usum, si spinæ dorsi applicantur: huc pertinent etiam linimenta stomachica, ut & Balsama, sed hæc posteriora, utpote nimis calida, non nisi paulo frigidioribus conveniunt.
- 5 Ad alvi laxitatem semper quoque respiciendum est, partim, ut hoc modo symptomata circa caput & præcordia urgentia, partim ut materia morbifica eo commodius successive e primis viis evacuetur.
- 6 Quoniam vero Febris hæc semper circa horam septimam matutinam affligit, ita ut Purgationi nullum commodum tempus concedatur, laxantia potius in usum trahantur & circa vespere exhibeantur: hoc enim modo talia remedia tempore nocturno eo facilius operationem suam edere queant, ita ut Febrem prorsus nullo modo turbent.
- 7 Tandem remota materia Febris in usum trahantur sistentia, uti sunt Pulv. Chacarill. Chin. Chin. cum salibus digestivis & absorbentibus, quibus nonnulli etiam anodyna addunt, aut hæc etiam sola legitime correctæ exhibent. Magis tamen placet Crocus ♂ tis ♂ iatus Stahlii, qui præmissis præmittendis & legitime præparatis humoribus & evacuatis, sine ulla metuenda noxa Febrem sistit.
- 8 Cum vero partim per motus febriles, partim per causam morbificam Ventriculus præcipue interdum

insigniter debilitetur, amara quoque in usum trahantur, quæ, si quid adhuc materiæ morbificæ restat, illud abstergunt, ac tonum sensim sensimque restituant.

- 9 Tandem Purgantia superato morbo cum amaris aliisque mixta interdum non sine fructu exhibentur, quatenus non solum primas vias optime a sordibus liberant, sed etiam recidivam præservant.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 Quoad vitæ periculum, nullum uti in aliis Intermitentibus metuendum est, nisi morbus per malum regimen ægotantium aut imprudentem medicationem ita corrumpatur, ut in alios graviores degeneret, qui postea lento gradu ad mortem ducunt: quare Medicus etiam summa cautela non solum hanc, sed & reliquas Intermitentes tractet.
- 2 Vomitoria licet a quibusdam commendentur, nunquam tamen, nisi die intermissionis subjectis, quæ propter cruditates copiosas intestinorum aut cibos malæ digestionis in Febres inciderunt, in usum trahantur, plura de hac re Vid. Tab. seq.
- 3 Venæsectio per se & directe prorsus nullum habet usum, interdum tamen si alia adhuc permittentia adiunt, Plethoricus subjecti status ejus usum postulat.
- 4 Purgantia drastica hic exulent, ut pote quæ placidum morbi successum turbant, multaque incommoda producant, quare ab iisdem absteineatur & potius lenia dentur, quæ solum alvum expediunt & materiam febrilem præparatam abstergunt.
- 5 In æstu vitentur nimis calida, nimis enim usurpata Febres lentas & Hæcticas post se trahunt.
- 6 Nunquam præmature sistatur hæc Febris, quoniam gravia vel acuta vel chronica sequuntur mala. Vid. Tab. seq.

## CAPUT XXV.

## D E

## Febre Tertianæ intermittente legitima.

- I. *Definitio.* **F**ebbris Tertianæ est species Febris intermittens, tertio quovis die horrore & hunc insequente æstu ac sudore affligens, cujus ope Natura causam morbificam primas vias occupantem corrigere & eliminare intendit.
- II. *Differentia.*
  - 1 A *Febre quotidiana*:
    - a Respectu *Typi*: quatenus hæc singulis, tertiana vero alternis diebus.
    - b Respectu *temporis invadendi*: Quotidiana ordinarie procedens hora septima, Tertianæ vero nona, decima vel undecima affligit.
    - c Ratione *durationis*: Tertianæ utpl. citius finitur quotidiana, nisi error in Diætâ vel curatione committatur, aut causæ morbificæ conditio ad diuturnitatem aliquid conferat.
  - 2 A *Quartana*:
    - a Respectu *temporis anni*: Quartana enim ordinarie non nisi tempore autumnali affligit, tertiana vero & vernali & autumnali.
    - b Respectu *temporis diei*, quatenus Quartana regulariter procedens tempus pomeridianum & quidem horam secundam, Tertianæ vero antemeridianum observat.
    - c Ratione *durationis*: Tertianæ enim longe breviori termino finitur, quam Quartana.
    - d Respectu *durationis paroxysmi*: qui in Tertianæ ordinarie ad 8. 10. 12 horas se extendit: cum e contra in Quartana quatuor tantum, vel sex horis absolvatur.
    - e Ratione *successionis pathemata*: in Tertianæ satis notabilis occurrit horror ultra dimidiam. imo fere ad horam usque se extendens; quem exci-



cipit vel vomitus vel Diarrhœa, imotalis vomitus in ipso etiam horrore se exerit. Sequitur postea æstus diu admodum durans cum consuetis symptomatibus ac tandem sudor paroxysmo finem imponens erumpit.

f In *Quartana* vero res longe aliter se habet, ordinarie enim nullus adeo notabilis horror sed rigor cum horrore mixtus & ad duas horas se extendens, occurrit. Calor est mitis & lentus & rarissime ultra sex horas se extendit. Sudor utpl. nullus vel in progressu morbi paucissimus est. Nec etiam post frigus Vomitus vel Diarrhœa sequuntur, nisi Ventriculus cibis manifeste sit oneratus.

3 A *Tertiana notha*: hæc quidem etiam tertio quovis die recurrit, sed longe aliter se habet.

a Ratione temporis invadendi: *notha* enim legitimum invadendi tempus nunquam observat, sed modo hoc, modo alio tempore affligit

b Respectu symptomatum, quæ in *notha* cum aliis alias in legitima minus obviis complicantur. Frigus enim est lene & transitorium, æstus vero ultra consuetum terminum se extendit & hinc ad continuitatem admodum pronæ sunt &c.

4 A *Tertiana maligna*: quæ interdum tempore vernali homines sub *Tertianæ* larva invadere solet, sed mox erumpentibus maculis aliisque malignitatis indicibus insignem stragem edere solet.

5 *Tertiana*: quoque vel est *fixa*, quæ scil. certum tempus & horas observat, vel *erratica sive vaga*, quæ tempus ordinarium vel anticipat, vel posticipat.

6 Denique differt etiam respectu gradus, dum alios gravius, uti Plethoricos, alios mitius affligit, ut juniores.

7 *Tertiana* tandem est vel *simplex*, vel *duplex*, quando scil. Paroxysmus singulis diebus affligit, ita quidem ut primus & tertius, secundus & quartus paroxysmus sibi respondeant, sed sub hoc schemate rarius occurrit.

### III. Signa.

1 Si le icime procedit invadit ordinarie ab hora circiter octava ad meridiem usque.

2 Incipit cum pandiculationibus atque oscitationibus sine manifesta causa affligentibus.

3 Cui jungitur insignis artuum lassitudo cum inquietudine & jectigatione in lecto.

4 Sequitur hinc aliqualis refrigeratio totum habitum corporis occupans.

5 Quæ tamen magis se exerit in dorso & lumbis cum spastica constrictione: ægroti rem ita expriment, *es lassen ihnen wie kalt wasser den Rücken hinauf*. Vid. Morton.

6 Tandem etiam hic spasmus cum frigore præcordia occupat & inpr. circa cordis scrobiculum urget cum insignibus anxietatibus præcordialibus.

7 Jungitur hisce nausea insignis nullus tamen adhuc actualis sequitur vomitus, nisi in subjectis evemetis aut Ventriculo cibis maxime repletis.

8 Interim sub horripilatione illa habitum etiam corporis occupante vasa detumescunt & conspectum fugiunt.

9 Totus habitus corporis constrictus est, ita ut pori promineant ac cutis superficiem superent.

10 Pallor universum corpus occupat, inpr. v. faciem quæ simul est admodum constricta, ita ut ægroti totum quanti alterati videantur. *Sie jehen gantz eingefallen una veran iert drein*.

11 Oculi fiunt cavi sive retrahuntur.

12 Nasus reditur acutus.

13 Ungues in multis sunt lividi, aut cœrulei.

14 Os multa saliva continuo perfunditur.

15 Pulsus quidem est aliquo modo frequens, sed simul depressus & debilis ac interdum intermittens præsertim in Plethoricis: imo interdum ita diminuitur, ut vix tactu deprehendi queat.

16 Hæc ordinarie durant tres quadrantes horæ aut horam integram, & interea nausea cum cardialgia insigniter affligunt.

17 Quo magis vero hæc urgent eo certius sequitur vomitus materiæ mucosæ admodum tenacis ac postea biliosæ etiam.

18 In aliis vero præsertim evemetis, ubi materiæ copia abundat & non adeo mucosa & tenax est, Vomitus statim in ipsius horrore principio observatur.

19 Nonnunquam etiam ubi materia nimis tenax est & ventriculi parietibus adhæret, præsentem licet nauseam & conatu vomendi, nullus tamen sequitur Vomitus.

20 In subjectis debilioribus loco Vomitus observatur Diarrhœa.

21 Cum per hæcenus recensita symptomata corpus maxime debilitetur, sequitur etiam universalis corporis lassitudo, ita ut ægroti quo se vertant, nesciant.

22 Sed sub hoc ipso languore pulsus sensim sensimque augetur & frequentior evadit.

23 Habitus corporis antea constrictus iterum intumescit & vasa in conspectum prodeunt.

24 Idem etiam contingit in facie, quæ naturalem sensum sensimque acquirit intumescit ac ruborem.

25 Postea vero auctiori pulsu tumor & rubor naturalem statum superant.

26 Oculi fiunt turgidi, rubicundi & fulgidi.

27 Omnia vasa in capite intumescunt, atque caput insigniter dolet.

28 Calor vel successive auctus, vel uno impetu ingruens, diffunditur per omnia membra ita ut insigniter incallescant.

29 Unde etiam in quibusdam dolores lancinantes instar fulguris artus penetrantes observantur.

30 Concurrit ardor & siccitas faucium & linguæ cum amaritie oris ac sitis insigniter urget.

31 Æstus hic ordinarie ad quinque, sex vel octo horas pro subjectorum diveritate se extendit.

32 Gravius quoque vel mitius affligit secundum diversorum temperamentorum statum.

33 Toto autem hoc tempore æstus est aridus & habitus corporis siccus.

34 tandem æstus hic aliquo modo remittit & mador quidam in habitu corporis sequitur.

35 Quem excipit sudor universalis in toto corpore.

36 Id quod tamen non semper in primis Paroxysmis contingit, nisi in subjectis humidioribus & ad sudores alias pronis.

37 Erumpente sudore omnia symptomata febrilia, quæ hæcenus ægrotum afflixerant, sensim imminuuntur ac finiente sudore prorsus disparent.

38 Sequentibus Paroxysmis si reliqua bene se habent & æger tranquille in lecto se servat, calor longe mitior est, ast sudore eo copiosius fluit.

39 Scena hæc singulis alternis diebus luditur, post quartum tamen Paroxysmum omnia mitigantur & Paroxysmi breviores fiunt.

40 Donec septimo sub quietâ ægroti continentia bono regimine ac convenienti & rationali Methodo totus morbus finiatur.

### IV. Subjecta.

1 Homines adulti adolescentes juvenes, temperamenti activioris.

2 Homines ad nauseam insigniter proni.

3 Cibos cum nausea deglutientes & vomitum cohibentes.

4 Diætâ crassa utentes & insignes errores in diætâ committentes.

5 Ira post cibos sumptos excandescentes.

6 Otio indulgentes.

7 Corpus calidum aeri frigido exponentes.

8 Diu in aere frigido & humido versantes.

9 In constitutione epidemica viventes, in qua tamen viri magis, uti alias, in hæc Febres quam feminae incidunt.

10 Quibus ulcera, Scabies, aliæque cutis impuritates retropulsæ fuerunt.

### V. Prognosis.

1 Inter omnes Febres genus humanum affligentes, nulla adeo salutaris deprehenditur, si legitima est & subjecti etiam conditio respondet, quam *Tertiana*; nam

a Per



- a Per eam cruditates & materia viscida primas vias obfidentes remouentur.
- b Ipsa Massa Sanguinea per sanguinis conuassationem & resolutionem non solum in quantitate sua molesta imminuitur sed etiam a multis sordibus adeoque optime depuratur, ita ut postea homines, si modo Diætā adhuc aliquandiu seruent, sanitatem firmiorem nanciscantur.
- c Absterguntur etiam partes solidæ, ita ut flexilitatem & agilitatem recuperent & ad motum promptiores evadant.
- d Tolluntur etiam per eam glandularum & viscerum obstructions & leviores infarctus, ita ut, qui antea ob dicta incommoda semper valetudinarii erant, postea optimam acquirant sanitatem.
- e Imo ipsas Convulsiones, summo cum impetu affligentes, quæ nullis prorsus remediis coerceri poterant, per Febres Tertianas aliquoties sublatas vidimus.
- f Pariter pedum œdemata post Febres suppressas per Febrem revocatam tolli, experientia testatur.
- g Eadem œdemata a mensium suppressione orta per Febrem Tertianam supervenientem resoluta vidimus.
- h Mensium quoque suppressionem a sanguinis spissitudine ortam per Tertianam sublatam vidimus.
- i Tandem etiam infarctum lienis a Quartana relictum per Tertianam resolutum & curatum novimus: ut alia silentio prætereamus.
- 2 Si Febris hæc legitime procedit, & recte tractatur, tempore vernali sæpius quinto vel sexto Paroxysmo finitur: rarius vero ultra septimum extenditur.
- 3 Tempore vero autumnali etiam si convenienti Methodo tractatur, propter humidam & frigidam æris constitutionem, sæpius diutius durat.
- 4 Pari modo se res habet, si constitutio est epidemica, hæ enim semper longius tempus postulant, ob levissimas tamen causas ægroti recidivam patiuntur, ut id superiori anno observavimus, & hoc ipso anno vidimus.
- 5 In subjectis junioribus alias vegetis & antea laudabili sanitate gaudentibus sæpius solo regimine & Diætā tollitur.
- 6 Si legitima Methodo tractatur ac ægroti diætā simul observant, rarissime mala habet consecutaria, nisi corpus antea mala fuerit dispositum, aut labes in visceribus hæreat.
- 7 Perversa autem Methodo tractata, nempe per Venæsectiones subjecto minus convenientes, Vomitoria & Purgantia drastica &c. tota Febris facile turbatur ac non solum diuturna fit, sed etiam non raro Tumores pedum œdematosos, Cachexiam & Hydropem post se trahit.
- 8 Id quod eo certius contingit, si Medici post talia exhibita statim ad sacram Anchoram, Pulverem scil. Chin. Chin. aliæque Adstringentia confugiant; sic enim etiam si antea dicta non statim sequuntur, obstructionibus & Scirrhis viscerum, Febribus lentis & Hæcticis porta panditur.
- 9 Malum quoque fatum experiuntur ii, qui vel alias ad sudores proni, vel minime ad eos proclives, vel æstu graviore laborantes, per sudorifera volatilia & fortiora tractantur, vel enim in Febres acutas ruunt, vel in Inflammatorias vel in Hæcticas Febres incidunt.
- 10 Absentia sudoris in Tertiana morbum utpl. diuturniorem reddit, æstum auget & ad Febres continuas disponit.
- 11 Sudores vero post quemvis Paroxysmum placide, aut in subjectis humidioribus largius fluentes, morbum indies leviores reddunt, & tandem prorsus tollunt.
- 12 Sudores nocturni spontanei finita Febre in subjectis repletis adhuc aliquandiu durantes optimi sunt, quatenus humores superfluos evacuant.
- 13 Si vero negliguntur Febribus denuo tam intermit-

- 14 Sudores partiales in Tertiana nullius sunt usus, melioris vero indolis sunt universales.
- 15 Nonnunquam tamen sudores partium inferiorum in subjectis hæmorrhoidariis suo non carent usu.
- 16 Vomitus & Diarrhœa quo maturius in Tertiana apparent, eo breviori tempore morbum solum iri indicant.
- 17 Si vero præsentibus etiam ad eos indicia, tales excretiones non contingunt, eo diuturnior fit morbus & morbus etiam eo magis ingravescit.
- 18 Alvum in Tertiana liberam esse semper optimum est: clausa vero symptomata, præcipue cephalalgiam & anxietates præcordiales, auget.
- 19 Largum Urinæ profluvium morbum quoque in subjectis sudore carentibus leviores reddit.
- 20 Nisi Diætā in hac Febre exacte servetur & prudens medicatio applicetur, subsequentes Paroxysmi semper graviores sunt.
- 21 Si tres priores Paroxysmi sunt leviores, quartus utpl. fortius affligit.
- 22 Plethorici semper graviores in hoc morbo patiuntur symptomata, quam reliqui.
- 23 Eo graviores autem sunt omnia, si ante Febris invasionem Plethora per varias causas commota fuit.
- 24 Æstus in Tertianis Plethoricorum semper gravius urget & ad plures horas se extendit. Vidimus in talibus subjectis Paroxysmos usque ad triginta horas durantes.
- 25 Tales Febres ordinarie sunt anomalæ & ad continuitatem maxime inclinant.
- 26 Sudores hic ordinarie absunt & nisi mitissimo modo tractentur tales Tertianæ non raro degnerant in Febres inflammatorias.
- 27 In omni Tertiana æstus diu affligens sine præcedentibus per superiora aut inferiora, aut subsequenti- bus sudoribus, continuitatis suspectus est.
- 28 Appetitus insolitus auctus in Tertiana vel post eas nunquam bonus est; priori enim modo Febrem diuturniorem reddit, posteriori recidivæ viam sternit.
- 29 Oedemata pedum, quæ ordinarie vel malam diætā, vel perversam medicationem, vel morbi diuturnitatem, vel subjecti debilitatem, vel pedum nimiam refrigerationem &c. pro causa agnoscunt, si legitime tractantur, successive quidem possunt tolli per blanda laxantia, diuretica & diaphoretica, sed facile, nisi Diætā probe observetur, redeunt.
- 30 Febris si jam cessavit, aut suppressa fuit, si denuo redit, multum confert ad resolutionem œdematum, inpr. si medicamenta convenientia junguntur.
- 31 Motus corporis moderatus in loco temperato multum quoque contribuit ad felicem œdematum horum curationem.
- 32 Si Oedematibus post Tertianam jungitur color faciei cachecticus & durities abdominis cum intumescencia Hydrops ante fores est.
- 33 Oedemata per externa repellentia, discutientia credita, aut per fortiora interna evacuantia tractata pariter facile in Hydropem degenerant.
- 34 Sudores spontanei moderati partes inferiores affligentes successive cum euphoria tollunt Oedemata.
- 35 Oedemata Tertianariorum facilius solvuntur quam Quartanariorum.
- 36 Quo magis inveterata sunt Oedemata talia, eo difficilior curantur.
- 38 Urinam in Oedematibus imminui & obscuro colore tingi malum, Hydrops enim ante fores est.

## VI. Remedia.

- 1 Materiam crudam & viscidam in primis viis hærentem præparantia & ad excretionem disponentia: Salia neutra Tart. Vitriolatus, Arcan. dupl. Absorbentia Mat. Per Lap. &c. inpr. acido quodam saturata uti Conch. Citrat. &c. Incidentia Vegetabilia inpr. amara, Rad. Gent. Ari, Caryoph. Herb. Absinth. Cent. min. Card. bened. &c.
- 2 Præparatam si opus est evacuantia: Tart. emet. Rad. Ipecac. Specif. Jalap. Pulv. Cornach. Rhabarb. Mangel. Liq. aperit. miner. Sal cathart. amar. salia neu-



- tra majori dosi exhibita: aut quæ hisce tutoria sunt  
Pilul. Tart. Polychrest. Stahlianæ, Becherianæ.  
3 Diaphoresin excitantia; ꝑ diaphoret. Bezoard: mi-  
ner. Ess. alexiph. Mixt. simpl. Tinct. Bezoard. &c.  
4 Symptomata mitigantia; Succus Citri recens, Clyf-  
sus ꝑii, Tinct. Rosar. Flor. Bellid. Rob. aciduli fru-  
ctuum ut & eorum Sirupi ac ex hisce parati Julepi.  
Ungt. de Alabaistro Camph. &c. Vid. *Metb. Med.*  
5 Ventriculū & primas vias roborantia, uti supra  
laudata amara in Infusis Essentiis & Extractis.  
6 Motus febriles sistentia: Pulv. Chacaril. Chin Chin.  
Crocus ꝑtis ꝑiatius &c.

*Formula Remediorum.*

1 Pulvis præparans.

R. Tart. Vitriolat. Div. in 4. p. æq.  
Nitr. ꝑiat. an. ʒj. M. D. sing. 4. 6. horis.

2 Alius.

R. Sal cathart. am. ʒss. D. ut antea.  
Div. in 4. p. æq.

3 Alius.

R. Conch. citrat. Div. in 6. p. æq.  
Arcan. duplic. D. ut. antea.

Nitr. ꝑiat. an. ʒj.

4 Potio diaphoretica.

R. Aq. Card. Bened. Nitr. ꝑiat. a. ʒ ss.  
Flor. Acac. a. ʒij. Cinnab. ꝑij. ꝑj.  
ꝑ diaph. Sacch. perlat. ʒij.  
Matr. perl. D. sing. 3. horis cochl. ij.

5 Pilulæ laxantes.

R. Extr. Panchym. Cr. M. F. Pil.  
Pil. Stablii a. gr. XII. D. pro una dosi.  
Tinct. Tart. q. s.

6 Electuarium Febrifugium.

R. Conf. Ros. antiq. Extract. Gent. ʒj.  
Visceral. an. ʒvj. Sir. Cort. Ont. q. s.  
Pulv. Chacarill. ʒij. M. F. Elect.  
Cbin. ʒss. D. sing. 4 horis 2 cusp.  
Ari. ꝑij. cult.

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Si nullus morbus curatu facilis est, hic sane est, si legiti-  
ma Methodo tractatur, nihilominus tamen, pro-  
pter incertiam eorum qui eam tractant, sæpius ita  
pervertitur atque in pejus mutatur, ut postmodum  
peritissimis etiam Medicis crucem figat.
- 2 Optima & sanæ rationi conveniens Methodus est,  
si reliquis remediis præmittuntur digestiva & præ-  
parantia quæ materiam præparant & abstergunt ita  
ut postea eo commodius a Natura per Vomitus aut  
Diarrhœam, aut per remedia evacuantia, si opus  
est, expelli queat. Si hoc modo res instituitur, e-  
xinde sequentia fluunt commoda.
- a Vires scil. optime conservantur, quæ contraria  
Methodo, ubi per evacuantia drastica curæ ini-  
tium fit, maxime franguntur.
- b Morbus nullo modo in tranquillo suo cursu turba-  
tur, quod juxta communem Praxin frequen-  
tissime fit.
- c Frigus sub tali Methodo non adeo urget, æstus  
quoque mitior est, & sudor citius erumpit.
- d Vomitus spontanei & Diarrhœa longe facilius a  
Natura excitantur.
- e Alvi libertas semper conservatur.
- f Imo omnia symptomata, in aliis maxime urgentia  
longe sunt mitiora.
- 3 Et talia remedia digestiva dentur partim ante Paro-  
xysmum, partim die intermissionis mediocribus &  
repetitis, imo pro circumstantiarum diversitate ma-  
joribus etiam dosibus, si scil. vel anum aperire vel  
lenem laxationem instituere animus est. Interdum  
etiam cum fructu immediate ante paroxysmum &  
in ejusdem principio exhibentur, quando scil. ma-  
teria morbifica per se ad excretionem prona est,  
vel per remedia ad eam disposita; hoc enim modo  
sine ulla difficultate a natura excernitur & residuum  
denuo aliquo modo præparatur.
- 4 Si sitis in horrore urget, potus quoque concedatur,

sed calidus magis, quam frigidus: minime enim re-  
formidandæ sunt plebejæ illæ anicularum persuasio-  
nes, quæ etiam Medicorum, ex formulis Præcti-  
corum, cerebra & observationes cerebrinas irreple-  
re, quasi talis potus summe noxius sit: tantum  
enim abest, ut noxius sit, ut potius corpori summe  
conducat; quatenus materiam morbificam diluit,  
temperat & ad faciliorem excretionem disponit: &  
Natura corpori suo semper prospiciens consulto non  
vero per errorem sitim hancce excitat, ut materia  
febrilis aliquo modo corrigatur.

- 5 Cum vero interdum in subjectis maxime sensibili-  
bus horror & anxietas præcordiorum maxime ur-  
geant, ita graviora mala metuenda sint, huic quo-  
que prospiciendum est: Profunt tali in casu Spir. Vi-  
ni simpl. & rectific. Spir. Vin. Camph. Aq. Reg. Hung.  
aliaque spirituosæ non adeo volatilia; aut si hæc  
non arrident, ipsis substitui possunt Linimenta aut  
Balsama stomachica ex Ol. nucist. expr. & destill.  
ex Herb. fragrant. quæ scrobiculo cordis & dorso,  
imponi & inungi possunt.
- 6 Finito horrore & æstu incipiente concedatur potus  
sufficiens parvis tamen sed sæpius repetitis hausti-  
bus. Exhibeantur etiam diaphoretica fixa cum Ni-  
trosis & Absorbentibus, ut hoc modo non solum ni-  
mius æstus præcaveatur, sed etiam humores sensim,  
ad blandam diapnoen disponantur.
- 7 Si vero æstus nimium ingravescit, potui admiſce-  
antur acidula, uti sunt Spiritus acidæ minerales,  
quibus tamen merito præferuntur succi vegetabi-  
lium aciduli, inpr. vero succus citri recens suffi-  
cienti copia Aqu. simpl. mixtus quæ sanguineis ma-  
xime conveniunt. Nitrum quoque optime prodest,  
inpr. vero Cholericis & Melancholicis. Et per ta-  
lia remedia obtinetur etiam symptomatum mitiga-  
tio, ita ut tot ac tantis Balsamis, Unguentis, spi-  
ritibus aliisque curialibus minime opus sit. Si ve-  
ro urgente capitis dolore aliquid præscribendum  
est, sufficit Ungt. Alabastr. cum pauca Campho-  
ra.
- 8 Remittente aliquo modo calore detur moderata do-  
sis Mixt. simpl. aut Essent. alexiph. in vehiculo ca-  
lido; qua sumpta æger tranquillus sit & successive  
aliquid potus calidi assumat, ut hoc modo diapho-  
resis eo melius promoveatur.
- 9 Finito hoc modo Paroxysmo æger non statim etiam-  
si vires adhuc consent, lectum relinquat, sed ad-  
huc aliquandiu in eo permaneat, ne id quod ad-  
huc per diapnoen excerni debet, in corpore retinea-  
tur, hoc enim neglecto, insequens paroxysmus sem-  
per gravior est.
- 10 Die intermissionis continuentur Pulveres supra lau-  
dati digestivi sive præparantes, quibus Essentia a-  
lexipharmaca, si æstus alias admodum urget, par-  
vis & repetitis dosibus interponatur. Ubi vero su-  
spicio est, multum adhuc causæ morbificæ in primis  
viis latere soli pulveres præparantes continuen-  
tur.
- 11 Cum vero Præparantia materiam quidem abstergant  
& ad excretionem disponat, non vero ordinarie e-  
vacuent, lenia Laxantia die intermissionis exhibe-  
ri possunt eaque vel in forma Infusi, quando scil.  
ex Radic. & Herb. amaris & Fol. Sennæ parantur  
vel in forma Pilularum, cui fini potissimum inter-  
viunt Pilul. Tartaræ, Becherianæ, Stahlianæ a-  
liæque ex Extractis amaris & Gummatibus para-  
tæ.
- 12 Ubi Febris impetus mitescere incipit, & materia  
Febrilis sufficienter evacuata fuit, exhibeantur mo-  
tus febriles sistentia, quæ superius recensita fuerunt  
ex quibus omnium tutissima sunt Crocus ꝑtis ꝑia-  
tus & Pilulæ wildegansi veræ, quæ vero admo-  
dum raræ sunt.
- 13 Tandem etiam ad Ventriculi roborationem respici-  
endum est: id quod potissimum præstant Stomachi-  
ca amara & Carminativa, ut & Ess. ex hisce pa-  
ratæ, quales sunt Ess. Galang. Cort. Ont. &c. qui-  
bus addi meretur Tinct. ꝑt. Ludov.



VIII. *Cautelæ Prædicæ.*

- 1 Quod Cautelas Prædicas concernit, abstinendum est in hac Febre a multitudine remediorum. Nihil enim Naturam magis turbat, quam si Ventriculus multis, diversis & adversis remediis obruitur. pauca sed selecta remedia sufficiunt.
- 2 Nec etiam Vomitoria & Purgantia fortiora facile in usum trahantur.
- 3 Cum h. l. Vomitoriorum mentio fiat, merito quaeritur: sed hoc loco? utrum sint absolute necessaria? an vero certis tantum subjectis conducant? & an in hisce peculiare quid præstent? Qui vulgariibus imbuti sunt principiis & Praxin suam juxta aliorum modulum metiuntur, hic uno ore clamant evacuantia talia non solum summæ utilitatis, sed etiam maxime necessaria esse: & si quis contra talia mustitare audeat, novatoris titulo statim eum insigniunt. Quamvis autem hi quoad evacuantia conveniant in ipsa tamen Methodo adhuc differunt. Ponamus Methodam & omnia erunt clariora: laborat e. g. quis Febre Tertianâ, Medicus vocatus statim præscribit Pulverem emeticum, die scilicet vacuo, illo die quo Febris affligere solet ægroto commendatur Potiuncula ex Aquis destillatis & absorbentibus cum Sio diaphoret. aut antihæst Poterii; Die tertio æger purgatur Cerberotricipite aut Pulvere trium diabolorum; Sequenti die continuatur Potiuncula diaphoretica cui jungitur Potio confortans cum Ol. magno Scorp. Math. Ol. aliisque externis. Nec etiam negligitur Venæsectio etiam repetita. Hæc excipiunt Potiunculæ laxantes ex Manna aut etiam no. uli laxantes & tandem China Chinæ in Vino Burgundiano infusa exhibetur. Aliis vero hæc Methodus nimis est tædiosa, quare totam Methodum in compendium redigunt, & præmissis universalibus Vomitoriis, Purgantibus & Venæsectione statim Chinam Chinæ ad uncias usque devorandam præscribunt: & talem Methodum stricte servant, licet oedemata & Hydropes, superveniant: hæc enim non Methodo, sed malo viscerum statui, adscribunt. Disputant quoque hi Vomitoriorum Patroni utrum talia remedia die intermissionis, an vero ipso die quo Febris affligit exhiberi debeant: plerique militant pro die intermissionis, paucissimi vero pro alterno. Quod Ejam decisionem hujus quæstionis concernit, statuo Vomitoria & Purgantia non esse absolutæ necessitatis
- a Quoniam magnam quidem irritationem in primis viis excitant, materiam autem morbificam minime in totum tollunt, unde etiam hisce ipsis Paroxysmi in multis prorsus non mitigantur, sed potius exasperantur. Agunt talia remedia contra intentionem Naturæ, quæ successive & per repetitos Paroxysmos materiam illam removere conatur.
- b Ipse morbus in tranquillo suo cursu turbatur, ita ut sæpius postea Febris nullum amplius certum typum formet, nec etiam paroxysmi regulariter procedant, sed Febris exinde prorsus anomala fiat.
- c Imo in subjectis Plethoricis Febres tales sæpius propter emetica & Purgantia degenerant in continuas quæ utpl. mali moris sunt & facile cum Purpura miliarî complicantur.
- d Sæpius etiam per talia drastica remedia Febris ita frangitur, ut prorsus nulli formentur amplius Paroxysmi, sed calor lentius vires indies magis frangit & corpus depascit, ita ut tandem Hæctica sequatur.
- e Ægroti hoc modo tractati ordinarie superato jam morbo diu languere coguntur, cum e contra alii diversa Methodo tractati vires cito recuperent.
- 4 Eo majus dampnum autem expectandum est si Vomitoria eo ipso die, quo Febris affligere solet, exhibentur: hæc enim Paroxysmum accelerant,

unde dum remedium operatur & Natura Vomitus quoque excitat, sæpissime sequuntur Hyperemeses, aut Natura ita fatigatur & debilitatur, ut Lipothymia graves sequantur.

- 5 Omnium vero pessime agunt, qui date uno vel altero Vomitorio statim ad sacram Anchoram Chinam Chinæ confugiunt, quoniam Oedemata & Hydropes, infarctus & indurationes viscerum, Febres lentæ, Hæctica exinde sequuntur. De China Chinæ paulo inferius dicemus. Nemo tamen putet, me Vomitoriorum usum prorsus improbare, legitimo enim tempore exhibita suo non carent usu v. g. quando quis ob cibos malæ digestionis in Tertianam incidit, vomitorium exhibitum cruditates illas removendo sæpius etiam simul ipsam Febrem tollit. Quoad Purgantia improbo abusum & continuationem eorum, quoniam Febris nimium protrahitur: sufficiunt lenia laxantia, si materia antea per temperantia debito modo præparata fuit.
- 6 Pariter abstinendum est a Venæsectione. ut pote quæ in hac Febre prorsus nullam directam habet utilitatem, & si aliquid præstat, id potius respectu subjecti Plethorici fit; qui vero in omnibus subjectis eum instituere vult, stultum potius aut vanum Empiricum, quam Medicum agit.
- 7 Præcipue vero talia remedia fortiora vitanda sunt in subjectis sensibilibus & teneris, hæc enim lenissima Methodo tractari amant.
- 8 Evacuantes in Tertiana nunquam nisi probe præparata & ad excretionem disposita materia dentur; nihil enim movendum est, nisi sit mobile.
- 9 Quoad præparantia, magis semper conducunt salia neutra cum absorbentibus, inpr. acido citri saturatis quam Vegetabilia acria.
- 10 In subjectis tamen Phlegmaticis commode reliquis remediis admiscantur.
- 11 Sistentia nunquam exhibeantur, nisi materia antea probe præparata & evacuata fuerit & Febre declinante, sive quando Paroxysmi & leviores & breviores fiunt.
- 12 Si vero nimis mature exhibentur, graviora Febres sequuntur mala, Oedemata. Hydropes &c.
- 13 Ventriculorum roborantia remedia, inpr. acria & calida, si præpostere usurpantur, ad Hæcticam disponunt.
- 14 Tumores pedum nisi legitimo modo tractentur facile degenerant in Hydropem: optima hic remedia sunt, abstinencia a nimis cibis, motus corporis moderatus, incidentia & resolventia mitiora cum blandis laxantibus.
- 15 Si Febris hæc degenerat in lentam, Extracta amara, Infusa & Pilulæ Becherianæ optime conveniunt ad revocandam Febrem; vitanda tamen sunt remedia nimis acria inpr. vero volatilia, quoniam morbum exasperant.
- 16 Arsenicum purum quocunque etiam modo occultetur, nunquam est remedium boni viri, an vero ita corrigi queat, ut revera fiat specificum, iis relinquo, quibus major quam mihi in talia data est potestas.
- 17 Superata Tertianâ vitetur abusus ciborum ac aer frigidus & humidus.



## CAPUT XXVI.

D E

*Febris Tertianæ nothæ sive anomali & malignæ.*I. *Definitio.*

- 1 **F**ebbris Tertianæ nothæ est species Febris intermittentis in qua Natura materiam quandam noxiam in primis viis & interdum in Massa sanguinea hærentem expellere & simul quoque vitium quoddam sanguinis corrigere nititur.
- 2 Maligna vero est, quæ quidem typum tertianarium, sed simul materiam malignam conjunctam habet, quam Natura per motus febriles expellere conatur.

II. *Differentia.*

- 1 A Tertianæ legitima: per signa superius recensita & hic paulo infra recensenda.
- 2 Ipsa Febris anomala, differt diversis gradibus:
  - a Nam primo est tantum simpliciter anomala, ita ut cum Tertianæ vaga quoad maximam partem habeat convenientiam.
  - b Nonnunquam vero symptomata gradu ordinaria & legitima longe superant & insignem fatigationem post se relinquunt, quæ etiam die intermissionis continuat.
  - c Ordinarie autem horror est brevis & mitis, æstus vero ultra consuetum terminum extenditur.
  - d Nonnunquam mali est moris & ad efflorescentias inclinatur.

III. *Signa*1 *Anomalæ:*

- a Invadit ordinarie uti Tertianæ legitima cum horrore.
- b Quem præcedunt quoque alia signa, contractio dorsi spastica, aliaque superius recensita.
- c Hic tamen horror brevi tempore finitur, imò interdum prorsus superficiarius est.
- d Adest quoque Nausea, quæ tamen rarius in actuales vomitus erumpit: aut etiam actualis vomendi conatus adsit, nihil tamen excernitur.
- e Horrorem statim excipit æstus insignis, in quo symptomata omnia sunt graviora, quam in Tertianæ legitima.
- f Æstus hic fere similis est calori acutarum & ad decem, duodecim, imò viginti horas & diutius adhuc se extendit.
- g Æstus utpl. est aridus cum siccitate linguæ, gravi capitis dolore &c.
- h Sudores vel sunt nulli vel inordinati, ita ut ægroti nullum exinde sentiant levamen.
- i In subjectis humidioribus sudores sæpius sunt admodum largi, sed ægrotos insigniter debilitant.
- k Post Paroxysmum nullam prorsus sentiunt refocillationem ægrotantes, sed summa lassitudo cum siti, capitis dolore, agrypnia &c. urgent.
- l Ipsi Paroxysmi ordinarie nullum statum tempus observant, sed modo summo mane, modo interdiu, modo noctu affligunt.
- m Et si levissimus in Diætâ error accedit, Paroxysmi facile duplicantur, ita quidem ut finito alter statim incipiat.
- n Paroxysmi quoque progrediente morbo non sunt æquales, interdum enim hic est admodum mitis, alter vero gravissimus.
- o Numerus quoque Paroxysmorum nullam hic habet legem, uti in Tertianæ legitima, ubi Febris legitime procedens vel ante septimum Paroxysmum, vel paulo post eum profligari po-

test, hic autem numerus est plane indefinitus & ordinarie Febris ad aliquot septimanas & amplius se extendit.

p Morbo finito languor adhuc diu ægrotos affligit, & non nisi elapso multo tempore vires recuperant.

2 *Malignæ.* Vid. *Histor. Morb. Urat. Tom. II. p. 134.*

- a Invadunt quoque circa meridiem cum horrore sed non adeo gravi.
- b Quem excipit æstus satis lenis.
- c Qui tamen statim cum insigni lassitudine & virium prostratione junctus est.
- d Etsi autem mitis sit diutius tamen protrahitur & ad quintam vel sextam horam sequentis diei se extendit.
- e Pulsus in Paroxysmo semper summe est languidus.
- f Circa dictum tempus hora scil. sexta secundi diei Febris cessat & plenarie intermittit.
- g Quamvis autem hæc contingat, nihilominus maxima virium prostratio superest, & artus omnes quasi contractos esse ægroti conquerruntur.
- h Tertio die versus vespeream levis quidam horror dorsum percurrit.
- i Quem magnus statim sequitur æstus, qui per totam noctem usque ad octavam vel decimam quoque horam durat.
- k Et sic denuo sequitur vera Febris intermissio.
- l Sequentibus tribus aut quatuor diebus æstus, debilitas, virium prostratio cum reliquis symptomatibus augentur.
- m Lingua toto morbi cursu muco viscido (albo plerumque) est obducta.
- n Nausea gravissime urget.
- o Quam etiam in quibusdam vomitus sequuntur.
- p Alios vero inanes vomendi conatus, quam maxime torquent cum insigni Cardialgia.
- q Alii animi deliquiis corripiuntur.
- r Adest quoque continua inappetentia & nausea ciborum.
- f Sitis quamvis sit ingens non tamen est clamorosa.
- t Primis tribus aut quatuor diebus dolor capitis admodum urget, qui tamen postea aliquo modo imminuitur.
- u Agrypnia adest continua nullis cedens remediis.
- x Urina in principio morbi est fere naturalis, in incremento tamen fit saturate rubra & in statu plerumque turbida est.
- y Alvus ordinarie est adstricta.
- z Interdum Purpura sub maximis anxietatibus & jectigationibus erumpit.
- aa Hæc tamen symptomata pro diversa annorum & temporum constitutione quam maxime variant.

IV. *Subjectum.*1 *Tertianæ anomaliæ.*

- a Omnes illi qui alias Tertianæ corripi solent.
- b Præ ceteris tamen Plethorici.
- c Ut & ii, quorum sanguis multis impuritatibus scatet.
- d Labe visceris cujusdam incipiente laborantes.

2 *Malignæ.*

- a Hæc nulli parcit ætati, sed ubi epidemice grassatur, omnis generis homines corripit.
- b Magis tamen adollescentes, juvenes & viros, quam senes & pueros.
- c Frequentius quoque viros quam feminas affligit.
- d Præ ceteris ea corripiuntur homines sensibiles, ad iram proni & meticulosi.
- e Maxime quoque proni sunt ad eam Plethorici & Cacochimici.

V. *Prognosis.*1 *Febris Anomalæ:*

- a Tertianæ anomala per se quidem nullum vitæ periculum infert, longe tamen gravius semper affligit, quam legitima.
- b Nisi Diætâ exacte servetur & perite tractetur hæc



hæc Febris facile degenerat in Febrem. continuam.

c Ordinarie Febris hæc diutius durat, quam Tertianæ legitima.

d Nonnunquam, si debita Methodo tractatur, transit in Tertianam legitimam, quod optimum est.

e Quo magis calidis tractatur, eo certius vel in Febres inflammatorias, vel Hæticam transit.

f Id quod etiam contingit, si sacrum illud remedium China Chinæ ægrotis exhibetur.

g Sudores mature in hoc modo erumpentes morbum leviores reddunt.

h Nimii autem & coacti ægros admodum debiles reddunt, & ægri diu post morbum etiam superatum languere coguntur.

i Neglecti vero aut suppressi æstum cum omnibus symptomatibus augent ac viam ad continuitatem sternunt.

## 2 Febris Malignæ:

a Tertianæ hæc maligna admodum rara est, ita ut etiam plures eam negaverint: interim tamen Peste ingruente, imo etiam sine ipsa a non paucis observata fuit.

b Uti omnes malignæ insigni periculo non vacant, ita quoque hæc facile ægros jugulat.

c Periculum tamen hic tantum non est ac in aliis malignis stricte sic dictis, de quibus superius actum fuit.

d Semper tamen respiciendum est ad constitutionem epidemicam, uno enim anno plus periculi involvit, quam in altero.

e Quo magis est contagiosa, eo majori etiam periculo exponit ægrotantes.

f Quo magis vires sunt prostratæ & actiones rationales sunt turbatæ, eo periculosior est status.

g Continuatæ investigationes in lecto graves Cardialgiæ & Lipothymix cum deliriis, pessimum quoque indicant statum.

h Petechiæ aut Purpura præmature in hoc morbo erumpentes semper peioris sunt indolis, quam si tardius prodeunt.

i Alvus adstricta morbum semper graviores, aperta vero leviores reddit.

k Febres legitime tractatæ hæc post septimum diem interdum acquirunt iterum sensibiles intermissiones & mutantur vel in Tertianas, vel in Quartanas degenerant.

## VI. Remedia.

1 Temperantia: Lap.  $\omega$ . Matr. Perl. Conch. Citrat. aliaque Absorbentia acido quodam saturata. Nitr. depur. regenerat.  $\zeta$ iat. Perlat. Tart. Vitriolat. Arcan. dupl. Succ. Citr. Rob. Cydon. Ceras. acid. Rib. Berb. Sirupi aciduli Tinct. Rosar. Bellid. Clyff.  $\zeta$ ii. Spir. Nitri Vitrioli Emulsiones.

2 Diapnoica:  $\zeta$  diaphoret. Bezoard. mineral. Reg.  $\zeta$ ii medicinal. Ess. alexiph. Scord Pimpin. alb. Mixt. simpl. Tinct. Bezoard. parum camphorata. Infusa calida ex Plantis & Radicibus moderate bezoardicis.

3 Symptomatibus prospicientia: Clysteres, lenia laxantia, Emulsiones aliaque temperantia, confortantia sive Analeptica, blanda sopientia externa, quæta continentia in lecto, bonum regimen, rationalis Methodus.

4 Primas vias roborantia: Amara, blanda Adstringentia, &c. Vid. Tab. præced.

### Formula Remediorum.

#### 1 Pulvis temperans.

Rx. Conch. citr. Cinnab.  $\zeta$ ii.  $\zeta$ i. M.  
Matr. perl. Div. in 6. p. & q.  
Nitr. depur. a.  $\zeta$ ij. D. sing. 4. horis.

#### 2 Potiuncula temperans

Rx. Aq. Borrag. Tinct. Rosar.  $\zeta$ ij.  
Bugloss. Succ. citr. rec.  $\zeta$ ss.  
C. C. citr. a.  $\zeta$ ij. Sir. ceras. acid.  $\zeta$ j. M.  
Lap.  $\omega$ .  $\zeta$ j. D. coch. ii. iij.

#### 3 Alia simul analeptica.

Rx. Aq. Scorzon. Rob. Cydon.  
Ceras. nigr. Berb.  
Naph. a.  $\zeta$ ss. Ceras. acid. a.  $\zeta$ ij.  
Cinnam. cydon.  $\zeta$ j. Sir. Granat.  $\zeta$ vj. M.  
Succ. citr. rec.  $\zeta$ ss. D. ut antea.

#### 4 Pulvis diapnoicus.

Rx.  $\zeta$  diaph. Cinnab.  $\zeta$ ii a. gr. xv. M.  
Matr. perl. D. sing. 4. vel 5. horis 2.  
Nitr.  $\zeta$ iat. a.  $\zeta$ ij. cusp. cultr.  
Reg.  $\zeta$ ii Medicin.

#### 5 Alius Bezoardicus.

Rx. Matr. Perl. Pulv. Bezoard. Senn.  
C. C. philos.  $\zeta$ j. M.  
 $\zeta$  diaph. a.  $\zeta$ ss. D. ut antea.

#### 6 Potiuncula diapnoica.

Rx. Aq. Galeg. Conch. citrat.  
Scord. Nitr.  $\zeta$ iat. a.  $\zeta$ ss.  
Scorzon. Extr. Chacarill. gr. vj.  
Ceras. nigr. a.  $\zeta$ j. Sir. contraj.  $\zeta$ ss. M.  
Bezoard. min. D. sing. 3. vel 4. hor. coch. iij.

#### 7 Mixtura alexipharmaca.

Rx. Essent. Alexiph.  $\zeta$ ij. D. 30. gutt. mane & versus  
Scord. meridiem.  
Pimp. alb. a.  $\zeta$ j. M.

#### 8 Infusum diapnoicum.

Rx. Herb. Scabios. Diptamn.  
Galeg. Vincetox. a.  $\zeta$ ss.  
Bellid. a. mj. Inc. infund. in Aq. ferv.  
Thee a.  $\zeta$ ij. fumatur calide.  
Rad. Pimp. alb.

## VII. Methodus Medendi.

### 1 Febris anomala:

a Febris anomala respectu remediorum fere eadem exposcit remedia ac Febris Tertianæ legitima, majori tamen cum circumspectione hic usurpanda sunt.

b Quare primo exhibeantur Præparantia & Temperantia, ut æstus ad continuitatem vergens ita temperetur, ne Febris continua sequatur.

c Ipsa autem temperantia non nimis diu usurpentur, sed mature ipsis admisceantur Diapnoica, ut diaphoresis in hoc morbo summe necessaria excitetur: hac enim præsentem morbum non solum levior redditur cum symptomatibus, sed etiam breviori tempore finitur.

d Semper tamen attendendum est ad Paroxysmos & remedia, partim ante eum, partim in ipso convenienti Methodo exhibenda sunt: hoc enim neglecto frustranea sunt omnia.

e Si vero Paroxysmi sunt ita vagi, ut prorsus nullum ordinarium observent tempus ad Paroxysmos solum attendendum est, & iis finitis, partim præparantia sola, partim alexipharmaca exhibenda sunt: ita tamen ut Alexipharmaca reliquis remediis semper interponantur.

f Talia Alex. dicta Methodo convenienti usurpata insignem habent usum, quatenus sanguinem penetrando, id quod in Massa Sanguinea hæret, & continuitati ansam præbet, sensim remonent.

g Si sudores erumpere incipiunt, quæta in lecto continentia & potus calidus frequenter haustus ad ejus continuationem optima sunt remedia.

h Alvus uti sæpius est clausa sive adstricta admittit usum Clysterum aut blandorum laxantium, inpr. die intermissionis exhibitorum.

i Hæc omnia si probe observentur, Febris anomala vel perfectum exhibebit typum tertianarium, facile per remedia convenientia superandum, vel successive, fluentibus rite sudoribus, cessabit.

### 2 Febris malignæ.

a In Cura hujus Febris respiciendum est potissimum ad genium ejus, an scil. sit constitutio epidemica & cujusnam indolis sit malignitas Febris.

b Si constitutio est epidemica ante omnia videndum

Gg dum



dum est, quænam remedia ægroti commode ferant, & quænam Medendi Methodus ipsis conveniat.

c In genere tamen in principio & progressu morbi exhibeantur blanda Diapnoica cum Alexipharmacis.

d Quibus, si necessitas id exigit, blandum laxans præmitti potest, quod admodum proficuum, vid. *Neweranzius de Purpura curatione* p. 413 deprehenderunt Medici Uratislavienfes.

e Quoad Bezoardica & Alexipharmaca illa consistunt ex diapnoicis fixis bezoardicis & Nitro, dentur si intermissio aliqua observatur, in Paroxysmo interpositis humectantibus & analepticis & in declinatione Essentia alexipharmaca Stahlî cum Ess. Scordii mixta.

f Eadem etiam Bezoardica cum Nitrosis una vel altera hora ante Paroxysmum cum fructu exhiberi possunt, quoniam humores disponunt, ut sudor postea eo facilius sequatur.

g Quando vero vel nulla vel obscura observatur intermissio, Essentia modo laudata detur bis tempore antemeridiano, hora scil. quinta & undecima: Pulvere vero bezoardici hora quarta pomeridiana & nona vespertina.

h Et hæc remedia tam diu continuanda sunt, donec iterum sensibiles observentur intermissiones ac morbus sensim sensimque ad finem tendat.

i Tranquillitas etiam in lecto ægrotis post sumpta remedia semper commendetur, ut sudor eo melius erumpere queat, ab hoc enim ægroti salus dependet.

k Finito morbo non statim desistatur a remediis, sed Essentia alexipharmaca aliquandiu adhuc continuetur mane scil. & vespere, cui, si ægroti adhuc sunt admodum debiles, Analeptica jungantur cum gelatinosis aliisque nutrientibus.

l Tandem detur blandum laxans, cujus ope si forsan sordes in primis viis hærent, eas removeantur.

#### VIII. Cautela Præctica.

##### 1. Febris anomala;

a In tota cura hujus Febris cautissime procedendum alias enim facillime in continuam degenerat.

b Morbum autem huncce quam maxime turbant, sacra illa Universalia, quæ secundum Methodum multorum in febribus aliisque morbis specificis Lapid. scil.  $\Sigma$  C. C. Philos. Terr. sigill. & diaph. aliisque hujus generis præmitti solent.

c Quemnam usum Vomitoria hic habeant, ipsa sana ratio dicitur; scil.

1 Materiam in hisce Febribus jam satis agilem in actum deducunt, ut eo facilius corporis nocere queat; si materia esset aliquo modo correctæ, posset aliqualis excusatio locum habere, crudam autem cum impetu evacuare velle, contra rationem & experientiam est.

2 Vires statim ab initio frangunt, ita ut Natura morbo ferendo impar sit.

3 Magnas turbas excitant in Massa Sanguinea, & Naturam a scopo suo, quem h. l. intendit, revocant, ita ut postea vel nulli vel insufficientes sequantur sudores, qui tamen in hoc morbo maxime necessarii sunt.

4 Omnia symptomata inpr. Cephalalgiam, graviora reddunt.

d Idem judicium ferendum est de Purgantibus, præsertim si aciora fuerint, si scil. e. g. Cerberus triceps sive Pulvis trium diabolorum ad  $\mathfrak{z}$ ss. cum Tart. emet. gr. ij iij mixtus præscribitur; quæ quidem remedia apud ignarum vulgus, quod de præstanti remedii ex numero sedum judicium fert, magnæ sunt fidei, Medici autem talia Agyrtis & Circumlatoribus relinquunt.

e De Venæsectione non opus est ut multa dicamus, quoniam alibi jam locuti sumus de ejus abusu & vero usu, sufficit saltem innuisse, in tali Febre nullam esse indicationem quæ eam urgeat.

f Remedia calida alexipharmaca hic quoque summe sunt noxia, quatenus æstum quam maxime augment, Inflammationes excitant, aut Purpuram miliariam producant. Interim tamen modernis temporibus, ubi quivis morbi, quorum legitima diagnosi aliquo modo difficilis est, aut ubi vel anomala vel gravia symptomata occurrunt, pro malignis habentur, ad hæc remedia statim confugiunt Medici, eaque largioribus dosibus cum volatilibus mixta exhibent, quo autem de fructu mortui testantur.

g Abstinentum quoque est in hisce Febribus a nimis refrigerantibus & incrassantibus, hæc enim sudorum excretionem impediunt, unde postea in lentas mutantur, quæ non nisi elapso diuturno tempore cum magno labore curari possunt.

h Reliquas Cautelas tam quoad regimen, quam quoad Dietam, prudens Medicus secundum circumstantias occurrentes ipse annotare & noxia prævenire poterit.

##### 2. Febris maligna;

a In hac Febre propter complicatam malignitatem majori adhuc circumspectione opus est, quare Medicus ad omnia probe attendat, nec se facile seduci patiatur.

b Vomitoria non præscribat, nisi forsan constitutio epidemica & factæ jam experientiæ eorum usum suadeant, quando scil. malum est a contagio per salivam communicato & in Ventriculo magnas molestias excitat: positus enim talibus circumstantiis Vomitoria sæpius admodum proficua fuisse, Observationum Scriptores testantur: sed sint semper lenissima & in primo statim principio exhibeantur; sed cum Medici rarius in principio vocentur, tempus talibus remediis utendi ut plurimum præterlabitur.

c Quoad Purgantia ea studiose, inpr. fortiora, vitet, sufficiunt, si necessitas aliquid utendum suadet, lenissima laxantia.

d Venæsectio uti in nulla Febre maligna aliqualem usum habet, sed potius insignia damna infert, ita & hoc loco studiose fugienda est.

e Quo lenior est Methodus in hac Febre, eo magis ab omnibus alexipharmacis, volatilibus aliisque commoventibus abstinendum est. Reliquas Cautelas vide supra sub morbis malignis.

## C A P U T XXII.

### D E

#### Febre Quartana.

I. *Definitio.* **Q**uartana est species Februm intermittentium qua Natura quarto quovis die materiam quandam noxiam circa viscus quoddam hypochondriorum hærentem, per motus auctiores corrigere & expellere & læsionem dicti visceris prævenire nititur.

##### II. *Differentiæ.*

1 Quomodo a reliquis intermittentibus differat, ipsa nomina docent.

2 Alia est *simplex*, alia continua de qua inferius peculiari Tabula.

3 Alia porro est *simplex*, quæ quarto quovis die affligit, alia *duplex*, alia *triplex*, de quibus seq. Tabulæ.

##### III. *Signa.*

1 Invadit ordinarie tempore autumnali, si vero alio tempore observatur, sunt adhuc reliquæ Quartanæ prægressæ.

2 Antequam ægrotos corripiat, sentiunt insignem corporis languorem.

3 Postea affligit cum insigni frigore more aliarum intermittentium, non tamen adeo horrent ægrotantes, sed potius rigent: quamvis in non paucis observaverim tantum horrorem cum tantis artuum succus-



cussationibus, ut totus lectus exinde commotus fuerit.

- 4 Frigus hocce invadit ordinarie ab hora secunda pomeridiana & ad duas horas se extendit.
- 5 In hac Febre nec Vomitus, nisi Ventriculus cibis malæ digestionis oneratus sit, observatur.
- 6 Calor hic tantus non est ac in reliquis intermittentibus, unde etiam symptomata non adeo urgent.
- 7 Dolor enim capitis saltem est obtusus cum perturbatione capitis vertiginosa.
- 8 Æstus hic non est diurnus & ultra sex horas vix se extendit: imo morbo progrediente una vel altera hora absolvitur.
- 9 Æstus quoque ordinarie est siccus & aridus, unde etiam rarissime sudor post eum erumpit. Observavimus tamen in multis, præcipue junioribus & temperamenti humidioris, copiosos sudores post septimum vel octavum Paroxysmum, qui etiam in quibusdam per integrum mensem singulis noctibus erumpebat, ita ut indusia ter, quater mutare cogarentur.
- 10 Alvus utpl. est clausa & adstricta.
- 11 Finitur hoc modo Paroxysmus & quarto quovis die redit, remanet tamen sæpius insignis lassitudo totius corporis, ipsa ossa quasi penetrans: quamvis non pauci dentur, qui superato Paroxysmo de nulla prorsus molestia conquerantur, sed ad pristinos labores statim redeant.
- 12 Appetitus in hac Febre sæpius est admodum laudabilis ita ut sanorum nullo modo cedat: nonnunquam etiam nimis, quam par est auctus est: imo interdum etiam in ipso Paroxysmo ægri insignem habent appetitum, qui ad voracitatem usque se extendit. Novi hic loci fabrum lignarium, qui cum uxore sua Quartana correptus erat: hi tempore Paroxysmi panem recentem & calidum anxie desiderabant, & cum aliquoties ab adstantibus ipsis concederetur, integrum sex librarum panem cum summo appetitu devorabant: tandem tamen partim morali discursu, partim convenientibus remediis a chronico hocce malo liberabantur.

#### IV. Subjecta.

- 1 Morbus hicce frequentius affligit viros & senes, quam juniores, in quibus aliquo modo rarior est.
- 2 Prorsus tamen ab eo non immunes vivunt, si multos in Diæta errores commiserint, & postea tempore autumnali injurias aeris externi experti fuerint.
- 3 Infantes omnium rarissime vel prorsus non corripiuntur, nisi forsan epidemica constitutio aliquid contulerit.
- 4 Femine hystericæ multa incommoda in visceribus Hypochondriorum passæ.
- 5 Mensium ataxia laborantes.
- 6 Ut & Hypochondriaci ac Hæmorrhoidarii propter debilitata hypochondria.
- 7 Homines sanguinis spissitudine laborantes.
- 8 Quibus consuetæ excretiones humorum male procedunt.
- 9 Viscerum debilitate in abdomine laborantes.
- 10 Multum pituitæ sive materiæ viscidæ in sanguine habentes.
- 11 Vitam sedentariam amantes & speculationibus nimium dediti.
- 12 Mœrore & tristitia sæpius affecti.
- 13 Diæta cruda abutentes.
- 14 Quibus aliæ Febres intermittentes male curatæ fuerunt.
- 15 Inpr. vero ad eam inclinant Melancholici, & qui de eorum temperamento multum participant.
- 16 Corpus calidum inpr. vero abdomen in aere frigido & humido, qualis est Autumnalis, refrigerantes.
- 17 Interdum etiam hac Febre corripiuntur homines si ulcera antiqua ipsis consolidantur, aut scabies retropellitur.

#### V. Prognosis.

- 1 Febris hæc legitime decurrens & conveniente Methodo tractata per se quidem non est periculosa, ast ubi error committitur, alii sequuntur morbi, qui lentum quidem, sed funestum habent exitum.

- 2 Quartana merito pro Medicorum scandalo habita fuit, quoniam, etiam si optima Methodo utaris nihilominus admodum diuturna est: ægroti enim diuturnitatis pertæsi raro exactum servant vitæ regimen: ubi vero bona Methodus & bonum regimen concurrunt, potest etiam breviori tempore curari, nisi jam labes visceris subit.
- 3 An vero juxta computum Sydenhamii semper sex menses sequantur ad perfectam curationem, merito dubitatur, si enim experientiam consulimus ea contrarium suadet, dum multi elapso saltem unico mense perfecte curati fuerunt: quæ autem postea sequuntur recidivæ, eæ potius malo regimini & ægrotantium meticulositati adscribendæ sunt: præparetur solummodo materia debito modo, & commode e corpore evacuetur, & sic omnia bene se habebunt. Ubi tamen denuo merito excipitur labes visceris.
- 4 Si ver est humidum & pluviosum aut si Autumno est similis ac tertianæ plures affligunt homines, Quartana quoque non adeo est rara, sed subjecta disposita invadit.
- 5 Autumnales tamen Quartanæ semper curatu sunt difficiliore, quam Vernales, quatenus Autumnales sæpius ad vernum usque tempus durant, quo tempore demum curantur: frigus enim hybernium humores condensat, adeoque necessariam causæ morbificæ resolutionem & excretionem impedit: tempore autem vernali, ubi ad serenitatem & calorem aeris humorum naturalis fit depuratio, curatio longe faciliore est.
- 6 Quamvis reliquæ Febres, etiam gravissime, non raro sponte sine concursu Medici curentur, Quartana tamen rarissime a Natura sola curata legitur: imo quo altius agit radices, eo minus tam per Naturam, quam per artem tolli potest.
- 7 Quoniam in Quartana rarissime spontaneæ occurrunt excretiones, hinc etiam curatio tam difficilis & morbus adeo diuturnus est: omnes enim Febres, si salutariter procedere debent, amant excretionem & sine hisce non solvuntur.
- 8 Quartanæ præ ceteris recidivæ maxime obnoxia est, quod inpr. contingit, si præmature per Chinam Chinæ sistitur, aut ægroti appetitui nimium indulgent.
- 9 Quoniam Natura in hac Febre lento gradu procedit, ideo etiam fortiora evacuantia, vomitoria, Purgantia, Volatilia &c respuit, quatenus talia remedia vel morbum diuturniorem reddunt, vel labem visceris metuendam inducunt, vel Febrem in continuam aut Lentam vel Hæcticam convertunt.
- 10 Quartana illegitime tractata facillime Scirrhus vel Hepatis, vel lienis, quod utpl. fit, post se trahit.
- 11 Imo non raro Oedemata pedum, in Hydropem degenerantia, Tussis sicca chronicæ, Asthmata, utpl. incurabilia, sequuntur.
- 12 Nonnunquam, si legitime procedit ac prudens methodus adhibetur, salutaris quoque alias sequitur effectus, dum prægressi Hypochondriaci affectus tolluntur.
- 13 Tumores œdematosi Quartanam sequentes admodum sunt pertinaces & hoc ipso indolem Febris sequuntur, quare remedia incidentia & resolventia cum lenibus laxantibus diu continuanda sunt.
- 14 Quæ autem præsentem adhuc Febrem occurrunt, facilius solvuntur, quatenus motus febriles aliquid ad eorum dissolutionem contribuunt.
- 15 Si Quartanæ per præmaturum usum Chinæ Chinæ suppressæ fuerunt, & sequuntur pedum œdemata, eo difficilius curantur & eo facilius in Hydropem degenerant.
- 16 Scirrhi post Quartanam semper mali sunt ominis, quamvis enim diu subsistant, & nullas adeo magnas molestias creent, certissime tamen post se trahunt gravia symptomata Hæcticam, Hydropem &c.
- 17 Si Febris denuo recrudescit, quod tamen raro contingit, tales Scirrhi recentiores, concurrente convenienti Methodo, interdum solvuntur.
- 18 Si autem sunt inveterati, res utpl. desperata est, quoniam remediis Scirrhus resolventibus destituimur.



- 19 Scirrhum recentem a Quartana relictum, sed adhuc recentem per Febrem acutam cui Petechiæ superveniebant, solutum fuisse observavimus.
- 20 Quo magis appetitus urget in Quartana & ægroti eidem indulgent, eo diuturnior fit Febris.
- 21 Scabies humida sæpius boni est ominis in Quartana quando nimirum causa morbifica ad peripheriam corporis deponitur: sicca autem cum Cachectico corporis habitu mala est.
- 22 Icterus Quartanæ superveniens rarius est boni ominis, hepatis enim labes subest.

VI. *Remedia.*

- 1 Incidentia & Resolventia, tam mineralia quam vegetabilia: Salia neutra Tart. Vitriolat. Arcan. duplic. Nitr. ♂ iat. Salia fixa vegetabilium, Sal Cent. min. Absinth Genist Onon. Card. benedict. Liq. Terr. fol. Tart. Tart. solub. in Infus aut Decoct. pro ordinario. Omnes Radices & Herbæ incidentes, præcipue vero amaræ: Rad. Gentian. Caryophyll. Pimpinell alb. Vincetox. Ari. Galang. Zedoar. Herb. Cent. min. Card. bened. Absinth Fumar. Trifol. Fibr. Gummata quoque resolventia, Essentiæ ex Radic. & Herb. incidentibus & amaris, Pilulæ ex Extractis amaris & Gummatis paratæ, Becherianæ, Stahlianæ &c. Porus & motus sufficiens.
- 2 Alvum apertam servantia & materiam præparatam successive evacuantia: uti sunt Infusa ex Radicibus & Herb. modo dictis ac laxantibus præparata cum Melanagogis præcipue Rad. Helleb. Pilulæ incidentes & laxantes, quales sunt Tartareæ, de Ammoniaco, aut modo allegatæ Becherianæ, aliaque juxta hunc modulum paratæ.
- 3 Viscera infimi ventris roborantia: uti sunt præter supra laudatas Rad. & Herb. Stomachica & Carminativa moderate Essentiæ & potissimum Extracta ex iisdem parata, Tinct. ♂ t. Ludov.
- 4 Motus febriles sistentia: Crocus ♂ t. ♂ iatus D. Stahlian. Pilulæ wildegansii, ut & Pulvis China Chinæ in Electuariis vel Infusis cum aliis exhibitus: Amuletica & alia interna &c.

*Formula Remediorum.*

- 1 Pulvis incidens & resolvens.  
 Rx. Tart. Vitriolat. Lap. s. a. ℥ss.  
 Sal. absinth. Div. in 4. p. aq.  
 Rad. ari. ppt. M. D. sing. 6. horis.
- 2 Tinctura incidens.  
 Rx. Tinct. ♂ ii apr. ℥ij. D. 30. gutt. pro dosi.  
 Ess. Pimpin. alb. ℥j. M.
- 3 Infusum incidens.  
 Rx. Rad. Gentian. r. ℥ss. Cort. Ont.  
 Galang. Citr. a. ℥ij.  
 Ari. a. ℥ij. Winteran. ℥ss.  
 Herb. Cent. min. Tart. solub. ℥ij.  
 Card. bened. Incis. infund. in Vin. alb.  
 Capill. ♀. ℥. iv. D. 3vi. pro dosi.  
 Fumar. a. mfs.
- 4 Pilulæ resolventes & aperientes.  
 Rx. Gumm. Ammon. Card. bened.  
 Heder. Aloes Gummof. a.  
 Junip. a. ℥j. ℥ss.  
 Extr. Helleb. nigr. Tinct. Tart. q. s. M.  
 Cent. min. F. Massa.  
 Fumar. D. 15. 20. 25. pro dosi.
- 5 Alia.  
 Rx. Pil. Tart. ℥j. D. 20. pro dosi.
- 6 Infusum laxans.  
 Rx. Rad. Pimpin. alb. Fol. Serm. s. f. ℥vj.  
 Vincetox. Fibr. Hell. nig. ℥ij.  
 Onon. a. ℥ij. Cort. Ont.  
 Ari. ℥ij. Tart. solub. a. ℥ij.  
 Herb. Epithym. Incis. infund. in ℥. iv.  
 Cuscut. Vini. D. mane ℥vj.  
 Cent. min. a. mfs.
- 7 Pilulæ Purgantes.  
 Rx. Extr. Hell. nigr. C. Elix. P. P. F.  
 Dulc. a. gr. XII. Pil. D. pro 1. dosi.

## 8 Tinctura tonica.

- Rx. Tinct. ♂ t. Lud. ℥ss. D. mane et vesperi 40. gutt.
- 9 Alia.  
 Rx. Ess. Absinth. comp. ℥ss. D. 30. gutt. bis per diem.
- 10 Alia.  
 Rx. Essent. Gent. Cent. min. a. ℥ij. M.  
 Pimpin. alb. D. ut antea.
- 11 Pulvis leniter tiltens.  
 Rx. Tart. Vitriolat. Rad. Ar. ℥j. M.  
 Cort. Chacarill. D. sing. 4. horis 2. cusp.  
 Chin. Chin. a. ℥ij. cult.
- 12 Electuarium febrifugum.  
 Rx. Conserv. Spagir. Aug. ℥j Sir. de Absinth. q. s.  
 Chin. Chin. M. F. Elect.  
 Chacarill. a. ℥ij. D. sing. 4. horis 2. cusp.  
 Rad. Ari. ℥ij. cult.
- 13 Infusum Febrifugum.  
 Rx. Rad. Gentian. ℥vj. Tart. solub. ℥ss.  
 Ari. ℥ij. Incis. infund. in vin. ferven.  
 Herb. Cent. min. ℥. iv. linquntur prope  
 Card. bened. a. mj. ignem in vase bene clau-  
 Chacarill. so, ita tamen ut bullire  
 Chin. Chin. a. ℥vj. nequeant. Postea remo-  
 Cort. Ont. tis ab igne  
 Winteran. a. ℥ij. D. sing. 4. hor. ℥ij. ℥. iv.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Si ulla Febris est pertinax hæc sane est, sæpius enim Medici & ægroti patientiam exhaurit, inpr. si jam inveterata est: quare ægroti mature Medici auxilium implorent, in principio enim mali, si modo convenientia exhibentur remedia, Medicus plus præstare potest, quam postea longo tempore.
- 2 Uti autem in Tertianæ, ita quoque in Quartanæ digestiva versus Paroxysmum exhibita optimum edunt effectum: quare una vel altera hora ante Paroxysmum exhibeatur sal quoddam neutrum, qualia sunt Arcanum duplicatum & Tartarus Vitriolatus legitime præparatus, vel per se a ℥j. ad ℥ss vel cum Sale fixo, quod tamen non adeo necessarium est, exhibeantur.
- 3 In estu vero, quoniam mitior est, neque temperantibus neque diaphoreticis opus est, sudor enim hic minime expectandus est; sufficit potus sufficiens aliquo modo plus quam tepidus, hic enim & causam morificam & sanguinem diluit, fluxilitatemque ejus conservat.
- 4 Quoniam vero hæc remedia versus Paroxysmum exhibita minus sufficiunt, hinc duobus diebus intercalaribus strenuo eo annitendum est, ut materia primo semper die per resolventia incidatur, altero vero per blanda laxantia cum incidentibus mixta evacuetur.
- 5 Exhibeatur itaque primo die vacuo Infusum incidens mane & circa meridiem ad unicas quatuor vel quinque, a meridie vero dentur iterum aliquot doses Pulveris digestivi in vehiculo calido, & ægroti aliquoties postea juscula vel Infusum Herb. Thee dilutum ad resolutionem facilitandam sumant.
- 6 Si vero cuidam Essentiæ ex hisce vegetabilibus magis placent, detur Essent. alexipharmaca cum Scordio, cui addatur Essent. Gent. rubr. quæ itidem mane & circa meridiem exhibeatur.
- 7 Altero die vacuo dentur mane Infusi incidentis & laxantis uncia sex, atque superbibantur interdum juscula ad promovendam operationem. Eidem fini inserviunt Pilulæ Becherianæ & Stahlianæ, aut hisce deficientibus aliæ ex Gummatis & Extractis amaris cum Extract. Helleb. nigr. paratæ.
- 8 Pulveres vero digestivi a meridie semper continuentur.
- 9 Hæc Methodus semel incepta continuo observetur, donec Febris aliquo modo remittat, ac horror cum æstu imminuantur: quod ut pl. intra aliquot septimanas contingit.
- 10 Quo facto inquirendum est utrum Patiens diebus vacuis adhuc sentiat torporem & fatigationem corporis? quod si est, Methodus antea præscripta continuanda est:



est: quod si vero ægrotus diebus intercalariis bene se habet & in actionibus ac laboribus suis alacris est, dentur sistentia remedia ad motus, qui in habitum degenerarunt, compescendos.

- 11 Huic fini inserviunt potissimum fortiora sistentia uti Cortex Chinæ Chinæ: mitius sed tutius operatur Cortex Chacarillæ verus non adeo vetustus: commode E. in hisce Febribus Chinæ Chinæ admisceri potest, vel in Electuariis, vel in Pulveribus vel in infusis cum vino: Crocus Martis Jiatius, Stahlî, sua laude quoque non caret, si aliquandiu continuatur, magis enim tutus est quam reliqua sistentia.
- 12 Oedemata quoque non raro in hac Febre occurrunt, quæ multum sollicitudinis propter summam pertinaciam Medico pariunt: cura tamen hujus affectus ita dirigenda est, ne morbo primario præjudicium inde gignatur.
- 13 Insignem hic usum habent, Infusa superius laudata sed mitius purgantia: meliora adhuc sunt Extracta Radicum & Herbarum talium, utpote quæ longe penetrantiora sunt simplicibus: omnium vero optimæ sunt Pilulæ Stahlianæ, quæ Extracta amara cum Gummatibus, sed legitime depuratis modo soli Authori cognito correctis in se continent. Hæ enim Pilulæ solæ teste experientia non solum Oedemata, sed etiam tumores per universum corpus sustulerunt. Optandum sane esset, ut hæ Pilulæ majori copia in Germaniæ Provincias distribuerentur, quo Medici in casu necessitatis iisdem in multis affectibus uti possent.
- 14 Si Febris adhuc in vigore est & exacte Paroxysmos suos format, remedia consueta Infusa scil. vel Essentiæ supra laudatæ, tempore ante meridiem, Pulveres vero digestivi pomeridiano juxta consuetam Methodum usurpentur.
- 15 Si vero post Febrem sequuntur Oedemata, aliaque signa imminentis Hydropis adsunt, eo majori diligentia Pilulæ Stahlianæ, sed majori dosi, aut Infusa tam incidentia quam laxantia exhibeantur.
- 16 In hac Febre ægrotantes nonnunquam sentiunt sensibilem tensionem dolorificam, quam facile Infarctus lienis, ex quo postea Scirrhus gignitur, excipit: profunt hic itidem incidentia & resolventia cum lenibus laxantibus & postea tonicis: externe vero Emplast. de Ammon. Forest de Cicuta, de Hyoscyamo, Emplast. Sapon. probe Camphor.

#### VIII. Cautela Præctica.

- 1 Cum Febris hæc lento gradu procedat, vitentur omnia drastica remedia Vomitoria scil. & Purgantia: materia enim hujus Febris pauca quidem, sed admodum tenax & viscida est, adeoque per talia remedia, nisi prius præparetur & ad exitum disponatur, minime evacuari potest, sed ea potius naturam maxime debilitant, ita ut etiam si a remediis laudabilibus adjuta vix ac ne vix quidem ad superandum morbum concurrere queat.
- 2 Nec etiam Venæsectio hic aliqualem habet usum, prorsus enim nihil neque ad præparandum neque ad evacuandam materiam febrilem confert.
- 3 Alexipharmaca aliaque positive Urinam pellentia studiose vitanda sunt, cum enim Quartana ad sudores non præcise inclinet, talia remedia insignes turbas edunt in Massa sanguinea imprimis in subiectis calidioribus & Plethoricis: alvum enim magis adstrictam reddunt, caput turbant, ac Febrem hancce vel ad continuitatem vel ad Febrem Lentam aut Hæticam disponunt.
- 4 Refrigerantia ut & absorbentia materiam morbificam incrassando & Hæticam, Oedemata, Scirrhos producendo nocent, quare fugiantur.
- 5 Quoad Diætam ea probe observetur, servetur scil. tempore æstus tranquilla continentia, vitetur aer frigidus & cibi male digestionis. Conf. etiam Cautela supra sub Tertianâ traditæ.

#### C A P U T XXVIII.

##### D E

#### Febribus duplicatis & triplicatis.

**I. Definitio.** Febres tales sunt Febres intermittentes potissimum Tertianæ & Quartanæ partim a materiæ copia partim a malo regimine, partim a perversa medicatione originem trahentes, in quibus Natura per Paroxysmos ultra consuetum ordinem repetitos, materiam corpori molestam & noxam vel propinquiorem, vel remotiorem minitantem, expellere nititur.

#### II. Differentia.

- 1 A Febribus intermittentibus respectu reduplicationis Paroxysmorum.
- 2 Quoad Tertianam ea fit duplex, quando scil. Paroxysmus primus tertio respectu temporis, secundus vero quarto respondet & sic porro. Observavimus tamen aliquando Febrem, quam Tertianam quadruplicem fuisse eventus docuit. Corripiebatur hic loci femina nautæ grâvida Febre satis peculiari, cujus primus Paroxysmus mane hora sexta ægrotam cum horrore & insignibus vomitibus invadebat & ad horam usque undecimam durabat: a meridie hora prima alter sequebatur Paroxysmus cum iisdem vomitibus qui circa horam sextam finiebatur. Duraverat hæc Febris sub ductu obstetricis fere integrum octiduum. Vocatus deprehendebam feminam nil nisi materiam corruptam vomitu rejicere: venter gravidæ antea globosus & acuminatus planus jam erat. Cum cernerem ægrotam tot & tantus vomitus sine ulla noxa sustinuisse, suadebam lene emeticum, sed obstetrix quantum poterat, resistebat. Ea E. abire jussa & annuente ægrotâ præscribebam gr. XV. Rad. Ipecac. cum ℞s. Sal Abfinth. Quo summo mane circa horam quartam duodecies sine multis incommodis copiosam materiam evo-mebat. Paroxysmus hora sexta affligens admodum erat mitis, pomeridianus vero emanebat. Præscriptis convenientibus remediis, altero die Paroxysmus saltem unicus sine vomitibus, tandem Febris acquirebat typum tertianarium & sponte sine sistentibus cessabat.
- 3 Quoad Quartanam vero ea fit vel duplex vel triplex: priori modo si Paroxysmi primo & secundo die affligunt, tertius vero est vacuus, quartus vero & quintus sunt denuo febriles & sic porro.
- 4 Hoc loco tamen attendenda est differentia inter Tertianam duplicem, Quotidianam & Quartanam triplicem: sed hæcce differentia facile patebit ex supra dictis, quatenus Quotidiana tempus antemeridianum Quartana vero pomeridianum observat.

#### III. Signa.

- 1 Hæc per se patent, si enim quis signa Tertianæ simplicis novit, scit etiam signa Tertianæ duplicis, nam sunt eadem.
- 2 Quoad gradum tamen in Febrium reduplicatione symptomata augentur & sæpius graviora sunt quam in Febribus simplicibus.

#### IV. Subj. etum.

- 1 Homines in Febribus simplicibus diætam negligentes & omnis generis cibos, malæ etiam digestionis assumentes.
- 2 Ad iram fortiolem & frequentiolem proni.
- 3 Excretionem sudoris necessariam in Tertianâ per jestigationes corporis aut se frigori exponendo negligentes.
- 4 In Quartana nimis voraces & in aere frigido humido diutius versantes.
- 5 In utraque Febre nimiam causæ morbificæ copiam in corpore habentes.
- 6 Pariter quoque ii qui imprudenter per evacuantia & præmatura sistentia in hisce Febribus tractantur.

#### V. Prognosis.

- 1 Uti simplices Febres ita & hæc periculo vacant, nec facile quandam jugulant.



- 2 Si tamen negliguntur aut perversè tractantur, propter mala consecutaria sæpius non solum in affectus maxime diurnos & dubii eventus, sed etiam in funestos incident. Uti sunt Scirrhi, Hæctica Hydropes &c.
- 3 Quoad durationem simplices longe superant, & non nisi elapso multo tempore curantur.
- 4 Quamdiu in sua reduplicatione persistunt, tam diu nulla curationis spes est.
- 5 Si vero Tertianæ duplex in simplicem, Quartana triplex primo in duplicem, ac deinde in simplicem mutatur. Febres tales simplices facile postmodum convenienti Methodo superari possunt. Tractatam aliquando juvenem Febre Quartana simplici laborantem: cum vero Diætæ leges prorsus non servaret, primo in duplicem ac paucò elapso tempore in triplicem incidebat. Præfagebam Hydropem, Hæcticam &c. nisi bonum vitæ regimen observaret: æger mortem timens tandem exacte Diætæ regulas sequebatur, & cum convenientia remedia simul exhiberentur, tandem Quartana iterum in duplicem ac postea in simplicem mutabatur a qua elapsis aliquot hebdomadibus liberabatur.
- 6 Sudores in Tertianæ, etiam duplici, debito modo procedentes semper bonæ spei sunt & proximam promittunt curationem: sudoribus enim bene procedentibus facile mutatur in simplicem.

## VI. Remedia.

- 1 Sunt remedia superius sub hisce affectibus simplicibus jam allegata digestiva, incidentia, resolventia tam mineralia, quam vegetabilia.
- 2 Evacuantiæ per varia loca pro diversitate Febrium, Purgantiæ lenia, Diaphoretica, Diuretica &c.
- 3 Tonica sive viscera roborantia, Radices & Herbæ amaræ, Stomachica, Carminativa &c.
- 4 Sistentia: Vid. supra.

## Formula Remediorum.

Hæc jam superius sufficienter traditæ fuerunt.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Hæc eadem est ac in Febribus simplicibus, quia vero per Paroxysmorum reduplicationem multum temporis præscinditur, ita ut remedia non ita commode dari queant, hinc modus & tempus remedia exhibendi aliquo modo variari debent.
- 2 In Tertianæ duplici versus Paroxysmum exhibeantur digestiva & reliqua uti supra dictum est & eadem remedia sequenti die continentur. Si evacuatione per inferiora opus est, & Paroxysmus alter in pomeridianum tempus incidit, detur laxans quoddam: si vero uterque Paroxysmus tempore matutino affligit, abstinendum est a laxatione, quoniam operatio remedii intempus Paroxysmi incidit: exhibeantur E. tali in casu Pilulæ Becherianæ vespere.
- 3 Et hoc modo remedia continentur donec duplex Febbris iterum in simplicem transeat, ac postea sufficienter præparata ac evacuata materia & Febre mitesciente exhibeantur sistentia supra præscripta.
- 4 In Quartana triplici & duplici exhibeantur die quo Febbris affligit digestiva, diebus vero vacuis remedia incidentia & lenia laxantia, digestivi vero Pulveres, alter versus vespere post Paroxysmum, alter vero hora nona vel decima detur.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 Uti in Febribus simplicibus circumspeditione opus est, ita in earum reduplicatione major adhuc attentio requiritur, ne morbi in deterius ruant.
- 2 Summo E. studio vitentur Vomitoria, inpr. in Quartana uti superius jam monitum fuit. Sunt tamen qui admodum commendant Radicem Asari in Quartana in Infuso aut etiam Pulvere, qua desperatos quartanarios se curasse testantur. Utrum autem experientiæ multiplici hoc assertum respondeat definire nequeo, propriam enim experientiam in hac re non habeo.
- 3 Sistentia in Febribus hisce nisi prius bene præparato corpore, nunquam in usum trahantur.
- 4 Ceterum Diætæ exactissime servetur, hæc enim ad curationem harum Febrium multum contribuit.

I. *Definitio.* **F**ebbris lenta est Febris corrupta modo ab intermittente, sed variis, utpl. autem a continua dependens, in qua Natura per motus febriles, lentos tamen, infarctum vel aliam labem visceris cuidam a prægresso morbo inductam aut imminentem corrigere & labem visceris præcavere nititur.

## II. Differentia.

Febris lenta & Hæctica a non paucis Practicis, inter se confunduntur, ita ut eas pro una eademque habeant, sed revera inter se differunt & quidem

- 1 Ratione *temporis invasionis*: quatenus lentæ adhuc aliquo modo typum prioris morbi servant: in Hæctica autem calor continuo durat, post prandium tamen aliqualis observatur exacerbatio.
- 2 Respectu *morborum præcedentium*: Febres enim lentæ tam intermittentes, quam continuas, vel male tractatas vel malo regimine corruptas sequuntur, Hæctica vero vomitis, viscerum Exulcerationibus & inflammationibus jungitur.
- 3 Respectu *finis*: in Lenta enim ubi nulla adhuc est actualis visceris labes, Natura per motus febriles eam solum præcavere nititur: in Hæctica autem Natura per motus suos præsentem jam læsionem corrigere, quamvis utpl. frustra intendit.
- 4 Ratione *Prognosis*: Lenta legitime tractata successive, Hæctica vero admodum difficulter vel prorsus nullo modo curari potest.
- 5 Ratione *symptomatum*:
  - a In Hæctica primo gradu multa quidem incommoda non sentiunt ægrotantes, in secundo vero & inpr. in tertio admodum urgent: in Lenta autem omnia sunt mitia.
  - b In Hæctica non obstantibus optimis remediis, omnia graviora, in Lenta autem successive mitiora fiunt.
  - c Hæctica ad Diarrhœas inpr. colliquativas & morbum pessimum reddentes inclinatur, quod in Lenta non occurrit.
  - d Lenta quidem ad sudores maxime prona est, sed ad colliquativas non inclinatur, uti Hæcticas, nisi perversè tractetur.
- 6 Ratione *eventus*:
  - a Lenta legitimo modo tractata, sæpius vel in Febrem præcedentem mutatur aut successive cessat vel male curata in Hæcticam infausito omine degenerat.
  - b Hæctica autem in nullum alium morbum convertitur, sed utpl. lento gradu ad mortem ducit.

## III. Signa.

- 1 Præcedunt ordinarie Febres continuæ male tractatæ, quas sequuntur hæc Lentæ, quæ sunt spuria continuæ indolis.
- 2 Æstus sive calor mitis vel continuo urgens, vel certis temporibus suas exacerbationes habens.
- 3 Unde fitis lenis continuo urget.
- 4 Adest etiam, aliqualis siccitas linguæ oris & faucium quæ sæpius, etiam materia mucida obducuntur.
- 5 Appetitus est valde languidus & si quid appetunt sunt certa tantum alimenta eaque magis frigida quam calida.
- 6 Concurrit corporis extenuatio manifeste in sensus incurrens.
- 7 Vires etiam in dies magis magisque prosteruntur.
- 8 Pallet universum corpus exceptis genis, quæ rubent.
- 9 Pulsus est quidem celer, sed languidus.
- 10 Somnus turbulentus est.
- 11 Caput quidem non dolet insigniter, adest tamen perturbatio vertiginosa.



- 12 Magna quoque adest in somnum propensio, ita ut quam primum dormire incipiant ægrotantes, insigni statim sudore corripiantur.
- 13 Alvus est inordinata, modo liquida, modo sicca.
- 14 Urina rubicundo colore est tincta, post aliquam vero moram fit turbida & deponit sedimentum ro-  
seum, reliqua Urina clara existente.

IV. Subjectum.

- 1 Homines calidioris temperamenti & Plethorici in Quotidiana intermittente & Synocha aliisque male & per calidiora alexipharmaca tractati.
- 2 Aut etiam qui æstu urgente per remedia refrigerantia & absorbentia, quæ sudores maxime necessarios quam maxime retardant, continuo tractantur, sanguinem inspissando.
- 3 Patientes in Febris acutis & intermittentibus, ubi calor maxime urget, sudores negligentes aut jam fluentes frigori se exponendo, plane supprimentes.
- 4 Sæpius etiam in tales Febres incidunt, vel qui in Febris acutis nimiam sanguinis copiam per nares effundunt, uti id in quibusdam observavimus: vel qui etiam sani nimias sanguinis effusiones frequenter patiuntur.

V. Prognosis.

- 1 Febris lenta recens, si legitime tractatur, facile curari potest, ubi vero jam inveterata est, insignes Medico parit difficultates.
- 2 Periculo etiam per se vacante, si tamen in alios morbos transit, sæpius periculosa habet consecutaria.
- 3 Quo diutius tamen, exhibitis etiam convenientibus remediis, in lento suo gradu permanet, eo periculosior est.
- 4 Sudores legitime fluentes nil mali portendunt, suppressi autem totum morbum pervertunt.
- 5 Quo magis corpus contabescit & vires supprimuntur, eo magis metuendus est transitus in Hecticam.
- 6 Febris lenta in Febrem prægressam intermittentem denuo transiens, nullum insigne periculum minatur.
- 7 Periculosior vero est, si denuo in Febrem mutatur acutam.
- 8 Si Tæd. sicca cum respirandi difficultate accedit, malum & metuendum est, ne brevi Hectica succedat.
- 9 Quo magis calor aridus cum siccitate & contabescencia & virium prostratione invalescit, eo propior ad Hecticam est gradus.
- 10 Satius est Lentam mutari in Intermitrentem aut acutam, quam Hecticam.
- 11 Hectica Lentæ diuturnæ succedens utpl. est incurabilis.

VI. Remedia.

- 1 Incidentia & Resolventia: Rad. Vincetox. Pimpin. alb. Caryoph. Ari. Helen. Herb. Scord. Bellid. minor. Veron. Heder. Terrest. Succ. Nasturt. Arcan. dupl. Tart. Vit. Herb. Card. bened. Cent. min. Fumar. &c. vel in Infusis vel in Extractis sub Pilularum forma exhibitæ. Gumm. Ammon. Heder. Junip. &c.
- 2 Tonum roborantia, Rad. Gent. Herb. amar. cum blandis carminativis mixtæ, Essent. Ont. Tinct. ♂tis Ludov.
- 3 Analeptica: Condita fructuum acidulorum, Julapia blande acidulata, vinum moderate sumptum, cibi laudabilis digestionis &c.

Formule Remediorum.

- 1 Pulvis temperans & diaphoreticus.  
R. Tart. Vit. Conch. citr. an. ʒss. M.  
Nitr. ʒiat. Div. in 6. p. æq.  
♂diap. D. a meridie 2. dos.
- 2 Infusum incidens & roborans.  
R. Rad. Pimp. alb. Summit. Cent. min.  
ʒss. Card. bened.  
Galang. Capil. ♀ an. mfs.  
Ari ʒij. Cor. citr.

- Ont. an. ʒij. ʒiij. vel iv.  
Incis. Infund. in Vin. alb.  
3 Pilulæ resolventes & laxantes.  
R. Gumm. Ammon. depur. Cent. min.  
ʒj. Aloes Gummos. an.  
Extr. Helleb. nigr. ʒss.  
Fumar. Tinct. Tart. q. s.  
Card. bened. M. F. Pil. D. 15. 20. pro dosi
- 4 Potio analeptica.  
R. Aq. Cord. frig. Ceras. acid. an. ʒss.  
Ceras. nigr. Conf. Alkerm.  
Borrag. de Hyac. an. ʒiss.  
Bugloss. Sir. acetos. citr. ʒj. M.  
C. C. citrat. D. interdum aliquot cochle.  
Cinnam. cydon. an. ʒj. aria.
- 5 Mixtura alexipharmaca.  
R. Essent. alexiph. ʒij. D. 25. 30. gutt.  
Pimp. alb. ʒj. M.
- 6 Tinctura tonica.  
R. Tinct. ♂t. Ludov. ʒss. gutt.  
D. Mane & vespere 30. 40.

VII. Methodus Medendi.

- 1 Cum Febris hæc modo ab intermittente, modo ab acuta originem trahat, hinc etiam cura diversa est, & quæ alteri prodest, alteri nocet.
- 2 Si E. Febris Lenta ab intermittente male curata dependet, eo respiciatur ut Febris intermittens quantum fieri potest & quidem mature revocetur, quod in recentiori malo, si modo cura bene instituat, facile obtineri potest & quidem.
  - a Per Radices incidentes & resolventes ac Herb. amaras vel infuso cum vino solo, vel addendo ipsis adhuc Folia Sennæ, Helleb. nigr. Rhabarb. partim ut id, quod resolutum est, evacuetur, partim ut Natura; per talia remedia excitata motus contra causam morbificam au-geat.
  - b Felicius hoc adhuc præstant Extracta amara cum Gummatibus legitime correctis, quibus addi potest stimulus purgans Extract. scil. Hellebr. nigr. Si vero cuipiam ad manus sunt Pilulæ veræ Becherianæ aut Stahlianæ, illæ cito id efficient, quod alia remedia præstare nequeunt.
  - c Febre hoc modo revocata exhibentur postea remedia alias Febris intermittentibus communia.
  - d Præparandum scil. est & leniter evacuandum, viscera sunt roboranda per stomachica & carminativa ac tandem, si opus, motus febriles sistendi sunt.
  - e Sudores in hoc morbo maxime urgentes aliquo modo mitigandi sunt, quod commode præstant Matr. Perl. Lap. ♂ Nitr. Corall. Spec. de Hyacinth. Julepi aciduli, e Succ. acid. Emulsiones.
- 3 Si vero ab acuta ortum traxit, semper respiciendum est ad indolem acutam, ut hoc modo remotis reliquis Febris sensim cesset, quod tamen semper majori difficultate procedit, quam in præcedente casu, quare.
  - a Tempore ante meridiano, uti in aliis acutis, detur Essentia alexipharmaca bis dosi ordinaria, aut etiam minori.
  - b Tempore vero pomeridiano exhibeantur Pulveres ordinarii temperantes ex Nitro, absorbente sale digestivo & antimon. diaphoretico hora scil. secunda vel tertia & circa vespeream.
  - c Alvus interea semper aperta servetur, partim per Pil. Stahlianas, partim per Infusa leniter laxantia.
- 4 Si vero ab enormibus sanguinis profusionibus Lenta Febris producta fuerit, præ ceteris conveniunt.
  - a Analeptica, Mucilaginosa, Gelatinosa &c. vires restaurantia Gelatina C. C. cum Amygd. dulc. Decoct. C. C. saturatum cum Radicibus aperi-entibus, Serum lactis vel per se vel cum Radic. aperi. aut Herb. bellid. & parum Nasturtii coctum.



b Quidam etiam balnea aquæ dulcis, aliquo modo plus quam tepida commendant, ad emolliendum & aperiendum.

5 In omnibus hisce casibus tonum roborantia & analeptica, uti Tinct. Mart. Lud. reliquis interponenda vel subiungenda sunt.

### VIII. Cautela Practicæ.

1 Uti in hac Febre omnia lento gradu procedunt, ita etiam, quantum possibile ab omnibus drasticis remediis abstinendum est.

2 Vitentur E. Vomitoria, utpote quæ & vires notabiliter frangunt & placidum morbi cursum turbant: si vero subiecta sunt admodum robusta & ob saburram biliosam antea in Febrem intermittentem inciderunt, quæ per convenientia remedia neque correctæ neque evacuata fuit & jam multas cardialgica anxietates patiuntur, in iis locum habent, nunquam tamen fortiora sint uti Aialia & Mercurialia: sufficit Rad. Ipecac. cum sale quodam fixo ac peracta operatione dentur Analeptica.

3 Idem sentiendum est de Purgantibus: etsi enim lenia laxantia certis temporibus exhibita ad alvum liberam servandam sint admodum proficua, acria tamen Purgantia corpus nimis debilitant & ad Febres continuas disponunt.

4 Venæsectio etiam in hac Febre directe prorsus nullum habet usum, nisi Venæsectio in præcedente Febre acuta, præente urgente Plethora, neglecta fuerit, cum fructu quoque administratur, si a consuetis sanguinis suppressionibus Febris prægressa originem traxit.

5 Abstinendum quoque est non solum a coactis sudationibus per nimis calidum regimen, sed etiam per remedia sudorifera: cum enim hæc Febris per se jam maxime inclinæ ad sudores, per talia remedia nimium augentur, humores nimis commoventur, adeoque vel Febres acutæ periculosæ sequuntur, vel sudores in hæcticos colliquativos degenerant.

6 Eo facilius vero talia remedia insignia excitant damna, si Volatilia ipsis admiscuntur, aut alia Alexipharmaca calida.

7 E contrario quoque vitandus est abusus refrigerantium & absorbentium, quamvis enim utraque moderate usurpata, suo non carent usu, sed Febrem hancce insigniter leniunt: ita abusus talium producit pedum œdemata.

8 Adstringentia remedia pariter summe noxia sunt, materiam enim morbificam magis incrassant & fibras constringendo ejus excretionem impediunt, adeoque eo promptius ad continuas Febres aut Hæcticam disponunt: eo magis vero id præstant, dum sudores simul supprimunt.

9 Febrifuga & sistentia in hac Febre non facile in usum trahantur, in Lenta enim ex aucta orta maxime sunt noxia, in altera vero quæ ab intermittente originem traxit, non nisi Febre revocata post alia præmissa locum habent: Imo si Febris per se sensim imminuitur & tandem vix amplius sentitur præstat ab eorum usu abstinere.

10 Quoad Analeptica vitanda sunt spirituosa, si autem dosi minori aliis admiscuntur, locum aliquo modo habere possunt.

## C A P I T U L U M XXX.

### D E

#### Febre Hæctica.

I. *Definitio.* **E**st species Febris continuæ, sed lentæ, a Natura institutæ, ut per auctiores motus febriles, vel exulceratio in viscere quodam hærens, abstergatur, vel gravior Scirrhus corrigatur.

### II. *Differentia.*

1 Quomodo Lenta & Hæctica differant, superius jam dictum fuit.

2 Ipsa Hæctica differt ratione graduum.

a Primus gradus mitissimus est, ita ut ægroti, excepta aliquali corporis debilitate, de nulla adeo molesta re conquerantur. Et in tali statu patientes sæpius plures annos transigere valent: morbus tamen hæcticus nunquam se revera aliis signis manifestat: & hinc etiam Medicus in hoc gradu ob defectum signorum morbum non cognoscit aut dignoscit, sufficientia quoque remedia ad præcavendum morbum exhibere nequit.

b In secundo signa Hæcticæ se jam magis manifestant, ita ut morbus sine omni difficultate cognosci queat, & quamvis multi tum temporis lecto se nondum affigant, adeo tamen debiles sunt, ut vix se erectos tenere queant. Hic Febris suas sensibiles habet exacerbationes, appetitus languet, reliqua symptomata inferius recensenda concurrunt.

c Tertius gradus est, quando omnia symptomata maxime urgent, ut æger continuo lecto affixus hædere cogatur: quo in statu non solum vires quam maxime prosteruntur, sed corpus antea jam aridum indies magis contabescit, ita ut tandem vivum repræsentent sceleton ægrotantes.

d Non tamen semper hi gradus, qui interdum longum tempus requirunt: ita ut malum maxime chronicum exinde fiat, occurrunt: sed interdum præente læsione, brevi tempore finiuntur: quod in quibusdam observavimus, qui paucis elapso tempore absolutis hisce gradibus vitam cum morte commutare cogebantur.

3 Respectu partis affectæ Hæctica.

a Est vel abdominalis & hæc vel occupat

α Hepar, quæ præ ceteris frequentius affligit, quando propter infarctus vel Schirros contumaces hepatis labes producta fuit.

β Lienem, si ob easdem causas ulcerosa in eo deprehenditur constitutio.

γ Glandula mesenterii: si præcedente eorum infarctu & inde dependente Atropia vel Scirrhi insignes, vel exulcerationes in paucis vel multis glandulis productæ sunt.

δ Renes, quando vel ob Nephritidem veram, vel ob calculosam ulcera tam in uno, quam in utroque rene genita sunt.

ε Pancreas, in quo etiam interdum vel a sanguinis corruptione vel ab humoribus acerbis exulceratio producitur.

ζ Partes genitales internas: si, propter morbi gravitatem, partes interiores exulceratæ sunt.

b Alia est pectoralis sive pulmonalis, quæ vel ob abscessum, vel exulcerationem vel scirrhosam constitutionem ut plurimum gignitur: nonnunquam tamen etiam a Tussi chronica acri originem trahit inpr. si talis tussis male tractatur.

### III. *Signa, & quidem*

I Communia:

a Aëstus aridus si non continuo, diu tamen affligens.

b Non tamen adeo gravis est hic calor, sed minor.

c Post prandium aliqualem habet exacerbationem, & tunc temporis caloris augmentum potissimum in volis manuum tactu deprehenditur.

d Genæ etiam rubentes calorem auctum esse indicant.

e Comitatur calorem huncce continua siticulositas.

f Adest quoque continua oris siccitas cum saliva spumosa vel glutinosa.

g In nonnullis occurrit etiam Tussis sicca ægrotos maxime torquens.

h Dolor quidem capitis nullus vel exiguus calorem comitatur, adest tamen, dum se erigunt patientes, & perturbatio ejusdem vertiginosa.



i Corpus interim indies successive contabescit & vires magis magisque prosternuntur.

k Pulsus est celer & frequens, sed debilis & parvus.

l Appetitus est languidus aut nullus, & ægroti frigida potius quam calida desiderant.

m Somnus est admodum turbulentus & ægrotantes nullam exinde percipiunt refocillationem.

n Alvus ordinarie est irregularis, fin vero est nimis liquida, magis debilitat patientes.

o Urina est pinguis & graveolens in quibusdam & quidem in ultimo gradu: utpl. vero Ontii coloris cum cuticula pingui & sedimento roseo.

p Fastidiunt quoque omnia & perpetuus adest animi languor.

q Si causa mali hæret in hypochondriis, sentiunt interdum aliquod pondus modo in sinistro, modo in dextro hypochondrio.

r Tandem accedunt sudores in dies incrementa capientes, Medicis colliquativi dicti.

s Qui brevi vires maxime frangunt & contabescantiam promovent.

t Tandem etiam accedit Diarrhœa colliquativa.

u Cui in quibusdam defluvium capillorum jungitur.

x Et hæcce ultima symptomata brevi ægrotum jugulant, præsertim quando facies accedit Hippocratica.

## 2 Propria & quidem

### a Abdominalis.

α *Hæctica hepatica*: quæ sunt præter signa communia, Tussis sicca cum respirandi difficultate, pressio in hypochondrio dextro, color faciei ictericus.

β *Lienis*: in hac præter signa communia insignes anxietates præcordiales sentiunt ægrotantes cum tensione vel pressione in hypochondrio sinistro.

γ *Renum*: frequentes dolores nephritici prægressi, aut renum inflammatio, præsentia adhuc pathemata nephritica, excretio vel materiæ purulentæ vel muci admodum tenacis.

δ *Partium genitalium*: prægressa varia pathemata Venerea, exulcerationes variæ, Gonorrhœa virulenta, post adhibita debita remedia nulla plenaria symptomatum cessatio, sed continua debilitas cum consumptione corporis.

b Pulmonalis: præter signa communia multa adhuc specialia, quæ vid. *Cap. de Phthisi*.

## IV. Subjectum.

1 Homines teneræ & siccioris constitutionis facilius incurrunt febrem lentam quam subjecta porosi & spongiosi habitus corporis.

2 Diætæ calida, cibis aromatizatis, vino & inpr. Spiritu Vini tempore matutino abutentes.

3 Animi pathematibus præcipue iræ nimium indulgentes.

4 Venere abutentes.

5 Speculationibus, Lucubrationibus & curis nimium dediti.

6 Corpori sufficiens nutrimentum denegantes & inediam diuturnam passi.

7 Quibus per Purgantia drastica, sanguinis missiones fortiores sæpius repetitas vires nimis fractæ & exhaustæ fuerunt.

8 Mensium, Hæmorrhoidum & Hæmorrhagiæ narium suppressionem passi.

9 Qui Venæsectiones & Scarificationes assuetas neglexerunt.

10 Aut e contrario qui largiores profusiones sanguinis, constrictiones viscerum passi sunt.

11 Aut qui in hisce per remedia adstringentia male tractati fuerunt.

12 Tandem etiam Febres tam intermittentes, quam chronicas passi & per remedia incongrua male tractati.

## V. Prognosis.

1 Hæctica vera semper periculi plena est, & etiam si per convenientem Methodum sæpius diu protrahatur, utpl. tamen ad funestum tendit exitum.

2 Juniores ab anno decimo octavo usque ad trigessimum quintum semper gravius affliguntur ab hac Febre & citius etiam moriuntur, quoniam omnia symptomata statim nimium ingravescent.

3 Qui autem hanc ætatem superarunt, diutius malum hocce perferunt, ita ut in hisce revera fiat chronicum.

4 Quoniam Natura motibus suis auctioribus nil solidi efficere potest, ita ars etsi concurrat, nunquam ad optatum finem pervenit.

5 Si morbi hujus cura cito instituat & quidem in primo adhuc gradu, ægroti diu morbo resistere possunt, inpr. si laudabilis diætæ accedit. Novi virum quemdam qui in Adolescentia ob diætam inordinatam incidebat in hanc Febrem, consulebantur plures Medici, sed omnia adhibita remedia frustranea erant. Consulebatur tandem alius Medicus, qui nil nisi Diætam exactam & cælibatum suadebat, cujus consilium cum ægrotus sequeretur quinquagesimum attingebat annum: cibi autem ejus, uti ipse mihi dicto anno referebat erant panis similagineus, carnes vitulinæ pullorum, columbarum juniorum & vinum Hochheimense ad minimum duodecim annorum, quæ omnia definito pondere & Mensura assumebat.

6 Si jam maxime inveterata est remedia prorsus nulla admittit, quicquid etiam Thrasones interdum quidam de suis arcanis jactitent, se scil. Hæcticam & Phthisin consummatam curare posse.

7 Hæcticas Febres acutas inpr. inflammatorias excipiens semper insigne minatur periculum.

8 Eiusdem indolis est, quæ enormes Sanguinis profusiones sequitur.

9 Æquinoctia aliæque subitanæ aeris mutationes Hæcticas semper peiores reddunt; imo Æquinoctia & Solstitia ipsis sæpius funesta sunt.

10 Si dolor in hypochondriis maxime urget, malum est signum & mors brevi sequitur.

11 Observavimus in quibusdam Febrem hancce ultimis temporibus maxime auctam in continuam versam & certas periodos septenarias observasse, ita quidem ut die septimo admodum tranquillæ fuerunt, melius se habuerint, ac de nulla alia re, quam de dolore hypochondrii dextri, conquesti fuerint, sed absoluto septenario tertio nihilominus moriebantur.

12 Quo magis invalescit corporis contabescantia & virium jactura, eo citius morbus funestum nanciscitur exitum.

13 Quo maturius superveniunt sudores colliquativi, eo citius moriuntur ægrotantes.

14 Defluvium capillorum cum Diarrhœa colliquativa mortem præ foribus esse indicant.

## VI. Remedia.

1 Primas vias abstergentia: Arcan. duplic. Tart. Vit. absorbentia acido quodam saturata uti Conch. Citrat. Rhabarb. Manna, Magnesia, Merc. dulc. Pilul. Tart. Pilulæ ex Gummatibus, Becherianæ, Clysteres &c.

2 Materiam purulentam in viscere hærentem temperantia: Absorbentia Lapid. ☿. Percar. Mat. Perl. Conch. ppt. sæpius jam laudata incidentia ex regno vegetabili Rad. Pimpin. alb. Vincetox. Cichor. Taraxac. Helen. Gelatinosa & Mucilaginosa, Cremor Hordei, Avenæ, Gelatina C. C. Decoct. C. C. cum Rad. Cichor. & Flor. Bellid. &c. Gummata quoque Ammoniacum, Galbanum, Arabicum.

3 Materiam correctam ad alia loca derivantia & evacuantia: Diuretica, Decoct. Rad. 5. aperient. Serum lactis cum Rad. Cichor. & Flor. bellid. coctun. Blanda diaphnica cum temperantibus mixta, ☿ diaph. Bezoard. min. Lap. ☿. Mat. Perl. quibus interponatur temperandi sine Emulsio. Amygd. dulc.

4 Nimium humorum affluxum ad locum affectum interceptantia; Venæsectiones versus tempora æquinoctialia institutæ, Scarificationes in assuetis.



- 5 Tonicæ: Mixtura Tonica Stahlî, Corallia, Gemmata, Herb. Veron. Virg. Or. Hed. terrestr. Scabios. Pyrol. Sanic. Flor. Hyper.

*Formula Remediorum.*

- 1 Pulvis abstergens,  
 R. Tart. Vitr. Div. in 6. p. æq.  
 Conch. citrat. D. sing. 3. horis.  
 Magnes. alb. & Zij. M.  
 2 Alius laxans.  
 R. Rhab. elect. 3ss. D. pro 1. dosi.  
 3 Pilulæ laxantes.  
 R. Pil. Stahlî. D. 15. pro dosi.  
 4 Decoctum abstergens.  
 R. Serilactis fervent. ʒij. Rad. Cichor. rec. mj.  
 Infund. per noct. Mane bulliant leniter  
 Herb. bellid. recent. mij. D. calide.  
 5 Infusum incidens & abstergens.  
 R. Rad. Pimp. alb. Virg. Or.  
 Vincetox. Capill. ♀ & mj.  
 Caryoph. & Zij. Incis. infund. in Aq. simpl.  
 Herb. Scabios. & usurpentur instar  
 Bellid. Herb. Thee.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Cum Febris hæc ordinarie sit chronica & Natura ad labem visceris tollendam blandis semper motibus febrilibus utatur, hinc etiam Medicus blande admodum & lento gradu in ea tractanda procedere debet, quoniam alia Methodus utpl. morbum exasperat & omnia turbando eo citius funestum post se trahit exitum.
- 2 Vocatus E. Medicus primo exhibeat blanda alexipharmaca, ut ea tam Feбри quam absterfioni & materiæ correctioni aliquo modo satisfaciant, id quod præstat vel Infusum ex radicibus alexipharmacis & abstergentibus, vel Ess. alexiph. cum largiori quantitate Ess. Scord. & Pimpin. alb. mixta, ante meridiem parvis dosibus exhibita.
- 3 Huic subjungantur a meridie aliquot doses pulveris digestivi & absorbentis acido quodam saturati, qui & calorem febrilem temperat ac simul materiæ acrimoniam corrigit & abstergit.
- 4 Interea temperantia reliqua superius laudata nunquam negligantur, sed reliquis continuo interponantur. Hic præ ceteris laudem meretur Gelatina C. C. cum amygd. parata, utpote quæ materiæ corrigit, partes acres involvit & corpus insigniter nutrit. Eundem usum habet Cremor hordei & Avenæ s. eorum Decocta cum Bellide & Cichorio aut potius cum sero lactis. Nec etiam sine fructu exhibentur Emulsionem variæ, non tamen ex semin. frigidis paratæ.
- 5 Correcta & mitigata aliquo modo materia postea per convenientia loca successive evacuetur: id autem commode fieri potest 1. per alvum, si ea per blanda remedia continuo aperta servatur. 2. Per diuresin, quo in casu potissimum convenit Decoctum feri lactis cum Rad. 5. aperient. aut ejus Infusum cum Rad. Cichor. & Flor. Bellidis. 3. Per Diaphoresin, exhibendo Aquas quasdam destillatas cum Antimonio diaphoret. & absorbente quodam, aut etiam Emulsionem ex Amygd. dulc. cum dictis pulveribus.
- 6 Hisce per aliquod tempus usurpatis exhibeantur tonica v. g. Pulveres absorbentes cum Coralliis, Antim. diaphoret. & Speciebus de Hyacintho, vel etiam Tinctura tonica Stahlî, quæ simul adhuc incidit, abstergit ac discutendo nimium ad partem affectam affluxum impedit.
- 7 Huc pertinent etiam Traumatica vulgo sic dicta ex Regno vegetabili, Herbæ scil. superius recensitæ, quæ & abstergunt & simul etiam, quantum morbi conditio permittit, consolidant, & talia in affectibus hisce chronicis sæpius plus efficiunt, quam multa alia, si modo debito ordine & diu usurpantur.
- 8 Symptomatum quoque præcipuorum in hoc morbo habenda est ratio: talia autem sunt.

a *Contabescencia corporis*: in qua præ ceteris conveniunt Gelatinæ ex carnibus junioribus, Raf. C. C. Eboris, Amygdalis dulcibus &c. paratæ: Lac. caprillum, asininum & humanum, Emulsionem nutritives, Gummi Arabicum, Tragacantha &c.

b *Tussis*: hanc nimis urgentem mitigant Pilulæ ex succo Liquiritiæ, & M. P. de Cynoglossa.

c *Sudores & Diarrhæa*: ubi præ ceteris conveniunt Corallia rubra, Lap. 5. aliaque absorbentia, Spec. de Hyacinth & alia ex Gemmis parata.

d *Æstus Febrilis*: quem blanda acida & ex his parati Julepi, Emulsionem, Decoctum avenaceum &c. mitigant.

9 Si malum per hæc remedia aliquo modo mitigatum fuit & ægroti etiam vires quadantenus recuperarunt, Venæsectio circa æquinoctia instituat, ut hoc modo sanguis a parte affecta revellatur, sed circa idem tempus repetatur necesse est.

10 Si vero subjecta Venæsectionem ferre nequeunt, aut juniora sunt, ita ut Venæsectionem nondum admittant, exhibeantur pulveres temperantes cum paucis Nitro.

11 Ceterum exhibeantur tonica superius dicta, Mixtura scil. Tonica Stahlî, Corallata & Gemmata cum Cort. Chacarill. aut ejus extracto.

12 Quoniam vero post absterfionem ad consolidationem quoque respiciendum est, dentur postea Infusa illa traumatica & diu continentur; aut etiam iisdem substituantur Mixtura balsamica ex Ess. Succin. & Scord. a Stahlîo commendata.

VIII. *Cautela Practica.*

- 1 Cum morbus hic, uti antea jam monitum est, lento gradu procedat, ita absint hic omnia illa, quæ aliquo modo humores commovere possunt.
- 2 Exulent E. hic positive purgantia, sufficiunt lenissima laxantia, alvum, ubi opus est, aperientia.
- 3 Absit quoque indiscreta & intempestiva Venæsectio, quamvis enim ea legitimo modo instituta suo non careat usu, intempestiva tamen maxime nocet.
- 4 Exulent quoque reliquarum excretionum inpr. sudoris impertinentes excitationes. Sudorifera enim & Diuretica humorum resolutionem promovent & sudores colliquativos eo maturius producant; sufficit hic blanda diapnoe aut saltem æqualis humorum distributio.
- 5 Quare remedia calida & acria, præcipue vero volatilia summo studio vitentur.
- 6 Sed probe cavendum est, ne lapsus in alterum extremum, exhibendo scil. multa refrigerantia, fiat, si enim æstus uno impetu obtunditur, Naturæ concursus ad absterfionem ulceris quam maxime impeditur.
- 7 Vitandus quoque est abusus absorbentium, utpote quæ sanguinem nimium incrassando placidum Febris cursum turbant.
- 8 Si vero cum acido Citri saturata sunt, optimum edunt effectum abstergendo & præcipitando materiæ & tali in casu reliquis abstergentibus & digestivis merito præferenda sunt.
- 9 Opiata quoque summa cum cautela adhibenda sunt, vires enim maxime jam fractas magis frangunt, & sæpius funestum post se trahunt eventum.
- 10 Antihecticum Poterii, quod tanquam specificum hinc inde laudatur & commendatur, nullum plane habet usum & magis adstringit, quam abstergit & consolidat; nihilominus tamen videas illud continuo præscribi: ratio est, quia in Officinis jure civitatis donatum & in Specificorum classe jam diu relatum fuit.
- 11 Minoris adhuc pretii est Tinctura antiphthis. Grammanni, quæ adhuc magis adstringit.
- 12 Quod infusa traumatica concernit semper præparentur ex mitioribus vitando omnia fortiora Adstringentia, deinde quoque non sint saturata, sed diluta.
- 13 Expectorantia in Tussi mitiganda suo quidem non ca-



- carent usu, quoniam vero pectus emolliendo nimium ad pectus humorum affluxum producant & hinc, si aliquid mali in pectore hæret, illud augment, satius est ab eorum usu abstinere.
- 14 Remediorum multitudo vires patientis maxime destruit & morbum pejorem reddit, quare ab ea abstinendum est.
  - 15 Idem etiam censendum est de continuo remediorum usu, sufficiunt pauca & bona remedia legitimo tempore usurpata, nempe quando malum aliquo modo urget.
  - 16 Quoad reliqua vero, si malum est remissius, exhibeantur solum præservationis gratia & quidem mature pauca remedia convenientia ac instituatur Venæsectio.
  - 17 Bona Diæta in hac Febre ordinarie superat omnia reliqua remedia, quare etiam exacte servetur.
  - 18 Motus corporis moderatus in aere liberiori optime prodest Hecticis, & hinc sæpius in tali aere sæpius diu ab exacerbationibus immunes vivunt; quies vero & vita sedentaria ipsis minime prodest.
  - 19 Aer tamen hic non sit siccus, ut pote qui corpora jam sicca magis ex ucca reddit, sed leniter humidus, minus tamen frigidus.
  - 20 Equitatio a Sydenhamio commendata propter blandam succussionem minime contemnenda est, sed vitandus est abusus.

## CAPUT XXXI.

## DE

## Febre Tertianâ continua.

**I. Definitio.** **F**ebbris Tertianâ continua est species Febris, compositæ in qua Principium Vitale beneficio motuum auctiorum materiam quandam noxiam in massa sanguinea & primis viis simul hærentem expellere nititur.

**II. Differentia.**

- 1 A *Tertianâ simplici*: respectu plenariæ intermissionis, quæ in illa occurrit, cum in hac non nisi remissio locum habeat.
- 2 A *Tertianâ anomala*: quæ quidem quam maxime tendit ad continuitatem & nisi perite tractetur, actu in eam transit, nihilominus tamen etsi Paroxysmi satis sint diurni, sensibiles tamen suas habent intermissiones, cum e contra hæ in continua deficient.
- 3 A *Tertianâ maligna*; in qua mature malignitatis signa supra recensita se manifestant; cum e contra in hac, si convenienti Methodo tractatur, non facile malignitatis signa conspiciantur: per imprudentem tamen medicationem facile quoque accedere solet malignitas, ut id in quotidiana continua sive catarrhali benigna cernere licet.

**III. Signa.**

- 1 Invadit quidem etiam instar Tertianæ horrore quovis tertio die, nihilominus tamen horror in hac tam diu non durat ac in Tertianâ legitima.
- 2 Hunc præcedunt etiam signa alia ordinaria, lassitudines, pandiculationes &c. sed magis in principio, quam in reliquo suo cursu.
- 3 Sequitur vero æstus satis vehemens graviter ægrotos excrucians, qui tamen sensim sensimque mitefcit.
- 4 Nunquam tamen plenarie cessat, sed sequente die adhuc durat cum insigni debilitate, adeo ut ægrotantes lectum deferere nequeant.
- 5 Tertio die horror circa consuetum tempus redit, quem æstus, eodem modo excipit, uti in primo Paroxysmo.
- 6 Comitantur hancce Febrem alia pathemata febrilia, quæ tamen respectu Tertianæ sunt graviora.
- 7 Appetitus hic ordinarie magis est languidus, imo sæpius nullus, quam in Tertianâ.
- 8 Pulsus est celer & frequens, qui tamen, etsi in ce-

leritate & frequentia sua non prorsus desinat in Febris declinatione, tamen aliquo modo remittit, donec recurrente Paroxysmo denuo augeatur.

- 9 Æstus continua comitatur Cephalalgia, quæ æstu crescente & decrecente augetur & imminuitur.
- 10 Sitis nunquam deest, sed pro ratione æstus modo gravius modo mitius affligit.
- 11 Propter calorem continuum & sitim continua quoque oris adest siccitas, modo major, modo minor pro diverso æstus gradu.
- 12 Somnus nunquam est tranquilluss, sed continuo interruptus, unde etiam parum refocillationis exinde sentiunt ægrotantes.
- 13 Vires hic maxime ob diurnitatem caloris prostratæ sunt & quidem longe magis quam in Tertianâ simplici.
- 14 Febris hæc cum suis symptomatibus ordinarie ultra secundum septenarium se extendit, postea legitime tractata sensim sensimque mitior redditur, donec prorsus cesset.

**IV. Subjectum.**

- 1 Qui alias ad Tertianam simplicem proni sunt, facile quoque in hanc incidunt. Vid. *Tab. de Tertiana*.
- 2 Potissimum autem eam incurrunt, qui in Tertianâ simplici imprudenter tractantur & quidem
  - a Si alexipharmaca vel statim ante paroxysmum, in vel horrore ad eum mitigandum iis exhibentur.
  - b Quando eadem remedia subjectis ad sudorem non adeo dispositis in ipso æstu dantur.
  - c Si in æstu & fluente sudore refrigerantia exhibentur, quibus salutaris & necessarius sudor suppressitur.
  - d Si Venæsectiones in Tertianâ simplici sine urgente ratione instituuntur.
- 3 Plures etiam corripit quando constitutio aeris est epidemica & tunc nulli ferre parcat ætati & temperamento.
- 4 Sensibiliores tamen, & ad iram proni, temperamenti calidioris &c. tunc temporis facilius ea corripiuntur, quam reliqui.
- 5 Quibus ulcera antiqua manantia, Scabies aliaque exanthemata in cute retropelluntur non raro quoque in hanc Febrem incidunt.

**V. Prognosis.**

- 1 Febris hæc legitime tractata ordinarie periculo caret, ob imprudentem vero medicationem varia mala sequuntur & morbus in pejus ruit.
- 2 Plethorici utpl. gravius hoc malo corripiuntur, & nisi Medicus circumspectione utatur, facillime in inflammatoriam Febrem degenerat.
- 3 Idem etiam contingit, si subjecta alias calidioris temperamenti per alexipharmaca calidiora tractantur.
- 4 Quando vero leniori Methodo tractatur, mutatur in Febrem Tertianam simplicem, quæ postea Methodo ordinaria facile tollitur.
- 5 Quando epidemice grassatur, sæpius aliquid maligni junctum est, & nisi tum temporis lenissima Methodo & cautissime tractetur, facile Purpura succedit, uti id hoc anno quo talis Febris admodum frequens est, pluries observatum fuit.
- 6 Eo facilius autem tale quid contingit, si statim ab initio Purgantia exhibentur & Venæsectiones instituuntur: & etiam si nulla Purpura erumpat, in maximo tamen versantur periculo & utpl. etiam moriuntur, uti tristis hætenus docuit experientia: quando autem exanthemata miliaria prodeunt, ea tamen instabilia sunt & modo apparent modo disparant, donec ægroti satis cedant. O utinam tandem saperent ii, qui tali perversa utuntur Methodo! sed furdis narratur fabula: odium reportant, qui salutaria dant consilia & loco gratiarum actionis audire coguntur: *Was sol e uns dieser Klugling rathen, unsere liebe Vorfahren waren auch Keine Narren die haben auch auf diese Art curirt Ich habe nach dieser Methode so und so lang practiciret, also verbleibe ich auch dabey.* Medicorum errores tegit terra &



& Medici interdum sunt carnifices privilegiati, qui nocendi & necandi facultatem impune exercent.

- 7 Plethorici & femina mensium ataxia laborantes nisi summa circumspeditione tractentur facile quoque in Purpuram miliarem incidunt.
- 8 Quo minor est horror, æstus vero gravior, eo magis metuenda est Purpura.
- 9 Exanthemata tamen miliaria alba plus semper periculi involvunt, quam rubra.
- 10 Febres hæ in subjectis cacoehymicis maxime sunt periculosa.
- 11 Quo magis vires prosteruntur in hac Febre cum augmento reliquorum symptomatum, eo periculosior est status.
- 12 Nonnunquam Tertianam continuam sequuntur Febres Lentæ & Hæticæ.

#### VI. Remedia.

- 1 *Temperantia*: Tart. Vit. Arcan. dupl. Tart. fatus, Conch. citrat. Mat. Perl. Lap.  $\Sigma$ . Succ. acid. inpr. vero Succus Citri, Emulsionem &c.
- 2 Blanda diaphoretica & alexipharmaca; Antimon. Diaphoret. Bezoard. miner. Ess. alexiph. Tinct. Bezoard. Mixt. simpl. Aq. Card. bened. Galeg. Fl. Acac. Ulmar. Fl. Sambuc. &c.
- 3 *Analeptica*: blanda acida & ex iis parati Julepi, Emulsionem, Aquæ fragrantem &c.
- 4 *Tonica*: Corallata, Gemmata, Tinct. St. Ludov. Infusa ex amaribus & carminativis &c.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Potiuncula diaphoretica temperans.

R. Aq. Borrag.	Tart. Vit.
Bugloss.	Nitr. depur. a. $\mathfrak{z}$ j.
Cicbor.	Sacch. perlat. $\mathfrak{z}$ ij. M.
C.C. citr. a. $\mathfrak{z}$ iss.	D. sing. 2. 3. 4. horis coch. a-
Q. diaph.	liquot.
Conch. citrat.	

##### 2 Alia.

R. Aq. Galeg.	Bezoard. miner.
Scorzon.	Nitr. $\mathfrak{z}$ iat. a. $\mathfrak{z}$ ss.
Scord.	Reg. $\mathfrak{z}$ ii Medicin.
Scabios.	Cinnab. $\mathfrak{z}$ ii a. gr. XV.
Card. bened. a. $\mathfrak{z}$ j.	Sacch. Canar. $\mathfrak{z}$ ij. M.
Matr. perl.	D. ut antea.

##### 3 Mixtura alexipharmaca.

R. Ess. alexiph. Stahlii.	Scord. a. $\mathfrak{z}$ j. M.
Pimpin. alb.	D. 25. 30. gutt.

##### 4 Alia.

R. Ess. alexiph.	Vitr. gutt. XV. M.
Scord. a. $\mathfrak{z}$ ij.	D. ut antea.
Spir. Tart. $\mathfrak{z}$ ij.	

##### 5 Potiuncula alexipharmaca.

R. Aq. Ulmar.	Scord. a. $\mathfrak{z}$ j.
Flor. Acac.	Succ. citr. rec. $\mathfrak{z}$ ss.
Scorzon.	Sir. ceras. acid. $\mathfrak{z}$ vj. M.
C.C. citr. a. $\mathfrak{z}$ iss.	D. cochleatim.

Ess. alexiph.

Julapium temperans in æstu Febris.

R. Aq. Galeg.	Berb.
Cicbor.	Ceras. acid.
Fragar.	Succ. citr. rec. a. $\mathfrak{z}$ ss.
Scabios.	Sir. granat. acid. $\mathfrak{z}$ ss.
Bugloss.	Clyss. $\mathfrak{z}$ ii Sulph. q. s. ad
C.C. citrat. a. $\mathfrak{z}$ iss.	Gratam aciditatem.
Rob. Cydon.	D. sæpius.
Rib.	

#### VII. Methodus Medendi.

- 1 Cum Febris hæc sit composita, respiciendum quoque est partim ad materiam viscidam in primis viis hærentem, partim ad materiam organasticam in Massam sanguinis diffusam, hoc enim si negligitur, facile errores committuntur.
- 2 Quare primo loco, uti in Tertiana intermittente, Tartarus Vitriolatus aut aliud quoddam digestivum versus Paroxysmum exhibeatur, ut materia viscida in primis viis hærens successive incidatur & evacuetur.

3 Postea vero respectus habeatur in æstu ad materiam illam fermentescentem, ut illa partim temperetur, partim vero evacuetur, ut hoc modo æstus Febris infringatur & symptomata mitigentur.

4 Ad hunc finem autem potissimum tendunt temperantia & diluentia: quare præter remedia lenia temperantia & diaphoretica moderate data, ægro sæpius exhibeantur in æstu sufficientia diluentia, inpr. calida & blande calida: partim ut hoc modo humores diluantur, partim etiam, ut moderato æstu ad placidam diapnoen disponantur.

5 Potus per blanda alexipharmaca vegetabilia alteratus uti & Emulsionem dilutæ ex Amygd. dulc. & Sem. Card. Mar. paratæ, hic multum præstant, quoniam hæc viam ad blandam diapnoen in hac Febre maxime necessariam, sternunt.

6 Cum vero hæc remedia sæpius non sufficiant, hinc postea alexipharmaca in usum trahenda sunt, inter quæ principem sane locum obtinet Essentia alexipharmaca Stahlii, quoniam admodum temperata est nec ullum detrimentum, uti ab aliis alexipharmacis calidis metuendum est.

7 Hæc E. Essentia mitescente æstu parvis sed repetitis vicibus exhibeatur, ut hoc modo Naturæ quæ in hisce Febribus facile errare solet, regia via ad salutarem viam, nempe diaphoresin perveniendi, monstratur: sudore enim neglecto nulla hic salus speranda est.

8 Si post hujus usum singulis quatuor vel sex horis repetitum sequitur diapnoe, optimum est signum & dicta Ess. continuanda est.

9 Si vero tempus novi Paroxysmi aut exacerbationis appropinquat, desistendum est ab ejus usu & quidem mature ne humores per frequentiores usum nimium incalescant.

10 Missio itaque versus meridiem dictæ Essentiæ usu, aut ante quam Febris hæc affligere solet, detur de novo pulvis digestivus & quidem aliquoties, ut hoc modo iterum pars materiæ morbificæ in primis viis hærentis resolvatur & postea sensim sensimque evacuetur.

11 Si in hac Febre in subjectis Plethoricis æstus nimium urget, optime conveniunt spiritus acidi minerales, Clyssus Antimon. Spir. Nitr. Vitr. Sulph. per campanam potissimum vero Succus citri, quod inpr. Sanguineis optime prodest.

12 Profunt etiam in tali casu & in aliis quoque ubi æstus est nimis Julapia ex Succis acidulis, Succo Citri & Spiritibus mineralibus parati, quibus etiam Pulveris temperantes jungi possunt, ut æstus eo melius temperetur.

13 Ad alvi libertatem quoque respiciendum est, quoniam clausa & æstum & symptomata juncta auget, aperta vero mitigat: huic scopo missis acrioribus inserviunt lenissima laxantia, & talia potissimum locum habent, quando morbi impetus aliquo modo remittit.

#### VIII. Cautela Practicæ.

1 Si ullibi in hac sane Febre, cautissime procedendum est, minimus enim error insignia post se trahit damna.

2 Ab initio sæpius lento admodum gradu procedunt, ita quidem, ut admodum mites videantur ac Medicum & patientes hinc securos reddunt, ut nihil mali metuant, sed mox indolem suam monstrant ac ægrotum jugulant, inpr. si malignitatem junctam habent.

3 Quare Medicus probe ad omnia attendat, ac omnem operam impendat, ut lenissima Methodo & convenientibus remediis mature omnia metuenda mala præcaveat.

4 Abstineat autem ab omnibus drasticis & commoventibus remediis, hæc enim non raro in causa sunt, ut morbus benignus visus revera in malignum degeneret.

5 Et hinc etiam Medicus non semper respiciat ad materiam illam in primis viis hærentem eamque evacuare tentet, hæc enim tantum periculum ac illa organastica in sanguine latens non minatur.



- 6 Vitet E. quam maxime omnia Vomitoria & Purgantia, hæc enim etsi humorum saburram e primis viis evacuent, nihilominus tamen maximas turbas in Massa Sanguinea producant, materiam orgasticam ad interiora derivant, ejusque placidam per peripheriam corporis excretionem impediunt.
- 7 Abstineat quoque a fortioribus & nimis calidis alexipharmacis ac volatilibus in æstu, hæc enim non solum Febres acutas & inflammatorias producant, sed etiam, sanguinem nimis commovendo & intimius resolvendo, morbum revera malignum reddunt & efflorescentiæ miliari viam sternunt.
- 8 Nullus quoque hic locus est Venæsectioni, nisi status insigniter Plethoricus aliæque circumstantiæ ejus usum urgeant.
- 9 Exulet quoque China Chinæ, quæ hic prorsus nullum habet usum, inpr. quando maturius exhibetur, post præmissa scil. Purgantia & Emetica: hoc modo enim excretio per peripheriam corporis simul supprimitur, unde morbus malignam induit indolem ac ægrotos præsentissimo vitæ exponit periculo. Et etiamsi tale quid non semper contingat, ægroti vel incidunt in Lentas & Hæcticas, ita ut diu miserrime languere cogantur, vel recidivam, ad quam Febris hæc quam maxime prona est, patiuntur.
- 10 Ad hanc evitandam ægri vitent aerem liberiores, inpr. vero humido frigidum, assumant vero quotidie aliquoties Ess. alexipharm. donec successive aerem ferre queant.

## CAPUT XXXII.

D E

## Febre Quartana Continua.

- I. *Definitio.* Quartana continua est species Febris compositæ, typum quidem Quartanæ servans, sed calore suo ab uno Paroxysmo ad alterum se extendens, in qua Natura motibus auctioribus labem visceri cuidam abdominis inductam reparare nititur.
- II. *Differentia.*
- 1 A Quartana simplici: in qua calor plenarie intermittit, hac vero is continuo durat.
  - 2 A Lenta & Hæctica: quamvis enim motus febriles & calor admodum Lenti in Quartana continua uti in Hæctica sint, typus tamen quartanarius facile differentiam monstrat.
- III. *Signa.*
- 1 Invadit cum frequentibus horripilationibus.
  - 2 Quas præcedunt pandiculationes & oscitationes.
  - 3 Tempus quidem, uti Quartana simplex, observat pomeridianum, sed sæpius ordinarias horas anticipat.
  - 4 Sequitur postea æstus sed siccus, qui primo die ægroto admodum molestus est.
  - 5 Die vero secundo & tertio mitior evadit usque ad novum Paroxysmum: interim tamen patientes propter debilitatem extra lectum manere nequeunt.
  - 6 Stupor caput continuo affligit, nulla tamen vera adest Cephalalgia.
  - 7 Adest continua siticulositas.
  - 8 Cui jungitur faucium & oris siccitas.
  - 9 Id quod potissimum fit propter insufficientem salivæ copiam, pauca enim & spumida est.
  - 10 Appetitus est insigniter prostratus aut languidus.
  - 11 Frigida, salsa & acida magis quam calida ægroti appetunt.
  - 12 Pulsus est quidem frequens in Paroxysmo, sed debilis.
  - 13 Quidam sentiunt tensiones in Hypochondriis.
  - 14 Alvus ad siccitatem continuo inclinatur.
  - 15 Urina est crassa roseum deponens sedimentum.
  - 16 Magna quidem ad somnum adest propensio, sed est maxime turbulentus: & quamvis ægroti interdum

dormiant, nullam tamen a somno percipiunt refo-cillationem.

IV. *Subjectum.*

- 1 Omnes ii, qui alias obdiversas causas Quartana corripitur solent.
- 2 Melancholico temperamento sive spissiori terrestri sanguine præditi.
- 3 Homines ætatis consistentis aut provectoris jam ætatis.
- 4 Tristitiæ & mœrori frequenti obnoxii.
- 5 Cibis crassioribus, viscidis, male digestionis, aqua palustri aut potu alias vitioso utentes.
- 6 Corpus aeri frigidiori & humido diu exponentes.
- 7 Spiritu Vini & inpr. frumenti abutentes.
- 8 Ad iracundiam tacitam proni, eam tamen supprimentes.
- 9 Per Adstringentia in Quartanam simplici præpostere tractari.
- 10 Præcipue vero quibus in talibus Febribus Quartanis remedia calida alexipharmaca vel in Paroxysmo, vel extra eum exhibita fuerunt.

V. *Prognosis.*

- 1 Uti Quartana simplex per se est morbus admodum pertinax, ita continua admodum quoque refractaria est, & multum temporis, si curari debeat, postulat.
- 2 Quo magis inveterata est, eo minor restitutionis est spes.
- 3 Recens tamen, si modo corpus alias bene fuit dispositum, successive per convenientia remedia curari potest.
- 4 Quartana hæc quam maxime inclinatur ad Hæcticam & in eam etiam facile degenerat.
- 5 Pariter transit etiam in Hydropem, præsertim si Adstringentia præpostere exhibentur.
- 6 Id quod eo facilius fit, si Urina in dies & crassior fit & imminuitur.
- 7 Ictericæ corporis defœdatio cum pedum Oedematibus & virium majori lapsu pessimum præbent indicium in Quartana continua.
- 8 Quo magis viscera sunt læsa, eo minus curatio speranda est & eo facilius etiam vel Hæctica vel Hydrops sequuntur.
- 9 Hydrops quidem, si scirrhus adest concretio, Hæctica vero, si exulceratio visceris adest.
- 10 Transit quoque interdum in Febrem acutam, si remedia calida sudorifera usurpantur.

VI. *Remedia.*

- 1 Blanda temperantia; Arcanum duplicatum, Tartarus Vitriolatus, Absorbentia acido quodam saturata.
- 2 Lenia diaphoretica: Antimon. diaphoret. Bezoard. min. Essent. alexiph. Stahlianæ &c.
- 3 Temperata laxantia: ex Fol. Senn. Rhabarb. cum Radic. & Herbis aperitivis. Pil. Becher. Stahlianæ, Polychrestæ &c.

## Formule Remediorum.

- 1 Potiuncula temperans.  
R. Aq. Cichor. Conch. citrat. ℥j.  
Tarax. Sacc. canar. ℥ij. M.  
Capill. ♀ a. ℥ss. D. versus Paroxysmum co-  
Tart. Vit. ℥j. chl.
- 2 Pulvis temperans.  
R. Arcan. dupl. Div. in 4. p. æq.  
Nitr. ℥iat. a. ℥ss. D. versus Paroxysmum.  
Conch. citrat. ℥j. M.
- 3 Mixtura diaphoretica.  
R. Essent. alexiph. ℥ij. D. 25. 30. gutt.  
Gent. ℥j. M.
- 4 Potio laxans.  
R. Rad. Cichor. Fol. Senn. f. ℥ss.  
Tarax. Rhabarb. elect. ℥ss.  
Polypod. a. ℥ij. Infus. in seri lactis ferven-  
Herb. Cent. min. tis ℥ss. D. mane ℥vj.  
Capill. ♀ a. mss.
- 5 Decoctum laxans.  
R. Tamarind. ℥ij. Rad. Cichor.  
H h Tarax.



Tarax. a. ℥ij.

Herb. Bellid. mj.

Coq. in Hls Δæ simpl. l.

feri lact.

D. colatur, ℥viij. calide.

6. Pilulæ aperientes &amp; laxantes.

R. Gum. Ammon. ℥j.

Aloes Gummos.

Extr. Cent. min.

℥j.

Card. bened.

Tinct. Tart. q. s. F. Pil. ad

Fumar.

pond. gr. j.

Hell. nigr. a. ℥ss. D. vesperi 15. 20.

## CAPUT XXXIII.

D E

Febre Rheumatica.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In hac Febre potissimum respiciendum est ad materiæ febrilis viscidæ incisionem & præparationem, ut ea post modum eo commodius evacuari possit. Quare ab initio dentur Salia digestiva, aliaque incidentia & resolventia.
- 2 Exhibeantur autem Salia digestiva versus Paroxysmum, ut cooperante Natura operatio remedii eo melius procedat.
- 3 In æstu, quoniam admodum mitis est, nulla fere requiruntur remedia, excepto potu sufficiente ad diluendos humores.
- 4 Sequentibus autem duobus diebus respiciendum est partim ad ipsam Febrem, partim ad incisionem & evacuationem materiæ febrilis.
- 5 Priori scopo inservit Essentia alexipharmaca, vel sola, vel cum alia amara, v. g. Cent. min. &c. remixta, quæ ante meridiem bis exhiberi potest.
- 6 Posteriori vero satis faciunt Intus & Decocta ex Herb. aperitivis, & Splenicis, leniter laxantia, quæ tempore pomeridiano dentur.
- 7 Si talis Infusa laxantia non sufficienter operantur, aut si solum ex Herb. & Rad. aperitivis sine Laxantibus sunt parata, vesperi detur dosis Pilul. Stahlî vel supra præscript.
- 8 Si hæc remedia per aliquod tempus fuerunt continuata, Crocus Martis & Stahlii Pulveribus digestivis potest admisceri.
- 9 Blazerus: commendat etiam Flores Salis Ammon. versus Paroxysmum digestivis Pulveribus additos.

## VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Quoniam Febris hæc lente admodum procedit, hinc etiam nullas fortiores commotiones ferre potest, sed propter eas statim in pejorem statum mutatur.
- 2 Exulent E. Vomitoria & Purgantia, quæ quidem evacuant, sed Febrem turbant & ad Hecticam disponunt.
- 3 Multo minus Vena hic secanda, utpote quæ in hac Febre prorsus nullo modo indicatur.
- 4 Fortiora alexipharmaca Febres acutas excitant, quare fugienda sunt.
- 5 Absorbentia, quæcunque demum etiam ea sint, improvide & nimium usurpata materiam febrilem adhuc magis incrassant & majorem lentorem inducunt, quare non nisi refracta dosi & cum acidis saturata dentur, sic enim majorem incidendi & abstergendi habent vim.
- 6 Si Febris imminuitur aut prorsus cessat, appetitus vero redit, caveant sibi ægrotantes, ne appetitui nimium indulgeant, quoniam recidiva facile sequitur.
- 7 Ad hanc præcavendam ægroti aliquandiu vitent aerem frigidum, & quotidie tam Pulveres digestivos quam Stomachico -- Carminativa usurpent.

I. *Definitio.* **F**ebbris Rheumatica est Febris symptomatrica, nullum certum typum servans modo intermittens modo remittens, eum in finem a Natura instituta, ut materia vel quantitate, vel quod utpl. fit, qualitate peccans e corpore per motus secretorios & excretorios auctiores e corpore expellatur, modo minoribus, modo gravioribus symptomatibus stipata.

II. *Differentia.*

- 1 Differt *gravi*: in aliis enim *mitior*, in aliis vero *gravior* est.
- 2 A Febre *eryspelacea*: quæ Inflammationem quandam notabilem in cute comitem habet, quæ vero in Febre rheumatica ordinaria deest.

III. *Signa.*

- 1 Invadit ordinarie cum horrore modo mitiore, modo graviore, qui ad incertum tempus sese extendit, ad horæ scil. quadrantem, dimidiam horam, imo ad integram horam.
- 2 Quam sequitur æstus satis gravis & mordax.
- 3 Sæpius vero & quidem utpl. continuæ adsunt horris & caloris alternationes, inpr. quando corpus solum aliquantulum in lecto commovetur.
- 4 Continuat hic æstus non raro aliquot horas.
- 5 Non tamen statim sequitur sensibilis sudoris excretio, sed æstus, inpr. in principio ordinarie, est ficcus.
- 6 Tempore æstus dolor capitis dorsi & artuum insigniter urget, magis vero se exferit respectu ætatis iis in locis, ubi excretiones humorum & dolores congestorii tam completi, quam incompleti fieri solent.
- 7 In aliis quoque insignis præcordiorum anxietas concurrit.
- 8 Sitis pro Febris diversitate diversa est, in aliis enim magis, in aliis minus urget.
- 9 Pulsus est celer & frequens & ante sudoris eruptionem plenus, sed simul aliquo modo mollis.
- 10 Urina excreta utpl. est pauca atque rubicunda.
- 11 Alvus ordinarie est adstricta, & si causa latet circa inferiora, flatulentia adm. dum urget.
- 12 Concurrit etiam tam in Febre, quam post finitum sudorem insignis artuum lassitudo, quæ tamen non adeo diu durat.
- 13 Et quamvis Paroxysmus sudore finiatur & reliqua symptomata mitigentur, remanet tamen insignis debilitas corporis cum dolore partis cujusdam & interdum cum aliquo tumore & levi rubore.
- 14 Paroxysmo hujus Febris nullum certum intercedit tempus, sed vagi admodum sunt & modo hac, modo illa hora invadunt.
- 15 Paroxysmi hi interdum adeo diu durant, ut continuatis merito suspecti sint: ita observavimus in quibusdam horrorem, quem æstus duos integros dies & adhuc amplius durans excipiebat.
- 16 Nonnunquam vero Paroxysmum finitum mox alius excipit: inpr. si in priori sudor non erupit. Passus sum ante 6 circiter annos hujusmodi Febrem, primus Paroxysmus cum magno horrore hora quinta vespertina invadebat, quem calor sed sine sudore excipiebat: circa mediam noctem alter sequebatur cum leni horrore, sed graviore æstu, siti, dolore capitis, dolore dorsi & scapularum &c. ast iterum matutina tertius superveniebat sine horrore, ast gravissimo æstu, doloribus majoribus capitis & delirio, qui post sextam in largissimos sudores fiebat. Quo omnia symptomata cessabant, excepto dolore scapularum & colli, qui aliquot dies durabat, ita



ita ut collum movere nequirem. Observavi id quoque in aliis, qui spatio viginti quatuor horarum duobus aut tribus Paroxysmis correpti fuerunt.

- 17 Ordinarie autem non nisi unicus observatur Paroxysmus febrilis, quem excipit dolor vel cervicis & scapularum vel dorſi, ossis sacri aut aliarum partium qui non nisi elapſo aliquo tempore sensim sensimque sub blanda diapnoe cessat.
- 18 Observavimus quoque talem Febrem statas periodos servantem in femina juniore, quæ singulis diebus præcise hora duodecima meridiana cum insigni dolore hemicranico ad vespertinam octavam continuante corripiebatur, & hæc Febris cum dolore per integrum octiduum durabat, quo finito Febris quoque cessabat, remanente solum adhuc dolore aliquo capitis.

#### IV. Subiectum.

- Homines temperamenti humidioris, Sanguinei, Sanguineo Phlegmatici, Plethorici.
- Plethoram nimium commoventes.
- Vino & liquoribus spirituosis abutentes.
- Vitam otiosam subito cum laboriosa commutantes.
- Excretiones sudoris assuetas negligentes.
- Venæsectiones & scarificationes debito modo non observantes.
- Quibus sanguinis fluxus, v.g. Hæmorrhagiæ narium, Menſes aut Hæmorrhoides suppressi sunt.
- Affectibus Rhevmaticis sæpius afflicti & in iisdem male tractati.

#### V. Prognosis.

- Febris hæc sæpius per solam tranquillam continentiam & per diaphoresin a Natura curatur.
- Facile etiam cedit remediis temperantibus & diaphoreticis fixis debito tempore exhibitis.
- Male vero tractata inpr. remediis diaphoreticis calidis & volatilibus facile degenerat in acutam.
- Rhev mata talia cum Febre conjuncta, si partes internas occupant, & male tractantur, Febres inflammatorias producant.
- Quo magis urget æstus, eo magis metuendum est, ne affectus in morbum acutum transeat.
- Si Febris hæc aliquoties homines afflixit, postea ob leviores etiam causas eos iterum corripit.
- Si æstus & horripilationes alternis vicibus affligunt, melius est, quam si æstus continuus diu ægrotos torquet.
- Alvus adstricta malum exasperat, aperta vero levius reddit.

#### VI. Remedia.

- Temperantia: Arcan. duplic. Tart., Tartarifat. Vitr. Lap.  $\mathfrak{c}$ . Conch. Citrat. Mat. Perl. Lap. Percar. lenia acida, Succus Citri &c.
- Blanda diapnoica: Aqu. Card. bened. Mariæ, Scabios. Scord. Scorzon. Galeg. &c.  $\mathfrak{g}$ . diaphor. Bezoard. miner. Mixt. simpl. Essentia, Scord. Pimpin. alb. Alexipharmaca.
- Lenia laxantia: Magnes. alb. Manna, Fol. Senn. Rhabarb. Pil. Stahlianæ, Becherianæ, Tart. &c.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Potiuncula temperans.

Rx. Aqu. Scabios.	Nitr. $\mathfrak{g}$ iat. a. $\mathfrak{z}$ ss.
Scorzon.	Cinnab. nat. $\mathfrak{g}$ j.
Tarax.	Sir. acetos. citr. $\mathfrak{z}$ ss.
Cichor.	M.
C. C. citr. a. $\mathfrak{z}$ j.	D. sing. 2. 3. horis cochl. aliquot.
Arcan. dupl.	
Conch. citrat.	

##### 2 Alia diapnoica.

Rx. Aqu. Galeg.	Nitr. regener.
Fl. acac.	C. C. Philos. a. $\mathfrak{g}$ j.
Ulmav.	Cinnab. $\mathfrak{g}$ ii. gr. XV.
Card. bened. a $\mathfrak{z}$ j.	Tab. M. xst. f. $\mathfrak{z}$ ij. M.
Bezoard. miner.	D. ut antea.
Matr. perl.	

##### 3 Alia.

Rx. Aqu. Fl. Samb.	Rub. id.
--------------------	----------

Ceras. nigr.  
Scord. a.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\mathfrak{g}$  diaphor.  
Lap.  $\mathfrak{c}$ . ppt.

Nitr.  $\mathfrak{g}$ iat. a.  $\mathfrak{g}$ j.  
Ess. alexiph.  $\mathfrak{g}$ j.  
Sir. ceras. acid.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
D. cochl. tempore sudoris.

##### 4 Decoctum laxans.

Rx. Tamarind. $\mathfrak{z}$ ss.	in quibus dissolv.
Coq. in f. q. Aq. f.	Mann. elect. $\mathfrak{z}$ ij. M.
Rx. Colat. $\mathfrak{z}$ vj.	Colat. D. calide vel tepide.

##### 5 Infusum laxans.

Rx. Fol. Senn. $\mathfrak{z}$ ij. iij.	Aq. Cichor. $\mathfrak{z}$ vij.
Rhab. elect. $\mathfrak{z}$ ss.	In Colat. dissolv.
Sal. Absinth. $\mathfrak{z}$ j.	Mann. elect. $\mathfrak{z}$ j. M.
Infund. per noct. in	D. ut antea.

##### 6 Aliud.

Rx. Rad. Cichor.	Fol. Senn. f. f. $\mathfrak{z}$ vj.
Tarax.	Rhabarb. elect. $\mathfrak{z}$ ij.
Polypod.	Cort. Ont.
Vincetox. a. $\mathfrak{z}$ ij.	Tart. solub. a. $\mathfrak{z}$ j.
Herb. Bellid. c. Fl.	Incis. infund. in
Capill. $\mathfrak{q}$	Vin. alb. $\mathfrak{q}$ Aq. f.
Cent. min. a. mfs.	$\mathfrak{z}$ ij. D. mane $\mathfrak{z}$ vj. viij.

##### 7 Pilulæ laxantes.

Rx. Pil. Tart. $\mathfrak{g}$ j.	D. mane.
----------------------------------	----------

##### 8

Rx. Pil. Becher. $\mathfrak{g}$ j.	D. vesperi.
------------------------------------	-------------

#### VII. Methodus medendi.

- In commotionibus hisce Febrilibus, quæ ordinarie a Natura ad expellendam materiam acrem Salfobiliolam in sanguine hærentem instituuntur, nunquam tamen verum febrilem typum observant, ante omnia eo respiciendum est, ut materia hæc mature partim temperetur, partim e Massa Sanguinea ad habitum corporis pellatur.
- Huic fini potissimum interviunt remedia temperantia, materiæ illius acrimoniam aliquo modo infringentia & æstum febrilem ita moderantia, ut per habitum corporis possit excerni.
- Hæc ipsa temperantia, inpr. Salina cum Absorbentibus mixta, simul etiam optime Urinam pellunt, ac multas partes salinas biliolas per Urinam evacuant.
- Iis tamen statim vel jungenda vel subjungenda sunt lenia diapnoica, hæc enim temperantibus mixta & Urinam & diaphnoen pellunt, adeoque affectus curationem faciunt.
- Eo magis autem insistendum est hisce remediis, si æstus nimium urget cum aliis symptomatibus febrilibus, ut hoc modo blanda diaphnoe promoveatur.
- Si alvus est adstricta, ita ut ideo motus febriles magis urgeant, aperiatur Clystere emolliente, aut vesperi dentur Pilulæ ex Gummatibus & Extractis, aut Stahlianæ, quæ omnes excretiones promonent.
- Non solum autem curative, sed etiam præservative profunt, inpr. si Venæsectiones æquinoctiales aut Scarificationes in subjectis dispositis præmittuntur.
- Non sine fructu etiam Infusa laxantia & incidentia evacuationibus sanguinis subjunguntur, quæ humores incidendo successive evacuant.
- Hisce autem laxantibus palmam facile præcipiunt Pilulæ ex Sal. Tart. fixo certa encheireſi volatili reddito & cum Extracto quodam Purgante mixto, quæ non solum affectum brevi tempore mitiorem reddunt, si noctu ad gr. vj. viij.  $\mathfrak{d}$ ss. sumuntur, sed etiam dolores post Rhev mata relictos, imo eos quoque qui in articulis jam fixi sunt, mitigant & tollunt, quod sæpius expertus sum.

#### VIII. Cautelæ Practicæ.

- In febrilibus hisce commotionibus abstinendum est ab omnibus commoventibus & drasticis remediis: exulent E. omnia emetica, Purgantia acria &c.
- Absint quoque sudorifera calida, quæ maximos motus in Massa Sanguinea excitant, Rhev mata exasperant, ita ut non raro in Febre acutas degenerent.
- Ægroti in lecto quantum quidem possunt, tranquilli sint, ac finem sudoris expectent.



- 4 Vitent quoque omnes fortiores commotiones, quoniam hæc malum facile revocant; e contra vero corpus placido motu exerceant, ut hoc modo sanguis æqualiter distribuatur ac secretiones & excretiones promoveantur.

## C A P U T XXXIV.

D E

*Febre Scorbutica.*

I. *Definitio.* **F**ebbris Scorbutica est Febris symptomatice & erratica horripilationibus & æstu alternantibus ac maculis in peripheria corporis postea stipata, a Natura eum in finem excitata, ut per motus auctiores materiam quandam noxiam ad habitum corporis expellat.

II. *Differentia.*

- 1 Respectu commotionum febrilium, quæ in aliis graviores, in aliis vero mitiores sunt.
- 2 Deinde Febris hæc non confundi debet cum illis in quibus interdum ob culpam ægrotantium & Medicorum, aut etiam ob concurrentem Cacochymiam maculæ rubicundæ occurrunt. Hæc enim Febris scorbutica requirit subjecta, quæ antea frequentibus maculis rubris, lividis &c. afflicta fuerunt. Vocabar ante duodecim, & quod excurrit annos ad ægrotum quendam qui maximum æstum patiebatur: corpus hinc inde maculis rubicundis conspersum erat, & quidam existimabant eum laborare Petechiis, alii vero Scorbuto. Sed cum accuratius inquirerem in regimen & assumpta remedia, utrumque negabam; æger enim in æstu die eodem electo surrexerat: unde sequebatur aliqualis horror cum insigni æstu; adstantes ad expellendum venenum, uti putabant, dederant Theriacam Andromachi, Tinct. Bezoardicam, vinum rubrum generosum &c. ac ægrotum colore hypocaufti ac stragulis cogere voluerant ad sudorem, unde in tali æstu maculæ eruperant. Præscribebam E. Potiunculam diaphoreticam temperantem ac Emulsionem, unde sequenti die melius se habebat, maculæ vero disparuerant, & sic elapsis paucis diebus pristinam sanitatem recuperabat.

III. *Signa.*

- 1 Præcedunt multa Scorbuti signa, de quibus supra Tab. de Scorbuto actum fuit, quæ manifeste Scorbutum adesse monstrant.
- 2 Inpr. vero sæpius affliguntur maculis varii coloris, rubicundis, ex atro rubris, lividis &c. sine concursu sensibili febrili.
- 3 Imo ordinarie præcedunt hæc maculæ ipsas commotiones febriles, illasque comitantur.
- 4 Et si antea non sufficienter prodierunt, per motus febriles magis expelluntur, ut hoc modo Natura sine suo potiatur.
- 5 Sed tales maculæ ordinarie sunt minores ac numero pauciores, coloris minus consueti, & etiam in locis inconvenientibus prodeunt, donec Natura motibus suis febrilibus per consueta loca & sufficiente numero ac magnitudine eas expellat.
- 6 Interea in partibus in quibus tales maculæ hærent, aut per quas expelli debent, insolito languore ac torpore affliguntur.
- 7 Quos non raro dolores tendentes, prementes, modo minores, modo graviores sequuntur, ita ut ægræ ob fatigationem & dolorem insignem admodum inquieti sint.
- 8 Quoad ipsas febriles commotiones, sunt eæ admodum variabiles & inconstantes.
- 9 Non raro enim mitiores quoque tales motus uno impetu in vehementes commotiones degenerant.
- 10 Quæ tamen diu non durant, sed brevi iterum finiuntur.
- 11 Interim tamen gravia & molesta admodum in tem-

porariis hisce commotionibus conjuncta habent symptomata.

- 12 Præter scil. fatigationem & dolores tensivos, modo memoratos, angustias & anxietates præcordiorum.
- 13 Quibus junguntur vertiginosæ capitis perturbationes.
- 14 Alvus est perturbata, sive modo adstricta modo sicca.
- 25 Nulla tamen deliria concurrunt in hisce perturbationibus.
- 16 Sed sæpius urgentibus hisce symptomatibus insperata sequitur animi alacritas & euphoria.
- 17 Et tales vicissitudines interdum cito alternant, ita ut statim symptomata illa iterum urgeant.
- 18 Nullus tamen unquam in hisce Febrilibus commotionibus observatur typus multo minus periodus, sed vago modo ægrotos corripiunt, adeoque revera nil nisi Febres symptomatice sunt.
- 19 Sed tam diu recurrunt, donec materia, quam Natura expellere nitebatur, e corpore excreta sit.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines Scorbuto vero laborantes & eum antea sæpius experti.
- 2 Per malum vite regimen Scorbutum incurrentes.
- 3 Cacochemici etiam simul multa hypochondriaca pathemata passi.

V. *Prognosis.*

- 1 Febres tales nullum periculum minantur, etiam si frequentius recurrant.
- 2 Et hinc magis in iis respiciendum est ad affectum primarium, nempe Scorbutum, quam ad commotiones febriles.
- 3 Quo neglecto facile per remedia inconvenientia turbari possunt.
- 4 Inpr. quando pathemata hypochondriaco arthritica concurrunt, sic enim commotiones tales febriles facile in pejorem statum degenerant.
- 5 Quamvis autem Medici sæpius Scorbutum in multis Febrilibus tanquam causam accusent, revera tamen Febres tales scorbuticæ in nostris regionibus maxime sunt raræ: an vero frequentiores sint iis in regionibus, ubi epidemice homines affligunt, innotunt qui in talibus locis praxin exercent. Fateor me in tota mea Praxi ultra quinque vel sex hoc morbo laborantes non observasse. Vocabar aliquando ad puerum novem vel decem annorum, qui, eo tempore quo Febres petechizantes hic grassabantur, post horripilationem & æstum totum corpus maculis varii coloris satis magnis conspersum reportabat. Chirurgus jam consultus fuerit, qui dum Petechiarum mentionem fecerat, magnum terrorem parentibus incusserat: cum veronil nisi leviores commotiones febriles in puero deprehenderem adstantes læto animo esse jubebam: exhibebam E. nil nisi potiunculam leniter diaphoreticam & simul temperantem unde brevi salvus erat.
- 6 Commotiones hæc febriles non facile ad acutam indolem inclinant, nisi admodum perverse tractentur.
- 7 Magis vero tendunt ad diuturnitatem sive frequentiore recidivam, si affectus primarius non tollitur.

VI. *Remedia.*

- 1 Lenia temperantia & diaphoretica: Arcan. dupl. Tart. Vit. & diaph. Bezoard. miner. &c.
- 2 Blanda laxantia Tamarind. Fol. Senn. f. f. Rhabarb. Manna, Pil. Stahlianæ.
- 3 Anti Scorbutica: Vid. Tab. de Scorbuto.

*Formula Remediorum.*

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 Potiuncula diaphoretico temperans. |                       |
| Rx. Aq. Cherefol.                    | ℥ diaph.              |
| Brecabung.                           | Nitr. regener.        |
| Nummular.                            | Tart. Vit. æ. ʒj.     |
| Bellid. æ. ʒj.                       | Sacch. Canar. ʒij. M. |
| Conch. citrat.                       | D. cochlearim.        |



## 2 Infusum laxans.

- R. Rad. Vincetox. Fol. Senn. f. st. ʒvj.*  
*Onon. Rhabarb. el.*  
*Polyp. Fibr. Helleb. nigr. ʒij.*  
*Herb. Fumar. Incis. infund. in Vin. ʒiij.*  
*Trisol. fibr. Colat. D. ʒvj. mane.*  
*Cherefol. ʒ. mss.*

Reliquas Formulas contra Scorbutum vid. *supra*.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Febris Scorbutica rarius postulat peculiarem Methodum, sed curato morbo primario, nempe Scorbuto per se cessat.
- 2 Nec etiam opus est remediis, quoniam per solam tranquillam in lecto continentiam ordinarie sponte cum omnibus symptomatibus curatur.
- 3 Si tamen aliquid agendum est, sufficiunt temperantia cum diaphnoicis interposito solum potu sufficiente, inpr. mediocriter calido.
- 4 Præservationis gratia conveniunt lenia laxantia cum antiscorbuticis mixta, præsertim si aliquandiu usurpantur, aut certis temporibus repetuntur.
- 5 Hisce vero semper interponantur antiscorbutica ut hoc modo affectus primarius tollatur.
- 6 Si in commotionibus hisce febrilibus pathemata hypochondriaco arthritica occurrunt, ad hæc quoque respiciendum est, de quibus suo loco.

VIII. *Cautela Practica.*

- 1 Quamvis hæ commotiones febriles in Scorbuto sæpius sint leviores, nunquam tamen prorsus negligendæ sunt.
- 2 Multo minus perversa Methodo utendum est, quoniam gravia mala non raro exinde originem trahunt.
- 3 Exulent hic omnia commoventia, Vomitoria, Purgantia fortiora, Volatilia, fortiora sudorifera &c.
- 4 Reliquas Cautelas Vid. *Tab. de Scorbuto*.

## CAPUT XXXV.

## D E

*Febribus corruptis & nondum typicis.*

I. *Definitio.*

- 1 **F**ebres corruptæ sunt Febres partim intermittentes, partim acutæ, quæ vel propter malum regimen, vel propter perversam medicationem ita corruptæ sunt, ut ab indole & typo ordinario prorsus alienæ sint ac hinc tam diagnosin, quam curationem admodum difficilem reddant.
- 2 Febres nondum typicæ sunt commotiones febriles modo graviores modo mitiores, quæ tamen, licet communia febrilia symptomata conjuncta habeant, nondum tamen se ita manifestant, ut exinde plenarie cognosci queat, an ad acutas, an vero ad intermittentes referri debeant vel queant.

II. *Differentia.*

- 1 Febris corrupta est vel *intermittens* vel *aucta* aut *continua*.
- 2 Eadem differentia quadrat quoque in Febres nondum typicas.

III. *Signa.*

- 1 Quando omnia symptomata ita sunt confusa, ut morbus ad nullam certam Febrem referri queat, quoniam typus simul perversus est: aut quando Febris in suo gradu cum omnibus symptomatibus nimium aucta est, aut quando in vigore suo defecit præsentem nihilominus virium prostratione.
- 2 Februm vero nondum typicarum symptomata sunt, invasio quædam febrilis vel fortior, vel mitior: primis tamen diebus vix cognosci potest, ad quam Februm classem referri debeant vel queant.

IV. *Subjectum.*

- 1 Homines quicunque in Febribus tam intermittentibus quam acutis per inconvenientia remedia imprudenter tractati.
- 2 Ægroti regimen Febribus conveniens minime observantes.
- 3 Sensibiles & ad animi commotiones proni.

V. *Prognosis.*

- 1 Febres corruptæ ordinarie majori exponunt periculo ægrotantes, quam non corruptæ, quoniam omnia symptomata magis urgent.
- 2 Majus adhuc periculum ab iis imminet, si simul excretiones in Febribus necessariæ suppressæ sunt.
- 3 Febres corruptæ semper diutius durant & difficilius curantur, quam non corruptæ.
- 4 Febres intermittentes corruptæ facilius curantur quam acutæ.
- 5 Acutæ corruptæ semper admodum periculosæ sunt, & quamvis conveniente etiam Methodo tractentur, nihilominus tamen sæpius ad mortem properant.
- 6 Febres nondum typicæ si imprudenter tractantur, facile in graviores morbos degenerant.

VI. *Remedia.*

- 1 Sunt sæpius laudata temperantia, absorbentia, diaphoretica fixa, Julepi, Emulsiones &c.
- 2 Alexipharmaca varia hisce interposita.
- 3 Lenia laxantia pro divergitate Februm.
- 4 Tonica varia superius recensita.

*Formula Remediorum*

Vid. *Tab. præcedentes.*

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 *In morbis corruptis.*
  - a Cum tales Febres per imprudentem medicationem & malum regimen corruptæ fuerint, Methodo cuiusvis Febrì convenienti tractandæ sunt.
  - b Conveniunt E. ab initio sæpius laudata digestiva, absorbentia acido Citri saturata & diaphoretica fixa cum Essentia alexipharmaca reliquis vel mane vel a meridie interposita.
  - c Ad Alvi laxitatem semper etiam respiciendum est, inpr. in Febribus intermittentibus corruptis, quoniam ab alvi libertate symptomatum mitigatio dependet.
  - d Pilulæ Stahlianæ & Becherianæ ac amara cum lenibus laxantibus mixta hic optima sunt, quoniam ad Febris revocationem multum contribuunt.
  - e Si Febris iterum in ordinem redacta est, tractetur postea Methodo ordinaria.
- 2 *In Febribus nondum typicis;*
  - a Exhibeantur ab initio digestiva cum absorbentibus & diaphoreticis fixis, quibus pro circumstantiarum ratione interponatur Ess. alexiph.
  - b Et hæc remedia tam diu continuanda sunt donec Febris certum typum acquisiverit.
  - c Si autem talis typus se manifestat, probe deinde ad eum medicus attendat, ne iterum per imprudentem remediorum applicationem turbetur.
  - d Sin vero prorsus nullus adest typus, Medicus inquirat in tempus invasionis, an matutinum, antemeridianum, pomeridianum an vero vespertinum fuerit, ut & an cum, an vero sine horrore invaserit; & sic versus tempus exacerbationis consueta digestiva cum absorbentibus fixis, declinante vero Paroxysmo alexipharmaca exhibeat.

VIII. *Cautela Practica.*

- 1 In Febribus corruptis pariter ac nondum typicis abstinentum est ab omnibus remediis commoventibus & Venæsectione, quoniam morbos & typum magis pervertunt, laudanda potius est mitissima Methodus.
- 2 In Febribus corruptis ægrotus non obruatur remediis, ad expugnandum morbum, quoniam enim restitutio tarde procedit, patientia opus est.
- 3 Essent. alexipharmacam, inpr. Ess. Scordii probe mitigatam, præstat minoribus & repetitis dosibus, quam auctoribus exhibere.
- 4 Absorbentia quæ cum digestivis exhibentur, semper sint acido Citri saturata, sic enim eo melius & diuresin & diaphoresin promovent.



## L I B E R VI.

D E

## AFFECTIBUS SENSUUM INTERNORUM

E T

## EXTERNORUM IN GENERE.

I. *Definitio.*

**M**Orbi sensuum sunt affectus præternaturales, sensus affligentes, eorum functionem magis vel minus lædentes, a variis causis originem trahentes.

II. *Differentia.*

- 1 Alii sensus externos corripunt, uti sunt varii affectus oculorum, aurium &c.
- 2 Alii vero sensus internos affligunt, uti sunt varia deliria.
- 3 Alii sunt recentes & sensuum functionem solum aliquo modo lædentes.
- 4 Alii vero inveterati & sensuum tam internorum quam externorum usum quam maxime perturbantes.

III. *Signa: quæ per se facile patent*1 *Sensuum externorum:*

- a Visus imminutio per *Hypopium*, *Unguem oculi* &c. ejusdem abolitio per *Cataractam*, *Guttam serenam*, graviores læsiones oculorum.
- b Auditus læsio aut abolitio per *Obauditionem*, *Tinnitus*, & *Susurrum aurium*, *Surditatem*.
- c Depravationes & læsiones Gustus & Olfactus, ita ut omnia falsa, amara &c. appareant.
- d Læsiones tactus variæ ex relatione ægri se manifestantes.

2 *Sensuum internorum:*

- a Læsiones memoriæ, debilitas ejusdem & amissio.
- b Rationis perversus status in variis deliriis tam acutis in Febris, quam Chronicis. *Melancholia*, *Mania*, *Moria* &c.
- c Læsiones appetitus, dum vel imminuitur, vel depravatur, vel augetur, fitis vel aucta vel nulla. Signa Specialia in sequentibus tabulis explicabuntur.

IV. *Subiectum.*

Affectibus hisce in genere obnoxii sunt omnes homines, quilibet enim in tales morbos ob varias causas incidere potest.

- 2 Magis tamen ad eos inclinant homines, frequentes congestiones ad sensoria passî.
- 3 Varios morbos tam acutos quam chronicos experti, a quibus sæpius talia mala producantur.
- 4 Quibus Philtra vel venena exhibita fuerunt.
- 5 Meditationibus nimium indulgentes.
- 6 Melancholici, sanguinem spissorem habentes, mœrori & tristitiæ dediti.
- 7 Maxime sensibiles, iracundi. Reliqua vide in *Tab. Specialibus*.

V. *Prognosis.*

- 1 In læsiones sensuum Ars Medica tantam non habet potentiam ac in alios morbos, & hinc non pauca illarum vel sunt admodum chronica, vel incurabiles.
- 2 Chirurgia interdum facilius adhuc tollere potest nævos oculorum internos, quod videmus in *Hypopio*, *Ungue oculi* & depositione *Cataractæ*.
- 3 Læsiones sensuum internorum, a fortioribus animi pathematibus productæ, utpl. eludunt omnem operam Medici.
- 4 Si vero res naturales in causa sunt, uti sanguis

spissior in liene incarceratus causa est *Melancholiæ hypochondriacæ*, aliquando curationem admittunt, quamvis & hic magnus requiratur labor; idem censendum est de *Mania*,

- 5 Deliria, a Philtris, Venenis &c. producta, adhuc difficilius curam admittunt.

VI. *Remedia.*

- 1 Evacuantiæ varia per superiora & inferiora.
- 2 Omnis generis alterantiæ, incidentiæ, resolventiæ, absorbentiæ.
- 3 Auxilia Chirurgica varia, ope instrumentorum & remediorum.
- 4 Specifica, quæ tamen rarissima sunt.

*Formula Remediorum.*

De hisce vid. *Tab. sequentes*,

VII. *Methodus medendi, &*VIII. *Cautele Practicæ.*

- 1 Hæc pro diversitate subiectorum, affectuum, admodum variat, quare Medicus ad omnia probe attendat necesse est.
- 2 Nonnunquam Venæsectione opus est, sed Medicus probe examinet, quo tempore & qua in parte ea institui debeat.
- 3 Imprudenter enim instituta sæpius affectus graviores reddit.
- 4 Si purgandum est, id pariter fiat debito tempore & remedia in sufficienti copia exhibeantur, quidam enim horum morborum non nisi lenes postulant laxationes, quidam vero etiam drastica Vomitoria & Purgantia dum euphoria ferunt, uti id videmus in maniacis, quibus interdum doses remediorum in duplo exhibere necesse est.
- 5 Si morbus talis dependet ab alio, semper ad primum respiciendum est, quo neglecto nunquam salutaris obtinetur finis.
- 6 Cura moralis in affectibus imaginationis plus sæpius prodest, quam omnia alia remedia.
- 7 In deliriis a Philtris, Venenis &c. Medicus utpl. ob defectum specificorum oleum & operam perdit.
- 8 Nunquam tamen exhibeantur specifica, nisi præmissa fuerint, ubi opus est, universalis, Venæsectio scil. Vomitoria, Purgantia, Diaphoretica, Incidentia, Absorbentia &c.
- 9 In Deliriis mulierum coitus sæpius omnia reliqua remedia superat. Vid. infra sub *Morbis Mulierum*.
- 10 Si læsiones sensuum internorum dependent a peculiari partium conformatione, Medicus frustra utitur omnibus remediis.
- 11 Cura præservativa hic in Medico probe quoque est attendenda, quoniam tales affectus facile recrudescunt: novi feminas, qui in puerperio semper erant maniacæ, aliæ melancholicæ, aliæ vero adeo simplices, ut vix aliquid comprehendere possent. In aliis observavi tempore graviditatis vel perpetuam Melancholiam vel furorem contra maritos, quos tamen maxime amabant, directum, quæ tamen incommoda misso sanguine mox cessabant. In aliis malum tempore vernali, in aliis vero autumnali recrudescit; adeoque Medicus consideratis omnibus circumstantiis modo Laxationes, modo Venæsectiones &c. instituere debet.



## S E C T I O I.

D E

## MORBIS SENSUUM EXTERNORUM.

## C A P U T P R I M U M.

D E

*Hypopio & Pterygio.*I. *Definitio.*1 *Hypopii.*

**H**ypopium est parvum apostema & pustula sub tunica cornea, a perpeffa inflammatione, male discussa, producta.

2 *Pterygii s. Unguis:*

Pterygium s. Unguis est concrementum quoddam membranofum, volucrum alam l. unguem humanum repræsentans, ex cantho oculi majori plerumque originem fumens & ad pupillam sæpius se extendens visumque intercipiens.

II. *Differentia.*

1 Quomodo Hypopium & Pterygium inter se differant ex Definitionibus patet.

2 Pterygii plures ab Auctoribus recensentur species. Aliud enim e *tenui* tantum *membrana* formatum videtur: aliud e *pinguedine*: aliud denique ex *fibris carnosis*, intertextis aliquot vasculis sanguineis, quod specialiter *Pannus* audit.

3 Aliud porro est *parvum*, aliud *magnum*: aliud fortiter corneæ adhærens: aliud facile ab eadem separabile: aliud *album*, aliud *rubrum*.

III. *Signa.*1 *Hypopii.*

Pustula parva ad instar variolæ in hac l. illa oculi parte post prægressam inflammationem exurgens.

2 *Pterygii:*

Excrescentia e cantho oculi majori exorta, & quotidie magis magisque in latum se se extendens, figuram alæ l. unguis efformans, tandemque ipsam visionem obscurans.

IV. *Subiecta.*

1 Hypopio expositi sunt, qui Ophthalmia sanguinea laborant.

2 Qui contusionem oculorum passi sunt.

3 Quibus oculi variolis obfidetur.

4 Pterygio, quibus Hypopium minus bene curatum fuit.

5 Quibus acriora remedia, affluxum humorum invitantia, applicantur.

V. *Prognosis.*

1 Inflammatio oculorum, nisi rite discutiatur, post se ducit suppurationem Hypopiumque efformat.

2 Hypopium vero minus bene mundificatum Pterygio sæpius occasionem præbet.

3 Hypopium selectis remediis facile cedit, nullamque deformitatem post se relinquit.

4 Quo proprius vero ipsi pupillæ est, eo accuratius tractandum.

5 Pterygium in principio suo adhuc constitutum non ita difficulter remediis externis tollitur.

6 Quando vero jam latioris ambitus est, tunc minus obedit his medicaminibus, sæpiusque præsidio Chirurgico opus est.

7 Ubi tamen exquisitior concurrit sensus, nec Operatio Chirurgica tuta est, cum Carcinoma exinde quandoque originemumat.

VI. *Remedia.*

1 Generaliora, affluxum humorum versus superiora derivantia & evacuantia: Venæsectio & Scarificatio in statu Plethorico; laxantia ex Rhabarbaro, & dulci,

Extract. Helleb. nigr. Panchym. Croll. Ma ff. Pil. e Succ. Crat. Resin. Jalapp. Scammon. Sal. Epsom. f. Cathart. amar. Pediluvia.

2 Discutientia in Ophthalmia celebrata, & in specie Unguentum ophthalmicum D. Weisbach.

3 Hypopium ruptum mundificantia, septica leniora: Ungt. modo laudatum, mel in vase cupreo liquatum, donec viridescat, saccharum in vase cupreo ad cæruleum fere colorem tritum, os sep. ppt. Conch. ppt. mat. perl. ppt. Test. ovor. subtiliss. pulverisat. Tut. Pompholyx, Nihil. alb. pulveretenus inflata, vel cum ∇ ophthalmicis, Euphras. Fl. Cyan. Ros. Calcitr. chelid. maj. mixta & applicata, Vitriolum album & saccharum ∇ ni in ∇ ophthalm. solut. & guttatim applicita, saccharum Canariense subtilissime pulverisatum, oleum laterinum.

4 Pterygia emollientia: Pinguedines recentes: Anseris. Asciae piscis, Serpent.

5 Eadem absumentia: septica supra commendata mitiora, post & fortiora: fel Anser. Gallinar. piscium cum melle subactum, Succ. Nicot. Chelidon. major. Aloe hepatica; denique penetrantissima: Vitriolum Cyprium, & præcipitat. Æs ustum, Lithargyrium, Crocus Metallorum, aquis, oleis l. mucilagibus diluenda & temperanda. Ultimo loco Operatio Chirurgica.

*Formula Remediorum.*1 *Pilulæ laxantes.*

Rx. Extract. panchym. Crol. Resin. Jalapp. gr. iv.  
gr. XII. F. l. a. Pil. No. XV.

& ii dulc. vit. par. gr. vi. D. pro una vice.

2 *Pulvis laxans.*

Rx. Specif. Jalappin. ℥ss. M. D. pro una vice.

& ii dulcis vit. parat. ℥ss.

3 *Sal laxans.*

Rx. Salis Cathart. amar. ℥j. calente.  
Assumatur in juscule

4 *Unguentum Ophthalmicum discutiens & resolvens.*

Rx. Ungt. ophthalm. D. Weisbach. ℥ij ad magnitudinem pisi  
oculi cantho majori.

Applicetur bis per diem

5 *Aqua ophthalmica mundificans & exiccans.*

Rx. Tut. ppt. ℥j. Chelidon.  
Matr. perl. ppt. Fenic. a. ℥ij.

Off. sep. ppt. a. ℥ss.

Camph. ℥ss.

∇ Euphras.

6 *Unguentum emolliens pro Unguibus.*

Rx. Pingued. Asciae pisc. l. Applicetur guttatim calide.  
viperar. rec. ℥ij.

7 *Aqua septica pro iisdem.*

Rx. ∇ Fl. cyan. rat. gr. vj.  
Rosar. Aloes hepat. gr. iij.  
Chelid. maj. Vitriol. alb. gr. ij.  
Croc. metall. subtiliss. M. applicetur, ut antea.  
pulverisat. & edulco-

8 *Alia.*

Rx. ∇ Chelid. ex panna Cannabin. combust. parat.  
Euphras. parum.  
Rosar. a. ℥ss. M. Usus, ut prioris.  
Tutt. ppt. ℥j.

9 *Alia.*

Rx. ∇ Rosar. Vitriol. Cypr. ℥ss.  
Euphras. Sacchar. ∇ ni gr. v.  
Chelid. maj. M. Usus, ut præcedent.  
Fl. Cyan. a. ℥ss.

VII. *Methodus medendi.*1 *Hypopii.*

a In incipiente Hypopio eadem usurpantur remedia, quæ in Ophthalmia sanguinea commendata sunt, interna nimirum & externa discutientia, laxantia aliquoties repetenda, Pediluvia.

b Quo



b Quo facto eo intentio dirigatur, ut vulnusculum mundificetur, quod per Unguentum ophthalmicum Weisbachii, egregium discutiens & mundificans, aliaque septica leniora impetratur.

#### *Pterygii 1. Unguis:*

a In Pterygii genesi conveniunt etiam aliquæ laxationes per vices instituendæ, præmissa in statu plethorico Scarificatione aut Venæsectione.

b Deinde excrementia hæc emollienda est per pinguedines supra laudatas, per aliquot dies parti affectæ guttatim calide instillandas.

c Substituuntur postea lenia septica & his nihil proficientibus magis magisque fortiora in usum trahantur, impositis sub horum usu externe Sacculis discutientibus camphoratis, pro dolore a septicis inducto mitigando, aut etiam solutione Sacchari Saturni in usum vocata, quæ acrimoniam septicorum egregie temperat.

d Qui vero Unguento weisbachii potitur, raro hisce opus habet.

e Quando Pterygium latioris est ambitus & medicamentis non obedit, Operatio Chirurgica in auxilium vocetur.

#### VIII. *Cautele Practicæ.*

1 Hypopio jam rite formato frustra ad discussionem intentio dirigitur; præstat hoc in casu ad ruptionem & mundificationem statim respicere.

2 Ruptio melius committitur naturæ quam arti: nisi enim perita manus apertionem instituat, facile aliam oculi læsionem incurrere potest.

3 Septica & mundificantia, quæ adhibentur, non sint acriora: sæpius enim major humorum affluxus exinde invitatur, majorque etiam inflammatio inducitur.

4 Unde, si in usum trahantur, semper temperanda sunt per diluentia, oleosa, mitigantia, saturnina & discutientia.

5 Quod in primis in illo casu observandum, ubi pro Pterygiis extirpandis in usum trahuntur.

6 Emollientia olea, quæ in Pterygiis adhibentur, non sint antiqua, utpote quæ colliquandi vim habent, sed recentia, quæ emolliendi vi prædita sunt.

7 Neque etiam hæc diu in usum trahantur, alias major humorum affluxus contingit.

8 Idem etiam efficiunt formulæ nimium aquosæ.

9 Omnes pulveres, qui in usum trahuntur, decet esse alcoholisatos; alias irritatio oculi eundem humorum affluxum inducens exoritur.

### CAPUT SECUNDUM.

#### D E

#### *Cataracta & Gutta Serena.*

#### I. *Definitio.*

##### 1. *Cataractæ:*

**C**ataracta s. Suffusio est obscuratio visus, ab humore viscido sub tunica cornea pupillæ adhærente & radiis luminaribus ingressum per humorem crystallinum præcludente originem habens.

##### 2. *Gutta Serena:*

Gutta Serena est omnimoda visus privatio, a paralytica nervorum opticorum læsione probabiliter dependens.

#### II. *Differentia.*

##### 1. *Cataracta a Gutta Serena differt.*

a Ratione causæ: hæc quippe nervorum vitiis originem debet, illa vero ab humorum lentore & visciditate natales suos ducit.

b Ratione læsionis: Cataracta pupillam offendit, eandemque humore concreto contegit: Gutta

vero serena oculum quoad externa prorsus integrum & sanum repræsentat.

##### 2. *Cataracta ratione sui ipsius differt*

a Respectu coloris: qui est vel albus l. glaucus, l. viridis l. flavus, l. cæruleus.

b Respectu magnitudinis: l. totam pupillam contegit l. partem tantum illius.

c Ratione consistentiæ: materia Cataractam formans l. est adhuc tenuior & fluxilis l. crassior, in concretum jam mutata.

d Ratione durationis: vel est incipiens, l. consummata.

#### III. *Signa*

##### 1. *Cataractæ.*

a Conspicitur externe pupilla ipsius oculi tecta materia quadam, modo viridem, modo cinereum, modo flavum, modo album colorem referente.

b Quando formari demum incipit & materia adhuc tenuis est, variæ res oculis obversari creduntur; v. g. nubeculæ, muscæ, culices, telæ araneæ, filamenta &c, visus vero aliquo modo adhuc subsistit.

c Quod si vero humores illi viscosi magis coeunt & concreverint, visu omnino privantur Patientes & color ipsius Cataractæ accuratius potest distinguui quam in primo principio.

##### 2. *Gutta serena:*

Subito plerumque exurgit cum visus omnimoda ablatione, oculo prorsus nullum vitium referente, sed ad instar sani sese habente.

#### IV. *Subjectum.*

1 Qui Hæmorrhagarum spontanearum, hæmorrhagiæ nimirum narium consuetæ, Hæmorrhoidum & mensium suppressiones incurrunt.

2 Vel qui artificiales Sanguinis evacuationes assuetas omittunt.

3 Fonticulos, Vescicatoria, ulcera diu manantia temere supprimentes.

4 Externas violentas injurias, ictum, casum, contusionem passi.

5 Lucubrationibus nimis, concurrente dispositione, indulgentes.

6 Venere abusi.

7 In fumis, exhalationibus acrioribus, diu versantes.

#### V. *Prognosis.*

1 Gutta Serena rarissime curatur & ab omnibus fere Auctoribus pro re desperata habetur.

2 Cataracta, quando in primis suis adhuc constituta est initiis, remediis internis & externis solventibus specificis curationem adhuc admittit.

3 Quando vero rite jam formata est, tunc non nisi auxilio chirurgico tollitur.

4 Cataracta alba præ reliquis speciebus curatu facilius judicatur.

#### VI. *Remedia.*

1 Primas vias expurgantia & humores præparantia, hydragoga & melanagoga: Rad. Jalapp Specii. Jalappin. Pulv. Cornachin. Mass. Pil. e Succin. Crat. Extract. Helleb. nigr. Panchym. Croll. & rius dulcis.

2 Sanguinem abundantem evacuantia & humores avertentia: Venæsectio in pede, Scarificationes hirudinum applicatio, Fonticuli brachii inusti, Vescicatoria, & Setacea nuchæ applicita, pediluvia.

3 Materiam stagnantem solventia & attenuantia fibrillasque oculi roborantia: Rad. Valerian. Chelidon. maj. Herb. Verben. Meliss. Beton. Euphras. Anagall. Fl. Calcatripp. Ros. Cyan. Calend. Sem. Anis. Fœnic. ∇ Mustelæ fluviatilis, a Michaelae commendata, externe applicita, Essentia dulcis Halensis externe & interne usurpata, Unguentum ophthalmicum D. Weisbach, Vitriolum album, vitrum 3 ii, Crocus metallorum, succus formicarum, fel lucii piscis cum ∇ mellis subactum.

4 Materiam non amplius resolubilem removet a pupilla acus peculiaris huic Operationi destinata.



## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis laxans.

R. Pulv. Cornach. gr. 25. M. D. pro una vice.  
 ℞ ii dulcis rit. par. ℞s.

## 2 Alius.

R. Specif. Jalapp. ℞s. pro una vice.

## 3 Pilulæ laxantes.

R. Mass. Pil. e Succin. Crat. ms. & cum Tinct. ℞ ii Tart.  
 gr. XV. f. Pil. No. XV.  
 Extr. helleb. nigr. ℞s. Consperg. pulv. liquir.  
 ℞ ii dulc. rit. par. gr. vj. D. pro una vice.  
 Resin. Jalapp. gr. ij.

## 4 Infusum discutiens &amp; roborans.

R. Rad. Valerian. Calend.  
 Celido. maj. a. ℞s. Cyan. a. p. j.  
 Herb. Meliss. Incis. ad instar Herb. Thee  
 Verben. a. Mss. singulis mane usurpen-  
 Flov. Anagall. punic. tur.

## 5 Aliud.

R. Herb. Euphras. Rosar. a. p. j.  
 Beton. Sem. fœnic. ℞j.  
 Anagall. a. Mss. Sem. fœnic. ℞j.  
 Fl. Calceatripp. Incis. contus. usurp. ut præc.  
 6 Tinctura resolvens & roborans.  
 R. Tinct. ℞ ii tartarifat. ms. Dos. gutt. 20. singulis  
 Essent. pimpinell. alb. mane in Infuso præscri-  
 a. ℞s. pto.  
 Succin. ℞j.

## 7 Essentia roborans.

R. Essent. dulc. Hal. Ord. Dos. gutt. 20. bis per diem.  
 ℞ ij.

## 8 Unguentum D. Weisbach.

R. Butyr. mial. illot. ℞iv. Virid. axis gr. xii.  
 Tut. ppt. ℞j. Miscæ, quotidie versus so-  
 Corall. r. mni tempus ad pisi ma-  
 Camph. gnitudinem cantho oeu-  
 Sacchar. ℞ ni a. ℞s. lorum majori inungen-  
 Nihil. alb. ℞j. do.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Quando materia Cataractam formans adhuc tenuis est, eo scopus dirigatur, ut humores versus caput congesti evacuentur & revellantur.
- 2 Fit hoc per laxantia nunc & tunc repetita, Venæsectiones, Scarificationes, Fonticulos, Setacea, Vescicatoria, Pediluvia.
- 3 Parti vero affectæ succurratur per interna & externa solventia & discutientia, intermixtis roborantibus.
- 4 Quod si nullam amplius discussionem admittit affectus, tunc operatio Chirurgica in auxilium vocari potest.
- 5 In Gutta Serena itidem universalibus modo nominatis prius locus concedatur, postea nervina & tonica in usum vocentur.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Purgantia, quæ adhibentur, sint selecta, non irritante vi prædita & frequentius, singulis nempe mensibus, in usum trahantur.
- 2 Venæsectiones & Scarificationes in robustioribus & assuetis nunquam intermittantur, alias malum eximie augetur: vanus enim est metus, per easdem visus debilitatem induci.
- 3 In subjectis spongiosioribus præstat Scarificationes quam Venæsectiones in usum trahere & quidem magis in inferioribus quam superioribus locis.
- 4 In malo pertinaciori Fonticuli, Vescicatoria & Setacea non raro eximium levamen afferunt, sed opus est, ut iisdem inhæreamus, alias affectus majori vi & pertinacia repullulare solet.
- 5 Euphrasiæ, ad instar herbæ Thee usurpatæ, virtutem plures deprædicant, in formata tamen Cataracta nihil ab eadem sibi promittendum est.
- 6 Essentia quoque dulcis interne & specialis ad oculos externe usurpata pluribus encomiis digna censenda est.
- 7 Qui hac destituuntur, non absque effectu Unguen-

tum ophthalmicum D. weisbachii in usum trahere possunt.

- 8 In omni tamen casu, nisi humores Cataractam formantes amplius sint fluxiles, tam ab internis quam externis remediis parum sibi promittendum est.
- 9 Veneris abusum nec non lucubrationes & exhalationes externas acriores noxias esse ex supra dictis jam patet.
- 10 A perspicillis dioptriciis tam diu abstinere debemus, quantum possibile est: plerumque enim major debilitas visus per eadem inducitur.
- 11 Alium & Cepæ, ut traditio fert, oculis sunt inimica: experientia tamen hoc omnino rejicit in rusticis, Judæis, Hungaris, Polonis.
- 12 Post febres acutas, hæmorrhagias nimias, aliosque morbos graviore plerumque debilitas visus remanet, quo tempore oculi non sunt defatigandi per multam lectionem & adspersionem rerum subtilium & lucidarum, utpote quæ energiam oculorum non parum imminuunt.

## CAPUT TERTIUM.

## DE

## Tinnitu &amp; Susurro Aurium.

- I. **Definitio.** Tinnitus & Susurrus aurium sunt depravationes auditus in perceptione soni, vel tinnitum l. susurrum formantis, consistentes.
- II. **Differentia.**
  - 1 Distinguitur uterque affectus a *pulsatione*, ubi in aurium cavitate pulsus, qualem arteriæ referunt, percipitur.
  - 2 A *Fluctuatione*, quæ alicujus rei fluentis sensum in auribus innuit.
  - 3 A *Sibilo & Strepitu*, ubi similes soni in auribus sentiuntur.
- III. **Signa.** His opus non est, cum ex diversitate sensus quilibet facile cognoscatur.
- IV. **Subjecta.**
  - 1 Qui congestiones sanguinis l. feri versus caput frequenter experiuntur.
  - 2 Febricitantes interdum in paroxysmorum initiis.
  - 3 Vertiginosi.
  - 4 Ebrii.
  - 5 Cruditate Ventriculi laborantes.
  - 6 Aures a cerumine minus bene expurgantes.
  - 7 Quibus infecta aurium cavitatem occupavere.
- V. **Prognosis.**
  - 1 Susurrus & Tinnitus Aurium ab internis causis dependens, nisi sæpius recurrat, nihil periculi involvit.
  - 2 Quod si vero frequentius revertatur, Cephalalgias, Vertigines & in senioribus Apoplexiam quandoque minatur.
  - 3 Interdum etiam auditus læsionem post se ducit.
  - 4 Qui ab externis causis originem habet, externis præfidiis facile tollitur.
- VI. **Remedia.**
  - 1 Humectantia, siccitati aurium, si quæ adest, consulentia: Infusa ex herbis temperatis pectoralibus, Emulsiva, Julapia. Externe oleosa,  $\text{O} \text{O}$  ovor. amygd. amarar. Cer. Decocta ex herbis nervinis cum lacte parata & vaporetenus admissa, lac muliebre guttatim instillatum.
  - 2 Laxantia, humores deorsum derivantia: Mass. pil. e Succin. Crat. Tartar. Querc. Extract. panchym. Croll. helleb. nigr. & dulc. cum stimulo Res. Jalap. l. Trochise. alhan d Clysteres, Pediluvia.
  - 3 Sanguinis abundantiam concurrentem removens: V. S. in pede, Scarificatio in locis inferioribus.
  - 4 Discutientia interna: Tinctura ℞ ii tartarifat. Essent. alexipharm. Stahlî, Succin. Liq. C. C. Succin. Externe fac-



faculi discutientes ex Herb. Chamom. Verben. hyssop.  
Fl. layend. Sambuc. Lil. conyall.

- 6 Aurium meatum roborantia: Suffimigia ex Succino, Mastich. Oliban. Storac. calam. Fl. Rosar. Lavend.  $\odot\odot$  destillata, Lign. Rhod. Anis. Fœnic. Succin. Meliss. Rut. Majoran. Liq. C. C. succinat. guttatim applicata, Salia volatilia urinosa, Ambra & Moschus cum gossypio immissa.

*Formula Remediorum.*

1 Species pro Infuso.

- Rx. Herb. Veron. Violar.  
Tussilag. Bellid. a. p. j.  
Heder. Terrestris a. Incis. bis per diem loco Infusi Thee usurpentur.  
Fl. Pap. rh.

2 Pilulæ laxantes.

- Rx. Pil. Tart. Querc. gr. Resin. Jalapp. gr. ii.  
xii. F. l. a. Pil. No. XVII. pro  
Extract. Helleb. nigr.  $\mathfrak{z}$ ss. i. vice.

3 Aliæ.

- Rx. Moss. Pil. e Succin. vii.  
Crat. Trochisc. alhand. gr. iii.  
Extract. panch. Croll. F. l. a. Pil. No. XIX. pro  
helleb. nigr. a. gr. i. vice.

4 Essentia discutiens.

- Rx. Essent. alexiph. Stahl. Ms. Exhibeantur bis per diem 30. gutt. in infuso supra descripto.  
3ii. Succin.  $\mathfrak{z}$ j.

5 Tinctura discutiens.

- Rx. Tinct. Antimon. tartar. Ms. dentur bis per diem  
ris.  $\mathfrak{z}$ ij. 25. gutt.  
Liq. C. C. succinat.  $\mathfrak{z}$ ij.

6 Sacculus discutiens.

- Rx. Herb. Verben. Lil. conyall. a. p. j.  
Chamom. Sem. fœnic.  $\mathfrak{z}$ iss.  
Meliss. a. Ms. Incis. contus. includ. Saccul. & applic. externe.  
Fl. Lavend. cul. & applic. externe.  
Stæch. arab.

7 Pulvis pro fumo.

- Rx. Storac. Calam. Lavend.  
Mastich. Ros. a. p. j.  
Oliban. a.  $\mathfrak{z}$ j. F. pulv. grossus.  
Fl. Lil. conyall.

8 Spiritus oleosus externus.

- Rx. Vreg. Hung.  $\mathfrak{z}$ ij. gutt. vi.  
Spir. Sal. ammon. re- Cinam. gut. iij.  
tis.  $\mathfrak{z}$ ss. Ms. applicetur cum gossypio.  
 $\odot\odot$  destillat. lign. rhod. pio.

VII. Methodus medendi.

1 Tinnitus.

- a In hoc affectu plerumque animadvertitur notabilis aurium siccitas cum satis eximio quandoque capitis dolore & calore conjuncta; unde omissis medicamentis calidioribus Curæ initium fiat per humectantia interna, adhibitis simul, si circumstantiæ id efflagitent, nitroso-absorbentibus.

- b Subjungantur lenissima laxantia ex Extract. Panchym Croll. helleb. nigr. Mann. Cass fo'. Senn. in necessitatis casu repetenda.

- c Quod si plethora concurrat aut affectus sæpius recurrat, in usum trahatur V. S. in pedel Scarificatio in locis inferioribus, adhibitis simul nunc & tunc pediluviiis.

- d Externe auribus succurratur humectantibus, oleosis & Decoctis, guttatim l. vaporetenus in usum vocatis.

2 Susurri.

- a In Susurro cum major feri concursus observetur, adhibeantur statim in principio laxantia, pro circumstantiarum ratione repetenda.

- b Subjungantur interne Essentiæ & Tincturæ discutientes bis forte per diem in usum vocandæ Externe vero Sacculi, suffitus & similia, non neglectis pediluviiis.

- c Colophonis tandem loco, nisi malum his obediat, adhibeantur roborantia nervino-balsamica.

- d In utroque casu, si a causis externis cerumine nimi-

rum, infectis &c. originem affectus habeat, conveniente modo aurium cavitas expurgetur.

VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 In Tinnitu Aurium, quo magis calidiora medicamenta & interne & externe ulurpantur, eo magis incrementa capit affectus.

- 2 Idem etiam ab exiccantibus impetratur.

- 3 Oleum amygdal. amar. & lac muliebre egregie quandoque se gerunt.

- 4 Aliqui quoque cum affectu adhibent Panem anisatum recentem e furno extractum calide impositum.

- 5 In susurro primo adhibeantur discutientia & nervina mitiora, his vero nihil proficientibus sensim sensimque penetrantiora.

CAPUT QUINTUM.

DE

Gravitate auditus & Surditate.

I. Definitio.

1 Gravitatis Auditus.

Est imminuta auditio, qua nonnisi fortè & vehementes soni percipiuntur.

2 Surditatis:

Est Auditio prorsus abolita, qua nullus sonus, si ve levis si ve vehemens sit, auditur.

II. Differentia.

- 1 Gravitatis Auditus & Surditas tantum ratione Gravis inter se differunt.

- 2 Uterque affectus est vel natus l. adventitius.

III. Signa.

Hæc l. ex ipsa ægroti narratione patefiunt, l. ab adstantibus & conversantibus facile animadvertuntur.

IV. Subiecta.

- 1 Congestionis fortiores & frequentiores inprimis feri versus caput passi.

- 2 Quibus auris externa abscissa est.

- 3 Qui tympanum nimium flaccidum aut plane exesum l. exulceratum habent.

- 4 Qui frequenter a fortioribus sonibus perturbantur.

- 5 Quibus meatus auditorius a Cerumine, infectis, globulis, tumore l. tuberculo est obstructus.

V. Prognosis.

- 1 Quando malum a congestionem humorum dependet & ægri adhuc sunt juniores, Curationis spes superest.

- 2 Quo magis vero subiecta sunt annosa malumque jam inveteratum, eo difficilior curatio.

- 3 Surditas in acutis cum Urina cruda delirium portendit: sed cum coctionis signis bonum & hæmorrhagiam Criticam promittit. Ettmuller.

- 4 Qui surdi in lucem sunt editi rarissime curantur.

- 5 Si Organa sunt læsa, restitutio itidem difficulter procedit, rariusque expectanda est.

VI. Remedia.

- 1 Humores ad caput congestos derivant & expurgant laxantia leniora: Mast. Pil. e Succin. Crat. Extract. panch. Croll. Helleb. nigr. & rursus dulcis, Trochisc. alhand.

- 2 Discutiunt eosdem anticatarrhalia: Essentia alexipharmaca Stahl. Pimpinellæ albæ, Succini, Tinctura Antimonii, Tartari. Externe Sacculi ex Herb. Chamom. Salv. Majoran. Rosmar. Bacc. Laur. Junip. Sem. Fœnic. Carv. Anis.

- 3 Partes relaxatas roborant Salia Volatilia Urinosa sub sicca l. liquida forma adhibita. Sal Succini Volatile, Urinæ. Salis ammoniaci, Tartari, Spir. C. C. Salis ammoniaci, Urinæ. Sanguinis, nec non Essentia Succini, Castoreum, Ambra, Moschus,  $\odot\odot$  destillata: Chamom. Salv. Rut. Succin.

- 4 Nimis aurium siccitati specificè succurrunt olea cocta & expressa Chamom. Matricar. amygd. amar. succus heder. terrestr. urtic. rut. rad. bryon. Cepar. guttatim instillata, Decocta ex herbis nervinis & discutientibus vaporetenus admixta, panis hisipis repleti, in medio dissecti & adhuc calentes applicati.



5 Cerumen & insecta l. alia heterogenea meatum auditorium obstruunt educunt peculiaria instrumenta.

### Formule Remediorum.

#### I Pilulæ Purgantes.

Rx. Pil. e Succin. Crat. gr. 15. Trochisc. alband. gr. iij.  
Extract. helleb. nig. ℥ss. M. f. l. a. Pil. No. 17. pro 1.  
℥ i dulc. rit. parat. gr. vj. vice.

#### 2 Aliæ.

Rx. Extract. panch. Croll. Resin. Jalap. ℥. gr. iij.  
Pil. e Succin. Crat. ℥ss. F. l. a. Pil. No. XIX.  
Trochisc. alband. D. pro 1. vice.

#### 3 Essentia discutiens.

Rx. Essent. alexiph. Stablii Tinct. ℥ ii Tartar. ℥ij.  
℥ss. M. Dos. gutt. 30. bis l. ter  
Succin. ℥ij. per diem.

#### 4 Aliæ.

Rx. Tinct. ℥ ii Tartar. ℥ij. D. Dos. gutt. 25. bis l. ter  
Liq. C. C. Succin. ℥ij. per diem.

#### 5 Sacculus discutiens.

Herb. Chamom. Sem. anis.  
Salv. fenic. ℥. ℥j.  
Rosmarin. ℥. Mss. Incis. contus. includ. Sac-  
Bacc. Laur. ℥ij. cul.

#### 6 Pulvis roborans.

Rx. Sal. Succin. volat. ℥ss. M. applicetur pauxillum  
Ambr. gryf. gr. ii. cum gossypio.

#### 7 Alius.

Rx. Sal. volat. Corn. Cervo. M. applicetur ut praece-  
gr. XII. dens.  
Medull. Cast. elect. gr. iij.

#### 8 Essentia roborans.

Rx. Essent. Succin. ℥ss. gutt. iv.  
Ambr. ℥j. M. instilletur guttatim.  
destillat. Chamom.

### VII. Methodus Medendi.

1 Si malum originem suam habet a congestione humorum, caput gravantium, evacuatio eorumdem instituenda est, in phlegmaticis quidem per alvum, mediantibus laxantibus, aliquoties pro circumstantiarum ratione repetendis, in Sanguineis vero cum per hæc, tunc Venæsectiones Sanguinis, revulsio- nis scopo in pede celebrandas, sub iunctis pediluvii.

2 Discussionis deinde scopo adhibeantur Tincturæ & Essentiæ resolventes & discutientes, nec non similia Infusa. Externe etiam parti affectæ per Sacculos nervino-discutientes succurratur.

3 Tandem partes internæ roborentur per nervino-bal- samica sub liquida l. sicca forma aurium cavitati in- sinuanda.

4 Ubi vero ficitas potius observatur, post præmis- sam V. S. & adhibita interna diluentia, externe ap- plicentur olea blandiora, vapores ex nervinis & di- scutientibus, succi vegetabilium aperientium, panes calidi paulisper aromatizati.

5 Si a vi externa casu nimirum aut percussione ma- lum dependet, supra nominata roborantia locum habent, nec non Cyclaminis destillata, ab Et- multero celebrata.

6 Aurium vero sordibus, auditus gravitatem sufful- cientibus, variis & facilibus occurrere potest modis.

### VIII. Cautela Practicæ.

1 Nisi ad temperamentorum & causarum diversita- tem respiciatur, facile malum ab adhibitis medi- camentis augeri potest.

2 Siccioribus igitur præscribantur blandiora, temperan- tia & demulcentia interne & externe; succulentis vero magis fortiora, balsamico-nervina, volatila.

3 Omnia frigida auribus sunt inimica, calide igitur remedia applicentur.

4 In pauca quoque quantitate eadem in aures im- mittere decet, nisi malum adauctum cupiamus.

5 Antequam applicentur, aures a sordibus liberari debent.

6 Post instillationem liquidorum in aurem sanam ægro- tus decumbat, ne medicamentum effluat.

7 In febribus, si gravitas auditus occurrit, a cali-

dioribus abstinendum & res peragenda est internis diluentibus & temperantibus, externe vero topicis blandioribus.

8 In Surditate nativa omnia fere in cassum adhiben- tur.

9 Senes, plerumque auditus gravitate laborantes, au- xilium impetrant ab evacuationibus debito tempo- re institutis & repetitis, & temperatis discutienti- bus.

## CAPUT QUINTUM.

### DE

### Læsionibus Gustus & Olfactus.

I. **Definitio.** Læsiones Gustus & Olfactus indignant vel abolitiones vel imminutiones vel alterationes Gustus & Olfactus naturalis, a variis causis originem habentes.

#### II. Differentia.

1 Differt Gustus & Olfactus ratione gradus: alius est perfectissimus, alius imminutus, alius plane aboli- tus.

2 Ratione qualitatis: alius est naturalis, alius deprava- tus, a statu ordinario prorsus recedens.

#### III. Signa.

Hæc ab ipsis Patientibus recensentur & facile ab iis- dem animadvertuntur.

#### IV. Subiectum.

I. Læsionis Gustus:

a Qui Linguam ulcere vel vulnere affectam habent.

b Isterici.

c Pica laborantes.

d Cruditatem biliosam, acidam, & nidorofam in Ventriculo possidentes.

e Catarrhi fortioribus obnoxii.

f Quibus fauces ulcere sunt obsessæ.

#### 2 Læsionis Olfactus:

a Qui in naribus, ozænam, polypum, carcinoma gerunt.

b Aut quibus ab aliis causis nares sunt obstructæ.

c Coryza l. gravedine laborantes.

d Scorbutici & Lue Prea affecti.

e Quibus Cerebrum in parte anteriore est corru- ptum.

#### V. Prognosis.

1 Si Læsiones Gustus & Olfactus ab aliis dependet morbis, his curatis & illæ corriguntur.

2 Quo magis tamen malum est inveteratum, eo cu- ratu difficilior est.

3 Idem etiam dicendum est, si læsiones partium so- lidarum concurrunt.

#### VI. Remedia.

##### 1 Læsionis Gustus:

a Materiam Gustum alterantem evacuant Purgan- tia: Helleborus niger, Senna, Rhabarbarum Massa Pil. e Succin. Crat. Extract. panch. Croll. Xrius dulcis: quandoque etiam Vomitoria: Tartarus emeticus, Sy upus emeticus.

b Sensum ipsius Linguae exsuscitant subacida & le- nia aromatica: serum lactis tamarindinum, Succus acetos. Condit. Rad. Cichor. Carn. Ci- tr. Rad. Helen. Pimpin. Z. Z.

##### 2 Læsionis Olfactus.

a Laxantia supra commendata.

b Errhina & Apophlegmatizantia: Rad. Pyrethr. Irid. Flor. Helleb. nigr. Fol. Ptarm. Majoran. Rosmarin. Puleg. Nicot. Fl. Lavend. Lil. con- vall. Euphorb. Z. Z. Cubeb. Balsamus Ma- joran. Succin.

### Formule Remediorum.

#### I Pilulæ Purgantes.

Rx. Mass. Pil. e Succin. Crat. Extract. helleb. nigr. ℥ss.  
gr. XV. Trochisc. alband. gr. iij.

Mer-



*Mercurii dulc. rit. parat.* *F. l. a. Pil. No. XIX. pro*  
*gr. vj.* *1. vice.*

## 2 Aliæ.

*R. Extract. panchymag.* *Resin. Jalapp. gr.*  
*Croll. gr. XII.* *iv.*

*Mercurii dulc. rit. parat.* *F. l. a. Pil. No. XVII. pro*  
*gr. vj.* *1. vice.*

## 3 Pulvis emeticus.

*R. Rhabarb. elect. gr. XII.* *Sal absinth. gr. iij.*  
*Tartar. emet. gr. iiss.* *Ms. f. Pulv. pro 1. vice.*

## 4 Potio emetica.

*R. Syr. emet. ℥ss.* *▽ Cichor. ℥ss.*  
*Diacydon. lucid. Jal. ℥ij.* *Ms. pro 1. vice.*  
*Sal polychr. gr. iij.*

## 5 Electuarium exsuscitans &amp; reficiens.

*R. Conserv. rad. cichor. ℥iss.* *Succ. Granor. cherm ℥ss.*  
*Condit. Carn. Citr.* *▽ Cinam. q. s.*  
*Rad. Helen. ā. ℥ij.* *F. Elect. ad magnitudi-*  
*Spec. aromat. rosat. ℥iss.* *nem avellane bis ter*  
*Sem. Eruc.* *per diem commastican-*  
*Sinap. ā. ℥ij.* *dum.*

## 6 Spiritus.

*R. Aq. Regin. Hung. ℥ss.* *℥j.*  
*Spir. Salis ammon. rectif.* *Ms. affricetur linguae.*

## 7 Pulvis Sternutatorius.

*R. Rad. Ir. Flor. ℥ij.* *Sem. Nigel. ā. ℥j.*  
*Herb. Majoran.* *Ms. f. Pulv. irroretur* *○○*  
*Rosmarin.* *destillato Lign. rhod. gut.*  
*F. Lil. Convall.* *viii.*  
*Lavend.*

## VII. Methodus medendi.

## 1 Læsionis Gustus:

- In omni Gustus Læsione ad causam respiciendum, secundum quam Cura instituenda est.
- Quod si igitur Caput abundantia humorum laboret, sicuti in Coryza & Gravedine contingit, usurpentur lenia laxantia, internis discutientibus haud omisiss.
- In Pica, & cruditatibus primarum viarum adhibeantur Vomitoria.
- Ulcera linguæ abstergantur, vulnera vero ejusdem consolidentur.
- Fauces si ulcere sunt obsessæ, in usum trahantur frequentia Gargarismata, non neglectis quæ ipsius mali originis debentur.
- Subjungantur tandem, quæ ipsum gustum exsuscitant, acidula, acria, aromatica.

## 2 Læsionis Olfactus:

- Idem etiam in Olfactus Læsione observandum est.
- In Coryza & Gravedine laxantia in usum sunt trahenda, nec non sternutatoria, in illa fortiora, in hac mitissima, aliis internis, suis in locis commendatis, haud omisiss.
- Si polypi, ozæna, sordes induratæ in causa sunt, hæc debito modo removeantur.
- Ubique pulveres sternutatorii medice & modice in usum trahantur, utpote quæ sensum ipsius Olfactus exstimulant. Convenit etiam *▽* Majoranæ immuncta, Balsamus majoranæ, Succini cavitati narium insinuat.

## VIII. Cautela Practica.

- Neque Gustus neque Olfactus Læsiones rite tolluntur, nisi morbus, a quo originem habent, removeatur.
- In Temperamento & Causa sicciori & Gustus & Olfactus Læsionibus temperatiora semper adhibenda sunt medicamenta; alias malum adaugetur.

## S E C T I O II.

## D E

## MORBIS SENSUUM INTERNORUM.

## CAPUT PRIMUM.

## De Memoria Debilitate.

I. *Definitio.* **M**emorix Debilitas consistit in facili rerum ab animo l. perceptarum vel inventarum oblivione.

II. *Differentia.*1. *Ratione gradus:*

Est vel *major*, ubi vix adhuc actarum & præteritarum rerum memores sunt patientes, vel *minor*, ubi memoria saltem ratione prioris vigoris aliquatiter remittit.

2 Vel *hæreditaria* a Parentibus contracta, vel *acquisita* a variis causis originem fumens.

III. *Signa.*

Cognoscitur hoc vitium partim ab ipsis patientibus, partim a conversantibus ex deficiente in loquendo & scribendo verborum & rerum apparatu.

IV. *Subjecta.*

- Expositi huic vitio sunt senes, otiosi torpidi, phlegmatici.
- Bacco & Qri nimium dediti.
- Paralyssi vel hemiplexia tacti.
- Qui Memoriam in Juventute per artes mnemoneuticas nimium defatigavere.
- A morbis gravioribus acutis & malignis resurgentes.
- Læsiones Capitis a vi externa passi.

V. *Prognosis.*

- Debilitas memoriæ plerumque curatu admodum difficilis est.
- Difficillime autem curatur, quando Paralyssin, Hemiplexiam, aut Epilepsiam sequitur.
- Idem quoque de hæreditaria memoriæ debilitate dicendum, quæ vix Curationem aliquam admittit.
- Quæ post acutos aliosque graviore morbos evenit, post vires patientis restitutas, ut plurimum priorem vigorem recipit.
- Quæ cum stupore animi, somnolentia fere perpetua conjuncta est, sæpius Apoplexiæ subsecuturæ signa præbet.
- Debilitatem memoriæ non raro neglectus secretionum & excretionum vitalium sequitur.

VI. *Remedia.*

- Generaliter Sanguinis & Humorum abundantie succurrunt: V. S. Scarificatio, Laxationes epicraticæ per *℥* dulc Extr. helleb. nigr. Pil. e Succin. Crat. Nodulos laxativos ex purgantibus & vegetabilibus nervinis compositos.
- Vim sensuum internorum exsuscitant nervino analeptica: Pulv. Abbatis Trithemii, Spec. Diamb. Diamosch. Confect. Anacard. ℥ss. mane Cubebæ jejuno stomacho comestæ, *▽* Magnanim Essent. Succin. Castor. Ambr. interne propinata. Externe vero Cucuphæ ex herbis aromaticis. Puleg. Serpill. Ror. mar. Lil. convall. Lavend. Major. Stoech. Arab. Spic. *○○* Cinam. Caryop. Cubeb. Cardamom. Lign. rhod. irroratis. Spirituosa naribus excipienda, Balsama cephalica, & vitalia sub solida l. liquida forma præscripta, temporibus & vertici inungenda.

## Formula Remediorum.

## 1 Pilulæ laxantes.

*R. Pile Succin. Crat. gr. 15.* *c. Essent. Succin. f. Pil. No.*  
*Extr. Helleb. nigr.* *XIX. pro 1. vice.*  
*℥ii dulc. rit. par. ā. gr. viij.*



## 2 Nodulus laxativus.

R. Rad. Valerian.	Cubeb. ʒj.
Vincetox.	Fol. Senn. ʒj.
Polypod. quern. ʒ.	Rhabarb. el. ʒij.
ʒss.	Agar. mund.
Herb. Meliss.	Fibr. belleb. nigr. a. ʒij.
Puleg.	CrySTALL. Tartari ʒss.
Origan. ʒ. Mss.	Incis. cont. d. ad ch.
Fl. Lavend.	Cum ʒj. v. ferv. & ʒij.
Anth. ʒ. p. j.	Vin. generos. in fund.
Cardamom.	Dof. ʒvj. alternis diebus.

## 3 Tragæa confortans.

R. Sem. Coriandr. ʒij.	Cons. alkerm. ʒss.
Cubeb.	Sacchar. perlat. ʒj.
Mac. ʒj.	ms. f. Pulv.
Rad. Valerian.	Dof. ʒss. ad ʒij. mane &
Calam. aromat. a. ʒij.	vesperi.

## 4 Essentia nervina.

R. Tinct. ʒij Tartaris. ʒj.	M. Dof. gut. 25. ad 30. bis
Essent. Succin. ʒj.	vel ter per diem.
Ambr. ʒss.	

## 5 Rotulæ roborantes.

R. Spec. Diamb.	C. f. q. Sacchar. in v Meliss.
Diamosch. a. ʒj.	Solut. f. l. a. rot.
Specif. cephal. Mich. ʒj.	Succeſſive assumantur.
Cubeb. ʒss.	

## 6 Balsamus nervinus.

R. Balsam. Succin. ʒj.	ms. D. ad pyx. temporibus
Nucist.	& vertici inungatur.
Lavend. an. ʒss.	

## 7 Species pro Cucuphis.

R. Rad. Valerian.	M. f. Pulv. gross.
Calam. arom. a. ʒij.	Irror. o o destillat. Succin.
Herb. Verben.	Majoran.
Meliss. an. Mss.	Cardamom. an.
Fl. Anth.	gutt. vj.
Stoech. Arab. an. p. j.	cinnam. gutt. iij.
Cardamom.	D. ad. ch. pro conficiendis
Cubeb. an. ʒss.	- Cucuphis.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Ubi Sanguinei quid subest, ita ut malum a regurgitationibus Sanguinis ortum habeat, V. S. vel Scarificatio pro temperamenti vel consuetudinis ratione celebranda est.
- 2 In cruditatibus vero primarum viarum & superfluis ferositatibus cerebrum gravantibus in usum vocanda sunt evacuantia phlegmagoga & melanagoga, per epicrasin agentia.
- 3 Subjungenda demum sunt analeptico-nervina, interne usurpata, ordinando quidem sanguineis temperatiora, phlegmaticis vero calidiora.
- 4 In Diæta Qris & Bacchi nec non Somni abusus interdicens est; nocent m. vigiliæ nimia & defatigatio. Agile autem vitæ genus, aerisque sanioris & temperatioris usus pro sensibus internis conservandis plurimum valet.

## VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Nisi temperamenta Sanguinea a Phlegmaticis probe distinguantur facile ab indistincto nervinorum medicamentorum usu noxæ potius quam emolumenta exurgere possunt.
- 2 In debilitate memoriæ symptomatice præ omnibus ad primarium morbum intentio dirigenda est.
- 3 Cucuphæ aromaticæ subiectis sanguineis & sanguineo-melancholicis haud sunt ordinandæ, quia majores ordinarie turbas pariunt.
- 4 Ars mnemonica certa Methodo instituta memoriæ debilitati egregie subvenit.
- 5 Quidam commendant lotionem & quotidianam frictionem capitis cum lintheaminibus calidis, sed plerumque parum auxilii exinde obtinetur.
- 6 Sicuti nimia memoriæ defatigatio tandem debilitatem post se ducit, sic memorandi legendi & ediscendi neglectus idem efficit.

## CAPUT SECUNDUM.

## DE

## Mania.

I. *Definitio.* **E** St delirium fortissimum sine Febre cum maxima mentis abalienatione & ratiocinationis perturbatione conjunctum.

II. *Differentia.*

- 1 A *Phrenitide*, & deliriis symptomaticis, variis in morbis acutis obvenientibus, cum quibus nunquam non febris concurrere solet.
- 2 A *Melancholia*, in qua tristitia & meticulositas potius observanda sunt; in mania vero furor & audacia.
- 3 Ratione *gradus*: Alia est fortior cum summo ægroti furore conjuncta, alia *mitior*, in informibus saltem fermocinationibus cum intermixto frequentirifu consistens.
- 4 Ratione *causæ*: alia principium habet immateriale, v. g. iracundiam, incantationes, speculationes, ubi illa, quæ amorem certæ alicujus Personæ pro Objecto habet, *Erotomania* vocatur; alia materiale, v. g. vermes, philtro, mensium, lochiorum, & spermatis retentionem, ex quibus illa, quæ lochiorum vel mensium suppressionem pro fundamento habet, *Furorem uterinum* constituit.

III. *Signa.*

- 1 Loquuntur absurda, frequenter risus intermiscenti, alii vero calumnias & convitia evomunt.
- 2 Arrogantes, protervi & temerarii sunt, insigni corporis robore instructi.
- 3 Sibi relictæ varia secum agunt, blaterant, rident, vociferantur, cantant.
- 4 Summa laborant agrypnia, appetitus vero sibi constat.
- 5 Faciem ut plurimum rubicundam & sanorum similem habent, cum Pulsu magno & celeri.
- 6 In gradu insigniori omnia dilacerant, tumultuantur, accedentibus insidias vel verberibus, vel quicquid præsto est, struunt.
- 7 Impudici sunt, nullam vestimentorum curam habentes, publice etiam excrementa emittentes.
- 8 Quandoque maxima vi catenas & vincula corpori injecta disrumpunt.
- 9 Verbera & vulnera vix sentiunt, virgis tamen præ omnibus parent.
- 10 Alii immoderate Qris cupidine tenentur.
- 11 Omnes fere a frigore, etiam si nudi cubent, vix læduntur.
- 12 In declinatione morbi fiunt stupidi, quieti, meticulosi.

IV. *Subjectum.*

- 1 Juvenes cholericis melancholicis temperamenti, præ senibus.
- 2 Fœminæ eodem temperamento instructæ & vel mensium l. lochiorum defectu & suppressione laborantes, præ viris.
- 3 Uterque sexus infano amore correptus, inprimis fœmininus.
- 4 Juvenes spermatis orgasmo gaudentes, nec occasione illud emittendi frui.
- 5 Animi commotionibus fortioribus agitati, nec non curis & sollicitudinibus nimis, vel speculationibus admodum profundis inhærentes.
- 6 Philtro vel veneficiorum vim infelicitè experti.
- 7 Vermibus quandoque nimium divexati.

V. *Prognosis.*

- 1 Dementia, quæ cum risu conjuncta est, curatu faciliior, quam quæ cum multa temeritate & furore contingit.
- 2 Quo magis inveterata, eo curatu difficilior.
- 3 Si in sanis Varices & hæmorrhoides superveniunt, fit solutio morbi. Hippocr. S. VI. Aph. 21.



- 4 In ſceminino ſexu menſtrua & lochia bene procedentia malum etiam quandoque tollunt.
- 5 Mania laſciva præ aliis medicationem admittit, ſi non admodum altas radices egit.
- 6 Quæ a philtris originem habet medicationi magis obedit, quam quæ profundas ſpeculationes pro fundamento agnoſcit; quamvis & illa ſit ſatis pertinax.
- 7 Curatu difficillima eſt, quæ veneficiis ortum debet.
- 8 Melancholia ſæpius tranſit in Maniam & vice verſa.
- 9 Melius eſt maniacos fieri melancholicos, quam hos maniacos.

## VI. Remedja.

- 1 Sanguinem abundantem vel retentum evacuantia, conveniente tempore & loco in uſum vocata: V. S. & ſcarificationes in locis inferioribus, hirudinum applicatio, ſi circumſtantiæ ſuaſerint, ad anum.
- 2 Ventriculum ab inquinamentis liberantia & ſenſum ordinariū excitantia, Vomitoria: Tart. emet. Syr. emet. Vit. ꝑij, Purgantia: Helleb. niger. eju. que Extract. Gilla Paracelſi &c. Vitriolum album.
- 3 Sanguinem orgaſticum temperantia, interne Tartaroſa, abſorbentia, diapnoica Cinnabarina, potus & cibi tenuiores; Externe Camphorata.
- 4 Specifica efficacia in genus nervoſum agentia: medicamenta ex Cro parata, Panaceæ Ores, Eſſent. dulc. Hal. & concentr. Fl. anagall. punic. Herb. adianth. alb. & Oreum, Baccæ Paridis, ſanguis aſini retro aures extractus & lintheis exceptus exiccandus, cujus fruſtulum potui tempore uſus infundendum. In philtris ſpecifica Nucem Vomicam & Eleſtuarium de ovo, præmiſſo tamen prius Vomitorio commendant.
- 5 Remedja moralia, politica & theologica per comminationes, perſuaſiones & exhortationes.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis Vomitorius.

Rx. Tartar. emet. gr. iij. M. D. pro 1. vice,  
Sal abſinth. gr. iv.

## 2 Potio Vomitoria.

Rx. Syr. emet. ꝑvj. ꝑ anagall. ꝑij.  
Sal cent. min. ꝑſs. pro 1. vice.

## 4 Potio Purgans.

Rx. Syr. e pom. lax. ꝑſs. Cryſtall. Tartari gr. vi.  
Extract. helleb. nigr. gr. ꝑ anagall. ꝑij.  
XV. ms. pro 1. vice.

## 4 Nodulus laxativus.

Rx. Herb. Capill. Veneris. Fibr. Helleb. nigr. ꝑvj.  
Adianth. alb. Cryſtall. Tartari ꝑij.  
Aur. æ. Mſs. Inciſ. contuſ. infund. in ꝑ  
Fl. Anagall. punic. Vin. anat. portione. Doſ.  
Hyperic. a. p. j. ꝑvi. viii.  
Fol. Sen. ſ. ſt. ꝑij.

## 5 Potio nervino-temperans.

Rx. ꝑ anagall. Eſſent. dulc. Hal. ꝑſs.  
Hyper. a. ꝑij. Syr. Fl. tunic. ꝑſs.  
Pulv. Bezoard. Hal. ꝑij. M. porrigatur cochleatim.

## 6 Infuſum nervino cephalic.

Rx. Herb. Salv. Mj.  
Verben. a. Mſs. Inciſ. uſurpentur loco In-  
Anagall. Fl. punic. fuſ. Thee.

## 7 Aliud ſpecificum.

Rx. Panni linei, ſanguini a- peric. donec Tinct. elici-  
ſinino imbuti. q. v. ta ſit Det. cum regimine  
Inf. in ꝑ anagall. vel Hy- ſudoriſero.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Maniaci ordinarie fere vel quantitate ſanguinis a priori, vel ſuppreſſione evacuationum ſpontanearum laborant; ideoque in larga quantitate v. g. ad ꝑvij. x. educendus eſt ſanguis & quidem revulſionis ſcopo in locis inferioribus.
- 2 Subjungantur laxantia helleborata, aliquoties repetenda.
- 3 In quibuſdam ſubjectis autem, & inprimis, ubi philtra concurrunt, majorem efficaciam exerunt Vomitoria, quippe quæ non tantum primas vias expurgant, ſed & ſenſum Naturæ fortius excitant.
- 4 His peractis uſurpentur ſpecifica appropriata.

- 5 Si res a lochiorum, hæmorrhoidum l. menſium ſuppreſſionibus originem habeat, primarius ſcopus ad has excretionem dirigatur, haud omiſſis modo laudatis ſpecificis.
- 6 Laſcivia Juvenibus optime, poſt præmiſſa univerſalia, exhibentur temperantia & Nitroſa in larga quantitate & ſi occaſio fert, matrimonii uſus concedatur.
- 7 In cauſis moralibus præter ſupra commendatam methodum, remedia moralia in uſum trahantur.

## VIII. Cautela Præctica.

- 1 Omnia aromatica ſpirituosa, acria interne propinata Maniam exacerbant.
- 2 Ægroti ad iracundiam non ſunt excitandi: quia idem damnum exinde emergit.
- 3 Opiatorum uſus, ſicut in omnibus deliriis, ſic & in Mania nocet.
- 4 Pro ſpecifico quidam Venæ raninæ l. frontis ſectionem ſuadent.
- 5 Loco hujus V. S. in pede, aliquoties celebratam, ſubjunctis helleboratis & Decocto Anagallidis puniceæ proficuam fuiſſe, in ſcæmina 30. annorum obſervavi.
- 6 Cum vinculis, verberibus & virgis caute eſt procedendum inprimis ab initio morbi: niſi enim remedia interna præmittantur, talibus malum facile exacerbatur.
- 7 Commendant aliqui hepar Arietis calidum, pulmonem ovis, hederam arboream & Verbenam contuſam, raſo capiti impoſita, quæ quidem abſque noxa in uſum vocari poſſunt.

## CAPUT TERTIUM.

## D E

## Melancholia.

I. Definitio. **M**elancholia eſt tæſio Imaginationis, ſive delirium ſine Febre, a rebus vel materialibus vel immaterialibus Phantaſiæ intimius & fortius impreſſis, eandemque afficientibus originem habens.

## II. Differentia.

- 1 Reſpectu cauſæ; eſt vel materialis, a morbis corporis diuturnis, vel ſanguine ſpiſſiori Venæ portæ producta, quæ ultima Melancholiam Hypochondriacam conſtituit; vel immaterialis, variis cauſis moralibus originem ſuam debens; vel mixta, ubi & cauſæ phyſicæ & morales concurrunt.
- 2 Diftinguenda eſt: a Morofi ſeu Moria, quæ eſt itidem delirium, ſed circa jucunda verſans, ubi Patientes alta quæque ſpirant & ſe Principibus, Regibus imo ipſi Deo pares eſſe autumant; Melancholia vero eſt delirium triſte, qua in ſuſpiria, lachrymas erumpunt, taciturnitatem, ſolitudines &c. amant.

## III. Signa.

- I Melancholiæ Hypochondriacæ;
  - a Modo uni, modo pluribus objectis anxie inhærent, continuo eodem in Phantaſiæ exercitio occupati.
  - b Mox in ſuſpiria, mox vero in lachrymas, plerumque tamen abſque cauſæ indicatione erumpunt.
  - c Solitudinem amant, conſortiumque hominum & amicorum fugiunt.
  - d Taciturni ſunt, triſtes, nullis jocis commovendi & exhilarandi.
  - e Metuunt præterea de inſidiis, carceribus & ipſa morte, quæ ab aliis ſibi parata & ſtructa eſſe falſo autumant.
  - f Somnum interruptum & paucum habent, pluri-  
bulque gravibus inſomniis de incendiis, vul-  
nerationibus ſubmerſionibus ſtipatum.



- g Respiratio est anxiosa, laboriosa, cum intermixtis suspiriis profundis.
- h Alvum possident plerumque inertem & clausam, appetitum vero vagum.
- i Interdum Palpitationes cordis & phlogoses cum rubore faciei sentiunt.
- k Ordinarie vero facies est pallida austera, morosa, cum oculis torvis.
- l In insigniori gradu desperant, fiunt interdum avtocheires, dum in aquam se præcipitant, laqueo suspendunt, jugulum sibi percindunt, aliudve lethale vulnus infligunt.
- 2 *Moræ emmaterialis jucundæ*:
- a Alta quæque spirant, arrogantes sunt, se Reges, principesque esse autumantes.
- b Quæ intus volvunt, loquuntur, quando soli sunt.
- c Somnus deficit.
- d Consortium hominum haud acceptum est.
- e Quandoque etiam obscena, ludrica & absurda perpetrant.
- 3 *Melancholiæ immaterialis tristis*:
- a Prægressa ingens bonorum l. honorum jactura vel male transactæ Vitæ conscientia.
- b Summa tristitia, agrypnia, solitudinis amor, profunda speculatio & meditatio, appetitus imminutus.
- c His quandoque succedit desperatio, periculosas machinationes post se ducens.

V. *Subiectum.*

- 1 *Melancholiæ hypochondriacæ* expositæ sunt Personæ temperamenti sanguineo-melancholici, malo hypochondriaco vel passione hysterica laborantes, spissorem sanguinem in Vena Porta gerentes.
- 2 Fluxus hæmorrhoidalis suppressionem diuturniorem passus.
- 3 Fœminæ menstruorum l. lochiorum ataxiis obnoxie.
- 4 Uterque sexus pariori potui & vitæ sedentariæ assuetus, nec non labem insignem in partibus nobilioribus possidens.
- 5 *Melancholiæ immateriali jucundæ* expositi sunt superbi, arrogantes, cholericæ vel sanguineo-melancholici.
- 6 *Melancholiæ tristem, moralem* experiuntur meticulosi, avari, a rebus sinistris facile afficiendi vel etiam pœnitentes male actam vitam deplorantes.

VI. *Prognosis.*

- 1 Melancholia materialis facilius curatur, quam immaterialis.
- 2 Melancholiæ Hypochondriacæ si sanguinis nigri excretionem superveniant, bonum.
- 3 Melancholicis hæmorrhoides accidere salutare est.
- 4 Menstrua & Lochia in fœminino sexu legitime fluere, plurimum ad tollendum malum valet.
- 5 Hæreditaria Melancholica rarius recte curatur.
- 6 Moralis quo diuturnior, eo curatu difficilior.
- 7 Jucunda facile in Maniam degenerat.
- 8 Hæc si superveniat, malum.

VII. *Remedia.*

- 1 *Melancholiæ hypochondriacam* solvunt excretionem sanguinis sinceri spontaneæ, in viris per hæmorrhoides, in fœminis vero per menses & lochia, aut quandoque vicariæ artificiales Ventilationes, Venæsectiones in pede aut Hirudines locis inferioribus applicandæ.
- 2 Humores spissos resolvunt & incidunt vulgo sic dicta aperientia: Rad. Ari, Vincetox. Helen. Pimp. alb. Apii, Gramin. Polypod. Herb. Agerat. Cuscut. Capill. Gris cochl. Hepat. nob. Fl. Bellid. Cort. Cappar. Tamarisc. Gum. Heder. Junip. Ammon. Extract. amar. Fumar. Absinth. Cent. min. Card. bened. Cochlear. Pil. Polychr. D. Stahl. Polychr. Hal. & Balsam. visceral. Argent. Tart. Vit. Arcan. duplic. Crystall. Tart. cum interposito & subjuncto motu corporis voluntario per vecturam aut equitationem.
- 4 Eosdem diluunt sufficiens & tenuis potus ex rad. gramin. Scorzon. acetos. polypod. cichor. ras. C. C. ebor. Fl. ros. viol.

4 Resolutos evacuant Noduli laxativi ex Fol. Senn. Rhabarb. & præcipue Helleb. nigr. cum modo dictis solventibus combinatis. Uterque etiam scopus adimpletur per modo celebratas Stahl. Polychrest. Hal. & balsamico-viscerales Pilulas. Pertinet m. huc Sal. Catharticum amarum, nec non Liq. Terræ. Fol. Tart.

5 Tonum viscerum inæqualem corrigunt Alia. Tinctura Stis Hellebor. wedd. aperitiv. Ludov. nec. non Sal. Volatilia; Spir. C. C. rectif. Tart. cum Tinctura Stis acris combinati, Mistura simplex ex commendatione Tenfelii. Huc etiam referatur Essentia Millefol.

6 Intercurrentes phlogoses & orgasmos sanguinis temperant & discutunt pulveres Nitrosos-Diaphoretici ex Nitr. depurato, Stio diaphoretico Tart. Vit. Arcan. dupl. Oc. St. ppt. Conch. ppt. Cinnabari Stii vel Nativa.

7 Specificè aliquid præstare creduntur Herb. capillares, & in specie Adianthi species; Epithym. Polypod. nec non Anagallis Fl. puniceo; Chymicorum præparata ex ☉ hic potissimum palmam habent, ad quæ etiam Essent. dulc. Hal. Ordinar. & Concentrat. referenda est. Ex compositis Stahlius pulverem Palmarii celebrat.

8 Ideis admodum profundis & perversis medentur, suavis concentus instrumentorum Musicorum, aeris mutatio; Modicus Vini generosioris usus, motitatio corporis per equitationem aut vecturam in consortio amicorum peracta, varia suscepta negotia, ut per hæc objecta tristitia removeantur.

9 Moralem Melancholiam ob jacturam bonorum, aut male actam vitam excitatam corrigunt argumenta l. politica l. theologica frequenter & cum emphasi ægrotis insinuanda.

## Formule Remediorum.

## 1 Nodulus laxativus.

Rx. Rad. Ari.	Fol. Senn. s. st. ʒj.
Cichor.	Rhabarb. el. ʒij.
Polypod. quern. a ʒss.	Fibr. Helleb. nigr. ʒij.
Herb. Adianth. alb.	Crystall. Tart. ʒss.
Epithym.	Incis. contus. infund. in ʒij.
Agrim. a. Mss.	¶ fervent. ʒ ʒij.
Fl. Bellid.	Vin generos.
Cent. min. a. p. j.	Dos. ʒvj. vij. alternis diebus
Cort. Cappar.	mane usurpandæ.
Tamarisc. a. ʒij.	

## 2 Pilulæ laxant.

Rx. Pil. Tart. Overc. gr. XV.	c. Tinctura Stis aperit. Lud.
Extract. Helleb. nigr. gr. viij.	F. Pil. No. XXIII.
	D. pro 1. vice.

## 3 Alia.

Rx. Extr. Panchym. Croll.	c. Essent. Stis Helleb. Wed.
Gum. *ci a. ʒss.	F. Pil. 2. gran. ponder.
Extract. Helleb. nigr. gr. xij.	re.
	D. pro 2. vicibus.

## 4 Infusum.

Rx. Herb. Capill. Gris.	Incis. usurpentur loco potus
Adianth. alb.	Thee singulis mane.
Epithym. a. Mss.	
Fl. Anagall. punice. p. j.	

## 5 Essentia tonica.

Rx. Essent. Adianth. alb.	Dos. gutt. 30. bis vel ter per diem.
Tinctura Vit. Stis Lud.	
a ʒss. M. D.	

## 6 Alia.

Rx. Essent. Stis helleborat.	Millefol. ʒj.
Wed. ʒij.	m. Dosis ut prioris.

## 7 Essentia diuretico-nervina.

Rx. Tinctura Stis acris.	ʒss.
Spir. C. C. rectif. a.	Dosis ut prioris.

## 8 Alia.

Rx. Tinctura Tart.	ʒj.
Mixtur. simpl. Mich. a.	Dosis eadem.



## 9 Species pro potu Ordinario.

Rad. Gramin.

Acetof.

Liquir. a. ʒiſs.

Raf. C. C. ʒiſs.

Fl. Rosar.

Anagall. punic. a. p. j.

Sem. Fœnic. ʒiſs.

Incis. contus. D. ad ch.

Dof. aliquot. pugilli pro mens. j. ▽

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Ad diversas Melancholiæ species respiciendum est, & secundum hanc differentiam Cura I. materialiter vel moraliter est instituenda.
- 2 In Melancholia hypochondriaca sanguis spissior, ut plurimum in Vena portæ & connexis visceribus stagnans, locis convenientibus ad exitum est invitandus & evacuandus, quod & remediis appropriatis & artificialibus sanguinis evacuationibus, mediantribus hirudinibus vel V.S. obtinetur.
- 2 Resolutioni & dilutioni humorum opera impendenda, adhibendo ea, quæ sanguinem ad stagnationem primum resolvunt, diluunt, & in æquali circulatione conservant, cui rei partim aperientia temperatiora, partim sufficiens potus tenuis, partim denique etiam motus corporis in amicorum confortio suscepta, consulit.
- 3 Alvus adstricta, ad spissitudinem sanguinis ejusque stagnationem in Vena portæ plurimum contribuens, continuo aperta servanda est. Præstat etiam nunc & tunc primas vias per Nodulos laxativos a sordibus liberare.
- 4 His præmissis demum conducunt cum Alia & tonica, tum etiam specifica, interponendo semper si e re videbitur, Nitroso diaphanica, ne orgasmus sanguinis per modo dicta excitetur, & Maniæ occasio præbeatur.
- 5 Quod Diætam concernit, ægrotis aeris mutatio, cibi & potus tenuiores, excretorum successus suadenda sunt, interponendo ea, quæ animum ab Ideis conceptis abstrahunt, eundem exhilarant, & priori vigori restitunt.
- 6 In Mora'i Melancholia, Pharmaciæ ut plurimum parum loci conceditur, unde ad argumenta persuasoria ex theologia vel Politica desumenda, est confugiendum.

## VIII. Cautele Prædicæ.

- 1 In materiali Melancholia nisi respiciatur ad humores, eorumque correctionem vanus est omnis Medendi conatus, e contra in morali nisi primarius respectus ad animum læsum dirigatur, remedia in cassum propinantur.
- 2 Remedia Volatilia, nisi præmittantur universalialia & interponantur Tartarosa, quandoque patientes in Maniam præcipitant, quod etiam Vomitoria quandoque faciunt.
- 3 Melancholicos diuturnos nunquam solos esse decet: alias facile autocheires fieri possunt.
- 4 Quo magis ad negotia & hominum consortia excitantur & propelluntur, eo minus Melancholia radices sumere potest.
- 5 Thermæ & acidulæ, nisi prius humorum optima fuerit habita ratio, non tutæ sunt.
- 6 Serum lactis cum rosis laxativum, post Venzesectionem celebratam, in Melancholia hypochondriaca utile fuisse novi.

## CAPUT QUARTUM.

## D E

## Rabies Canina.

## I. Definitio.

**R**abies Canina est delirium fortissimum cum summo furore & febre acutissima conjunctum, a morfu canis rabidi vel alius animalis inductum.

## II. Differentia.

- 1 Alia est mitior: vehementior alia, ratione sc. majoris vel minoris morfus, miasmatis etiam magis vel minus communicati.
- 2 Alia mox post morfum impactum sese manifestat, alia post plures menses, imo annos quandoque a morfu accepto homines corripit.
- 3 Rabies Canina a *Lycanthropia* nonnisi ratione nominis differt, utraque enim præter reliqua symptomata, *Hydrophobiam* comitem habet.

## III. S. g. a.

- 1 Qui a Cane vere rabido vulneratur, post aliquot dies vel menses vel annos, prout plus vel minus veneni communicatum fuit, in phantasia insigniter corrumpuntur.
- 2 Fiunt namque tristes, Melancholici, hominum confortia averſantur, solitudines quærunt.
- 3 Cogitant varia, perversè judicant & insomnia terrores plena patiuntur.
- 4 Memoria maximopere læditur, dum amicos & familiares vix amplius agnoscunt.
- 5 Quanto ulterius procedit malum ad instar canum ringentium sibi vicinos hostiliter adoriuntur eosque lacerant, imo quandoque illorum more ejulant larrantque.
- 6 Faciem præ se ferunt ferocem & rubicundam, oculos lucidos & ardentes.
- 7 Respiratio valde est difficilis: anhelant namque & spumam ex ore eructant.
- 8 Canes maximopere extimescunt nec non specula, dum in illis se canes videre autumant.
- 3 Tandem fiunt hydrophobi, omnia liquida anxie evitantes, etiam si vehementissime sitiant, quod symptoma plerumque post nonum accedere solet diem.
- 10 Os propterea fit aridum & vox rauca aspera.
- 11 Febris eo ipso magis magisque accenditur.
- 12 Accedunt non raro artuum contractiones & convulsiones.
- 13 Intercurrunt sudores frigidi.
- 14 Tandem ferocia & viribus consumti moriuntur.
- 15 Post mortem viscera & præcipue pulmones inflammati deprehenduntur.

## IV. Subjecta.

Homines, qui a cane rabioso, lupo vel homine simili sunt vulnerati.

## V. Prognosis.

- 1 Nisi in primo statim principio exquisita medela afferatur, rabies, vix ac ne vix quidem curabilis, succedit.
- 2 Si Venenum non omnino est extirpatum, post aliquod tempus malum recrudescit & patientes de novo in vitæ discrimen conjicit.
- 3 Qui hydrophobi sunt facti rarissime evadunt: quia medicamenta difficillime iisdem ingeri possunt.
- 4 Ustione quemdam, a cane rabioso demorſum, tractatum novi, qui per plures menses optime se habuit tandem fortiori motu corpus exagitans subito in furorem incidit, post hydrophobus factus post aliquot dierum intervallum vitam miserrime finivit.
- 5 Hydrophobia plerumque post duos vel tres dies mortem post se ducit.

## VI. Remedia.

- 1 Vulnus expurgantia: Scarificatio profunda, eluitio per appropriata, exſuctio per Cucurbitulas, ustio lata & profunda.
- 2 Specifica: aliquid ab animali rabioso, quod momordit vel simili specie aut lupo canibus anxie exagitato desumptum v.g. hepar, cor, cerebrum, & interne Patienti exhibitum, nec non Limatura Orichalci ad ʒj. propinata, succus præterea scarabæorum majalium in melle suffocatorum, & tempore necessitatis No. iij. contusorum expressus, pulvis Julii Palmarii adversus morſum canis rabidi in Tab. Smaragd. descriptus & si alia ad manus non sunt Electuarium de Ovo cum nucis Vomica, amygdalæ amaræ ob cognationem idearum venenatarum cum animalibus quæ ab illis enecantur, Radix Pimpinell. alb. Cynosbat. Valerian. Gentian. rubr. acetof. spiritus Sal marini. Externe submersio in mare profunda vel loco hujus secundum Stahlî com-



commendationem in aquam salſam, aut juxta Helmontium in dulcem ſaltem qualemcumque modo profunde id fiat, applicatio pilorum illius canis qui momordit, in vulnus Patientis, cancri combuſti & Vulneri inſperſi,

*Formula Remediorum.*

**I Pulvis Julii Palmarii contra morſum canis rabidi.**

*R. Rut.*

*Salv.*

*Verben.*

*Beton.*

*Meliſſo-phyll.*

*Plantag. acut.*

*Hyper.*

*Centaur. min.*

*Artemiſ.*

*Polypod. ā.*

*ms. f. Pulv. Doſ. ʒj. ſingulis diebus ſemel aut bis ſumenda, Decoſto etiam ejuſdem vulnus eluendum eſt.*

**2 Species pro Decoſto.**

*R. Rad. Acetoſ.*

*Pimpinell.*

*Valerian.*

*Gentian. rubr. ā ʒſſ.*

*Incis. coq. in ʒ ſ. & utere mane & poſt meridiem loco potus Thee.*

**VII. Methodus medendi.**

**1** Pars læſa & vulnerata ſtatim in principio eſt eluenda & detergenda Decoſto herbis & radicibus alexipharmacis alterato.

**2** Poſtea ſcarificetur vel uratur late & profunde.

**3** Subjungantur interne Bezoardica & alexipharmaca generaliora.

**4** Interponantur vero ſtatim in principio ſpecifica, utpote quæ hic omnem abſolvunt paginam.

**VIII. Cautela Prædica.**

**1** Venæſectiones & Purgationes, quas quidam Auctores commendant, noxias potius quam proficias eſſe cenſemus, cum fermentum noxium magis ad interiora his ipſis invitetur.

**2** Scarificatio vero proficia eſt, & quidem lata & profunde, ut multum ſanguinis effluere poſſit.

**3** Poſtea abſterſio & frequens elutio haud eſt negligenda.

**4** Vulnus vero non ſtatim eſt consolidandum, ſed per aliquot meſes apertum ſervandum eſt, alias facillime fermentum primo cicuratum viſum poſt aliquod tempus novas vires aſſumit & patientem in priſtinum conjicit morbis metum.

**5** Si vulnus a cane inſiſtum anguſtum nimis eſt, præſtat illud dilatare & amplificare.

**CAPUT QUINTUM.**

**D E**

**Tarantismo.**

**I. Definitio.** **T**arantismus eſt morbus admodum periculofus, maximam phantaſiæ depravationem conjunctam habens, ab iſtu Tarantulæ, e genere Aranearum ſ. Phalangiorum octonoculorum in Apulia arva incolentium & viatoribus meſſoribusque inſidias ſtruentium, productus.

**II. Differentia.**

**1** Ratione diverſarum Tarantularum, quæ iſtum inſiſcere, morbus eſt vel mitior vel vehementior. Teſtatur quippe Baglivus Borealem Apuliæ regionem incolentes præ aliis ſæviores eſſe: a ſtellatis etiam & uveis majus periculum eſſe metuendum, quam a ſubalbidis.

**2** Ratione durationis, alius brevi interficit, alius ad plures meſes vel annos durat.

**III. Signa.**

**1** Quando mordentur a Tarantulis meſſores vel viatores, ſentiunt in parte affecta puncturam, veluti ab apibus inſiſtam.

**2** Excipit hanc maxima virium jaſtura, dolor primo vel ſtupor, cum circulo ambiente livido. nigro l. ſubflavo.

**3** Succedit poſtea partis læſæ inſignis intumeſcentia & tandem ſenſus in eadem abolitio, ita ut ægroti de dolore quæſiti nihil ſe ſentire reſpondeant.

**4** Intercurrunt profunda ſuſpiria, de anxietate cardialgica ſatis teſtancia.

**5** Summa inſuper afficiuntur triſtitia, commercia hominum fugiunt & ſolitaria loca quærun.

**6** Quandoque deſperabundi autocheires ſiunt.

**7** Alii ululant, indecora peragunt & abiectis veſtimentis inſtar ſuum in cœno ſeſe volutat.

**8** Alii immobiles & veluti emortui jacent.

**9** Quidam his, alii aliis coloribus delectantur, omnes vero nigrum colorem abhorrent, ad ejusdem adſpectum alta ſuſpiria trahentes.

**10** Omnes mira dulcedine ab inſtrumentis muſicis, modo his modo aliis afficiuntur & ad ſaltandum com-moventur.

**11** Quando vero diſſonantia vitio Muſici immiſcetur, ſummis doloribus & anxietatibus cardialgicis torquentur, donec conſonantia iterum obſervetur.

**IV. Subjectum.**

Huic morbo ii tantum ſunt expoſiti, qui infortunio a Tarantulis mordentur, præcipue viatores meſſoresque tempore æſtivo Apuliæ arva permeantes.

**V. Prognofis.**

**1** Tarantismus eo periculofior eſt, quo ſpecies, quæ iſtum inſiſxit, eſt venenofior.

**2** Sunt, qui a Tarantula morſi, paucis diebus moriuntur, nihil proficientibus Muſica & Antidotis. Bagl.

**3** Tarantulæ venenum ſemel corpori illatum indelebile impoſterum eſt. *Idem.*

**4** Singulis quippe annis & potiffimum circa illud tempus, quo Patienti illatum fuit, inſallibiliter recrudescit. *Idem.*

**VI. Remedia.**

**1** Generalia eadem, quæ Tab. præced. fuere commendata.

**2** Specialia, Muſica cum variis inſtrumentorum generibus inſtituta: fiſtulis paſtoralibus, tympanis parvis, cytharis, lyris, cymbalis, fidibus &c. Spir. Vini roſmarinatus vel potius ipla Eſſentia Roſmarini per ſe deſtillata & ſumpta cum ʒ theriacali, Cort. Citr. vel hyſſopi meliſſ. ſerpilli &c.

*Formula Remediorum.*

**1 Spiritus Alexipharmacus a Bagliv. commendatus.**

*R. ʒ regin. Hung. ʒj. vel ʒj.*

*Exhibeatur cum ʒ ſerpilli aut brodio, her-*

*bis alexipharmacis alterato.*

**2 Eleſtuarium antiphalangium Epiphanii Ferdinandi.**

*R. Bacc. Myrt.*

*Tamaric. a. ʒj.*

*Sem. Paſtinac.*

*Nigell.*

*Agn. Caſt.*

*Dauc.*

*Anis.*

*Origan. a. ʒj.*

*Terr. ſigill.*

*Boll. Armen. Or. a. ʒj.*

*C. Syr. e toto Citr. f. ſ. E-*

*lect. de quo ægrotus ma-*

*ne quotidie ʒj. ſumat,*

*ſuperbibendo brodium*

*herbis & radicibus alex-*

*xiteriis alteratum.*

**VII. Methodus medendi.**

**1** Locus affectus detergatur alexipharmacis, poſt ſcarificetur, imponendo deſuper Cucurbitulam, vel loco ſcarificationis in uſum vocetur uſtio paulo profundior.

**2** Interne adhibeantur Alexipharmaca & Bezoardica generaliora.

**3** Interponantur ſimul & ſubjungantur ſpecifica, inprimis Muſicæ talia genera, quæ affectui conveniunt. His quippe rite inſtitutis ægroti ſaltationes inchoant, eaſdemque tam diu & tam vehementer continuant, donec in largos ſudores corruant. Poſtea quieti tantisper dant locum & pauco elapſo tempore eaſdem ſaltationes denuo reiterant, donec deſaſſati quietem adhuc dum petant. Quod quidem exercitium ad quartum rarius ad ſextum uſque diem protrahunt, quo finito tempore ſanitatē priſtinam recuperare ſolent.



V. II. *Cautela Practicæ.*

- 1 Etiam si selectissima adhibeantur alexipharmaca aliaque antidota, non eadem tamen felicitate agere observantur quam Musica.
- 2 Non omnia instrumenta Musica neque iidem concentus Tarantatis conveniunt, alii quippe his instrumentis & sonis, alii aliis delectantur: Unde tamdiu cum instrumentis & sonis variandum, donec ad choreas & saltationes excitentur.
- 3 Quando Musica affectui haud correspondens instituitur, ægroti ad saltationes haud commoventur.
- 4 Omnes Tarantati velocissima sonorum modulamina expetunt, & tales instituunt etiam saltationes.
- 5 Circa anni tempus, quo a Tarantula fuit demorsus Patiens, gravia recrudescere solent symptomata, unde, nisi in prius delabi velit periculum, eandem Musicam in ulum vocare necesse habet.

## CAPUT SEXTUM.

D. E.

*Noctambulatione.*

I. *Definitio.* **N**octambulatio est læsio Phantasie, qua homines inter dormiendum lectum deferere, variosque actus, se insciis, exercere invitantur, quibus peractis priorem quietis locum repetere solent.

II. *Differentia.*

- 1 Alia est *Naturalis*, qua varia negotia domestica, talesque actus, qui alias sibi consueti sunt, exercent; alia *præternaturalis*, qua loca minus consueta adeunt & insolita prorsus perpetrant, ita ut muros adscendant & in tecta sese recipiant altissima, aliaque similia peragant.
- 2 Vocantur Noctambulantes etiam *Lunatici*: quia plerumque circa phases Lunæ insigniores hoc morbo corripiuntur.

III. *Signa.*

Cognoscimus Lunaticos, si noctu sæpius surgunt, oculos clausos habent, nudique obambulant, postero vero die nihil de actis sciunt.

IV. *Subjectum.*

- 1 Plethora, spissitudine sanguinis & obstructionibus laborantes.
- 2 Phantasia fortiori præditi.

V. *Prognosis.*

- 1 Rarius aliquid damni neque aliis neque sibi causantur, quod si tamen in insolitis locis versantur, ibidemque ex improviso excitantur, facile in vitæ periculum incidunt, quod sibi relictis plerumque cautissime evitare sciunt.
- 2 Alias corpori nihil ex hoc morbo mali accidere observatum est.

VI. *Remedia.*

- 1 Primas vias expurgantia: Diacydon. lucid. Jalappin. specif. Jalappin. Pulv. Cornachin. Noduli laxativi, & ubi circumstantiæ hoc suadent, Vomitorium e tartaro emetico, syrupo emetico.
- 2 Orgasum sanguinis ejusque plethoram imminuentia, Venæsectio, Scarificatio legitimo tempore instituta, subjunctis Nitrosis & Cinnabarinis.
- 3 Specifica: Castigationes mediantibus virgis eo tempore factæ, quo patiens e lecto egreditur, appositio etiam vasis alicujus majoris aqua repleti juxta Patientis lectum, ut surrecturus in illud delabatur & hac ratione evigilet.

*Formula Remediorum.*

I. Potio Purgans.  
 R. Syr. e cich. c. Rhab. ʒss.      ▽ Meliss. ʒss.  
 Diacydon. lucid. Jal. ʒiii.      ms. D. pro una vice.  
 Sal Polychr. gr. iii.

## 2 Pulvis Purgans.

R. Specif. Jalappin. ʒss.      D. pro 1, vice.  
 3 Nodulus laxativus.  
 R. Rad. Valerian.      Rhabarb. elect. ʒss.  
     Scorzon.      Fibr. Helleb. nigr.  
     Helen.      Agar. albiss. a. ʒiii.  
 Herb. Meliss.      Crysell. Tartari ʒss.  
     Card. bened.      Sem. Coriand. correct.  
     Adianth. ʘ. a. Mfs.      ʒss.  
 Fl. Til.      Incis. cont. d. ad ch.  
     Tunic. a. p. j.      Infund. in ▽ ferv. ʒij. ʘ  
 Cort. ʘrum ʒii.      Vini generos. ʒij. Dos.  
 Fol. sen. s. st. ʒiss.      ʒvi. vel viij.

## 4 Potio Vomitorio-Cathartica.

R. Syr. emet. ʒss.      ▽ Cichor. ʒss.  
 Diacydon. luc. Jal. ʒii.      ms. D. pro 1, vice.  
 Sal absinth. gr. iv.

## 5 Pulvis temperans.

R. Conch. ppt.      Cinnab. ʒi ʒss.  
 C. C. phil. ppt. a. ʒss.      ms. f. Pulv. in x. p. a. divi.  
 Nitr. depurat.      dend. d. ad citr.  
 Tartar. Vitriol.      Exhibeatur his, ter per  
     a. ʒi.      diem.

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Primæ viæ ante omnia conveniente purgante evacuentur.
- 2 Subjungatur postea Venæsectio vel scarificatio.
- 3 Versus phases luna vero adhibeantur interne Nitrosa cum Cinnabarinis, externis auxiliis simul in usum vocatis.

VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 Si Noctambuli sunt in loco quodam periculoso, nunquam excitentur, expergefacti enim facile cadunt & damnum exinde reportant.
- 2 Venæsectiones & Scarificationes, circa tempora æquinoctialia versus insigniores Lunæ phases institutæ, semper reliquis meliores sunt.
- 3 Motus corporis laboriosus optime quoque ad somnum profundiorum ipsis conciliandum prodest: otium vero spissitudinem sanguinis auget.

## CAPUT SEPTIMUM.

D. E.

*Nostalgia.*I. *Definitio.*

**N**ostalgia est vitium Imaginationis in exquisito Patriam repetendi desiderio consistens, modo vehementioribus, modo mitioribus stipatum symptomatibus.

II. *Differentia.*

Est vel *idiopathica* per se absque aliis morbis, exurgens, vel *symptomatica* cum aliis morbis complicata.

III. *Signa.*

- 1 Qui Nostalgia laborare incipiunt vel actu laborant, tristes sunt hominumque commercia fugiunt.
- 2 Patriæ delicias data occasione extollunt.
- 3 Somnum patiuntur inquietum.
- 4 Cibos & potum fere averfantur.
- 5 Ingestos vero haud bene digerunt, ita ut nausea, sæpius etiam vomitus succedat.
- 6 Quando soli sunt, profunda suspicia trahunt, palpitationes etiam cordis sentiunt.
- 7 Intensum quoque patriam repetendi desiderium, quovis fere momento produnt.

IV. *Subjecta.*

- 1 Juvenes prima vice in exteris regiones missi domique delicatius vel lautius habitati.
- 2 Ex aere subtiliori in crassiorem atmosphæram delati.
- 3 Inprimis Helvetii rusticis suis cantilenis & lactis delictis assuetis.
- 4 Qui temperamento gaudent sensibiliiori.
- 5 Qui mox post abitum e Patria in morbum aliquem delabuntur vehementiorem. Erat hic adolescens Helvetius.



vetius qui Febre tertiana correptus, nullo modo curari poterat. In sermonibus continuo Patriæ & aquæ, quam anxie desiderabat, certi cujusdam fontis mentionem faciebat. Remissus E. a Magistro suo in Patriam brevi restituebatur.

V. Prognosis.

- 1 Si morbus est simplex tantum periculi haud involvit, quam si complicatus est.
- 2 Quod si tamen redeundi desiderium sit intensius, morbus, nisi voluntati satisfiat, maxime periculosus & tandem lethalis fieri potest.
- 3 In Patriam missi vel in itinere, vel postquam advenire, plerumque statim convalescunt.
- 4 Quo vehementior est morbus complicatus, eo minor reconvalescendi spes superest.

VI. Remedia.

- 1 Primas vias expurgantia, simulque revulsiones humorum peragentia: Mass. Pil. e Succin. Crat. Extract. panchym. Croll. Helleb. nigr. & ius dulc. Pilulæ cephal. variæ vel Vina medicata cum Helleboro aliisque laxantibus in usum vocata.
- 2 Sanguinem abundantem ventilantia: Venæsectio, Scarificatio, Hirundinum applicatio.
- 3 Conversatio frequens cum amicis, aeris mutatio, Vini generosi usus medicus, refocillatio per Cardiacæ.
- 4 His vero nihil juvantibus reditus in Patriam.

Formula Remediorum.

1 Pilulæ purgantes.

Rx. Mass. Pil. e Succin. Crat. Trochisc. alband. gr. ij.  
g. XV. c. Essent. Ambr. f. Pil. No.  
Extract. helleb. nigr. ℥ss. XXI.  
℥ii dulc. rit. par. gr. vj. D. pro una vice.

2 Nodus laxans.

Rx. Rad. Vincetox. Fibr. helleb. nigr. ℥vj.  
Valerian. Agar. albiss.  
Scorzon. a ℥ss. Rhab. elect. a ℥ij.  
Herb. Meliss. Salis polychr.  
Capill. Gris. Tart. solub. a ℥ij.  
Adianth. O a Mss. Sem. jenic. ℥ss.  
Fl. Cent. min. p. j. Inc. cont. infund. in v. f. O.  
Cort. Citr. ℥ij. Vin. generos. a ℥ij.  
Fol. Senn. f. fl. ℥j. Dos. ℥vj. viij.

VII. Methodus medendi.

- 1 In affectu simplici, præmissis universalibus, remedia tam moralia, quam physica supra nominata, adhibeantur.
- 2 His vero nihil proficientibus ægrotus in Patriam remittendus est.
- 3 In affectu complicato primarius scopus ad morbum principalem dirigatur.
- 4 Interponantur talia remedia, quæ animum mentemque erigunt, postea superato morbi primarii periculo, eadem, quæ supra allegata sunt, adhibeantur.

VIII. Cautela Practicæ.

- 1 In Nostalgia graviore omnia medicamina incassum adhibentur, nisi ægrotantis animo per reditum in Patriam satisfiat.
- 2 Cantilenam Helveticam, vulgo des Kube Reyben vocatam pluribus e patria egressis in exteris oris auditam Nostalgiam induxisse experientia docuit.
- 3 Unde apud sensibiliores ab omnium rerum memoria, qua fortiter affici & in Patriam allici possunt, desistendum est.

CAPUT OCTAVUM.

D E

Appetitu depravato & aucto.

I. Definitio.

- a **A**ppetitus depravatus est rerum insolitarum & a nobis alienarum concupiscentia.
- b Appetitus auctus est ciborum consuetorum vehemens & anxium desiderium.

II. Differentia.

- 1 Appetitus depravatus, qui ab Auctoribus Pica vocatur, distinguitur ab aucto appetitu ratione rerum, quæ appetuntur; in illo quippe prorsus alienæ res v. g. carbones, calx, arena desiderantur, hic in cibis solitis subsistit, sed majori tantum copia & vehementiori, quam moris est desiderio, eadem concupiscit.
- 2 Appetitus hic auctus differt ratione nominis & concurrentium circumstantiarum: modo enim vocatur Addephagia, quando pueri cibos continuo appetunt & in magna quantitate, antequam priores sint digesti, devorant: modo Bulimi s. famis bovinæ nomen assumit, si cibos ea quantitate ac boves appetunt & deglutiant, quæ fames cum animi deliquio sæpius est conjuncta; modo Orexix s. fames canina audit, si anxio desiderio & in magna quantitate cibi appetuntur & ingeruntur, devorati vero l. per Vomitus vel alvum rejiciuntur: denique etiam Malaciæ titulum assumit, si unus tantum vel alter cibus cum maximo desiderio expetitur.

III. Signa.

- 1 Appetitus depravati signa ex ipsa absurda concupiscentia patefunt.
- 2 Appetitum auctum & nimium cognoscimus ex signis concomitantibus.
  - a Alii, Cardialgias, pressiones & anxietates circa Ventriculum post assumpta sentiunt.
  - b Accedunt quibusdam Cephalalgia vertiginosa, temulentæ.
  - c Sequitur in aliis Nausea, Vomitus vel Diarrhoea.
  - d Corpus languet magis, quam viget, marcescit potius, quam nutritur.
  - e Habitus corporis fit decolor, pallidior.
  - f In abdomine concurrunt Flatus & dolores quandoque prementes.
  - g Non raro sequuntur Febres, obstructions Mesenterii, Lienteria, Atrophia, Hæctica &c.

IV. Subjectum.

- 1 Pica laborat quandoque sexus foemininus, mensium vitiis obnoxius & in statu graviditatis constitutus; nec non vermibus divexati: Seminis suppressione laborantes: Epilepsia obnoxii: ulcera in stomacho gerentes: Febre quartana decumbentes.
- 2 Addephagiam experiuntur infantes atrophici, verminosi.
- 3 Bulimi & Orexix caninae expositi sunt sanguinei & sanguineo phlegmatici, largis evacuationibus & inedia longa exhausti, & ad plenam Dietam translatis; quibus febres intermittentes per Chinæ Chinæ usum suppressæ sunt: qui morbos graviores superare & valetudinem recuperarunt: vermibus obnoxii: Hypochondriaci & Hystericæ.
- 4 Malacia contingit ut plurimum gravidis sensibilibus.

V. Prognosis.

- 1 Gravidæ Pica laborantes post tertium a Graviditate mensem ut plurimum ab eadem liberantur.
- 2 Quod si eisdem res appetita denegatur, nævus plerumque infanti imprimitur.
- 3 Rarissime aliquod damnum a comestis, alias satis noxiis, inferitur, dummodo in minori quantitate comedantur.



- 4 Aliqui, teste Hildano, a Febre Quartana per esum ejusmodi absurdorum, appetitorum & devoratorum fuere liberati.
- 5 Quæ virgines hoc malo corripiuntur, mensium legitimo fluxu restituto curantur.
- 6 Infantes addephagia laborantes incidunt in Atrophiam, Cachexiam, Lienteriam, quæ non curantur, nisi Patientes ad justas Diætæ regulas remittantur.
- 7 Bulimos morbis chronicis superveniens funestus est eventus. Ettmuller.
- 8 Fames canina post Febres a Chinæ Chinæ abusu excitata plerumque post se ducit recidivam.
- 9 Cibi post diuturnam inedia in copia comesti post se trahere possunt repentinam mortem.
- 10 Qui comesta Vomitu & Diarrhœa frequenter ejiciunt, tandem in Cachexiam incidunt.
- 11 Gravidis Malacia laborantibus res appetita haud est deneganda, alias nævus in infante metuendus est.

## VI. Remedia.

- 1 Stomachum vel per Vomitum vel per alvum expurgant: Tartarus emeticus, Syrupus emeticus, Ipecacohanna, Sal. Catharticum amarum, Rhabarbarum, Extractum Panchymag. Croll. Pil. Beccheri vel Stahlilii.
- 2 Evacuationibus Sanguinis impeditis vel suppressis satisfacit, præter remedia aperientia, V. S. in pede l. Scarificatione partium inferiorum.
- 3 Liquorem gastricum corrigunt amara, Herb. Card. Bened. Fumar. Absinth. Cent. min. eorumque Extracta, Cort. Orum, Elix. Propr. Paracelsi, dulce, Essent. amara Halensis, Myrrh. Absinth. cort. Orum; nec non Salia fixa: Cent. min. Absinth. Card. bened. Tartarus vitriolatus, Sal. polychr. Glaferi.
- 4 Ventriculi tonum roborant Martialia & subadstringentia: Tinct. Vitrioli & tis Ludov. Crocus & tenerior. Extractum Cort. Chacar. Syr. Cydon. e ros. siccis.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis emeticus.

Rx. Tartari emet. g. iijss. ms pro i. vice.  
Salis absinth. gr. vj.

## 2 Potio emetica.

Rx. Syr. emet. ℥vj. Cichor. ℥ss.  
Sal. polychr. gr. vj. ms pro i. vice.

## 3 Sal laxans.

Rx. Salis Cathart. amar. ℥j. lente & propinetur  
Dissolvatur in jusculo ca- pro i. vice.

## 4 Pilulæ laxantes.

Rx. Extract. Rhabarb. gr. XII. ℥ii dul. gr. iij.  
Scammon. Sulph. gr. ℥j. F.l.a. Pil. No. XV. pro j. vice.

## 5 Aliæ.

Rx. Pil. Beccher. ℥ij. sper. gr. XV.  
Exhibeantur mane & ve-

## 6 Pulvis alterans.

Rx. Oc. ℥. ppt. Crem. Tart. ā ℥ij.  
Corall. r. ppt. ā ℥j. ms f. Pulv.  
Herb. Card. bened. Dos. ℥j. bis l. ter per diem.  
Cort. Orum.

## 7 Essentia Stomachica.

Rx. Essent. Absint. ℥ij. ms. Dos. gutt. 30. bis vel ter  
Cort. Orum. ℥j. per diem.  
Myrrh. ℥ij.

## 8 Electuarium Stomachicum.

Rx. Conserv. Menth. Crec. & tis ℥ii ℥ss.  
Cent. min. ā ℥j. Syr. Cydon. q. s.  
Visceral. ℥ss. F. Elect. Dos.  
Pulv. Cort. Chacar. ℥ij. Castan. magnitudo bis per  
Orum ℥j. diem.

## 9 Tinctura Tonica.

Rx. Tinct. Vitriol. & tis Lud. ms Dos. gutt. 30. bis per  
℥ij. diem.  
Elix. dulc. ℥j.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Pica a menstruorum suppressione ortum habens tractanda est per V. S. in gravidis in brachio, in reliquis vero in pede instituendam.
- 2 Subjungantur laxantia leniora, in primis in gravidis.
- 3 Reliqui picantes exposcunt Vomitoria, subjunctis ubique remediis quæ causis specialibus satisfaciunt.
- 4 Addephagia Infantum curatur per laxantia aliquoties exhibita, incidentia & lenia & lia, inprimis Tinct. Vitrioli & tis Ludov. & Diætam legitimo tempore & modo institutam.
- 5 Bulimos & Orexia Canina post adhibita Vomitoria vel laxantia desiderant amara, Salia fixa & lenia martialia, quæ tempore, ubi Ventriculus a cibis vacuus est, exhiberi debent.
- 6 Commendetur insuper Patientibus, ut eupepta assument, & sæpius parciusque comedant, donec Natura in justum reducatur ordinem.
- 7 Malacia Curatione vix opus habet, cum malum sit transitorium, & post rei desideratæ comestionem sponte cesset, rariusque plerumque revertatur.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 In Pica, nisi evacuationibus consuetis via aperiatur, frustra Curatio expectanda est.
- 2 In Bulimo, Addephagia & Orexia canina temperantia omnibus remediis palmam eripiunt: nisi enim illa cum his combinentur, parum aut nihil solidi obtinetur.
- 3 Pro appetitu extinguendo male exhibentur Opiata, quæ Naturam tantum stupefaciunt & majora plerumque mala post se ducunt.
- 4 Majori adhuc spe & securitate potest commendari fumus Tabaci, qui teste Experientia famem nimiam temperare solet.

## CAPUT NONUM.

## D E

## Anorexia.

I. Definitio. **A** Norexia est appetitus ciborum abolitus, a variis causis originem ducens.

## II. Differentia.

- 1 Differt a Dysorexia gradu; utpote quæ appetitum ciborum imminutum innuit.
- 2 Contingit Anorexia vel idiopathice a vitio Ventriculi, vel symptomatice ab aliis morbis, quibus dum Natura debellandis est intenta, reliqua negotia vitalia paulisper seponit, & negligit, donec morbus sit superatus, ubi appetitus absque medicamentorum concursu sponte redit.

## III. Signa.

- 1 Fastidium ciborum quorumvis, etiamsi optime sint preparati.
- 2 Subsequens Nausea vel gravitas Ventriculi, si citra appetitum fuere comesti.
- 3 Interdum etiam Vomitu iterum rejiciuntur, ubi melius se habent Patientes.

## IV. Subjectum.

- 1 Ventriculum variis & nimis cibis onerantes, otiosi, assumpta minus bene digerentes.
- 2 Cholericis, graviore iracundia affecti, inprimis post pastum.
- 3 Morbis acutis, inflammatoriis, arthriticis graviorebus, febribus intermittentibus laborantes.
- 4 Hypochondriaci, phthistici, hectici, aliisque chronicis morbis divexati per intervalla Anorexia afficiuntur.
- 5 Nimiis laboribus & evacuationibus viribus suis exhausti.

## V. Prognosis.

- 1 Anorexia idiopathica vel Ventriculum nimium flaccidum.



cidum f. tono suo debito privatum , vel cruditates ejusdem innuit .

- 2 Quæ a cruditatibus ortum habet , facilius curatur , quam quæ debilitato tono natales suos debet .
- 3 Utrique tamen malo debita Methodo occurrere potest .
- 4 Symptomatica Anorexia non curatur , nisi vel ipse morbus , vel paroxysmi morbifici cessaverint .
- 5 Melius est Anorexiam morbos & paroxysmos morbificos præcedere & iisdem concurrere , quam post eosdem superatos adhuc dum durare : recidivam enim plerumque post se ducit .
- 6 Qui Anorexia in morbis laborant , sæpius citius ab iisdem liberantur , quam qui appetitu vegetiori gaudent .
- 7 Quo magis tamen appetitus in morbis acutis est prostratus , eo major morbi vehementia innuitur .
- 8 Si in acutis & aliquando in chronicis post magnam inappetentiam dè repente ingens excitetur appetitus , nulla præcedente bona crisi , aut alio bono signo , postmodum mortem prædicito . Bagliv .

#### VI. Remedia .

- 1 Saburram Ventriculi abundantem immediate evacuant per Vomitus : Tartarus emeticus , syrupus emeticus , Ipecacohanna , aut per alvum : Noduli laxativi , ex Col. Senn. Rhabarb. Agar. albiss. Fibr. Helleb. nigr. cum radic. Herb. rī cort. incidentibus & amaricantibus combinatis , vel Sal Catharticum amarum aliquoties exhibitum .
- 2 Materiam lentam , tenacem , Ventriculi parietibus adhærentem , incidunt Salia dicta mediâ : Tartarus Vitriolatus , Arcanum duplicatum Sal. polychrestum Glaferi , Nitrum & gum. Crystall. Tart. Tartarustarificatus , liq. Terr. Fol. Tartari , nec non vegetabilia incidentia & amara : Rad. Ari. Zedoar. Galang. Gentian. Pimpinell. alb. Caryophyllat. Helen. Calam. aromat. Herb. Cent. min. Card. bened. Fumar. Absinth. Z. Z. Piper , Cort. Orum , Pulvis stomach. Bickmanni , Quercetan .
- 3 Tonum Ventriculi relaxatum roborant cum modo dicta amara , tum Martialia selecta : Tinctura Vitrioli & tis Ludov. Zwelf e pom. Borsdorf. nec non Cortex Chacar. ejusque Extractum .

#### Formule Remediorum .

##### 1 Pulvis emeticus .

R. Rhabarb. elect. gr. XV.      Salis Absinth. gr. iij.  
Tartar. emet. gr. iij.      ms pro 1. vice.

##### 2 Alius .

R. Rad. Ipecac. gr. XXIV.      D. pro 1. vice.

##### 3. Nodulus laxativus .

R. Rad. Ari.      Fibr. Helleb. nigr.  
Caryophyllat.      Agar. mund. ā. ʒj.  
Gentian. ā. ʒss.      Sal. Cathart. amar. ʒss.  
Herb. Card. bened.      Incis. contus. d. infund. in ʒ  
Fumar. ā. Mss.      fervent. ʒ Vin. gene-  
Summir. Absinth. p. j.      ros. ā. ʒij. Dos. ʒvj. vij.  
Cort. Orum ʒij.      alternis diebus usur-  
Fol. Senn. ʒss.      pande .

##### 4 Pulvis stomachico-digestivus .

R. Rhabarb. elect.      Salis Absinth. ʒss.  
Rad. Arippt.      ms f. Pulv. Dos. ʒj. bis l. ter  
Flaved. Cort. Orum.      per diem .  
Fl. Cent. min. ā ʒj.

##### 5 Alia .

R. Herb. Card. bened.      Sal. Cent. min. ā ʒj.  
Rad. Arippt. ā ʒss.      ms f. Pulv. ut præcedens u-  
Cort. Winteran.      surpandus .  
Tart. Vitriol.

##### 6 Pilulæ Tonico-Stomachicæ .

R. Extract. Cort. Chacar. ʒss.      Dos. gr. vj. l. viij. ante pran-  
F. Pil. gran. j. magnitud.      dium & cœnam.

##### 7 Tinctura similis .

R. Tinct. Vitriol. & tis Lud. ms. Dos. gutt. XXXV. ante  
ʒij.      prandium.

##### 8 Alia .

R. Tinct. Vitrioli & Zuvelf. m Dos. & usus , ut præ-  
ʒij.      cedentis .  
Essent. cort. Chacar. ʒj.

#### VII. Methodus Medendi .

- 1 Anorexia idiopathica , quæ copiosam Ventriculi saburram pro fomite habet , optime tractatur per Vomitorium in principio exhibitum .
- 2 Quod si autem debilitas subjecti aliæque circumstantiæ hocce dissuadeant , præscribi potest Nodulus laxativus , qui & secure & efficaciter plerumque Operationem suam exserit .
- 3 Idem locum habet in visciditate & lentore humorum , Ventriculum occupante : interponuntur hoc in casu optime digestivo-stomachica , diebus a purgatione liberis .
- 4 Quod si vero res magis a flacciditate , quam cruditate Ventriculi , dependeat , præter amara & stomachica præscribantur subadstringentia , & tonica .
- 5 In morbis acutis & accessibus febrilibus ad ipsum morbum potius , quam symptoma hoc , respiciendum est , promovendo secretiones & excretiones debito more .
- 6 In morbis tamen chronicis , ubi sæpissime Ventriculi tonus labefactatur , succurri potest partim per temperata digestivo-stomachica , partim per lenia tonica , reliquiis remediis perite interponenda .

#### VIII. Cautela Practica .

- 1 Vomitoria conveniunt in casu recente , ubi multa materia præsto est , & subjecta sunt robustiora .
- 2 In malo vero inveterato & subjectis sensibilibus magis conveniunt Noduli laxativi , qui lentorem & visciditatem incidunt & simul evacuant . Curavimus nuper tali Nodulo per 12. dies usurpato , Anorexiam habitualement , per 8. jam menses durantem quæ profligata eximium appetitum , adhuc dum vigentem , post se ducebat .
- 3 In Anorexia , cum malo hypochondriaco hysterico sæpius concurrente , abstinendum est ab omnibus remediis calidioribus & turgescientibus ; insistendum potius temperantibus , nitratis , digestivis & diluentibus .
- 4 Sanguinei a subacidis majus auxilium recuperant , quam ab amaris , acris & aromaticis , nisi eximia Ventriculi flacciditas vel visciditas concurrat , ubi hæc in moderata dosi conveniunt .
- 5 Phlegmaticis vero & pituitosis posteriora potius , præ prioribus , solamen afferunt .
- 6 Ab Extracto corticis Chacarillæ egregias observavimus virtutes , nec non a Tinctura Vitrioli & tis Ludov.
- 7 Baglivius celebrat in omnibus Ventriculi morbis Hieram picram .
- 8 Remedia e Cydoniis parata temperatissimum præbent stomachicum .
- 9 Elix. propr. Paracelsi , Essentia absinth. cent. min. Phlegmaticis potius , quam sanguineis præscribenda sunt .
- 10 Terreæ & absorbentia in majori dosi exhibita Anorexiam adaugent .



## CAPUT DECIMUM.

## D E

## Sitis Excessu &amp; Defectu.

## I. Definitio.

- a Sitis excessus est solito majns liquidorum desiderium & concupiscentia.  
b Sitis Defectus est minor, quam par est, eorundem liquidorum appetentia.

## II. Differentia.

- 1 Sitis aucta differt ratione gradus: vel enim in limitibus suis adhuc subsistit, vel ad eximium gradum evehitur, quam *sitim clamorantem* Auctores appellant.  
2 Uterque affectus distinguitur a *siti depravata*, ubi Patientes insolitos prorsus liquores expetunt, qui affectus cum Pica convenit.

## III. Signa.

- 1 Cognoscimus sitim auctam ex largiori quam consuetudo alia ferebat, liquidorum appetentia & assumptione, nec non concurrente ut plurimum majori calore corporis.  
2 Sitis vero imminuta contrario modo sese manifestat, dum liquida in parvissima, respectu aliorum hominum, quantitate assumuntur, nullusque calor & activitas, sed potius pigritia & languor in corpore observatur.

## IV. Subiectum.

## a Sitis Excessus:

- 1 Biliosi, Febricitantes, acutis morbis decumbentes.  
2 Hydropici & Scorbutici.  
3 Hectici, Phthisici & Atrophici.  
4 Fortioribus Purgantibus & Vomitoriis tractati.  
5 Diarrhœis & Dysentericis laborantes.  
6 Qui V. S. vel Vinis fortioribus in copia usi fuerunt.  
7 Qui laboribus fortioribus, cursibus, exercitiisque aliis corporis serum imminuere.  
8 Cantores & Tubicines.  
9 Qui Sale & aromatibus abutuntur.

## b Sitis Defectus:

- 1 Phlegmatici & Melancholici.  
2 Spissitudine Sanguinis laborantes.  
3 Hypochondriaci & Hystericæ.  
4 Feminae præ viris.  
5 Qui vitam sedentariam agunt.

## V. Prognosis.

- 1 Sitis aucta in febribus & morbis acutis non est reformidanda.  
2 Clamora sitis inflammationem internam & quidem plerumque Ventriculi & intestini Duodeni innuit.  
3 Sitis aucta absque causa occasionali externa febrem portendit.  
4 In febribus post morbi solutionem sponte cessat.  
5 In morbis etiam chronicis non remittit, nisi causa mali e medio sit sublata.  
6 Sitis magna in Hydropicis mala.  
7 In febribus malignis sitis pauca suspecta est.  
8 Pulsus celerem & frequentem esse & linguam exsiccata, sitim vero parvam, innuit Naturam ab officio suo remittentem.  
9 Extra febres sitis imminuta spissitudinem sanguinis innuit.

## VI. Remedia.

## a Sitis aucta.

- 1 Aquea humores biliosos & lixiviosos diluentia: Decocta Rad. Gramin. Cichor. acetos. hord. C. C. Potus Thee. serum lactis, Emulsiones dilutæ.  
2 Gelatinosa & mucilaginosa fluxiliores humores involventia: Gelatina C. C. Ebor. Mucilag. Sem Psyll. Cydon.  
3 Acida, humores & vias refrigerantia: Succus acetos. Citr. Rib. Berb. Spir. Vitriol. Nitr. Clyff. min.

Tinct. Rosar. Violar. Julepi aciduli, Decoctum Tamarind. e tot. Citr. Syrupi & tabulæ acidulæ.

- 4 Absorbentia & Nitrata motum humorum remorantia & vias relaxantia: Oc. ꝑppt. Conch. ppt. Matr. Perl. ppt. C. C. Phil. ppt. Nitr. depurat. Sal. prunel. Nitr. gutum.

## b Sitis imminuta:

- 1 Liquores suaves appetitum exstimulantes: Vinum Generosum, Ceraforum, Cydoniorum, Juniperinum, Potus Caffæ, vel alius magis temperatus, secundum temperamenti constitutionem ordinandus, & in majori copia hauriendus.  
2 Motus & labores corporis congrui.

## Formula Remediorum.

## I Species pro Decocto Ordinario.

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| R. Rad. Gramin.                     | Passul. min. ʒj.                |
| Acetos.                             | Fl. Pap. rh.                    |
| Scorzon.                            | Rosar. a. p. j.                 |
| Liquir. a. ʒss.                     | Sem. Fœnic. ʒij.                |
| Raf. C. C.                          | Incis. q. o. d. ch. sumantur 2  |
| Ebor. a. ʒvj.                       | cobl. ad Mens. j. ▽ font.       |
| 2 Infusum refrigerans pro potu Ord. |                                 |
| R. Mal. Citr. Noj.                  | Incis. contus. q. o. Infund. in |
| Sacchar. alb. ʒij.                  | ▽ font. ʒj.                     |

## 3 Emulsio refrigerans.

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| R. Amygd. d. exc. ʒj.     | Fl. a. Emuls.              |
| Sem. 4. frig. maj. a. ʒj. | Edulc. Tab. M. xst. f. ʒj. |
| c. Decoct. hord. ʒx.      | Add. Oc. ꝑppt. ʒj.         |

## 4 Mixtura mucilaginosa.

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| R. Mucilag. Sem. Cydon. & | Syr. violar. ʒss.           |
| psyll. c. malv. extract.  | ms Dos. coch. j. aliquoties |
| a. ʒss.                   | per diem.                   |
| ▽ fenic. ʒvj.             |                             |

## 5 Julepus subacidus.

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| R. Decoct. Hord. ʒj.  | Tinct. rosar. ʒij.           |
| Sir. Rib.             | ms per intervalla usurpetur. |
| Acetos. Citr. a. ʒss. |                              |

## 6 Alius.

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| R. Decoct. rad. & sol. acetos. | Spir. Vitr. q. s. pro grato a- |
| ʒj.                            | core.                          |
| Syr. Rub. id. ʒss.             |                                |

## 7 Pulvis temperans.

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| R. Oc. ꝑppt.   | ʒii diaph. a ʒj.             |
| Nitr. depurat. | ms Dos. ʒj. bis ter per diem |
| Salis polychr. |                              |

## 8 Alius.

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| R. Conch ppt.        | Cinnabar. ʒii. ʒj.      |
| Nitr. depurat.       | ms Dos. ut præcedentis. |
| Arcan. dupl. an. ʒj. |                         |

## VII. Methodus medendi.

## a Sitis Aucta:

- 1 In omnibus febribus tam intermittentibus, quam acutis sitis auctior esse solet, pro eadem extinguenda conveniunt potus diluti in larga quantitate hauriendi, interponendo quandoque potum calefactum pro promovenda corporis Diapnoe; qua re æstus eximie imminuitur.  
2 Quando insignis æstus concurrit præscribenda sunt acidula, potui ad gratam aciditatem commiscenda.  
3 Infringunt etiam eximie præter naturalem calorem, sitimque imminuunt Gelatinosa & mucilaginosa, sæpius per diem cochleatim usurpanda.  
4 Pro eodem scopo præscribi etiam possunt Emulsiones dilutæ, nec non Nitrata absorbentia & diaphoretica fixa, quæ quidem res perite sibi invicem interponi debent.  
5 In inflammationibus abdominis sufficiens potus haud est denegandus, sed fiat hoc successive: alias damnum infertur.  
6 Hydropicos magis solantur Nitrata, quam potus simplex, hic quippe sitim magis adauget.  
7 Phthisicis & Hecticis convenit potus paululum nutriens ex hordeo raf. C. C. Ebor. Passul. &c.  
8 Aliis in casibus Methodus supra allegata in auxilium vocetur.  
b Sitis imminuta.



- 2 Injungatur Patientibus potus, etiam si sufficiens nullus appetitus præsto sit.
- 2 Convenit autem talibus Patientibus potus gratior, generosior, ut sensus Naturæ excitetur.
- 3 Commendetur etiam iis motus corporis, ad lassitudinem usque instituendus, ut circulatio & excretio humorum, sitim post se trahens, promoveantur.

VIII. *Cautele Practicæ.*

- 1 Sitis nunquam est reprimenda, sed etiam satisfaciendum per sufficientem & convenientem potum.
- 2 Quando ægroti a multa ingurgitatione aquæ molestias capiunt, subacida interponantur, vel potui aliquid Nitri infundatur, sic eo citius sitis extinguitur.
- 3 Juscula fortiora e carne parata & bene salita sitim ægrotantium adaugent, imminuunt vero eandem, si sint diluta insulsa.
- 4 Pro siti etiam imminuenda succus semper vivi a vulgo cum fructu in usum trahitur.
- 5 Cibi e Spinachia, Lactuca, hordeo similiter sitim aliquantisper destruant.

## LIBER VII.

## DE

## MORBIS MULIERUM.

*De Morbis Mulierum in genere.*I. *Definitio.*

**M**Orbi Mulierum sunt affectiones præter naturales feminis propriæ, vel activum, vel passivum aut erroneum quid conjunctum habentes, in quibus Natura per varios motus extraordinarios aliquid quod ipsis magnas molestias creat remove conatur, variis gravibus pathematibus stipatæ.

II. *Differentia.*

- 1 Alii sunt *communes*, qui scil. in & extra conjugium viventibus communes sunt: uti sunt *uteri inflatio*, *Inflammatio*, *Hydrops*, *Ulceræ*, *Angustia*, *Mensium varia vitia*, *Fluor albus* &c. de quorum præcipuis in præcedentibus Tabulis iam actum fuit.
- 2 Alii sunt *propriæ* maritatis & hinc alii sunt.
  - a Morbi *imprægnandi*: uti *Sterilitatis*, *Mola*, *Melancholia* & *Furor uterinus*, quamvis hic etiam frequentius virgines & viduas corripit.
  - b *Imprægnatarum*. *Nausea*, *Vomit*, *Pica*, *Abortus*, *Fœtus debilis*, *mortuus*.
  - c *Parturientium*: *Dolores spurii*, *Partus difficilis*, *Secundinarum retentio*, *Procidencia uteri*.
  - d *Puerperarum* & *Lactantium*: *Dolores post partum*, *Tumor abdominis*, *Lactis vitia*, *Tumores Mammarum*.

III. *Signa.*

Hæc ex sequentibus Tabulis patebunt.

V. *Subjectum.*

- 1 Feminæ mensium fluxum expertæ, aut eum proxime expectantes.
- 2 In conjugio viventes.
- 3 Gravidæ.
- 4 Parturientes.
- 5 Puerperæ.
- 6 Lactantes.

VI. *Prognosis.*

- 1 Morbi Mulierum ob statum complicatum fere omnes difficilioris sunt curationis, quam reliqui.
- 2 Multi morborum Mulierum tendunt ad statum chronicum, pauciores ad acutum.
- 3 Non adeo absurdum est illud dictum: *Mulierem omnem morbum bis pati*: restrictione tamen aliqua opus habet.
- 4 Morbi Mulierum chronici facile in habitum degenerant, ita ut postea curationem vix admittant.
- 5 Morbi tales ab initio utpl. circa uterum & ramifi-

cationes Venæ Portæ se manifestant, postea tamen facile alias & remotiores partes in consensum trahunt.

- 6 Quo major in hisce morbis mensium est ataxia, eo difficilior curationem admittunt.
- 7 In ordinem autem redactis mensibus, aliqua curationis spes superest.
- 8 Sanguinis spissitudo cum mensium ataxia conjuncta, Melancholiam facile post se trahit.
- 9 Mensium suppressio & imminutio longe graviores post se trahit morbos, quam eorundem nimium fluxus.
- 10 Morbi Gravidarum, etsi interdum graviores videantur, sæpius tamen crescente fœtu notabiliter imminuuntur & prorsus tolluntur.
- 11 Morbi vero eorum aucti semper pejoris sunt indolis, quam reliqui.
- 12 Omnium vero pessimi sunt acuti Puerperarum, quoniam facillime malignitas jungitur.
- 13 Morbi a Lochiorum suppressione pendentes, semper pejores sunt illis, qui a mensium suppressione originem trahunt.
- 14 Secundinæ aut saltem portio earundem, post partum in utero remanentes, sæpius gravissimos morbos post se trahunt.
- 15 Nihil abortum magis producit, quam concrementa illa carnosa, sive parvæ molæ in utero per errorem Naturæ genitæ.
- 16 Multum tamen etiam confert Plethora, tam per interna, quam per externa commota.
- 17 Dolores post partum, quia sunt Naturæ motus ad expellendum sanguinem lochiale, cautissime tractandi sunt: quo neglecto gravia post se trahunt mala.

VI. *Remedia.*

- 1 *Aperientia* & *Incidentia*: Rad. Ari, Galang. Zedoar. Pimp. alb. Angel. Imperat. Aristol. Vincetox. Onon. Herb. Capill. Fumar. Cent. min. Absinth. Card. bened. Tinct. Tart. & acris Essent. Carminat. alexipharm. Pimp. alb. Succ. Myrrh.
- 2 *Evacuantia*: Magnesia alba, Sal cathart. amar. Manna, Fol. Senn. Rhabarb. Tamarind. Helleb. nigr. Pil. Tart. e G. Ammon. Stahlianæ, Becherianæ aliæque ex Gummatibus rite præparatis, Extractis amaris & Purgantibus parata.
- 3 *Emmenagoga* & *pellentia*: Præter antea recensita Resolventia, Myrrha, Crocus, Castoreum, Hepar Anguillæ, Borrax, Essentia Castor. Succin. Myrrh. &c.
- 4 *Tonica*: Tinct. ♂ Ludov. Mix. Tonica Stahlian, Crocus ♂ & iatus Stahlian, Antimon. ♂ tial. Ludov. Pil. Stahlianæ & Becherianæ successive exhibitæ.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pulvis incidens.

R. Pulv. stomach. Birchm. D. sing. 4. hor. 2. cusp. cult. 3ss.

## 2 Infusum resolvens.

R. Rad. Vincetox. Citr.  
Pimpin. alb. a. mifs. Winteran. a. 3ij.  
Galang. Croci Orient. 3j.  
Ari a. 3ij. Inc. infund. in Vin. alb.  
Herb. Fumar. 15ij.  
Cent. min. a. mifs. Dos. bis vel ter per diem 3vj.  
Cort. Ont.

## 3 Infusum incidens &amp; laxans.

R. Rad. Gentian. Cort. Ont.  
Imperat. Cur. a. 3iss.  
Aristol. a. 3ij. Sem. Anis.  
Zedoar. Fœnic. 3ss.  
Ari a. 3ij. Tart. solub. 3ss.  
Herb. Capill. ♀. Incis. contras. g. m.  
Card. bened. a. mj. Inf. in Vin. alb. &  
Fol. Senn. f. f. 3j. Aq. simpl. a. 15. iv.  
Fibr. Helleb. nig. D. mane 3vj. vel viij. pro do-  
Rhab. elect. a. 3ij. si.



## 4 Mixtura resolvens.

R. Eff. Pimpin. alb. ℥ij. Tinct. ℥ii acris a ℥j.  
Scord. M. D. mane & vesperi 30.  
Succin. gutt.

## 5 Potiuncula pellens.

R. Aq. Meliss. Sir. Cort. Ont. ℥ss.  
Cinnam. a. ℥ij. M. D. sæpius cochleatim.  
Hep. Anguill. ℥ss.

## 6 Pulvis pellens.

R. Cinnam. acut. Borrac. a. ℥ss. M.  
Lap. ̄. a ℥j. D. aliquot cusp. cultri pro do-  
Croc. si.

## 7 Mixtura incidens &amp; pellens.

R. Tinct. Tart. Myrrh. a ℥j. M.  
℥ii acris a ℥ss. D. 25. 30. gutt. pro dosi.  
Eff. Succin.

## 8 Pulvis incidens &amp; tonicus.

R. Pulv. stomach. BircKm. D. 2. cusp. cultri sing. 5. ho-  
℥ss. ris.  
℥le Ludov. ℥ij. M.

## 9 Mixtura tonica.

R. Tinct. ℥ii acris. D. 30. gutt. mane & vesperi.  
Spir. C. C. a. ℥ij.

## 10 Alia.

R. Tinct. At. Lud. ℥ss. meridie.  
D. 40. 50. gutt. mane & a

## VII. Methodus medendi.

- 1 Hæc pro diversitate affectuum admodum variat, quare etiam semper varianda est, & remedia ad causas speciales in quovis morbo occurrentes dirigenda sunt.
- 2 Si Plethora Mulierum Morbos fovet, uti id frequenter contingit, ea mature imminuenda est per Venæsectiones æquinoctiales, aut alias urgente necessitate institutas.
- 3 Spissitudo quoque sanguinis, qua sæpius mulieres laborant, per incidentia & resolventia corrigenda est, sanguinis enim fluxilitate restituta feliciter & citius morbi a spissitudine pendentes curantur.
- 4 Pari modo se res habet, si status humorum adest cacochymicus, ubi præter antea laudata incidentia & resolventia lenia antiscorbutica conveniunt.
- 5 In omnibus morbis mulierum quam maxime respiciendum est ad menses, iique per convenientia remedia in ordinem redigendi sunt, de quibus suo jam loco actum fuit.
- 6 In morbis Gravidarum graviditatis semper habeatur ratio; quare hic præ ceteris placida Methodus semper præferenda est: id quod potissimum locum habet in morbis acutis Puerperarum. Reliqua vide in Tabulis antecedentibus & sequentibus.

## VIII Cautelæ Practicæ.

- 1 In omnibus morbis mulierum caute admodum mercandum est cum remediis evacuantibus fortioribus & commoventibus, hæc enim in mulieribus alias adhuc satis sanis graves affectus producere possunt & solent, ita ut non paucæ hinc per totam vitam valetudinariæ reddantur.
- 2 Venæsectiones in his morbis legitimo tempore institutæ insignem quidem habent usum, at intempestivæ magis nocent, quam prosunt.
- 3 In mensibus in ordinem redigendis semper satius est incidentia & resolventia, quam pellentia in usum trahere: hæc enim illegitimo tempore exhibitæ non solum magnas in Massa sanguinea excitant turbas, sed etiam sæpius menses per insolitas vias expellunt.
- 4 Morbi a Lochiorum suppressione orti mitissime semper tractentur: hoc enim neglecto morbi, impr. acuti, semper deteriores redduntur.
- 5 Qui, præsentē jam Febre acuta, Lochiorum fluxum per Myrrhata & Castorina revocare tentant, pessime agunt, quoniam horum usum vel exanthemata miliaria vel Petechiæ sequuntur.

I. **Definitio.** Sterilitas est inhabilitas abconcipiendum & ad legitimum fœtum ferendum in fœminis iusta ætate gaudentibus occurrens & a variis causis originem trahens.

## II. Differentia.

- 1 Alia est, quando nunquam conceptionis signa apparent.
- 2 Alia vero, quando quidem concipiunt, nunquam tamen fœtum ad maturitatem & perfectionem usque gestare possunt, sed ante legitimum tempus frequentius abortiunt.

## III. Signa.

- 1 Hæc sunt admodum fallacia & iis vix certo fidendum est, varia tamen hinc inde allegantur.
- 2 Nulla unquam conceptionis signa apparentia, etiam si femina quoad omnes circumstantias sana sit & bene habeat ac in marito etiam nihil occurrat, quod coitum fœcundum impedire queat.
- 3 Frequens abortus: huc etiam pertinent concrementa illa carnosæ, quæ feminæ sæpius in utero gestant, ac postea cum magna sanguinis profusione ejiciunt. Reliqua vid. sub *subjecto*.

## IV. Subjectum.

- 1 Feminæ insigniter Plethoricæ: quamvis enim sæpius concipiant, præ ceteris tamen ad frequentiores abortus dispositæ sunt.
- 2 Pari modo se res habet cum nimium obesæ, quæ & rarius concipiunt & frequenter abortiunt.
- 3 Tabidæ, leucophlegmaticæ & œdematosa ac scorbutico - arthritica corporis constitutione laborantes.
- 4 Quibus menses nimis diu emanent aut prorsus non apparent: quamvis interdum, sed rarissime, dentur, quæ non obstante tali constitutione nihilominus concipiant & pariant, uti femina in vicinia nostra, quæ nunquam menses experta est, & tamen ter peperit; in puerperio lochia etiam nunquam nisi in ipso partu, sed in exigua admodum quantitate fluxerunt.
- 5 Coitum abhorrentes sive appetitu veneris læso laborantes.
- 6 Nimia partium genitalium angustia vel laxitate præditæ, ita ut in priori casu semen admitti, in posteriori vero admitti nequeat.
- 7 Scirrhus aut alio vitio uteri quoad conformationem afflicti.
- 8 Tubarum obstructione correpti.
- 9 Hæmorrhagiis uteri enormibus vel uno impetu vel successive prorumpentibus laborantes.
- 10 Fluorem album chronicum sive diurnum & pertinacem patientes.
- 11 Quæ emmenagoga fortiora frequentius assumpserunt.
- 12 Concrementa carnosæ in utero gerentes, hæc enim sæpius abortum producant.
- 13 Imaginationi fortiori nimium indulgentes.

## V. Prognosis.

- 1 Feminæ steriles interdum per totam vitam valetudinariæ sunt.
- 2 Nisi aliæ causæ internæ obstant, sæpius non adeo facile pereunt, sed ad longævitatē perveniunt.
- 3 Quoniam causæ sterilitatis utpl. latent, hinc curatu est admodum difficilis.
- 4 Si ab aliis morbis fovetur, interdum hisce remotis tollitur.



- 5 Sterilitas sæpius ad morbos Chronicos disponit, qui tamen subsequente fecundatione facilius curantur.
  - 6 Sterilitas ab uteri mala conformatione originem trahens incurabilis est.
  - 7 Si sterilitas dependet a mala feminis virilis constitutione, sæpius in subsequente matrimonio tollitur. Erat hic loci femina quæ 20. annos in sterili vivebat conjugio; mortuo vero marito & alij nupta primo statim anno pariebat.
  - 8 Quo magis emmenagoga fortiora ad promovendum Abortum assumerunt juvenulæ, eo magis postea in coniugio viventes ad abortum & sterilitatem inclinant.
- VI. Remedia.
- 1 Plethoram imminuentia, Venæsectio, Scarificatio, Hirudinum applicatio.
  - 2 Spissitudinem & Cacochymiam corrigentia: uti sunt omnia resolventia, incidentia & acriuscula remedia.
  - 3 Laxantia: Fol. Senn. Rhabarb. Helleb. niger, Pilulæ Stahlianæ.
  - 4 Emmenagoga: Vid. Tab. præced.
  - 5 Emollientia: Herb. 5. emoll. & ex iis parata Balnea.
  - 6 Laxitatem partium restituentia: uti sunt blanda adstringentia & tonica. Reliqua vide sub Tabulis Specialibus.
  - 7 Specifica: Testiculi varii inpr. leporis, Rad. Eryng. Satyr. Ambra &c. quæ hinc inde ab Authoribus commendantur.

Formula Remediorum.

1 Infusum resolvens & laxans.

R. Rad. Pim. alb.	Fibr. Hell. nigr. ʒss.
Vincetox.	Rhabarb. el.
Angel. a. ʒij.	Cort. Ont.
Ari ʒij.	Tart. solub. a ʒij.
Summit. Cent. min.	Incis. infund. in Vin. alb. ʒiv.
Marrub. alb. a mj.	D. mane ʒvj. vel viij.
Fol. Senn. s. s. ʒj.	

2 Electuarium confortans ex Musitano.

R. Conf. Fl. Salv.	Antophyll.
Anth. a ʒj.	Sem. Sesel. a. ʒij.
Rad. Eryng. cond.	Sir. de Cinnam. q. s.
Nuc. Ind. cond.	M. F. Elect. D. ter per diem.
Succolad. a. ʒij.	aliquot cusp. cultri.

3 Aliud.

R. Elect. Diasatyr. ʒiss.	Ess. Ambr. ʒiss.
Rad. Eryng. cond.	Sir. Cinnam.
Nuc. Mosch. cond.	Cort. Ont. a q. s.
Zingib. condit. a. ʒij.	M. F. Elect.
Conf. Alk. compl.	D. ut antea.
de Hyac. compl. a. ʒij.	

4 Morsuli stimulantés.

R. Cinnam.	Lingu. avis.
Zingib.	Sem. Cep.
Piper.	Scinc. a. ʒj.
Sem. Nasturt.	Sacch. in Aq. Ros. sol. q. s.
Sinap. a. ʒss.	M. F. l. a. Morsuli.

VII. Methodus Medendi.

- 1 Si quid hic tentare animus est, semper respiciendum est ad causas a quibus malum fovetur.
- 2 Si Plethora causa est frequentis Abortus & inde dependentis sterilitatis, ea mature per sanguinis missiones convenienti tempore institutas imminuatur. Subjungantur etiam lenia laxantia inpr. vero Pilulæ Becherianæ & Stahlianæ aliaque remedia æqualem sanguinis distributionem producentia. Motus etiam moderatus & diætâ tenuis hoc in casu optime conveniunt.
- 3 In nimium obesis pariter evacuantia varia ac motus corporis continuatus conducunt.
- 4 Si tabidum quid subest, aut Levcephlegmatia, Oedemata, Scorbutus &c. feminas affligunt, morbi hi juxta Methodum suo loco præscriptam tractentur, ac postea tonica ad roborandum uterum exhibeantur.

- 5 Si Menses in culpa sunt, ii quantum quidem possibile est convenienti Methodo revocentur: ubi autem nunquam fluxerunt, cura difficultatis plena est, Pilulæ tamen Stahlianæ cum aliis incidentibus & Venæsectione in usum trahi possunt.
- 6 Quando nimia partium adest strictura, videndum est an per blanda emollientia & manum Chirurgi aliquid effici possit.
- 7 In nimia vero earum laxitate & humiditate humores ad alia loca derivandi & evacuandi ac postea tonica & nervina interna & externa usurpanda sunt; profunt hic potissimum Balnea ex Herb. aromaticis & leniter adstringentibus parata.
- 8 In Scirrho & exulceratione uteri res utpl. desperata est, si quid tamen agendum videtur, in usum trahantur remedia sub Scirrhis & Exulcerationibus laudata.
- 9 Si tubarum adest obstructio & quidem a mucoviscido præter Pilulas Becherianas laudari merentur Tincturæ alcalinæ acres, utpote quæ in talibus obstructionibus optimum ordinarie edunt effectum.
- 10 Quando ab Hæmorrhagiis fovetur, in usum trahantur remedia sub Hæmorrhagiis commendata, postea vero subjungantur tonica cum nutrientibus.
- 11 In Sterilitate vero a Fluore albo remedia incidentia resolventia, Tincturæ alcalinæ, Laxantia, Pilulæ Stahlianæ &c. diu usurpentur, ac postea tonica in usum trahantur.
- 12 Si per Emmenagoga fortiora uterus nimium debilitatus fuit, tonica cum Tincturis alcalinis mixta optima sunt.
- 13 Tandem in concrementis carnosæ Pilulæ Stahlianæ repetitis vicibus assumptæ ceteris palmam præripiunt.

VIII. Cautelæ Prædictæ.

- 1 Antequam Medicus remedia contra Sterilitatem adhibeat, probe inquiret an maritus, an vero femina in causa sit: si enim causa latet in viro, frustra femina fatigatur remediis.
- 2 Interdum in feminis appetitus Veneris est læsus, ita ut prorsus nullam delectationem in congressu cum marito percipiant. Hic præ ceteris convenit diætâ nutrienda, gelatinosa, mucilaginosâ, cibi aromatizati, vinum generosum &c. abstinendum tamen est a fortioribus stimulantibus & Aphrodisiacis, quoniam lenia sufficiant.
- 3 Si semen mariti male dispositum & ad conceptionem ineptum est, illud per nutrientia & depurantia corrigendum est: Sin vero Impotentia plenaria laborat, ea in usum trahantur, quæ supra sub Impotentia virili laudata fuerunt, abstinendo ubique a fortioribus & acrioribus stimulantibus.
- 4 Ceterum in omnibus morbis Sterilitati junctis observentur Cautelæ suis locis traditæ.
- 5 Specifica, quæ hinc inde ab Authoribus Prædictis laudantur, uti sunt testiculi variorum animalium, raro laudabilem edunt effectum.

CAPUT SECUNDUM.

D. E.

Mola.

I. *Definitio.* **M**ola est massa informis in utero mulierum genita, a falla & depravata conceptione originem trahens.

II. *Differentia.*

- 1 Aliæ sunt majores, aliæ vero minores.
- 2 Aliæ sunt cum fetu & nutrimentum eidem subtrahunt, unde sanguisugæ vocantur: aliæ sunt solæ sine eodem. Imo interdum fœtus ipsi Molæ inclusus deprehensus fuit, teste Kerkringio. *spicileg. Anatom. Obs. 95.*
- 3 Aliæ aliqualem figuram habent e.g. cordis, muris, capitis ovilli &c. aliæ sunt prorsus informes.

Kk

4 Aliæ.



- 4 Aliæ aquam in se continent, aliæ eadem carent. Vidimus ante aliquot annos talem molam, quam femina, gravidam se esse putans, quinto circiter mense post ingentem uti Hæmorrhagiam excreverat: hæc plus quam dimidium pedem longa & insigniter carnosa erat: cum cultro aperiretur sero limbo repleta deprehendebatur: & interna conformatio erat instar ventriculi cordis sinistri.
- 5 Aliæ magis membranaceæ & aqua repletæ sunt: vidimus talem in femina 30. annorum, quæ sexto mense abortum patiebatur: foetu enixonihilominus dolores cum Hæmorrhagia uterina adhuc insigniter urgebant, ita ut femina Lipothymiis frequentibus corriperetur. Tandem Mola magnitudine ovum anserinum superans aqua repleta sequebatur, & femina spatio paucorum dierum pristinam recuperabat sanitatem.
- 6 Aliæ sunt flatibus repletæ, quales *Bohnus* bis observavit.
- 7 Ut pl. nulla molis inest vita, nonnunquam tamen in quibusdam manifestus motus observatus fuit.
- III. *Signa.*
- 1 Hæc sunt admodum fallacia, ita ut difficile sit Molæ gestationem a vera graviditate distinguere, inpr. si mola foetui juncta est.
- 2 Adest enim, uti in reliquis gravidis, mensium suppressio.
- 3 Cui jungitur coloris faciei vividi & floridi in pallidum mutatio.
- 4 Appetitus est maxime prostratus & carnem inpr. abhorrent feminae.
- 5 Urget etiam nausea & vomitus matutinus uti in vera graviditate.
- 6 Intumescit quoque abdomen ac postea mammae unde etiam ante quartum mensem vix probabiliter, feminam esse gravidam, concludi potest.
- 7 Si vero post quartum mensem mutatio faciei cum labiorum pallore & palpebrarum tumore perseverant.
- 8 Cachectici aut Hydropici quid accedit.
- 9 Venter insigniter intumescit ac durus redditur, cum insigni gravitate & extensione abdominis.
- 10 Nullus nisi tremulus in utero motus postea vero iterum cessans observatur.
- 11 Feminae pondus quoddam modo in sinistro, modo in dextro latere, pro diversitate situs corporis sentiunt, ita ut pondus illud ex latere uno in alterum volvatur.
- 12 Dolor uteri punctorius jungitur.
- 13 Flacciditas & marcor artus occupat.
- 14 Languor insignis continuo affligit.
- 15 Menses interdum sed inordinate & decolores fluunt.
- 16 Probabiliter concludere possumus adesse Molam, inpr. si elapso legitimo tempore nullus sequitur partus verus.

IV. *Subiectum.*

- 1 Feminae humidiores constitutionis, Plethoricae.
- 2 Quæ Fluore albo laborarunt.
- 3 Abortum frequentius passæ.
- 4 Quæ fortiori imaginatione præditæ sunt.
- 5 Mensium ataxia antea afflictæ.
- 6 Lochiorum malum successum incurrentes.
- 7 Quibus uterus post partum non bene purgatus fuit.
- 8 Quibus aliquid secundinarum remansit.

V. *Prognosis.*

- 1 Affectus hic in principio facile curari aut difficulter dignosci potest.
- 2 Aquosa Mola & ventosa facilius expellitur, quam carnosa, quæ non nisi magna cum difficultate tollitur.
- 3 Maxime tamen ambigam curam reddit distinctio Molarum, an scil. sint flatulentæ, an aquosæ an carnosæ &c.
- 4 Nonnunquam etiam sponte exitum molitur, cui tamen insignis jungitur profusio, nunquam cessans aut saltem sæpius recurrens donec Mola excreta sit. Observavi hocce in pluribus feminis, quæ tantam san-

guinis jacturam patiebantur, ut morti proximæ essent, quæ tamen Hæmorrhagiæ excreta Mola cessabant.

- 5 Quando vero exclusa Mola Hæmorrhagia adhuc urget, indicium est aliam adhuc superesse Molam.
- 6 Quo magis urgent Hæmorrhagiæ eo peior est status & contra.
- 7 Quo major est Mola, eo majori periculo feminas exponit propter Hæmorrhagiam graviolem.
- 8 Quæ semel Molam in utero gestarunt, eadem facile denuo corripiuntur.
- 9 Non raro etiam Molæ grandiori Ascites incurabilis jungitur.
- 10 Aliæ hæctica simul patiuntur pathemata.
- 11 Grandiores Molæ nonnunquam testibus Observationum scriptoribus ex improvviso feminas jugulant.
- 12 Nonnunquam etiam Dysenteriam Molæ excretionem lethalem præcessisse observatum fuit.

VI. *Remedia.*

- 1 Preparantia: uti sunt Balnea emollientia Inseffus, Unguinea, Fetus, Clysteres tam alvini, quam uterini, Pediluvia.
- 2 Plethoræ imminuentia: Venesectiones tam in brachio, quam in pedibus institutæ, & Scarificationes in assuetis.
- 3 Pellentia: ad quæ ab Authoribus referuntur Vomitoria, Purgantia fortiora, uti sunt Pilulæ fœtidæ, de Hiera cum Colocynth. Species Diaturbith. cum Rhabab. Decoct. Senn. c. Sabin Extr. Helleb. nig. Colocynth. Herb. Artemis. Puleg. Sabin. Rad. Bryon Afari &c Myrrha, Crocus, Castoreum & eorum Essentiæ, Hepar Anguillæ cum Aq. Cinnam. Pulvis Secundinæ.
- 4 Hæmorrhagiæ prospicientia: temperantia cum blandis vel fortioribus adstringentibus mixta.
- 5 Uteri tonum restituentia: Tinctura Martis Ludovici.

*Formula Remediorum.*

## 1 Balneum emolliens.

Rx. Herb. 5. emoll. a. mij. Coq. in f. q. Aq. f.  
Matricar. F. Balneum.  
Meliss. a. mij.

## 2 Aliud.

Rx. Rad. Alth. Mercurial. a. mij.  
Lil. alb. a 3ij. Sem. Fæn. gr.  
Herb. Chamom. Lini a. 3j.  
Parietar. Coq. ut antea.  
Branc. Ursin.

## 3 Unguentum emolliens.

Rx. Ungu. de Alth. 3ij. Chamom. a. 3ss.  
Anod. 3j. M. F. Unguent. quo illinatur  
Ol. Lil. alb. abdomen.

## 4 Clyster emolliens.

Rx. Decoct. pro Clyst. 3x. Ungt. Clysmat. a. 3ss.  
adde Ol. Chamom. Sal. Gemm. 3j.  
Lil. alb. Vit. Ov. No. j. M. F. Clyster.

## 5 Clyster uterinus ex Ettmull.

Rx. Herb. Artemis. Ol. Laurin.  
Sabin. a. mj. Irid.  
Sal. Tari. 3ss. Lil. alb. a. 3vj.  
Coq. in f. q. Aq. f. Vitell. Ov. No. j.  
Colat. 3v. l. vj. adde Sir. de Artemis. 3j.  
Essent. Myrrh. M. F. Clyster, applicetur in-  
As. fœtid. strumento conveniente.  
Castor. a. 3ss.

## 6 Suffitus.

Rx. Herb. Sabin. 3ss. Colocynth. 3ij. M.  
Cinnam. F. Pulvis carbonibus insper-  
Galang. gendus, cujus fumus in-  
Macis, fundibulo sive tritorio ex-  
Galbani a. 3ij. cipiat.  
Myrrhæ 3j.

Rx. Ungu. Nervin. 3j.  
Ol. Cheir. 3ss.  
dest. succ. 3ss. M.

7 Illinatur regio pectinis cà-  
lide.



## 8 Pulvis pellens.

- R. *Borrac. Venet.* ℥ss. *Div. in 3. p. aq.*  
*Myrrh. elect.* ℥i. *D. sing. 4. vel 6. horis.*  
*Sal. volat. succ.* ℥ss. M.

## 9 Potiucula pellens.

- R. *Aq. Artemis.* *Hepat. Anguill.* ℥ij.  
*Puleg. ā* ℥iss. *Sir. Artemis.* ℥ss. M.  
*Cinnam.* ℥vj. *D. sapius cochleatim.*  
*Liq. C. C. succin.* ℥iss.

## 10 Alia.

- R. *Aq. Puleg.* *Croci a.* ℥ss.  
*Meliss. c. Vin.* *Sir. Cinnam.* ℥ij. M.  
*Cinnam. ā.* ℥j. *D. ut antea.*  
*Ess. Myrrh.*

## 11 Pilulæ.

- R. *M. P. sœtid.* ℥j. *D. pro 1. Dosi.*  
*c. Ess. Castor. F. Pil.*

## 12 Pulvis ad Hæmorrhagiam.

- R. *Nitr. depur.* *Croc. ♂ t. gr. XII. M.*  
*Conch. ppt.* *Div. in 3. p. aq. D. sing. 2.*  
*Corall. r. ppt. a.* ℥j. *horis.*

## VII. Methodus medendi.

- 1 Curatio Molæ mature instituenda est, ne major facta omnem curationem respuat, aut graviora mala post se trahat.
- 2 Si Mola fœtui juncta est, semper convenientia remedia ad præcavendum Abortum dentur, quoniam hunc gravissima & periculosa semper sequitur Hæmorrhagia.
- 3 In Molæ autem curatione ordine procedendum est, & remedia convenientia convenientibus substituenda sunt.
- 4 Præmittenda E. est præparatio corporis, ut postea reliqua remedia sine graviore metuendo periculo exhiberi queant.
- 5 Præparationis hujus initium fieri potest per Venæsectionem in brachio vel pede instituendam, si reliquæ circumstantiæ ejus usum permittunt.
- 6 Ad hanc præparationem pertinent etiam Infessus & Balnea, ut & omnia reliqua superius laudata emollientia, Potus, Unguenta &c. quæ vias lubricando & relaxando Molæ faciliorem exitum concedunt.
- 7 Hisce præmissis ab Authoribus commendantur Vomitoria & Purgantia cum stimulantibus & pellentibus mixta, ut per tales fortiores commotiones Mola per uterum exturbetur.
- 8 Si vero nullus salutaris effectus horum usum sequitur, reliqua pellentia & quæ alias ad fœtum mortuum expellendum & partum stimulandum ab Authoribus laudantur, in usum trahunt, & talium usum tamdiu suadent, donec Molæ sequatur excretio.
- 9 Cum vero Molæ excretionem gravis semper sequatur Hæmorrhagia uterina, temperantia cum adstringentibus mature exhibeantur: si vero Pulvis Hallensium niger haberi potest, hujus aliquot doses exhibeantur, quoniam nullum potentius ad sistendas Hæmorrhagias uterinas datur remedium, uti Praxis medicæ docuit.
- 10 Sublata Hæmorrhagia respiciendum est ad restitutionem toni uterini, quo in casu potissimum laudem merentur Tinctura Martis Ludovici & Mixtura tonica Stahlî ut & Pilulæ tonicæ D. Richterî.
- 11 Præservationis gratia dentur etiam repetitis vicibus Pilulæ Becherianæ, aut Stahlianæ, utpote quæ uterum non solum purgant, sed etiam eundem roborant ac fluxum sanguinis in naturalem ordinem redigunt.

## VIII Cautelæ Practicæ.

- 1 Cura hujus mali admodum difficilis est & optimis etiam Practicis crucem figit: nisi enim Natura ipsa Molæ curationem suscipiat & eandem expellat, frustra ut plurimum laborant Medici.
- 2 Imo ipsa remedia, quæ hinc inde ab Authoribus commendantur, utpl. sunt subleste fidei & gravioribus malis exponunt mulieres.
- 3 Præsertim si mulier & fœtum & Molam in utero gerit: talia enim remedia non raro fœtum enecant cum insigni matris periculo.
- 4 Venæsectio in subjectis Plethoricis, Mola adhuc

minore existente, instituatur, in majore enim parum emolumenti expectandum est & in tali casu largior sanguinis missio in pede magis prodest, quam in brachiis.

5 In Mola per se Balnea reliquaque emollientia suo quidem non carent ulu, si vero fœtus junctus est, hujus excretionem simul promovent, inpr. si stimulantia emollientibus addita sunt.

6 In Vomitoriorum & Purgantium usum caute semper procedendum est: si enim graviditas juncta est, Abortum facile producant, in dysemetis vero graves in infimo ventre excitant turbas. Inpr. in subjectis Plethoricis.

7 Eodem modo res comparata est cum Volatilibus & pellentibus, nisi enim hæc provida manu dentur, facile graves excitant Hæmorrhagias: quare hisce usum Pilularum Stahlîanarum aut Becherianarum præmittere, iisque vel addere vel interponere pellentia consultius est.

8 Pellentia nunquam diu usurpentur, sed tantum reliquis resolventibus interponantur: dentur autem præcipue eo tempore, quo alias Menses fluere solebant.

## CAPUT TERTIUM.

## DE

*Melancholia ac Mania uterina Virginum & Viduarum.*

## I. Definitio.

## 1 Melancholia:

**E**st delirium triste sine Febre Virgines & Viduas Mensium ataxia ac obstructione viscerum, sanguinis spissitudine laborantes & perversæ imaginationi de rebus venereis indulgentes potissimum affligens.

## 2 Mania:

Est delirium cum furore sine Febre eadem subjecta ob easdem causas corripiens.

## II. Differentia.

1 Quomodo hi duo affectus inter se differant, definitiones docent.

1 Ab aliis vero deliriis differunt, quoniam illa alia objecta, hæc vero res venereas habent.

## III. Signa.

## 1 Melancholia:

a Ingens desiderium rerum venerearum, quod tamen prudenter occultant.

b Interim continuo tristes sunt & taciturnæ.

c Consortia hominum fugiunt & solitudinem amant.

d Mœstitiam tamen mutant, si mares eosdem appropinquant.

e Unde iis præsentibus gestibus, oculis ac suspiriis desiderium aliquo modo explicant.

f Mentem tamen ob verecundiam verbis nunquam explicant.

g Si hoc modo sine suo non potiuntur, in majorem mœstitiam conjiciuntur.

h Donec malo auctiori iis, quos amant, mentem suam aperiant.

i Expleta libidine multum mœstitiæ perit & magis fiunt hilares.

k Si autem verecundia easdem a coitu retinet, vel in majorem Melancholiam incidunt, vel in ipsam Maniam.

l Vires interim sunt maxime languentes & appetitus est prostratus.

## 2 Mania:

a Hæc nonnunquam originem trahit a Melancholia & omnia modo tradita signa præcedunt.

b Adest appetitus Veneris maxime auctus, continuo urgens.

c Cui jungitur ab initio levis Maniæ species.

d Feminae hoc in affectu sunt admodum loquaces ac



garrulæ & discursibus suis semper quædam de rebus Venereis intermiscunt.

e Hominum & inpr. virorum consortia anxie quærunt & lascivis verbis & gestibus mentem suam iis explicant.

f Auctiori Malo domi retineri nequeunt, sed publice viros alloquuntur & ad venerem sollicitant. Habuimus hic luculentissimum exemplum in Nosodochio nostro. Laborabat filia quædam furore uterino ac tandem perfecte maniaca evadebat: catenis alligatæ a Medico ordinario varia præscribebantur remedia, sed sine successu. Tandem cum ad expurgandas caveas omnes ægroti uni hypocausto includerentur, hæc clam se cum catenis subducebat ac noctu per plateas currens militem offendens, eum, ut libidinem expleret, rogabat: & cum hic annueret ac per integrum octiduum idem officium singulis noctibus præstaret, ea tandem summo mane Medicum adiens, ei quid secum actum esset referebat & se ab omni malo perfecte restitutam asserbat, id quod etiam ipsa experientia confirmabat.

g Genitalia viris ad excitandam libidinem monstrant & renuentes verberibus excipiunt.

h Tandem, si libido non expletur, in perfectam incident Maniam, ac sæpius sibi ipsis vim inferunt.

#### IV. Subj. etum.

- 1 Feminæ, virgines & viduæ lascivæ & ad Venerem alias pronæ.
- 2 Diu a concubitu, cui assuetæ erant, ob mariti malam valetudinem aut absentiam abstinere coactæ.
- 3 Inprimis quæ Veneris delicias jam gustarunt, aut quibus a maritis non satisfacit.
- 4 Quibus Philtra exhibita fuerunt.
- 5 Nimia feminis inturgescentia laborantes.
- 6 Stimulantibus rebus abusæ.

#### V. Prognosis.

- 1 Melancholia uterina facilius curatur, quam Furor uterinus.
- 2 Uterque affectus, si malum adhuc est recens, facilius curationem admittit, quam si diu jam duravit.
- 3 Quo magis corpus emaciatur, eo minor restitutionis spes & contra.
- 4 Si uterque affectus in Maniam, ad quam admodum pronus est, degenerat, curationis vel nulla, vel non nisi post longum tempus aliqua spes est.
- 5 Conjugium mature institutum malum hocce sæpius prompte tollit.
- 6 Si vero maritus non est validus, ita ut feminæ sufficienter satisfacere nequeat, malum non raro augetur.
- 7 Quo impensius tales feminæ amant maritos, eo facilius etiam turpe hocce malum tollitur, id quod inpr. locum habent: eo in casu, si malum a nimio amore ortum traxit.

#### VI. Remedia.

- 1 Temperantia: Nitr. depur. regener. ꝯilat. Sal. digestiva. acida, Emulsiones refrigerantes ex Sem. Cannab. 4. frigid. major. cum Aqua Nymph. Plantag. Lactuc. Plantag. Solan. Semperviv. &c. paratæ.
- 2 Evacuantes: Helleborata, Extractum helleboris nigri, Noduli laxativi.
- 3 Sanguinem nimium educantia; Scarificatio, Venæsectio repetita.
- 4 Spissitudinem ejusdem incidentia, resolventia & vias obstructas referantia, quæ mensium defectui debentur.
- 5 Exercitium corporis, laborque paulo fortior, Diæta vero parior.
- 6 Libidines concessa explendi venia per matrimonium, legitimo modo contrahendum.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pilulæ laxantes.

R. Extract. panchymag. Croll. Hellebor. nigr. ꝯss.  
gr. XII. Resin. Jalapp. gr. ij.

c. Tinct. ꝯij. tartar. f. Pil.

N. XVIII. d. pro 1. vice.

##### 2 Potio laxans.

R. Syr. epom. laxat. ꝯss.

Salis polychr. gr. iv.

Diacodon. lucid. Jalappin.

ꝯ Anagall. ꝯj.

ꝯij.

ms. d. pro 1. vice.

##### 3 Nodulus laxativus.

R. Rad. Valerian.

Fibr. helleb. nigr.

Vincetox.

Agar. albiss. ꝯ ꝯss.

Polypod. qu. ꝯ. ꝯss.

Tartar. solub. ꝯij.

Herb. adianth. alb.

Incis. contus.

aur.

Infund. in ꝯ. font. ꝯ

Anagall. ꝯ. Mss.

Vini albi ꝯ ꝯss.

Cort. Citr. ꝯij.

Dof. ꝯvj. viij.

Fol. Senn. f. ꝯj.

##### 4 Pulvis temperans.

R. Nitri. depurat.

ms f. Pulv. Dof. ꝯj. ter vel

Arcan. dupl. ꝯ. ꝯij.

quater per diem.

Cinnabar. ꝯij. ꝯj.

##### 5 Julepus acidulus.

R. Decoct. Scorzon. ꝯvij.

Syr. acetos. Citr. ꝯ ꝯss.

Rob. rib.

Spir. Vitriol. par. prægrato

Berb.

acore.

##### 6 Emulsio refrigerans.

R. Sem. 4. frig. maj. a. ꝯss.

Portulac. a. ꝯj.

Cannab. ꝯj.

f. l. a. Emuls. edulc. Sacchar.

c. ꝯ Nymph.

albis. ꝯj.

Lactuc.

D. pro 2. vicibus.

#### VII. Methodus medendi.

##### 1 Melancholia.

- a Laxantia helleborata aliquoties in usum trahantur, subjuncta Venæsectione & Scarificatione in locis inferioribus, pro rei necessitate repetenda.
- b Interponantur & subjungantur temperantia, Sanguinis & Seminis Orgasmi imminuentia.
- c In mensium defectu vel eorundem ataxia talia simul adhibeantur remedia, talisque methodus in usum trahatur, quæ origini mali debetur, suo loco jam descripta.
- d In speculationibus venereis commendetur Patientibus, ut corpus labore exerceant & Diæta frugaliori utantur.
- e Optimum vero remedium hoc in casu est, ut secundum Apostoli Pauli monitum ejusmodi lascivis virginibus & viduis concedatur & tuadeatur matrimonium.

##### 2 Mania:

- a Laxantia frequentius & in majori dosi sunt propinanda.
- b Venæsectiones etiam largiores vel frequentiores instituere in hoc casu decet.
- c Reliqua commendata remedia, & hic usum habent.

#### VIII. Cautela Practica.

- 1 Otium, potus generosus & aromatum abusus hoc malum maximopere adaugent.
- 1 Quando obstructio mensium vel ataxia eorundem adest, tunc semper simul ad hoc malum respicere decet, interpositis quæ sanguinem & semen simul contemperant, sic eo facilius sine nostro potimur.
- 3 A comminationibus, verberibus, vinculis tamdiu abstinendum, quantum possibile est: sæpiissime enim & quidem plerumque malum per talia altiores agit radices, & patiens in reconvalescentiæ statum rediens anxietate & verecundia perpetua afficitur.
- 4 Specifica remedia causis occasionalibus haud sublati parum auxilii præstant.



## S E C T I O I I.

## D E

## AFFECTIBUS IMPRÆGNATARUM.

## CAPUT PRIMUM.

## De Pica &amp; Malacia.

I. *Definitio.*

- 1 **P**ica est rerum inusitatarum nutritioni minus inservientium, & concoctu quandoque impossibilium maxima appetentia a cruditatibus vel humoribus in primis viis stagnantibus & perversa phantasia originem habens.
- 2 Malacia est certorum tantum & usualium magis ciborum intensum desiderium.

II. *Differentia.*

- 1 Uterque affectus differt ab Addephagia, in qua cibi in nimia quantitate, prioribus nondum concoctis, appetuntur & devorantur.
- 2 A Bulimo, ubi patientes insigni fame torquentur, cum qua sæpius Lipothymia sunt conjunctæ.
- 3 Ab Orexi canina, in qua cibos anxie appetunt, devoratos vero vel per alvum vel per Vomitum rejiciunt.
- 4 Pica ratione gradus est vel remissior, ubi cretam, oryiam recentem, amyllum, carnes & pisces crudos, piperis grana in copia, carbones &c. appetunt: vel intensior, ubi appetitus in calcem vivam fertur, gossypium, pellem ovillam cum lana, amurcam, *Wagenschmier*, fila oculata, vulgo *Spitzen*, &c. Quibus adde raram illam picæ speciem, qua mulier quædam in Anglia laborasse dicitur, ventum ore aperto e foliis inversis, propria manu motis excipiens vid. Act. Philosoph. Anglic. A. 1667. Mens. Novembr.

III. *Signa.*

- 1 Concurrit sæpius assidua oris expulsiō.
- 2 Alias Ventriculi morsus divexat.
- 3 Quandoque totius corporis extenuatio affectum comitatur.
- 4 Plerumque Nausea & Vomitus intercurrit.

IV. *Subjectum.*

- 1 Sanguineæ & Sanguineo-Cholericæ, Plethoricæ.
- 2 Fœminæ sensibiliores & phantasia fortiori præditæ.
- 3 Quibus alias fluxus mensium inordinate processit.
- 4 Quæ ab inedia ad lautam dietam pervenere.
- 5 Vermibus obnoxie.
- 6 Epilepsia vel febribus quartanis laborantes.
- 7 Hæreditariam dispositionem a parentibus possidentes.

V. *Prognosis.*

- 1 Gravidæ ut plurimum a Malacia & Pica liberari solent versus quartum gestationis mensem.
- 2 Si vero malum ulterius progreditur, periculosum esse observatum fuit.
- 3 Melius est hoc affectu laborantes acida quam alias res incongruas appetere.
- 4 Nihil mali inde præfagiendum venit, nisi fœminæ perverso appetitui nimis diu indulerint, tunc enim facile digestio lædi, sanitasque labefactari potest.
- 5 Hoc in casu sæpius cachecticus corporis status insequitur.
- 6 Denegatio rerum appetitarum non rare nævos in infantibus producit.

VI. *Remedia.*

- 1 Leniter Evacuantia. Rhabarbarum, folia Senn. f. ft. Pulp. Tamarind. Sal. Cathart. amar. Pilul. Becher. vel Stahlianæ.
- 2 Absorbentia & præcipitantia: conch. præp. creta, mat. perl. præp. Unic. foss. C.C. phil. ppt. Oc. ꝑ. præp.
- 3 Stomachica & Confortantia: Nux moschat. in Ind. condit. vinum Malvatic. aq. menth. Cinamom. cy-

doniat. Bals. Embryon. Spec. & Conf. de Hyacinth Tinctur. Corallior. Tinctur. Cinamom. cum Spirit. Vini rectificato sola infusione parata, Essent. Cort. Aurant. Spirit. C.C.

- 4 Martialia cum absorbentibus mixta, ut pulv. Cachectic. Ludov. cum Pulv. Stomachic. Birckm. maritat. Electuar. Chalybeat. a Roderic. a Castro commendatum, Tinct. Vitriol. Mart. Tartarifat. Ludov. &c.
- 5 Specifica, ut aq. Virg. Pastor. Anthum vino maceratum, fabæ saccharo conditæ, polypodium exsiccatum, uvæ crispæ, Ol. Tart. per deliq. Nux Moschata cum paucis melle, panis maceratus in succo pomorum granatorum, vel succo cydoniorum. Succus mali punici cum pulv. menth. ficc.

*Formula Remediorum.*

## 1 Pulvis Laxans.

Rx. Rhabarb. el. ℥ss. M. p. 1. dof.  
Crem. Tart. ℥ss.

## 2 Pulvis Absorbens.

Rx. Matr. perl. præp. Tart. Vitriol. a. ℥ij.  
Conch. præp. M. Dof. ℥j. bis, ter per diem.  
C. C. Phil. præp.

## 3 Alius.

Rx. Pulv. Cachect. Ludov. ℥ij. ℥ss.  
Stomach. Birckm. M. detur ut præcedens.

## 4 Mixtura Tunico-Stomach.

Rx. Aq. menth. Spirit. Sal. \*c. gutt. xij.  
rosmar. a. ℥iss. Syr. de menth. ℥ij.  
Essent. cort. aurant. ℥j. M. propinetur cochleatim.

## 5 Tinct. Tonico-Stomachica.

Rx. Tinct. Vitriol. mart. Ludov. ℥ij. Essent. cort. Aurant. ℥j.  
M. Dof. gutt. XXV. bis de die.

## 6 Elect. confortans.

Rx. Conserv. rosar. Vitr. ℥j. Sal. absynth. gr. XV.  
Rad. calam. arom. cond. Syr. Card. bened. q. f.  
℥ss. M. bis vel ter per diem ca-  
Nuc. Ind. condit. stance magnitudine su-  
Cort. Aurant. cond. a. ℥ij. mendum.  
Spec. diarrh. Abb. ℥j.

## 7 Sacculus Stomachicus.

Rx. Hab. absinth. galang. a. ℥ij.  
menth. a. Mfs. Sem. anis.  
Fl. Chamomill. R. fœnic. a. ℥j.  
rosar. a. gr. ij. Incis. contus. includ. saccul.  
Rad. acor. Imponatur calide.  
zedoar.

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Optandum esset, ut talia medicamenta possideremus, quæ deliras impressiones immediate repellere valerent, sed dolendum quod talibus destituamur.
- 2 Unde causis tantum occasionalibus obviam eundum est.
- 3 Ventriculus itaque ab humoribus & cruditatibus liberetur per lenia laxantia, pro renata aliquoties repetenda.
- 4 Deinde Sanguinis abundantia, si quæ præsto est, imminuatur per Venæsect. in brachio.
- 5 Subjungantur postea absorbentia cum Stomachicis conjungenda, vel iisdem interponenda.
- 6 Denique in usum trahantur Martialia & specifica.
- 7 Inter externa esse possunt crusta panis vino malvatico intincta, exterius applicata, item Olea cydonior. nardin. menth. rosar. mastichin. Sacculi, Balsama & Emplastras Stomachica, Empl. de crust. pan. de Tacamah.
- 8 Inprimis animus blandis persuasionibus a perversis ideis avocandus, vel increpationibus, aut stratagematibus adhibitis corrigendus est.

VIII. *Cautelæ Prædicæ:*

- 1 Res esui non omnino ineptæ, quando a prægnantibus magno cum desiderio appetuntur, tanquam morbi remedium concedendæ sunt.
- 2 Tales enim cibos, quorum desiderio maximopere flagrant, facillime ferunt ac digerunt, quos alias non prægnantes minime ferre possent.



- 3 Purgantia fortiora, vel etiam Vomitoria exulent, quia malum primis saltem menſibus accidere ſolet; ubi hæc abſque abortus metu haud propinare licet.
- 4 Cavendum, ne intrinſecus aſſumantur, quæ ex fœniculo & abſynthio conficiuntur ex obſerv. Roder. a Caſtro.
- 5 Oleum Tartar. per deliq. ſolum ad plures guttulas exhibitum apud gravidam pica laborantem ſelicif-me fuit exhibitum.
- 6 Decoctum Chamomillæ omnibus præfert remediis Hoffmannus.
- 7 Abſorbentium ſeu præcipitantium uſui non nimium eſt indulgendum, alias in Anorexias, Dyſpnœas, Cachexias, febres lentas & alia mala incidere poſſunt.
- 8 Licet Tinctura Cinamomi cum Spir. Vini rectifica-to ſola infuſione parata præ omnibus aliis Aromatibus prærogativam habere iudicetur, atramen non omnes gravidæ eandem ferunt; unde huius loco alia aromata in uſum trahi poſſunt.
- 9 Perverſi Gravidarum appetitus ſæpius in infantes derivantur, ut poſtea & hi iisdem, qui matres recreare, delectentur cibis.
- 10 Juvat aliquando fallaciis aut technis uti; ſicuti cui-dam loco calcis vivæ pulverem Mechoacannæ quodidie cum fructu exhibitum fuiſſe in A.N.C. Dec. 2. A. 3. legimus.

## CAPUT SECUNDUM.

## D E

## Nauſea &amp; Vomitu.

**Definitio.** Nauſea & Vomitus ſunt Symptomata aliquibus gravidis primis geſtationis menſibus ſolennia, a congeſtione Sanguinis verſus Ventrículum vel Diætæ vitiiſ originem habentia.

## I. Differentia.

- 1 Nauſea & Vomitus differunt gradu: illa quippe Vomendi actum præcedit, & hunc mox ſecuturum plerumque indicat.
- 2 Vomitus ipſe differt ratione materiæ excretæ: aliæ aſſumptam eibum & potum rejiciunt, aliæ materiæ viſcidam, biliolaſam aliæ.
- 3 Ratione temporis; aliæ vexantur eodem matutino tempore, aliæ poſt paſtum, vesp̄eri aliæ: aliæ primo ſtatim conceptionis initio hoc ſymptomate afficiuntur, aliæ poſt aliquot a conceptione ſeptimanas.
- 4 Ratione durationis: Quædam ſentiunt hoc incommodum primis tantum graviditatis diebus, pleræque per aliquot ſeptimanas & menſes eodem divexantur, pauciores per totum graviditatis decurſum eodem laborant.

## III. Signa.

- 1 His opus vix eſt, cum ipſo actu ſtatim ſeſe indicent.
- 2 Antecedit vero nauſeam & Vomitum gravidarum plerumque conſpectus vel eſus carniū aliorumque e carne paratorum ciborum.
- 3 Concurrit Salivæ in os effluxus.
- 4 Et tandem ſubſequitur Vomitus actualis, niſi ſtatim poſt conceptam nauſeam ciborum præſentiam fugiant.

## IV. Subjeſtum.

- 1 Fœminæ delicatiores, ſenſibiliores & inprimis Plethoricæ.
- 2 Quæ animi pathematibus ſunt obnoxia.
- 3 Quæ thoracem veſtimentis nimium conſtringunt.
- 4 Nimia voracitate & cibis dyſpeptis Ventrículum onerantes.

## V. Prognofis.

- 1 Vomitus Gravidarum, quando in limitibus ſuis ſubſiſtit, nihil periculi involvit, ſed ſymptoma eſt plurimis imprægnatis familiare; unde Hippocrates jam ſuo tempore pro ſigno fere ordinario graviditatis

illud habuit juxta Aphor. 61. Sect. V. Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore neque febre ſuperveniente, cibi autem ſaſtidia ipſi accedant, hanc in utero gerere putato.

- 2 Si nimis violentus vel juſto frequentior eſt, languorem totius corporis, dolores hypochondriorum & non raro Abſortum poſt ſe ducit.
- 3 Qui tempore partus contingit, partum promovere obſervatum eſt.
- 4 Qui primis menſibus impregnatas exercet, minus periculi minatur, quam qui circa medium aut ultimum graviditatis terminum urget.
- 5 Quo minus adſtringentibus locus datur, eo citius ſæpe malum abigitur.
- 6 Quæ alias pronæ ſunt ad Vomitus, illæ magis & fortius hoc incommodo vexantur, quam aliæ, huic rei minus aſſuetæ.

## VI. Remedia.

- 1 Materiam in primis viſchærentem temperantia, incidentia & reſolventia: Nitrum depuratum, antimoniæ. Sal. Abſint. Cent. min. Card. bened. Tartar. Vitriol. Arcan. dupl. Oc. ꝑ. ppt. Conch. ppt. Unic. foſſ. Pulv. Stomach. BircK. rad. Helenii, Zedoar. Galang. Eſſent. Cort. Orum, amara Halens.
- 2 Materiam præparatam evacuantia, laxantia leniora: Fol. Senn. ſ. ſt. Rhabarb. el. Pulp. Caſſ. Tamariind. Mann.
- 3 Plethoram, ſi quæ adeſt, imminuentia: V. S. in brachio inſtituta.
- 4 Subadſtringentia & Tonica; Corall. r. ppt. Smaragd. ppt. ſpec. de Hyac. Tinct. Coralliorum, Syrup. Corall. Pulv. Cort. Schacar. Eſſent. & Extr. ejusdem.
- 5 Externe regionem ſtomachi roborantia; Sacculi ex Herb. Menth. criſp. Abſinth. Chamom. Matricar. Sem. Aneth. Fl. Roſ. Cataplaſmata ex fermento cum Pulv. Stomach. mixto, Empl. e cruſt. Pan. Stomach. Zw. Baſ. ex ꝑ. N. M. expr. deſt. Tacam. Abſinth. cort. Orum.

## Formula Remediorum.

## 1 Pulvis temperans.

Rx. Corall. r. præp. Nit. depur. a. ꝑj.  
Oc. ꝑ. præp. Cinnab. ꝑj. ꝑſ.  
Tart. Vitriol. M. Doſ. ꝑj. bis vel ter per diem

## 2 Pulv. Stomachicus.

Rx. Pulv. Stomach. BircKm. Arcan. duplic. a 3j.  
ꝑſ. M. Doſ. ꝑj. ad 3ſs. bis vel ter per diem.

## 3 Pulv. Purgans.

Rx. Rhabarb. el. pulveris. 3ſs. Nit. depur. a gr. v.  
Oc. ꝑ. ppt. M. pro 1. doſi.

## 4 Infuſum Laxans.

Rx. Fol. Senn. ſ. ſt. 3ij. vent. mane parum bull.  
Rhabarb. e. 3j. In Colatur. diſſolv.  
Crem. tart. Mann. el. 3j.  
Sem. Fenic. a 3j. D. p. 1. Doſ.

Infund. per noct. in aq. fer-

## 5 Aqua Confortans.

Rx. Aq. Cinamom. cydon. 3ij. Extr. cort. Schac. ꝑſ.  
maſtichin. 3j. Sir. Corallor. 3ij.

Conf. de hyacinth. 3j. M. D. coch. unum vel alterum

## 6 Eſſentia roborans.

Rx. Tint. Vit. Mart. Ludov. Eſſent. Abſinth. a. 3j.  
3j. M. Doſ. gutt. 30. bis de die.

Corallor.

## 7 Alia.

Rx. Eſſent. Millefol. M. Doſ. bis per diem gutt. 30.  
cort. Aurant. a 3j. in vino:

Elix. Vitriol. Myns. 3ſs.

## 8 Baſamum Stomachicus.

Rx. Ol. Nuc. Moſch. expr. 3j. caryophyll. gutt. ij.  
Deſt. Menth. M. Scrobicul. cordis inun-  
Fenicul. a. gutt. viij. gendus.

## 9 Emplastrum Stomachicum.

Rx. Empl. de cruſt. Pan. tionem.  
3ſs. M. imponatur calide regioni  
Tacamahac. 3j. ventriculi.  
Ol. Menth. q. ſ. ad malaxa-



10 Linimentum Stomachicum.

R.  $\circ$   $\circ$  *Stomach. Croc. ʒss.* *Mac. a gutt. v.*  
*Ol. nuc. Mosch. expr. ʒj.* *Bals. Peru. ʒj.*  
*Dest. Menth.* *Scrobiculo cordis bis inun-*  
*Absynth. ʒj.* *gendum vel ter de die.*  
*Caryophyll.*

VII. Methodus Medendi.

- 1 Quodsi vomitus & nausea a Ventriculo, saburra humorum vitiosorum obfesso, originem traxerit, tunc blanda conducunt laxantia.
- 2 Quando vero in plethorica corporis constitutione a sanguine versus Ventriculum congesto ortum suum habet, ubi fœtus tanta sanguinis quantitate nondum indiget, ibi Venæsectio præsentaneum sæpius est remedium.
- 3 Subjungantur Stomachica selectiora, e.g. Essent. ex Rad. Enul. Gentian. rubr. Pimpinell. alb. essent. Millefol. Adianthi albi, Elix. Visceral. Aq. Vit. mulier. Bals. embryon. Aq. Cinam. cydon. & similia.
- 4 Interponantur in statu sanguineo Temperantia, ut Oc. ʒ. ppt. Unic. foss. Margarit. ppt. Nitrata, Julepiaciduli.
- 5 Postea Ventriculus roboretur per lenia Martialia, Corallata & Gemmata. Externis stomachicis haud omittis.

VIII. Cautelæ Practicæ.

- 1 Vomitoria, etiam si cruditates primarum viarum adsint, & ipsa natura viam nobis præmonstret, non tuto exhibentur: majorem enim Sanguinis commotionem & Abortus periculum inducunt.
- 2 Dantur tamen gravidæ, quæ gestationis tempore Emeticum audacter, non obstantibus dehortationibus Medicorum, cum euphoria & haud infelici successu, assumunt.
- 3 Hiera Picra a Baglivo in omnibus Ventriculi affectibus admodum commendatur.
- 4 Centaurium minus in Idiopatica appetitus dejectione præ aliis ad tonum restituendum a quibusdam laudatur.
- 5 Evitent Gravidæ carniū esum, aliaque alimenta, quæ multum sanguinis generant, eorumque loco eligant magis temperata, lubricantia, diluentia, leniter aromatizata.
- 6 Sanguineæ a remediis adstringentibus & Stomachicis calidioribus præprimis abstineant, malum enim plerumque exinde obstinatius redditur.

CAPUT TERTIUM.

DE

Varisibus.

- I. *Definitio.* **V**arices sunt venarum, inprimis cruralium, nodosæ, lividæ & molles intumescentiæ, a sanguinis impedita circulatione originem habentes.
- II. *Differentia.*
  - 1 Differunt ab Aneurismate ratione vasorum, quod enim Varis est in Venis, in Aneurisma est in Arteriis.
  - 2 Ratione locorum: Alii sese exerunt in cruribus, in tibiis alii, quandoque in inguinibus sese ostendunt, aliquando in infimo ventre, sub umbilico. Qui in virili sexu in scroto protuberant, Circocele s. Herniæ varicosæ nomen assument.
- III. *Signa.*
  - 1 Venarum justo major amplitudo, tumor & conjunctus quandoque dolor.
  - 2 Faciem præ se ferunt lividam, nodosam, mori vel uvæ aut globulorum figuram repræsentantem.
  - 3 Quandoque digiti crassitiem adæquant.
  - 4 Tumores sunt molliusculi, digitis prementibus cedentes, his autem remotis in pristinum restituntur statim.
  - 5 Varices hi gravidis a medio gestationis tempore ad

partum usque obtingunt, ob uteri molem, vasa iliaca prementem.

- 6 Præprimis in cruribus & quandoque etiam prope malleolum observantur.
- 7 Post partum, sponte evanescent, in quibusdam tamen post aliquot tempus recurrunt, quod pro signo pathognomonico denuo factæ imprægnationis haberi solet.

IV. *Subiecta.*

- 1 Fœminæ de temperamento sanguineo multum participant.
- 2 Evacuationes sanguinis menstruas extra gestationis tempus largius expertæ.
- 3 Venas nimis obvias habentes.
- 4 Lautæ & largæ Diætæ utentes, sanguinis vero evacuationes artificiales omittentes.
- 5 Otio & Vitæ sedentariæ assuetæ.
- 6 Fœtum majorem, vel etiam in utero gemellos gerentes.
- 7 Quæ ob negotiorum rationem continuo stare coguntur.

V. *Prognosis.*

- 1 Communissime nihil incommodi aut molestiæ præter dolorem aliquem tensivum hi tumores gravidis inducunt.
- 2 Nimium vero tumefacti nonnunquam dehiscunt & rumpuntur, multumque sanguinis profundunt, non absque Vitæ discrimine.
- 3 Licet Gravidis Varices in femore & cruribus valde sint molesti, & quidem ultimis mensibus, excluso tamen fœtu præprimis rite fluentibus, sponte sua disparent.

VI. *Remedia.*

- 1 Abundantiam sanguinis imminuit ventilatio ejusdem per Venæsectionem in brachio institutam.
- 2 Eundem stagnantem aliorum derivant, partemque ejusdem evacuant lenia laxantia: Manna, Fol. Senn. Magnes. alb. Pulp. Cass. Tamarind.
- 3 Distributionem æqualem promovent blanda diaphoretica cum Absorbentibus, Nitrosis & Cinnabarinis mixta nec non potus sufficiens, & quidem calidus, v.g. Infusa Thee, Caffee, Veronic. Salv.
- 4 Loco immediate affecto succurrunt topica & discutientia: Oleum lauri, Unguentum de baccis lauri, oleum de Ranis, Lumbricor. terrestr. Unguentum e butyro majali vel oleo rosaceo cum succo Cancrorum ab Hartmanno maximopere laudatum. Spiritus Vini Camphoratus, Lumbric. terrestr. Formicarum.

Formula Remediorum.

1 Pulvis laxans.

R. *Magnes. alb. ʒij.* *sione Amygd. dulc. vel*  
*Exhibeantur in Emul. potu Thee.*

2 Potio laxans.

R. *Fol. Senn. s. ft. ʒij.* *Stent. in digestionem per no-*  
*Rhabarb. el. ʒj.* *stem: Add. Mann. Cal.*  
*Sem. Fœnicul.* *Colat. add. ʒj.*  
*Tart. solubil. ʒss.* *M. p. i. Dos.*  
*Infund. in aq. com. ʒvj.*

3 Pulvis temperans & Diapnoicus.

R. *Nitr. depur.* *Cinnabar. ʒij. ʒj.*  
*Tart. Vitriol. ʒj.* *M. F. Pulv. Dos. ʒj. bis,*  
*Oc. ʒ. ppt.* *ter per diem.*  
*ʒij diaph. a. ʒij.*

4 Essentia discutiens.

R. *Essent. Alexiph. Stabl.* *M. dos. gutt. 30. singulis*  
*Scord. a. ʒj.* *mane in potu Thee.*

5 Linimentum paregoricum & discutiens.

R. *Ol. Lumbr. terrestr. ʒss.* *Camphor. ʒss.*  
*Laurin. ʒij.* *M. Inungatur calide.*  
*Dest. fœnic. ʒj.*

6 Spiritus discutiens.

R. *Spir. Vini Camphorat.* *formic. a. ʒss.*  
*ʒj.* *ms. Applicetur calide.*  
*Lumbric. terrestr.*



VII. *Methodus medendi.*

- 1 Venæsectio tam curatorie, quam præservatorie maximo cum fructu in usum trahitur, in primis circa medium & ultimum gestationis tempus &, si necessitas postulat, etiam primis imprægnationis mensibus.
- 2 Evacuationibus sanguinis vel præmittatur, vel subjungatur lenis laxatio, imo repetatur etiam, præsertim quando prægnantes sunt voraces, & ad vitam sedentariam pronæ.
- 3 Hisce interponantur temperantia, diluentia & lenia discutientia.
- 4 Commendetur quoque motus corporis moderatus, quotidie institutus, ut humores stagnantes ad æqualem invitentur circulationem.
- 5 Quod si enormiter tumentes doleant & ruptionem minitentur, in usum vocentur paregorica & discutientia externe applicanda.
- 6 Quibus omnibus irritis, adhibeantur fasciæ latiores Varicibus deprimendis & constringendis aptæ ut ulterior venarum distensio & dilatatio inhibeatur.

VIII. *Cautela Practice.*

- 1 Vomitoria in hoc affectu nullum usum habent, nec etiam laxantia fortiora.
- 2 Hinc talia tantum in usum trahantur, quæ humores leniter evacuant, & sanguinem haud exagitant.
- 3 Varices gravidarum aliquando, licet rarissime, rumpuntur, quo in casu Spir. Vini rectificatissimus ad Hæmorrhagiam inhibendam, secure adhibetur.
- 4 Sectio Varicum est periculosa, quin & ruptio quandoque lethalis, Hæmorrhagiam enim lethalem non raro causantur.
- 5 Curatio eorundem sæpius difficillima est, præprimis si sint exulcerati, qui Medicis eque atque Chirurgis plurimum negotii facessere solent.
- 6 Extra gestationis tempus sese representantes optime tractantur per Venæsectionem in pede, aut Hirudinum appositionem ad anum.

## CAPUT QUARTUM.

## D E

*Abortu.*I. *Definitio.*

**A** Bortus est intempestiva fœtus nondum perfecti, aut mortui, aut vivi, ante terminum partus legitimum, cum gravioribus ut plurimum symptomatibus facta, ex utero exclusio.

II. *Differentia.*

- 1 Ratione temporis: Alius contingit primis, alius vero ultimis graviditatis mensibus.
- 2 Differt a Mola: hæc est massa carnea, fibrosa, membranacea, informis vel utriculosa. Abortus vero denotat fœtum quoad omnia sua membra rite formatum.
- 3 A partu præmaturo, qui intra septimum & nonum mensem accidere, fœtunique rarius lethalis esse solet. Abortus vero contingit a primo conceptionis mense usque ad septimi mensis initium & nunquam non morte ipsius ipsius fœtus stipatus est.

III. *Signa.*a *Imminentis:*

- 1 Fluxus sanguinis ex improvise genitalibus erumpens vel ichoris cujusdam uterini excretio.
- 2 Accedens interdum subitaneus corporis rigor vel horror cum intermixtis phlogosis.
- 3 Quibus jungitur inappetentia, nausea & corporis lassitudo.
- 4 Adsunt præterea non raro dolores lumborum, & palpitatio cordis:
- 5 Nec non Lipothymia aut Syncopa intercurrentes.
- 6 Quibus continuus mœror & animi tristitia accedit.
- 7 Circa pubem vero dolor gravativus & in ingui-

nibus sensatio alicujus ponderis interdum occurrit.

8 Frigus porro in partibus genitalibus tenesmode alvi & uteri conatu stipatum, quandoque observatur.

9 His accensenda Mammarum spontanea extenuatio juxta Hipp. Aph. 37. & 53. Sect. V.

10 Aut lactis, præsertim aquosi, e mammis effluxus spontaneus, secundum Hipp. Aphor. 1. 52. Sect. V.

b *Præsentis:*

1 Dolores spastici abdominis versus muliebria sese extendentes.

2 Frequens dejectiendi stimulus.

3 Hæmorrhagia uterina fortiter continuans, cum inter currentibus Lipothymiis & extremorum frigiditate.

4 Phlogoses & horripilationes alternantes, Dolorem Capitis quandoque satis acutum conjunctum habentes.

5 Abdominis sensibilis & conspicua subsidencia deorsum inclinans.

6 Tandem ipsa fœtus, vel involucri suis adhuc involuti, vel ab iisdem liberati exclusio.

IV. *Subjecta.*

1 Quæ Venæsectiones largiores initio & medio gestationis tempore administrant; præprimis quæ Venas pedis repetitis vicibus sibi aperiri jubent.

2 Primiparæ delicatiores & simul plethoricæ.

3 Quæ mensium fluxum extra gestationis tempus largius expertæ sunt & Venæsectionem durante graviditate omisere.

4 Diæta, vinosa, aromatica, spirituosas abutentes.

5 Fœtum debilem, egrotante, vel plane mortuum, aut mola stipatum in utero gerentes.

6 Animi pathematibus iracundia, tristitia, terrore gaudio nimio percussæ.

7 Quæ uteri capacitatem minorem, quam fœtus succrescens requirit, possident.

8 Quibus uterus Scirrhus, aut ulcere est obsessus.

9 Quæ dysenterias, vomitiones, diarrhœas, aliosque graviores morbos incurrunt.

10 Corpus nimium commoventes, onerantes aut extendentes Vectura, saltationibus, sternutationibus, elevatione ponderum, extensione brachiorum.

11 Quibus Purgantia fortiora & Clysteres acriores fuerint exhibita.

12 Quæ Thoracem & abdomen nimium constringunt.

13 Coitu frequentiori corpus nimium defatigantes.

14 Quæ emmenagoga fortiora pro pellendo fœtu assumpfere.

V. *Prognosis.*

1 Debiles, delicatula abortum passæ gravissime quandoque eodem exercentur, & non raro mortis periculum incurrunt. Facilius eundem ferunt robustiores & quæ jam sunt provectionis aliquantum ætatis.

2 Abortus plus negotii facessit quam legitimus partus; unde non raro fœminæ testantur, se malle decies parere, quam semel abortire.

3 Si hyems australis & pluviosa & tranquilla sit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres quidem, quibus partus in ver incidit, ex omni occasione abortiunt. Hippocr. Aphor. 12. Sect. III.

4 Mulieri in utero gerenti, tenesmus superveniens, abortire facit, juxta Hipp. Sect. VII. Aphor. 27.

5 In gravida, si alvus multum fluxerit, periculum est, ne abortiat. Sect. V. Aphor. 34.

6 Gravidæ, febricitantes, & quæ absque manifesta causa extenuantur, abortientes periclitantur. Hipp. 55. Sect. V.

7 Peripneumoniæ, pleuritidi, febri malignæ, dysentericiæ & similibus morbis gravioribus superveniens, ut plurimum est lethalis.

8 Abortus una alteraque vice abortus, plerumque plures post se ducit, non absque sterilitatis secutura metu.

VI. *Remedia.*

1 Plethoram imminuentia: Venæsectio primis & mediis gestationis mensibus celebrata & pro circum-

stan-



stantiarum ratione aliquoties repetita.

- 2 Temperantia Conch. præp. Ebor. sine igne præp. C. C. phil. præp. Corall. r. præp. Oc. 25. præp. Unic. Fossil. cum Nitrosis & Cinnabarinis mixta, Pulv. Antispasmod. Halens.
- 3 Leniter adstringentia & Roborantia: Corallata & Gemmata, Corall. r. ppt. Matr. Perl. ppt. Spec. de Hyac. Julepus Gemmatus; Remedia e Cydoniis, Nux Moschat. Gran. Kerm. in ovo sorbili propinata, a Bartholino & Medicis Parisinis celebrata, decoctum Millesfolii, vel etiam Salvix, a Simone Pauli commendatum. Tinct. Vitriol. Mart. Ludov. Tinct. Mart. cum Pom. Borisd. Tinct. terræ. Catech. Anodyna Correcta: M. P. de Cynogloss. Theriac. cœlest. in refractiori dosi adhibita.
- 4 Analeptica, Acidula, Gelatinosa, Emulsiva, Julepi aciduli. Gelatin. C. C. Amygdalata, Emuls. ex Amygd. dulc. Pineis & Semin. IV. frig. maj. paratæ. ∇ Cinam. Cydon. Balsam. Embryon. Vinum rubellum, Hispanicum, Succ. Gran. Kerm. Syrup. Corall. Externe Sacculi, Epithemata & Unguenta confortantia, abdomini applicata.
- 5 Specifica: Testa ovorum a perdicibus exclusorum, acini passularum majorum, qui tamen evidenter adstringunt, lapis in corde, vulva, aut intestinis cervarum repertus, pro Amuleto a Foresto commendatus, Lapis aquilæ instante abortu sub axillis gestatus, Pulvis ex Umbilico infantis desumptus.

#### Formula Remediorum.

##### 1 Pilulæ laxantes.

Rx. Pilul. Stahlian. ʒj. Dos. gr. XV.

##### 2 Pulvis laxans.

Rx. Rhabarb. tost. ʒss. M. f. Pulv. p. 1. dos.  
Crem. Tart. ʒss.

##### 3 Pulvis temperans.

Rx. Oc. 25. præp. Tartar. Vitriol. ʒ. ʒss.  
Unic. fossil. Cinnab. ʒ ʒj.  
Corall. r. præp. M. div. in 8. p. aq. propine-  
Nitr. depur. tur singul. 4. hor. 1. Dos.

##### 4 Pulvis Subadstring. & Anodyn.

Rx. Corall. r. præp. Cinnab. ʒ gr. xii.  
Nitr. depur. a. ʒss. M. P. de Cynogloss. gr. iij  
Spec. de Hyacinth. gr. M. div. in iii. p. aq. d. singul.  
XV. 5. hor. dos. 1.

##### 5 Alius.

Rx. Pulv. ad abort. Augu. Dos. ʒj. usurpetur ut præ-  
stan. ʒii. cedens.  
Cinnab. ʒ gr. XV.

##### 6 Alius.

Rx. Gramor. Kerm. ʒj. vid. Hermann. Cyno-  
Corall. r. præp. sur. Mat. Med. p.  
Conf. Alkerm. a. ʒss. 144.  
M. capiatur ex ovo sorbili.

##### 7 Mixture Subadstringens.

Rx. Aq. Plantag. Tinct. Corallor. ʒij.  
Burs. pastor. Theriac. coel. gr. ij.  
Cinnam. Cydon. a. Syr. granor. Kerm. ʒij.  
ʒj. M. d. sing. 4. hor. 2. co-  
chlear.  
Corall. r. præp.  
Unic. fossil. a. ʒss.

##### 8 Essentia Subadstringens.

Rx. Tinct. Vitriol. Mart. M. Dos. gutt. XXXV. ad  
Lud. ʒij. XL. bis vel ter per  
Essent. Cort. Chacarill. diem.  
ʒi.

##### 9 Epithema confortans.

Rx. Balsam. Embryon. ʒij ms. applicetur abdomini  
Theriac. Andr. ʒij cum linteaminibus ca-  
Cinnamom. pul. ʒj. lide.

##### 10 Emplastrum confortans.

Rx. Gumm. Tacamah. Moschat. irrorand. &  
Mastich. a. q. s. calide applicandum.  
F. Emplastr. 00 Nuc.

#### VII. Methodus Medendi.

- 1 Curatio tota consistit in Præservatione, nam factio abortu, eadem methodus requiritur, quæ rite parientibus destinata est.
- 2 Ante omnia ergo Ventilatio sanguinis est instituenda, & si necessitas urget, reiteranda, præprimis in plethoricis.
- 3 Præsentē qualicunque sanguinis commotione temperantia in usum veniant, præcipue vero Nitrosa, cum Absorbentibus & Cinnabarinis mixta, nec non Pulv. Antispasmodic. Halens.
- 4 Alvum semper apertam esse convenit, quod optime per Clysteres & Infusa Laxantia Rhabarbarina, per Pilulas Stahlianas, ut & Suppositoria obtinetur.
- 5 Hisce lenia adstringentia cum Anodinis correctis subjungantur, uti sunt Tonica, Gemmata, Corallata, Opiata, ubique certam dosin & ordinem observando.
- 6 Externe simul adhibeantur confortantia & observe- tur tranquilla corporis continentia.
- 7 Quod si vero ob gravio- rem uteri Hæmorrhagiam videamus vires Patientis admodum esse exhaustas, ibi opera danda est, ut quantocyus excussio per remedia promoveatur, quo in casu iterum optime sese gerunt Pilul. Stahlian. & alia mitiora pellentia, abstinendo, nisi summa necessitas urgeat, a fortioribus.
- 8 Hisce tamen semper Analeptica interponantur, ut vires patientis integræ, quantum fieri potest, conserventur.
- 9 Facto abortu uteri ratio habeatur, ut imposterum ab omnibus recrementis liberetur, ne varia subsequantur symptomata & denuo imprægnata idem incurrat infortunium.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1 Nihil magis abortum provocare solet, quam animi pathematum furor, unde quam maxime vitandus.
- 2 Vectura paulo fortior, sicuti minus assuetis nocet, ita aliis in proximo & legitimo parturiendi stadio versantibus admodum proficuum fuisse experientia docuit, uterus enim angustior relaxatur, ut partus eo felicius subsequi possit.
- 3 Mulieribus abortum passis sæpe gravissima accidere solent symptomata, & per plures easdem defatigare menses, nisi uterus bene expurgetur.
- 4 Observationes prostant, quod quædam fœminæ singulis mensibus ingravitationis Venæsectione opus habuerint ad abortum præcavendum.
- 5 In Plethoricis itaque Venæsectio aliquoties repetita, tanquam optimum præservans, ab Auctoribus summo jure celebrata est.
- 6 Adstringentia fortiora, ubi hæmorrhagia enormior adest, cautissime sunt adhibenda; alias facile in Vitæ periculum parturientem conjicere possumus.
- 7 Pilulæ Stahlianæ mitissimum habent pellendi effectum & hoc in casu secure & efficaciter in usum trahuntur.
- 8 Utrum Magnes & lapis Etites, a quibusdam pro specifico alias habiti, talem effectum exerant, experientiæ relinquendum est.

#### CAPUT QUINTUM.

D E

#### Fœtus mortuo.

- I. Definitio. **F**œtus mortuus denotat fœtum in utero Matris adhuc delitescentem & motu vitæque, quibus antea præditus erat, privatum.
- II. Signa.
  - 1 Admota abdomini ipsius Gravidæ manu non moveri percipitur amplius fœtus, sed decumbente fœmina in latus unum vel alterum & infans hunc motum, veluti ponderosum quoddam corpus, motu proprio destitutum, sequitur.



- 2 Oculi concidunt, cum circulo palpebrarum pallescente.
- 3 Visus paulisper vigorem suum amittit, ut plurimum etiam Cephalalgia Vertiginosa concurrit.
- 4 Aurium, labiorum & extremitatum narium pallor atque frigus adest.
- 5 Turbulentis præterea insomniis vexantur & languorem debilitatemque corporis sentiunt.
- 6 Crebræ lipothymix intercurrent cum horripilationibus & phlogosis alternantibus.
- 7 Genitalia tactu frigida sunt, ex utero vero emanant non raro ichores fœtidi & saniosi.
- 8 Mammæ sensibilibus extenuantur cum lactis tenuioris effluxu.
- 9 Urinæ etiam sæpius aliqualis adest incontinentia.
- 10 Quandoque secundinarum exclusio sese manifestat absque fœtu, quod certissimum fœtus in utero mortui indicium nobis subministrat.
- 11 Fœtidum non raro spirant odorem, quod fœtum in putrilaginem abiisse indicat.
- 12 Baglivio signum fœtus mortui certissimum & infallibile est Tenesmus, vid. ejus Opera p. 140. 198. cum quo consentit Cœlius Aurelianus.

IV. *Subiectum.*

- 1 Insigni plethora fruenter, nec sanguinem debito tempore ventilantes.
- 2 Morbis gravioribus laborantes & succo nutritio vel alimento necessario destitutæ.
- 3 Commotionibus animi vehementioribus agitæ.
- 4 Quæ casus violentos passæ sunt, ictus, vulnera, vel contusiones.
- 5 Quæ Venæsectionibus frequentioribus fœtui sanguinem necessarium detraxere.
- 6 Quæ purgantibus fortioribus fœtum insigniter debilitavere.
- 7 Quibus dolores in ipso partu male succedere, cum iusto diuturniori fœtus in utero strictura.

V. *Prognosis.*

- 1 Ubi fœtus mortuus Dystociam causatur, ibi res fere est conclamata.
- 2 Quibus superveniunt Convulsiones, Lethargus, de his male agitur.
- 3 Fœtus mortuus, in utero in putrilaginem abiens, uterum ipsum corruptione sua afficit; unde febres acutæ, convulsiones, deliria, imo ipsa quandoque gangræna suam habent originem, in quo posteriori casu omnis spes evadendi vana est.
- 4 Fœtus mortuus, nisi cito excludatur, variis anormaliis ansam præbet, ut postea ataxiæ mensium, tumores abdominis aliaque succedant mala.

VI. *Remedia.*

- 1 Pellentia & quidem
  - α Interna: Hepar Anguillæ, Borrax veneta, Sabina, Dictamnus Creticus, Pulegium, Polium, Myrrha, trochisc. de Myrrha, Croc. Castor. Succin. alb. ol. Succin. ol. Lini juxta Simon. Pauli, & pro pauperulis semen Aquilegiæ.
  - β Externa: Suffimigia, ex Sem. Carvi vel Cumim. genitalibus excipienda, nec non Sacculi, ex uterinis herbis sub sicca forma abdomini imponendi, Balnea uterina & simul emollientia, Clysteres similes, Cataplasma Zacut. Lusitan. perinæo impositum, axungia Serpentum &c.
- 2 Analeptica & quidem gratiora, ut vinum generosum in parca quantitate, Emulsiones Amygdal. dulc. gelatinæ amygdalatæ, confect. Alkerm. conf. de Hyacinth. aq. vitæ mulier. bals. Embryon.
- 3 Manualis tractatio per peritam obstetricem aut Operationem Chirurgicam mediantibus instrumentis.

*Formule Remediorum.*

## 1 Pilulæ.

R. Pil. polychr. Stahl. vel. Dos. gr. XV.  
Becher. genui. ʒj. Repetantur aliquoties.

## 2 Pulvis Pellens.

R. Borrac. Venet. Ol. Cinamom. gutt. ij.  
Succin. alb. præp. ʒ. ʒss. M. p. iij. Dos.  
Croc. or. ʒss.

## 3 Alius.

R. Aloes succotr. Ol. Succin. alb. gutt. ij.  
Croc. or. a. gr. vij. M. p. IV. Dos.  
Borrac. ʒj.

## 4 Alius.

R. Hepat. Anguill. cum felle Sal volat. Viperar. ʒss.  
pulv. Borrac. venet. a. ʒj. M. div. in iij. p. & q.

## 5 Mixtura pellens.

R. Aq. Lil. alb. Borrac. venet. a. ʒss.  
Puleg. Cinnab. ʒ. gr. XV.  
Levistic. Ol. Succin. gutt. iij.  
Cinnam. a. ʒj. Syr. Artemis. ʒss.  
Hep. Anguill. M. exhibeatur cothleatim.

## 6 Unguentum.

R. Axung. Serpent. ʒj. M. Inungatur eodem Umbilicus.  
Ol. dest. Spic. gutt. vj.

## 7 Species pro Balneo.

R. Rad. Lil. alb. Fl. Chamom.  
Aristol. O. a. ʒij. Cheir. a. p. iij.  
Herb. Malv. Sem. Lini.  
Rorismar. Bacc. Laur. ʒ. ʒj.  
Puleg. a. Mij. Inc. cont. M. pro balneo.

## 8 Cataplasma Zacuti Lusitani.

R. Medull. Colocynthid. rut. a. ʒj.  
Succ. Colocynthid. virid. Coq. ad succi consumptionem.  
a. ʒj. Quo Cataplasmate se feliciter  
Succin. ʒij. usum fuisse affirmat  
Myrrh. ʒj. Zacut. Lusitanus perinæo  
Ol. castor. imposito.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Quamprimum observamus Fœtum in utero mortuum existere, statim lenia pellentia & quidem specifica sunt adhibenda, ne Embryo in putrilaginem abeat, pessimaque post se ducat symptomata.
- 2 Interpolanda tamen semper, & quidem crebrius, sunt Analeptica gratiora, vires Gravidæ conservantia, ut eo melius excussio contingere queat.
- 3 Omnibus autem his irritis, & doloribus ad fœtum expellendum necessariis cessantibus, ad manualementem operationem progrediendum est. Antequam vero Operatio Chirurgica instituatur, adhuc examinandum, an perita obstetricis manu adhuc aliquid auxilii præstare possimus, qua nil proficiente ad Chirurgicam tandem deveniendum est operationem, quæ instrumentis perficitur, & exercitissimum artificem requirit.
- 4 Extracto fœtu, Puerpera tractatur ut reliquæ puerperæ, ea tantum differentia, ut maxima uteri habeatur ratio, ne aliquid damni post se ducat.
- 5 Quod si febris jam concurrat, ea remedia in usum sunt trahenda, quæ febris inflammatoriæ debentur.

VIII. *Cautele Practicæ.*

- 1 Quandoque Gemelli in utero geruntur uno vivo, altero existente mortuo, quo in casu caute est procedendum, ne vitalis cum mortuo exturbetur vel incaute protrahatur.
- 2 Experientia docet, mortuum Fœtum sæpissime quoque matris mortem post se ducere.
- 3 Forestus specialissimè succum foliorum Levistici recent. express. cum aqua Artemisiæ vel vino laudat.
- 4 Semen Lini in expellendo fœtu mortuo, sive sit ejus decoctum pro potu ordinario, sive in Vino infundatur, sive ex eo fiat balneum, aliquid specifiçi habet. vid. Simon. Paul. Q. B. p. 77.
- 5 Angelus Sala in triumpho Emeticorum testatur se felicissime cum successu pluries hoc in casu exhibuisse Mercurii vitæ gr. iij vel v. Sed cavendum, ne fiat ʒ Mortis.
- 6 An suffimigium Uvarum, quod Zacut. Lusitan. commendat, aut pessus ex radice jugulandis a Fontanio laudatus, vel gummi Sagapenum pudendis intrusum, tantæ sint efficacix, valde dubitandum est.
- 7 Instrumenta, quibus Operator utitur, probe polita esse oportet, non inæqualia aut aspera.
- 8 Cavendum omni operâ, ne in extrahendo fœtu vulnerentur partes vicinæ aut circumjectæ.
- 9 Post Operationem omnia calidiora evitentur medicamina & Puerpera ut vulnerata tractetur.



## SECTIO IV.

DE

## AFFECTIBUS PARTURIENTIUM.

## CAPUT PRIMUM.

DE

Partu.

I. *Definitio.* Partus naturalis est fœtus consummatus & perfecti cum annexis secundinis iusto tempore per spasticos Naturę motus felix facta exclusio.

II. *Differentia.*

- 1 Alius paucio absoluitur tempore & moderatis stipatus est doloribus. Alius vero plures requirit horas & gravissimos dolores conjunctos habet.
- 2 Alius prorsus naturalis est, nullumque periculum involvit; alius est difficilis, cum matris & fœtus vitę discrimine conjunctus, de quo Tab. seq.

III. *Signa.*

- 1 Dolores a lumbis & inguinibus versus genitalia sese extendentes & fortiter continuantes.
- 2 Notabilis descensus uteri & subsidencia abdominis versus genitalia.
- 3 Frequens mingendi & desidendi desiderium,
- 4 Cephalalgia cum insigni rubore faciei conjuncta.
- 5 Tremores artuum inferiorum, dolores ad partum concomitantes.
- 6 Effusio humorum in involucri membra necis, fœtum ambientibus, contentorum, qui sæpius aliquot jam ante partum diebus effluere solent.
- 7 Apertura Orificii Uterini & Capitis infantilis in illud insinuatio, tandemque subsequens fœtus & concomitantium secundinarum exclusio.

IV. *Prognosis.*

- 1 Quo magis dolores sunt nothi minusque versus genitalia sese extendunt, eo minor pariendi spes adest.
- 2 Omnes dolores, versus superiora pariendi tempore directi, excretionem fœtus retardant.
- 3 Quamdiu orificium uteri nondum sese aperuit, tamdiu legitimum pariendi tempus nondum præsto est.
- 4 Quæ aliquot jam ante partum diebus humoribus uterinis spoliatur, difficilior pariunt, quam quæ eisdem ad partum usque tempus conservant.
- 5 Agiliores, Cholericæ & Sanguineæ - Cholericæ facilius pariunt, quam Melancholicæ & Phlegmaticæ.
- 6 Primiparis ut plurimum partus plus negotii facessit, quam quæ aliquoties jam pepererunt.
- 7 Quæ immodestius clamitant & dolores non rite sustinent, difficilem sæpius sibi provocant partum.

V. *Remedia.*

- 1 Emollientia, partes inferiores lubricas reddentia: Balnea ex Herb. Malv. Artemis. Branc. ursin. Fl. Chamom. Samb. Lil. alb. rad. Alth. Lil. alb. Clysteres ex spec. emollient. Decoctis Carni teneræ, Avenæ, Hordei. Linimenta ex Adip. Gallin. Anseris, Cunic. & oleis emollientibus.
- 2 Nothos dolores demulcentia & reserationem uteri adjuvantia: Suffitus vaporosi ex Cardamom. Nuc. Mosch. Cinam. Caryoph. Croc. & Vino: Epithemata ex Pane mellito aut panno scarlatino Balsamo Embryonum. madefacto: Linimenta ex oleis dest. Lauri, Anethi, Carvi, Fœnic. Juniper. Sacculi sub sicca forma applicandi ex Herb. Menth. Matricar. Meliss. Puleg. Ror. mar. Sem. Lin. Fœn. Græc.
- 3 Orgasmi Sanguinis concurrentem contemperantia: Nitrum depuratum, Gum. perl. cum salibus digestivis Tartaro Vitriolat. Arcan. dupl. Sal Polychr. & Cinnabari commistum, Pulv. antispasmod. Halens.

4 Naturam deficientem refocillantia, viribusque succurrentia: Emulsiones ex Amygd. Pineis. Sem. 4. frig. & Cardiac. Cinam. buglossat. Potiones Cardiac. ex aq. temperatioribus destillat. Confect. Alkerm. inc. Julep. Gemmat. Tab. Man. Xst. perlat. Frustulum Cinamom. panis melliti, Caryoph. ad mordendum exhibitum exhaustis desuper aliquot Vini generosioris guttulis. Juscula nutritiva.

*Formula Remediorum.*

## 1 Balneum Emolliens.

Rx. Rad. Alth.	Samb.
Lil. alb. a. ℥ij.	Lil. alb. a. Mj.
Herb. Malv.	Sem. Lin.
Branc. Ursin.	Fœn. græc. a. ℥ss.
Artemis. a. Mij.	Incis. contus. d. pro Balneo.
Flor. Chamom.	

## 2 Clyster emolliens.

Rx. Decoct. Spec. emoll. pro	Lil. alb. ℥j.
Clyst. ℥ix.	Vitell. Ov. No. j.
Dissolv. Elect. lenit. ℥j.	F. Clyster.
Mel. Rosat. ℥vj.	

## 3 Linimentum emolliens.

Rx. Amygd. d.	Gallin. a. ℥ij.
Lil. alb. a. ℥ss.	ms. pro inungendo Ventre.
Axung. Anser.	

## 4 Suffitus discutiens &amp; Carminativus.

Rx. Pulv. Cardamom.	Dilue cum Vino & fervido
Nuc. Mosch.	lateri affunde, vaporem
Cinamom.	dirigendo versus genitalia
Caryoph. a. ℥j.	Puerperæ.
Croc. Or. ℥ss.	

## 5 Epithema.

Rx. Pan. mellit. vel alium	Pulv. Cinamom.
in medio dissect.	Nuc. Mosch.
Madefac ex una parte	Caryoph.
Balsam. Embryon. vel	Mac. a. par.
vino Generos. & ad-	Ventri tepide applicanda.
sparg.	

## 6 Linimentum Carminativum.

Rx. Menth.	Carv.
Chamom.	Fœnic. a. ℥ss.
Aneth. a. ℥ss.	ms. pro inungendo Ventre.
dest. Laur.	

## 7 Sacculus.

Rx. Herb. Matricar.	Sem. Lin.
Meliss.	Fœn. græc. a. ℥ij.
Puleg. a. Mj.	Incis. cont. includ. Sacc.
Flor. Anth.	qui calide Ventri imponantur.
Lavend. a. p. j.	

## 8 Pulvis temperans.

Rx. Nitri depurat.	beat. una alterave
Salis polychr. a. ℥ij.	vice partus tempore repe-
Cinnab. ℥ij. ℥ij.	tendus.
ms. F. Pulv. Dos. ℥j. exhi-	

## 9 Emulsio Cardiaca.

Rx. Amygd. dulc. exc.	Edule. Tab. Man. xst.
Pinear. mund. a. ℥ss.	perlat. ℥ij.
Sem. Citr. ℥ij.	Add. Matr. perl. ppt.
C. Borrag.	∇ Cinam. bugl. ℥j.
Bugloss.	D. ad Vit. pro 2. vel 3.
Rub. id. a. ℥ij.	vicibus.
F. l. a. Emuls.	

## 10 Potio Analeptica.

Rx. Ceras. nigr.	Confect. Alkerm. inc.
Borrag.	℥ss.
Bugloss. a. ℥j.	Julep. gemmat. ℥ss.
Cinam. bugl. ℥ss.	ms. d. ad Vit.
Matr. perl. ppt. ℥ss.	Cochlearim propinanda.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Partum ipsum facilitare creduntur Balnea paulo ante pariendi tempus in usum vocata, nec non Linimenta emollientia Ventri inuncta.



## CAPUT SECUNDUM.

DE

*Partu Difficili seu Dystocia.*

- 2 Instante Partu, quando uterus insufficienter referatur & simul nothi dolores concurrunt, injiciatur Clyster emolliens, aut suffitus vaporosi versus genitalia dirigantur, aut adhibeantur Carminativa leniora, externe Ventri applicanda.
- 3 Si vagina siccescit,  $\circ\circ$  amygd. dulc. vel. oliv. in auxilium vocandum est.
- 4 In concurrente ebullitione sanguinis summo cum fructu Nitrosa & Cinnabarina commendantur, que etiam in passionibus hystericis, sub partu contingentibus, locum habent.
- 5 In constitutionibus debilioribus & deficiente dolorum spasticorum conaminibus optimum præbent effectum Cardiacæ & Analeptica temperatiora, Naturam succumbentem refocillantia.
- 6 Uterus interim externe semper calore foveatur, ne refrigescat, quod plura solet inducere incommoda.
- 7 Quando dolores ad partum urgent, parturiens commonefacienda, ut spiritum retineat & premendo versus orificium uteri conatus Naturæ adjuvet.
- 8 In fella perforata si parturiens est locata, artus ipsius a mulierculis ministrantibus suffulciantur, ut eo melius spasticis Naturæ conatibus succurrere possit.
- 9 Expectetur sic tranquille, donec primo fœtus deinde & secundinarum exclusio ab ipsa Natura perficiatur.

VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 A Linimentis & Unguentis emollientibus aliquot ante partum septimanis in usum vocatis solito faciliorem partum quasdam sibi provocasse, experientia mihi constat.
- 2 A balneis & infusibus in statu plethorico temperare sibi convenit.
- 3 Quando iusti & sufficientes dolores ad partum jam imminet, a Clysteribus cessandum, alias Naturam perturbamus.
- 4 Antequam referatio uteri sufficienter facta sit, parturiens non temere ad labores, sicuti sæpius fit, excitanda est: spoliatur enim ante tempus viribus suis, ut partus vel difficilior procedat, vel corpus insigniter exæstuetur.
- 5 Quod si a spasmō referatio uteri impeditur, digitorum auxilium aliquo modo implurandum est.
- 6 In nothis doloribus vel insufficiente uteri referatione si interna propinquamus, ab omnibus calidioribus remediis abstinere debemus.
- 7 Præstat omnia remedia interna seponere, quamdiu Natura in iustis doloribus provocandis est occupata.
- 8 Præ primis cavendum, ne dolores hi interpellentur per præmaturam spiritus elisionem aut inconcinnos clamores: hac enim ratione partus diutius, quam par est, protrahitur.
- 9 Ad partum facilitandum multum facit commodus Parturientis situs. Potest hunc in finem Puerpera sub regione ossis sacri fulcro aliquo sustentari.
- 10 Cardiacæ fortiora & emmenagoga non temere in usum trahenda, nisi Naturæ impetus remittat.
- 11 Obstetricibus stupidioribus interdendum est, ne sub specie juvandi incongruis suis manipulationibus vel fœtui vel matri periculum inferant.
- 12 Post editum Partum Puerpera quantocyus in lectum calefactum transferenda, ne a refrigerio damna accipiat.
- 13 Abdomen etiam fasciâ lata est ligandum: alias facile flatulentes ejusdem turgescationes exinde originem sumunt.

I. *Definitio.* **P**artus Difficilis s. Dystocia est præternaturalis pariendi conatus, non tantum solito gravioribus symptomatibus, sed etiam sæpius fœtus & Matris vitæ periculo stipatus, a variis causis originem habens.

II. *Differentia.*

Distinguendus est partus difficilis, causas fonticas conjunctas habens, a partu laboriosiori diutius protrahito, juvenculis & primiparis sæpius familiari.

III. *Signa.*

- 1 Dolores insufficientes, rariores, languescetes, vel spurii sursum magis directi, thoracem & Capitis regiones cum exquisitis doloribus & oppressionibus occupantes.
- 2 Foramen pubis solito angustius, quod non raro fœminis brevioris staturæ solenne est, vel ossa pubis nimis indurata in primiparis annosis, vel pelvis male conformata, vel uterus propendulus, obliquus, aut inflammatus.
- 3 Scirrhusæ excrecentiæ vaginam occupantes, aperturamque orificii uterini impediētes.
- 4 Hæmorrhagiæ nimis uterinæ partum antecedentes.
- 5 Convulsiones vel graviores Lipothymia eundem concomitantes.
- 6 Membrarum fœtum cingentium nimia crassities.
- 7 Situs ipsius infantis perversus, ut pedibus, manibus, facie, humeris, cubito, tergo, natibus, funiculo umbilicali promineat.
- 8 Nimia Capitis magnitudo vel alia fœtus mala conformatio.
- 9 Fœtus mortuus, vel, loco fœtus, molæ in utero gestatio.
- 10 Funiculus umbilicalis collo ipsius infantis circumvolutus.
- 11 Secundinarum ante fœtum excretio vel nimis firma adhæsiō ipsius uteri parietibus.
- 12 Gemelli æquali nisu ad exitum propensi.

IV. *Subiectum.*

- 1 Laboriosius pariunt Plethoricæ, obesæ, delicatule, passionibus hystericis obnoxia.
- 2 Difficilior vero Naturæ conaminibus, inconcinnis clamoribus, vociferationibus, spiritus elisione resistentes.
- 3 Malam uteri & partium vicinarum conformationem possidentes, vel fœtum male formatum, debiliorem, mortuum in utero gerentes.
- 4 Nec non Hæmorrhagiis nimis ante partum debilitatæ.
- 5 Præprimis vero incongruo fœtus situ pariendi spe privatæ.

V. *Prognosis.*

- 1 Partus, qui circa plenilunium contingit, plerumque difficilior esse solet.
- 2 Quæcumque in utero gerentes a febris corripuntur & vehementer attenuantur, absque manifesta occasione, difficulter & periculose pariunt. Hippocr. Sect. V. Aphor. 35.
- 3 Mulieri difficulter parenti sternutatio superveniens bonum. Idem Sect. V. Aphor. 35.
- 4 Quando secundina fœtum præcedit, periculosum est.
- 5 Quo diutius fœtus exclusio protrahitur, eo majus periculum imminet.
- 6 Si incongruus fœtus situs pariendi actum impedit, nulla spes concipiendi, nisi manuali obstetricis vel alius periti Chirurgi opera fœtui auxilium feratur.
- 7 Febrem malignam, deliria aut alium morbum graviolem concurrere, malum.



- 8 Aquas aliquot jam ante partum diebus effluere, non semper tutum.
- 9 Hæmorrhagia uterina partum præcedens sæpius fœtum vel insigniter debilitatum vel plane mortuum indicat.
- 10 Convulsiones parturienti accedere, malum, minus tamen metuendum, si spasticis uteri affectibus antea obnoxia fuerit.
- 11 Lipothymia concurrentes non adeo reformidandæ sunt, si eadem fuerint hystericae.
- 12 Alias si ab insigni virium defectu originem habuerint, sudorque frigidus concurrerit, res periculi plena est.

## VI. Remedia.

- 1 Nothos dolores discutiunt Carminativa leniora, Capite præced. laudata, interne & externe in usum vocata.
- 2 Stricturam partium nimiam emolliunt Clysteres humectantes, emollientes, oleosi, Balnea, Insesus, Fomenta, Unguenta & Linimenta, ante & sub partu usurpata.
- 3 Orgasmi Sanguinis concurrentem temperant Nitrofa, absorbentia, diaphoretica fixa & Cinnabarina.
- 4 Virium defectum refarciunt Juscula nutritiva, Potiones Cardiacæ, Emulsiones.
- 5 Naturæ energiam motuumque vim excitant lenia Pellentia, primo leniora:  $\nabla$  Artemis. Puleg. Cheir. Ror. mar. Meliss. Succin. ppt. Cinam. acut. Cass. Lign. post & fortiora: Myrrha, Crocus, Borax Venet. Sal. Vol. Suc. Hepar. Anguillæ,  $\odot\odot$  Sabin. Succin. Externe Axung. Serpent. Viperar. Epithemata ex pane mellito, crusta panis Balsamo Embryon. vel vino rubello madefacta, insperso Pulv. Cinam. Caryoph. Nuc. Mosch. Croc.
- 6 Viarum siccitati occurrunt oleosa:  $\odot\odot$  Amygd. dulc. Oliv. Chamom. Verbas. vaginæ uterinæ inuncta.
- 7 Convulsionibus medentur præter supra laudata Nitrofa, Absorbentia & Cinnab. lenia nervina, ut Lumbr. terrestr. ppt. Rad. & Sem. Pæon. Essent. dulc. Hal. Pulv. confort.
- 8 Incongruum situm corrigunt obstetrices vel periti Chirurghi manuum ministerio.

## Formule Remediorum.

## 1 Species pro Balneo.

- Rx. Rad. Lil. alb. Lil. alb. a. Mj.  
Alth. a.  $\frac{3}{4}$ ss. Sem. Lin.  
Herb. Malv. Fœn. græc. a.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Chamom. Incis. cont. d. ad ch.  
Bræc. Ursin. a. Mj. Usurpentur sub Balnei forma, aliquot ante partum septimanis.  
Fl. Melilot.  
Sambuc.

## 2 Unguentum emolliens.

- Rx. Unguent. Dialth.  $\frac{3}{4}$ ss. Verbas. a.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Axung. Anser.  $\frac{3}{4}$ ss. ms. pro. inungendo abdomine.  
 $\odot\odot$  Lil. alb.

## 3 Clyster emolliens.

- Rx. Rad. Lil. alb. Colat.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Alth. a.  $\frac{3}{4}$ ss. Add. Mel. mercur.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Herb. Chamom.  $\odot\odot$  verbas.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Branc. Urs. Vitell. ov. N. j.  
Fl. Melilot. Salis commun.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Verbas. a. Mfs. Inficiatur calide.  
Incis. coq. in f. q. N. f.

## 4 Pulvis temperans.

- Rx. Oc.  $\frac{3}{4}$ ss. ppt. Cinnab.  $\frac{3}{4}$ ss.  
 $\frac{3}{4}$ ss. diaph. ms. F. Pulv. Dos.  $\frac{3}{4}$ ss. bis, ter vel quater per diem.  
Nitri depurat.  
Salis polychr. a.  $\frac{3}{4}$ ss.

## 5 Alius Nervino-temperans.

- Rx. Conch. ppt. Lumbric. terrestr. ppt. a.  
 $\frac{3}{4}$ ss. diaph.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Nitri depurat. a.  $\frac{3}{4}$ ss. ms. F. Pulv. Dos. ut præced.  
Cinnabar. nativ. ppt.

## 6 Potio Cardiaca.

- Rx.  $\nabla$  Meliss. Confect. Alkerin. inc.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Nymph. a.  $\frac{3}{4}$ ss. Julep. Gemmat.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Cinam. bugloss.  $\frac{3}{4}$ ss. ms. d. ad Vitr. dentur sæpius cochl. ii.  
Matr. perl. ppt.  $\frac{3}{4}$ ss.

## 7 Emulsio analeptica.

- Rx. Pinear. mund. Lat.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Amygd. dul. excort. a.  $\frac{3}{4}$ ss. Add. Matr. perl. ppt.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Sem. st. frig. maj. a.  $\frac{3}{4}$ ss.  $\nabla$  Cinnam. bugloss.  $\frac{3}{4}$ ss.  
C. f. q. Decoct. C. C. f. l. a. D. ad Vitr. pro aliquot vicibus.

## 8 Potio pellens.

- Rx.  $\nabla$  Artemis. Borac. Venet. a.  $\frac{3}{4}$ ss.  
Puleg. Syr. Cort. Oram  $\frac{3}{4}$ ss.  
Meliss. a.  $\frac{3}{4}$ ss. ms. d. ad Vitr. dentur sing.  
Succin. ppt. 2. horis cochl. ij.

## 9 Pulvis pellens.

- Rx. Trochisc. de Myrrh.  $\frac{3}{4}$ ss. dendus, cujus singulis  
Borac. Venet.  $\frac{3}{4}$ ss. 2. vel iij. horis dos. j. porrigatur, donec fœtus excernatur.  
Croc. Or.  $\frac{3}{4}$ ss.  
ms. F. Pulv. in V. p. a. divi-

## 10 Alius.

- Rx. Hepat. Anguill.  $\frac{3}{4}$ ss. detur pro 2. vicibus.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Fœminæ difficiliori partui jam assuetæ per 14. circiter ante partum dies balneis utantur emollientibus, Ventremque Unguentis & Linimentis similibus inungant.
- 2 Instante partus tempore, si dolores nothi concurrant iidemque ad superiora magis vergant, Clyster injiciatur emolliens, oleosus, lubricans, commendato ante & post ejusdem usum parturienti leni corporis motu, in cubiculo peragendo.
- 3 In insufficienre dolorum concursu, uterique apertura primo exhibeantur Cardiaca & Analeptica, subjunctis postea lenissimis Emmenagogis, sensim sensimque, si circumstantiæ id exigant, ad fortiora procedendo.
- 4 In insigni orgasmi Sanguinis præsentia egregium usum habent pulve-es antispasmodici, nitrati, repetiti vicibus exhibiti.
- 5 Convulsiones aut Lipothymia si concurrant, adhibeantur, præter Cinnabarina & Analeptica, specifica nervina: Essent. dulc. Hal.  $\odot\odot$  animal. Dippe-  
lii, Lumbr. terrestr.
- 6 Quando membranæ fœtum cingentes sponte haud disrumpuntur, partusque actum impediunt, obstetrix scalpello conveniente apertionem instituat, cavendo ab incongrua dilaceratione per ungues, ali-  
quibus solenni.
- 7 In Hæmorrhagia uteri abstinendum est a pellentibus eorumque loco temperantia & Analeptica in usum trahenda sunt.
- 8 Si perversus infantis situs excretionem impediatur, embryo in debitum est reponendus locum vel ab obstetrice vel Chirurgo perito.
- 9 Horum quoque opera invocanda est, si alia uteri, vaginæ, partium continnentium vel ipsius infantis vitia concurrant.

## VIII. Cautela Practica.

- 1 Laboriosi partus non statim pro difficultibus sunt habendi.
- 2 In illis caute adhibeantur pellentia: Orgasmus enim sanguinis exinde excitatur & fluxui lochiorum nimio sæpius occasio subministratur.
- 3 Si Plethora ingens concurrat, poterit in ipso partus termino Venæsectio celebrari & quidem convenientius in pede quam brachio.
- 4 Partum facilitare creduntur Jaspis, Smaragd. Aetites femori alligati, Cingula ex spoliis serpentum vel cute humana parata; tad. Cyclaminis orificio pudendi vel femori applicata, Magnes in manu detentus, Herba Anagallidis dextro cruri appensa; quæ quidem res experientiæ testimonium adhuc expostulant.
- 5 Vomitoria & sternuatatoria fortiora pro partu facilitando commendata, cautissime sunt exhibenda. Priora exquisitissimum exposcunt judicium practicum, an & quo tempore conveniant? Posteriora vero eo in casu



tantum locum habent, ubi orificium uteri rite apertum, fœtusque legitime constitutus est, nîsus vero sufficientes desunt.

- 6 In Hemorrhagia uterina Henricus ab Heer commendat testiculos equinos in taleolos concisos, vino immerfos, exiccatos postea & pulverilatos pro usu interno.
- 7 Fœtu in lucem edito secundinarum habenda est ratio, ubi serio cavendum, ne majori vi, quam par est, extrahantur: Sæpius enim exinde uterus graviter vulneratur, febresque acutæ inflammatoriæ originem habent.
- 8 Quando a partu laboriosiori & difficiliore pudenda intumescunt, Unguentum album Camphoratum, Dialth.  $\circ\circ$  Lil. alb. Verbasc. Chamom. locum habent, impositis postea sacculis ex Herb. Chamom. Matricar. Fl. Sambuc. Melilot. Sem. Lin. &c.

### CAPUT TERTIUM.

#### DI

#### Secundinarum Retentione.

- I. *Definitio.* **S**ecundinarum Retentio est membranarum. fœtum ambientium vel placentæ uterinæ, post partum excludendarum, in utero remansio, a variis causis originem sumens.
- II. *Differentia.*  
Est vel plenaria, quando membranæ una cum placenta remanent, quod rarius fit, vel partialis, si pars saltem una vel altera, modo major, modo minor, retinetur, quod sæpius occurrere solet.
- III. *Signa.*
  - 1 Ventris tumor & durities aliqua, externe quandoque sentienda.
  - 2 Dolor infra umbilicum præcipue occurrens.
  - 3 Motus subsequentes febriles & non raro gravissima febris inflammatoria.
  - 4 Cui sæpius enormes Lipothymix & Hæmorrhagiæ uterinæ junguntur.
- IV. *Subjectum.*
  - 1 Parturientes, quibus Placenta uterina iusto firmitus adhæret.
  - 2 In quibus uteri orificium post partum subito sese claudit, antequam secundinæ fuerint extractæ.
  - 3 Per obstetrices perperam & violentiori modo tractatæ.
  - 4 Quibus funiculus umbilicalis per fortiozem attractionem abruptus vel neglectus est, ut retrocedere & orificii uterini clausuræ locum relinquere poterit.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Secundinæ, quo diutius in utero remanent, eo graviora post se ducunt symptomata.
  - 2 Quo major earundem pars retinetur, eo majus periculum metuendum.
  - 3 Interdum integræ excernuntur, interdum putrefactæ per frustra ejiciuntur; non raro vero plane in utero remanent, pessimaque symptomata vel ipsam mortem post se ducunt.
  - 4 Febris concurrens quo gravior, eo res periculiosior est.
- VI. *Remedia.*
  - 1 Secundinas retentas expellunt & lenissime per uterum evacuant Pilulæ Beccheri, Balsamico-viscerales nostrates, Stahlianæ & Polychrestæ Halenses.
  - 2 Fortiori modo easdem exturbant Borax Veneta, Myrrha, Crocus, Hepar anguillæ, in sicca vel liquida forma exhibita.
  - 3 Febrem concurrentem discutunt aquæ diapnoicæ & diaphoretica fixa, nec non alexipharmaca leniora: Essent. Alexiph. Stahlii, Mixtura simplex, Tinct. Bez. Mich.
  - 4 Corruptionem præcavent lenia Balsamica: Essentia Myrrh Succin. supraque laudatæ Pilulæ Balsamicæ.

#### Formula Remediorum.

- I Pilulæ lenientes & balsamicæ.  
R. Pil. Balsam. visceral.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . bis per diem.  
Dof. gr. XV. pro 4. vicibus,
- I Aliæ.  
R. Pil. polychr. D. D. Stahliani  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . Dof.  $\circ$  usus, ut præcedentium.
- 3 Potio Pellens.  
R.  $\nabla$  Puleg. Borac. Venet. a.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
Artemisf. Syr. Artemisf.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
Meliss. a.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . ms. d. ad Vitr. exhibeatur  
Croc. comp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . cochl.  
Succin. ppt.
- 4 Pulvis Pellens.  
R. H. pat. Anguill.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . pro 1. vice.  
Exhibeatur in  $\nabla$  sabin.
- 5 Alius.  
R. Trochisc. de Myrrh.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . ms. F. Pulv. in V. part.  
Succin. alb. ppt. æq. dividendus  $\circ$  bis  
Borac. Venet. a.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . vel ter per diem exhibendus.  
Croc. Or.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .
- 6 Potio diapnoica.  
R.  $\nabla$  Scorzon. Cinnab.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}$   $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
Fl. Samb. Syr. Fl. bellid.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
Card. Mar. a.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . ms. d. ad Vitr. exhibeantur  
Typh. Ceru.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . singulis 4. horis cochlearia 2.  
Oc.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . ppt.  
 $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}$  diaph. a.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .
- 7 Essentia discutiens.  
R. Essent. Alexiph. St.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . ms. d. ad Vitr. Dof. gutt. 30.  
Scord.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . mane  $\circ$  vesperi.
- 8 Essentia balsamica.  
R. Essent. Myrrh.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . ms. Dof. gutt. 25. loco prioris  
Succin.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . bis per diem usurpetur.
- VII. *Methodus medendi.*
  - 1 Quando fœtus in lucem editus est, eo allaborandum, ut secundinæ quantocyus, antequam uterus sese occludat, excernantur.
  - 2 Fit hoc laniori funiculi umbilicalis attractione, per obstetricem peragenda, vel etiam tussicula aut sternutatione voluntaria ipsius parturientis.
  - 3 Quod si vero fortius adhærent secundinæ, digitis oleo olivarum vel butyro inunctis eorundem separatio tentanda, ut deinde leniori attractioni auscultent.
  - 4 Interne, quando uterus sese jam occlusit, conveniunt præ omnibus Pil. Beccheri, Stahlianæ & nostrates balsamico-viscerales, quæ lenissimam pellendi vim habent.
  - 5 In primo tamen principio si universæ secundinæ vel magna earundem pars ex negligentia obstetricis in utero remansere, præstat quandoque Hepar anguillæ vel pellentia alia paululum fortiora exhibere, ut hac ratione earundem excretio adhuc tentetur.
  - 6 Quando febris inflammatoria affectum comitatur, adhibeantur Diaphoretica fixa, Gelatinosa, Emulsiones cum Sem. Card. Mariæ & similia.
  - 7 Pro corruptione inhibenda reliquis remediis interponantur balsamica leniora, parvis & repetitis vicibus.
- VIII. *Cautela Practicæ & Observationes.*
  - 1 A Fortioribus pellentibus, si uterus per aliquot jam dies est occlusus, sibi cavendum est, commotiones enim sanguinis exinde excitantur & febricula magis accenditur.
  - 2 Pilulæ Balsamicæ Stahlianæ & similes tutissimæ sunt, Essentiarumque balsamicarum locum optime refarciunt.
  - 3 Quando fortior febris concurrit, omnia balsamica & resinosa cautissime sunt usurpanda.
  - 4 Usu Pulveris, ex Trochisc. de Myrrh. Sem. Violar. Rad. Dictamn. & ras. Dactylorum, a Foresto commendati, Orstius aliquot se restituisse testatur.
  - 5 Gesnerus laudat testiculos equi castrati, frustulatim incisos, in furno siccatos & sub pulveris forma usurpatos.
  - 6 Rulandus  $\circ\circ$  Juniperini gutt. 30. feliciter exhibuit.
  - 7 Succus Foliorum Levistici Arcanum est Foresto.



## CAPUT QUARUM.

## DE

## Procidencia Uteri.

I. *Definitio.* **P**rocidencia Uteri est vel ipsius uteri vel vaginæ, modo major, modo minor descensus aut prolapsus, a relaxatione partium nimia ortum habens.

II. *Differentia.*

- 1 Est vel stricte sic dicta, ubi uterus justo longius extensus vel intra vaginam delitescit vel extrapudenda prominet; vel late considerata, ubi vagina uterina prolabitur, saccumque & tumorem mollem ad instar intestini constituit.
- 2 Prior contingit vel cum inversione ipsius uteri, ingentem tunc molem globosam caput infantis fere referentis & intra femora propendentis, vel absque eadem, ubi orificium uteri internum sese conipiciendum præbet.

III. *Signa.*

- 1 Ex Ægræ relatione hæc manifesta sunt.
- 2 Sentiant tumorem modo majorem, modo minorem in vagina uterina, vel extra eandem cum aliquo dolore & pondere conjunctum.
- 3 Inprimis autem doloris sensus in illis partibus percipitur, quibus ute us est annexus in lumbis, hypogastrio, pudendo & circa os sacrum.
- 4 Quo diutius subsistit, eo magis dolor evanescit & nonnisi ponderis molestia remanet.
- 5 Quando Procidencia uteri insignis est, ambulationem impedit.

IV. *Subjectum.*

- 1 Fœminæ, quæ partu difficili vel abortu sæpius laboraverunt.
- 2 Quæ in partu ab imperitis obstetricibus aut Chirurgis perverse tractatæ fuerunt.
- 3 A Violentis aliis causis ligamentorum, uterum suspendentium, relaxationem perpeffæ.
- 4 Nervorum, hisce partibus propriorum, paralytica impotentia laborantes.
- 5 Venere nimium abutentes.
- 6 Fluore albo immodestiori vexatæ.
- 7 Gravidæ in ultimo gestationis termino constitutæ, descensu potius uteri quam procidencia quandoque laborant.

V. *Prognosis.*

- 1 Prolapsus uteri, nisi insignis fuerit, raro periculosus est, maximam tamen fœminis molestiam parit, Venerisque & conceptionis negotium aliquo modo impedit.
- 2 Quando vero nimium descendit, aerisque iniurias incurrit uterus, non raro inflammationem, gangrenam & sphacelum concipit, cum superveniente morte, vel ulceribus fœtidis manantibus inficitur.
- 3 Si affectus recens est, & extra vulvam haud propendet, facilius curatur, quam si inveteratus fuerit & amplioris extensionis.
- 4 Facilius in junioribus curatur, quam vetulis.
- 5 Quando post repositionem uterus statim iterum procidit, insignis partium relaxatio, difficilisque indicatur curatio.
- 6 Uterus cum inversione prolapsus difficillime curatur.
- 7 Prolapsus uteri a causis violentis originem habens difficiliter Curationem admittit, quam qui ab internis producit causis.
- 8 Mensium suppressionem, hystericas passiones vel Convulsionem affectui supervenire, malum.

VI. *Remedia.*

- 1 Uterum vel vaginam prolapsam reponunt Obstetrices vel Chirurgi modesta manuum opera.
- 2 Partes tumidas repositioni haud auscultantes emolliunt & foveant: Rad. Alth. Lil. alb. Herb. Malv. Branc.

Ursin. Chamom. Absinth. Fl. Melilot. Samb. Sem. Fœn. græc. in lacte vel Vino rubello decocta.

- 3 Corruptionem ab aere inductam extirpant, culter Chirurgicus, Ligaturæ vel Cauteria actualia.
- 4 Repositas partes in suis locis confirmant quies corporis, & Adstringentia: Fol. Myrt. Querc. Herb. Equiset. Virg. ☉, Artemis. Matricar. Pilosell. Fl. Balaustr. Cort. Granat. Gall. Nuc. Cupress. Baccar. myrt. cupul. gland. fem. Sumach. Sang. Drac. Mastich. Sarcocol. Alum. rocc. Lap. medicament. cum Aqua Reg. Hung. agitat, sub Decoctorum, Injectionum & Suffimigiorum forma externe usurpata, Emplastra Caragmatica Inguinibus & Hypogastrio imposita; & his nihil proficientibus, Pessaria ex Ebore, Subere, aut alio ligno leviori parata.

## Formule Remediorum.

## 1 Decoctum emolliens.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| R. Rad. Lil. alb.   | Fl. Melilot.                               |
| Alth. a. 3j.        | Verbasc. a. Mss.                           |
| Herb. Branc. ursin. | Sem. Fœn. græc. 3ss.                       |
| Absinth.            | Incis. coq. in lacte & applicentur calide. |
| Malv. a. Mj.        |  |

- 2 Decoctum Vulnerarium Caroli Musitani, maxime commendatum in vaginæ uterinæ procidencia.

- |                   |   |
|-------------------|---|
| R. Herb. Herniar. | Terment.                                |
| Pilosell.         | Bistort. a. p. j.                       |
| Stellar.          | Fl. Ros. rubr. p. ij.                   |
| Bursa Pastoris.   | Nuc. Cupr. No. IV.                      |
| Polygon. a. Mj.   | Fiat decoct. in Vino rubr.              |
| Rad. Consol. maj. | vase optime clauso. Exhibeatur interne. |
| Dictamn. alb.     |   |

## 3 Decoctum adstringens.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| R. Rad. Symphyt.   | Ros. r. a. p. j.                                  |
| Bistort. a. 3j.    | Baccar. Myrt. 3ij.                                |
| Herb. Polygon.     | Nuc. Cupress. No. iij.                            |
| Burs. past.        | Incis. cont. coq. in Vino rubro & applic. calide. |
| Fol. Querc. a. Mj. |   |
| Fl. Balaustr.      |   |

## 4 Suffimigium nervinum &amp; adstringens.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| R. Gum. Tacamah.   | Fl. ros. r.   |
| Juniper.           | Lavend. a. p. j.                                      |
| Sarcocoll. a. 3ij. | Incis. contus. gross. modo usurpentur pro suffimigio. |
| Sang. Dracon.      |   |
| Mastich. a. 3j.    |   |

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Prolapsus uterum vel vaginam in suum situm naturalem illico reponere decet; fit hoc conveniente ægræ situ & manuum Chirurgi vel Obstetricis adjuvantium ministerio.
- 2 Collocanda hunc in finem ægrota est super dorsum, demisso capite, coxis altioribus dilatatis & poplitibus reflexis.
- 3 Postmodum tumor, aliquandiu jam fomentatus, manibus tamdiu leniter comprimatur, donec suum situm naturalem obtinuerit.
- 4 Quod si tumor & aliqualis inflammatio repositionem impediat, fons instituat frequens Decoctus emollientibus & discutientibus donec imminuatur.
- 5 In Gangrænæ vel sphaceli concursu, Chirurgicum auxilium implorandum est, quod tamen rarius feliciter cedere solet.
- 6 Reposito utero vel vagina, quies corporis per aliquot temporis spatium observetur, in usum simul vocatis adstringentibus externis: Suffimigiis, Injectionibus, Pessis & bombace vel linteis contorti, Decoctis adstringentibus madidis, & Emplastris nervinis.
- 7 His nihil proficientibus in subsidium vocentur Pessaria, ad uteri usque Cervicem immittenda, pro sustentando utero apprimere convenientia.

VIII. *Cautela Practicæ & Observationes.*

- 1 Vomitoria a quibusdam laudata, omnino rejiciuntur, cum prorsus contrarium effectum exerant.
- 2 Purgantia quoque fortiora haud tuta sunt, quorum locum refarcire potius possunt lenientia & Clysteres, in alvi constipata casu repositionem non parum adjuvantia.



- 3 Oleosa & pingua adhibita, nec absterfa anterepositionem, sæpius novo prolapsui viam sternunt.
- 4 In adstringentium cum externorum tum internorum usu, ad mensium & lochiorum negotium respiciendum, ne versus hoc tempus in usum vocentur & fluxui obex iisdem ponatur.
- 5 Pessaria optima sunt, quæ habent figuram triangularem & oblongam.
- 6 In medio decet esse perforatas, ne mensium fluxum impendant.
- 7 Antequam intrudantur, intinguntur ceræ, eademque obducta ligula serica prospiciuntur, ut comode extrahi possint.
- 8 Intrusa nunquam extrahuntur, nisi tempore concubitus.
- 9 Sterilitatem iisdem haud induci, plurima exempla confirmant.
- 10 In Gravidis, quando descensus aliqualis uteri observatur, quod non raro contingit, subligacula, abdomini & pudendis injicienda, officium præstant, nimiumque descensum impediunt.

## S E C T I O V.

D E

## AFFECTIBUS PUERPERARUM.

## CAPUT TERTIUM.

D E

## Doloribus post Partum.

- I. *Definitio.* **D**olores post partum sunt symptoma, omnibus fere Puerperis familiare, a sensibilitate uteri & impeditiori sanguinis profluu præcipue originem sumens.
- II. *Differentia.*  
Sunt vel veri, a sanguine & utero ortum habentes, vel nothi, a refrigeratione intestinorum & concurrentibus flatibus excitati.
- III. *Signa.*
  - 1 Dolores plus minus exquisiti, in Ventre inferiori & præcipue regione hypogastica alternatim occurrentes.
  - 2 Sanguinis lochialis impeditior successus.
  - 3 Excretio tandem grumorum sanguinis, quandoque satis insignium, vel secundinarum portionis, dolorum imminutionem post se ducens.
- IV. *Subjectum.*
  - 1 Quæ partus tempore frigidum potum copiose ingurgitavere.
  - 2 Partu difficiliore defunctæ.
  - 3 Secundinarum retentionem vel impeditum aut suppressum lochiorum fluxum expertæ.
  - 4 Quæ frigori abdomen exposuere.
  - 5 Quibus uterus graviore modo vulneratus est.
  - 6 Quæ uteri ligaturam neglexere.
  - 7 Quas infantes fortiori suctione nimium fatigant, ut exinde sanguis lochialis aliquantum regurgitet, ejusque fluxus imminuatur.
- V. *Prenosis.*
  - 1 Quando alternatim occurrunt, & non sunt exquisitissimi, nihil periculi involvunt, sed tranquilla corporis continentia & calido regimine intra aliquot dies prorsus discutuntur.
  - 2 Quod si vero magis sunt statarii, diutiusque continuant, graviora interna mala indicant.
  - 3 Quoties sanguis congrumatus excernitur, toties dolorum mitigationem sentiunt puerperæ.
- VI. *Remedia.*
  - 1 Sanguinem vel secundinas retentas ejiciunt, leniterque promovent: Pilulæ polychr. Stahlianæ, Beccheri, nostrates balsamico viscerales, & Emmenagoga

- leniora:  $\nabla$  Puleg. Artemis. Meliss. Croc. in jusculis, Essentia Myrrh. Succin. & Croc. ad paucas guttas.
- 2 Dolores discutunt Carminativa temperatiora: Tinct. Cort.  $\odot$ rum & Syrup. ejusdem,  $\nabla$  Chamom. Fœnic. Angel. Essent. Alexiph. Stahlian, Pimpinellæ albæ. Externe Clysteres Carminativi, Epithemata sicca ex Herb. Matricar. Menth. crisp. Chamom. Majoran. Ror. Mar. Fl. Sambuc. Sem. Aneth. Baccar. Laur. Junip. Linimenta & Unguenta ex  $\odot\odot$  Chamom. Menth. Matric. Aneth. dest. Carv. Cumin, Cort.  $\odot$ rum.

## Formula Remediorum.

## 1 Pilulæ Balsamicæ.

Rx. Pil. polychr. D. Stahlian, *Exhibeantur singulis mane gr. XV.*  
vel Beccher.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

## 2 Aqua Emmenagoga.

Rx.  $\nabla$  puleg. *Sal. Succin. vol. gr. vj.*  
Meliss. *Syr. Cort.  $\odot$ rum  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .*  
Artemis.  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . *ms. d. ad Vitr. Propin-*  
Croc. comp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . *tur singulis 4. horis co-*  
Succin. ppt. *chl. ij.*  
 $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . diaph.  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

## 4 Pulvis Varandæ maxime celebris.

Rx. Rad. Consol. maj.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . *ms. F. Pulv. sing. 3. hor.*  
Nucl. persic. *quantum cuspis cultri*  
Nuc. Mosch.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . *capere potest, exhibea-*  
Succin. alb.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . *tur.*  
Ambr. gryf.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

## 5 Essentia Carminativa.

Rx. Essent. alexiph. St.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . *ms. usurpetur, ut præce-*  
Cort.  $\odot$ rum.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . *dens.*

## 6 Aqua Carminativa.

Rx.  $\nabla$  Fœnic.  *$\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$  diaph.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .*  
Ment.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . *Syr. Cort.  $\odot$ rum  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .*  
ad Flat. f. Vin.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . *ms. dentur singulis 4. horis*  
Liq. C. C. Succin.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . *cochl. ij.*

## 7 Epithema Carminativum.

Rx. Herb. Menth. crisp. *Sem. Aneth.  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .*  
Chamom. *Incisa cont. gr. mod. in-*  
Matricar.  $\mathfrak{a}$ . Mj. *clud. Sacculis. cali-*  
Fl. Sambuc. Mfs. *de Ventri imponen-*  
Bacch. Laur. *dis.*  
Junip.

## 8 Oleum Carminativum.

Rx.  $\odot\odot$  Menth. crisp. *Cort.  $\odot$ rum.*  
Absinth. *Carv.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .*  
Chamom.  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . *ms. Inungatur calide ab-*  
Mosch. expr.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . *domini.*  
Dest. Aneth.

## VII. Methodus medendi.

- 1 Ut dolores post partum, quantum possibile est, præcaveantur, præstat, ut statim post absolutum partus actum fascia lata leniter constringatur abdomen puerperæ.
- 2 Si hoc non obstante aliqualis lochiorum immixtio compareat aut Secundinarum retentio subsit, exhibeantur Pilulæ Balsamicæ, superius laudatæ, aliaque pellectia temperatiora.
- 3 In Concurfu insignis Plethoræ, Venæsectio in pede instituatur, ubi etiam pulveres Nitrosi, absorbentes & Cinnabarini haud sunt rejiciendi, inprimis quando febricula aliqua complicata est.
- 4 Pro doloribus discutiendis & demulcendis, adhibeantur Carminativa leniora, interne & externe in usum vocanda.

## VIII. Cautela Practica &amp; Observationes.

- 1 Frigidam post partum ingurgitare pro præcavendis doloribus, aliquibus solenne, conamen est omni rationi contrarium.
- 2 Sem. Nigellæ in jusculo pingui & Urina mariti ad cochlear. assumpta, pro specificis laudantur.
- 3 Spermat. Cet. cum potu calido Thee vel jusculo assumptum, efficaciam aliquam exerere experientia docuit.
- 3 Forestus Decoct. Chamom. in Cerevisia vel Decoct. Artemis. & Chamom. in jure pulli, felici successu se exhibuisse testatur.



- 5 Tinctura Succini cum  $\nabla$  Cinam. extracta & exigua syrupi Cinamom. quantitate temperata, specificè laudatur a Baglivo.
- 6 Nostrates Obstetrices exhibent Puerperis  $\text{g}$   $\text{o}$  amygd. dulc. ad  $\text{zj}$ . & Syrup. Violar.  $\text{zss}$ .
- 7 A pellentibus & Carminativis fortioribus abstinendum est.
- 8 Ambrata in iis, quæ passionibus hysterice obnoxie sunt, minus conveniunt.

## CAPUT SECUNDUM.

D E

## Diarrhæa Choleriodes.

- I. *Definitio.* **D**iarrhæa Choleriodes est fluxus alvinus, cum magnis doloribus & non raro febricula inflammatoria stipatus, puerperis non raro lethalis.
- II. *Differentia.*
  - A Diarrhæa simplici, refrigeratione ortum debente, nullaque tormina, multo minus febrem conjunctam habente.
- III. *Signa.*
  - 1 Cognoscitur ex frequenti dejiciendi stimulo.
  - 2 Concurrentibus torminibus & exquisitis doloribus.
  - 3 Febricula plus minus intensiori.
  - 4 Adest plerumque sitis satis insignis, cum appetitu prostrato.
  - 5 Nec non sanguinis lochialis imminutio vel plenaria cessatio.
- IV. *Subjecta.*
  - 1 Animi pathematibus obnoxie, iisdemque vehementer agitatae.
  - 2 Refrigeratione nimia corpus alterantes.
  - 3 A variis causis sanguinis lochialis suppressionem incurrentes.
  - 4 Diæta cruda, potuque minus defæcato, frigido utentes.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Quamdiu febris nondum concurrat, res adhuc in vado est.
  - 2 Quod si vero dolores sint exquisiti febrisque ardeat, magnum periculum imminet.
  - 3 Nunquam hæc Diarrhæa, etiamsi levior sit, vilipendenda, facile enim insignia damna post se ducere potest, puerperamque brevi temporis spatio interficere.
- VI. *Remedia.*
  - 1 Materiam biliosam acrem eliminant per alvum Pilulæ polychr. D.D. Stahlii & Beccheri, nec non Rhabarbarina: Rhabarbarum elect. in subest. tostum, Syr. Rhab.
  - 2 Eandem temperant absorbentia: CrySTALL. mont. ppt. Oc.  $\text{ss}$ . ppt. Unic. foss. Conch. ppt. Mater perlar. ppt. Mucilaginosæ: Cremor Hordei, Gelatin. C.C. Ebor. cum paucis Croco.
  - 3 Corrigunt eandem fibrisque prospiciunt amariüscula & tonica: Rad. Gentian. r. Cort. Orum, Schacarilla.
  - 4 Dolores mitigant Anodina correctæ: Mass. Pil. e Cynogl. Theriac. cælest.

## Formula Remediorum.

- 1 Pil. laxantes & balsamicæ.  
*Rx. Pil. polych. D.D. Stab.  $\text{zj}$  vel alternis diebus  
Dentur singulis mane gran. XV.*
- 2 Pulvis laxans.  
*Rx. Rhab. tost.  $\text{zss}$ . D. pro 1. vice.*
- 3 Alius temperans.  
*Rx. CrySTALL. mont. ppt.  $\text{zij}$ . Cinnab.  $\text{zij}$ . a.  $\text{zss}$ .  
Oc.  $\text{ss}$ . ppt. ms. F. Pulv. Dos.  $\text{ij}$ . ter.  
Matr. perl. ppt.  $\text{zj}$ . vel 4. per diem.  
 $\text{zij}$  diaph.*

- 4 Alius temperans & Anodynus.  
*Rx. CrySTALL. mont. ppt.  $\text{zj}$ . ms. F. Pulv. div. in  $\text{vj}$ . part.  
Matr. perl. ppt. æq. divis. d. ad quinas  
 $\text{zij}$  diaph. a.  $\text{zss}$ . vel senas horas.  
Theriac. cælest. gr.  $\text{iiij}$ .*
- 5 Potio discutiens & tonica.  
*Rx.  $\nabla$  Card. bened. CrySTALL. mont. ppt.  
Mar.  $\text{zij}$  diaph. a.  $\text{ij}$ .  
Fl. Samb.  $\text{zj}$ . Syrup. Corall.  $\text{zss}$ .  
Cinam. cydon.  $\text{zss}$ . ms. d. cochleatim.  
Extr. cort. Schacar.*

## 6 Species pro Infuso.

- Rx. Rad. Gentian. Card. bened. a. Mss  
Helen. Incis. inf. in  $\nabla$ . s. & usur-  
Cort. Schacar. a.  $\text{zss}$ . pentur loco potus Thee,  
Herb. Scord. bis per diem.*
- VII. *Methodus medendi.*
  - 1 Eo allaborandum, ut materia acris biliosa quam primum e corpore eliminetur, quod optime per Rhabarbarina & Clysteres obtinetur.
  - 2 Interponenda & subjungenda sunt absorbentia & temperantia, parvis & repetitis potius quam majoribus dosibus exhibenda.
  - 3 Dolores mitigentur per correctæ Anodyna, caute reliquis remediis conjungenda.
  - 4 Partes relaxatæ roborentur interne per tonica & amara; externe per Fomenta, & Epithemata sicca.
- VIII. *Cautela Practicæ.*
  - 1 Ab omnibus stimulantibus & fortioribus evacuantibus abstinendum est.
  - 2 Nitrosa etiam non adeo large exhibere convenit, dilutata tamen in potu commendari possunt.
  - 3 Sufficiens potus haud denegandus est, repetitis potius vicibus quam largioribus haustibus & quidem tepidum eundem assumere decet.
  - 4 Adstringentia & Opiata fugienda sunt.
  - 5 Extractum Corticis Schacar. sicuti in omnibus fluxibus alvinis ita & in hoc egregie sese gerit.
  - 6 Clysteres, qui injiciuntur sint primo abstergentes, mucilaginosi, postea subadstringentes & tonici.

## CAPUT TERTIUM.

D E

## Tumore Abdominis.

- I. *Definitio.* **T**umor abdominis est deformis Ventris Intumescencia a puerperio remanens & ligaturæ abdominis post partum neglectæ præcipue originem debens.
- II. *Differentia.*

Distinguitur facile ab aliis Ventrismumoribus. Hic enim immediate puerperium excipit, statarius fere est, & nulla alia nisi flatulenta quandoque incommoda post se ducit. Reliqui vero tumores, ut Ascitici, Tympanitici, Gravidarum ex aliis concurrentibus circumstantiis levi negotio dijudicantur.
- III. *Signa.*
  - 1 Turgities abdominis nulla notabili duritie sed mollitie potius conspicua.
  - 2 Concurfus facilis flatulentorum & torminosorum Pathematum.
- IV. *Subjectum.*
  - 1 Debitam abdominis post partum ligaturam negligentes.
  - 2 Lochiali excretionem minus bene depuratæ.
  - 3 Quæ in Puerperio regimen Diæticum haud curavere.
- V. *Prognosis.*
  - 1 Nihil mali involvit hic tumor, nisi quod aliqualem molestiam fæminis pariat.
  - 2 Facile tamen affectibus flatulentis & ataxiæ mensium occasionem subministrat.
  - 3 Quod si diutius jam substitit, Medicique auxilium neglectum est, Curationis spes fere frustranea est.



VI. *Remedia.*

- 1 Lenia Laxantia : Noduli laxativi ex Rhabarb. Senn. Fibr. Helleb. nigr. Tamarind. Sal. Angl. Cathart. amar. Cryfall. Tartari. Sal. polychr. Pilulæ Balsamicæ D. D. Stahlii, Beccheri, Orphanotroph. Halens.
- 2 Resolventia & Carminativa : Rad. Caryoph. Helen. Brion. Taraxac. Pimpinell. alb. Herb. Absinth. Chæref. Beton. Fumar. Capill. Qris, Origan. Cuscut. Tart. Vitriol. Arcan. dupl. Tart. Tartar. Liq. terræ. fol. Tartari, Essentia Carmin. Wedel. Cort. Orum. Liq. C. C. Succin. Spir. falis ammon. anisat. Externe Linimenta ex  $\circ\circ$  Chamom. Matricar. Aneth. Menth. crisp. lumbr. terrestr. N. M. express. Balnea ex Rad. Aristol. rot. Bryon. Herb. Meliss. Artemis. Ror. mar. Abrotan. Bacc. Laur. Sem. Lini.
- 3 Tonica, Martialia: Tinct. Vitriol.  $\sigma$  tis Ludov. Zwelferi, e Pom. Cydon. Helleborat. Wedelii.

*Formula Remediorum.*

## 1 Nodulus laxans.

Rx. Rad. Bryon. Cryfall. Tartari  $\zeta$ ss.  
 Pimpinell. alb. Sem. Fœnic.  
 Polypod. Qu.  $\alpha$ .  $\zeta$ ss. Cort. winteran.  $\alpha$ .  $\zeta$ ss.  
 Herb. Absinth. Incis. contus. infund. in  $\text{libj}$ .  
 Beton.  $\nabla$  fervent. et  $\text{libj}$ . Vin.  
 Origan.  $\alpha$ . Mfs. Gen ros.  
 Foll. Senn. f.  $\text{jt}$ .  $\zeta$ j. Dos.  $\zeta$ vj. viij. alternis diebus.  
 Rhabarb. elect.  $\zeta$ ij.  
 Fibr. Helleb. nigr.  $\zeta$ j.

## 2 Pilulæ laxantes.

Rx. Pil. Beccher.  $\zeta$ ss. quotidie gr. XV.  
 Usurpentur per 14. dies

## 3 Essentia Carminativo-discutiens.

Rx. Essent. cort. Aurant. ms. usurpentur bis per diem  
 $\text{ij}$ . gutt. 30.

Alexiph. Stahlii  $\zeta$ i.

## 4 Alia.

Rx. Essent. Carminat. wed. Mac.  $\zeta$ ss.  
 $\zeta$ ij. ms. usurpetur, ut præcedens.  
 Cort. Orum.  $\zeta$ j.

## 5 Alia, Tonica.

Rx. Tinct.  $\sigma$  tis Helleborat. Usurpentur singulis mane  
 wed.  $\zeta$ ij. ne gutt. 30.

## 6 Linimentum Carminativum.

Rx.  $\circ\circ$  Chamom. Cer. par. f. Linim. Ven.  
 Matricar. tri calide inungendum.  
 Castor.  $\alpha$   $\zeta$ ss.  
 N. M. expr.  $\zeta$ j.

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Ut uterus a reliquiis puerperii repurgetur, convenit nodulum laxativum, Pilulas Beccheri genuinas vel alia appropriata laxantia in usum vocare.
- 2 Interponi & subungi possunt, quæ materiam adhuc stagnantem incidunt & discutiunt.
- 3 Golophonis loco Tonica & præcipue Martialia, correctæ in usum vocentur.

VIII. *Cautela Practicæ.*

- 1 A Fortioribus laxantibus sibi cavendum est. Præ aliis in nostro affectu laudem merentur Pilulæ Stahlianæ vel Beccherianæ veræ. Earundem tamen locum refarcire possunt Noduli laxativi.
- 2 Carminativa calidiora aliaque interna, sanguinem exagitantia minus conveniunt.
- 3 Eitentur esculenta & potulenta, quæ multum flatuum generant, nec non cibi crudioris consistentiæ.
- 4 Durante puerperio a laxantibus fortioribus omnino abstinendum est. Noduli laxativi etiam finito demum puerperio in usum vocentur.
- 5 Pilulæ vero Beccherianæ & Stahlianæ quovis tempore secure in usum trahi possunt.

## S E C T I O V.

D E

## LACTANTIUM AFFECTIBUS.

## C A P U T P R I M U M.

D E

*Lactis Abundantia.*

I. *Definitio.* **L**actis abundantia est Lactis justo copiosior, quam recens natus requirit, in mammis productio, plerumque cum dolore & tumore, non raro etiam inflammatione mammarum conjuncta.

II. *Differentia.*

Est vel vera, a Matris saniori constitutione originem habens, vel accidentalis & notha, a suctione rario-ri vel intermissa infantis debilioris, mortui vel ablati producta.

III. *Signa.*

- 1 Turgescent mammæ & tumores nodosi plures conspiciuntur.
- 2 Lac tenue effluit & vestimenta, mammis incumbentia, madefacit.
- 3 Conjungitur dolor plus minus exquisitus.
- 4 Et nisi auxilium feratur, Inflammatio & abscessus mammarum succedunt.

IV. *Subjectum.*

- 1 Vegetæ, plethoricæ, saniores & succulentæ.
- 2 Alimentis evchymis in largiori quantitate utentes.
- 3 Infantes diutius a mammis arcenses.
- 4 Debiliores infantes vel nimis parvos possidentes.
- 5 Vitæ otiosæ & sedentariæ assuetæ.
- 6 Puerperæ saniores, post aliquot demum dies foetum mammis apponentes.
- 7 Foetu vel infantibus suis privatæ.

V. *Prognosis.*

- 1 Abundantia Lactis, facillime tumores & nodosas collectiones post se ducit.
- 2 Non raro etiam Inflammationes & Abscessus mammarum succedunt, quæ insignes dolores Lactantibus pariunt.

VI. *Remedia.*

- 1 Suctio ab alio infante vel catulo, mammis applicato, vel feminis pauperculis ad hanc rem sese offerentibus, vel ipsa Lactante pervitra facienda; nec non Emulsio Mammarum.
- 2 Venæsectio, vel Scarificatio in plethoricis, Diæta parcior, lenia laxantia per Mannam, Panaceam solutivam, Sennam, Tamarindos, sufficiens corporis labor.
- 3 Discutientia & lac plenarie consummentia, interne: Essentia Alexipharmaca Stahlii, Tinct. Tartar.  $\zeta$ ij, Arcan. dupl. Tartar. Vitriol. Sal. polychr. Glas. Tartar. Tartarifat. Vini & Aromatum usus paululum largior Externe: Herb. heder. terrestr. Petrosel. Menth. Calaminth. Apii, Chæref. Sem. Coriandr. Agni cast. Petrosel. Empl. Diaphoret. Myns. de Spermat. Cet. resolv. D. Heinrichi, Spiritus Vini Camphoratus, crocatus, instillatio lactis Lapidis ignito vel cadaveri mortuo.

*Formula Remediorum.*

## 1 Potio laxans.

Rx. Mann. Calabr.  $\zeta$ ij. Dissolv. in  $\nabla$  fragor.  $\zeta$ iv.  
 Sal. polych.  $\zeta$ j. Colat. d. proj. vice.

## 2 Pulvis Laxans.

Rx. Magnes. alb.  $\zeta$ j. Emulsione amygd. d.  
 Usurpetur in potu vel in D. pro 1. vice.



## 3 Essentia discutiens.

R. Essent. alexiph. Stahlii. *ms d. 30. gutt. bis per diem.*  
Pimpinell. alb. ʒiſs

## 4 Alia.

R. Tinct. ʒij. Tartar. ʒij. *ms usurpetur, ut præcedent.*  
Essent. alexiph. Stahlii ʒj.

## 5 Epithema Discutiens.

R. Herb. Chæref. rec. *Menth. a. Mſs.*  
Petrosel. *Incis. applicentur.*

## 6 Sparadrapum emolliens &amp; discutiens.

R. Sev. hircin. ʒiſs. *Liquefactis inting. linteum*  
Cer. Virg. ʒij. *& applica.*  
o o Chæref. ʒiij.

## 7 Emplastrum resolvens.

R. Emplastr. e Spermat. Cet. *Malax. o o chæref. &*  
ʒiſs. *applic. mammis.*

## 8 Aliud.

R. Empl. resolv. Heinr. *Malax. o o Ment. & appl.*  
ʒiſs.

## VII. Methodus medendi.

- 1 In vera abundantia sanguinis ab alimento superfluo proveniente frequens infantis proprii vel etiam alius applicatio optimum remedium est. Refarcire quoque hoc officium potest catulus recens, vel fœmina quæpiam. His vero deficientibus instituatur Emulſio.
- 2 Eodem in casu convenit Venæsectio & Scarificatio, nec non lenior laxantia, motus corporis & Diæta parcior.
- 3 In negligentiori Infantis appositione Lactans officii sui commonefacienda est.
- 4 Si infans nimis debilis est, alius applicetur infans, vel mammæ emulgeantur.
- 5 Si Puerpera haud nutrire velit infantem vel nutritum ablactare, adhibeantur præter interna, externa præcipue, quæ lac discutiunt & plenarie dissipant.

## VIII. Cautela Præctica &amp; Observationes.

- 1 Si Puerperæ post partum nimis sero fœtum suum mammis applicant, in tumores & non raro inflammationes mammarum incidunt.
- 2 Rad. Armor. Acet. infusa aut alio modo assumpta lac imminuere creditur.
- 3 Waldschmidus loco Empl. sperm. cet. Cinnab. nat. cum ʒ Fl. Samb. vel cera efficaciter applicari afferit.
- 4 Frigida, & humidiora externe minime conveniunt.
- 5 Venæsectio in pede & mensium fluxus lactis proveniunt largiori aliquantisper resistunt.

## CAPUT SECDNDUM.

## D E

## Defectus Lactis.

## I. Definitio.

**D**efectus Lactis est minor, quam ad fœtum nutriendum requiritur, Lactis copia, a variis causis originem habens.

## II. Differentia.

Est vel totalis, quando ob senium, nutrimenti defectum, morbos concurrentes, acutos aut alios chronicos plane nihil lactis in mammis generatur; vel partialis, ubi nutrix lacte non omnino destituitur, sufficiente tamen pro fœtu alendo irrorandoque haud instructa est.

## III. Signa.

- 1 Infantes sufficiens lac in mammis haud inveniunt clamitant continuo & inquieti sunt.
- 2 Pannos, quibus involvuntur, rarius & parum madefaciunt.
- 3 Nullum corporis incrementum capiunt.
- 4 Mammæ vero Lactantium sunt vel flaccidæ vel carnosæ nimis, turgitie conveniente, Lactis abundantiam præ se ferente, destitutæ.

## IV. Subjectum.

- 1 Mulieres debiles, temperamenti calidioris ac siccioris.
- 2 Morbis acutis vel chronicis laborantes.
- 3 Infantem rarius mammis apponentes.
- 4 Animi pathematibus, præprimis mœrore, nec non pre fortius agitata.
- 5 Victu conveniente destitutæ.
- 6 Parum bibentes & lac crassius generantes.
- 7 Vigilis quoque nimis & laboribus necessarium corporis alimentum consumentes.
- 8 Immodicas mensium vel lochiorum excretiones passæ.
- 9 Diutius jam Lactationis munere functæ.

## V. Prognosis.

- 1 Quod si in organis lactis generationi destinatis lateat vitium, defectus lactis difficillime corrigitur.
- 2 Qui a causis occasionalibus, morbis acutis vel chronicis, animi pathematibus, Diæta incongrua originem sumit, his mox remotis, medelam admittit.
- 3 Insignem defectum lactis sufficienti ejusdem copię subito succedere, sæpius vel morbos graviores vel philtia innuit.

## VI. Remedia.

- 1 Lacti materiam convenientem subministrant alimenta evchyma & evpepta; Pineæ, Amygdalæ d. Pistaciæ, Avellanæ, Pulticulæ ex Hordeo, Oryza, Avena, ova Sorbilia, Lac Vaccinum, ovinum, caprinum, asinum, juscula Carnium tenuium, Vitulin. Agn. Caponum, Gallinarum, Sem. Coriandr. Fœnic. Cumin. Nigell. flor. Sambuc. Lardum, cum lacte decocta, Gelatinæ C.C. & Eboris amygdalata.
- 2 Salsedinem feri corrigunt Lumbr. terrestr. CrySTALL. mont. ppt. Lac. Lun.
- 3 Sanguinem sicciorē temperant Nitrata, Emulſiones, Gelatinæ, Potus sufficiens.

## Formula Remediorum.

## 1 Decoctum nutriens.

R. Flor. Sambuc. Mj. *Cog. in Lact. Vaccin. ʒij. d.*  
Sem. Fœnic. ʒij. *4. vicibus.*

## 2 Emulſio nutriens.

R. Amyg. d. exc. ʒi. *Edulo. Sacchar. albiss. ʒiſs.*  
Pinear. mund. ʒiſs. *Add. Lact. Lun. ʒij.*  
c. Decoct. C.C. ʒviii. *D. pro 2. vicibus.*  
F.l.a. Emulſ.

## 3 Pulvis Lac. augens.

R. Sem. Anis. *Sacchar. albiss. ʒiſs.*  
Fœnic. ʒ ʒiſs. *ms F. Pulv. bis, ter per diem*  
Nigell. ʒiſs. *ad ʒi. sumendus.*

## 4 Alius in Salsedine Lactis.

R. CrySTALL. mont. ppt. ʒij. *Macis ʒiſs.*  
Lumbric. terrestr. ppt. ʒij. *Sacchar. albiss. ʒij.*  
Sem. Fœnic. ʒiſs. *ms. Dos. ʒiſs. in jussculo.*

## 5 Alius.

R. Lact. Lun. *Card. Mar. a. ʒi.*  
CrySTALL. ppt. a. ʒiſs. *ms F. Pulv. d. bis, ter per*  
Sem. Nigell. *diem ʒi.*

## 6 Pulvis temperans.

R. CrySTALL. mont. ppt. *Cinnab. ʒij. ʒi.*  
Lact. Lun. *ms F. Pulv. Dos. & usus ut*  
Nitri depurat. a. ʒi. *præcedentis.*

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Ubi nutrimenti defectus adest, commendentur alimenta potius bene nutriencia, quam medicamenta.
- 2 Quod si vero Lactis defectus a morbis concurrentibus originem suamumat, horum ante omnia ratio habeatur; his quippe profligatis, eo melius per alimenta modo commendata restitui poterit Lactis copia.
- 3 In præsentē Salsedine feri adhibeantur absorbentia, præmissa leni laxatione per Mannam aut Pilulas Stahlianas vel Beccherianas.
- 4 Quando temperamentum sicciorē, Cholericum vel Melancholicum proventum lactis impedit, commenduntur.



dentur sufficiens potus Thee, Hordei tosti, Emulsiones, Gelatinæ & in orgasino Sanguinis Nitrata.

### VIII. *Cautela & observationes.*

- 1 Sæpissime Lactis defectus non in utraque sed una tantum mamma observatur, quod plerumque a diversa dispositione glandularum & rubulorum dependet.
- 2 Cucurbitulas dorso applicatas lactis abundantiam imminuere experientia testatur.
- 3 Frictiones sanguinem ad mammas invitant; sed cavendum, ne fortius instituuntur & inflammationi mammarum ansa præbeatur.
- 4 Lapis Galactites, tanquam Amuletum collo appensus, viam suam specificam in producendo lacte nondum confirmavit.

## CAPUT TERTIUM.

### Lactis Vitia.

**I. Definitio.** Lactis Vitia sunt Lactis qualitatis læsiones, a diversis causis originem suam sumentes.

### II. Differentia.

Lac in qualitate sua læsum differt:

- 1 Ratione consistentiæ: aliud est aquosum nimis a tenue, crassum aliud, coagulatum, mucidum.
- 2 Ratione saporis: aliud est falsum, acidum aliud, a bilioso-acre.
- 3 Ratione coloris: aliud est flavum vel subviride, sub-æthereum aliud.
- 4 Ratione odoris: acidum aliud, aliud ingrati odoris.
- 5 Differt a Lacte sano, quod est albissimum, dulcissimum, grati odoris, & debitæ consistentiæ, guttatim unguibus instillatum haud defluens.

### III. Signa.

a Lactis tenuis & aquosus:

- 1 Unguibus guttatim instillatum instar aquæ statim diffuit.
- 2 In vascula vel cochlearia collectum parum cremoris præbet, plurimum vero feri.

b Crassioris & mucidioris.

- 1 Signa fere contraria, unguibus instillatum iisdem firmiter inhæret.
- 2 Parum feri vasculis exceptum exhibet.
- 3 Difficulter e papillis prodit.
- 4 Glandulas mammarum aliquando turgidas reddit & obstruit.

c Bilioso-acris:

- 1 Cognoscitur ex sapore & non raro etiam odore.
- 2 Ejulatus & torminibus ipsius infantis.
- 3 Excrementis biliosis, viridibus, linteamina fere corrodentibus.
- 4 Siti præternaturali, aphthis & Convulsionibus non raro accedentibus.

### IV. Subjctum.

a Lac tenue & aquosum generant.

- 1 Phlegmaticæ & victu aquoso utentes.
- 2 Omnes fere Puerperæ in lactationis initio, nec non provectioris ætatis fœminæ, alimento superfluo destitutæ.

b Lac crassius exhibent:

- 1 Vitæ sedentariæ assuetæ & parcius bibentes.
- 2 Cibis crassioribus, mucidioribus utentes.
- 3 Sudoribus nimis, & diarrhœis fero suo privatæ.
- 4 Animi Pathematibus, mœrori & tristitiæ obnoxia.

c Lac bilioso-acre producunt:

- 1 Cholericæ, iracundiæ deditæ.
- 2 Salsis, aromatibus, acidis abutentes, & Vinum largius ingurgitantes.

### V. Prognosis.

- 1 A lacte tenuiori infantes nulla capiunt augmenta & sæpius Diarrhœas incurrunt.

2 Lac acre biliosum Vomitus, Diarrhœas, tormina insignia, spasmos intestinorum & non raro Convulsiones in infantibus producit.

3 Sæpius quoque aphthæ infantum & prunellodes faucium affectus exinde originem habent.

4 Lac sola falsedine peccans, frequentissime intertriginis, aliorumque cutis affectuum causa est.

5 A lacte crassiori infantes non satis irrigantur: hinc vigilæ & ejulatus continui.

6 Idem lac, mucidos pectoris & glandularum Mesenterii obstructions producit.

### VI. Remedia.

a Lactis tenuioris.

1 Laxantia Phlegmagoga: Nodulilaxativi, Sal. Cathart. amar. Pilul. Stahl. & Beccherianæ Extra-ct. Helleb. nigr. panchym. Croll. Specif. Jalap-pin. Pulvis Cornachin.

2 Stomachica & exiccantia: Pulv. Stomach. Birckm. Quercer. Trag. suav. Spec. Diagalang. Diacynam. Imperat. Essent. Cort. Orum, Macis, Absinth.

3 Diæta sicior: Aromatum & Vini generosi usus, Carnes assatæ.

b Lactis crassioris & mucidioris:

1 Laxantia Melanagoga: Polypod Epithym. Senna sub Infusorum forma, Mercurius dulcis, Pil. Beccheri.

2 Incidentia & Resolventia: Essentia Alexiph. Stahlii, Pimpinell. alb. Tinct. Jii tartar. Sal. Polychr. Glas. Tart. Vit. Arcan. dupl. Rad. Ari ppt. Galang. Zedoar. Helen. Cort. Orum.

3 Diluentia: Potus Thee, Caffè, Hord. tost. Gelatin. C. C. Ebor.

c Bilioso-acris & Salsi:

1 Laxantia Cholagoga: Rhabarbarum, Manna, Cassia, Tamarind. Pilulæ Beccheri, Stahlii.

2 Acrimoniam obtundentia & diluentia: Oc. ꝑpt. Conch. ppt. C. C. phil. ppt. Crystall. mont. ppt. Gelatin. C. C. Ebor. Crem. Hord.

### Formula Remediorum.

1 Nodulus laxativus.

Rx. Rad. Vincetox.

Helen.

Bryon. ʒjss.

Herb. Card. Bened.

Capill. Qris.

Fumar. ʒi Mls.

F. l Genist. p. j.

Cort. Orum. ʒj.

Fol. Senn. f. fl. ʒj.

Rhabarb. elect. ʒss.

Fibr. Helleb. nigr.

Agar. albiss. ʒij.

Salis Cathart. amar. ʒiij

Sem. Fœnic. ʒiss.

Incis. d. ad ch. infund. in ʒiij.

¶ fervent. & totidem

Vini Generosi ʒss.

Usurpentur alternis diebus

ʒvi. viij.

2 Infusum laxans.

Rx. Fol. Senn. f. fl. ʒss.

Rhab. el. ʒiss.

Crem. Tart. ʒij.

Infund. per noct. in ʒ f. vel

brod. prun. dulc.

Mane bulliant parum; Co-

latura clara calide as-

sumantur.

3 Potio Mannata.

Rx. Tamarind. ʒss.

Rhabarb. el. ʒij.

Salis polychr. ʒss.

Coq. in f. q. ʒ f. in Colat.

ʒiijss.

Dissolv. Mann. Calab. ʒiss.

4 Pulvis Stomachicus.

Rx. Pulv. Stomach. Birckm.

ʒij.

Herb. Card. Bened.

Cort. Orum.

Fl. Cent. min.

Crem. Tart. ʒj.

F. Pulv. bis vel ter per diem

ad ʒj. assumendus.

5 Essentia Stomachica.

Rx. Essent. Absinth.

Cort. Orum ʒjss.

Mac. ʒij.

ms Dos. gutt. 30. bis per

diem.

6 Essentia incidens.

Rx. Essent. alexiph. Stahlii.

Pimp. alb. ʒij.

ms Usurpetur, ut præcedens;

7 Alia.

Rx. Essent. alexip. Stahlii.

Tinct. Tartar. a. ʒiss.

ms. Usus ut præcedentis.

8 Pulvis contra acredinem.

Rx. Oc. ꝑpt.

Crystall. mont. ppt.

C. C.



C. C. phil. ppt. ʒj.

Nitri depurat.

Salis polychr. a. ʒss.

ms. F. Pulv. Dos. ʒj. bis vel  
ter per diem.

## CAPUT QUARTUM.

DE

Tumore Apostematode Mammarum.

R. Gelatin. C. C.

Ebor. a. ʒiv.

m. d. ad. Vasc.

9 Gelatina.

Quotidie ad 4. ʒ. coctilearia  
sumenda.

## VII. Methodus Medendi.

Secundum varietatem vitiorum Lactis Cura variat.

## a In Lacte tenuiori:

- 1 Laxantia leniora in usum trahenda sunt.
- 2 Subjungantur Stomachica & Balsamica, vigorem balsamumque sanguinis restituentia.
- 3 Inprimis Diæta conveniens instituat, serum superfluum discutiens & per urinarias vias educens.

## b In Lacte simpliciter crasso:

- 1 Adhibeantur diluentia, Gelatinosa, potus sufficiens.
- 2 Evitetur Aromatum & Vini abusus.

## c In Lacte crasso &amp; simul mucido.

- 1 In usum trahantur Laxantia, mucorem incidentia & evacuantia.
- 2 Interponantur & subjungantur resolventia & incidentia salina, diuretica efficacia instructa.

## d In salsedine &amp; acrimonia biliosa.

- 1 Post evacuationem per Rhabbarum, Cassiam, Tamarindos, præscribantur absorbentia, acrimoniam humorum destruentia.
- 2 Commendentur Gelatinosa, Mucilaginoso.
- 3 Dissuadeantur Aromatica, spirituosas, animique pathematum furor.

## VIII. Cautele Prædicæ &amp; Observationes.

- 1 In Nutricibus lactantibus non tantum Lac, sed & aliæ circumstantiæ examinandæ, ne lue, qua sæpius laborant, delicatulos inficiant.
- 2 Mores perversos per lac infantibus haud communicari certissimum est.
- 3 Quandoque, licet rarissime, lac tales refert colores, quibus alimenta vel medicamenta a Nutricibus assumpta prædita erant, quale quid de Rhabbaro & Vino supra cerasa recentia infuso M. N. C. Dec. II. A. VI. testantur.
- 4 Acidorum, Salsorum, Aromaticorum, & Spirituosorum abusus Lacti summopere nocuus est.
- 5 Diæta quoque valde cruda, nisi Natura robustior & labor strenuus concurrat, parum emolumenti lacti præstare potest.
- 6 Frigus mammas lacte turgidis inimicum est; unde ab eodem sibi cavendum.
- 7 Lac tenue in puerperis primis diebus occurrens nullam medelam exposcit, inservit potius meliori mediconii evacuationi.
- 8 Nihil magis detrimenti lacti affert, quam animi pathematum furor; unde vitandus.
- 9 Ubi autem ex improvviso dominium jam suum exercuit, ibi laxantia, absorbentia & mammarum Emulctus in auxilium vocanda sunt, arcendo infantem per aliquot tempus a mammas.
- 10 Nutricibus & Lactantibus Vinum haud in largiori quantitate exhibendum est; exiccat enim lac & spirituosum nimis reddit, infanti parum deinde proficuum.
- 11 Mensium fluxus, durante lactatione, sese sistens, varias sæpe alterationes excitat.
- 12 Infantes delicatiores a frigida & fructibus horæis, a Nutricibus clam sæpius ingesta, graviter afficiuntur; unde talia interdicienda sunt.
- 13 Optimum Lac a Matre ipsa petitur; Nutricum enim plerumque plura conjuncta habet incommoda.

## I. Definitio.

**T**umor Mammarum apostematodes est inflammatio earundem cum dolore, & rubore ad abscessum vergente conjuncta, a sanguinis lactisque stagnatione originem ducens.

## II. Differentia.

- 1 Differt a Scirrho Mammarum, ubi nulla inflammatio, sed tantum durities in hac vel illa Mammarum parte & quidem absque dolore & rubore occurrit.
- 2 A cancro quomodo distinguatur, vid. Tab. de Cancro.
- 3 A Collectionibus Mammarum nodosis, affluxui uberiori lactis, ejusque stagnationi originem debentibus, & nulla adhuc inflammatione stipatis.

## III. Signa.

- 1 Cognoscitur ex tumore duro ab initio, inflammatione, dolore & rubore stipato.
- 2 Doloris sensus est pulsatorius, cui semper febricula aliqua jungitur.
- 3 Appetitus fere est prostratus, sitis vero solito auctior.
- 4 Quando abscessus formatus est, in medio Inflammationis punctum albicans sese conspiciendum præbet, quod incisum, vel sponte ruptum, pus & ichorem in larga sæpius quantitate fundit.
- 5 Rupto abscessu & evacuato pure, omnis fere dolor disparet & reliqua etiam symptomata imminuuntur.

## IV. Subiectum.

- 1 Plethorica, sanguinea, succulentum Corporis habitum præ se ferentes.
- 2 Lactis copiam largiorem generantes, nec eadem debito modo liberata.
- 3 Primipara, in quibus tubuli mammarum nondum satis prævii sunt.
- 4 Quæ infantes subito ab lactant.
- 5 Erysipelaceis mammarum affectibus obnoxia.
- 6 Quæ mammas lacte turgidas frigido aeri exposuere.

## V. Prognosis.

- 1 Inflammatio mammarum quo diffusior est, eo exquisitiores dolores conjunctos habet.
- 2 Tumorem durum sensim ad mollitiem vergere, abscessum succedere innuit.
- 3 Periculosa haud est hæc inflammatio; quando tamen perverse tractatur, in fistulas, scirrhos & canculos abire potest.
- 4 Quando abscessus formatus est & sponte haud ruptur, incisio vero negligitur, tunc materia purulenta partes vicinas inficit, sinusque difficulter postea curabiles sibi format.

## VI. Remedia.

- 1 Laxantia leniora: Pilulæ Balsamicæ D. Stahlî, Becheri, & nostrates, Manna, Rhabbarum, Senna, Panacea Solutiva.
- 2 Absorbentia & Diaphoretica fixa cum Nitratis & Cinnabarinis; Oc. ʒ ppt. Conch. ppt. C. C. phil. ppt. ʒ diaph. Bezoard. min. Sal. ʒtum, depuratum perlat. Cinnab. ʒii, nativ. ppt.
- 3 Discutientia externa: Empl. resolv. D. Heinrichi, e spermat. Cet. diaphoret. Myns. Melilot. Spiritus Vini Camphorat. crocat.
- 4 Maturantia; Empl. filii Zachariæ, e Mucilagibus, Diachyl. simpl. & cum gumm. anaticæ comixta.
- 5 Mundificantia & Balsamica; Liquam. Myrrh. Essentia Myrrh. Succini, Spiritus Terebinth. Balsam. Sulph. Terebinth. Empl. diasulph. Rulandi, Opodeldech Paracelsi.



## Formula Remediorum.

## I Infusum laxans.

R. Fol. Senn. f. st. ℥ij. *Mane bulliant parum ;*  
*Rhabab. elect. ℥iſs. in Colat. ℥iſs.*  
 Crystall. Tart. ℥ij. *Dissolv. Mann. Calabr. ℥j.*  
*Infund. per noct. in f. q. v. f. sumatur calide.*

## 2 Pilulæ Balsamicæ.

R. Pil. polychr. D. Stahlī *D. pro 2. vicibus.*  
 ℥ſs.

## 3 Pulvis Diapnoicus.

R. Conch. ppt. *Cinnab. ℥ij. ℥ij.*  
 ℥ii diaph. *ms. f. Pulv. bis vel ter per*  
 Nitr. perlat. *diem ad ℥j. summendus.*  
 Salis polychr. a. ℥j.

## 4 Emplastrum discutiens.

R. Empl. resolv. D. Heint. *Add. Camph. gr. vj. vel ℥ſs.*  
 ℥ſs. *Applicetur loco dolenti.*  
 Malax. o o charef.

## 5 Emplastrum maturans.

R. Emplastr. e Spermat. Cer. *Malax. o o ovor.*  
 Diachyl. cum gum. *applicetur calide.*  
 a. ℥ij.

## 6 Essentia mundificans.

R. Essent. Myrrh. *ms. applicetur guttatim cum*  
 Succin. a. ℥j. *plumaceolis.*  
 Spir. Terbinth. ℥j.

## 7 Emplastrum Consolidans.

R. Emplastr. Diasulph. Ru- *Malaxat. o o Nuc. ju-*  
 landi ℥j. *gland. applicetur.*

## VII. Methodus Medendi.

- 1 In Tumore & inflammatione Mammarum adhibeantur discutientia externa, internis temperantibus & diapnoicis simul in usum vocatis.
- 2 Quando his nil obtinetur, & inflammatio ad abscessum vergit, maturantia substituenda sunt.
- 3 Maturatione facta, aperiatur abscessus per lanceolam, nisi sponte rumpatur.
- 4 Tandem pure evacuato & emolliitione sufficiente facta, mundificantia in usum trahantur.
- 5 Caro vero luxurians, si quæ concurrat, per lenia septica tollatur.

## VIII. Cautela &amp; Observationes.

- 1 Ab initio a maturantibus & emollientibus desistendum est, præstat rem discutientibus aggredi.
- 2 Hoc tempore sparadrapum Cera, Sevo Cervino & o o rosarum liquefactis paratum officium præstitisse sæpius observavi.
- 3 Formulæ nimium aquosæ, refrigerandi scopo commendatæ, plerumque magis incommodi quam emolumenti præstant.
- 4 In nodosis Collectionibus & Erysipelaceis affectibus Emplastra resolventia & sparadrappa similia egregium usum habent.
- 5 Interna remedia nunquam negligenda sunt; inprimis eo allaborandum, ut alvus quotidie officio respondere, ne major sanguinis affluxus ad mammas fiat.
- 6 Quando abscessus apertus est & difficulter sanationem admittit, usurpetur Balsamus Vulnerarius Kortholti, qui egregie mundificat & consolidationem promovet.

## CAPUT QUINTUM.

## D E

## Papillarum Fissuris.

I. *Definitio.* **P**apillarum Fissuræ sunt ulcuscula rimosa in papillis lactantium occurrentia, valde molesta & inter sugendum præcipue exquisitissimum dolorem inferentia, sanguinemque & ichorem plerumque plorantia.

## II. Differentia.

Aliæ sunt majores, foveas fere majores in papillis for-

mantes, aliæ minores, proprie sic dictas scissuras s. rhagades constituentes.

## III. Signa.

- 1 Fissuræ modo majores, modo minores, in papillis occurrentes & ulcuscula rimosa formantes.
- 2 Effluxus sanguinis vel ichoris præcipue inter sugendum conspicuus, ubi os infantis non raro sanguinolentum redditur.
- 3 Acerbissimorum dolorum, eodem tempore maxime sævientium, concursus.

## IV. Prognosis.

- 1 Primiparæ & juniores papillis tenerioribus gaudentes.
- 2 Ab infantibus robustioribus vulneratæ, per dentes vel fortiolem suctionem.
- 3 Aphtharum Infantum vitiis inquinatæ.

## V. Prognosis.

- 1 Præter summam molestiam & acerbissimos dolores nihil periculi inferunt.
- 2 Ob infantum tamen frequentiore suctionem difficillime sæpius sanatur, nisi in principio medela affertur.
- 3 Quando negligentius vel perversè tractantur, corruptionem concipiunt & absumuntur papillæ, ut postea ad Lactationis negotium prorsus ineptæ reddantur mulieres.

## VI. Remedia.

- 1 Humores temperantia, absorbentia & diaphoretica fixa: Oc. ℥. ppt. Conch. ppt. Unic. foss. C. C. phil. ppt. ℥ diaph. Bez. miner. cum Nitratis & Cinnabaribus conjungenda.
- 2 Diluentia & lubricantia: Potus Thee, Caffee, Hordei tosti, Gelat. C. C. Ebor. Emulsiones.
- 3 Demulcentia & Consolidantia externa: o o ovorum Lumbric. Cer. Lin cum ovis conquassatum, Unguent. O. de Glycyrrhiza, Liq. Fl. Verbasc. maris & Calend. in Clibano paratus, Butyrum cum floribus recentibus Calendulæ in formam linimenti redactus, oleum s. liquamen Myrrh.
- 4 Præservantia: Suctio matura, mediante vitro ad hoc negotium parato, cupula cerea ante & post partum imposita.

## Formula Remediorum.

## I Unguentum abstergens &amp; consolidans.

R. Unguent. e min. Camph. *℥ſs. ms. usurpetur aliquoties per diem.*  
 o o Tartar. per deliq.

## 2 Aliud.

R. Unguent. Oream. *a. ℥ij. ms. usurpetur ut prius.*  
 de Liquir.

## 3 Aliud.

R. Flor. Calend. Mſs. *Ebullitione facta exprima-*  
 Infund. in f. q. Butyr. rec. *tur & servetur ad usum.*

## 4 Linimentum abstergens &amp; consolidans.

R. Liqueam. Myrrh. cum Vittell. *Lumbr. terrestr. a. ℥j.*  
 ov. conquassand. ℥ij. *ms. Inungantur aliquoties per diem.*  
 o o Cer.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Quando acrimonia humorum subest, usurpentur interna præcipitantia, diluentia & lubricantia.
- 2 Præcipue vero omni in casu ad locum affectum intentio curatoria dirigatur, imponendo talia remedia papillis, quæ dolores demulcent, fissuras abstergunt, easdemque tandem consolidant.
- 3 Pro præservatione adhibeantur remedia modo commendata.

## VIII. Cautela &amp; Observationes.

- 1 Suctio matura antequam lac crassius evadat & stagnatione spissescat, plurimum pro præservatione hujus mali valet.
- 2 Si Papillæ in mammarum substantia profundius delitescunt, vitra, sugendi negotio destinata, in auxilium vocari possunt.
- 3 Nimix thoracis stricturæ, juvenculis propriæ, plurimum damni & mammis & papillis inferunt, unde serio dissuadendæ sunt.



- 4 Ut Topica eo melius effectum suum exerere possint, infans rarius papillis applicandus est.
- 5 Antequam infans fugat, papillæ abstergantur & post suctionem finitam topica denuo imponantur.
- 6 Laudant eximie Millepedes in Vino maceratos, expressos postea & impositos, quod experientiae commendandum.
- 7 Post inunctionem topicorum foliolum lil. alb. vel passula major inversa & ab acinis liberata egregie se gerit.
- 8 Ex fissura papillarum Nutricem quandam insignem passionem hystericam contraxisse A. N. C. recensent.

## LIBER VIII.

## DE

## MORBIS INFANTUM.

## CAPUT PRIMUM.

## De Retentione Meconii.

I. *Definitio.* **M**econii retentio est excrementorum fœtus nigricantium, Ventriculum, & intestina occupantium, neglecta evacuatio, pluribus gravibus symptomatibus posthac viam sternens.

III. *Signa.*

- 1 Meconium retentum vel insufficienter evacuatum esse colligimus, si infans recens natus *αὐτὸ* & *κατὰ* parum vel nihil materiae mucido-viscidæ nigricantis eliminavit.
- 2 Si continui clamores, inquietudines & pavores, tormina flatulenta, Convulsiones, dyspnœa, Cardiogmus succedunt.
- 3 Si tandem dejectiones decolores, biliosæ æruginosæ, vitellos ovorum referentes, sequuntur, vel intercurrent.

V. *Prognosis.*

- 1 Quo minus Meconii evacuatum est, eo plura subsequi solent symptomata.
- 2 Retentum Meconium non tantum gravissima excitat symptomata, sed & non raro ipsa mortem post se ducit.
- 3 Torminibus Infantum gravioribus facillime succedunt Convulsiones.

IV. *Subjectum.*

- 1 Infantes, quibus post partum nihil evacuandi scopo exhibitum fuit.
- 2 Qui alvo sunt strictiori.
- 3 Quibus iusto citius alimenta ingeruntur.
- 4 Quibus Colostrum Matris denegatur.

VI. *Remedia.*

- 1 Lubricantia & lenissima evacuantia:  $\circ\circ$  amygd. cum saccharo subactum, syrup. e Cichor. c Rhab. Ros. solut. e Spina Cervin. Oxymel. Squillit. Butyrum recens cum Pulvere epil. March. & Trag. alb. commixtum, nostratibus solenne, Pulticulæ e Manna, Aurum fulminans.
- 2 Laxantia leniora, puerperis & Nutricibus primis diebus exhibenda: Pilul. Beccheri, Stahlii, nostrates balsamico-viscerales.
- 3 Colostrum mox post partum fœtui ad sugendum propinatum.
- 4 Absorbentia, materiam acrem præcipitantia: Crystall. mont. ppt. Conch. ppt. Oc.  $\mathfrak{z}$  ppt.  $\mathfrak{z}$  diaph.
- 5 Temperantia, Mucilaginosa: Crem. Hord. Gumm. Tragac. Arab. Mucilag. Sem. Cydon. Psyll.
- 6 Anodyna: Cinnabaris  $\mathfrak{z}$  ii, Theriac. tantillum.

## Formule Remediorum.

## 1 Pulticula evacuans.

$\mathfrak{R}$ . Trag. alb.  $\mathfrak{z}$  ss. Butyr. rec. q. s. f. Pulticula, detur successive.

## 2 Alia.

$\mathfrak{R}$ .  $\circ\circ$  Amygd. dule. rec. Sacchar. cand. alb. q. s. f. Pultic.

## 3 Mixtura purgans.

$\mathfrak{R}$ . Syr. Rhabarb. simpl. detur successive.  
Mann. liquid.  $\mathfrak{z}$  ij.

## 4 Alia.

$\mathfrak{R}$ . Syrup. e cichor. C. Rhab. ms usurpentur, ut præcedens.  
Oxymel. squillit.  $\mathfrak{z}$  ij.

## 5 Pulvisculus purgans.

$\mathfrak{R}$ . Crystall. mont. ppt. gr. ms. detur in lacte cum paucio saccharo.  
iv.

Auri fulminant. gr. ss.

## 6 Pulvis temperans.

$\mathfrak{R}$ . Conch. ppt.  $\mathfrak{z}$  ij. Cinnab.  $\mathfrak{z}$  ii  $\mathfrak{z}$  ss.  
Antimon. crud. Hung. ms f. Pulv. ad gr. vj. vij.  
 $\mathfrak{z}$  j. cum Saccharo propinandus.  
Lambr. terrestr. ppt.

## 7 Pulvis resolvens &amp; evacuans.

$\mathfrak{R}$ . Trag. alb.  $\mathfrak{z}$  ss. lacte bis, ter per diem  
Spermat. Cet.  $\mathfrak{z}$  j. exhibendus.

ms f. Pulv. cum pulve vel

## 8 Alius temperans &amp; discutiens.

$\mathfrak{R}$ . Sem. anis.  $\mathfrak{z}$  j. Sacchar. cand. viol.  
Lapp.  $\mathfrak{z}$  ppt.  $\mathfrak{z}$  ss.  
Crystall. mont. ppt.  $\mathfrak{z}$  ms f. Pulv. usurpetur, ut  
 $\mathfrak{z}$  j. præcedent.

Croc. Or. gr. vj.

## 9 Anodynum.

$\mathfrak{R}$ . Theriac. Andromach. gr. ss. vel gr. j.  
vel detur cum plus vel  
Mithridat. Damocr. lacte.

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Pro præservandis symptomatibus, retentum Meconium sequentibus, optimum remedium est matura ejusdem evacuatio.
- 2 Quando vero jam præsto sunt, tunc in torminibus flatulentis & Cardiogmo, post lenem evacuationem, per Oxymel scylliticum & Syr. Ros. Sol. vel Rad. irid. Flor. pulverisat. ad gran. aliquot, & rium dulcem ad gr. j. ij. aut Clysterem factam, adhibeantur temperantia & discutientia: Oc.  $\mathfrak{z}$  ppt. Conch. ppt.  $\mathfrak{z}$  ium diaphoret. Bezoard. min. Confect. Anis. Sperma Cet. cum Trag. alb. commixtum, Sacculi ex Herb. Menth. Chamom. Matricar. Sem. Aneth. Ventri imponendi, vel Linimenta discutientia ex  $\circ\circ$  Chamom. Absinth. Matric. Anath. Carv. N. M. expr. ventri calide inungenda.
- 3 Si Materia admodum acris, caustica, Convulsiones minitans, adfuerit, præscribatur Aurum fulminans, quod omnia inquinamenta exturbat, sed maximas, antequam effectum exerit, anxietates & Lipothymicos quasi affectus excitat. Subjungantur deinde absorbentia & mucilaginosa.
- 4 In Diarrhœis biliosis, æruginosis & decoloribus exhibeantur etiam, post evacuantia & Clysteres, absorbentia & temperantia, nec non supra descriptus pulvis temperans, subjunctis subadstringentibus lenissimis.
- 5 In Nimiis vigiliis & inquietudinibus post usurpata evacuantia & alterantia Anodyna correctâ in refractiori dosi commendantur.

VIII. *Cautela & Observationes.*

- 1 Mercurius dulcis Infantibus aliquot menses habentibus ad gr. ij. tuto exhiberi potest.
- 2 Usus Auri fulminantis commendavit jam Etmüllerus; sed non admodum tenerrimis exhibendum, verum jam aliquot menses natis; Convulsiones potentissime præcavet.
- 3 Celebrat Blaxer in torminibus Infantum flatulentis, Cardiogmo & asthmaticis oppletionibus loco Mercurii dulcis Sulph.  $\mathfrak{z}$  ii tenerius secundum Glauberi præ-



præparationem præcipitatum cum acido Tart. a gr.  $\frac{1}{4}$  ad gran. j.

- Opiata non nisi in refracta dosi & post evacuantia  
4 & alterantia jam in usum vocata sunt exhibenda.  
Adstringentia quoque eandem cautelam requirunt;  
5 alias eximium damnum exinde emergere potest.

## CAPUT SECONdUM.

## D E

*Aphthis.*

I. *Definitio.* **A** Phthæ sunt pustulæ oris & faucium, cum inflammatione, dolore & deglutionis difficultate conjunctæ, a sanguinis & feri stagnatione originem habentes.

II. *Differentia.*

- 1 Ratione coloris: aliæ sunt albicantes, aliæ rubræ, nigricantes aliæ, prout nimirum fortius vel mitius affligunt, diutius vel brevius subsistunt.
- 2 Ratione indolis, aliæ sunt benignæ, quæ facile medicamentis cedunt, aliæ malignæ, exitum plerumque lethalem sortitæ.
- 3 Ratione causæ morbificæ: aliæ sunt idiopathicæ, absque alio morbo occurrentes, aliæ symptomatice, morbis aliis eorumque perverso regimini originem debentes.

III. *Signa.*

- 1 Pustulæ parvæ elevatæ instar fere miliis solis, Linguam & interiora faucium occupantes.
- 2 Dolorem & plerumque inflammationem aliquam conjunctam habentes.
- 3 Lingua inflata & crusta alba obducta, cum deglutione impedita.
- 4 Accedens, nisi cito prospiciatur, vicinarum partium corruptio, cum subsequente morte.

IV. *Subjectum.*

- 1 Infantes cholerici, biliosi, lac acrius fugentes.
- 2 Corpore æstuante frigido aeri expositi.
- 3 Medicamentis calidioribus tractati.
- 4 Quibus fauces & lingua nunquam abstergantur.
- 5 In febres malignas aliasque acutas incidentes, & perversè tractati.

V. *Prognosis.*

- 1 Idiopathicæ melioris sunt prælagii quam symptomatice.
- 2 Quo magis fœtidum odorem spirant & ad nigredinem inclinant, eo periculosiores sunt.
- 3 Quo recentiores vero & magis albescentes, eo magis medicamentis obediunt.
- 4 Febribus acutis & malignis conjunctæ, quæcunque eæ fuerint, plerumque lethalem eventum portant.

VI. *Remedia.*

- 1 Abstergentia: Decoctum Veronicæ, Salviæ, Saturejæ, addito paucis melle, vel Syrup. acriusculis Dianuc. diamor. Mixtura ex  $\nabla$  Salv. Flor. Samb. Veron. Mel. rosat. & tantillo aluminis, pro absterfione linguæ & faucium cum linteis vel pannis paululum asperioribus.
- 2 Laxantia leniora: Syr. e Cich. c. Rhab. Pultic. Mann. Syr. Ros. Sol. e Spin. Cerv. Pomor. laxativ.
- 3 Demulcentia interna: Mucilag. Sem. Psyll. & Cydon. cum Mel. rosat. vel Rob. diamor. Emulsiones ex Sem. 4 frig. Card. Mar. Alth. Amygd. dulcibus & aquis appropriatis: Gelatin. C. C. Ebor. Crémor. Hord.
- 4 Diapnoica, febrem concurrentem discutientia: Oc. ppt. Conch. ppt. Gum. diaph. Bez. miner. Nitr. depurat. perlat. Cinnab.  $\mathfrak{z}$  ii,  $\nabla$  diapnoicæ, Infusa, ex herbis discutientibus & pectoralibus calide sæpius propinata.

## Formula Remediorum.

## 1 Decoctum abstergens.

*R. Herb. Veron.* *Add. mel. rosat.  $\mathfrak{z}$  j.*  
*Agrimon.  $\mathfrak{a}$ . Mfs.* *Pro absterfione linguæ &*  
*Cog. c.  $\nabla$  Vin.  $\mathfrak{a}$ .* *faucium cum linteis De-*  
*Colat.  $\mathfrak{z}$  iij.* *cocto imbuto*

## 2 Mixtura abstergens fortior.

*R.  $\nabla$  Sal.* *Mel. rosat.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}$  ss.*  
*Prunell.* *Alum. ust.  $\mathfrak{z}$  j.*  
*Liquistr.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}$  iij.* *usurpetur, ut præcedens.*  
*Rob. diamor.*

## 3 Laxans pro Infante bimestri.

*R. Pulticul. Mann.  $\mathfrak{z}$  j.* *D. ad lambendum.*

## 4 Aliud.

*R. Syrup. e Spin. Cerv.* *Rhab.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}$  iij.*  
*e Cich. c.* *ms d. successive.*

## 5 Mixtura demulcens interna.

*R. Mucilag. Sem. Psyll.* *Mel. rosat.  $\mathfrak{z}$  vj.*  
*Cydon.* *ms d. sæpius aliquid ad lam-*  
*C.  $\nabla$  Malv. extr.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$  ij.* *bendum.*  
 *$\nabla$  fœnic.  $\mathfrak{z}$  j.*

## 6 Emulsio discutiens &amp; refrigerans.

*R. Amygd. dulc. exc.  $\mathfrak{z}$  ij.* *F. l. a. Emuls.*  
*Sem. 4. fr. maj.* *Educl. Syrup. dialth. Fern.*  
*Card. mar.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$  j.*  *$\mathfrak{z}$  vj.*  
*C.  $\nabla$  Card. Mar.* *Add. Oc. ppt.  $\mathfrak{z}$  ss.*  
*Veron.* *D. repetitis vicibus.*  
*Lactuc.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$  ij.*

## 7 Aqua diapnoica.

*R.  $\nabla$  Fl. Samb.* *Cinnab.  $\mathfrak{z}$  ii. gr. vi.*  
*Card. Mar.* *Tab. Man. xst. simpl.*  
*Veron.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$  j.*  *$\mathfrak{z}$  ss.*  
*Conch. ppt.* *D. singulis 4. horis cochle-*  
*Gum. diaph.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$  i.* *ar. 2.*  
*Nitr. perl.  $\mathfrak{z}$  ss.*

VII. *Methodus medendi.*

- 1 Nutricis vel puerperæ habenda est ratio, ut lac acrius biliosum corrigatur. Obtinetur hoc congrua Diætâ, humectante, diluente, lubrica: vitando spirituosâ, aromaticâ, salsa, animi pathemata.
- 2 Ad ipsam partem affectam respiciatur, ut impuritates abstergantur per mitiora primum, postea, his non sufficientibus, per fortiora.
- 3 Ut affluxus humorum inhibeatur & impuritates simul evacuentur; instituatur lenis laxatio per Rhabbarbarinam vel Mannatam.
- 4 Ubi affectus symptomatice affligit, ubi ad morbum primarium præcipue respicere convenit, haud neglectis tamen remedia parti affectæ debitis.

VIII. *Cautele & Observationes.*

- 1 Sæpius lingua crusta fortiori albicante est obducta, ubi acriuscula in usum sunt vocanda & lingua faucesque bene abstergendæ sunt.
- 2 Laxantia in idiopathico statu conveniunt, non item in symptomatico, cum febribus acutis conjuncto.
- 3 In hoc præprimis excretiones diapnoicæ æqualiter promoveantur; plerumque enim malum a calidiori regimine ortum habet.
- 4 Demulcentia, humectantia, Lubricantia & Infusa Herbarum sæpius propinata hoc in casu eximium usum habent.
- 5 Album Græcum specificum plane effectum exerit. Cum vero in Gargarismatibus hic locum haud habeat, decoquatur cum Speciebus pro potu ordinario.
- 6 Ab omnibus calidioribus medicamentis sibi cavendum est quodcumque demum originem habeat malum.
- 7 In acutis sæpius ab externa colli refrigeratione ortum suum ducit; unde eidem prospiciendum est.



## CAPUT TERTIUM.

D E

Intertrigine.

## CAPUT QUARTUM.

D E

Achoribus, Crusta Lactea &amp; Tinea.

**Definitio.** Intertrigo est cuticulæ in variis corporis juncturis, sub axillis, mento, in ingu- nibus, femoribus, nec non natibus, exco- riatio, stagnationi sudoris originem debens.

## II. Differentia

Distinguitur facile ab aliis corporis efflorescentiis ulcerosis, quæ ubique fere partium & sub alia diversa- que facie sese conspiciendas præbent; Intertrigo vero non nisi in illis partibus, quæ aeri minus expositæ sunt, su- doremque excretum diutius conservant, occurrit & plerumque in extima saltem cuticula sedem suam figit.

## III. Signa.

Cognoscitur ipso aspectu: Rubet primo pars ardetque: postea in exco- riationes cuticulæ exterioris abit, nisi remediis promte occurratur.

## IV. Subjectum.

- 1 Infantes obesi, sudoribus largioribus expositi.
- 2 Qui urina acriori linteamina sæpius madefaciunt.
- 3 Qui rarius absterguntur, novisque subinde linteami- nibus haud prospiciuntur.

## V. Prognosis

- 1 Rarius aliquid mali exinde metuendum est.
- 2 Quod si tamen negligentius tractatur, ulcerosum assumit genium, satisque refractarium aliquando se- se gerit.

## VI. Remedia.

- 1 Exsiccantia: Lapis calaminaris, Tutia, Liquiritia, Creta, Cerussa, Amylum cum pauco Camphoræ.
- 2 Abstergentia & Consolidantia: Unguent. alb. Cam- phorat. e Min. Camph. Emplastr. Diapalm. Fol. Ari- stoloch. rot. Plantag. Gratia Dei imposita.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis exsiccans & consolidans egregius.  
℞. Cret. ignit. & extinct. Tut. ppt. ℥j.  
    & iterum exsiccatur. ℥j. ms. F. Pulv. subtiliss. in lin-  
    Cerusf. alb. teolis adspargendus.  
    Lap. Calamin. a ℥j.  
    2 Alius.  
℞. Lap. Calamin. ℥ij. Amyl. a. ℥ss.  
    Tut. ppt. ℥j. Camph. ℥ss.  
    Liquirit. ms. f. Pulv. subtiliss.  
    3 Linimentum abstergens & exsiccans.  
℞. Litbarg. c. s. q. o o ovor. f. Liniment.  
    Cerusf. a ℥ss.  
    4 Aliud.  
℞. Unguent. e Min. Campho- Balsam. Peruv. ℥ss.  
    rat. ℥ss. ms.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 Præservatio hujus mali consistit in munda Infantum tractatione, ut debito tempore abluantur & novis linteaminibus involvantur.
- 2 Curatio vero exposcit exsiccantia, aliquoties per diem inspergenda.
- 3 Quando ulcerascentia subest, adhibeantur abstergen- tia fortiora, subjunctis consolidantibus.
- 4 Si ab acrimonia sanguinis malum foveatur, com- mendentur interne temperantia, lubricantia & de- mulcentia, in usum simul vocatis lenibus laxanti- bus.

## VIII. Cautela &amp; Observationes.

- 1 Simpliciter oleosa & nimis aquosa formulæ in inter- trigine præprimis refractaria minus conducunt.
- 2 Officium sæpius in posteriori casu haud explent ex- siccantia, supra commendata, sed opus est fortiori- bus abstergentibus.
- 3 Non raro e calidiori Nutricis Diæta malum fove- tur: unde congrua alimenta potiusque eidem com- mendanda sunt.

## I. Definitio.

## a Achorum &amp; Crusta Lactæ:

Sunt ulcera crustosa, albicantia, in infantum Ca- pitibus & Facie Lactationis tempore efflore- scentia, humorem ichoroso glutinosum fundentia, & a vitiata feri qualitate ortum suum habentia.

## b Tinea:

Est Scabies ulceroso-crustosa, partem capitis capil- latam occupans, eandemque ac præcedens affe- ctus causam agnoscens.

## II. Differentia.

Differt uterque morbus ab aliis affectibus scabiosis ra- tione partis affectæ: in his universus corporis habi- tus, excepto fere capite, efflorescentiæ scabiosæ ex- positus est: in nostris vero affectibus Caput præci- pue laborat, reliquæque partes magis tutæ sunt.

## III. Signa.

## a Achorum &amp; Crusta Lactæ.

- 1 Antequam erumpunt, plerumque mala sese habent infantes, appetitus imminutione laborant & non raro phlogosis & horripilationibus alternantibus afficiuntur.
- 2 Antecedunt & concurrunt collectiones nodosæ glandularum in collo præcipue conspicuæ:
- 3 Tandem efflorescunt pustulæ & sensim sensimque universum fere caput occupant.
- 4 Fundunt materiam viscidam, ichorosam, flave- scentem, omnia fere cum pilis conglutinatam.
- 5 Ardore suo sunt molestæ & inquietudinem, ab- initio præprimis, infantibus causantur.

## b Tinea:

- 1 Efflorescit in Capitis parte capillata & ichorosum humorem glutinosumque, quandoque satis fæti- dum fundit.
- 2 Abit in squamas & furfures, dum in aliis locis de- nuo efflorescit.
- 3 Interdum cutis exeditur vel scalpendo vulneratur, ut sanguis cum sanie effluat.
- 4 Pruritu & ardoris sensu præprimis molesta est, ut continuo fere ad scalpendum invitentur affli- cti.

## IV. Subjectum.

- 1 Achoribus & crustæ lactæ expositi sunt infantes repleti, serum acrius viscidiusque possidentes.
- 2 Lac acre, salsum e nutricibus sugentes.
- 3 Alimenta dyspepta in larga quantitate assumentes.
- 4 Post sudorem liberiori aeri expositi.
- 5 Tineam experiuntur pueri cacochymici, nullam Diætam observantes.
- 6 Serum acrius, salsum possidentes.
- 7 Cachectici & corpus a sordibus non bene liberan- tes.
- 8 Pilos in majori quantitate generantes.
- 9 Hæreditariam a Parentibus habentes dispositio- nem.

## V. Prognosis.

- 1 Uterque affectus nihil mali involvit, sed pro pur- gatione Naturæ habendus est.
- 2 Quando vero materia incongruis tentaminibus re- pellitur, facillime asthmata, Catarrhi suffocativi, Convulsiones, aut, quod adhuc melius, febres mali moris succedunt.
- 3 Collectiones nodosæ in collo occurrentes efflore- scentia scabiosa & manante sensim sensimque discutiuntur.
- 4 Achores & crusta lactea facilius curantur, quam Ti- nea, inprimis, si hæc jam sit inveterata.
- 5 Tinea confirmata & rebellis plerumque Capillorum defluvium post se ducit.



- 6 Neglecta & perverse tractata in Lepram abire potest.
- 7 Mitior provectiori puerorum ætate sæpius sponte remittit & optimam valetudinem comitem habet.
- 8 Quod etiam achores & crusta lactea faciunt, quæ vegetos floridosque plerumque infantes post se relinquant.

## VI. Remedia.

- 1 Laxantia: Rhabarbarum, Manna, Mechoacanna, Diacydon. lucid. Jal. Specif. Jalap. Pulv. Cornach. Panac. solut. & ius dulc.
- 2 Anticatarrhalia: Rad. Sarsapar. Aristol. rot Bryon. Vincetox. Helen Chin Caryophyllat. Lapath acut. Angel. Lign. sanct. Sassafr. Herb. Fumar. Saponar. Card. Bened. Fl Samb. Sem. Anis. Aquileg. Tinct. & ii tartarif. Tart. Essent. Succin. Antimon. crud. Hung. Lumbric. terrestr. ppt.
- 3 Temperantia: Oc. & ppt. Unic. foss. Conch. ppt. & ium diaph. Bez. mineral. Cinnab. & ii, nativ. ppt. Nitr. depurat. perlat.
- 4 Abstergentia, exsiccantia & consolidantia externa; Rad. Aristol. Lapath. acut. Helen. Fol. Nicot. Salv. in urina vel vino vel Lixivio communi decoquenda, Cret. Tut. ppt. Lap. Calaminar. Lithargyr. Ceruss. Liquir. Bryon. pulveretenus inspergenda, oleum ovorum vel cheirinum cum  $\phi\phi$  philosoph. Unguent. Enul. & Nicot. commiscendum.

## Formula Remediorum.

- 1 Pulvis purgans pro Infant. semestri.  
R. Pulv. Cornachin. gr. vj. ms. d. pro 1. vice.  
    & ii dulc. rit. parat. gr. j.
- 2 Alius pro Bimulo.  
R. Specif. Jalappin. & ss. ij.  
    & ii dulc. rit. par. gr. ms. d. pro 1. vice.
- 3 Potiuncula pro puero 8 annorum.  
R. Syr. e cich. c. Rhab. & Fl. acac. & ss.  
    Diacydon. lucid. Jal. a. & ij. ms. pro 1. vice.  
    Salis absinth. gr. iij.
- 4 Species pro potu Ordinario.  
R. Rad. Sarsapar. Ebor. a & iij.  
    Chin. Fl. til.  
    Gramin. pap. rh. a. p. j.  
    Liquir. a. & ss. Sem. Anis.  
    Raf. Lign. sanct. Aquileg. a. & j.  
    Sassafr. Incis. contus. d. ad ch.
- 5 Essentia anticatarrhalis.  
R. Ess. Lign. ms. d. Nutrici quotidie 30.  
    Tinct. & ii tartarif. a & ss. gutt.
- 6 Alia.  
R. Tinct. Tartar. acr. & ij. ms. usurpetur, ut precedens.  
    Essent. Succin. & j.
- 7 Pulvis expellens & temperans.  
R. Conch. ppt: Lumbr. terrestr. ppt.  
    Oc. & ppt. Cinnab. & ii a & j.  
    Antimon. crud. Ung. a ms. f. Pulv. Dos. varia ratione  
    & ij. ætatis.
- 8 Decoctum abstergens.  
R. Rad. Lapath. acut. & j. Coq. in Lixivio communi vel  
    Helen. Urinz puerorum, abluc  
    Aristoloch. ros. a. & ss. Achores & post exsiccationem  
    Herb. Sapon. Mls. & ovorum vel cere inunge.  
    Nicot. p. j.
- 9 Unguentum Foresti.  
R. Vitel. Ovor. ad duritiem exprimatur oleum, toties  
    coct. N. XVI. que coque & exprime  
    Myrrh. & j. donec spumam non amplius  
    Rad. Ari & ss. emitat, abjectis  
    Helleb. nigr. gr. iv. hinc facibus, oleum in  
    ms & eoque in ferrea sartagine vase clauso servetur ad usum  
    absque flamma, donec spumam emitat, tum
- 10 Oleum abstergens & consolidans.  
R. Olei ovor. & ss. ms. inungatur bis per diem.  
    philosoph. & j.

## VII. Methodus Medendi.

- 1 In crusta lactea & Achoribus non tantum infantes sed

& Nutrices sunt expurgandi, ut sanguinis ferique labes corrigatur.

- 2 Convenit hunc in finem laxantia & lia aliaque leniora in usum trahere & aliquoties repetere.
- 3 Subjungantur & interponantur anticatarrhalia remedia, temperantia, leniterque expellentia.
- 4 Repurgato corpore externa abstergentia & consolidantia locum habent.
- 5 Tinea eandem exposcit Methodum Medendi, eademque remedia ac crusta lactea.
- 6 Si pili admodum conglutinati sunt remediorumque applicationem impediunt, forcipe abscindantur.
- 7 In ficosa Tinea rebeli & refractaria applicans Dro-pacem, omnemque cutem corruptum cum eodem auferunt, vulneratumque postea caput debitis remediis priori suo nitore restitunt.

## VIII. Cautela Practicæ &amp; Observationes.

- 1 Crusta Lactea & Tinea perite sunt tractandæ, ne retropulsæ insignia damna inducant.
- 2 Ab omnibus igitur repellentibus quam maxime sibi cavendum est.
- 3 Ad hanc classem referuntur Adstringentia, Sulphurata & formulæ nimium aquosæ externe usurpatæ.
- 4 Ut remedia eo melius affectum suum exerere possint, opus est Diætâ congrua: alias optatus scopus haud obtinetur.
- 5 In crusta lactea quidam Nasturtium frixum vel cum axungia porcina subactum cum fructu imponunt.
- 6 Alii spiritum tantum Vini simplicem vel myrrhatum applicant.
- 7 Satius est hos affectus cutaneos aliquandiu sibi relinquare, quam justo citius reprimere.

Plures Cautelas vid. in Tab. de Scabie.

## CAPUT QUINTUM.

## DE

## Dentitione Difficili.

- I. Definitio. **D**entitio difficilis est dentium cum summo dolore aliisque gravioribus symptomatibus contingens eruptio, firmioribus plerumque gingivis originem suam debens.
- II. Differentia. Dentitio difficilis alia solito difficilior tantum procedit, nec ulla periculosa conjuncta habet symptomata, alia est difficillima & vitæ discrimine stipata.
- III. Signa.
  - 1 Circa septimum plerumque mensem dentes e gingivis prorumpunt & primo quidem canini, postea incisores & tandem maxillares, nullo certo circa singulorum eruptionem servato ordine.
  - 2 Qui tamen tardioris sunt temperamenti post annidum spatium aut serius dentes suos primos acquirunt.
  - 3 Sentiant tenelli pruritus in gingivis, dolori satis exquisito conjunctum.
  - 4 Digitis continuo gingivas contrectant & cibos calidos respuunt.
  - 5 Copiosam Salivam ex ore emittunt.
  - 6 Inquieti sunt & continuo clamitant.
  - 7 Gingivæ hinc inde tubercula & nodos, dentium eruptionum testes, formant.
  - 8 In aliis Diarrhœa concurret, ubi plerumque res facilius procedit.
  - 9 In aliis vero alvus adstricta est, cui febricula, quandoque satis intensa, comes est, Convulsionibus non raro & intercurrentibus frequentibus pavoribus stipata.
  - 10 Somnus hoc in casu fere nullus, & appetitus prostratus est.
  - 11 Continuant hæc symptomata, remittuntque, donec Natura finem sibi præfixum obtinuerit.



VIII. *Cautela & Observationes.*

- 1 Difficiliori dentium eruptioni expositi sunt Infantes  
firmioribus & crassioribus gingivis præditi.
- 2 Cholericis simul & temperamenti activioris.
- 3 Adstrictione alvi laborantes.
- 4 Lacte acriori, falso & spissiori nutriti.

V. Prognosis.

- 1 Melius est infantes dentitione laborantes Vomitus & Diarrhoeas pati, quam alvi constipationem.
- 2 Pavores frequentius occurrentes cum febricula intensiori Convulsiones minantur.
- 3 Gingivas superne albicantia referre puncta, dentes mox erupturos indicat.
- 4 Qui tam firmas habent gingivas, ut dentes haud erumpere possint, Convulsionibus non raro moriuntur.

## VI. Remedia.

- 1 *Laxantia leniora* : Manna, Syr. ros. solut. e pom. laxat. Fl. pers. Violar. Clyster.
- 2 *Diapnoica* ; Pulv. Bezoard. Hal. ▽ Fl. Samb. Scorz. Fl. Til. Oc. ☞ ppt. C. C. Phil. ppt. Ung. Alc. ppt. Lumbr. terrestr. ppt. ☞ diaph. Bezoard. min. Cinab. ☞ ii, nativ. Nitr. perl. Sal. Prunell.
- 3 *Demulcentia & Paregorica externa* : Mucilago Sem. Pyl. & Cydon. cum ▽ Alth. & Lactuc. extract. mel. cum butyr. rec. permistum, ☉☉ Amygd. dulc. Pinguedines Lepor. Gallinarum, Anserum, Gingivis inunctæ, Baculi Liquiritiæ contusi & ad lambendum exhibiti.
- 4 *Amuleta collo appensa & ad mordendum propinata* : dens Lupi, Crystallus, Jaspis, argento inclusi, Radix Ireos flor.
- 5 *Specificæ* : Sanguis recens e crista Galli nigricantis inunctus, chalybs septies & ultra candefactus & in lacte caprino vel muliebri extinctus, ad mordendum exhibitus, dentes Hominis, Equi primum nati, Viperæ masculæ, pellis Lupi, Lana agnina, Gingivis applicata, Cerebella Leporis, Gallinarum, Pullorum, cum Melle subacta & gingivis inuncta.

*Formula Remediorum.*

1 Potio Laxans.

Br. Mann. Calabr. 3vj. 3iss.  
Salis polychr. gr. iij. d. pro I. vice.  
Dissolv. in  $\nabla$  Fl. Til.

2 Pulvis Laxans.

*Rx. Specif. Jalappin. gr.*  
*viii.*  
*Mercurii dulc. rit. par.*

3 Aqua diapnoica.

*R. v. Fl. Til.* *Cinab. ʒij.*  
*Samb.* *Nitr. perl. a ʒfs.*  
*Card. Mar. a. ʒj.* *Fab. e Succ. Citr. ʒfs.*  
*C.C. phil. ppt.* *ms. d. singulis 4. horis co-*  
*ʒii diaph. a. ʒj.* *chl. ij.*

4 Mucilago demulcens.

Ex. Mucilag. Sem. Psyll.      ▽ Fl. Samb. 3vj.  
Cydon.      Mel. rosat. 3fs.

c. ▽ *Malv. extract. a.* *ms. pro inungendis* *Gingi-*  
*3ss.* *vis.*

3 Unguentum demulcens.

Br. Butyr. recent.      ms. usurpetur, ut praece-  
Mel. rec. a. 3fs.      dens.

6 Aliud.

℞. *Pingued. Gallinar.* 80 *Amygd. d.* ℥j.  
*Lepor. a.* ℥ii. *ms. ut prius usurpandum.*

VII. Methodus Medendi.

- 1 Quando alvus est adstricta, aperire eandem convenit vel per Clysteres vel lene laxans.
- 2 In concursu febriculæ exhibeantur pulveres vel ▽ diapnoicæ.
- 3 Externe vero Gingivæ demulceantur per inunctionem emollientium & mucilaginosorum, exhibito simul dente lupi vel rad. Irid. flor. ad mordendum.
- 4 Nutrix vero utatur hoc tempore Diæta lubrica, diluente, ne sanguis & lac orgasmum concipiant & symptomata exacerbent.

- 1 Sanguis e crista Galli & Cerebrum leporis humores vehementer alliciunt, & sæpissime malum adaugent.
- 2 Dentes variorum animalium nullam præ dente Lupi peculiarem habent efficaciam.
- 3 Quando Gingivæ admodum sunt firmæ, quidam incisionem per Lancettam suadent, sed cavendum, ne ulcera succedant.
- 4 In convulsionibus Infantum dentitionem difficilem secutis quidam Venæsectione cum fructu usi sunt.
- 5 Celebrat eandem tanquam Specificum Sydenhamius.
- 6 Salia volatilia neque in Convulsionibus neque febricula concurrentibus locum habent.

CAPUT SEXTUM.

## D E

*Nævis Maternis.*

- I. *Definitio.* **N**ævi Materni sunt vitia s. maculæ diversæ figuræ, magnitudinis & coloris, externe Infantis cuti impressæ, a fortiori Matris phantasia originem habentes.
- II. *Differentia.*
- 1 Ratione figuræ, alii fructus: Cerasa, Fraga, Mora; alii animalcula varia: mures, araneas, vesperiliones, bufones; alii maculas tantum latas representant.
  - 2 Ratione coloris: diversi sunt, & rerum relatarum colorem plerumque imitantur.
  - 3 Ratione partis affectæ: alii occurrunt in facie, alii in pectore, in femoribus alii, alii in aliis corporis partibus. Ubi notandum, quod illa præcipue factus pars lædi soleat, quam gravida in ipso phantasiæ fortioris conceptæ momento vel in suo corpore tetigit, vel in alio intensius intuita est.
  - 4 Ad nævos quoque hosce referenda sunt varia in lucem allata conformationis vitia, ut labia leporina, defectus manuum, digitorum, brachiorum & similia, ex perversa imaginatione plerumque originem sumentia.
- III. *Signa.*
- 1 Horum enarratione opus non est, cum ipso adpectu statim sese prodant.
  - 2 Illud autem notandum, quod statim a partu non semper figuram suam legitimam, sed puncta tantum minora sæpius referant, quæ demum post aliquot menses elewantur & sensim sensimque augmenta capiunt, donec ad justam pervenerint magnitudinem & figuram.
- IV. *Subjectum.*
- 1 Infantes, quorum matres rem aliquam insigni appetitu efflagitavere, nec ejusdem compotes factæ sunt.
  - 2 Quæ mutilata membra vel alias, res deformes ex improviso cum horrore adpexere.
  - 3 Quæ ex subitaneo incendio, murium, bufonum similitumque rerum aspectu terrore graviori percussæ sunt.

IV. *Subiectum.*

- 1 Infantes, quorum matres rem aliquam insigni appetitu efflagitavere, nec ejusdem compotes factæ sunt.
- 2 Quæ mutilata membra vel alias, res deformes ex improviso cum horrore adspexere.
- 3 Quæ ex subitaneo incendio, murium, bufonum similiumque rerum aspectu terrore graviore percussæ sunt.

## V. Prognosis.

- 1 Recentes magis medicationi obediunt, quam inveterati.
- 2 Quo latioris sunt ambitus & profundiores, eo difficilius curantur.

## VI. Remedia.

- 1 Sympathetica: Secundinarum & Sanguinis lochialis recentis & adhuc calentis vel e Matre vel aliis puerperis defuncti applicatio, manus mortua adhuc calens affricta, Lignum fulmine tactum, sanguis piscis Barbi, varia magnetica applicata; fructuum, quorum figuras referunt, primo anno collectorum, impositio.
- 2 Chirurgica: Exstirpatio vel per Sectionem vel per Cauterium potentiale, vel Ligaturas.



*Formula Remediorum.*

His opus non est, cum ipsæ res modo nominatæ illas absolvant.

VII. *Methodus Medendi.*

- 1 Quando infantes adhuc sunt teneriores & juniores, sympathetica remedia tentare decet, ubi optimum sæpius habent effectum.
- 2 His vero in cassum adhibitis Chirurgicum auxilium implorandum.
- 3 Si bases nævorum angustæ magis quam latæ sunt, instituuntur ligaturæ, quæ hoc in casu cum fructu in auxilium vocantur.

VIII. *Cautela & Observationes.*

- 1 Gravidæ præprimis a medio gestationis tempore ad partum sibi caveant ab animi pathematibus, & perverfis appetitibus: hoc enim tempore præcipue nævos corporibus Infantum imprimi observamus.
- 2 Sympathetica in subjectis sensibilibus & junioribus locum habent, non item in aliis.
- 3 Commendant quidam pro exstirpatione Spiritum Nitri, sed caute cum eodem procedendum, ne frequentiori applicatione Inflammationes aliaque mala excitet.
- 4 In Sectione examinandum, annon vasa sanguifera majora ingrediantur nævum: quo in casu debite sibi prospiciendum, ne hæmorrhagia gravior provocetur.

## CAPUT SEPTIMUM.

## D E

*Vermibus.*

I. *Definitio.* **V**ermes sunt. Insecta in Juniorum præcipue intestinis generata, calori partim deficienti, partim cruditati primarum viarum originem debentia.

II. *Differentia.*

- 1 Alii sunt longi, teretes, Lumbricos terrestres æmulantes, in intestinis præcipue, quandoque vero ipso etiam Ventriculo, hospitantes.
- 2 Alii lati sunt, duplicisque observantur generis; vel enim ex pluribus minoribus, semen Cucurbitæ æmulantibus, sibi invicem cohærentibus sunt compositi, vel simpliciter absque internodiis lati sunt, plurimum ulnarum longitudinem referentes, & ad instar glomeris quandoque convoluti, ubi *Taniarium* nomen assumunt.
- 3 Alii sunt teretes parvi, Vermiculis in caseis repertiundis similes, vel acus sutorias majores figura referentes, in intestino recto præcipue stabulantes, *Ascarides* vocati.
- 4 Interdum etiam alia generantur animalia in intestinorum cavo, cum insolitis concurrentibus symptomatibus, sicuti exempla ranarum, serpentum, vermium aculeatorum, productorum prostant.

III. *Signa.*

- a Lumbricorum stricte sic dictorum:
  - 1 Frequens narium pruritus, & frictio.
  - 2 Morsus atque Vellicatio stomachi tempore matutino, præcipue contingens, cum multa sputatione.
  - 3 Ventris inflatio atque durities.
  - 4 Pavores sub somno, dentium stridores & non raro spasmodici contractiones cum subsequenter Convulsionibus.
  - 5 Genarum inconstans color, modo rubicundus, modo pallidus, oculorumque subsidia.
  - 6 Appetitus vagus, cum alvo modo liquida, modo obstructa.
  - 7 Inprimis vero appetentia singularis panis.
  - 8 Siticulositas, præcipue matutino tempore.
  - 9 Nausea quandoque & Vomitus, si in Ventriculo hospitentur Lumbrici.

10 Urinæ turbidæ, crudæ, cum sedimento albicante, fursureo.

11 Dolores Capitis, quandoque satis insignes, interdum vero magis obtusi.

12 Atrophia corporis & universalis fere flacciditas.

## b Vermium latorum:

- 1 Præter nominata signa continua fere appetentia.
- 2 Morsus abdominis frequentes.
- 3 Summa corporis macilentia.

## c Ascaridum.

- 1 Plura modo nominatorum signorum.
- 2 Pruritus peculiaris in intestino recto, ægrotos mirum in modum discrucians, cum conjuncto tenesmo.

IV. *Subjectum.*

- 1 Lumbricis obnoxii sunt pueri voraces, nullam Diætam observantes, corpusque debito moto haud exercentes.
- 2 Cibos dyspeptos, mucidos in larga quantitate assumentes & aquam desuper ingurgitantes.
- 3 Præprimis, qui jejuno stomacho multum panis edunt & nocturno tempore ingurgitatione aquæ Ventriculi calorem destruunt.
- 4 Vermibus latis obnoxii magis sunt adulti, eadem Diætæ vitia comittentes.
- 5 Ascarides quoque adulti potius quam juniores experiuntur.

V. *Prognosis.*

- 1 Lumbrici quo majores & copiosiores, eo plura & vehementiora excitant symptomata.
- 2 Exinde enim Cardialgiæ, Palpitationes Cordis, Vomitus, dolores colici, Diarrhææ, Febres inordinati typi, motus spastici & convulsivi aliaque mala non raro originem habent.
- 3 Cum aliis morbis complicati omnia exacerbant & inprimis in malo hypochondriaco-hysterico spastica molimina maximopere adaugent.
- 4 Mensium quoque obstructio & flatulentia Abdominis non raro ab iisdem originem habet.
- 5 Lumbrici enecati & in intestinis putrefacti febres malignas & lethalia inducere possunt symptomata.
- 6 In acutis quoque occurrentes orgasmum sanguinis & deliria adaugent.
- 7 Incipientibus febribus si vivi, aut iisdem declinantibus si mortui, excernuntur, malum est. *Hippocrat. Aphor.*
- 8 In omni graviore morbo vermes sponte exire, malum; inprimis si ægrotus insigni virium debilitate laboret.
- 9 Quando ex intestinis in Ventriculum migrant, Nausea, Vomitus, Cardialgia, Singultus exinde excitantur.
- 10 Vermes rubicundi, sanguine repleti, intestinorum læsionem innunt, facileque Febres malignas inducunt.
- 11 Sanguinis stillæ e naribus in febribus continuis nonnunquam Vermium latentium signa sunt, ut graves testantur Auctores. *Bagliv.*
- 12 Vermes lati universum fere Intestinorum tractum occupantes gravissima quoque excitant symptomata & difficillime exstirpantur.
- 13 Ascarides quoque, etiam si præter pruritus in ano & tenesmum nihil incommodi afferant, pertinacissime tamen sese gerunt & difficulter remediis obediunt.

VI. *Remedia.*

- 1 Vermes enecantia: rad. Gentian. Cichor. Aristoloch. rot. Zedoar. Gramin. Allii, Herb. Absinth. Card. bened. Fumar. Abrotan. Matricar. Salv. Hyperic. Tanacet. Marrub. albi, flor. Cent. min. Persic. Sem. Santon. Tanacet. Myrrha, Corallina, Mercurius vivus, Antimon. crud. Cinnab. ꝯii & nativ. Æthiops miner. Vitriol. ꝯtis, ejusdemque Tinct. Elix. propr. Parac. Lumbrici terrestr. Externe Fel. Tauri inspissat. aliaque amaricantia, Vitrum quoque Venetum subtilissime pulverisatum, cum melle commixtum & umbilico singulis noctibus applicatum.

2 Eisdem



2 Eisdem enecantia & evacuantia: Mercurius dulcis rite paratus, Trochisci hermetici, Colocynthiaca & Aloetica, Pulvis ad Vermes Augustan. Externe Unguentum de Arthanita.

Formula Remediorum.

I Pulvis anthelminticus.

R. Pulv. ad Verm. Aug. Sacchar. rosat. ℥iij.  
℥ii. ms f. Pulv. Dos. ℥i. quotidie  
Corallin. ℥i. mane in lacte sumen-  
℥ii. dulc. rit. par. ℥ss. dus.

2 Alius.

R. Sem. Santon. Mercurii dulc. rit. par. a ℥i.  
Fœn. grac. ℥ii. Scammon. Sulph. gr.  
C. C. ust. XV.  
Diaph. ℥lis. Dos. ℥ss. ad ℥ss. Lun. decre-  
Corallin. ppt. sente per 3. vel 4. dies.

3 Alius.

R. Sem. Santon. ℥ii. quotidie stomacho je-  
Pulverisat. div. in iv. juno cum melle Dos.  
part. aq. exhibeatur una.

4 Aqua Mercurialis Baglivi.

R. Mercurii crud. recte pur- Macerentur per 2. horas, sepe  
gati ℥j. ac foriter agitando, po-  
▽ Gramin. stea decanta aquam &  
Portulac. a cola, relicto in vase Mer-  
℥iv. curio.

5 Pulvis Mercurialis.

R. Ethiop. Miner. gr. vi. pideo vel vitreo mor-  
viii. tario & exhibeatur.

ms cum Saccharo in la-

6 Nodus laxativus.

R. Rad. Gentian. Fol. Senu. f. st. ℥vi.  
Gramin. a ℥ss. Rhabarb. elect. ℥ss.  
Cyclam. ℥ii. Agar. albiss.  
Herb. Tanacet. Fibr. Helleb. nigr. a  
Salv. ℥ii.  
Marrub. alb. an. Vitriol. Aris  
Mss. Salis Absinth. a ℥i.  
Fl. Persia. Incis. & contus. affund. ℔i. ▽  
Hyper. a p. i. fervent. & Vin. alb. gene-  
Bacc. Laur. ℥ii. ros. ℔i. Dos. varia pro  
Sem. Santon. ℥i. ratione ætatis.

7 Clyster anthelminticus.

R. Rad. Filic. ℥i. o o absinth.  
Herb. Tanacet. amygd. amar. a  
Marrub. alb. a ℥ss.  
Mss. Salis gemm. ℥ii.  
Coq. in lacte vel ▽. ms. applicetur calide.  
Add. Mel. ros. ℥j.

8 Linimentum Anthelminticum.

R. Unguent. de Arthanit. Fel. Tauri inspissat. ℥i.  
℥ss. o o Colocynth. q. s. f. Liment.

9 Suppositorium in Ascaridibus.

R. Aloes Succ. Absinth. inspissat.  
Myrrh. ℥ss.  
Pel. Taur. inspissat. a c. f. q. Mellis f. l. a Supposito-  
℥i. rium.

VII. Methodus Medendi.

- 1 Eo allaborandum, ut non tantum Vermes enecentur, sed & simul expellantur.
- 2 Interponenda propterea sunt enecantibus expellentia, vel statim cum iisdem conjungenda.
- 3 Exhibentur autem optime tempore matutino & continuantur per aliquot dies, donec probe fuerint expurgati, cui fini supra nominata remedia optime satisfaciunt.
- 4 Ne vero nova progenies producat, Diæta conveniens suadenda, & omnia dyspepta, saccharata, mellita, nec non Lacticinia interdicenda sunt.

VIII. Cautela & Observationes.

- 1 Commoventia amara, diutius absque evacuantibus in usum vocata, symptomata sæpius exacerbant.
- 2 Amaricantia talia phlegmaticis magis conveniunt quam sanguineis.
- 3 In his majori efficacia sese commendat Acida, ut pote quæ etiam Vermes enecare observantur.

4 Potentissime Vermes pellunt Colocynthiaca, mitius jam Aloetica.

5 Cortici Peruviano anthelminticam quoque viutem adscribunt Observatores Uratislavienses.

6 Hypericum ab Antiquis pro Vermibus enecandis commendatum est, sed dubium, annon illis vermibus affectibus, qui a Fascino inducti esse credebantur, oppositum fuerit.

7 Cretam decoctam vel in substantia assumtam a vulgo aliquoties cum fructu usurpatam fuisse novi.

8 C. C. ustum specificam haud habet efficaciam.

9 Sem. Santon. Corallinam quoad effectum longe post se relinquit.

10 Ad Lumbricos latos præcipue Salvia a quibusdam laudatur.

11 Lumbrici hi sæpius in Scorbuticis inveniuntur, ubi succus Nasturtii aquatici expressus, quotidie matutinis horis exhibitus, commendatur.

12 Ascaridibus non tantum resistendum per interna, per os assumta, sed & Clysteres & Suppositoria anthelmintica, ut eo certius enecentur.

13 Vitrum Venetum & Herbam Sabinam cum melle subacta & in cortice Nucis juglandis excavato applicata destinat vulgus Vermi umbilicali. An talis detur, a plerisque recte dubitatur.

14 Circumforanei lumbricos expulsos pulverisat & denuo ægrotis exhibent, non absque effecta. Eorum locum supplere possunt Lumbrici terrestres.

CAPUT OCTAVUM.

DE

Crinonibus.

I. *Definitio.* **C**rinones s. Comedones sunt Animalcula pilorum majorum crassitiem adæquantia, coloris cineritii plus minus nigricantis, in poris cutis stabulantia & materiæ seroso lymphaticæ stagnantis & corruptæ ortum debentia.

II. *Differentia.*

Ab aliis Vermibus corpus occupantibus differunt, cum figura & magnitudine, tum etiam loco affecto, quod quidem ex singulorum descriptione facile patet.

III. *Signa.*

- 1 Contabescunt sensim sensimque Infantes.
- 2 Inquieti sunt & insomnes, insignemque pruritus præprimis in dorso sentiunt.
- 3 Appetitus vagus est: delectantur frigidis potius quam calidis cibis.
- 4 Neque ullum corporis agumentum capiunt.

IV. *Subjectum.*

- 1 Infantes Lympha viscidiori gaudentes.
- 2 Nullam Diætam observantes, & corpus a sordibus non bene repurgantes.

V. *Prognosis.*

- 1 Nihil fere incommodi inferunt, nisi quod pruritu molesti sint, & nutritionem non nihil impediunt.
- 2 Quando tamen malum prorsus negligitur, tunc sensim sensimque in Atrophiam abire potest.

VI. *Remedia.*

- 1 Lenia laxantia Mercurialia: Specif. Jalappin. & Pulv. Cornach. cum Mercurio dulci Diacydon. lucid. Jal. Panacea solutiva.
- 2 Diapnoica: Gum. diaphor. Bezoard. min. Gum. crud. Cinnab. ℥ii & nativ. Oc. ppt. C. C. phil. ppt. lumbr. terrestr. Tinct. ℥ii, Tartar.
- 3 Externe: Balnea abstergentia ex herbis aliquot cum lacte vel aqua parata: abrasio postea per crustam panis, aut novaculam.

Formula Remediorum.

I Pulvis laxans pro Infante 6 annorum.

R. Pulv. Cornach. gr. XV. gr. vj.  
Mercurii dulc. rit. par. ms f. Pulv. pro 1 vice.  
Mm 3 2 Pul-



2 Pulvis laxans pro Infant. 4. annor.  
*R. Syr. e pom. lax.* *Salis polpchr. gr. ij.*  
*Diacydon. lucid. Jal.* *▽ fragor par.*  
*ā 3ss.* *ms pro 1. vice.*

3 Pulvisculus diapnoicus.  
*R. Oc. 3 ppt.* *ms f. Pulv. bis per diem ad*  
*Antimon. crud. Hung.* *3ss. vel gr. XV. exhibendus.*  
*Lumbr. terrestr. ppt. ā*  
*3ss.*

4 Tinctura diuretica & diaphoretica.  
*R. Tinct. 3ii tartar.* *ms Dos. gutt. XX. singulis*  
*3ij.* *diebus mane in potu*  
*Essent. alexiph. St.* *Tbec.*  
*3j.*

#### VII. Methodus medendi.

- 1 Pro Crinonibus extirpandis Balneis infantes immergendi sunt, ut pori cutis eo melius aperiantur.
- 2 Postea dorsum lacte illinatur & quando vermiculi capitibus prominent, tunc nozacula vel crusta panis abradantur.
- 3 Interne, ut crasis sanguinis corrigatur, adhibeantur lenia laxantia, diapnoica & diuretica leniora.
- 4 Præprimis congrua Diæta instituitur & corpus externum, quantum possibile, mundum servetur.

### CAPUT NONUM.

D E

#### Cardiogmo.

I. *Definitio.* **C**ardiogmus est Cardialgiæ species, cum anxietate præcordiorum & dolore gravativo conjuncta, a flatulenta abdominis & Ventriculi distensione, diaphragma comprimente, originem habens.

#### II. Differentia.

Differt a Cardialgia adutorum gradu: hæc latior est, illa strictior; provenit Cardialgia non tantum a variis contentis, Ventriculum gravantibus, sed & interdum a sanguine in vicinia congesto: Cardiogmus vero cruditates tantum primarum viarum, flatus & Vermes pro causa agnoscit.

#### III. Signa.

- 1 Anxietates & Angustia præcordiorum, cum respirandi difficultate conjunctæ.
- 2 Nausea, Anorexia & Vomitus interdum concurrunt.
- 3 Copiosus Salivæ in os effluxus, si Vermes subsunt.
- 4 Febricula quandoque satis intensa, Convulsiones non raro comites habens.

#### IV. Subjectum.

- 1 Infantes a Meconii inquinamento non bene liberati.
- 2 Saburram viscidam, mucosam in primis viis foventes.
- 3 Vermibus laborantes.
- 4 Sudores; Achorum aliarumque efflorescentiarum retrocessionem experti.

#### V. Prognosis.

- 1 Causa quo levior, eo mitior quoque effectus.
- 2 Ructus & flatus erumpentes levamen patienti afferunt.
- 3 Melius est alvum apertam, quam obstructam esse.
- 4 Si Febricula intensior concurrit cum pavoribus Convulsiones metuendæ sunt.

#### VI. Remedia.

- 1 Alvum aperientia: Clysteres.
- 2 Saburram primarum viarum expurgantia, lenia emetica: Aurum fulminans, Syr. Fl. perf. Oxy. Squill. Rad. Ipecac. Cathartica: Manna, Pultic. Mann. Specif. Jalappin. Pulv. Cornachin. Mechoac. Mercurius dulc. Sal. Cathart. amar.
- 3 Incidentia, resolventia: Rad. Zedoar. Galang. Pimpinell. alb. Herb Card. bened. Absinth. Cent. min. Tartar. Vitriol. Arcan. dupl. Sal. digestiv. Sylv.
- 4 Carminativa leniora: Confect. Anis. Cort. Orum, Cardomom. Cinamom. Trag. suav. Externe Unguenta & Linimenta Carminativa.
- 5 Tonica martialia: Tinct. Vitriol. 3tis Lüd. e pom. Borfd. Croc. 3tis 3tus Stahl's cum Salinis incidentibus commiscendus.

#### Formula Remediorum.

1 Potiuncula emetica pro infant 1 e m. annorum.  
*R. Syr. Flor. pers. 3ij.* *▽ Veron. 3ij.*  
*Emer. 3ss.* *ms pro 1. vice.*

2 Pulvis emeticus pro Infant 2 annorum.  
*R. Rad. Ipecac. gr. vj.* *ms pro 1. vice.*  
*Salix absinth. gr. ij.*

3 Pulticula pro bimulo.  
*R. Pulticul. Mann. 3j.* *D. successive.*

4 Clyster Carminativus.  
*R. Decoct. Chamom. 3 Sem.* *Mel. anthos. a 3ss.*  
*Fenic. vel Anis. 3iv.* *Salis Gemm. 3j.*  
*Add. 33 Anth.* *ms. Initiatur calide.*

5 Pulvis incidens & Carminativus.  
*R. Oc. 3 ppt.* *Confect. Anis. 3ii.*  
*3ii diaph.* *ms F. Pulv. bis, ter per diem*  
*Tartar. Vitriol. ā 3i.* *ad aliquot cultri cuspides*  
*Salis Absinth. 3ss.* *exhibendus.*

6 ▽ Carminativa.  
*R. ▽ Fenic.* *Oc. 3 ppt. ā 3j.*  
*Chamom. ā 3ss.* *Spir. Anis. 3j.*  
*ad stat. 1. V. 3ss.* *Syr. Cort. Orum 3ss.*  
*3ii diaph.* *ms cochleatim porrigenda.*

7 Unguentum Carminativum.  
*R. Unouent. Cardiac. us. 3ss.* *Cumin. ā 3j.*  
*33 Aneth. 3ij.* *ms pro inungendo Ventre.*  
*dest. Carv.*

#### VII. Methodus Medendi.

- 1 Ne symptomata ingravescant, optimum est, ut alvus quantocyus per Clysterem aperiatur.
- 2 Evacuentur postero die primæ viæ vel per Emeticum, si nihil obstat, vellent Catharticum.
- 3 Subjungantur resolventia & Carminativa, interne & externe in usum vocanda.
- 4 Colophonis loco usurpentur selecta Martialia, ubi Tinctura Vitrioli 3tis reliquis palmam præripit.
- 5 Quando Vermes subsunt, specialiter ad hos respiciatur, & convenientibus supra nominatis remediis iisdem obviam eatur.

#### VIII. Cautela & Observationes.

- 1 A calidioribus remediis in Cardiogmo abstinendum est: commovent tantum materiam & non corrigunt.
  - 2 Carminativa leniora cum resolventibus & incidentibus conjuncta optimum edunt effectum.
  - 3 Præter interna remedia Unguenta Carminativa externe illita egregie se gerunt.
  - 4 Eadem Unguenta laudem suam tuentur in flatulenta abdominis distensione, vulgo pro concretione partium habita, quæ eximie exinde mitigatur.
- Reliqui Affectus, quos Infantes cum Adultis communes habent, videantur supra, suis quisque locis.



## T A B U L A R U M.

<b>P</b> Ræcognita Medicinæ	<b>1</b>	Tab. LXVII. De Diarrhœa	<b>207</b>
Tab. I. De Physiologia	<i>ibid.</i>	LXVIII. De Cholera humida	209
II. De Pathologia	15	LXIX. De Fluxu Cœliaco & Linteria	211
III. De Semiotica	35	LXX. De Fluxu Hepatico	212
IV. De Methodo Medendi	54	LXXI. De Hæmorrhoidibus seroso-mucosis	213
V. De Chirurgia	80	LXXII. De Dysenteria benigna	214
VI. De Diætâ	94	LXXIII. De Incontinentia Urinæ	216
VII. De Plethorâ	101	LXXIV. De Diabete	217
VIII. De Hæmorrhagiis in Genere	102	LXXV. De Pollutione nocturna & Gonorrhœa benigna	218
IX. De Hæmorrhagia Narium	103	LXXVI. De Fluore albo simplici	220
X. De Hæmoptysi	105	LXXVII. De Sudore nimio	222
XI. De Vomitu cruento	106	LXXVIII. De Gravedine & dolore capitis catarrhali	223
XII. De Fluxu Hæmorrhoid. nimio	108	LXIX. De Brancho & Raucedine	224
XIII. De Fluxus Hæmorrhoidum defectu	110	LXXX. De Catarrho Suffocativo	225
XIV. De Fluxu Mensium nimio	111	LXXXI. De Tussi sicca	228
XV. De mensium defectu	113	LXXXII. De Astmate sicco	229
XVI. De Hæmorrhagia uterina	115	LXXXIII. De Ictero	231
XVII. De Lochiorum defectu	116	LXXXIV. De Ructibus & Inflatione Ventriculi	234
XVIII. De Mictu cruento	117	LXXXV. De Flatulentia	235
XIX. De Hæmorrhagiis Passivis	119	LXXXVI. De Obstructione alvi	237
XX. De Congestionibus in Genere	120	LXXXVII. De Stranguria	238
XXI. De Cephalalgia Sanguinea	122	LXXXVIII. De Dysuria	240
XXII. De Cephalæa & Clavo Hysterico	123	LXXXIX. De Mictione imminuta	241
XXIII. De Otalia	126	XC. De Ischuria f. Urinæ suppressione	242
XXIV. De Odontalgia	127	XCI. De Sudoris suppressione & defectu	244
XXV. De Cardialgia	128	XCII. De Cachexia & Chlorosi	246
XXVI. De Colica	130	XCIII. De Leucophlegmatia & Anasarca	247
XXVII. De Malo Hypochondriaco-Hysterico	132	XCIV. De Alcite	248
XXVIII. De Hæmorrhoidibus cœcis	135	XCV. De Tympanite	251
XXIX. De Doloribus Arthriticis in Genere	136	XCVI. De Hydrocephalo	252
XXX. De Hemicrania	138	XCVII. De Hydrope pectoris	253
XXXI. De Pleuritide spuria	140	XCVIII. De Hydromphalo & Hydrocele	254
XXXII. De Nephritide spuria	141	XCIX. De Oedemate	255
XXXIII. De Malo Ischiadico	142	C. De Soda f. Oresi	257
XXXIV. De Podagra	143	CI. De Fœtore Oris	258
XXXV. De Rheumatismo & Arthritide vaga	146	CII. De Fœtore Sudoris	259
XXXVI. De Inflammationibus in Genere	148	CIII. De Scabie benigna	260
XXXVII. De Phrenitide & Paraphrenitide.	151	CIV. De Scabie maligna	261
XXXVIII. De Ophthalmia	152	CV. De Scorbuto	263
XXIX. De Angina	154	CVI. De Gonorrhœa virulenta	265
XL. De Pleuritide & Peripneumonia	156	CVII. De Lue Venerea f. Malo Neapolitano	267
XLI. De Hepatide & Splenitide	158	CVIII. De Cancro	270
XLII. De Inflammatione Ventriculi & Intestinorum	160	CIX. De Motibus spastico-convulsivis in Genere	272
XLIII. De Passione Iliaca f. Volvulo	162	CX. De Spasms	273
XLIV. De Nephritide	163	CXI. De Astmate spastico f. convulsivo	275
XLV. De Inflammatione Uteri	165	CXII. De Incubo f. Ephialte	276
XLVI. De Infarctibus Scirrhis & Exulcerationibus Viscerum	166	CXIII. De Colica Convulsiva	277
XLVII. De Infarctu Pulmonum	168	CXIV. De Convulsionibus	278
XLVIII. De Infarctu Lienis	169	CXV. De Epilepsia	279
XLIX. De Infarctu Hepatis	171	CXVI. De Palpitatione Cordis	281
L. De Atrophie	172	CXVII. De Singultu	282
LI. De Tuberculis scirrhosis Pulmonum	174	CXVIII. De Tenesmo f. adstrictione alvi	283
LII. De Scirrho Lienis	176	CXIX. De motibus deficientibus in Genere	285
LIII. De Scirrho Hepatis	177	CXX. De Tremore	287
LIV. De Vomica Pulmonum	179	GXXI. De Vertigine	288
LV. De Empyemate	181	CXXII. De Soporosis Affectibus	289
LVI. De Exulceratione Pulmonum f. Phthisi	183	CXXIII. De Apoplexia	291
LVII. De Exulceratione Hepatis & Lienis	186	CXXIV. De Paralyfi & Hemiplexia	292
LVIII. De Exulceratione Renum & Vesicæ	187	CXXV. De Lipothymia & Syncope	294
LIX. De Calculo Renuu & Vesicæ	189	CXXVI. De Uvulæ prolapsu	296
LX. De Vitiis feri & lymphæ ac variis inde dependentibus affectibus in Genere.	192	CXXVII. De Procidencia ani	296
LXI. De coryza humida	193	CXXVIII. De Impotentia virili	298
LXII. De Lippitudine f. Ophthalmia serosa	195	CXXIX. De Febribus in Genere	299
LXIII. De Salivatione ac Ptyalismô	197	CXXX. De Febre Ephemera f. diaria simplici & plurium dierum	302
LXIV. De Tussi humida	198	CXXXI. De Febre Synocha f. Continente	303
LXV. De Astmate humido	202	CXXXII. De Synochio putrida f. Continente composita	305
LXVI. De Vomitu	205		



Tab. CXXXIII. De Febre Continua	306
CXXXIV. De Febre Biliosa ardente	308
CXXXV. De Causo f. Febre Ardente strictè sic dicta	310
CXXXVI. De Febre Inflammatoria	312
CXXXVII. De Febre Catarrhali benigna f. continua Veterum quotidiana	313
CXXXVIII. De Febre Maligna & Epidemica	315
CXXXIX. De Variolis Distinctis	317
CXL. De Variolis Confluentibus	320
CXLI. De Variolis Adultorum	322
CXLII. De Morbillis	324
CXLIII. De Febre Scarlatina	326
CXLIV. De Purpura Urticata	327
CXLV. De Purpura Rubra f. benigna	328
CXLVI. De Purpura Alba f. maligna	329
CXLVII. De Febre Catarrhali maligna f. petechizante	331
CXLVIII. De Febre Petechiali	333
CXLIX. De Febre Dysenterica f. Dysenteria c. Febre acuta	336
CL. De Febre Castrensi f. Hungarica	337
CLI. De Peste	339
CLII. De Febre Quotidiana intermittente	342
CLIII. De Febre intermittente Tertiana legitima	343
CLIV. De Febre Tertiana notha f. anomala & maligna	348
CLV. De Febre Quartana	350
CLVI. De Febribus duplicatis & triplicatis	353
CLVII. De Febre Lenta	354
CLVIII. De Febre Hætica	356
CLIX. De Febre Tertiana continua	359
CLX. De Febre Quartana continua	361
CLXI. De Febre Rheumatica	362
CLXII. De Febre Scorbutica	364
CLXIII. De Febribus Corruptis & nondum typicis	365
CLXIV. De Affectibus Sensuum internorum & externorum in Genere	366
CLXV. De Hypopio & Ptérygio	367
CLXVI. De Cataracta & Gutta serena	368
CLXVII. De Tinnitu & Susurro Aurium	369
CLXVIII. De Gravitate Auditus & Surditate	370

TAB. CLXIX. De Læsionibus Gustus & Olfactus	371
CLXX. De Memoriarum debilitate	372
CLXXI. De Mania	373
CLXXII. De Melancholia	374
CLXXIII. De Rabie Canina	376
CLXXIV. De Tarantismo	377
CLXXV. De Noctambulatione	378
CLXXVI. De Nostalgia	ib.
CLXXVII. De Appetitu depravato & aucto	379
CLXXVIII. De Anorexia	380
CLXXIX. De Sitis excessu & defectu	382
CLXXX. De Morbis Mulierum in Genere	383
CLXXXI. De Sterilitate	384
CLXXXII. De Mola	385
CLXXXIII. De Melancholia ac Mania uterina	387
CLXXXIV. De Pica & Melacia	389
CLXXXV. De Nausea ac Vomitu	390
CLXXXVI. De Varicibus	391
CLXXXVII. De Abortu	392
CLXXXVIII. De Fœtu mortuo	393
CLXXXIX. De Partu	395
CXC. De Partu difficili f. Dystocia	396
CXCI. De Secundinarum Retentione	398
CXCII. De Procidencia Uteri	399
CXCIII. De Doloribus post Partum	400
CXCIV. De Diarrhœa Cholericæ	401
CXCV. De Tumore abdominis	ibid.
CXCVI. De Lactis Abundantia	402
CXCVII. De Defectu Lactis	403
CXCVIII. De Lactis Vitiis	404
CXCIX. De Tumore Apostematode Mammæ	405
CC. De Papillarum Fissuris	406
CCI. De Retentione Meconii	407
CCII. De Aphthis	408
CCIII. De Intertrigine	409
CCIV. De Achoribus, crusta Lactea & Tinea	ibid.
CCV. De Dentitione difficili	410
CCVI. De Nævis maternis	411
CCVII. De Vermibus	412
CCVIII. De Crinonibus	413
CCIX. De Cardiogmo	414



# INDEX RERUM.

## A

- A** *Abdominis* Tumor. vid. Tumor Abdominis  
*Abortus* quid sit 392 Differentia ibid. Signa ib.  
 Subjectum ib. Prognosis ib. Remedia ib. Methodus  
 medendi 393 Cautelæ ibid.  
*Abortum* præcavet in quibusdam Venæsectio singulis men-  
 sibus instituta ibid.  
*Abscessus* Definitio 53. & 79 Differentia ibid. Signa ibid.  
 Prognosis ibid. Cura 79 Cautelæ & Observ. ibid. ad  
 aures & pedes in Vomica pulmonum salutare 179  
 aurium extrorsum ruptus periculosior quam intror-  
 sum 126  
*Absinthium* & ex eo parata in Pica & Malacia interne  
 non exhibenda 399  
*Absorbentia*, quomodo adhibenda in Febre quartana con-  
 tinua 359 nimia quid efficiant in Febre biliosa arden-  
 te 309 c. acido Citri saturata commendantur in Tussi  
 c. Febre catarrhali 202 commendantur in Hæctica 358  
 cum adstringentibus laudantur in Diabete 214 per se  
 in Tussi chronica caute usurpanda 202  
*Absorbentium* abusus vitandus in Soda 258 fixorum ni-  
 mium usum in Febre miliari quænam mala sequan-  
 tur 331  
*Abstergentes* injectiones commendantur in incontinentia  
 urinæ ab ulcere 217  
*Abstergentia* & Balsamica consolidantia suadentur in Go-  
 norrhœa simplici post virulentam 220  
*Achores* quid sint 409. quomodo differant ibid. horum  
 signa ibid.  
*Acida*, excepta aciditate Citri pectori sunt inimica 186  
 melius pura, quam dulcificata, exhibentur in Febre 301  
 blanda commendantur in Diabete 218  
*Acidula* in Congestionibus vitandæ 122 nocent in Hy-  
 drope 251 ob vim adstrictoriam promovent Infarctum  
 Lienis 171 nocent in Phthisi 187 quibusnam conve-  
 niant in Podagra 146 quando locum habeant in Scirr-  
 rho Hepatis 179 quando convenient in Scirrho Lie-  
 nis 177  
*Adstrictio* quid sit 73 ejusdem differentia ib. indicantia ib.  
*Adstringentes* pulveres vitandi in inflammatione Uvulæ  
 prolapsæ 301  
*Adstringentia* remedia 73 horum formulæ 74. 75 modus  
 operandi 75 regulæ & cautelæ ibid. fortiora in Abor-  
 tu cum hæmorrhagia enormiori caute exhibenda 393  
 in Diabete, præmature exhibita, quid pariant 218 in  
 Fluxu Cæliaco & Lienteria caute usurpanda 212 in  
 Fluxu Hepatico fugienda ibid. in Hæmorrhagia narium  
 nihil efficiunt 103 105 vitanda in Incontinentia uri-  
 næ. 217 quando exhibenda in infarctu pulmonum 169  
 quando convenient in inflammatione 150 nimis ma-  
 ture exhibita in Lippitudine quid efficiant 196 in Ne-  
 phritide spuria quid causentur 142 commendantur ex-  
 terne in Procidentia Ani 297  
*Acupunctura* Japonensium allegatur in doloribus arthri-  
 ticis 137  
*Aeris* definitio 95. differentia ib. regulæ & observ. ibid.  
*Aer* frigidus nocet in Empyemate 182 frigidus & hu-  
 midus producit Coryzam 195 humidus frigidus vitan-  
 dus in Catarro suffocativo 227 quomodo ad morbos  
 contribuat 29  
*Ætas* junior Plethoræ subjecta est 101 virilis hæmor-  
 rhoidibus obnoxia 136  
*Ætatis* definitio. 10 divisio ibid. juxta eam corporis &  
 actionum diversitas ib. seqq.  
*Album* Græcum optimum in Angina, gargarismatibus ad-  
 ditum 155 specificum in Aphthis 408  
*Alcaline* Tinct. acerrimæ laudantur in Lue Venerea 270  
 commendantur in Ictero 231 in Paralyfi 294 c. eff.  
 Pimpin. Helen. &c. in Tussi humida 20  
*Alexipharmaca* calida nocent in Febre tertiana anoma-  
 la 350 in Variolis 319 in Quartana 353  
*Alveolæ* nocent in hæmorrhagia narium 105 it in Vo-
- mitu cruento 108  
*Aloeticis* abutentes Hæmorrhoidibus sunt obnoxii 135  
*Aluminis* pulvis tibialibus in fœtore sudoris inspersus est  
 noxius 259  
*Alvus* quomodo laxa conservanda in Caufo 311 in Fe-  
 bre biliosa ardente aperta servanda 309 adstricta exa-  
 cerbat symptomata in Febribus malignis & epidemi-  
 cis 316 clausa quomodo referenda in Febre Petechia-  
 li 335 in Febre Purpura urticata 328 in Febre Rheu-  
 matica 361 in Febre tertiana continua 360 per reme-  
 dia purgantia in variolis non est aperienda 317 laxa  
 in Febre petechiali præstat adstricta 335  
*Alvi* adstrictio quid sit 283 ejusd. differentia ibid. signa  
 ib. subjecta ib. prognosis 284 remedia ibid. methodus  
 med. ib. Cautelæ 285 solvitur in Plethoricis V.S. in  
 pede 284 a sanguinis ebullitione quomodo tractanda  
 ib. promovet excretionem morbillorum 326  
*Amygdalæ dulces* cum ei paratæ gelatinæ commendan-  
 tur in Diabete 218 harum Ol. suadetur in Dysuria  
 a cantharidibus 241 amaræ allegantur in Rabie ca-  
 nin. 376 harum Ol. commendatur in aurium siccita-  
 te 370  
*Anagallis* Fl. puniceo est specifica in mania 374 in me-  
 lancholia 375  
*Analeptica* laudantur in Cachexia ab Hæmorrhagiis 247  
 dissuadentur in Febre lenta 356 in Lipothymia 295  
*Analeptica* potiones commendantur in Catarrho suffocati-  
 vo 227  
*Anasarca* vid. Leucophlegmatia  
*Anethum* in vino maceratum est specificum in Pica &  
 Malacia 389  
*Angina* definitio 154 differentia ib. signa ib. subjectum.  
 ib. prohnosis ib. remedia 155 methodus medendi ibid.  
 Cautelæ ibid. in eadem Bufo, in V.S. maceratus,  
 commendatur externe, tanquam specificum 156 Ni-  
 trum & Album Græcum in gargarismate ibid.  
*Angina* in Variolis adultorum quid indicent 323  
*Ani* procidentia quid sit 296 ejusd. differentia ibid. si-  
 gna 297 subjectum ibid. prognosis ib. remedia ib. me-  
 thodus med. ib. cautelæ ib. a dysenteria vel diarrhœa  
 quomodo tractanda ibid.  
*Anima* definitio 2 differentia ibid. finis ibid.  
*Animi* pathemata quid sint 97 eorum differentia ibid.  
 regulæ & observ. ibid. ad morbos disponunt 31 pa-  
 riunt Cephalæam 124 causantur Hæmorrhagias ute-  
 ri 115 Lochiorum suppressionem 117 Mensium defe-  
 ctum. 113  
*Anisi* seminis oleum in tussi humida laudatur 202  
*Anodynum* selectum in Dysenteria benigna 215  
*Anodyna*, quando non sint usurpanda 103 quomodo ex-  
 hibenda in Asthmate spastico 276 correctæ conveniunt  
 in Cephalæa & Clavo 122 lenia commendantur in  
 Colica sanguinea 131 in Coryza humida 194 post  
 usum sudoriferorum conveniunt in Doloribus Arthri-  
 ticis 138 cum adstringentibus quando convenient in  
 Fluxu Mensium nimio 307 Lenia commendantur in  
 Hæmorrhagia narium 105 correctæ commendantur in  
 Inflammat. Uteri 166 quando exhibenda sint in Po-  
 dagra 146 male exhibentur in Scorbuto 265 cum ad-  
 stringentibus & theriacalibus commendantur in Vo-  
 mitu 206  
*Anorexia* quid sit 380 ejusd. differentia ibid. signa ib.  
 subjectum ib. prognosis ib. remedia 381 methodus me-  
 dendi ib. cautelæ ibid. post morbos superatos occur-  
 rens quid quandoque indicet ibid.  
*Anticatatrrhalia* calidiora & volatilia in Catarrho suffo-  
 cativo quid efficiant in Sanguineis Plethoricis 227  
 calida quando noceant in Coryza humida 195 corri-  
 gentia commendantur in Gonorrhœa virulenta 267  
 in Gravedine cum selectu præscribenda 224  
*Antihæct.* Pot. vulg. usus rejicitur in Phthisi 186  
*Antimonium* crudum est specificum in scabie 260. 261  
 ejus suffitus in Fluore albo non admodum tutus 221  
 fumus robustioribus in Tuberculis scirrhosis pulmo-  
 num.



- num commendatur 175  
*Antimoniana* fixa laudantur in Variolis adultorum 323  
*Antirrhematicæ* pil. conveniunt in Salivatione ac Ptyalismo 198  
*Antiscorbutica* commendantur in Ascite 251  
*Antivenerea* ligna in scabie non exhibenda c. regimine diaphoretico 261  
*Apertio* clausurarum partium quid sit 89 hujus cautelæ *ibid.*  
*Aphæreseos* definitio 92. differentia *ibid.*  
*Aphibæ* quid sint 408 harum differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus med. *ib.* cautelæ *ib.* in Febre catarrhali maligna utpl. sunt lethales 332  
*Apophlegmatizantia* 64 horum modus operandi *ib.* Regulæ & cautelæ 65 conveniunt in odontalgia idiopathica 127  
*Apoplexia* quid sit 291 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjecta *ib.* prognosib. remedia 292 methodus med. *ib.* Cautelæ *ib.* in eadem specificus est Balsamus Succini *ib.*  
*Appetitus* quid sit 8. ejusd. differentia *ib.* sedes *ib.* causa efficiens *ib.* observationes *ib.* usus *ib.* ingens in acutis sine prægressa crisi quid indicet 380  
*Appetitus* depravatus & auctus quid sit 379 differentia *ib.* Signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ibid.* methodus medendi 380 cautelæ *ibid.*  
*Aqua* fabrorum & aluminosa prudenter adhibenda in œdema 257 Reg. Hungar. commendatur externe in nimio frigore febrium 343  
*Aqua* arterialis Caroli Musitani descriptio 120  
*Aquilegia* decoctum commendatur externe in impotentia virili 298  
*Arcanum* duplicatum male præparatum quid causetur in atrophia 174  
*Ari* Rad. commendatur in Asthmate humido 204 in infuso laudatur in Vomica pulmonum 180  
*Armoracia* allegatur in tympanite 252  
*Aromatica* spirituosæ interne Maniam exacerbant 374  
*Artemisia* carbo est specif. in epilepsia 280  
*Arteriæ* dissectæ majoris periculi sunt quam venæ 119  
*Arteriotomiæ* definitio 87 locus *ib.* modus operandi *ib.* usus *ib.* observat. & cautelæ *ib.*  
*Arthritici* doloris definitio 136 differentia *ibid.* signa 137 subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 138 cautelæ *ibid.*  
*Arthritici* dolores in senibus, partibusque inferioribus difficulter curantur 114  
*Arthriticorum* urina quomodo distinguenda ab urina calculosorum 137  
*Arthritidis* vagæ definitio 146 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 147 prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.*  
*Artium* amputatio quid sit 93 ejusdem differentia *ib.* causa *ib.* modus *ib.* cautelæ *ib.*  
*Ascia* piscis pinguedo quas virtutes obtineat in ophthalmia 154  
*Ascitis* definitio 249 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia 250 methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.*  
*Ascites*, si eidem Diarrhœa accedat, quid indicet 249 post Febres intermittentes quomodo tollatur 250 in eo rejiciuntur Canthar. 251  
*Asthma* humidum quid sit 202 ejusd. differentia *ib.* signa 203 subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 204 cautelæ 204 quandoque degenerat in Peripneumoniam 203 cum excretionem materiæ mucosæ & magna tussi citius curatur quam hisce deficientibus *ib.* in Febribus acutis periculofum *ib.* in eo commendatur extractum liquidum Stahlii 204 media ex Nicotiana caute propinanda 205  
*Asthma* siccum quid sit 229 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 230 prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ 231 cum scirrhusa hepatis labe difficillime curatur 230 a Variolis & morbillis quomodo tractetur a Sydenhamio 231  
*Asthma* spasticum s. convulsivum quid sit 275 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 276 cautelæ *ibid.* ab eo tandem oritur hydrops pectoris 275  
*Astropi*, quid sit 172 ejusd. differentia *ib.* signa 173 subjectum 174 prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 174 cautelæ *ib.* ab incantationibus est pessima 173 quandoque tollitur per Febres intermittentes *ib.* quandoque sola Tinæ & ris Ludov. & arcano duplicato curatur 174 in ea doses minores medicamentorum commendantur *ibid.* in principio ejus malæ præscribuntur nutrientia *ib.*  
*Auditus* gravitas vid. Gravitas auditus  
*Aurantiorum* Cort. commendantur in Anorexia 381 in Incubo 277 essent. commendatur in Cardialgia 129 in Colica 131  
*Aurum* dolor exquisitior est quam oculorum. 126  
*Aurum* fulminans convulsiones potentissime præcavet 407

## B

- B** *Alnea* & stuphæ sudatoriæ, quid in illis observandum 245 ex herbis aromaticis & leniter emollientibus commendantur in sterilitate 385 nocent in malo ischiadico 143 emollientia commendantur in atrophia 174  
*Balsamus* Indicus externe quid efficiat in Podagra 146 mineralis laudatur in Phthisi 185 mundificans nervinus D. Stahlii ubi profit 127 Scherzerianus laudatur in torminibus a Dysenteria 215 Succini est specificus in Apoplexia 292  
*Balsama* cephalica quid efficiant in coryza Sanguineor. & Cholericor. 195 in gravedine caute adhibenda. 224  
*Balsamica* acria in Cephalæa quando usurpanda 125 in Phthisi fugienda & cur 186 in principio Gonorrhœæ virulentæ 267  
*Barbette* emplastrum saponatum commendatur in incontinentia urinæ 218 quando locum habeat in malo Ischiadico 143 laudatur in nephritide 165 allegatur in scirrho lienis 176  
*Beccberi* pilulæ laudantur in Asthmate humido a suppressione fluxuum sanguinis 204 tollunt Diarrhœam 209 laudantur in Febre catarrhali ad libertatem alvi promovendam 315 commendantur in Febre Quartana 352 conveniunt in Febre Quotidiana intermittente 347 in Febre Tertianâ intermittente 346 in Fluore albo 221 in Fluxu cœliaco & lienteria 211 in Gravedine & dolore capitis catarrhali 224 in Hæmorrhoidibus seroso-mucosis 213 in Pollutione nocturna & Gonorrhœa 219 commendantur in Salivatione a vitio hypochondriorum 198 in Tussi pectorali 200 in V. Melissæ & Cinamomi solutæ laudantur in Vomitu 205  
*Beccabunga* succus commendatur in stomacace 264  
*Bellidis* Flor. succus laudatur in infarctu Lienis 171  
*Billis* definitio 5 differentia *ibid.* materia *ibid.* de Bile observ. semioticæ 48  
*Bilis* carnis atrii allegatur tanquam antepilepticum 272 crocea in diarrhœa excreta quid indicet 208  
*Birckmanni* pulvis stomachicus convenit in Tussi humida stomachali 201  
*Bisturiæ* radix commendatur in Angina in gargarismatibus 155  
*Bolaria* rejiciuntur in Febribus 300 cur vitanda in Febre epidemica 316 nocem externe in hæmorrhoidibus verrucosis 136  
*Branchus* & Raucedo quid sint 224 horum differentia *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.* in illis commendatur aqua Veron. spirit. Stahlii *ib.* vitandus abusus expectantium *ib.*  
*Bubones*, nisi in peste promte maturescant, sunt funestissimi 39 excisi & pulverisati sunt specifici in peste 341 Venerei melius per interna quam externa curantur 267  
*Buso* in S. V. maceratus commendatur in Angina 156 exsiccatus laudatur in Apoplexia 292 in Comate virgili & somnolento 290 est specificus in Hydrope 247 & 250 exsiccatus mali imponitur in odontalgia 127



## C

- Cachexia** & Chloroseos definitio 246 differentia *ib.*  
**signa** *ib.* **subjectum** *ib.* **prognosis** *ib.* **remedia** 247  
**methodus medendi** *ib.* **cautelæ** *ib.*  
*Cachexia* ab hauſtu frigida difficulter tollitur *ib.* in illa  
vitanda diuretica fortiora *ib.* quando Salia Volatilia  
in illa poſſint adhiberi *ib.* per adſtringentia tractata  
parit catarrhum ſuffocativum. *ib.*  
*Cacochimie* definitio 21. differentia *ib.* **signa** *ib.* **subjectum**  
*ib.* **observat.** *ib.* **correctio** quid ſit 72 ejusd. differentia  
*ib.* **indicantia** *ib.* **remedia** *ib.* **remediorum** **modus o-**  
**perandi** 73 **regulæ & cautelæ practicæ** *ib.*  
*Calculorum* definitio 24 differentia *ib.* **materiæ** *ib.* **subje-**  
**ctum** *ib.*  
*de Calculis* **observationes** *ib.*  
*Calculi Renum & Veficæ* definitio 189 differentia *ib.*  
**signa** *ib.* **subjectum** 190 **prognosis** *ib.* **remedia** 191 **me-**  
**thodus medendi** *ib.* **cautelæ** 192  
*Calcis vivæ* aqua convenit in tumore œdematoſo cum  
ruboribus 257  
*Calidiora* medicamenta ad lochia promovenda non præ-  
ſcribenda & cur? 166  
*Camphora* in Hydromphalo & Hydrocele parum efficit  
255 in Inflammationibus interne cur non danda 150  
non convenit in Miſtu cruento 118. vitanda in Ne-  
phritide aut cum cautela adhibenda 165 externe in  
Oedemate nullius eſt uſus 257  
*Camphorata* in cephalæa quando uſurpanda 125 commen-  
dantur in comate 290 quando convenient in coryza  
humida 194 quamdiu in Pleuritide & Peripneumonia  
poſſint applicari 157  
*Cancer* Salivatione exacerbatur 272  
*Canceri* **signa** 270 **subjectum** 271 **prognosis** *ib.* **remedia** *ib.*  
**methodus medendi** *ib.* **cautelæ** 272 **exulcerati curati**  
**exemplum** 271  
*Canceri* **mammæ** definitio 62 & 270 differentia *ib.*  
**signa** 92 **cauſæ** *ib.* **curatio** *ib.* **prognosis** *ib.* **cautelæ**  
& **observat.** *ib.*  
*Canceri* **combusti** externe commendantur in Rabie cani-  
na 376  
*Cantharides* in Aſcite caute adhibendæ 251 rejiciuntur in  
Gonorrhœa 220  
*Capitis* dolor catarrhalis vid. Gravedo  
*Cardialgiæ* definitio 128 differentia *ib.* **signa** *ib.* **subjecta**  
*ib.* **prognosis** 129 **remedia** *ib.* **methodus medendi** *ib.*  
**cautelæ** *ib.* **ſyncopticæ**, quando ſiant in febre bilioſa  
ardente 308  
*Cardialgia* quando periculofa 129 quomodo in ea adhi-  
benda opiata *ib.*  
*Cardiognus* quid ſit 414. ejusd. differentia *ib.* **signa** *ib.*  
**subjectum** *ib.* **prognosis** *ib.* **remedia** *ib.* **methodus me-**  
**dendi** *ib.* **cautelæ** *ib.* in eo commendatur Tinctur. Vi-  
trioli ꝑtis *ib.*  
*Cardui* Mar. ſemen eſt ſpecificum in omnibus inflam-  
mationibus internis 159  
*Caries* offium quid ſit 84 ejusd. **signa** *ib.* **cauſa** *ib.* **pro-**  
**gnosis** *ib.* **cura** *ib.* **cautelæ & observ.** *ib.*  
*Caries* dentium quomodo præſervanda 128  
*Carminativa* quando danda ſint in colica 132 calidiora  
vitanda in Colica bilioſa & ſanguinea *ib.* **tonica** quan-  
do in Cauſo adhibenda 312 in principio flatulentia vitan-  
da 237  
*Caruncula* urethræ quomodo in Gonorrhœa extirpandæ 167  
*Cariophyllorum* oleum commendatur in Odontalgia 128  
*Cascarilla* vid. Chacarilla.  
*Cassia* auget flatulentiam & atoniam 237  
*Castrationis* definitio 93 differentia *ib.* **indicantia** *ib.* **pro-**  
**gnosis** *ib.* **operatio** *ib.* **cautelæ & observat.** *ib.*  
*Cari* **signa** 289 **subjecta** *ib.* **remedia** 290  
*Casus* recens cum pelle leporina applicatus laudatur  
in Podagra 145  
*Cataractæ* definitio 368 differentia *ib.* **signa** *ib.* **subjectum**  
*ib.* **prognosis** *ib.* **remedia** *ib.* **methodus medendi** 369  
**cautelæ** *ib.*  
*Catarrhi* ſuffocativi definitio 225 differentia *ib.* **signa** 226  
**subjectum** *ib.* **prognosis** *ib.* **remedia** *ib.* **methodus me-**  
**dendi** 227 **cautelæ** *ib.* in eodem commendatur rad.  
Aſari *ib.* quando locum in illo habeant catarrhalia *ib.*  
*Catheterismus* quid ſit 90  
*Catheteris* differentia *ib.*  
*Catheterismi* **indicantia** *ib.*  
*Catheter* quomodo applicandus *ib.* de eo cautelæ & ob-  
ſervationes *ib.*  
*Cauſtica* in tumoribus œdematoſis male applicantur 251  
*Causus* vid. ſub. Febribus  
*Cauterifatio* ubi fugienda 120 glandulæ lacrymalis com-  
mendatur in lippitudine 196  
*Centaurium* minus laudatur in proſtratione appetitus idio-  
pathica 391  
*Cepæ* aſſatæ commendantur in ſtranguria 239  
*Cephalææ* differentia 124 chronicæ curatu difficiles *ib.* ſi-  
gna generalia *ib.* ſpecialia *ib.* **venereæ & ulcerofæ** ſig-  
*ib.* **subjectum** *ib.* **prognosis** *ib.* **remedia** *ib.* **methodus**  
**medendi** 125 **cautelæ** *ib.*  
*Cephalæa* ex hypochondriis orta quando exacerbetur Mar-  
tialibus *ib.* in quanam præſint veſicatoria 126  
*Cephalalgia* ſanguinea quid ſit 122 ejusd. differentia *ib.*  
**signa** *ib.* **idiopathica** quid ſit *ib.* ejusd. **subjectum** *ib.*  
**prognosis** *ib.* **remedia** 123 **methodus medendi** *ib.* **cau-**  
**telæ** *ib.*  
*Cerberus* triceps quid de eo cenſendum in febre tertiana  
anomala ex maligna 350  
*Cerebrum* in parte anteriora corruptum parit læſionem  
olfactus 371  
*Chacarilla* cortex & extractum laudantur in Diarrhœa 209  
in Diarrhœa in variolis nimium urgente 318 ſunt ſpe-  
cifica in Dyſenteria 215 commendatur in dolore dorſi  
& lumborum in Variolis 318 commendatur in Febri-  
bus in Vomitu nimio 303 in pleuritide 157 habet vim  
diaphoreticam 323  
*Chamomillæ & Galeopſ.* Fl. decoctum c. vino commen-  
dantur in fluore albo 221 ejusd. decoctum laudatur  
in Pica gravidarum 390  
*Cherefolium* quid de eo ſentiendum in inflammationibus  
253  
*Chelidonii* maj. herba externe ſuadetur in Aſcite 250 ra-  
dix, tanquam ſpecificum, laudatur in ictero 233  
*China* Chinæ diſſuadetur in Febre tertiana continua 361  
in Febribus exhibita excitat Bulimum 379  
*Chirurgiæ* definitio 80 differentia *ib.* **operationes** *ib.* **instru-**  
**menta** *ib.* **remedia** 81 **finis** *ib.* **cautelæ & observ.** *ib.*  
*Chlorosis* vid. Cachexia  
*Choleræ* humidæ definitio 209 differentia *ib.* **signa** *ib.* **sub-**  
**jectum** 16 **prognosis** 210 **remedia** *ib.* **methodus meden-**  
**di** *ib.* **cautelæ** *ib.*  
*Cholericorum* morbi. 33  
*Chylificationis* definitio 9 differentia *ib.* **organum** *ib.* **cau-**  
**ſa efficiens** *ib.* **uſus** *ib.* **observationes** *ib.*  
*Cibus & Potus* quomodo hominem ad morbos diſpo-  
nant 130  
*Cibi* definitio 95 differentia *ib.* **regulæ & observ.** *ib.*  
*Cibi* lubricantes conveniunt in ſcirrho hepatis 388  
*Cichorium* laudatur in affectibus hepatis 172 ejusd. rad.  
laudatur in ſcirrho lienis 177 ejusd. & Taraxaci alio-  
rumque ſucci pro calidioribus laudantur in ſarctu lie-  
nis 171  
*Cinnabaris* ꝑtis commendatur in variolis confluentibus in  
ceſſatione ſalivationis 322  
*Cinnabarina* quando locum habeant in convulſionibus 273  
in pyaliſmo hypochondriaco doſi minori exhibenda  
198 cum nitroſis ebullitionem humorum mitigant in  
Cephalalgia ſanguinea 123  
*Circuli* ſanguinis definitio 2 differentia *ib.* **organum** *ib.*  
**cauſa efficiens** *ib.* **finis** *ib.* **observationes** *ib.*  
*Cirri* ſuccus recens laudatur in Febre catarrhali maligna  
333 in Febre petechiali 335 ad æſtum Febris tertia-  
næ continuæ temperandum 360  
*Clavi* hyſterici definitio 123 **signa** 124  
*Clausuræ* partium differentia 89 **signa** *ib.* **prognosis** *ib.*  
**methodus medendi** *ib.*  
*Clyſteres* acres commendantur in Catarrho ſuffocativo  
227 quales adhibendi in Colica convulſiva 278 qui-  
nam convenient in Febre caſtrenſi cum dyſenteria  
339 carminativi in Flatulentia caute adhibendi 237  
quales eſſe debeant in Hepatitide & Splenitide 159  
quales in Inflammatione uteri ſint adhibendi 166 acres  
com-



commendantur in Lethargo 289 nimium emollientes in Obstructione Alvi in senibus vitandi 239 quales in Purpura rubra noceant 329  
*Cochlearia* succus commendatur in Stomacace 264 spiritus in Stomacace vitandus & cur 265  
*Cottionis* & cruditatis definitio 36 differentia *ib.* signa 37 causa efficiens *ib.* de his observ. *ib.*  
*Colica* definitio 130 differentia *ib.* signa generalia *ib.* specialia *ib.* subjecta *ib.* prognosib. remedia generalia *ib.* specialia 131 methodus medendi *ib.* cautelæ 140 pertinaci superveniens sudor copiosus quid indicet 130 biliosæ Cholericæ maxime sunt obnoxii *ib.*  
*Colica* flatulenta minoris est periculi quam biliosa & convulsiva *ib.*  
*Colica* convulsivæ definitio 277 differentia *ib.* signa *ib.* subjecta *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 278 cautelæ *ib.* in Colica convulsiva exhibenda purgantia selectissima *ib.*  
*Collyrium* weisbachii commendatur in Ophthalmia 153  
*Comatis* somnolenti signa 290 vigilis *ib.* utriusque remedia *ib.* subjecta *ib.*  
*Commoventia* nocent in scirrhus Lienis 271 fortiora & evacuantia in morbis mulierum caute exhibenda 384  
*Comitissæ* unguentum allegatur in Diabete 218 camphoratum in Ischuria 243  
*Conceptionis* definitio 14 requisita *ib.* locus *ib.* causa efficiens *ib.* & graviditatis signa *ib.* de conceptione observat. *ib.*  
*Congestionum* in genere definitio 120 differentia *ib.* signa 121 subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.* completarum & incompletarum symptomata 25  
*Consuetudinis* ægrotandi definitio 34 differentia *ib.* subjectum *ib.* de ea observat. *ib.*  
*Convulsiones* quid sint 278 earund. differentia *ib.* signa *ib.* subjecta *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 279 cautelæ *ib.* quando periculosa in variolis 318 quandoque per Febrem tertianam solvuntur 345  
*Coralia* melius dantur in declinatione Febris & cur? 77 ob duritiem vitanda in dentifriciis 259  
*Cortandri* semen commendatur in vertigine 289  
*Corporis* humani definitio 2 materia *ib.* mixtio *ib.* structura *ib.* divisio *ib.* observat. *ib.* & actionum diversitas ratione ætatum 10 seqq. habitus & ex eo signa 43  
*Correctio* motuum excedentium vid. Motus.  
*Corroboratio* per Analeptica frigida quid sit 77 ejusd. differentia *ib.* indicantia *ib.*  
*Corroborantia* *ib.* horum formulæ *ib.* modus operandi 78 regulæ & cautelæ *ib.*  
*Coryza* humidæ definitio 193 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 194 prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ 195 si in ea in senibus mucus non bene procedat, quid indicet. 194  
*Crotonis* M. P. de Succino commendatur in Gravedine 224 in Hemisrania 139 in Odontalgia 128  
*Crota* decocta cum fructu adhibetur in vermibus 413  
*Crinones* s. Comedones quid sint *ib.* horum differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 414  
*Crisis* quid sit 38 ejusd. differentia *ib.* tempus *ib.* subjectum *ib.* imminens signa *ib.* præsentis 39 causa efficiens *ib.*  
*Critici* dies 29  
*Critica* evacuationes quando suspectæ 39  
*Croci* Lochiorum fluxum promovet 117 ejus abusus parit Lethargum 289 *Crus* Stalii laudatur in febribus intermittens 343  
*Crolli* Extractum Panchymagogum commendatur in Coryza humida 194 in Gravedine 224  
*Crysalis* montana in Causo cautissime usurpanda & cur? 311 commendatur in Ictero 233  
*Crusta* Lactea vid. Achores.  
*Cucuphe* quando noceant 123 ex herba verbenæ commendantur in phrenitide 152 aromaticæ quibus non sint ordinandæ in memoriæ debilitate 374  
*Curcumæ* radix commendatur in Ictero 232  
*Cyclaminis* ∇ laudatur in surditate a vi externa 371  
*Cynoglossa* M. P. ex ea commendatur in Cholera humida 210 in Dysuria 240 in Hæmorrhagia uterina 208

laudatur in sopienda Tussi 201 cum Cinnabarinis commendatur in Coriza humida 194

## D

*Decocta* lignorum in Gonorrhœa virulenta diluta suadentur 267  
*Decubitus* ex eo signa 53  
*Deglutitio* quid sit 9 ejusd. organum *ib.* causa efficiens *ib.*  
*Dens* hominis mortui est specificum in Odontalgia 127  
*de Dentibus* observationes semioticæ 51  
*Dentitio* difficilis quid sit 410 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 411 prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.*  
*Dentium* evulsio quid sit 284 ejusd. indicans *ib.* instrumenta *ib.* modus *ib.* cautelæ *ib.*  
*Diabetes* definitio 217 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia 218 methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.*  
*Diagnostica* signa 35  
*Diarrhœa* definitio 207 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* remedia 208 methodus medendi *ib.* cautelæ 209 nimix quomodo in Variolis compescendæ 318 in salivatione accidentes quomodo tractandæ 270 in Febre catarrhali 272 in Febre Castrensi 339 in Febre Catarrhali maligna quid requirant 333 quando innoxia in Febribus malignis & epidemicis 316 menstruæ ingravida innoxia 214 in Morbillis salutare observatæ *ib.* critices in Hepatitide salutare 158  
*Diarrhœa* choleriodes quid sit 401 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus med. *ib.* cautelæ *ib.* in ea commendantur Rhabarbarina *ib.*  
*Diata* definitio 94 differentia *ib.* ætatum definitio 97 differentia *ib.* regulæ & observationes *ib.* respectu sexus definitio 98 differentia *ib.* regulæ & observationes *ib.* respectu temperamentorum definitio *ib.* differentia *ib.* regulæ & observationes 99 ægrorum regulæ & observationes generales *ib.* speciales *ib.*  
*Diata* Melancholicorum qualis esse debeat 376 aromatica commendatur in Anasarca 248 qualis esse debeat in Salivatione 270 falsa & acida nocet Cancrosis 272 qualis esse debeat in Palpitatione cordis 282 aromatica convenit in Asthmate humido 204  
*Diaphoresis* quid sit 61 ejusd. differentia *ib.* indicantia *ib.*  
*Diaphoretica* remedia *ib.* horum formulæ *ib.* modus operandi 62 tempus exhibendi *ib.* regulæ & cautelæ *ib.*  
*Diaphoreticum* regimen actuale nocet in Malo Ischiadico 143  
*Diaphoretica* fortiora nocent in Asthmate spastico 276 in Exulceratione Renum & Vesicæ & cur 283 præmature data in Febribus quid efficiant 301 acia in Febre biliosa ardente vitanda 309 non sint nimis commoventia in Febre Inflammatoria 313 positive talia in Febre scarlatina non sunt exhibenda 327 neque in Purpura urticata 328 fortiora quænam mala inducant in Splenitide & Hepatitide 159  
*per Diaphoretica* Pestis cura nunquam principaliter tentanda 342  
*Diuresis* definitio 86 ejusd. differentia *ib.*  
*Differentia* morborum essentialis *ib.* accidentalis *ib.* symptomatum 25  
*Diorthoses* definitio 94 differentia *ib.* instrumenta *ib.* modus *ib.* usus *ib.* cautelæ *ib.*  
*Discurientia* commendantur in Colica sanguinea 131 externe quando in Coryza humida applicanda 195 commendantur in Hæmorrhoidibus cæcis 137 in Odontalgia sympathica 127 cum emollientibus in Procidencia Ani 297  
*Diuresis* & per eam evacuatio quid sit 59 ejusd. differentia *ib.* indicantia 60  
*Diuretica* remedia *ib.* horum formulæ *ib.* modus operandi *ib.* regulæ & cautelæ 61 fortiora vitanda in Cachexia & Chlorosi 247 in Gonorrhœa &c. 220 in principio Dysuriæ nullius usus sunt 241 nocent in Hæmorrhoidibus seroso-mucosis 214 vitanda in Mictione imminuta 242 oleosa nocent in Nephritide 164 fortiora pariunt urinæ Incontinentiam 216 salina in morbis pectoris caute usurpanda 254  
*Diuretica* Tincturæ commendantur in Anasarca 248



*Dolor* acerbus in mediotallo partis quid indicet in Gangræna 251  
*Dolores* post partum quid sint 400 horum differentia ib. signa ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib. in eis a Foresto commendatur decoctum Chamomillæ ib. vitanda pel-  
 lentia & carminativa fortiora ib.  
*Doronic* rad. commendatur in Vertigine 289  
*Dysenteria* benigna quid sit 214 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 215 methodus medendi ib. cautelæ ib. in ea adulti gravius affliguntur 214 in illa excrementa mucosa sunt magis periculosa quam sanguinea ib. in ea commendantur Clysteres ex lacte 115 c. Lipothymiis quid indicent 295  
*Dysstocia* vid. Partus difficilis  
*Dysuria* quid sit 240 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 241 cautelæ ib. cum excretionem muci viscidum difficulter curatur 240 it. ab Exulceratione Vesicæ ib.

## E

*Lequarium* de Ovo commendatur in Paraphrenitide de 152 in Mania 374  
*Elixir* Polychrestum Hallense laudatur in Peste 341  
*Emeticum* sine pari Kortholti 271  
*Emmenagoga* vid. Hæmagoga fortiora ad promovendum abortum sumta pariunt sterilitatem 385  
*Emollio* partium durarum quid sit 75 hujus differentia ib. indicantia ib. remedia ib. formulæ ib.  
*Emollientium* modus operandi 76 regulæ & cautelæ ib.  
*Emollientia* ab initio in Angina non sunt applicanda 155 vitanda in Ophthalmia 154 quando in Otalgia sint usurpanda 127  
*Emplastrum* Ceratum matricale laudatur in malo Ischiadico 134 Diachyl. simplex ubi conveniat in Angina 155 Diachyl. c. Gummatibus quando locum habeat in Angina ib. e Galbano camphoratum commendatur in Podagræ initio 146 de Meliloto in Odontalgia est optimum discutiens 127  
*Empyematis* definitio 181 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 182 methodus medendi ib. cautelæ ib.  
*in Empyemate* quale pus salutare sit 181 pus omne non simul & semel evacuandum 182  
*Emulsiones* commendantur in Catarrho suffocativo in Febre concurrente 227 quales convenient in Febre inflammatoria 312 quænam locum habeant in Febre Purpura 329 ex sem. IV. frigidis majoribus commendantur in stranguria 239 in Variolis in sudore nimio 319  
*Emulsivo* refrigerantia & narcotica vitanda in Raucedine & Brancho 225  
*Ephialtes* vid. Incubus  
*Epilepsia* quid sit 279 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib. tollitur quartana ib. a Lymphæ vitio quomodo tractanda ib. ab orgasmo sanguinis & feminis quomodo curetur ib. in ea tanquam specificum commendatur bilis canis atrii 273  
*Equinus* testiculus commendatur in hæmorrhagia uterina 398  
*Equitatio* commendatur in Ascite recentiori 251 in Melancholia 305 in Phthisi 186 in Tympanite 252  
*Errhina* & Ptarmica quomodo differant 65 horum indicantia ib. remedia ib. formulæ ib. horum remedium modus operandi ib. regulæ & cautelæ ib. coryzam humidam quandoque graviolem reddunt 165  
*Error* Medicorum Practicorum quid sint 5 horum causas ib. effectus in Variis morbis ib. seqq.  
*Error* naturæ quid sint 27 horum differentia ib. causa efficiens ib. effectus in variis morbis ib. seqq.  
*de Erroribus* Medicorum & Naturæ observationes 28  
*Essentia* Alexipharmaca Stahlia convenit in Diarrhœa in principio Variolarum 318 commendatur in Febre biliosa ardente 308 in Febre catarrhali maligna & epidemica 316 in Febribus corruptis minoribus dosibus exhibenda 365 laudatur in Febre inflammato-

ria 312 in Febre petechiali 335 in Febre tertiana continua versus Paroxysmum non exhibenda 363 c. eff. Scord. mixta commendatur in Febre tertiana maligna 350  
*Essent.* dulc. Hallensis est verum Cardiacum 282 per eam curata Catalepsis 275 convenit in convulsionibus 273 commendatur tanquam anodynum in Diarrhœa 209 concentrata commendatur tanquam Analepticum in Febre Inflammatoria 313 in Hæmorrhoidibus suppressis 111 est specificum in Mania 374 in Melancholia 375 laudatur in morbis oculorum 153 commendatur in Volvulo 163  
*Etmulleri* pulvis ex pulvere viperarum & crystallo montana commendatur in Febre dysenterica 337 ejusd. pulvis pro Lætimingis 217  
*Evacuationes* per epicrasin sunt optimæ in Tympanite 252  
*Eventus* morbi modus 37 differentia ib. seq.  
*Euphrasia* laudatur in infuso in oculorum affectibus 369  
*Exaresis* quid sit 90 ejusd. differentia ib.  
*Excreta* & retenta quid sint 96 horum regulæ & observationes ib. morbos inducunt 30  
*Expectorantia* dulcia nimium exhibita nocent in Brancho & Raucedine 225 in Phthisi 186 quomodo in Tuberculis scirrhis pulmonum exhiberi possunt 176 vitanda in Vomica pulmonum 180 in quavis Tussi caute adhibenda 202  
*Expectoratio* quid sit 66 ejusd. differentia ib. indicantia ib. remedia ib. modus operandi 67 regulæ & cautelæ ib.  
*Extractum* liquidum Stahlia laudatur in Asthmate humido pectorali 204  
*Exulceratio* Hepatis & Lienis quid sint 185 horum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 187 methodus medendi ib. cautelæ ib.  
*Exulceratio* Pulmonum vid. Phthisis  
*Exulceratio* Renum & Vesicæ quid sint ib. horum differentia ib. signa ib. subjectum 188 prognosib. remedia ib. methodus med. 189. cautelæ ib.  
*Exulceratio* viscerum quid sit 165 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum 167 prognosib. remedia ib. methodus medendi 168. cautelæ ib.

## F

*Facies* quid sit 42 ejusd. differentia ib.  
*Ex Facie* signa ib.  
*Facies* Hippocratica ib.  
*Farcimina* ex cristis & testibus gallorum commendantur in impotentia virili 298  
*Fasciatio* ( Bandages ) definitio 180  
*Fascia* quomodo differant 81 quomodo applicandæ ib. harum usus 82 cautelæ & observat. ib.  
*Faucium* differentia 51  
*de Faucibus* observat. semeiotica ib.  
*Faventini* ( Leonelli ) Pilulæ hydragogæ 250  
*Faces* alvi quid sint 5 quomodo differant ib. & 49 harum materia ib.  
*ex Facibus* alvinis signa 49  
*Febris* definitio 299 differentia ib. signa 300 subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 301 cautelæ ib.  
*in Febre* vitanda subadstringentia 300 quid censendum de Sale digestivo Sylvii ib.  
*Febris* ardentis stricte sic dictæ & causi definitio 310 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus med. 311 Cautelæ ib. ejusd. observatio notatu digna 310  
*Febris* biliosa ardens quid sit 308 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 309 cautelæ ib. in ea crisis optime fit per vomitum l. diarrhœam 39  
*Febris* catarrhalis benigna s. continua quotidiana veterum 313 quid sit ib. quomodo differat ib. ejus signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 314 methodus medendi ib. cautelæ ib. per acria alexipharmaca tractata facile degenerat in malignam ib. in lentam degenerans quomodo tractanda ib.  
*Febris* catarrhalis maligna petechizans quid sit 331 ejusd. dif-



- differentia ib. signa ib. subjecta 332 prognosib. remedia ib. methodus medendi 16 cautela ib.  
*Febris Castrensis* s. *Hungaricæ* definitio 337 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum 338 prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela 339  
*in Febre Castrensi* vitanda Theriacalia ib.  
*Febris continua* quid sit 306 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 307 methodus medendi ib. cautela ib.  
*Febres corruptæ & nondum typicæ* quid sint 365 horum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela ib. in his vitanda commoventia ib. commendatur Essent. alexipharmaca Stahlī c. essent. Scordī ib.  
*Febris dysenterica* quid sit 336 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 337 cautela ib.  
*Febris ephemeræ* definitio 302 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela 303  
*Febris epidemicæ* definitio 315 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 316 methodus medendi ib. cautela ib.  
*Febris hecticæ* definitio 356 differentia ib. signa ib. subjectum 357 prognosib. remedia ib. methodus medendi 358 cautela ib. inveterata nulla remedia admittit 357 maxime aucta vertitur in continuam ib.  
*Febris inflammatoriæ* definitio 312 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 33 cautela ib.  
*Febris lentæ* definitio 354 differentia ib. signa ib. subjectum 355 prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela 356 ex intermittente quomodo tractanda 355 ex acuta orta quam methodum exposcat ib. a profusione sanguinis enormi 356  
*Febris malignæ* definitio 315 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 316 methodus medendi ib. cautela ib.  
*Febris petechialis* definitio 333 differentia ib. signa 334 subjectum ib. prognosib. remedia 335 methodus medendi ib. cautela ib.  
*Febris purpura urticata* vid. infr. *Purpura*  
*Febris purpura alba* ib. rubra ib.  
*Febris quartanæ* definitio 350 differentia ib. signa ib. subjectum 351 prognosib. remedia 352 methodus medendi ib. cautela 353  
*Febris quartanæ continuæ* definitio 359 differentia ib. signa ib. subjectum ib. remedia 360 methodus medendi ib. cautela ib.  
*Febris quotidianæ intermittens* definitio 342 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 343 cautela ib. quando degeneret in continuam 342  
*Febris rheumaticæ* definitio 362 differentia ib. signa ib. subjectum 363 prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela ib.  
*Febris scarlatinæ* definitio 326 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela 327  
*Febris scorbuticæ* definitio 364 differentia ib. signa ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 365 cautela ib.  
*Febres synochæ* s. continentis definitio 303 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 304 cautela ib. observat. ib.  
*Febris synochæ putridæ* s. continentis compositæ definitio 305 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela ib.  
*Febris tertianæ anomalæ* definitio 348 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 349 methodus medendi ib. cautela 350  
*Febris tertianæ continuæ* definitio 359 differentia ib. signa ib. subjectum ib. remedia 360 methodus medendi ib. cautela ib.  
*Febris tertianæ legitimæ intermittens* definitio 343 differentia ib. signa 344 subjectum ib. prognosib. remedia 345 methodus medendi 346 cautela 347  
*Febris tertianæ malignæ* definitio 348 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 350 cautela ib.  
*thodus medendi* 350 cautela ib.  
*Fistularum* definitio 89 differentia ib. signa ib. causa ib. prognosib. cura ib. cautela & observat. ib.  
*Flatulentia* quid sit 235 ejusd. differentia ib. signa 236 subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 237 cautela ib. facile acquirit habitum 236 in ea commendatur motus moderatus 237 a mens. & hæmorrhoidum malo successu quid pariat 236  
*Flatus* quid sint 23 horum differentia ib. sedes ib. materia ib. subjectum ib. effectus ib. observationes ib.  
*Fluvium* expulsio quid sit 78 hujus differentia 79 indicantia ib. remedia ib. formulæ ib. remediorum modus oper. ib. regulæ & cautela ib.  
*Fluxor* aibus simplex quid sit 220 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 221 methodus medendi ib. cautela ib. per pilulas Stahlianas in gravida sublatus 220 in puellam decem annorum & infante duorum cum dimidio observatus ib. sublatus per fluxum mensium ib. suppressus parit Arthritidem ib. Cachexiam & Hecticam 221 in eo fumus 311 non semper tutus ib.  
*Fluxus Cæliacus* vid. *Lienteria*.  
*Fluxus Hepaticus* quid sit 212 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela ib. non tollendus per Adstringentia ib.  
*Fætor oris* quid sit 258 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 259 cautela ib.  
*Fætor sudoris* quid sit ib. ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela ib. in acutis quomodo tractandus ib. a corruptione humorum dependens ib. in eo pulvis Aluminis male adhibetur ib.  
*Fœtus mortui* definitio 393 signa ib. & 90 subjectum 394 prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela ib. extractio quid sit 90 ejus prognosib. modus ib. cautela & observat. 91  
*Fonticulus* quid sit 88 ejus locus ib. modus excitandi ib. usus ib. cautela & observat. ib.  
*Fonticuli* quando locum habeant in *Cephalæa* 126 in *Ophthalmia* consolidati quando eam reddant pejorem 154 in *Ophthalmia* serosa medicationi internæ postponendi & cur 197  
*Foresti* unguentum in *Hydrocephalo* quid de eo censendum 253  
*Formicarum* spiritus laudatur in doloribus arthriticis confirmatis 235 succus commendatur in *Cataracta* & *Gutta serena* 368  
*Formulæ* aquosæ nocent in *Ascite* 251  
*Forus* vaporosi cum vino commendantur in *œdemate* 257  
*Fractura* quid sit 82 ejusd. differentia ib. causa ib. signa ib. prognosib. cura 83 cautela & observationes ib. simpliciter per transversum quam cum comminutione mitiora habet symptomata 82  
*Fragorum* aqua nephriticis sensibilibus non exhibenda 164  
*Frictiones* pedum commendantur in *Apoplexia* 292  
*Frigida* auribus sunt inimica 371  
*Fumaria* in *Lue Venerea* non præscribenda est & cur 270 ejus aqua destillata nocet in *Variolis* 320

G

- G** *Alege* aqua convenit in *Febre* epidemica maligna 316 in *Purpura* rubra 328 in *Variolis* 318  
*Gangrænæ* signa 149  
*Gargarismata* adstringentia commendantur in *Salivatione* & *ptyalismo* 198  
*Gelatina* C. C. commendatur in *Catarrho* suffocativo ad leniendam febrem 227 laudatur in *Febre* catarrhali maligna 333 c. amygdalis parata laudatur in *Febre* *Hectica* 358  
*Gelatina* *Viperina* 203  
*Gemmata* tenerioribus in *Febre* miliari non sunt exhibenda 331  
*Generationis* definitio 14 organa ib. causa efficiens ib. finis ib. Glo-



*Globulorum plumbeorum* & sagittarum extractio quid sit 91 horum differentia ib. prognosib. modus extractionis ib. cautelæ & observ. 92

*Gonorrhæa simplex* vid. Pollutio nocturna

*Gonorrhæa virulenta* quid sit 265 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 266 methodus medendi ib. cautelæ 267 quando locum in ea habeant balsamica acriora ib. in ea commendantur decocta lignorum dilutiora ib.

*Graved.* & doloris capitis catarrhalis definitio 223 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ 224

*Graviditatis* signa 14

*Gravitas* auditus quid sit 370 ejusd. differentia ib. signa ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 371 cautelæ ib. in Febribus quomodo tractanda ib. quomodo tollenda in senibus ib.

*Gummatoso Balsamica* augent dolores in Cancro 271

*Gummi-resinæ* commendantur in Anasarca 248 pro suffimigio in Asthmate spastico 275 commendantur in Tympanite 252

*Gutta serena* quid sit 368 ejusdem differentia ib. signa ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 369 cautelæ ib.

## H

**H** *Abitus corporis* quid sit 43 ejusd. differentia ib. observat. ib. constrictus quid indicet ib.

*Hæmagoga* quid sint 68 horum differentia ib. indicantia ib. remedia ib. formulæ ib.

*Hæmagogorum* modus operandi 69 regulæ & cautelæ ib.

*Hæmatites præparatus* commendatur in Hæmoptysi 106 in Hæmorrhagiis passivis 120

*Hæmoptysis juvenibus* familiaris est 102

*Hæmoptysios* definitio 105 differentia ib. signa imminentis & præsentis ib. subjecta ib. prognosib. remedia curatoria ib. præservatoria 106 methodus medendi ib. cautelæ ib.

*Hæmorrhagia* in genere definitio 102 differentia ib. narium junioribus familiares ib. & 104 signa 102 subjectum ib. prognosib. symptomata 25 quando non supprimenda 103

*Hæmorrhagarum* in genere cura 102 methodus medendi 103 cautelæ ib. criticarum paucitas quid indicet ib. observat. semioticæ 53

*Hæmorrhagiæ* narium definitio ib. differentia ib. signa ib. subjectum 104 prognosib. nimix quid pariant ib. per adstringentia suppressæ summe nocent ib. in quibus morbis periculosa ib. remedia ib. methodus medendi ib. quando non supprimenda ib. cautelæ 105 in auctis si supprimuntur, vitæ periculum inferunt 104 it. in Febre catarrhali maligna 332 quid de eis centendum in Febre epidemica 316 excedentes in Variolis quomodo tractandæ 319 in Variolis adulatorum quando periculosa 323 in Variolis & morbillis non sunt vere critica 39

*Hæmorrhagiæ e nare sinistra* quando salutare in splenitide 159

*Hæmorrhagiæ passivæ* quid sint 119 harum differentia ib. signa ib. subjecta ib. prognosib. immodica profusio varia mala post se trahit ib. passivæ remedia 120 methodus medendi ib. cautelæ ib.

*Hæmorrhagiæ uterinæ* definitio 115 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 116 methodus medendi ib. cautelæ ib.

*Hæmorrhoides* viris familiares sunt 102 Asthma humidum mitigant 203 nephriticis supervenientes sunt bonæ 164 post sanguinis vomitum bonæ 107 largiores immittunt Ophthalmiam 246 Scorbutum 264

*Hæmorrhoides cœcæ* quid sint 135 earum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 136 cautelæ ib. non apertæ varia mala inducunt 135

*Hæmorrhoidum* definitio 108 differentia ib. imminentium signa ib. fluentium signa ib. nimiarum signa ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib. fluxum quando supprimere non liceat ib. inhibitionem facilius ferunt sceminæ ib.

*Hæmorrhoidum* fluxus deficientis definitio 110 differentia ib. signa imminentis ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 111 cautelæ ib. suppressio quos morbos inducere possit 110

*Hæmorrhoidum seroso-mucosarum* definitio 213 differentia ib. signa ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus med. ib. Cautelæ 214 in his sudor circa partes vicinas quid indicet ib.

*Hedera terrestris* succus laudatur in Atrophia, tanquam specificum 173 in gravitate auditus & surditate 370 in infarctu Lienis 171 in infuso commendatur in Asthmate spastico 276

*Helenii* Essentia laudatur in Asthmate humido a nimia pulmonum flacciditate 204

*Helleborus albus & niger* commendantur in gravedine 224

*Hellebori nigri* extractum commendatur in Catarrho suffocativo 227 essentia saturatior commendatur in malo Hypochondriaco 134

*Hemicrania* quid sit 138 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum 139 prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib. per refrigerantia externa tractata in quid degeneret ib. quando locum in ea habeat Mixtura tonico-nervina Stahlii 140

*Hepar* anguillæ commendatur pro exclusione abortus 116 molæ 386 specificum dysenterix binignæ 215 arietis calidum, pulmo ovis &c. imponuntur capiti in Mania 374

*Hepaticis* est Febrium inflammatoriarum periculosissima 312

*Hepatitis & Splenitidis* definitio 158 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 159 Methodus medendi ib. cautelæ ib.

*Hirci* urina est specificum in Ischuria 244

*Hiera picra* celebratur a Baglivio in omnibus morbis Ventriculi 382

*Hirudines* quid sint 56 & 87 harum differentia 56 selectus 87 præparatio 56 modus applicandi ib. usus ib. cautelæ 87 applicantur ano in adstrictione alvi 284 in Colica Hæmorrhoidali 132 in Malo Ischiadico 143 in Phthisi 185 in Splenitide 159 temporibus applicantur in Hemicrania 140 suadentur in fluxu hæmorrhoidum deficiente 111 quando insigniter prosint 122 quando convenient in Tympanite 252

*Hominis* definitio 2 divisio ib.

*Humorum* alteratio quid sit 69 ejusdem differentia ib. regulæ & cautelæ ib. evacuatio quid sit 55 ejusd. differentia ib. tenuium resolutio vid. Resolutio. Incrassatio vid. Incrassatio

*Hydrocephali* definitio 252 differentia ib. signa 253 subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib. quando incisio in eo locum habeat ib.

*Hydrops* quando excipiat Febrem quartanam 361

*Hydrops pectoris* definitio 253 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 254 cautelæ ib.

*Hydromphali & Hydroceles* definitio ib. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 255 cautelæ ib.

*Hygiene* vid. Diætæ ejusd. materia 34

*Hypopii* definitio 367 differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. differentia 368

**J** *Alappa* commendatur in Cachexia & Chlorosi 247 in Fluore albo simplici 221 in Hæmorrhoidibus seroso-mucosis 213 ejus resina laudatur in Catarrho suffocativo 226

*Jalappin.* Specif. convenit in Lippitudine 196 in Odontalgia 220

*Icterus* in Febribus acutis quando malus 232 hydropi superveniens quid de eo censendum ib. cum anxietate & angustia præcordiorum incipiens quid portendat ib. quando & quibus in eo propinari queat limatura Martis 234

*Icteri* definitio 231 differentia ib. signa ib. subjectum 232 pro-



prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 233 cautela *ibid.*  
*Immissio* pedum in aquam calidam hæmorrhagiam narium sæpius sistit 105  
*Imperforatio* vid. supra Clausarum partium apertio  
*Impotentia* virilis definitio 298 ejusd. differentia *ibid.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus med. 299 cautela *ib.* in hac farcimina ex cristis & testibus gallorum commendantur 370  
*Incidentia* & resolventia commendantur in Febre Quartana continua 359 in Infarctu Hepatis 172  
*Incrassatio* humorum quid sit 71 ejusd. differentia *ib.* indicantia *ib.* remedia *ib.*  
*Incrassantium* modus operandi 72 regulæ & cautela *ib.* nimius usus vitandus in Tertianâ anomala 350  
*Incubus* quid sit 276 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 277 cautela *ib.* frequentior in senibus quid exinde metuendum 276  
*Indicationes*, Indicantia, Indicata quid sint 54 horum differentia *ib.* regulæ & cautela Practicæ 246  
*Infarctus* Hepatis definitio 171 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ibid.* remedia *ib.* methodus medendi 172. cautela *ib.* est periculosior infarctu Lienis 171 cum inflatione visceris facilius curatur quam a nimia constrictione 171 in eo laudatur Cichorium 172  
*Infarctus* Lienis definitio 169 differentia 170 signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus med. 171 cautela *ib.* in fœminis quandoque solvitur per vomitum cruentum 170 per Petechias illisque supervenientem excretionem sanguinis fœtensis per alvum solutus *ib.*  
*Infarctus* Pulmonum definitio 168 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 169 cautela *ib.*  
*Infarctus* Viscerum definitio 166 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 167 prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 168 cautela *ibid.* morbos reddunt diuturniores 14 & obstructions tolluntur per Febrem tertianam intermittentem 345  
*Inflammatio* nervi auditorii quæ mala post se trahat. 126  
*Inflammationis* definitio 148 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia 149 methodus medendi 150 cautela *ib.* symptomata 25  
*Inflammationis* ventriculi & intestinorum definitio 160 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 161 cautela *ib.*  
*Inflammationis* uteri definitio 165 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 166 cautela *ibid.* in hac ad lochiorum suppressionem respiciendum *ibid.* quales Clysteres conveniant *ib.*  
*Intertrigo* quid sit 409 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ibid.* methodus medendi *ib.* cautela *ib.* oleosæ & nimis aquosæ formulæ in hac non conducunt *ib.*  
*Ipecacuanha* rad. laudatur, tanquam specificum in Dysenteria benigna 215 in principio Dysenteria exhibendæ & cur *ib.* in principio Febris Ardentis biliosæ in hernioso feliciter exhibita 309 in Febre Catarrhali maligna vitanda 333 gravidæ Febre decumbenti cum successu data 353 cum Sale Tartaridin cholera humida cum fructu propinatur 210  
*Ischuria* definitio 242 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 243 prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautela 244  
*Ischuria* quandoque V. S. in pede tollitur 243 in ea specificum est urinae hirci 244  
*Ischiadicum* malum vid. Malum Ischiadicum  
*Juniperi* Ol. commendatur in retentione secundinæ 398

## K

**K** *Ortholzi* Balsamus Vulnerarius laudatur in Cancro exulcerato 272 in consolidandis abscessibus marum 406 ejusd. corrosivum liquidum 272  
*Kuseri* pulvis epilepticus niger suadetur in convulsionibus 279

## L

**L** *ac* convenit in cholera a Venenis corrosivis 210 cavari mortuo instillatur in ejus abundantia 402 muliebre commendatur in Impotentia virili 298 in tinnitu aurium 370  
*Lactantibus* vinum parce exhibendum 405  
*Lactis* abundantia quid sit 402 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis 402 remedia *ib.* methodus medendi 403 cautela *ib.* aquosi signa 404 bilioso-acris signa *ib.* crassioris & mucidioris *ib.* aquosi subjectum *ib.* bilioso-acris *ib.* crassioris & mucidioris *ib.* horum prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 405 cautela *ib.* defectus definitio 403 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautela *ib.* juvatur per frictionem 403  
*Lactuca* sitim nimiam exstinguit 382  
*Lamium* Plinii in infuso Theiformi laudatur in Nephritide 165  
*Laxantes* noduli commendantur præservative in Purpura rubra 283  
*Laxantia* frequentia vitanda sunt & cur 238 quando convenient in Aphthis 408 lenia suadentur in Asthmate humido 203 abstergentia in Diarrhœa 209 in declinatione Febris synochæ 304 in Flatulentia 237 in Fluore albo simplici 221 in Fluxu Cœliaco & Lienteria 212 aloetica rejiciuntur in Fluxu Hepatico *ib.* quænam sufficiant in Febre catarrhali benigna 315 purgantibus præferuntur in Febre quotidiana intermittente 343  
*Laxatio* quænam locum habeat in Febre dysenterica 337  
*Leporis* pinguedo commendatur in Dentitione difficili 411 cruor exsiccatus est specificum Dysenteria benignæ 215  
*Lethargi* signa 289 subjectum *ib.* remedia 290  
*Levisticæ* succus cum aqua Artemisæ laudatur in Fœtu mortuo 394 est arcanum in retentione Secundinarum 398  
*Lienis* infarctus vid. Infarctus.  
*Lienteria* & fluxus cœliaci definitio 211 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautela 212  
*Lignum* fraxini 10 solstitiis collectum usurpatur in Odontalgia 127 fulmine tactum usurpatur in Nævis maternis 412 in Odontalgia 127 sympatheticum quid sit 102  
*Limatura* Martis cruda & quid de ea censendum in Ictero 233 quales effectus edere debeat in Malo Hypochondriaco hysterico 134 Orichalci commendatur in rabie canina 376 nocet tibialibus in Fœtore sudoris inspersa 259  
*Lingua* differentia 51 observat. semioticæ *ib.*  
*Lini* semen est specificum in Fœtu mortuo expellendo 398  
*Liporhymia* & Syncopæ definitio 294 differentia *ib.* signa *ib.* subjecta *ib.* prognosis 295 remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautela *ib.* post hyperemeses quomodo tractandæ *ib.* quid de eis censendum in morbis acutis *ib.* quando malæ in Variolis confluentibus 321  
*Lippitudinis* definitio 195 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 196 cautela *ib.*  
*Liquamen* Myrrhæ commendatur in Cancro 271 in Otalgia 126  
*Liquores* Gallorum spirituosus ( Liqueurs ) commendantur in Tussi stomachali humida 109  
*Liquoris* styptici weberi descriptio 120  
*Liquoribus* stypticis non semper est fidendum *ib.*  
*Lithontripia* remedia caute adhibenda & cur 192  
*Lithotomia* definitio 90 differentia *ib.* operatio *ib.* cautela & observat. *ib.* huic præmittenda exploratio *ib.*  
*Lochia* bene procedentia tollunt Maniam 374  
*Lochialis* sanguis recens commendatur in Nævis matris 412  
*Lochiorum* defectus definitio 116 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 117 prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautela *ib.*  
*Lochiorum* suppressio quos morbos inducere queat 117 fluxus nimius periculosus est 115 lentior sed diuturnior



nior quid indicet ib. fluxum subito suppressum varia  
incommoda sequuntur 117  
a *Lochiorum* suppressione pendentes morbi peiores sunt  
quam a mensium suppressione 283  
*Lubricantia* commendantur in Calculo Renum 191 in  
Causo prudenter exhibenda 311  
*Luoarici* pulvis contra causum commendatur in Ischuria  
a causa violenta externa 244  
*Luis Venereæ* definitio 267 differentia ib. signa 268 sub-  
jectum ib. prognosib. remedia ib. methodus meden-  
di 269 cautela ib.  
*Lumborum* dolor rheumaticus quomodo a nephritico di-  
stinguatur a Baglivo 189  
*Lumbri* terrestres conveniunt in Convulsionibus a Vario-  
lis 318 in Lactis defectu 403  
*Luxationis* definitio 83 differentia ib. causa ib. signa ib.  
prognosis ib. curatio ib. cautela & observationes ib.  
*Lympha* definitio 6 differentia ib. materia ib. nervorum  
definitio ib. differentia ib. materia ib.  
*Lyseis* morborum definitio 39 differentia ib. modus ib.  
observat. 40

## M

**M***acula* & vesiculæ livido-rubrae in abdomine post  
inflammationem ventriculi quid indicent 160  
*Magnisia* alba convenit in Febre bilioso ardente 309 in  
Lue Venerea 269  
*Majorana* aqua commendatur in læsione olfactus 372  
*Malacia* vid. Pi a.  
*Malum Hypochondriaco Hystericum* quid sit 132 ejusd.  
differentia ib. signa mali hypochondriaci ib. hysterici  
16 subjectum 33 prognosib. remedia ib. methodus  
medendi 134 cautela ib. solvitur Hæmorrhoidum vel  
Mensium fluxu 133 quando in illo Venæsectio in bra-  
chio administranda 134 in hoc rejiciuntur purgantia  
fortiora ib. salivatio per Mercuriali ib.  
*Malum Ischiadicum* quid sit 142 ejusd. differentia ib. si-  
gna ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus  
medendi 143 cautela ib. in hoc rejicitur regimendia-  
phoreticum actuale ib. commendatur Emplastrum Sa-  
ponatum Barbette ib. Hirudinum applicatio ad anum  
ib.  
*Mammæ* quid sint 50 harum differentia ib. ex eis signa  
ib. cancrasæ amputatio 92  
*Mammarum* tumor apostematodes quid sit 405 ejusd. dif-  
ferentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia  
ib. methodus medendi 406 cautela ib. in eis laudatur  
sparadrapum ex Cera, sevo Cervino & Ol. rosarum  
ib.  
*Mania* quid sit 373 ejusd. differentia ib. signa ib. subjecta  
ib. prognosib. remedia 374 methodus medendi ib.  
cautela ib. quandoque oritur a vermibus 373 cum ri-  
tu facilius curatur 374  
*Manna* Calabr. in Cholera humida fugienda 211 non con-  
venit in Flatulentia & cur 237  
*Marrubium* album Exulcerationem Renum & Vesicæ e-  
xasperat 189 est specificum in Ictero 132  
*Martialia* quando adhibenda in Atropia 174 nocent in  
Cephalalgia sanguinea 123 præmature exhibita in  
Cephalæa eam exasperant 125 commendantur in Hæ-  
morrhagia Uteri 116 cum amaris in Incubo 277 in  
Ascite 250 quando convenient in Infactu Lienis 171  
ob vim adstrictoriam nocent in Phthisi 186 intempe-  
stive & largius data in Podagra quid efficiant 146  
quando locum habeant in Ptyalismo Hypochondria-  
co 198 quando in Scirrho Hepatis 178 in Scirrho Lie-  
nis 177  
*Mass. Pil. de Cynogl.* commendatur in Hæmorrhagia U-  
teri 116 convenit ad tussim in Febre hectica mitigan-  
da 358  
*Masticationis* definitio 9 organum ib. causa efficiens ib.  
usus ib.  
*Mastiche* laudatur in Procidentia Ani 297  
*Meconii* retentio quid sit 405 ejus signa ib. prognosib. remedia  
401 methodus medendi ib. caute-  
la ib.  
*Medicina* definitio 1 attributa ib. subjectum ib. divisio  
ib. finis ib. sectæ ib.

*Melancholia* definitio 374 differentia ib. signa ib. subje-  
ctum 375 prognosib. remedia ib. methodus medendi  
376 cautela ib.  
*Melancholia* & mania uterinæ virginum & viduarum  
definitio 387 differentia ib. signa melancholiae ib. ma-  
niae ib. subjectum 388 prognosib. remedia ib. me-  
thodus medendi ib. cautela ib.  
*Melancholicorum* morbi 34  
*Mellita* pro scopo abstergerendi laudantur in Vomica Pul-  
monum 180  
*Memoria* debilitas quid sit 372 ejusd. differentia ib. signa  
ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus me-  
dendi 373 cautela ib. in hoc commendantur Cube-  
bæ mane comestæ 372  
*Menses* & ex eis signa 49 quomodo differant ib.  
*Mensium* ordinariorum nimiorum definitio 111 differen-  
tia ib. signa ib. subjectum 122 prognosib. remedia ib.  
methodus medendi 113 cautela ib. fluxus ordinarius  
malum hystericum imminuit 133 excessus periculo  
vacat 112 diu durans quos morbos inducere possit ib.  
defectus definitio 113 differentia ib. signa ib. subje-  
ctum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi  
115 cautela ib. emanatione laborantes corripuntur Fe-  
bre scarlatina 326  
*Mercurius* dulcis commendatur in Cachexia a scabiæ re-  
trōpulsæ 247 in Coryza humida 194 in Crusta La-  
ctea 411 in nimia Lactis muciditate 404 in Lue Ve-  
nerea laxantibus optime additur 269 in Palpitatione  
cordis 28. in Vermibus 412 tussim leviorē quando-  
que tollit 201 cum pulv. Cornachin. commendatur in  
Crinonibus 404 infantibus aliquot mensium tuto ex-  
hibetur 407 convenit in Uvulæ prolapsu 296 nocet  
in Atrophia in majori dosi adhibitus 174 vitandus in  
Phthisi 185  
*Mercurius* vitæ cum successu exhibitus in Fœtu mortuo  
394  
*Mebulus* medendi quid sit 54 ejusd. differentia ib. fun-  
damentum 53 regulæ & cautela ib. in causis mor-  
borum virulentis 79  
*Milio* imminuta quid sit 241 ejusd. differentia ib. signa  
ib. subjectum ib. prognosib. remedia 242 methodus  
medendi ib. cautela ib. in hac abstinendum a Diure-  
ticis fortioribus ib.  
*Mictus* cruentus quid sit 117 ejusd. differentia ib. signa  
ib. subjectum 118 prognosib. remedia ib. methodus  
medendi 119 cautela ib. criticus non est supprimen-  
dus ib. senibus familiaris est 102 quandoque in calcu-  
losis a Tinctura antinephritica Rothii producitur 119  
*Millesolium* melius in fæminis adhibetur quam in viris  
134 ejus essentia commendatur in Colica sanguinea  
131 in Hæmorrhagia uteri 116 in infuso commenda-  
tur in Hæmorrhoidibus cœcis 136 ejusd. essent. suadet  
in fluxu Mensium nimio 112 in Mensium defe-  
ctu 114 in Vomitu cruento 108  
*Millepedes* nocent in Nephritide 164 in vino macerati  
laudantur in fissuris Papillarum 407  
*Mixtura* simplex laudatur in Febre Biliosa ardente 309  
in Febre inflammatoria 312 in Febre Petechiali 355  
Tonico-Nervina Stahlî ex Sp. C. C. & Tinctura Tart.  
commendatur in Calculo 192 in Congestionibus 121  
in Dolore Capitis Catarrhali 224 in Empyemate 182  
in Hæmoptysi 106 in Hæmorrhagiis 102 in Malo  
Ischiadico 143 in Tussi ad rnorandos pulmones 109  
cum Ess. Alexipharmaca Stahlî suadet in Fluxu  
Hepatico 212  
*Mola* quid sit 385 ejusd. differentia ib. signa 386 subje-  
ctum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi  
387 cautela ib.  
*de Mola* observationes duæ 386  
*Morbilli* quid sint 324 horum differentia ib. signa ib. su-  
jectum 325 prognosib. remedia ib. methodus me-  
dendi ib. cautela ib.  
*Morbi* acuti 18 adscititii ib. æstivi ib. autumnales ib.  
benigni ib. compositi ib. congrui ib. contagiosi 18. con-  
tinentes ib. continui ib. corrupti ib. curabiles ib. ende-  
mici ib. epidemici ib. habituales ib. hæreditarii ib. hye-  
males ib. idiopathici ib. immateriales ib. incurabiles ib.  
intermittentes ib. legitimi ib. lethales ib. magni ib. ma-  
ligni ib. materiales ib. non corrupti ib. nothi ib. par-  
vi



- vi ib. salutares ib. simplices ib. spurii vid. nothi. ib. symptomati ib. ib.
- de Morbis observationes* ib. ib.
- Morbi ætatum* quid sint 31 horum differentia ib. de eis observationes 32
- ad Morbos dispositio* ratione sexus ib. ratione temperamentorum 33
- Morbi mulierum* quid sint 383 horum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 384 cautelæ ib. gravidarum interdum fetu crescente imminuuntur 383 in morbis mulierum ad menses semper respiciendum 384
- Morbi sensuum* quid sint 366 horum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib.
- Morborum tempora* quid sint 19 horum differentia ib. causa efficiens ib. observat. ib. causæ quid sint 20 aerum definitio ib. differentia ib. observationes causæ non naturales quid sint 29 harum differentia ib.
- Morbus* quid sit 15 ejusd. differentia ib. observationes ib. horum subjecta quænam sint ib. quomodo differant ib. observationes ib. differentia quid sit ib. essentialis ib. accidentalis 17
- Morbi acuti* quænam sint diurni 39 chronici in corpore debili diu durant 37 hæreditarii sunt diurni ib. magni sunt breves ib. horum causa quo activior eo citius morbus finitur ib.
- Mors* ex sudore matutino suppresso 244
- Motus* & de eo regulæ & observationes 96 corporis quomodo & quando in malo Ischiadico instituendus 44 placidus convenit in Cachexia 247 laboriosus commendatur noctambulis 378
- Motus deficientes* quid sint 285 eorund. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 286 methodus medendi ib. cautelæ 286 horum æstimulatio quid sit 78 differentia ib. indicantia ib. remedia ib. formulæ ib. modus operandi ib. regulæ & cautelæ ib.
- Motuum* excedentium correctio quid sit 76 ejusd. differentia ib. indicantia ib. remedia ib. formulæ remedium internorum ib. externorum 77 horum modus operandi ib. regulæ & cautelæ ib. morbificorum definitio 24 differentia ib. causa efficiens 25 observationes ib. spastico convulsivorum definitio 272 horum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib.
- Motus tonici* definitio 3 existentia probatur ib. differentia ib. organum ib. causa efficiens ib. usus ib. observationes ib. voluntarii definitio 13 differentia ib. organum ib. causa efficiens ib. usus ib. observationes semioticæ 53
- Morus* & quies excedentes vel deficientes corpori nocent 30
- Moxa* Sinensium plerumque inefficax in Podagra 146
- Muci* definitio 5 differentia ib. materia 48
- de Mucis* observationes 48
- Mucilaginosa* conveniunt in arrosione a Caulo 311 infiti aucta 382 infringunt calorem præternaturalem ib. in retentione meconii conducunt 407
- Musitani* (Car.) decoctum vulnerar. ad procidentiam vaginæ Uteri 399 ejusd. pulvis stypticus 120
- Myrrha* nocet in Phthisi & cur 186 caute exhibenda in Vomica pulmonum 181 ejusd. essent. c. essent. Alexipharmaca laudatur in Variolis nimium depresso 321 & 323 c. eff. fucin. & croci in doloribus post partum 400
- Myrrhata* nocent in exulceratione Renum & Vesicæ 189 non præscribenda ad Lochia promovenda 166 versus periodum mensium exhibita laudantur in eorum defectu 115 in Dysuria ab exulceratione vesicæ parce sunt exhibenda 241
- nam* mala pariant in Epilepsia 280 quænam & quomodo danda in Sudore nimio 223
- Natura* errores quid sint 27 horum differentia ib. causa efficiens ib. effectus ib. observat. 28
- Nasturtium* suadetur externe in Crusta lactea 410 interne convenit in Hydrops 252
- Nausea* & Vomitus gravidarum quid sint 390 horum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 39 cautelæ ib. in plethoricis Venæsectione promptissime tollitur ib. emetico in grvida feliciter curata ib.
- Nephritica* quando noceant 125
- Nephritis* quid sit 163 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 164 methodus medendi ib. cautelæ ib. est levissima inflammationum 163 frequentius recurrens quæ mala post se trahit ib. in ea vitentur Salia Volatilia imprimis oleosa in statu & augmento morbi 164 Emplastica non semper sunt tuta & cur 165
- Nephritis spuria* quid sit 141 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 142 cautelæ ib. in hac commendatur serum lactis ib. olea acriora externe adhibita quænam mala inferant ib.
- Nervini* commendantur in Apoplexia 292 in Catarrho suffocativo 227 in spasms 275 interne & externe adhibenda in Incontinentia Urinæ 216
- Nitri Spiritus* pro extirpatione nævorum maternorum caute adhibendus 412
- Nitrata* & diluentia commendantur in Asthmate convulsivo 276
- Nitrosa* laudantur in Asthmate sicco 230 in Colica convulsiva 278 in potu in Diarrhœa Cholericæ 401 in Singultu ab inflammatione 283 in Tenesmo a Dysenteria 284 cum temperantibus conveniunt in Vertigine 289
- Nitrum* in potu vel pulvere datum differentem edit effectum 301 in Angina gargarismatibus optimo consilio additur 156 quomodo exhibendum in Cholera humida 211 convenit in Diarrhœa biliosa 209 Diarrhœam puerperarum mitigat 17 cum absorbentibus in principio Dysentericæ benignæ cum successu propinatur 215 depuratum conducit in Febre dysenterica 337 mitigat sudores in Febre lenta 355 in Mania juniorum lascivorum largiter dandum 374 quam diu in Pleuritide & Peripneumonia locum habeat 157 in Phthisi minoribus dosibus exhibendum 186 in Vomica pulmonum cautus sit ejus usus 181 commendatur in Vomitu gravidarum 390
- Noctambulatio* quid sit 378 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib.
- Noctalgia* definitio ib. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 379 methodus medendi ib. cautelæ ib.
- Nutrientia* in principio Atrophicæ male præscribuntur 274
- Nutritio* quid sit 8 ejusd. differentia ib. materia ib. organum ib. causa efficiens ib. usus ib. observat. ib. materia 9 fœtus quid sit 15 materia ib. organum ib. causa efficiens ib. de ea observat. ib.
- Nux Moschata* admiscetur absorbentibus in soda 258 Vomica laudatur in Mania a philtro 374

## O

- O** *Besi* Infantes in Variolis in majori periculo versantur 317
- Obstructio* alvi quid sit 237 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib. exasperat affectus capitis & hypochondriacos ib. in ea laudatur infusum ex decocto prunorum & fol. fennæ ib.
- Odontalgia* quid sit 127 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 128 cautelæ ib. hæreditaria rarissime curatur 127 symptomatice cum stridore dentium in acutis mortem portendit ib. in Odontalgia idiopathica opium non prædest 128

## N

- N** *Ævus* maternus quid sit 411 ejusd. differentia ib. signa ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ 412
- Narcotica* vitanda in Branchio & Raucedine 225 externa in Cephalæa exhibita quid quandoque inferant 125 nocent in Diabete præmature data 218 quæ-



*Oedema* quid sit 255 ejusd. differentia ib. signa ib. subje-  
ctum ib. prognosib. 256 remedia ib. methodus meden-  
di ib. cautelæ 257 si minetur rupturam quomodo ei  
obviam eundum ib. per fortiora evacuantia tracta-  
tum degenerat in Hydropem 345 ad ejus resolutionem  
multum confert Febris revocata ib.  
*Oedemata* per usum Chinæ Chinæ inducta difficilius cu-  
rantur 351 tolluntur quandoque per solas pilulas Sta-  
hlianas 353  
*Oleum* animale Dippelii allegatur in convulsionibus 279  
in Spasmodis 280 ejusdem effectus ib. Amygdal. amara-  
rum convenit in siccitate aurium 370 Capparum in  
Atrophia conducit 267 in Infarctus Lienis 264 in Scirr-  
rho Lienis 270 Caryophyllorum suadet in Odontal-  
gia 220 Ceræ allegatur in Atrophia 173 Ovor. pro-  
dest in siccitate Aurium 370 Rutæ in Scirrho Lie-  
nis 176 Tartari per deliquium in gravida pica labo-  
rante feliciter exhibitum 390  
*Olea* destillata in Otalhia vera non applicanda 127 quid  
efficiant in Podagra 146  
*Oleum* destillatum Pini nocet in Nephritide 164  
*Ophthalmia* definitio 246 differentia ib. signa ib. subje-  
ctum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi  
247 cautelæ ib.  
*Ophthalmia* serota vid. Lippitudo.  
*Opiata* largiter & perversa methodo adhibita quid effi-  
ciant 146 in eisdem succedens oculorum mutatio quid  
indiget 214 ad extinguendum nimium Appetitum ma-  
le exhibentur 380 in Cephalæa quando prosint 125  
in Colica quomodo adhibenda 132 in Convulsionibus  
minime adhibenda sunt 273 nec in Febre Dysenteri-  
ca 337 in Febre inflammatoria caute usurpanda 313  
quando & quomodo in Hemisphæria 140 Infarctum  
Lienis augent 171 in Inflammationibus Ventriculi &  
Intestinarum caute exhibenda 161 quando convenient  
in Mictione imminuta 242 nisi enormis tussis effla-  
gitet in Phthisi non danda 186 in Phrenitide & Pa-  
raphrenitide dissuadentur 152 in Pleuritide & Perip-  
neumonia non admodum tuta sunt 157 in Ulceribus  
cancrosis adhibita quid efficiant 272 in Vomitu cau-  
te danda 207  
*Orexis* vid. Soda.  
*Ossa* bufonum rubicundorum usurpantur in Odontalgia  
127 humana semiputrida sunt specifica in Peste 341  
*Otalgiæ* definitio 126 differentia ib. signa ib. subjectum  
ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 127  
cautelæ ib.  
*Otalgia* juvenum periculosior est quam senum ib.  
*Oxyfackarum* emeticum Ludovici laudatur in Tussi sto-  
machali infantum 202

## P

**P***Almarii* pulvis celebratur a Stahlio in Melancho-  
lia 375 ejusd. pulveris descriptio 377  
*Palpitatio* cordis quid sit 281 ejusd. differentia ib. signa  
ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus me-  
dendi 282 cautelæ ib.  
*Pancreaticus* Succus vid. Succus Pancreat.  
*Panis* anisatus allegatur in tinnitu aurium 370 quer-  
nus cum vino rubro commendatur in Procidentia A-  
ni 297  
*Papaveris* erratici virtus, in quo consistat 157  
*Papillarum* fissuræ quid sint 405 harum differentia ib.  
signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. metho-  
dus medendi ib. cautelæ ib. in his commendatur su-  
ctio Infantis matura præservative ib. ex his nutrice  
eveniebat passio hysterica ib.  
*Papillæ* profundius delitescunt quomodo tractandæ ib.  
*Paracentesis* quid sit 88 ejusd. Instrumenta ib. locus ib.  
modus operandi ib. cautelæ & observationes ib.  
*Paracentesis* aliquoties in eodem subjecto administrata  
251  
*Paralysis* & hemiplexia quid sint 292 horum differen-  
tia ib. signa ib. subjectum 293 prognosib. remedia  
ib. methodus medendi 294 differentia ib.  
*Paralyti* affecta pars tumens & livens quid indicet 293  
*Paraphrenitis* vid. infr. Phrenitis.  
*Paresis* ex colica quid in ea conveniat 294

*Parotidis* observatio in Febre Castrensi 336  
*Partus* quid sit 15 & 395 ejusd. tempus ib. signa ib. cau-  
sa efficiens ib. observationes ib. differentia 395 pro-  
gnosib. remedia ib. methodus medendi ib. differentia  
396 situ parturientis facilitatur ib.  
*Partus* difficilis quid sit ib. ejusdem differentia ib. signa  
ib. subjectum ib. prognosib. remedia 397 methodus  
medendi ib. cautelæ ib. facilitari creditur Jaspide ib.  
*Passio* Hysterica vid. sup. Malum Hypochondriaco Hy-  
stERICUM.  
*Passio* Iliaca s. Volvulus quid sit 161 ejusd. differentia ib.  
signa ib. subjectum 162 prognosib. remedia ib. me-  
thodus medendi ib. cautelæ 163 a flatulentia ab hæ-  
morrhoidum & mensium malo successu oriri potest 236  
de hac re observatio 238  
*Pathologia* definitio 15 differentia ib.  
*Pedituvia* suadentur in Asthmate spastico 276 in Co-  
ryza humida 194 cum vegetabilibus fragrantibus con-  
veniunt in Fœtore sudoris 213 commendatur in Ce-  
phalæa & Clavo 124 in Odontalgia 127 in Ophthal-  
mia 153 in Otalgia 126 post Venæsectionem conve-  
niunt in Palpitatione cordis 282 quando adhibenda  
sint in Podagra 146 in quanam Vertigine maxime  
convenient 289  
*Pellentia* in defectu Mensium improvide exhibita quæ-  
nam mala post se trahant 115 vitanda in Lochiorum  
defectu 117 in Mola quomodo usurpanda 387 in Par-  
tu difficili caute adhibenda 397 lenia specifica com-  
mendantur in Fœtu mortuo 394  
*Pessaria* quænam sint optima ad uteri prolapsum 400  
*Pestis* quid sit 339 ejusd. differentia ib. signa ib. subje-  
ctum 340 prognosib. remedia ib. methodus medendi  
341 cautelæ ib. in hac commendatur blanda & suc-  
cessiva diapnoe ib. cur in ea Vomitus, certa enchei-  
res institutus, sit necessarius ib. suadet in ea Mix-  
tura simplex probe acidulata ib. Tinctura Bezoardica  
modice camphorata ib.  
*Petechialis* Febris vid. sub Febribus  
*Petechizans* Febris ib.  
*Petechiæ* in interstitiis Variolarum occurrentes quid in-  
dicent 318 superveniunt Febri catarrhali per Alexi-  
pharmaca acra tractatæ 313  
*Phlegmaticorum* morbi 33 symptomata in Peste 341  
*Phrenitis* & Paraphrenitis quid sint 151 horum differen-  
tia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib.  
methodus medendi 152 cautelæ ib. in his deliria per  
intervalla & cum risu spem promittunt 149 in Le-  
thargum si mutantur, malum 151 in his commen-  
dantur animalia viva applicata 152 Opiata & Vola-  
tilia noxia ib.  
in *Paraphrenitide* quando locum habeat Vomitorium ib.  
*Phthisis* quid sit 183 ejusd. differentia ib. signa ib. sub-  
jectum ib. prognosib. remedia ib. methodus me-  
dendi 185 cautelæ ib. ab hæmorrhoidum obstructione  
facile fit exitialis 184 imminens difficulter cognosci-  
tur ib. mariti facile communicatur uxori ib. ea ci-  
tius pereunt adolescentes & juvenes ib. ab ea facili-  
us restituuntur fœminæ ib. in hac laudantur Pulve-  
res Solares Richter 185 in ea occurrens tussis urgens  
quomodo tractanda ib. rejicitur Mercurius dulcis 185  
Tinct. antiphthisica Grammani ib. quænam acida in  
ea locum habeant 186  
*Physiologia* definitio 1 differentia ib. subjectum ib. fi-  
nis ib.  
*Pica* & Malacia quid sint 389 horum differentia ib. si-  
gna ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus  
medendi ib. cautelæ ib. in his vitentur interne ex fe-  
niculo & absinthio parata 390 hoc morbo laboranti  
Mechoacanna loco calcis vivæ feliciter exhibita ib.  
*Pilule* Antirheumaticæ commendantur in Salivatione &  
Ptyalismo 198 horum usu menses & hæmorrhoides  
revocantur 204 Balsamicæ viscerales conveniunt in  
Coryza humida 194 in Fluxu mensium nimio 113 in  
Hæmorrhagia uterina 116 Cephalicæ cur non adhi-  
bendæ in Coryza humida 195 Polychrestæ quando  
adhibendæ in Mictu cruento 119 Stahlii commendan-  
tur in Febre Castrensi cum Diarrhœa vel Dysenteria  
339 ex extractis amaris & gummatibus commendan-  
tur in flatulentia 237  
Pin.



- Pimpinella* albæ essent. commendatur in Colica convulsiva 277 in Febre Dysenterica 337 in Peste 341 in Stranguria 239 cum Tinctura *Œii* sufficit ad Luem *Œeam* incipientem 269
- Pinguines* animalium conveniunt in aridura post Paralyfin 294 recentes suadentur in Pterygio 367
- Pinguia* unguinosa contracturas pariunt in Podagra 146
- Plethora* quid sit 101 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.* abundantia quid sit *ib.* composita quid *ib.* exundantia quid *ib.* simplex quid *ib.* com-mota multum confert ad Abortum 383
- de *Plethora* observationes 20
- Plethorici* propter V. S. parciorem facile in alios mor-bos incidunt 101 & cacochymici purpura gravius la-borant 328
- Plethoricis* quænam noceant *ib.*
- Pleuritis* spuria quid sit 232 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 233 prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.* male tractata in quosnam morbos degeneret *ib.*
- Pleuritis* & Peripneumonia quid sint 249 earum diffe-rentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 251 cautelæ *ib.* in his laudatur Cortex Chacarillæ *ib.*
- Podagra* quid sit 143 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* Podag-ræ regularis *ib.* irregularis 144 subjectum *ib.* pro-gnosib. remedia 145 methodus medendi in paro-xyfmo *ib.* extra paroxysmum 146 cautelæ *ib.* retro-pulsa quomodo tractanda *ib.* ad interiora si repulsa sit quænam mala eam sequantur 145 quando potissi-mum locum in ea habeat Spiritus Formicarum 146 in ea commendatur Sapo Venetus in S. V. solutus 145 qui juniores ea corripuntur non sunt longævi 144 in quibusnam contingat squamarum ac fursurum secessio 145
- Pollutio* nocturna & Gonorrhœa benigna quid sint 218 harum differentia 219 signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ 220 in his commendatur Rhabarb. *ib.* Tincturæ alcalinæ *ib.* Jalappæ & Mercurii dulcis usus sit cautus *ib.*
- Polypi* definitio 91 ejusd. differentia *ib.* prognosib. modus extrahendi *ib.* cautelæ & observat. *ib.*
- Polypodium* exsiccatum est specificum in Pica & Mala-cia 389
- Potus* acidulatus suadetur in Febris quotidianæ intermit-tentis æstu nimio 346 calidus in horrore febris quo-tidianæ audacter porrigendus *ib.* fæculentus & fer-mentescens vitetur in Stranguria 240 frigidus nocen-tissimus in Cholera humida 211 in Febre Purpura ur-ticata 328 magnis haustibus in Febre Castrensi non ingurgitand 339 qualis esse debeat in Febribus epide-micis & malignis 316 sufficiens in Purpura benigna est exhibendus 329 & tenuis commendatur in Melan-cholia 375
- Præcipuantia* suadentur in Colica biliosa 132 vitanda in Febre catarrhali benigna 315 in Pica nimium ex-hibita quid efficiant 390
- Priapus* Cervi est specificum Dysentericæ benignæ 215
- Procidentia* Ani: vid. Ani procidentia.
- Prognostica* signa quid sint 36 horum differentia *ib.* e-ventus *ib.* duratione 37
- Prolapsus* f. Procidentiarum definitio 85 differentia *ib.* causa *ib.* signa 86 prognosib. cura *ib.* cautelæ & observ. *ib.*
- Prostibis* quid sit 94 ejusd. differentia *ib.* materia *ib.* modus *ib.* usus *ib.* cautelæ *ib.*
- Pterygii* f. unguis definit. 367 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus me-dendi 368 cautelæ *ib.* in eo oleosa antiqua non sunt adhibenda *ib.*
- Puerperarum* affectus 400
- Pulsus* & ex eo signa 40 horum definitio *ib.* signa *ib.* observat. *ib.* caprizans indicat futuras convulsiones 41
- Putres* sint alcoholisati in Hypopio & Pterygio 368 absorbentes & Nitrosi conveniunt in Cholericorum Vomitu pestilentiali 341 digestivi ex Nitro & Cin-nabarini laudantur in Flatulentia 237 diaphoretici mo-deste nitrosi in Ascite cum Hæctica 250 nitroso ab-sorbentes & Cinnabarini in Palpitatione cordis ab Or-gasmo sanguinis 282
- Pulvis* adstringens Heurnii describitur 112 Haly contra Phthisin recens quid & quomodo agat in Phthisi 186 niger Hallens. commendatur ad sistendas Hæmorrhagias uterinas 387 Pannonicus ruber in Febribus acu-tis fugiendus 245 an usum habeat in febre catarrhali maligna 333 rejicitur in Variolis 320 Solaris Richt-eri commendatur in Hæmorrhagia Critica nimia 103 in Hæmorrhoid. defectu 111 laudatur in Infarctibus lienis 171 In inflammatione Uteri 165
- Purgantia* 57
- Purgantium* formulæ *ib.* modus operandi 58 regulæ & cautelæ *ib.*
- Purgantia* acria nocent in Hæmorrhoidibus seroso-muco-sis 214 exulenti in omni tenesmo 284 & resinosa in Tuberculis scirrhis pulmon. noxia 176 acria nocent in Ictero 233 in obstructione Alvi non adhibenda 238 vitanda in Stranguria 239 drastica rejiciuntur in Fe-bre quotidiana intermitt. 343 fortiora in Calculo non exhibenda & cur 147 nocent in Cephalæa 125 in Co-lica quando exhib. 132 in gravidis facile abortum producunt 58 in Hepatide & Splenide impediunt discussionem 159 fortiora in Infarctu pulmonum caute propinentur 169 in Otalgia suppurationem impediunt 127 in Rabie canina nocent & cur 377 conveniunt in principio tussis humidæ 201 in Vomica pulmonum fugienda 180 resinosa & aloetica vitentur in fluxu he-patico 120 in Hæmorrhoidibus 109 qualia sint ad-hibenda in Cataracta & gutta serena 369 in Colica convulsiva sint selectissima 200 stimulantia nimium & acria in Gonorrhæa benigna & pollutione noctur-na nocent 217
- Purpura* alba f. maligna quid sit 329 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 330 prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 331 cautelæ *ib.* lochiorum sup-pressionem excipiens pejor est reliqua 330
- Purpura* rubra f. benigna quid sit 328 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjecta *ib.* prognosib. remedia *ib.* me-thodus medendi 329 cautelæ *ib.* interdum est mali-gna 328 eam juniores facilius ferunt *ib.* malignæ red-ditur per alexipharmaca calida 329 quales clysteres in ea vitandi *ib.* ab excretionibus sanguinis suppressis orta quomodo tractanda *ib.*
- Purpura* urticata quid sit 327 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. methodus medendi *ib.* cautelæ 328 in ea vitentur positive purgantia acria *ib.* positive diaphoretica *ib.*

## Q

- Q** *Uercetani* Pil. de Ammoniaco commendantur in Fluore albo simplici 221 in infarctu Hepatis 172 in Malo Hypochondriaco 133
- Quies* quid sit 13 ejusd. differentia *ib.* organum *ib.* cau-sa efficiens *ib.* usus *ib.* regulæ & observat. 96 post fortio rem motum non statim convenit *ib.* nimia quæ mala inducat *ib.*

## R

- R** *Abies* canina quid sit 376 ejusd. differentia *ib.* si-gna *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* me-thodus medendi 377 cautelæ *ib.* unctione curata 376
- Radices* Alexipharmacæ laudantur in Purpura rubra 329 Aperientes & Alexipharmaco Diureticæ in Tympanite 252 incidentes conveniunt in Quartana 352 Re-solventes commendantur in Catarrho suffocativo in Fluxu Hepatico 212 in Tussi contumaci laudantur post morbillos relictæ 325
- Radix* Pseudoacori f. Iridis palustris usurpatur in Hæmor-rhagia narium 104
- Raparium* decoctum convenit in stranguria ab acredine urinæ 146
- Raphanacea* nocent in Lippitudine 105
- Raphani* succus commendatur in Calculo 191 in Tym-panite 159
- Raphanus* rusticanus in Nephritide periculosus est 164
- Rasio* quid sit 86



*Rauedo* vid. Branchus.

*Rauedo* a Salacitate 215 diuturna cum Tussi sicca Chronica quid indicet *ib.* inveterata difficillime curatur *ib.*

*Refrigerantia* nimia nocent in Febre tertiana anomala 350 externa quid efficiant in Nephritide 164 nocent in Pleuritide spuria 140 actu frigida in stranguria non facile adhibenda 240

*Regimen* sudoriferum coactum quid efficiat in Ictero 233 sudorificum æstuosum nocet in Pleuritide spuria 140

*Remedia* externa discutientia in doloribus Arthriticis 137 in Colica 130 emollientia in Hæmorrhoidibus cœcis 136 externa in Odontalgia 127 in Podagra 145 nimia nocent in Febre tertiana 347 in Variolis 319 de hac materia observat. *ib.*

*Res* toto genere præter naturam quid sint 23 harum differentia *ib.*

*Resolutio* humorum quid sit 70 ejusd. differentia *ib.* indicantia *ib.* remedia *ib.* horum formulæ *ib.*

*Resolventia* commendantur in Asthmate humido 223 in Atrophia 173 in Cephalæa & Clavo Hysterico 124 in Coryza humida 194 in Infarctu Lienis 170 cum emollientibus in Scirrho Hepatis 178 interna & externa laudantur in Cravedine & Doloze Capitis catarrhali 223 in Pleuritide spuria 140 & incidentia melius quam pellentia exhibentur in mensibus promovendis 384

*Resolventium* modus operandi 70 regulæ & cautelæ 71

*Respiratio* quid sit 3 ejus organum *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observat. *ib.* differentia 41 observat. & signa de respiratione *ib.*

*Respirandi* difficultas post sudores suppressos quomodo tractanda 245 quid indicet in Variolis 321 post ruptum abscessum quid indicet in Vomica pulmonum 180

*Rheumatismi* definitio 46 differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 147 prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.*

*Rhodium* lignum ejus Ol. commendatur in aurium affe-ctibus 370

*Ricini* pulv. solares commendantur in Catarrho suffocativo 226 in Convulsionibus 272 sistunt Diarrhœam 209 laudantur in Empyemate 182 in Phthisi 185 in Salivatione & Ptyalismo 198 in Scirrho Hepatis 178 in Tuberculis scirrhosis pulmonum 176 in Variolis 318

*Rorismarini* Ess. commendatur in Tarantismo 377

*Rothii* Tinctura antinephritica quid de ea censendum in Mictu cruento 119

*Ructus* quid sint 234 horum differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 235 cautelæ *ib.* fœtidi & putridi in acutis pessimi 234 quando locum in illis non inveniant Carminativa 235 quando in eis vitanda Purgantia *ib.* quando noceant Vomitoria *ib.*

## S

**S** Acculi herbis emollientibus repleti commendantur in Calculo Renum 191 nervino discutientes in gravitate auditus 371

*Salis* Ammoniaci flores laudantur cum digestivis in Febre quartana continua 359

*Sal* digestivum Sylvii in Febris rejecit 300

*Salia* digestiva laudantur in Febre catarrhali 314 in Febris corruptis 365 in Febre quartana versus Paroxysmum exhibenda 352 in Febre quotidiana intermittente 343 in ea reliquis remediis præmittenda 346 & absorbentia conveniunt in stranguria a vitio primarum viarum 239 cum diaphoreticis fixis in Ictero cum commotionibus febrilibus 233

*Salia* neutra in majori dosi exhibita conducunt in Obstructione Alvi 238

*Salia* Volatilia quando non sint usurpanda 195 & 211 in adultis caute ordinanda 291 oleoso-volatilia nocent in Cachexia a suppressione hæmorrhagarum 247 volatilia in Congestionibus quando usurpanda 122 conveniunt in Hydrope pectoris in periculo suffocationis 254 interne in Pleuritide minus bene in larga dosi adhibentur 157 externe in Podagra moderate adhibenda & cur 148 quando locum habeant in Nephri-

tide 164 volatilia urinosa in quonam genere Coryzæ conveniant 195 volatilia cum Tincturis diureticis commendantur in spasmodis 275 quomodo & quando in Asthmate spastico 276

*Salina* & Nitrosa in Empyemate parce exhibenda & cur 182

*Salivatio* & Ptyalismus quid sint 197 horum differentia *ib.* Signa *ib.* subjectum *ib.* prognosis *ib.* remedia *ib.* methodus medendi 198 cautelæ *ib.*

*Salivatio* particularis quid sit 64 ejusd. differentia *ib.* indicantia *ib.* remedia *ib.* formulæ *ib.* remedium modus operandi *ib.* regulæ & cautelæ practicæ *ib.*

*Salivatio* cancrum labiorum adauget 272

*Salivatio* universalis quid sit 63 ejusd. differentia *ib.* indicantia 62 remedia *ib.* formulæ *ib.* modus operandi 63 regula & cautela *ib.* non instituenda in emaciatione *ib.* per inunctionem minora incommoda excitat quam per interna remedia facta 256 quid censendum de salivatione per suffumigationem excitata *ib.* per inunctionem præfertur illi quæ sit per cingulum Mercuriale *ib.* per inunctionem non instituitur in Nucha & dorso *ib.*

*Salivæ* definitio 7 differentia *ib.* materia *ib.*

*Salsa* nocent Asthmaticis 205

*Salvia* laudatur in Lumbricis latis 413

*Salvæ* decoctum commendatur in Abortu 393

*Sambuci* flor. v. c. Cinnabari nativa convenit in Lactis abundantia 403

*Samlucus* in Inflammationibus internis exiguum virtutem possidet 150

*Sanguineorum* morbi 34

*Sanguinis* spissitudo quid sit 20 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjecta 21 causa *ib.* observationes *ib.* quomodo attenuanda in Mensium defectu 144 quomodo resolvenda in Moribus spastico-convulsivis 272 quomodo sanguis diluendus in Nephritide spuria 142

*Sanguis* circulationem æqualem quomodo disponendus in Nephritide spuria *ib.* quomodo coagulandus in Hæmorrhagiis passivis 120 ejus congestio quomodo derivanda in Cephalalgia sanguinea 123 congruescentia ejus quomodo corrigenda in Scorbuto 264 congruatus quomodo resolvendus in Hæmoptysi 106 crasis ejus quomodo temperanda in Hæmorrhagiis 103 ejus & lymphæ corrigentia suadentur in Vomitu cruento 108 dilutio ejus in defectu fluxus Hæmorrhoidalis 111 discussio ejus quomodo obtineatur in Congestionibus 121 distributio ejus æqualis quomodo procuranda in Hæmoptysi 106 ejus evacuationes in paroxysmo dolorum Arthriticorum male instituuntur 138 excretiones ejus consuetæ in malo Hypochondriaco Hysterico promovendæ 134 grumosus quomodo e Ventriculo evacuandus in Vomitu cruento 107 insuffi ienter per V. S. vel Scarificationem detractus quænam mala pariat 102 ejus motus ad inferiora quomodo invitandus in fluxu Hæmorrhoidalis defectu 111 motus ad uterum quomodo divertendus in fluxu Mensium nimio 113 orgasmus ejus quomodo compescendus in Cephalalgia Sanguinea 123 orgasmus ejus salinosulphureus quomodo corrigendus in Doloribus Arthriticis 137 orgasmus ejus quomodo sedandus in Hæmoptysi 106 quomodo refrænandus in Scorbuto 264 resolutio ejus quomodo fieri debeat in Pleuritide spuria 140 revulsio ejus quomodo instituenda in Hæmoptysi 106 stagnatio ejus quomodo instituenda in infarctibus 167 quomodo discutienda in Inflammationibus 149 stasis ejus in Vena-portæ quomodo resolvenda in Cardialgia 129 ventilationes ejus commendantur in Congestionibus extra paroxysmum 122 in Malo Hypochondriaco-Hysterico maxime sunt necessariae 134 quando admittendæ in Paroxysmo Podagrico 146

*Sanguis* quomodo dividatur 2 arteriosus cum subsultu prorumpit, venosus placide procedit 119 asinus est specificus in Mania 374

*Santas* quid sit 9 ejusd. differentia *ib.* causa efficiens 10 & vitæ signa *ib.* observationes *ib.*

*Santonici* semen in Vermibus præfertur Corallinae 413

*Sapo* Venetus in Spir. Vini solutus commendatur in Podagra 145

*Saponata* in Oedemate mature adhibita quandoque vix exe-



- exerunt 257  
*Scabies* benigna quid sit 260 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 261 cautelæ *ib.* per artificia externa perverse tractata quos morbos pariat 260 per contagium communicata facilius curatur, quam a dyscrasia sanguinis orta *ib.* sicca cum vitio Hepatis conjuncta quando curetur *ibid.* in senibus magis rebellis est quam in junioribus *ib.* retropulsa quam methodum exposcat 261 retropulsa cum commotionibus febrilibus quid de ea notandum *ib.* quando locum in ea habeant Mercurialia externa *ib.* in ea laudatur Antimonium crudum cum absorbentibus *ib.* humida post quartanam boni ominis 352  
*Scabies* maligna quid sit 261 ejusd. differentia *ib.* signa 262 subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 263 cautelæ *ib.* fœda & contumax olim sæpe pro Lepra habita fuit *ibid.*  
*Scammoniata* largiora nocent in Dysenteria benigna 215  
*Scarabæorum* pulvis intestino recto in ejusdem Procidentia inspergitur 297 majalium in melle suffocatorum succus laudatur in Rabie Canina 376  
*Scarificatio* quid sit 56 ejusd. differentia *ib.* indicantia *ib.* modus *ib.* instrumenta 87 locus *ib.* usus *ib.* regulæ & cautelæ *ib.* adhibetur in Palpitatione cordis 56 in sanguine nimis crasso inutilis *ib.* subjectis siccioribus minus convenit *ib.* præservatoria & repetita commendatur in Calculo 192 in Congestionibus 121 in assuetis convenit in Hæmoptysi 106 in Hemisrania 139 in Locis inferioribus commendatur in Odontalgia 127 in Nephritide spuria 141 in Podagra 144 in Oedemate quandoque sphacelum producant 257 in oculorum affectibus præfertur V. S. 154 narium convenit in Phrenitide 151 in pede suadet in Phthisi 184 in Vomitu cruento 107 in Podagra profundius instituenda 145 in Rabie Canina 376 in Doloribus arthriticis circa Novilunium 230  
*Sciacavilla* corticis extractum commendatur in Diarrhœa Cholericæ 401 corticis pulvis in Vomitu gravidarum 390 Plura vid. in Chacarilla.  
*Scirrhus* hepatis quid sit 177 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 378 cautelæ *ib.* inveteratus est incurabilis *ib.* qui morbi eum sequantur *ib.* hunc sequuntur Febres acutæ periodicæ *ib.* Martialibus præmature datis exasperatur *ib.*  
*Scirrhus* Lienis quid sit 176 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 177 cautelæ *ib.* sæpius per plures annos sine periculo durat 176 recentior quomodo interdum solvatur in fœminis *ib.* a Mensium vel Hæmorrhoidum suppressione quomodo tractandus 177 a Febre intermittente male curata quænam exposcat remedia *ib.* in hoc dissuadentur sanguinis evacuationes *ib.* in ea laudantur Gummi Ammoniacum & Rad. Cichorii *ib.*  
*Scirrhi* viscerum quid sit 166 horum differentia *ib.* signa *ib.* subjectum 167 prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 168 cautelæ *ib.* nullum ingens periculum inferunt 167 in iis commendatur diætæ exacta & motus continuatus 168  
*Scorbutus* quid sit 263 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.* in eo maculæ rosei coloris promptius curantur, quam coerulæ & lividæ *ib.* respuit omnes artificiales excretiones *ib.* an in eo salivatoria locum habeant 265  
*Scorbuticorum* Diarrhææ suppressæ quænam mala pariant *ibid.* Dolores male tractantur Anodynis *ib.* Hæmorrhagiæ suppressæ quid post se trahant *ib.* Vomitus suppressos sequuntur anxietates cardialgicæ *ibid.*  
*Secund. Eff.* commendatur in Febre inflammatoria 312  
*Scrotum* quid sit 50 ejusd. differentia *ib.* observationes *ibid.*  
*Seylla* & ex ea præparata commendantur in Tumore Podagræ extra Paroxysmum 146  
*Secretiones* & excretiones quid sint 3 horum differentia *ib.* organum *ib.* causa efficiens *ib.* modus 4 usus *ib.*  
*Secretio* Bilis ejus organum *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observat. *ib.*  
*Secretio* Fæcum Alvinarum *ib.* ejus organum *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observat. *ib.*  
*Secretio* Lactis 6 ejus organum *ib.* causa efficiens 7 usus *ib.* observationes *ib.*  
*Secretio* Lymphæ 6 ejusd. organum *ib.* usus *ib.* observationes *ib.*  
*Secretio* Lymphæ nervorum *ib.* ejus organum *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observationes *ib.*  
*Secretio* Muci 5 ejus organum *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observat. *ib.*  
*Secretio* Salivæ 7 hujus organum *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observat. 8  
*Secretio* Seminis 7 hujus organum *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observationes *ib.*  
*Secretio* Succu Pancreatici 8 ejus organum *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observationes *ib.*  
*Secundinarum* retentio quid sit 396 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.* quando in ea Hepar Anguillæ conveniat *ib.*  
*Sedum* Vermiculare laudatur in Paralyfi scorbutica 265  
*Sempervivi* succus laudatur in Siti nimia 382 in Soda 397  
*Septica* & mundificantia acriora in Pterygio non sunt adhibenda 368 quomodo mitiganda *ib.*  
*Serpillispiritus* abstractitius laudatur in Malo Ischiadico 142 in Nephritide spuria 141  
*Serum* lactis fumaria alteratum convenit in Scabie 261 cum rosis in Melancholia proficuum 376 tamarindinatum convenit in Mictu cruento 118  
*Semen* quid sit 7 ejusd. differentia *ib.* & 50 materia *ib.* de eo observat. & signa 50  
*Sensibilitas* quid sit 34 ejusd. differentia *ib.* subjecta *ib.* de ea observat. *ib.*  
*ex Sensibus* internis & externis signa 52  
*Sensus* quid sint 12 horum divisio *ib.* organum *ib.* objecta 13 causa efficiens *ib.* usus *ib.*  
*Sepia* os consultius minoribus quam majoribus dosibus exhibetur in Gonorrhœa 220  
*Serpigo* hæmorrhoidalis male tractata quos affectus inducat 135  
*Serrationis* definitio 87  
*Serum* & lymphæ ejusque vitia 192 horum definitio *ib.* differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia 193 methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.* ejus finis meliores sunt quam stagnationes *ib.* admodum mucosum parit partium obstructions *ib.*  
*in Seri* nimia fluxilitate & acrimonia nocent Alexipharmaca calida *ib.*  
*Serofi* affectus quando in eis convenient Discutientia & tonica *ib.*  
*Setacea* quid sint 87 horum locus *ib.* modus operandi *ib.* usus *ib.* cautelæ & observat. 88 in Cephalæa quando locum habeant 126 & fonticuli in Coryza habituali raro edunt effectum 195  
*Sexus* quid sit 11 ejusd. differentia *ib.* ad morbos disponit 32  
*Signum* quid sit 35 ejusd. differentia *ib.* fontes *ib.*  
*Sinapismi* allegantur in Catarrho suffocativo 36 in Cephalalgia Sanguinea 123 partium extremarum laudantur in Phrenitide & Paraphrenitide 152 urticationes &c. quas noxas inferre queant sanguineis 294  
*Singultus* quid sit 282 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi 283 cautelæ *ib.* in Dysenteria, Caulo & Colica malus 282 Emerica & Purgantia excipiens promptam medelam exposcit *ib.* ab inflammatione interna quomodo tractandus 283 a nimis emeticis & purgantibus Anodyna requirit *ib.* circa statum vel decrementum Febris Inflammatoriæ malus *ib.* in principio & statu febris Petechialis est funestus 335 in Hepatitide post Vomitus nigros lethalis 158 ut & in Paraphrenitide 151  
*Sistentia* quando in Febre exhibenda 347  
*Sitis* excessus & defectus quid sint 381 horum differentia *ib.* signa *ib.* subjecta *ib.* prognosib. remedia *ib.* methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.*  
*Sitis* cibis ex Spinachia, hordeo vel Lactuca sedatur *ib.*  
*Situs* qualis esse debeat in repositione uteri prolapsi 399  
*Sma-*



- Smaragdus* ppt. est verum cardiacum 282 est specificum  
*Dysenteriae* benignæ 215  
*Soda* s. *Orexis* quid sit 257 ejusd. differentia *ib.* signa  
*ib.* subjectum *ib.* prognosib. *ib.* methodus medendi 258  
cautelæ *ib.* in ea vitetur abusus Absorbentium *ib.*  
commendatur pulvis Nucis Moschatae absorbentibus  
additus *ib.*  
*Somnus* quid sit 13 ejusd. differentia *ib.* & 14 subjectum  
*ib.* signa *ib.* causa efficiens *ib.* usus *ib.* observat. *ib.*  
semioticae 53 in *Lipothymia* per aliquot horas non  
concedendus 295  
*Soporosi* affectus quid sint 489 horum differentia *ib.* me-  
thodus medendi 290 cautelæ 302  
*Spasmus* quid sit 273 ejusd. differentia *ib.* signa 274 sub-  
jectum *ib.* prognosib. *ib.* remedia *ib.* methodus meden-  
di 275 cautelæ *ib.* partialis ad quid vergat 274 par-  
ticularis quid indicet *ib.* in morbis acutis & vulne-  
ribus cerebri est periculosus *ib.* universalis ad quid  
pronus sit *ib.* idiopathicus quid exposcat *ib.* sympa-  
theticus, ad quænam in illo respiciendum 275  
in *Spasms* juniorum & sensibilibus laudatur *Cinnaba-*  
*ris* *ibid.*  
*Species* de *Hyacintho* commendantur in sudore & *Diar-*  
*rhœa* *Febris* *Hæctica* temperandis 358  
*Sperma* *Ceti* recens commendatur in *Tussi*, ubi materia  
nimis tenuis 201 discutiendi & resolvendi scopo ad-  
hibetur in *Uteri* inflammatione 165  
*Sphaelli* signa 93 prognosib. *ib.*  
*Spirituosa* non nisi sedato aliquantisper *Vomit* impetu  
applicanda 207  
*Spiritus* acidus formicarum quando efficax in *Podagra* 239  
*Spiritus* *Salis* in *Febribus* non convenit 195 tussim ad-  
modum auget 280  
*Spiritus* *Vini* commendatur in *Soda* ab assumtis pinguibus  
258 quando maxime conducatur in *Podagra* 146 simplex  
vel myrrhatus applicatur in *Crusta lactea* 410 recti-  
ficatissimus laudatur in *ruptura* *Varicum* 392 cam-  
phoratus *ventriculo* applicatur in *Febre* biliosa arden-  
te 309 *urinosi* quid efficiant in *Arthritide* 138 in exi-  
lissima dosi locum habent in *Vomitu* cruento 108  
*Splenia* quid sint 82 horum differentia *ib.* materia *ib.*  
usus *ib.* cautelæ *ib.*  
*Splenitis* vid. *Hepatitis*. quando in ea conducatur hæmor-  
rhagia *narium* 159 *Vomit* nigri diebus criticis con-  
tingentes salutare *ib.*  
*Sputum* quid sit 50 ejusd. differentia *ib.* observationes *ib.*  
quodnam salutare *ib.* in *Pleuritide* & *Peripneumonia*  
quodnam malum 51 graveolens in *Phthisi* lethale 184  
*Squilla* succus cum *V. S.* laudatur in *Tussi* humida ha-  
bituali 202  
*Stabli* *Crocus* *Martis* *Antimoniatus* suadet in *Cachexia*  
& *Cholorosi* 247 in *Oedemate* 256 in *Scorbuto* 264  
*Stabli* *Ess.* *Alexipharmaca* laudatur in *Fluxu* *Hepatico*  
212 in *Gravedine* 224 in *Impetigine* benigna 262 cum  
*Tonicis* convenit in *Raucedine* 225 locum habet in  
*Scabie* benigna 260  
*Stabli* *Pilulæ* laudantur in *Ascite* 250 in *Cachexia* &  
*Chlorosi* 153 in *Cardialgia* 129 in *Coryza* humida  
194 in *Dysuria* 240 in *Fluxu* *Cœliaco* & *Lienteria*  
211 in *Hæmorrhoidibus* nimis 109 in *Lochiorum* de-  
fectu 117 sunt specificæ in *Mensibus* nimis 113 com-  
mendantur in *Mictu* cruento 119 exhibentur in *secun-*  
*dinis* aut *laciniis* ejus resistentibus 116 in *Stranguria*  
239 in *sudore* suppresso 245 in *Tussi* *pectoralis* 200  
*Stabli* pulvis antepilepticus 269 ejusd. pulvis rubeus sa-  
linus allegatur in *fluxu* *Hæmorrhoid.* nimio 109  
*Stabli* *Mixtura* *Tonico* *Nervina* adhibetur in *Cholera*  
humida 210 in *Asthmate* humido 209 in *Diarrhœa*  
208 in *Fluxu* *Cœliaco* & *Lienteria* 211 in *Doloribus*  
capitis laudatur curative & præservative 224 in *Hæ-*  
*morrhoidibus* seroso-mucosis ad serum discutiendum  
213 in *Scorbuto* 264 in *Tussi* *stomachali* 202  
*Sterilitas* quid sit 384 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* sub-  
jecta *ib.* prognosib. *ib.* remedia 385 methodus meden-  
di *ib.* remedia *ib.* disponit ad morbos *Chronicos* *ib.*  
in illa commendantur balnea ex herbis aromaticis &  
leniter adstringentibus *ib.*  
*Stimulantia* quomodo præscribenda in *Impotentia* virili  
299 *Electuaria* conveniunt in *Obstructione* *alvi* 238  
& *Pellentia* nocent in *Mensum* defectu 115  
*Stranguria* quid sit 238 ejusd. differentia *ib.* signa 239  
subjectum *ib.* prognosib. *ib.* remedia *ib.* methodus me-  
dendi *ib.* cautelæ *ib.* ab *urinæ* acrimonia facilius cu-  
ratur quam a vitio *vesicæ* *ib.* frequentius sine errore  
diætæ recurrens quid portendat *ib.* ab acrimonia *uri-*  
*næ* quomodo tractanda *ib.* senum habitualis quid ex-  
poscat *ib.* a refrigeratione, quid in ea conveniat *ib.*  
a *Lue* venerea quomodo curetur *ib.*  
*Subadstringentia* & *tonica* commendantur in *flacciditate*  
*ventriculi* 381  
*Succi* *Pancreatici* definitio 8 ejusd. differentia *ib.* mate-  
ria *ib.* organum *ib.*  
*Succini* *Essentia* laudatur in *Dysuria* 49 in *Gravedine*  
& dolore capitis catarrhali 32 in *Lippitudine* 4 in  
*Scabie* benigna 67 in *Stranguria* 47  
*Suatio* sub salivatione præcavenda & cur 77  
*Sudor* quid sit 45 ejusd. differentia *ib.* observationes *ib.*  
& ex eo signa *ib.* matutinus præservat a morbis *ib.*  
in *Comate* occidens, lethalis 289 frigidus in *Febre*  
acuta occidens quid significet 237 nimius in *Vario-*  
*lis* *adultorum* est periculosus & cur 323 quomodo  
temperandus 319  
*Sudores* nocturni autocratici mediocres cum efflorescentia  
macularum rosearum scorbutum imminuunt 264  
*Sudoris* absentia *Tertianam* reddit diuturniorem 345  
*Sudoris* excretio quid sit 4 ejusd. differentia *ib.* mate-  
ria *ib.* organum *ib.* causa efficiens *ib.* tempus *ib.* usus  
*ib.* observat. *ib.* ad hunc promovendum quomodo con-  
currat calor externus *ib.*  
*Sudor* nimius quid sit 122 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.*  
subjectum *ib.* prognosib. *ib.* remedia *ib.* methodus me-  
dendi *ib.* cautelæ 223 febricitantium quam quandoque  
causam habeat 222 adstringentibus non est supprimen-  
dus 223 nec narcoticis & *Opiatis* minus correctis *ib.*  
in eo efficacia sunt acida temperata cum lenibus ale-  
xipharmacis *ib.*  
*Sudoris* suppressio & defectus quid sit 244 ejusd. diffe-  
rentia *ib.* signa *ib.* subjectum *ib.* prognosib. *ib.* reme-  
dia 245 methodus medendi *ib.* cautelæ *ib.* quænam  
mala ex ea eveniat adultis 244 quænam *Hypocho-*  
*driacis* *ib.* quænam junioribus *ib.* in acutis illorum  
statum reddit malum *ib.* quomodo tollenda in *Febri-*  
*bus* 245 in ea fugiantur *Purgantia* acria *ib.* ut &  
*Pulvis* *Pannonicus* ruber *ib.*  
*Suffitus* in *Ascite* non sunt adhibendi 251 in *Malo* *Is-*  
*chiadico* quando & quomodo convenient 143 pene-  
trantes nocent in *Convulsionibus* 279  
*Sulphur* laudatur in *Oedemate* a *Scabie* retropulsa 257  
in *Tussi* catarrhali & a *scabie* retropulsa est præstan-  
tissimum 202 externe ob vim repellendi rejicitur in  
*Hydrocephalo* 253 & i tenerius celebratur in *Blancar-*  
*do* in torminibus infantum 407  
*Suppositoria* nimis acria nocent in *Tenesmo* ab *Ascari-*  
*dibus* 285  
*Surditas* quid sit 370 ejusd. differentia *ib.* signa *ib.* subje-  
ctum *ib.* prognosib. *ib.* remedia *ib.* methodus medendi  
371 cautelæ *ib.* in acutis cum *urina* cruda quid por-  
tendat 370 quomodo hæc tractanda, & quæ in illa  
vitare conveniat 371 a nativitate raro admodum cu-  
ratur 370 senum quomodo sublevetur 371  
*Suppressio* *Hæmorrhoidum* vid. *Fluxus* *Hæmorrhoidum*  
deficiens.  
*Suppressio* *Lochiorum* vid. supra *Lochiorum* defectus.  
*Suppressio* *Mensum* vid. *Mensum* suppressio.  
*Sympathetica* in *Hæmorrhagiis* in genere 102 in *Hæ-*  
*morrhagia* *narium* 104 in *Odontalgia* *sympathica* &  
*Idiopathica* 127  
*Symptomata* quid sint 25 horum differentia *ib.* & seqq.  
observationes 27. & 79  
*Syncopæ* vid. *Lipothymia*  
*Synthesis* quid sit 82 ejusd. differentia *ib.*

## T

**T** *Abacus*, extractum ejus valet ad tussim compe-  
scendam 185 nisi legitime sit præparatum *Vomi-*  
*tus* excitat 186 in *Asthmate* humido caute exhiben-  
dum 205 ejus folia adduntur *Clysteribus* in *Colica*  
Oo 2 237



- 237 profunt in Oedemate 257 ejus fumus commen-  
datur in Appetitu nimio 380
- Tarantismus* quid sit 377 ejusd. differentia ib. signa ib.  
subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus me-  
dendi ib. cautela 378
- Tartarus* emeticus in Pleuritide ad promovendam expe-  
ctorationem male exhibetur 313 Vitriolatus com-  
mendatur in febribus acutis 301
- Temperamenta* quid sint 12 horum differentia ib. mixtio  
ib. mutatio ib. usus hujus doctrinae ib. observat. ib. dis-  
ponunt ad morbos 33 ad hæc respiciendum in Fluore  
albo 221 in surditate 371 in eligendis decoctis an-  
tivenereis 270
- Temperantia* laudantur in Addephagia, Bulimo, Orefi  
380 cum Cinnabari commendantur in præcavenda  
stranguria 240
- Tenesmus* quid sit 283 ejusd. differentia ib. signa ib. sub-  
jectum ib. prognosib. remedia ib. methodus me-  
dendi ib. cautela ib. graviditas affligens est periculosus  
ib. quomodo tractandus ib. ab ascaridibus, quid in eo  
exhibendum ib. cum Dysenteria, quid in eo conve-  
niat ib. Hæmorrhoidalis, fluxus hujus revocationem  
expolcit ib. in hac vitanda Aloetica 285
- Terebinthina* cocta, ex ea paratae pilulae conveniunt in  
Ischuria ab exulceratione 244
- Terebinthinata* & succinata in exulceratione vesicæ &  
renum caute adhibenda 189
- Terræ* sigillatae & adstringentia in Febre synocha putri-  
da nocent 306
- Theæ* potus commendatur in Soda 257 nimius parit Dia-  
beten 217
- Therapia* vid. Methodus Medendi.
- Theriaca* in Peste data excitat Petechias 342
- Theriaca* in Febre castrensi cum Diarrhœa vel Dy-  
senteria sunt vitanda 339
- Thermarum* usus internus & externus quid efficiat in  
Ascite 251
- Therma*, quæ in illis observanda 63 quomodo adhiben-  
dæ in Infartu Lienis 171 in Melancholia 376 quan-  
do locum habeant in Oedemate 257 quibusnam po-  
tissimum conveniant in Paralyfi & Hemiplexia 294  
quomodo & quæ in Phthisi suadendæ sunt 86 sul-  
phureæ & aluminosæ commendantur in incontinen-  
tia urinæ 217
- Thoracis* stricturæ nimix nocent mammis & papillis 406
- Tinea* quid sit 409 ejusd. differentia ib. signa ib. subje-  
ctum ib. prognosib. remedia ib. methodus meden-  
di ib. cautela ib. 410
- Tinctura* alcalina abstergens suadet post excretionem  
Calculi Renum 191 alcalina acris commendatur pro  
Mercurio e corpore expellendo 219 Antiarthritica  
quando conducat in Podagra 146 Antiphthifica Gram-  
manni nocet in Phthisi 185 Bezoardica absque cam-  
phora commendatur in Sudore suppresso 245 cum  
Camphora, Myrrha & Opio in Febre synocha non  
exhibenda 304 Coralliorum cum spiritu panis in Vo-  
mitu Cruento non rejicienda 108 Opii Langelotti  
commendatur in Diarrhœa 209 in Mictu cruento 118  
Resolvens sola sufficit ad Luem Veneream incipien-  
tem extirpandam 279 laudatur in ulceribus vaginæ  
uteri & urethræ 189 Salina Richteri temperat &  
discutit in colica biliosa 131 Vitrioli Martis Ludo-  
vici celebratur in anorexia 381 in sudore nimio 223  
interposito usu arcani duplicati curat atrophiam 174
- Tinnitus*, aurium quid sit 369 ejusd. differentia ib. signa  
ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus  
medendi 370 cautela ib. sæpius recurrens in seniori-  
bus Apoplexiam 369 ab adhibitis medicamentis cali-  
dioribus incrementa sumit 370 in eo laudatur Ol.  
amygd. amarar. & lac muliebre ib.
- Tonica* in Asthmate sicco 231 temperantia commendan-  
tur in Hæmorrhagia narium critica nimia 105 in  
Flatulentia diu continuanda 237 & discutientia sua-  
dentur in Fluore albo simplici 221 & adstringentia se-  
lecta commendantur in Gonorrhœa benigna & Pol-  
lutione nocturna 219 in Ictero 233 quænam adhiben-  
da in Fluxu Mensium nimio 113 quando locum ha-  
beant in Phthisi 186
- Tonus* corporis & ex eo signa 43 quid sit ib. ejusd. dif-  
ferentia ib. observat. ib. partium quomodo ad eum re-  
spiciendum in Catarrho suffocativo 227 in colica quo-  
modo roborandus 132 relaxatus in Cardialgia, quid  
in eo conveniat 129
- Topica* in Arthritide & Rheumatismo optime in forma  
sicca imponuntur 148 quando noceant in Cephalæa  
125 quænam in Mictu cruento conveniant 118 exter-  
na in Vomitu cruento non adhibenda grumis adhuc  
prodeuntibus 108
- Traumatica* quomodo adhibenda in Febre hæctica 359  
quænam conducant in Tussi sicca 229 fortiora nocent  
in Phthisi 186
- Tremor* quid sit 287 ejus differentia ib. signa ib. subje-  
ctum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi  
287 cautela ib. labii inferioris quid indicet 287 a  
Mercurio quomodo curandus ib. Paralyfi superveniens  
quid denotet ib.
- Trepanatio* quid sit 86 ejusd. indicantia ib. modus ope-  
randi ib. usus ib. cautela & observationes ib. in Ce-  
phalæa quando instituenda 126 an usum habeat in  
Hydrocephalo 253
- Trisolum* fibrinum quibus conveniat in Scorbuto 265
- Tubercula* scirrhusa pulmonum quid sint 174 horum dif-  
ferentia ib. signa ib. subjectum 175 prognosib. re-  
media ib. methodus medendi ib. cautela 186 ex his  
oritur Vomica pulmonum 175 in pulmonum sub-  
stantia ex sanguine nata pejora sunt quam quæ as-  
pera arteria & ex pituita generata sunt ib. quomo-  
do in hoc affectu locum habere queant expectorantia  
176 laudatur in eodem usus continuatus remediorum  
abstergentium & resolventium ib. balsamica & trau-  
matica rejiciuntur acriora. ib.
- Tumor* abdominis quid sit 401 ejusdem differentia ib.  
signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 402 me-  
thodus medendi ib. cautela ib. ansam præbet men-  
siu ataxiis 401
- Tumor* pedum œdematosus in Phthisi est lethalis 184
- Tumores* præputii & scroti quomodo in Gonorrhœa vi-  
rulenta tractandi 26
- Tumores* tunicati quid sint 92 horum differentia ib. si-  
gna ib. prognosib. curatio ib. cautela 93
- Tussis* humida quid sit 198 ejusdem differentia ib. signa  
Tussis humidæ catarrhalis 199 habitualis ib. pecto-  
ralis ib. stomachalis ib. ut plurimum accidit infan-  
tibus ib. subjecta ib. prognosib. remedia 200 me-  
thodus med. tussis catarrhalis ib. habitualis 202 pe-  
ctoralis 201 stomachalis ib. cautela 202
- Tussis* humida interdum est beneficium naturæ 199 quan-  
do pro phthifica habenda sit 200 stomachalis infan-  
tum facile transit in pectoralem ib. humida in sic-  
cam degenerans quid pariat ib. per expectorantia &  
emollientia perverse tractata in quid degeneret ib.  
sopitur per corticem chacarillæ 201 in hac laudatur  
Aqua Veronicæ Vinosa Stahlî ib.
- Tussis* sicca quid sit 228 ejusdem differentia ib. signa  
ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus  
medendi ib. cautela 229 ex congestionibus ad Hæ-  
moptysin quid exindemetuendum 229 hypochondria-  
ca chronica quid post se trahat ib.
- Tympanites* quid sit 251 ejusdem differentia ib. signa ib.  
subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus me-  
dendi 252 cautela ib. a Febribus male curatis orta  
facilius curatur quam a læsione viscerum 251 in eo  
laudantur digestiva & noduli ex incidentibus & a-  
maris 252 laxatio per epicrasin est optima in eo-  
dem ib.

## V

- Valeriana* commendatur interne & externe in Oph-  
thalmia 153 interne laudatur in Rabie canina 376
- Varandæ* pulvis ad dolores post partum 400
- Varices* quid sint 391 horum differentia ib. signa ib.  
subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus me-  
dendi 392 cautela ib. quandoque cum vitæ periculo  
rumpuntur 391 horum sectio periculosa 392 rumpen-  
tes, quid in illis conveniat ib.
- Variolæ* æqualiter erumpentes melioris sunt spei 315  
elevatæ meliores sunt depressis ib. limpida & aquo-  
la



- ſæ mali ut plurimum sunt ominis ib.* sub harum eruptione prodians hæmorrhagia narium ægros subleuat ib. quænam periculosa sint & retroversionem minentur ib.
- Variole* adutorum quid sint 322 harum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela 324 ut plurimum sunt confluentes 323 sunt periculosiores quam variolæ juniorum ib. quando in hisce suspectæ sint hæmorrhagiæ narium ib.
- Variole* confluentes quid sint 320 earund. differentia ib. signa ib. subjecta 321 prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautela 322.
- Variole* distinctæ quid sint 317 harum differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia 318 methodus medendi ib. cautela 19 in his Febris deficiens quomodo promovenda 318 nocet aqua Fumaræ 320 remedium multitudine ib. regimen nimis calidum 319 terreorum & incrassantium abusus ib.
- Venefectio* quid sit 55. & 87 ejusd. differentia 55 indicans ib. tempus ib. locus ib. modus ib. usus ib. cautela & observationes ib. non conducit in Angina symptomatice 156 in Apoplexia sanguinea sit larga 286 in Arthritide vaga tempore paroxysmi vitanda 147 præservatorie & curatorie convenit in Asthmate sicco 230 larga commendatur in Catarrho suffocativo 227 in Cephalæa hypochondriaca quomodo instituenda 125 quando commendanda in Colica convulsiva 278 præservativa circa æquinoctia suadet in Coryza humida 194 in digitis pedis majoribus specifica in Convulsionibus 273 in Febre Castrensi non facile instituenda 339 vitanda in Febre catarrhali maligna 333 quando cum fructu adhibeatur in Febre lenta 356 non administranda in Febre synocha præsentibus signis concoctionis 304 ab illa in febre Tertianâ legitima abstinendum 347 in Gutta serena & Cataracta non præmittenda 369 in pede convenit in Hæmoptoe 106 in Hæmorrhagia narium 105 in Hydrope incipiente feliciter administrata 250 quando locum habeat in Ictero 233 quomodo instituenda in Infarctu Pulmonum 169 quando locum non habeat in inflammatione Uteri 166 quando admittenda in inflammationibus 150 insignem usum habet in inflammatione ventriculi hypochondriaca & hysterica 235 larga sit in Ischuria Plethoricorum 244 quomodo locum habeat in Lipothymia 294 quando administranda in Mallo Ischiadico 143 quando conveniat in Oedemate 163 in Paralyfi 224 indicatur in Plethora 101 generalis omnibus Plethoricis convenit 102 insufficiens in Plethoricis quid causari possit ib. in Pleuritide & Peripneumonia non celebranda versus dies criticos 157 quando in Podagra 146 præservative commendatur in Purpura rubra 328 nocet in Scirrho Lienis a Febre male curata 177 quando maximum usum habeat in Tussi 201 in Vomica pulmonum consultius intermititur 180
- Venena* quid sint 24 horum differentia ib. signa ib.
- Veneræ* speculationes pariunt fluxum mensium nimium 112.
- Venus* vitanda in exulceratione Renum & vesicæ 189 in Ophthalmia 154 in Phthisi auget febrem 186 in Scirrho Lienis nimis exsiccatur 177
- Verbasci* liquor laudatur in Procidencia Ani 297
- Vermes* quid sint 23. & 412 horum differentia ib. 24 generatio ib. sedes ib. signa 412 subjectum 24. & 412 prognosib. remedia ib. methodus medendi 43 cautela ib. effectus 24 observationes ib. in Ventriculum migrantes quænam symptomata excitent 412 in graviore morbo exeuntes quid indicent ib. rubicundi sanguine pleni quid indigent ib. per Colocynthiaca potentissime expelluntur 413 quid in his censendum de C. C. ulso ib.
- Vermis* umbilicalis quomodo expellatur a vulgo ib.
- Veronica* aqua Vinosa Stahlî roborat pulmones debilitatos 200 commendatur in Asthmate sicco 230 in Brancho & Raucedine 225 in Tussi habituali 202
- Vertigo* quid sit 288 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 289 cautela ib. senum, quid ex ea metuendum 288
- tollitur fluxu Mensium & Hæmorrhoidum ib.
- Vesicatoria* quibus optime convenient in Apoplexia 292 commendantur in Catarrho suffocativo 217 in Cephalæa quando convenient 126 in Delirio symptomatice viris quam mulieribus magis profunt 152 quid efficiant in Febre synocha putrida 306 in Gravedine caute suadenda 224 in Lippitudine 196 ubi applicanda in Ophthalmia 154 maxime conveniunt in affectibus soporosis 291
- Vigiliæ* quid sint 13 horum differentia ib. organum ib. causa efficiens ib. usus ib. observat. ib. semiotice 53
- Vinea* per Vinca, aqua ejus commendatur in prolapsu uvulæ 296
- Vinum* calidum cum fimo equino est specificum in Ischuria 244 per cineres lixiviosos magis diureticum redditum convenit in Oedemate 256 generosum prodest in Dysenteria benigna 216 Rhenanum commendatur in Stranguria 240 ejus nimius usus parit Diabeten 217 ejus potus modicus conducit in Purpura rubra 283
- Vini* spiritus rectificatissimus applicatur scrobiculo cordis in nimio frigore febrium 343 camphoratus convenit externe in singultu ab Inflammationibus 283 in Vertigine 289
- Vita* quid sit 9 ejusd. differentia ib. causa efficiens 10
- Vitriolum* e Minera Martis Hassiaca commendatur in Mictu cruento 118
- Vitriolum* album c. v. Majoranæ laudatur in Gravedine 224
- Ulcera* quid sint 81 horum differentia ib. causa ib. signa ib. prognosib. curatio ib. cautela & observat. ib. vesicæ graviora sunt quam renum 188
- Unguentum* Comitis laudatur in Ischuria 244 in Nephritide 164 Forei ad Hydrocephalum 253
- Unguenta* pectoralia affluxum humorum ad pectus augent 202
- Unguifera* externa quid efficiant in Asthmate sicco 231
- Volatilia* quando bene exhibeantur in Asthmate convulsivo 276 in Atrophia data Hecticæ portam pandunt 174 in Calculo caute præscribenda 192 exulent in Febre catarrhali 315 in Febre inflammatoria 313 quid efficiant in Febre quartana 351 in Gravedine frequentius usurpare quas noxas inferant 224 quando exhibenda in Infarctu pulmonum 169 in Lippitudine in principio morbi non exhibenda 196 quid pariant in Melancholia incongrue adhibita 376 nocent in Phrenitide & Paraphrenitide 153 sine præmissis evacuantibus augent salivationem 198 in suppressione sudoris non propinanda 245 neque in Vomitu bilioso 207
- Volvulus* vid. sup. Passio Iliaca
- Vomica* pulmonum quid sit 179 hujus differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 180 cautela ib.
- Vomitoria* periculosa sunt in Angina 156
- Vomitoria*, quando ab usu eorum abstinendum in Asthmate 205 quando convenient in Asthmate spastico 276 curant Asthma stomachale 204 asthmaticis in ipso Paroxysmo data sunt valde periculosa ib. neque in Cephalæa 125 in Dysstocia caute danda 398 quando convenient in Febre Castrensi 339 quando in Febre epidemica & maligna 316 quibus & quando danda sint in Febre quotidiana intermittente 343 quare non sint exhibenda in Febre tertiana anomala & maligna 350 an sint necessaria in Febre tertiana legitima 347 in hac die paroxysmi non exhibenda ib. in Flatulentia non conveniunt 237 quando locum habeant in Hepatitide & Splenitide 159 nocent in Hypochondriaco-Hysterico 129 vitanda in Ictero 233 quando non danda in incubo 277 quando danda in inflammatione ventriculi & intestinorum 161 commendantur in Lethargo a nimia pituita 89 a venenis sulphureis ib. quando propinari queant in Melancholia 376 quando exhibenda in Paraphrenitide 152 quæ & quando in Peste 341 quando in Ruëtibus non adhibenda 235 nocent in Volvulo 163
- Vomitiorum* modus operandi 59 de eis regulæ & cautela ib. tempus ib.
- Vomitum* quid sit 205 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 206



- 206 cautelæ 207 continuans in acutis malus 205 artificialis quid sit 58. hujus differentia ib. indicantia ib. remedia 59 formulæ ib. cruentus quid sit 106 ejusd. differentia 107 imminentis signa ib. præsentis ib. subjectum ib. prognosib. remedia intra paroxysmum ib. extra paroxysmum ib. methodus medendi 108 cautelæ ib. in fœminis solvit infarctum Lienis 170 quandoque etjam scirrhum recentiore 176
- Vomitus* nigri in Hepatitide circa dies criticos lethales 158 in Splenitide magis salutare ib. materiæ nigricantis instar Rob sambuci ubi bonus & ubi malus 107
- Vox* & loquela quid sint & ex eis deprompta signa 41 horum differentia ib. observationes ib.
- Urina* quid sit 4. hujus differentia ib. materia ib. quænam sint organa ejus secretionis & excretionis ib. hujus causa efficiens ib. usus ib. observationes ib. turbida in Febribus quid indicet 24 cruenta in quibus morbis periculum prænuntiet 118 in Variolis & morbillis est lethalis 48 in inflammationibus qualis bona sit 149 nigra in acutis lethalis 146 pallida & crassa in rubicundam & flammeam mutata quid indicet in Atropia 173 profluvium ejus largum in Febre petechiali est periculosum 335 tenuis & alba in inflammatione uteri periculosa 165 turbida & sedimentum deponens circa diem quartum, quid indicet in Pleuritide & Peripneumonia 156 Lue Venerea laborantium qualis sit 48
- Urinæ* incontinentia quid sit 216 ejusd. differentia ib. signa ib. subjecta ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi 217 cautelæ ib. evenit fortioribus diureticis tractatis 216 plagas capitis fortiores excipiens quomodo tractanda ib. ab ulcere quomodo curetur 217 in somno quo anno ætatis cessare soleat juxta Timæum 216
- Uroscopia* præcepta 46
- Urtica* succus commendatur in Mictu cruento 118
- Ustio* quid sit 89 ejusd. differentia ib. prognosib. modus ib. usus ib. cautelæ ib.
- ab Ustione* inducta crusta non solis oleosis tractanda 90
- Uteri* procidentia quid sit 399 ejusd. differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ & observationes ib. in quibus difficilius curetur ib. a causis internis orta facilius curatur quam ab externis & violentis ib. qualis situs in ejus repositione observandus ib.
- Uteri* descensui aliquali in gravidis quomodo succurrendum ib.
- Vulnus* quid sit 84 ejusdem differentia ib. causæ ib. signa ib. prognosib. curatio ib. cautelæ & observationes 85 in Rabie Canina non statim consolidandum 377
- Uvula* destituti quos morbos incurrere soleant 194
- Uvula* exstirpatio quid sit ib. ejus indicantia ib. prognosib. operatio ib. cautelæ & observ. ib. non facile ad hanc procedendum ib. in quibus regionibus ut plurimum fiat ib. prolapsus quid sit 296 hujus differentia ib. signa ib. subjectum ib. prognosib. remedia ib. methodus medendi ib. cautelæ ib. in hoc affectu a Carolo Musitano laudatur Aqua Vincæ per Vincæ ib.

W

*Wildegansii pilul.* veræ commendantur in Febre quartana 352 in Tertiana 347

Z

*Zingiber* cibis aspersum commendatur in Ascite 250 in Cardialgia 129

F I N I S.























